

LOUIS VIDAL

DICTIONNAIRE
DE SPÉCIALITÉS
PHARMACEUTIQUES

1935

OFFICE DE VULGARISATION
PHARMACEUTIQUE
PARIS



P 11217-1935
LOUIS VIDAL

83218

83218

DICTIONNAIRE
DE SPÉCIALITÉS
PHARMACEUTIQUES

1935

EXCLU DU PRÊT




~~83218~~

~~83218~~

OFFICE DE VULGARISATION
PHARMACEUTIQUE

107, Rue Lafayette, PARIS (X^e)



Cet ouvrage est distribué par les soins de :

OFFICE DE VULGARISATION PHARMACEUTIQUE

===== SIÈGE SOCIAL : =====

107, rue Lafayette, Paris (Xe).

Tél. : Trudaine 41-05 et 06-84.

AGENCE DE LYON :

8, rue des Marronniers.

Tél. : Franklin, 39-83.

AGENCE DE MARSEILLE :

15, rue Lafayette.

Tél. : National 12-65.

OFFICE BELGE DE VULGARISATION PHARMACEUTIQUE

55-57, rue François-Bossaerts, Bruxelles.

===== Tél. : 15-79-05. =====

EXCLU DU PRÊT

AU CORPS MÉDICAL

Nous avons le plaisir de vous présenter la 16^e édition (1935) du *DICTIONNAIRE DE SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES*.

Comme les éditions précédentes, elle comporte un certain nombre d'améliorations de détail, dont certaines nous ont été suggérées par les médecins eux-mêmes. Toujours désireux de leur être agréable, nous avons suivi leurs indications. Bien entendu, nous n'avons pas modifié la présentation générale de notre ouvrage, à laquelle nous tenons à garder son caractère de commodité, de clarté et de simplicité.

La première partie (pages jaunes), a été paginée.

La « Table des Chapitres » a été refaite par ordre alphabétique et la pagination permet de retrouver instantanément, dans la « Table par action médicamenteuse et indications thérapeutiques », toutes les spécialités classées dans un chapitre donné.

La « Table par action médicamenteuse et indications thérapeutiques » a été simplifiée par la suppression de quelques paragraphes qui faisaient double emploi et l'encombraient inutilement ; par un contrôle rigoureux du répertoire des produits, son usage a été élargi et assoupli par de nombreux rappels paginés de chapitre à chapitre.

Les deuxième, troisième et quatrième parties se sont enrichies des nouveaux produits intéressants de l'année.

Les prix ont été systématiquement indiqués ; toutefois, nous vous prions de considérer qu'en cours d'année ils sont susceptibles de variations et qu'ils ne concernent que la vente en France.

Comme les années précédentes, les produits eux-mêmes ont été sélectionnés pour vous permettre de les prescrire dans votre clientèle d'assurés sociaux, sans craindre la moindre réaction administrative.

Telle quelle, la 16^e édition du *DICTIONNAIRE DE SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES* constitue sur ses aînées un progrès, progrès que nous n'entendons pas limiter. Cherchant à assurer une liaison médico-pharmaceutique de plus en plus étroite et amicale, nous continuerons à nous efforcer de faire toujours mieux, encouragés dans nos

efforts par l'appui moral du corps médical tout entier et l'aide financière des fabricants.

Nous sommes persuadés que le *DICTIONNAIRE DE SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES*, doyen des ouvrages de documentation spécialisée, restera pour vous l'ami fidèle qui, à portée de votre main, vous rend les services quotidiens auxquels vous êtes accoutumé.

Octobre 1934.

L. VIDAL.

NOTA

**Les prix des spécialités
pharmaceutiques
donnés dans cet ouvrage
sont ceux pratiqués en France.
Ils varient
pour chacun des autres pays.**

Première Partie

TABLE DES CHAPITRES

TABLE DES CHAPITRES

A

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Abcès | 130 |
| Abcès du poumon..... | 174-175-108 |
| Accélérateurs de la nutrition | 135 |
| Accidents sériques | 45 |
| Accouchements | 98 |
| Acétonémie..... | 139 |
| Acidose..... | 138 |
| Acné..... | 159 |
| Adénites | 127 |
| Adénoïdites..... | 202 |
| Adénopathie trachéo-bronchique..... | 112 |
| Aérophagie | 56 |
| Affections valvulaires..... | 108-28 |
| Albuminurie | 92 |
| Alcalins | 46 |
| Alcalose | 139 |
| Algies | 213 |
| Algies rhumatismales..... | 155 |
| Allaitement | 93 |
| Allergies | 57 |
| Alopécies..... | 161 |
| Amaigrissement | 224 |
| Amibiase | 183 |
| Amygdalites | 189-188-202 |
| Analgésiques généraux O. R. L. | 187 |
| Analgésiques locaux O. R. L..... | 187 |
| Analgésiques externes..... | 205 |
| Analgésiques internes..... | 206 |
| Anaphylaxie | 57 |
| Anémies..... | 31 |
| Anesthésiques généraux | 207-124 |
| Anesthésiques locaux | 207 |
| Anesthésiques rachidiens..... | 207 |
| Anesthésiques chirurgicaux | 207-124 |

| | |
|---|-------------|
| Anesthésiques locaux ophtalmologiques | 185 |
| Angines aiguës | 191 |
| Angine de poitrine..... | 34 |
| Angine de Vincent | 192 |
| Angiocholites..... | 59 |
| Anorexie | 58 |
| Anthrax | 130 |
| Anti-diarrhéiques..... | 47 |
| Antidyspnéïques..... | 108 |
| Antiémétisants | 48 |
| Antifermentescibles..... | 48 |
| Antigoutteux | 137 |
| Antiprurigineux | 158 |
| Antipyrétiques | 173 |
| Antiseptiques externes comprimés..... | 124 |
| Antiseptiques externes liquides..... | 124 |
| Antiseptiques externes pommades | 125 |
| Antiseptiques externes poudres..... | 125 |
| Antiseptiques externes savons, ovules, crayons. | 126 |
| Antiseptiques généraux tuberculose..... | 226 |
| Antiseptiques gynécologiques..... | 87 |
| Antiseptiques internes | 173 |
| Antiseptiques intestinaux | 48 |
| Antiseptiques locaux ophtalmologiques ... | 186-185 |
| Antiseptiques O. R. L. | 188 |
| Antiseptiques urinaires externes..... | 88 |
| Antiseptiques urinaires internes..... | 88 |
| Antiseptiques des voies respiratoires | 108 |
| Antispasmodiques artériels | 25 |
| Antispasmodiques et sédatifs (appareil digestif). | 50 |
| Antispasmodiques, sédatifs de la toux..... | 109 |
| Antispasmodiques (système nerveux)..... | 207 |
| Antithermiques | 173 |
| Anurie | 92 |
| Aortites | 37 |
| Aphonie..... | 189-121-195 |
| Appendicite chronique..... | 69 |
| Arsenicisme | 81 |
| Artério-sclérose et ses complications | 35 |
| Artérites | 37 |
| Arthralgies | 155 |
| Arthrite blennorragique | 95-134-174 |
| Arthrites | 155 |

| | |
|---------------------------------|------------|
| Arthritisme..... | 140 |
| Arythmie..... | 38 |
| Ascites | 61-25 |
| Asthénie | 142 |
| Asthme | 113 |
| Asthme cardiaque | 207-28-108 |
| Asthme des foin..... | 113 |
| Asystolie..... | 44 |
| Athrepsié | 151 |
| Atonie gastrique | 75 |
| Atonie gastro-intestinale | 75 |
| Auto-intoxication | 81 |
| Avitaminose | 146 |
| Avortements..... | 98 |
| Azotémie..... | 92 |

B

| | |
|--|------------|
| Bactériophages | 174 |
| Bactériothérapie | 174 |
| Bains..... | 126 |
| Bains d'yeux..... | 185 |
| Balanite..... | 95-88 |
| Balsamiques (voies urinaires) | 89 |
| Balsamiques (appareil respiratoire). | 111 |
| Bartholinites | 125-124-87 |
| Bismuthisme | 81 |
| Blennorragie | 95 |
| Blépharites | 186-185 |
| Bourdonnements d'oreilles | 192 |
| Bronchite capillaire..... | 116 |
| Bronchites chroniques | 121 |
| Bronchites fétides..... | 175-108 |
| Bronchopneumonie | 116 |
| Brûlures..... | 128 |

C

| | |
|--------------------------------|----------|
| Calmants de la douleur..... | 206-205 |
| Cancer | 231 |
| Cardiopathies aiguës..... | 39 |
| Cardiopathies chroniques | 28-25-39 |

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Carence calcique | 227 |
| Carence phosphatée | 227 |
| Carence magnésienne..... | 227 |
| Carie dentaire. | 227-203 |
| Cataplasmes | 126 |
| Catarrhe broncho-pulmonaire | 121 |
| Chancre mou | 96 |
| Chimiothérapie | 174 |
| Chlorose | 31 |
| Cholagogues | 51 |
| Cholécystites | 59 |
| Cholémie..... | 76 |
| Choléra..... | 63 |
| Cholérétiques..... | 51 |
| Chorée..... | 217 |
| Cicatrices vicieuses..... | 128 |
| Cicatrisants | 126 |
| Cigarettes médicamenteuses..... | 108 |
| Cirrhose | 61 |
| Claudication intermittente | 37 |
| Colibacillose | 175 |
| Coliques | 67 |
| Coliques hépatiques | 82 |
| Coliques néphrétiques | 103 |
| Coliques de plomb | 85 |
| Colloïdes | 174 |
| Collutoires | 188 |
| Collyres | 185 |
| Coma | 215 |
| Congestion cérébrale | 215 |
| Congestions du foie | 62 |
| Congestion pulmonaire..... | 116 |
| Conjonctivites | 186-185 |
| Constipation | 51-54 |
| Convalescences..... | 142 |
| Convulsions | 207-227 |
| Coqueluche..... | 117 |
| Coryza aigu et chronique..... | 193 |
| Coryza spasmodique..... | 194 |
| Crayons médicamenteux | 126 |
| Crevasses..... | 161 |
| Crevasses du sein | 93 |
| Cystites | 96 |

D

| | |
|-------------------------------|---------|
| Dartres | 167 |
| Débilité | 151 |
| Décongestifs (O. R. L.) | 191 |
| Décongestifs pelviens | 90 |
| Délires | 223 |
| Dentition..... | 203 |
| Dépression nerveuse | 220 |
| Dermites | 167-169 |
| Diabète | 146 |
| Diarrhées | 67 |
| Diététique..... | 134 |
| Dilatation des bronches | 121-108 |
| Diphthérie..... | 176 |
| Dissolvants uriques..... | 137 |
| Diurétiques..... | 25 |
| Dysenterie | 63 |
| Dyspepsies | 64 |
| Dyspnée..... | 108 |
| Dysthyroïdie..... | 216 |
| Dysurie | 92 |

E

| | |
|----------------------------|-------------|
| Echtyma | 125-124 |
| Eclampsie..... | 107 |
| Eczémas | 162 |
| Emménagogues..... | 91 |
| Émotivité | 218-209 |
| Emphysème pulmonaire..... | 119 |
| Empoisonnements..... | 81 |
| Encéphalite | 216 |
| Engelures..... | 161 |
| Enrouement..... | 189-121-195 |
| Entérites aiguës | 67 |
| Entérites chroniques | 69 |
| Entorses..... | 129 |
| Epilepsie | 217 |
| Epistaxis..... | 26 |
| Eréthisme | 39 |

| | |
|----------------------------------|-----|
| Eréthisme cardio-vasculaire..... | 39 |
| Erysipèle..... | 176 |
| Erythèmes..... | 164 |
| Etats précancéreux..... | 231 |
| Eupeptiques..... | 52 |
| Eupnéiques..... | 108 |

F

| | |
|---------------------------------|---------|
| Fébrifuges..... | 173 |
| Fermentations intestinales..... | 67 |
| Ferments lactiques..... | 174 |
| Fibromes..... | 98 |
| Fièvre..... | 173 |
| Fièvres éruptives..... | 177 |
| Fissures anales..... | 84 |
| Fistules..... | 132 |
| Fistules anales..... | 84 |
| Flatulences..... | 75 |
| Foie cardiaque..... | 28-62 |
| Folliculites..... | 159-130 |
| Fractures..... | 129 |
| Furoncles, Furonculose..... | 130 |

G

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Galactogènes..... | 90 |
| Gale..... | 166 |
| Gangrène..... | 40 |
| Gangrène pulmonaire..... | 174-175-108 |
| Gargarismes..... | 188 |
| Gastralgies..... | 72 |
| Gastro-entérites de l'enfance..... | 73 |
| Gerçures..... | 161 |
| Gingivites..... | 85 |
| Goitre exophtalmique..... | 216 |
| Goutte..... | 147 |
| Grippe..... | 177 |
| Grossesse..... | 98 |
| Gynécologie..... | 175-124-125-87 |

H

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Helminthiase..... | 183 |
| Hématémèse..... | 26 |
| Hématopoïétiques..... | 31-186 |
| Hématuries..... | 26 |
| Hémiplégie..... | 215 |
| Hémophilie..... | 26 |
| Hémoptyxies..... | 26 |
| Hémorragies..... | 26 |
| Hémorragie cérébrale..... | 215 |
| Hémorroïdes..... | 41 |
| Hémostatiques généraux..... | 26 |
| Hémostatiques utérins..... | 91 |
| Herpès..... | 164 |
| Hoquet..... | 207-56-50 |
| Hydarthroses..... | 129 |
| Hydrargyrisme..... | 81 |
| Hyperchlorhydrie..... | 74 |
| Hyperémotivité..... | 218 |
| Hyperkinésie gastrique..... | 74 |
| Hypertenseurs..... | 29 |
| Hypertension..... | 42 |
| Hypnotiques..... | 208 |
| Hypocalcémie..... | 227 |
| Hypochlorhydrie..... | 75 |
| Hypokinésie gastrique..... | 75 |
| Hypopepsie..... | 75 |
| Hyposystolie..... | 44 |
| Hypotenseurs..... | 30 |
| Hypotension..... | 44 |
| Hystérie..... | 217 |

I

| | |
|------------------------------|-----|
| Ictère..... | 76 |
| Impétigo..... | 165 |
| Impuissance..... | 100 |
| Incontinence d'urine..... | 101 |
| Infections intestinales..... | 78 |
| Infection puerpérale..... | 101 |

| | |
|------------------------------------|--------|
| Inhalations..... | 189 |
| Insomnies | 218 |
| Instillations ophtalmologie | 185 |
| Instillations O. R. L..... | 189 |
| Instrumentation | 134 |
| Insuffisance hépatique..... | 79 |
| Insuffisance pancréatique | 81 |
| Insuffisance cardiaque | 44 |
| Insuffisance polyglandulaire | 186 |
| Insuffisance rénale | 102 |
| Intertrigo | 164 |
| Intolérance lactée..... | 134-57 |
| Intoxications | 81 |

K

| | |
|------------------------|-----|
| Kératoplastiques | 159 |
|------------------------|-----|

L

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Lactiques (ferments) | 174 |
| Laryngites aiguës et chroniques | 195 |
| Laryngites striduleuses..... | 197 |
| Lavages O. R. L..... | 188 |
| Laxatifs | 54 |
| Lèpre | 177 |
| Leucémie | 31 |
| Leucorrhée | 124-125-87 |
| Lithiase biliaire | 82 |
| Lithiase rénale | 103 |
| Lumbago..... | 155 |
| Lupus | 170 |
| Lymphadénie | 31 |
| Lymphatisme | 151 |

M

| | |
|-----------------------------|--------|
| Magnésienne (carence) | 227 |
| Maladie du sommeil | 183 |
| Mal de mer | 209-48 |

| | |
|---|---------------|
| Mastoïdites..... | 197 |
| Médicaments d'épargne | 137 |
| Mélancolie | 210-218-209 |
| Mélæna..... | 26 |
| Méningite cérébro-spinale | 216 |
| Ménopause | 104 |
| Menstruation | 104 |
| Métrites | 90-124-175-87 |
| Migraines..... | 213 |
| Migraines ophtalmiques | 213 |
| Modérateurs cardiaques..... | 27 |
| Modificateurs sécrétoires (balsamiques)..... | 111 |
| Modificateurs sécrétoires (expectorants) | 111 |
| Modificateurs du sympathique et du para- sympathique | 209 |
| Muguet | 85 |
| Mycoses | 166 |

N

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Néphrétiques (Coliques) | 103 |
| Néphrites aiguës et chroniques | 102 |
| Nervosisme..... | 218 |
| Neurasthénie | 220 |
| Neuro-toniques..... | 210 |
| Névralgies | 213 |
| Névralgie faciale | 213 |
| Névrites..... | 213 |
| Névrose d'angoisse | 220 |

O

| | |
|----------------------------|-----|
| Obésité | 149 |
| Œdème aigu du poumon | 120 |
| Œdèmes périphériques | 25 |
| Opothérapie..... | 186 |
| Orchite | 95 |
| Oreillons | 180 |
| Orgelet | 185 |
| Ostéite..... | 131 |

| | |
|-------------------|-----|
| Ostéomyélite..... | 131 |
| Otites..... | 197 |
| Ozène..... | 198 |

P

| | |
|---|-------------|
| Palpitations | 39 |
| Paludisme | 183 |
| Panaris | 130 |
| Pansements | 132 |
| Pansements gastriques | 55 |
| Paralysie agitante | 223 |
| Paralysies périphériques | 223 |
| Paraplégie..... | 215 |
| Parasites de l'intestin et des voies biliaires. | 184 |
| Paratyphoïde..... | 182 |
| Pharyngites aiguës..... | 198 |
| Phlébites..... | 41 |
| Phlegmons..... | 130 |
| Phosphatée (Carence)..... | 227 |
| Phosphaturie..... | 150 |
| Phtyriase | 166 |
| Piqûres d'insectes | 130 |
| Pithiatisme | 218 |
| Pityriasis..... | 167 |
| Plaies | 132 |
| Pleurésies | 120 |
| Pleurite..... | 205-206-120 |
| Pleurodynie..... | 205-206-120 |
| Pneumonie franche aiguë | 116 |
| Pommades ophtalmologiques | 186 |
| Pommades O. R. L..... | 190 |
| Poudres O. R. L..... | 190 |
| Poudres antiasthmiques..... | 108 |
| Préparations radio-actives | 174 |
| Prétuberculose | 227 |
| Préventifs des maladies infectieuses..... | 189-173 |
| Produits irradiés et vitaminés | 138 |
| Prostatisme | 96 |
| Prurigo | 167 |
| Prurit | 167 |
| Prurit anal | 84 |

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Psychasthénie | 220 |
| Psychoses..... | 210-211-209-220 |
| Psychonévroses | 210-211-209-220 |
| Psoriasis..... | 168 |
| Puberté..... | 104 |
| Pulvérisations (O. R. L.)..... | 189 |
| Purgatifs | 54 |
| Purpura | 26 |
| Pyélonéphrites | 106 |
| Pylore (sténoses et spasmes) | 50-85 |
| Pyodermites..... | 169 |
| Pyorrhée alvéolo-dentaire | 203 |
| Pyrosis | 56-207-50 |

R

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Ramollissement cérébral | 215 |
| Rachi-anesthésie..... | 207 |
| Rachitisme..... | 151 |
| Radio-activité | 174 |
| Raynaud (Syndrome de) | 40 |
| Recalcifiants | 227 |
| Rectites | 84 |
| Régimes | 134 |
| Régulateurs de la nutrition..... | 138 |
| Régulateurs des règles..... | 91 |
| Réminéralisants | 227 |
| Révulsifs | 126 |
| Rhinites | 199 |
| Rhino-pharyngites chroniques | 199 |
| Rhumatisme articulaire aigu | 180 |
| Rhumatisme blennorragique | 175-134-174-95 |
| Rhumatismes chroniques | 155 |
| Rhumatismes infectieux | 174-175-173 |
| Rhume des foin | 194 |
| Rougeole | 181 |

S

| | |
|-------------------------|---------|
| Salpingo-ovarites | 125-124 |
| Saturnisme | 85 |
| Sciatique..... | 213 |

| | |
|--|-------------|
| Sclérose en plaques | 174-223 |
| Séborrhée | 170 |
| Sédatifs du système nerveux | 211 |
| Sédatifs utéro-ovariens..... | 91 |
| Sédatifs de la toux..... | 109 |
| Sérothérapie | 175 |
| Septicémie..... | 181 |
| Sérums vaccins..... | 175 |
| Shock | 45 |
| Sinusites | 200 |
| Spasmes digestifs | 50 |
| Spasmophilie..... | 227-209-207 |
| Spermatorrhée | 100 |
| Sténoses du pylore..... | 85 |
| Stimulants de la sécrétion et motilité gastriques. | 56 |
| Stomachiques | 52 |
| Stomatites | 85 |
| Stomatologie..... | 203 |
| Sueurs | 231 |
| Surdité..... | 192 |
| Surmenage | 142 |
| Sycosis | 166 |
| Sympathique (système) | 209 |
| Syndrome entéro-rénal..... | 173-88-175 |
| Syndrome de Raynaud..... | 40 |
| Syndrome solaire | 207-209-50 |
| Syphilis (préventifs)..... | 203 |
| Syphilis (Traitement arsenical)..... | 204 |
| Syphilis (Traitement bismuthique) | 204 |
| Syphilis (Traitement ioduré) | 204 |
| Syphilis (Traitement mercuriel)..... | 205 |
| Syphilis (Traitement mixte) | 205 |
| Système sympathique | 209 |

T

| | |
|------------------|-------------|
| Tabès | 205-204 |
| Tachycardie..... | 39 |
| Teigne..... | 166 |
| Tétanie | 209-227-207 |
| Tétanos | 175 |
| Tics | 223 |

| | |
|---|---------|
| Toni-cardiaques | 28 |
| Toniques..... | 227 |
| Torticolis..... | 213 |
| Toux | 109 |
| Trachéites | 121 |
| Trachéo-bronchites aiguës..... | 121 |
| Trachome | 186-185 |
| Troubles de croissance..... | 151 |
| Troubles vago-sympathiques..... | 209 |
| Tuberculose (Antiseptiques généraux) | 226 |
| Tuberculose (Hémoptysies) | 26 |
| Tuberculose intestinale | 86 |
| Tuberculose laryngée | 189 |
| Tuberculose (Médications locales) | 226 |
| Tuberculose osseuse | 138-227 |
| Tuberculose (Sueurs)..... | 231 |
| Tuberculose pulmonaire..... | 108-120 |
| Tuberculose (reminéralisation recalcification.) | 138-227 |
| Tuberculose (Traitement spécifique)..... | 230 |
| Tuberculose uro-génitale..... | 88 |
| Tumeurs | 231 |
| Tumeurs de la peau | 170 |
| Typhoïde..... | 182 |

U

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Ulcérations du col utérin..... | 134-126-87 |
| Ulcères (chirurgie)..... | 132 |
| Ulcères estomac et duodénum | 86 |
| Ulcères variqueux..... | 171 |
| Urémie | 92 |
| Urétrites | 95 |
| Urticaire..... | 172 |

V

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Vaccins..... | 175 |
| Vaginites..... | 175-87 |
| Varices | 41 |
| Varicocèle | 29-41 |
| Vaso-constricteurs (O. R. L.) | 191 |

| | |
|------------------------------------|--------|
| Vaso-constricteurs artériels | 29 |
| Vaso-constricteurs veineux. | 29 |
| Vaso-dilatateurs artériels..... | 30 |
| Végétations adénoïdes..... | 202 |
| Verrues..... | 170 |
| Vertiges | 42-192 |
| Vomissements..... | 48 |
| Vomissements incoercibles..... | 107 |


Z

| | |
|-----------|-----|
| Zona..... | 182 |
|-----------|-----|

TABLE
par actions médicamenteuses
et
indications thérapeutiques
des spécialités
figurant
dans cet ouvrage.

Abréviations : { **T. G.** : Thérapeutique générale.
 { **T. S.** : Thérapeutique spéciale.

Le **Dictionnaire de Spécialités Pharmaceutiques** doit son excellente réputation au soin apporté à sa rédaction. Sa composition est cependant si complexe qu'une erreur a pu s'y glisser. Il va sans dire que nous déclinons toute responsabilité pour les conséquences qui pourraient en résulter.



I. — APPAREIL CIRCULATOIRE. T. G.

ANTISPASMODIQUES ARTÉRIELS

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Acécoline. | Néospasmodyl. |
| Acécoline Camphre. | Neurotensyl. |
| Acécoline Spartéine. | Neuséda. |
| Acécoline Yohimbine. | Novatropine. |
| Acoégénol. | Nucléocardyl. |
| Alepsal Génévrier. | Oléthyle-benzyle. |
| Aloysine. | Orthogénol. |
| Amphostène. | Papavéryl. |
| Amphotonyl. | Paxène. |
| Ampoules de Spasmalgine | Pragmoline. |
| Roche. | Pulsamone. |
| Angioxyl. | Quinicardine. |
| Antonal. | Rhodazil. |
| Artérioveinine. | Rythmos Leysin. |
| Benzoflorine. | Sédergine. |
| Benzyanyl. | Sédopavérine. |
| Benzylol. | Spasmalone. |
| Calmocardine. | Spasmine Jolly. |
| Capsules Bruel. | Spasmoneural. |
| Cardialgine Dubois. | Spasmosédine. |
| Cardiosthénine. | Spasneurol. |
| Cratægus Gmet. | Surparine. |
| Crinocardine. | Sympathocrine. |
| Détensyl. | Sympathyl. |
| Disonyl. | Tensédine. |
| Dragées Lumeval. | Tensol Laurençon. |
| Eupavéryl Pachaut. | Tensoryl D. |
| Gouttes antispasmodiques | Théovérine Laleuf. |
| Dausse. | Trinivérine. |
| Gui Byla. | Vagosédyl. |
| Gui Gmet. | Valbornine Rogier. |
| Hypotan. | Valbrol. |
| Iodaubépine. | Valénal Novalis. |
| Iodotensyl Dubois. | Vasonitryl. |
| Natirose. | |

DIURÉTIQUES

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Absuric. | Chophytol Rosa Injectable. |
| Adoverne. | Comprimés Proto Gambier. |
| Antonal. | Crinocardine. |
| Androstine. | Chlorical. |
| Artérase. | Colchi-Sal. |
| Baldisédan. | Cynurol Rosa. |
| Benzo-iodhydrique. | Détensyl. |
| Boldo Gmet. | Digalène Roche. |
| Cafédrine. | Digibaïne. |
| Calcional. | Digifoline Ciba. |
| Calci-Sthénine. | Digi Lanatine. |
| Calcium Francalcion | Digllanide Sandoz. |
| Calcivitam. | Digimialbaïne. |
| Canol. | Digitaline cristallisée Mi- |
| Choléo-combrétol. | alhe Petit. |
| Chophytol Rosa. | Digitaline Inyar. |

I. — APPAREIL CIRCULATOIRE. T. G.

DIURÉTIQUES

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Digitatine Nativelle. | Pulmocardine. |
| Diurégan. | Pyurol. |
| Diurène. | Rénion Vincardl. |
| Diuréphédrine. | Romarantyl. |
| Diurétique Gmet. | Romarène. |
| Diurobromine. | Rythmos Leisyn. |
| Diurocalcine Gros. | Saint-Aré. |
| Diurocardine. | Santal Midy. |
| Do-Sa-No-Sal. | Santal Monal. |
| Dragécalcion. | Santhéose. |
| Dragées Lebrun tonicar- diaques. | Scillarène Sandoz. |
| Euchol Morellet. | Scillitrine. |
| Eumictine. | Sclérosérol. |
| Eupnine Vernade. | Sédarthryl. |
| Evobiline. | Solurol. |
| Francalcion. | Strophantine Catillon. |
| Gambéol. | Strophantus Catillon. |
| Gui Byla. | Técarine. |
| Gui Gmet. | Tensol Laurençon. |
| Guipsine. | Théisine Dubat. |
| Guitose. | Théobromine Invar. |
| Granules Chanteaud. | Théobromose Dumesnil. |
| Gravural. | Théobryl. |
| Hépalomel Védé. | Théocalciode. |
| Hermophényl Lumière. | Théosalvose. |
| Inorénol. | Théovadyl. |
| Kodos. | Théoverine Laleuf. |
| Lacto-Sérum Lavril. | Théoxanthine. |
| Lancéryl. | Tisane hépatique Lahaye. |
| Métaformine. | Tonicardine Gonnon. |
| Mictoseptol. | Ultraformine. |
| Natibaine. | Uréol Chanteaud. |
| Néphryl. | Uriclarine. |
| Neptal. | Urisanine. |
| Nucléocardyl. | Urobuccol Malmanche. |
| Organi-Calcion simple. | Uroflux. |
| Orthogénol. | Urol. |
| Ouabaine Arnaud. | Urométhyl. |
| Pancalcion. | Uromil. |
| Phaguryl. | Urophile. |
| Plasmocalcium. | Uroquinol. |
| Pelvivormine. | Urosalyl. |
| Pneumogéine Renard. | Urosalyl méthylé. |
| Poudre Danica. | Urosan Dufayard. |
| Proto Gambier. | Uro-Tisan. |
| | Vitacholine. |

HÉMOSTATIQUES

| | |
|---------------------|--|
| Adrénaline Clin. | Adréphédrine Béral. |
| Adrénaline Invar. | Albuol Leysin. |
| Adrénaline Sauba. | Ampoules Boissy |
| Adrénine. | Ampoules Boissy au nitrite d'amyle. |
| Adrénoloïdes Béral. | |

I. — APPAREIL CIRCULATOIRE. T. G.

HÉMOSTATIQUES

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Ampoule de Pantopon Roche. | Hémocalciopectine. |
| Anacamphre. | Hémogénol Dausse. |
| Anthéma. | Hémoplasmine. |
| Arhémapectine Gallier. | Hémosamine. |
| Artérase. | Hémostatique Coudert. |
| Belhémine. | Hémostatique Goy. |
| Boricine Meissonnier. | Hémostyl. |
| Calcional. | Hydrastine Houdé. |
| Calcium Francalcion. | Hydrastis Gmet. |
| Calcium Sandoz. | Jabosulfène. |
| Calcisthénine. | Lugocalcion. |
| Calcivitam. | Natirose. |
| Canol. | Organicalcion simple. |
| Chlorical. | Ozobiase. |
| Chlorocalcion. | Pancalcion. |
| Clisémine Longuet. | Pandrénaline. |
| Coaguléne Ciba. | Penghawar des Iles. |
| Colloïl Leysin. | Phymostéryl Leysin. |
| Donagol. | Physocrisine. |
| Dragécalcion. | Pituilobine Byla. |
| Ergotine Lamante. | Plasma de Quinton. |
| Extrait Hamyd. | Plasmocalcium. |
| Ferroxyline. | Post-hypophyse Choay. |
| Fornose. | Sclérosérum. |
| Francalcion. | Sécacornine Roche. |
| Gastrocaol. | Séroma Rey. |
| Gui Byla. | Sérum Jousset. |
| Gui Gmet. | Sérum Oliviero. |
| Guipsine. | Silicyl. |
| Guitose. | Térozone. |
| Gynergène Sandoz. | Toniveinine. |
| Hamamélis Gmet. | Utersan. |
| Hématoéthyroïdine. | Vasoneurine. |

MODÉRATEURS CARDIAQUES

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Adoverne Roche. | Digilanide Sandoz. |
| Alepsal. | Digimialbaïne. |
| Amphostène. | Digitaline cristallisée |
| Amphotonil. | Mialhe. |
| Artérioveinine. | Digitaline Invar. |
| Benzoslorine. | Digitaline Nativelle. |
| Bromo-garnal. | Dragées Lumeval. |
| Calmocardine. | Euphytose. |
| Cantéine Bouteille. | Freinospasmyl. |
| Chloral bromuré Dubois. | Iodaubépine. |
| Cratægus Gmet. | Lubrokai. |
| Cuprémone simple et F. | Néospasmodyl. |
| Digalène Roche. | Neuridor. |
| Digibaïne. | Neuroflorine. |
| Digifoline Ciba. | Neuséda. |
| Digi-lanatine. | Névrosan. |

I. — APPAREIL CIRCULATOIRE. T. G.

MODÉRATEURS CARDIAQUES

| | |
|--------------------|------------------------|
| Padéryl. | Spasmalone. |
| Passiflorine. | Spasmine Jolly. |
| Paxène. | Spasmoneural. |
| Phosol. | Spasmosédine. |
| Phosphobrom. | Sympathocrine. |
| Pulsamone. | Vagosédyl. |
| Quinicardine. | Vagostabyl. |
| Quinoïdine Duriez. | Valérianate Pierlot. |
| Rythmos Leisyn. | Valériane Gmet. |
| Rythmosystol. | Valériane Pachaut. |
| Sédergine. | Valérianose Gigon. |
| Sédobrol Roche. | Valérinodor Malmanche. |
| Sédopancrine. | Valérium Paul Thibault |
| Spartéine Houdé. | Vériane Buriat. |
| Spartoval. | Veronidia. |

TONI-CARDIAQUES

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Acécoline spartéine. | Digi-Lanatine. |
| Adoverne. | Digilanide Sandoz. |
| Adrénaline Clin. | Digimialbaïne. |
| Adrénaline Invar. | Digistabilline. |
| Adrénaline Sauba. | Digitaline cristallisée |
| Adrénine. | Mialhe Petit. |
| Adrénoïdes Béral. | Digitaline Invar. |
| Alcamfétol. | Digitaline Nativelle. |
| Allicardia. | Disonyl. |
| Anacamphre. | Diurène. |
| Angitan. | Diuréphédrine. |
| Asthmasédine. | Diurocalcine Gros. |
| Asthmo-actine. | Diurocardine. |
| Bain carbogazeux Wolo. | Dragées Lebrun tonicar- |
| Cafédrine. | diaques. |
| Camphodausse. | Ephédraphéine Béral. |
| Campho-spartéine Dubois. | Eupnine Vernade. |
| Camphostyl Lacroix. | Génésérine. |
| Camphydril Robin. | Génostrychnine. |
| Camphydril strychno-spar- | Gmet (extraits). |
| téiné. | Granules Chanteau. |
| Cardialgine Dubois. | Granules de Pantofort du |
| Cardibaïne. | D ^r Boycil. |
| Cardion Vincardi. | Gui Byla. |
| Cardiosthénine. | Gui Gmet. |
| Carditone. | Guipsine. |
| Colloïode Dubois. | Guitose. |
| Composé Gmet. | Humoro stabiline. |
| Coramine Ciba. | Intrait de strophantus. |
| Cratægus Gmet. | Kola caféinée Aubert. |
| Crinocardine. | Kola granulée Astier. |
| Digalène Roche. | Kola Monavon. |
| Digibaine. | Kolatines. |
| Digifoline Ciba. | Lancéryl. |

1. — APPAREIL CIRCULATOIRE. T. G.

TONI-CARDIAQUES

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Mialbaine. | Silguine. |
| Natibaine. | Solucamphre Delalande. |
| Nucléocardyl. | Solucamphre spartéiné Delalande. |
| Orthogénol. | Solution Normet chirurgicale. |
| Ouabaine Arnaud. | Solution Normet médicale. |
| Pavérinol Laleuf. | Spartéine Houdé. |
| Paxène. | Spartocamphre. |
| Phosol. | Spartoval. |
| Phylla Dyn. | Strophantine Catillon. |
| Pituitobine Byla. | Strophanthus Catillon. |
| Pneumogéine Renard. | Strychnal Longuet. |
| Protensène Lejeune. | Strychnotinine. |
| Quinoïdine Duriez. | Tensol Laurençon. |
| Rythmos Leisyn. | Théobromose Dumesnil. |
| Rythmosystol. | Théosalvose. |
| Santhéose. | Tonicardine Gonnon. |
| Scillarène Sandoz. | Viscosérum. |
| Scillitrine. | |
| Sérum Normet médical. | |

VASO-CONSTRICTEURS ARTÉRIELS HYPERTENSEURS

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Adrénaline Clin. | Ephédrine Houdé. |
| Adrénaline Invar. | Ephédrine naturelle Béral. |
| Adrénaline Sauba. | Ergotine naturelle Béral. |
| Adrénine. | Ergotine Lamante. |
| Adrénoïdes Béral. | Garéphédrine. |
| Adréphédrine Béral. | Grains d'éphédrine Béral. |
| Aloysine. | Hormuclases. |
| Androcalcion E. | Pandrénaline. |
| Androcalcion H. | Phylla Dyn. |
| Antonal. | Rénaleptine. |
| Arsécrinol. | Sanédrine. |
| Artérase. | Sédotensyl. |
| Carditone. | Spartéine Houdé. |
| Ephédrampoules Béral. | |

VASO-CONSTRICTEURS VEINEUX

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Acésine Guillaumin. | Cataményl. |
| Adrépatine. | Cipromarol. |
| Aesculase. | Cuprénone simple et F. |
| Angitan. | Cyproveinol. |
| Aphloïne Trouette-Perret. | Ergotine Lamante. |
| Astasol. | Esculéol. |
| Bain Bagnor radioactif. | Extraits Hamyd. |
| Bain Flévar. | Fluérase. |
| Biopausine. | Fluxine (Gouttes). |
| Calmo-suppos sédatifs. | Gouttes de Serd. |
| Cantéine Bouteille. | Hamacitro. |

I. — APPAREIL CIRCULATOIRE. T. G.

VASO-CONSTRICTEURS VEINEUX

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Hamaméline Roya. | Phlébotonine. |
| Hamaméliode. | Pommade Logeais. |
| Hamamélis Gnet. | Proveinase Midy. |
| Hamamélis Granval. | Rectosol. |
| Hémoductyl. | Rénovol. |
| Hémoluol. | Salveinase Legoux. |
| Hémopausine. | Sédacrine. |
| Hémorroïdine (Gouttes). | Silicyl. |
| Hémorroïdine (Pommade). | Suppositoires à l'Esculéal. |
| Hémoveine. | Suppositoires Almine. |
| Hormuclases. | Suppositoires Logeais. |
| Hirudinase. | Suppositoires Midy. |
| Indhaméline Lejeune pluriglandulaire. | Tablettes Zéva. |
| Indhaméline Lejeune simple. | Toniveinine. |
| Indoberbérine. | Tot'Hamélis. |
| Intrait de Marron d'Inde Dausse. | Variphile. |
| Iodamélis Logeais. | Veinalgol. |
| Mictasol. | Veinogène. |
| Néovaryl. | Veinopausine. |
| Phlébos. | Veinosérum. |
| | Veinosine. |
| | Veinotrope. |
| | Viscovéine. |

VASO-DILATATEURS ARTÉRIELS HYPOTENSEURS

| | |
|------------------------|---|
| Acécoline. | Cardisétyl. |
| Acécoline camphre. | Citralin. |
| Acécoline spartéine. | Citrophos. |
| Acécoline yohimbine. | Colloïde Dubois. |
| Acoégénol. | Cortiode. |
| Alepsal. | Curiode. |
| Algatan. | Curiode arsénié. |
| Alliocardia. | Détensyl. |
| Allisatine Sandoz. | Diasclérol. |
| Aloysine. | Dicaliode. |
| Ampoules Boissy. | Dioséine Prunier. |
| Androcalcion. | Endopancrine. |
| Angioxyl. | Eniode Lefebvre. |
| Antonal. | Eranol. |
| Artérase. | Eutensyl Grémy. |
| Artérior Vincardi. | Globules Fumouze à l'iodure de potassium. |
| Artério veinine. | Glycocarpine. |
| Athérolysine. | Gouttes Fluvia. |
| Bain carbogazeux Wolo. | Gouttes hypotensives Fraisse. |
| Benzo-iodhydrine. | Gui Byla. |
| Benzyanyl. | Gui Gmet. |
| Benzytol. | Guimelinde. |
| Blocs Vécór. | Guipsine. |
| Cantéine Bouteille. | |
| Carboiodure Fraudin. | |

I. — APPAREIL CIRCULATOIRE. T. G.

VASO-DILATATEURS ARTÉRIELS HYPOTENSEURS

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Guitose. | Rhocya Dyn. |
| Hémoductyl. | Rhodazil. |
| Hypersan. | Riodine. |
| Hypochoilate. | Rythmos Leisyn. |
| Hypophédrine. | Santhéose. |
| Hypotan. | Scillitrine. |
| Iodalose Galbrun. | Sclérosérol. |
| Iodamélis Logeats. | Silguine. |
| Iodassium. | Silicyl. |
| Iodinjectol Jammes. | Silisode. |
| Iodogénol Pépin. | Spasmine Jolly. |
| Iodomaïsine globules. | Sulfarsiode. |
| Iodone Robin. | Tensédine. |
| Iodonésyl. | Tensol Laurençon. |
| Iodonucléol. | Tensoryl D. |
| Iodotensyl Dubois | Tétranitrol Roussel |
| Iodurase. | Théobromose Dumesnil. |
| Iodure Pachaut. | Théoverine Laleuf. |
| Lipiodol Lafay. | Tiodine Cognet. |
| Lipoiodine Ciba. | Trinitrine caféinée Dubois. |
| Magiodyl. | Trinitrine papavérine La leuf. |
| Micelliode. | Trinivérine. |
| Natirose. | Trinitrine Roussel. |
| Néo-Riodine. | Trisodyl Rozet. |
| Néo-Séti. | Ulcéosine. |
| Nucléocardyl. | Uroiodine. |
| Oléthyle-benzyle. | Vagotonine. |
| Paniode. | Vascurol. |
| Pepiodon. | Vasonitryl. |
| Pneumogéine Renard. | Verticourine. |
| Poudre Danica. | Viscum Zyma. |
| Protensène Lejeune. | |

I. — APPAREIL CIRCULATOIRE. T. S.

ANÉMIES — CHLOROSE — LEUCÉMIE — LYMPHADÉNIE

Voir aussi :

Diététique.
Opothérapie.
Produits vitaminés.
Rachitisme.
Toniques.

Adrénaline Clin.
Adrénaline Invar.
Adrénaline Sauba.
Adrénine.
Adrénoïdes Béral.
Adréphédrine Béral.
Algane.

I. — APPAREIL CIRCULATOIRE. T. S.

ANÉMIES — CHLOROSE — LEUCÉMIE LYMPHADÉNIE.

| | |
|---|------------------------------------|
| Algotérine Oliviéro. | Fénucalcium. |
| Antiphi. | Fénucine. |
| Arcica. | Fénugrène. |
| Ardogène. | Fénurobur. |
| Arrhénuclène Bergevin. | Fer intraveineux Fraysse. |
| Arsécrinol. | Fer Larcade. |
| Arséniode Buriat. | Fer ovarine Vitalis. |
| Arsi-strychnal Longuet. | Ferrocodyle et Ferrico- |
| Arsylène Roche. | dyle. |
| Ascoléine Rivier. | Ferrophytine Ciba. |
| Balnéradol. | Ferydal. |
| Baumolacpinine. | Flétase. |
| Belhémène. | Fludiose. |
| Benzylocalcium. | Fluodyle. |
| Biocatalyseur Rolland. | Forxol. |
| Biocéane. | Fosfomagnyl. |
| Bionéol. | Fosfoxyl Carron. |
| Biosine le Perdriel. | Fosyls Carron. |
| Biotrigon. | Gaduamine. |
| Cacodyle Gonnon. | Gaduase. |
| Cacodyline Jammes. | Gasthréma. |
| Calcilène. | Gastricine. |
| Calcoléol. | Gaurol. |
| Carbotrigon. | Génosthéniques (Gouttes). |
| Carnine Lefrancq. | Globexine. |
| Causyth. | Glycène phosphatée Char- |
| Cérébro-lipase. | rière. |
| Cérébrosthénine Dalin. | Granions (Les). |
| Chlorhydrol Fouché. | Granoxyl. |
| Cimarsényl. | Granulé Cabasson. |
| Cinnozyl. | Granules de Pantofort du |
| Coagulène Ciba. | D ^r Boveil. |
| Colloïdogénine du D ^r Bayle. | Hectine. |
| Composé Gmet. | Hémagénine Giraud. |
| Comprimés levure Mycéta. | Hématoidine. |
| Créagénol. | Hémoantitoxine Sofos. |
| Crinhémol. | Hémocalcine. |
| Crinocardine Laleuf. | Hémo Cyto-Sérum-Cor- |
| Cytobiase. | bière. |
| Cyto-sérum Corbière. | Hémofer. |
| Diastogène Dehaussy. | Hémogénol Dausse. |
| Diastogène F. Dehaussy. | Hémoglobine Deschiens. |
| Dragées ferro-ergotées | Hémopanbiline. |
| Mannet. | Hémo-phagostyl. |
| Dragées Hecquet. | Hémoplase Lumière. |
| Elixir Ducro. | Hémoplasmine du D ^r Mo- |
| Elixir ferro-ergoté Mannet. | relli. |
| Elixir Grez. | Hémostérine irradiée. |
| Endopancrine. | Hémotra Roche. |
| Ergostol Violet. | Hémostyl. |
| Exhépa. | Hémotal. |

I. — APPAREIL CIRCULATOIRE. T. S.

ANÉMIES — CHLOROSE — LEUCÉMIE LYMPHADÉNIE.

Hémoviris.
Hépacrine.
Hépagyl.
Hépapeptine.
Hépaphos.
Héparfer.
Héparmone.
Hépatergol.
Hépathémo.
Hépatrol.
Hépatrol injectable.
Hipposarcine Roy.
Holosplénine.
Huile de foie de morue
 médicinale suractivée
 Rhône-Poulenc.

I. A. M.
Ixium Buisson.
Jémalt Wander.
Lauriatol.
Lécithine Vacheron.
Liposplénine du D^r Groc.
Magol Churchill.
Mancobène.
Mangaine.
Manganophosphat Julien.
Mangarsenic.
Mangratinés.
Marinol.
Marrucol.
Mésothorium Buisson.
Métaux colloïdaux Lancien.
Minergyl.
Morrhualène Gautier.
Morrhuéline Jungken.
Morrhuéline Jungken vita-
 minée.
Morrhuxine.
Morsine.
Morubiase.
Murones du D^r Robert
 Jacques.
Musculosine Byla.
Néoarsite.
Néocalciline.
Néo-rhomnol.
Nervocithine Tissot.
Neurotrophol Byla.
Nucléasine.
Nuclergol.
Nuphos.

Enophos.
Opocalcium du D^r Guer-
 sant.
Opocalcium irradié du D^r
 Guersant.
Opoferrine vitaminée.
Oponuclyl irradié Trouette-
 Perret.
Opophos.
Opostyl Bouty.
Orcalcine.
Organicalcion simple et
 endocrinien.
Orthozomine.
Ostéoglandulol.
Pancrinol du D^r Debat.
Pandrénaline.
Panostyl.
Panstomase.
Panxylon.
Pepto-fer Jaillet.
Peptonate de fer Robin.
Peptone Vassal.
Percalcine.
Persodine Lumière.
Phagosthyl.
Phagosthyl mangané.
Phosbiose.
Phoscamine.
Phosoforme.
Phosol.
Phospharsol.
Phosphate Pinard.
Phosphofluor Beynet.
Phospholéose Demasles.
Phosphonine Soulié.
Phosphopinal Juin.
Phostyl.
Phylla Dyn.
Phytine Ciba.
Phytogénine Byla.
Phytogyl.
Phytolécithine.
Phytosplénol Plet.
Phyto-vitamines Pié.
Plasma de Quinton.
Plasmarine.
Plasmosthène.
Plurion.
Pneumo lipase.
Prosthénase Galbrun.

I. — APPAREIL CIRCULATOIRE. T. S.

ANÉMIES — CHLOROSE — LEUCÉMIE LYMPHADÉNIE.

| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Quergémol. | Strychnal Longuet. |
| Quina Baron. | Strychnarsitol Robin. |
| Quina pepsiné Blot. | Strychnotonine. |
| Quinarsol antianémique. | Sulfureux Pouillet. |
| Quinéine. | Syphonéol. |
| Quinquina Gmet. | Taburol. |
| Réalphène Buisson. | Terpoxyl interne. |
| Reconstituant Mary. | Thiocol Roche. |
| Recrésal. | Thorix (Thorium X Rhem- da). |
| Sanas. | Tonikéine Chevreton. |
| Sanguil. | Tonique Gonnon. |
| Sérifer Laurençon. | Tonique Roche. |
| Sérobiol. | Tonuclyl. |
| Sérogène. | Tonudol. |
| Séroma Rey. | Total Tonic. |
| Sérosthényl Bouty. | Tréphonyl. |
| Sérum neuropsychique. | Uvéphorine. |
| Sérum Olivier. | Vanadarsine Guillaumin. |
| Sirop de glycérophosphates | Vanucléol. |
| Vacheron. | Végéphos. |
| Sirop de Lovel. | Vin de Baudon |
| Sirop Roche au thiocol. | Vin de Bugeaud. |
| Solution Normet chirur- gicale. | Vin de Carnéose. |
| Solution Normet médi- cale. | Vin de Vial. |
| Solution quinquina Bardet. | Viosten. |
| Spectrol. | Vioxyl Mouneyrat. |
| Splénarmone. | Virmonal Piam. |
| Splénomanganol. | Viscosérum. |
| Splényl. | Vitamine Cortial. |
| Stérogyl. | Vitamyl. |
| Sthénoléine. | Vitène. |
| Sthénoxal. | Zomine. |
| Stomarol. | Zoocythine. |
| Stovafer. | Zymatine irradiée. |

ANGINE DE POITRINE

Voir aussi :

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Antispasmodiques artériels. | Belladénal Sandoz. |
| Toni-cardiaques | Bellafoline Sandoz. |
| Vaso-dilatateurs artériels. | Benzoflorine Julien. |
| | Benzyanyl. |
| | Cafédrine. |
| Acécoline. | Calmocardine. |
| Alepsal. | Cardiosthénine. |
| Ampoules Boissy. | Cibalgine. |
| Ampoules de Spasmalgine | Comitiol. |
| Roche. | Cortiode. |
| Angioxyl. | Cratægus Gmet. |
| Antonal. | Crinocardine. |
| Artérase. | Curiode. |
| Artérion Vincardi, | Curiode arsénié, |

I. — APPAREIL CIRCULATOIRE. T. S.

ANGINE DE POITRINE

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Décholestrol. | Novatropine. |
| Dépuriode du Dr Roger Weber. | Nucléocardyl. |
| Détensyl. | Oléthyle Benzyle. |
| Dialacétine Ciba. | Ouabaïne Arnaud. |
| Dicaliode. | Papavéryl. |
| Digibaïne. | Pavérinol. |
| Digi-lanatine. | Pilules V. E. Doumer. |
| Digilanide Sandoz. | Pragmoline. |
| Digimialbaïne. | Rhocya Dyn. |
| Digitaline cristallisée Mialhe. | Rythmos Leisyn. |
| Digitaline Invar. | Scillitrine. |
| Digitaline Nativelle. | Sédoneurol Dehaussy. |
| Disonyl. | Sédopavérine. |
| Endopancrine. | Sédotensyl. |
| Eupavéryl Pachaut. | Silicyl. |
| Eupnine Vernade. | Silisode. |
| Florhépatine. | Spasmalgine Roche. |
| Génomorphine. | Spasmalone. |
| Glycocarpine. | Spasmoneural. |
| Granules Chanteaud. | Spasmosédine. |
| Gui Gmet. | Spasneurol. |
| Iodaubépine. | Surparine. |
| Iodogénol Pépin. | Tensoryl D. |
| Iodotensyl Dubois. | Tétranitrol Roussel. |
| Lipoiodine Ciba. | Tiodine Cognet. |
| Mésothorium Rhemda. | Tonicardine Gonnon. |
| Mialbaïne. | Trinitrine caféinée Dubois. |
| Morphéroïnn Leisyn. | Trinitrine papavérine La-leuf. |
| Natibaïne. | Trinitrine Roussel. |
| Natirose. | Trinivérine. |
| Néospasmodyl. | Verticurine. |

ARTÉRIO-SCLÉROSE ET SES COMPLICATIONS

Voir aussi :

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| <i>Antispasmodiques artériels.</i> | Aloysine. |
| <i>Diététique.</i> | Ampoules Boissy. |
| <i>Dissolvants uriques.</i> | Angioxyl. |
| <i>Diurétiques.</i> | Anti-urique de Contrexé-ville. |
| <i>Instrumentation.</i> | Antonal. |
| <i>Régulateurs de la nutrition.</i> | Artérase. |
| <i>Toni-cardiaques.</i> | Artérion Vincardi. |
| <i>Vaso-dilatateurs artériels.</i> | Artério-Veinine. |
| Absuric. | Athérolysine. |
| Acécoline. | Bain carbogazeux Wolo. |
| Acoégénol. | Balnéradol. |
| Alcamfétol. | Benzobromine. |
| Algatan. | Benzo-iodhydrine. |
| Allisatine Sandoz. | Benzyanyl. |
| | Bi-Citrol Marinier. |

I. — APPAREIL CIRCULATOIRE. T. S.

ARTÉRIO-SCLÉROSE ET SES COMPLICATIONS

- | | |
|--|-------------------------------------|
| Blocs Vécov. | Iodalose Galbrun. |
| Carboiodure Fraudin. | Iodamélis Logeais. |
| Carbolactyl billé. | Iodassium. |
| Cardialgine. | Iodaubépine. |
| Cardiosthénine. | Iodinfectol Jammes. |
| Chloral bromuré Dubois. | Iodogénol Pépin. |
| Chophytol Rosa. | Iodomaisine Globules. |
| Chophytol Rosa injecta- ble. | Iodométine. |
| Citrocarbine. | Iodone Robin. |
| Colloïode Dubois. | Iodonésyl. |
| Cortiode. | Iodonucléol. |
| Cratægus Gmet. | Iodotensyl Dubois. |
| Crinocardine Laleuf. | Iodurase. |
| Cuprémone simple et F. | Iodure Pachaut. |
| Curiode. | Kodos. |
| Curiode arsenié. | Lipiodol Lafay. |
| Décholesterol. | Lipiodine Ciba. |
| Dépuratif Rob Lechaux. | Magiodyl. |
| Dépuriodide du Dr Roger Weber. | Mésosoline. |
| Détensyl. | Mésosodium Buisson. |
| Diasclérol. | Mésosodium Rhemda. |
| Dicaliodide. | Micelliodide. |
| Dioséine Prunier. | Morrhualène Gautier. |
| Diurène. | Néo-Riodine. |
| Diurétique Gmet. | Néo-Séti. |
| Diurocalcine Gros. | Œnophos. |
| Endopancrine. | Orthogénol. |
| Eniode Lefebvre. | Panbiline. |
| Eranol. | Paniode. |
| Eupnine Vernade. | Papavéryl. |
| Eutensyl Grémy. | Pépiondon. |
| Fosfomagnyl. | Pipérazine Midy. |
| Globules Fumouze à l'io- dure de potassium. | Pipérazyl. |
| Glycocarpine. | Progaster. |
| Gouttes Fluvia. | Protensène Lejeune. |
| Gouttes hypotensives Fraise. | Rectopanbiline. |
| Gravural. | Rénion Vincardi. |
| Gui Byla. | Rhocya Dyn. |
| Gui Gmet. | Riodine. |
| Guimelinde. | Rythmos Leisyn. |
| Guipsine. | Salsanos. |
| Guitose. | Santhéose. |
| Hamacitro. | Sclérosérol. |
| Hamaméliode. | Sédotensyl. |
| Hémofluidol. | Seignet, fruits. |
| Hirudinase. | Sel hépatique U. N. Ar- quevaux. |
| Hypotan. | Sérogène. |
| Iloglandol Roche. | Silguine. |
| | Silicyl. |
| | Silisode. |
| | Solurool. |

I. — APPAREIL CIRCULATOIRE. T. S.

ARTÉRIO-SCLÉROSE ET SES COMPLICATIONS

Solution Normet sclérol-
tique.

Solvuric.

Strophantine Catillon.

Strychnotonine.

Sulfarsiode.

Tensédine.

Tensol Laurençon.

Tensoryl D.

Théisine Dubat.

Théobromine Invar.

Théobromose Dumesnil.

Théobryl Roche.

Théosalvose.

Théovadyl.

Théovérine Laleuf.

Théoxanthine.

Tiodine Cognet.

Tonicardine Gonnon.

Triglandine.

Ulcéosine.

Uréol Chanteaud.

Uroflux.

Uroïodine.

Urométhyl.

Uromil.

Uroquinol.

Variphile.

Vascurol.

Vasonitryl.

Verticurine.

Viscum Zyma.

ARTÉRITES — AORTITES — CLAUDICATION INTERMITTENTE

Voir aussi :

Instrumentation.

Opothérapie.

Toni-cardiaques.

Vaso-dilatateurs artériels.

Acécoline.

Algatan.

Alliocardia.

Angioxyl.

Antonal.

Artérase.

Artérion Vincardi.

Artério-Veinine.

Athérolysine.

Bain carbogazeux Wolo.

Banikol.

Benzobromine.

Benzoiodhydrine.

Benzyanyl.

Bi-Citrol Marinier.

Capsules Bruel.

Carboiodure Fraudin.

Cardialgine.

Citralin.

Citrosodine Longuet.

Colloïode Dubois.

Cratægus Gmet.

Crinocardine Laleuf.

Cuprémone simple et F.

Décholestrol.

Dépuriode du Dr Roger
Weber.

Dicallode.

Endopancrine.

Eniode Lefebvre.

Epicral.

Eranol.

Eupavéryl Pachaut.

Eupnine Vernade.

Eutensyl Grémy.

Formocitrine.

Globules Fumouze à l'io-
dure de potassium.

Glycocarpine.

Gui Byla.

Gui Gmet.

Hamacitro.

Hémofluidol.

Hirudinase.

Hypotan.

Iloglandulol Roche.

Iodalose Galbrun.

Iodaubépine.

Iode organique Boissy.

Iodogénol Pépin.

Iodomaisine globules.

Iodone Robin.

Iodonucléol.

Iodotensyl Dubois.

Iodurase.

Iodures Pachaut.

Kodos.

Lipiodol Lafay.

Lipoïodine Ciba.

Magiodyl.

I. — APPAREIL CIRCULATOIRE. T. S.

ARTÉRITES — AORTITES — CLAUDICATION INTERMITTENTE

Micelliode.
Natirose.
Néo-Riodine.
Orthogénol.
Paniode.
Pépiodon.
Pragmoline.
Rhocya Dyn.
Rythmos Leisyn.
Sclérosérol.
Silicyl.
Silisode.
Spartoval.

Spasmoneural.
Spasneuro.
Surparine.
Tensédine.
Tensol Laurençon.
Tiodine Cognet.
Triglandine.
Trinitrine papavérine Laleuf.
Trinitrine Roussel.
Vasonitryl.
Verticurine.

ARYTHMIES

Voir aussi :

Antispasmodiques artériels.
Antispasmodiques.
Régulateurs cardiaques.

Adoverne.
Anacamphre.
Anaclasine Ranson.
Benzoflorine Julien.
Calmocardine.
Camphodausse.
Campho-spartéine Dubois.
Camphostyl Lacroix.
Camphydryl Robin.
Camphydryl strychno spartéiné.
Cantéine Bouteille.
Cardialgine Dubois.
Cardibaïne.
Cardiosthénine.
Coramine Ciba.
Cratægus Gmet.
Crinocardine Laleuf.
Digalène Roche.
Digibaïne.
Digifoline.
Digi-lanatine.
Digilanide Sandoz.
Digimialbaïne.
Digistabiline.
Digitaline cristallisée
Mialhe-Petit.

Digitaline Invar.
Digitaline Nativelle.
Diurène.
Diurocardine.
Dragées Lebrun toni-cardiaques.
Dragées Lumeval.
Génostrychnine.
Granules Chanteaud.
Humoro-stabiline.
Mialbaïne.
Natibaïne.
Neuséda.
Ouabaïne Arnaud.
Pavérinol Laleuf.
Quinocardine.
Quinoidine Duriez.
Rythmos Leisyn.
Rythmosystol.
Sédopavérine.
Solucamphre Delalande.
Spartéine Houdé.
Spartocamphre.
Spasmine Jolly.
Strophantine Catillon.
Strophantus Catillon.
Strychnal Longuet.
Sympathocrine.
Sympathyl.
Vaso-Neurine.

I. — APPAREIL CIRCULATOIRE. T. S.

CARDIOPATHIES AIGÜES

Voir aussi :

Dietétique.

Diurétiques.

Toni-cardiaques.

Adoverne.

Adrénaline Clin.

Adrénaline Invar.

Adrénaline Sauba.

Adrénine.

Adrénoïdes Béral.

Anacamphre.

Bromo-Garnal.

Cafédrine.

Camphodausse.

Campho spartéine Dubois.

Camphostyl Lacroix.

Camphydryl Robin.

Camphydryl strychno-spartéiné.

Cardialgine Dubois.

Cardibaine.

Cardiosthénine.

Coramine Ciba.

Crinocardine Laleuf.

Digalène Roche.

Digibaine.

Digifoline Ciba.

Digi-lanatine.

Digilanide Sandoz.

Digimialbaine.

Digistabiline.

Digitaline cristallisée Mi-alhe-Petit.

Digitaline Invar.

Digitaline Nativelle.

Diurène.

Diuréphédrine.

Diurétique Gmet.

Diurocalcine Gros.

Dragées Lebrun toni-cardiaques.

Eupnine Vernade.

Génostrychnine.

Granules Chanteaud.

Gui Byla.

Gui Gmet.

Guipsine.

Guitose.

Intrait de strophantus.

Lancéryl.

Lubrokai.

Natibaine.

Ouabaine Arnaud.

Pandrénaline.

Pavérinol Laleuf.

Pneumogéine Renard.

Pulmocardine.

Rythmos Leisyn.

Scillarène Sandoz.

Sédobrol Roche.

Solucamphre Delalande.

Solucamphre spartéiné Delalande.

Solution Normet.

Spartocamphre.

Spartoval.

Strophantine Catillon.

Strophantus Catillon.

Strychnal Longuet.

Théisine Dubat.

Théobromine Invar.

Théobromose Dumesnil.

Théobryl Roche.

Théosalvose.

Théovadyl.

Théovérine.

Théoxanthine.

Tonicardine Gonnon.

ÉRÉTHISME - TACHYCARDIES - PALPITATIONS

Voir aussi :

Antispasmodiques.

Modérateurs cardiaques.

Modificateurs du sympathique.

Sédatifs.

Adoverne.

Adrénaline Clin.

Adrénaline Invar.

Adrénaline Sauba.

Adrénine.

Adrénoïdes Béral.

Aérocid.

Aérophagyl.

Alepsal Génévrier.

Amphostène.

Amphotonyl.

I. — APPAREIL CIRCULATOIRE. T. S.

ÉRÉTHISME - TACHYCARDIES - PALPITATIONS

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Anaclasine Ranson. | Novatropine. |
| Bellafoline Sandoz. | Ouabaine Arnaud. |
| Benzoflorine Julien. | Padéryl. |
| Blocs Vécor. | Pandrénaline. |
| Bromo-Garnal. | Paniode. |
| Bromovose. | Pansolanée. |
| Calmocardine. | Paradol. |
| Cantéine Bouteille. | Passiflorine. |
| Capsules Bruel. | Paxène. |
| Cardialgine Dubois. | Phosol. |
| Cardiosthénine. | Phosphobrom. |
| Cibalgine. | Pulsamone. |
| Cratægus Gmet. | Quinicardine. |
| Crinocardine Laleuf. | Quinoïdine Duriez. |
| Dial Ciba. | Rythmos Leisyn. |
| Dialacétine Ciba. | Rythmosystol. |
| Digalène Roche. | Sédergine. |
| Digibaine. | Sédobrol Roche. |
| Digifoline Ciba. | Sédopavérine. |
| Digi-lanatine. | Somnicones Béral. |
| Digilanide Sandoz. | Spartéine Houdé. |
| Digimialbaine. | Spartocamphre. |
| Digistabilline. | Spartoval. |
| Digitaine cristallisée Mi- | Spasmine Jolly. |
| alhe-Petit. | Spas Malone. |
| Digitaine Invar. | Spasmonéural. |
| Digitaine Nativelle. | Spasmosédine. |
| Disonyl. | Sympathocrine. |
| Diurocardine. | Sympathorlane. |
| Dragées Lumeval. | Sympathyl. |
| Ephédraféine Béral. | Tensoryl D. |
| Euphytose. | Théobromose Dumesnil. |
| Féminadène. | Vagoriane. |
| Florhépatine. | Vagosédyl. |
| Freinospasmyl. | Vagostabyl. |
| Génésérine. | Valédyl. |
| Granules Chanteaud. | Valérianate Pierlot. |
| Gynergène Sandoz. | Valériane Byla. |
| Humoro stabiline. | Valériane Gmet. |
| Lubrokall. | Valériane Pachaut. |
| Natibaine. | Valérianose Gigon. |
| Néospasmodyl. | Valérinodor Malmanche. |
| Neurinase. | Valérium Paul Thibault. |
| Neuridor. | Vasoneurine. |
| Neurotensyl. | Vériane. |
| Neuséda. | Véronidia Buisson. |
| Névrosan. | Viosten. |

GANGRÈNES — SYNDROME DE RAYNAUD

Voir aussi :

Analgésiques externes.
 Analgésiques internes.

Analgésiques locaux.
 Antiseptiques externes pom-
 mades.

I. — APPAREIL CIRCULATOIRE. T. S.

GANGRÈNES — SYNDROME DE RAYNAUD

Antiseptiques externes poudres.

Bactériophages.

Instrumentation.

Sérums Vaccins.

Acécoplex.

Acécoline.

Alepsal.

Androstine.

Glycocarpine.

Hirudinase.

Murones du D^r Robert Jacques.

Orthogénol.

Pragmoline.

Spasmonéural.

Térébenthine.

Tiodine Cognet.

HÉMORROÏDES — VARICES — PHLÉBITES

Voir aussi :

Cholagogues.

Hémostatiques.

Instrumentation.

Laxatifs.

Pansements.

Vaso-constricteurs veineux.

Acésine Guillaumin.

Adrépatine.

Æsculase.

Aïroglyce.

Angitan.

Aniode.

Antirrhoïde.

Anusol Mialhe.

Aphloïne Trouette-Perret.

Arlstargol.

Artérase.

Artério-Veine.

Astasol.

Bain Bagnor radioactif.

Bain Flévar.

Bain Salvia.

Balnéradol.

Baume Aroma.

Baume Suelta.

Bi-Citrol Marinier.

Biopausine.

Calmosuppos sédatifs.

Cantéine Bouteille.

Cataményl.

Cipromarol.

Citropaïne.

Citrosodine Longuet.

Coalt derma.

Crayons anti-fissure Do-mergue.

Crème résolutive du D^r Rap.

Créosoforme Longuet.

Cuprémone simple et F.

Cyproveinol.

Dermofagine.

Dioséine Prunier.

Do-Sa-No-Sal.

Ergotine Lamante.

Esculéol.

Eugynol Grandval.

Extrait Hamyd.

Fluerase.

Fluveinose Mauchant.

Fluxine (Gouttes).

Formocitrine.

Glyco thymoline.

Goménol rectal.

Gouttes de Serû.

Guimeline.

Hamacitro.

Hamaméline Roy.

Hamaméliode.

Hamamélis Gmet.

Hamamélis Grandval.

Hémductyl.

Hémoluol.

Hémopausine.

Hémorroïdine gouttes.

Hémorroïdine pommade.

Hémorroïdine suppositoires.

Hémoveine.

Hépalomel Védé.

Hirudinase.

Hydrastine Houdé.

Hydrastis Gmet.

Indhaméline Lejeune pluriglandulaire.

Indhaméline Lejeune simple.

Indoberbérine.

Insulanol.

I. — APPAREIL CIRCULATOIRE. T. S.

HÉMORROÏDES — VARICES — PHLÉBITES

| | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Intrait de marron d'Inde | Rénovol. |
| Dausse. | Romarantyl. |
| Iodamélis Logeais. | Romarènc. |
| Iodex. | Salantale. |
| Iodométine. | Salvénase Gigoux. |
| Juranol. | Sclérosérum. |
| Lacpinine. | Sédacrine. |
| Ménatol. | Sel hépatique U. N. Ar- |
| Métacitrine. | quevaux. |
| Mictasol. | Suppo-Gynals. |
| Néo-Collargol. | Suppositoires Almine. |
| Néovaryl. | Suppositoires à l'Esculcol. |
| Nestosyl. | Suppositoires au Nestosyl. |
| Onction Leisyn. | Suppositoires Logeais. |
| Onguent Fréval. | Suppositoires Midy. |
| Opochol. | Suppositoires Pépet. |
| Ouataplasme du D ^r Lan- | Tablettes Zéva. |
| glebert. | Toniveinine. |
| Pelviiformine. | Tot'Hamélis. |
| Percaïnal Ciba. | Triglandine. |
| Phlébos. | Ulcéobalnéine. |
| Phlébotonine. | Ulcéosine. |
| Pommade Bertol Vichy. | Uvargol. |
| Pommade Inséva. | Variphile. |
| Pommade Logeais. | Variscérine. |
| Pommade Midy. | Vascurol. |
| Pommade au Nestosyl. | Veinalgol. |
| Poudre et pommade d'in- | Veinogène. |
| suline Philoze. | Veinopausine. |
| Poudre Mass plastique. | Veinosérum. |
| Proveïnase Midy. | Veinosine. |
| Rectagine. | Veinotrope. |
| Rectoline. | Verticurine. |
| Rectopanbiline. | Viscovéine. |
| Rectosol. | Zymatine. |

HYPERTENSION

Voir aussi :

Dietétique.
Vaso-dilatateurs artériels.

Acécoline.
Acécoline Camphre.
Acécoline Spartéine.
Acécoline Yohimbine.
Acoégénol.
Agozymase.
Alcamfétol.
Algatan.
Alliocardia.
Allisatine Sandoz.

Aloysine.
Androcalcion E.
Angioxyl.
Antonal.
Artérase.
Artérion Vincardi.
Artério-Veinine.
Arthrila.
Athérolysine.
Bain carbogazeux Wolo.
Benzofodhydriane.
Benzanyl.
Benzylol.
Bi-Citrol Marinier.

I. — APPAREIL CIRCULATOIRE. T. S.

HYPERTENSION

| | |
|---|----------------------------|
| Blocs Vécor. | Gui Gmet. |
| Calsédine. | Guimeline. |
| Carbo iodure Fraudin. | Guipsine. |
| Carbolactyl. | Guitose. |
| Cardialgine Dubois. | Hamacitro. |
| Cardiosthénine. | Hémoductyl. |
| Chophytol Rosa. | Hémofluidol. |
| Chophytol Rosa injectable. | Hépalomel Védé. |
| Chloral bromuré Dubois. | Hirudinase. |
| Chlorumagène. | Hypersan. |
| Citralin. | Hypocholeate. |
| Citrofluyl. | Hypotan. |
| Citrophos. | Hoglandol Roche. |
| Colloïode Dubois. | Iodalose Galbrun. |
| Cortiode. | Iodamélis Logeais. |
| Cratægus Gmet. | Iodassium. |
| Crinocardine Laleuf. | Iodinjectol Jammes. |
| Cuprémone simple et F. | Iodogénol Pépin. |
| Curiode. | Iodomaisine Globules. |
| Curiode arsénié. | Iodométine. |
| Décholestrol. | Iodone Robin. |
| Dépuratif Rob Lechaux. | Iodonésyl. |
| Dépuriole du Dr Roger Weber. | Iodonucléol. |
| Détensyl. | Iodotensyl Dubois. |
| Diasclérol. | Iodurase. |
| Dicaliod. | Iodures Pachaut. |
| Diurène. | Lipiodol Lafay. |
| Diurétique Gmet. | Lipoiodine Ciba. |
| Diurocalcine Gros. | Magiodyl. |
| Do-Sa-No-Sal. | Mésothine Rhemda. |
| Endopancrine. | Mésothorium Rhemda. |
| Eniade Lefebvre. | Métaux colloïdaux Lancien. |
| Epical. | Micelliod. |
| Eranol. | Natibaine. |
| Euchol Morellet. | Natirose. |
| Eutensyl Grémy. | Néo-Riodine. |
| Fluveinose Mauchant. | Néo-Séti. |
| Formocitrine. | Neurotensyl. |
| Freinospasmyl. | Normatensol Bouret. |
| Globules Fumouze à l'iodure de potassium. | Nucléocardyl. |
| Glycocarpine. | Oléthyle-benzylé. |
| Gouttes antispasmodiques Dausse. | Orthogénol. |
| Gouttes Fluvia. | Ouabaine Arnaud. |
| Gouttes hypotensives Fraisse. | Paniode. |
| Granions (Les). | Papavéryl. |
| Granules Chanteaud. | Pépiondon. |
| Gravural. | Pneumogéine Renard. |
| Gui Byla. | Poudre Danica. |
| | Pragmoline. |
| | Protensène Lejeune. |
| | Rénion Vincardi. |
| | Rhocya Dyn. |

I. — APPAREIL CIRCULATOIRE. T. S.

HYPERTENSION

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Rhodazil. | Tensol Laurençon. |
| Riodine. | Tétranitrol Roussel. |
| Rythmos Lelsyn. | Théobromose Dumesnil. |
| Salsanos. | Théobryl Roche. |
| Santhéose. | Théosalvose. |
| Scillitrine. | Théoverine Laleuf. |
| Sclérosérol. | Tiodine Cognet. |
| Sédopavérine. | Tot'Hamélis. |
| Seignet' fruits. | Ulcéosine. |
| Silguine. | Uroiodine. |
| Silicyl. | Vaccin antirhumatismal |
| Silisode. | (Immuno-vaccins). |
| Sodésyl. | Vagosédyl. |
| Sodogastrol. | Vagotonine. |
| Solurol. | Valénal Novalis. |
| Solution Normet scléro- | Variphile. |
| lytique. | Vascurol. |
| Spasmosédine. | Vasonitryl. |
| Sufrolax Crosnier. | Verticurine. |
| Sulfarsiode. | Viscum Zyma. |
| Tensédine. | |

HYPOTENSION

Voir aussi :

Vaso-constricteurs artériels.

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Adoverne. | Dragées Lumeval. |
| Adrénaline Clin. | Ephédrine Houdé. |
| Adrénaline Invar. | Eufosyl Vély. |
| Adrénaline Sauba. | Garéphédrine. |
| Adrénine. | Grains d'Ephédrine Béral. |
| Adrénoïdes Béral. | Granules Chanteaud. |
| Adréphédrine Béral. | Hypophédrine. |
| Angitan. | Néo-Rhommol. |
| Arsécrinol. | Opoferine vitaminée. |
| Biophorine. | Phylla Dyn. |
| Camphodausse. | Rénaleptine. |
| Camphospartéine Dubois. | Sanédrine. |
| Camphostyl Lacroix. | Solucamphre Delalande. |
| Camphydryl Robin. | Solucamphre spartéiné |
| Camphydryl strychno-spar- | Delalande. |
| téiné. | Solution Normet médicale. |
| Carditone. | Spartocamphre. |
| Chlorumagène. | Spartoval. |
| Coramine Ciba. | Strychnotonine. |
| | Tensoryl D. |
| | Visco sérum. |

INSUFFISANCE CARDIAQUE — HYPO-SYSTOLIE — ASYSTOLIE

Voir aussi :

| | |
|-------------------------|----------------------|
| <i>Dietétique.</i> | Acécoline. |
| <i>Diurétiques.</i> | Acécoline spartéine. |
| <i>Opothérapie.</i> | Adoverne. |
| <i>Toni-cardiaques.</i> | Adrénaline Clin. |
| | Adrénaline Invar. |

I. — APPAREIL CIRCULATOIRE. T. S.

INSUFFISANCE CARDIAQUE — HYPOSYSTOLIE ASYSTOLIE

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Adrénaline Sauba. | Génostrychnine. |
| Adrénine. | Granules Chanteaud. |
| Adrénoïdes Béral. | Intrait de strophantus. |
| Adréphédrine Béral. | Kola caféinée Aubert. |
| Alcamfétol. | Kola granulée Astier. |
| Amphotonyl. | Kola Monavon. |
| Anacamphre. | Kolatines. |
| Angitan. | Mialbaïne. |
| Bain carbogazeux Wolo. | Natibaïne. |
| Cafédrine. | Nucléocardyl. |
| Camphodausse. | Orthogénol. |
| Camphospartéine Dubois. | Ouabaïne Arnaud. |
| Camphostyl Lacroix. | Pandrénaline. |
| Camphydryl Robin. | Pavérinol Laleuf. |
| Camphydryl strychno-spar- téiné. | Phosol. |
| Cardialgine Dubois. | Phylla Dyn. |
| Cardibaïne. | Pituilobine Byla. |
| Cardion Vincardi. | Pneumogéine Renard. |
| Cardiosthénine. | Protensène Lejeune. |
| Carditone. | Quinoidine Duriez. |
| Composé Gmet. | Rythmos Leisyn. |
| Coramine Ciba. | Santhéose. |
| Crinocardine Laleuf. | Scillarène Sandoz. |
| Digalène Roche. | Sécacornine Roche. |
| Digibaïne. | Solucamphre Delalande. |
| Digicardine. | Solucamphre spartéiné De- lalande. |
| Digifoline Ciba. | Solution Normet médicale. |
| Digi-lanatine. | Spartéine Houdé. |
| Digilanide Sandoz. | Spartocamphre. |
| Digimialbaïne. | Spartoval. |
| Digistabiline. | Strophanthine Catillon. |
| Digitaline cristallisée | Strophantus Catillon. |
| Mialhe-Petit. | Técarine. |
| Digitaline Invar. | Théisine Dubat. |
| Digitaline Nativelle. | Théobromine Invar. |
| Diurène. | Théobromose Dumesnil. |
| Diuréphédrine. | Théobryl Roche. |
| Diurétique Gmet. | Théocalciode. |
| Diurocalcine Gros. | Théosalvose. |
| Dragées Lebrun tonicar- diaques. | Théovadyl. |
| Endopancrine. | Théoverine. |
| Ephédraphéine Béral. | Théoxanthine. |
| Eupnine Vernade. | Tonicardine Gonnon. |
| | Visco sérum. |

SHOCK — ACCIDENTS SÉRIQUES

| | |
|---------------------|---------------------|
| Voir aussi : | Adrénaline Invar. |
| Toni-cardiaques. | Adrénaline Sauba. |
| | Adrénine. |
| Adrénaline Clin. | Adréphédrine Béral. |

I. — APPAREIL CIRCULATOIRE. T. S.

SHOCK — ACCIDENTS SÉRIQUES

Anacamphre.
 Anacalasin.
 Angitan.
 Calcium Francalcion.
 Calcional.
 Calci-sténine.
 Calcium Sandoz.
 Calcivitam.
 Camphodausse.
 Camphostyl Lacroix.
 Camphydryl Robin.
 Camphydryl strychno -
 spartéiné.
 Chlorical.
 Chlorocalcion.
 Chloromagnésion.
 Coramine Ciba.
 Digibaïne.
 Digifoline Ciba.
 Digi-lanatine.
 Digilanide Sandoz.
 Digimialbaïne.
 Digitaline cristallisée
 Mialhe-Petit.
 Digitaline Invar.
 Digitaline Nativelle.
 Dragécalcion.
 Ephédraféine Béral.
 Emgé Lumière.
 Ephédrine Houdé.

Euphoryl.
 Euphysol.
 Francalcion.
 Grains d'Ephédrine Béral.
 Granules Chanteaud.
 Hémosamine.
 Hémostatique Coudert.
 Hormantoxone.
 Hormuclases.
 Humoro-stabiline.
 Jabosulfène.
 Lobéline Bruneau.
 Mialbaïne.
 Natibaïne.
 Néopancarpine.
 Organi-calcion simple.
 Ouabaïne Arnaud.
 Pancalcion.
 Pancréastase Defresne gra-
 nulée.
 Pandrénaline.
 Solucamphre Delalande.
 Solucamphre spartéiné De-
 lalande.
 Solution Normet chirur-
 gicale.
 Spartocamphre.
 Spartoval.
 Terpoxyl interne.
 Visco-sérum.

II. — APPAREIL DIGESTIF. T. G.

ALCALINS — SATURANTS

Alcalinose.
 Algosédine.
 Alucol Wander.
 Anacidase.
 Anthraseptol.
 Arthrilax.
 Azym.
 Benzocarbène.
 Bi-Citrol Marinier.
 Bis-Ka-Ma.
 Bismokaol.
 Bismusodine.
 Bismuth Desleaux.

Bismuth Tulasne.
 Bradygastrine Ducloy.
 Calcomagnésie.
 Calmag-Na.
 Carbagol Marinier.
 Carbonate de bismuth. Ta-
 blettes Perroud.
 Carbonésie.
 Cheralys (Comprimés).
 Citropaine du Dr Fontal.
 Citrophos.
 Citrosodine Longuet.
 Colloïd Leisyn.

II. — APPAREIL DIGESTIF. T. G.

ALCALINS — SATURANTS

Comprimés Vichy-Etat.
 Digestif Harvey.
 Doloma.
 Gastrépatine.
 Gastrocalcine.
 Gastrocaol.
 Gastroclean.
 Gastronaldine.
 Gastrosodine.
 Hépatosodine.
 Isotonyl Bouret.
 Jecopeptol.
 Kaobrol.
 Lait de Magnésie Phillips.
 Magécarine.
 Mucobismuthine.
 Normogastryl.
 Orthogastrine.

Pangestyl Narty.
 Paquets Védé.
 Poudre Danica.
 Poudre Paterson.
 Radiogastrol.
 Sal Sodyl.
 Sédogastrine.
 Sel d'Ewald.
 Sel de Hunt.
 Sel digestil Bé-Mé-Cé.
 Sodésyl.
 Stomaxine.
 Stoméol Vichy.
 Stomophile.
 Tablettes Perroud.
 Zymatine.
 Zymogastrine Kervan.

ANTIDIARRHÉIQUES

Acolitol.
 Allisatine Sandoz.
 Aloysine.
 Alucol Wander.
 Alunosal.
 Amibiasine.
 Amidal.
 Amiphène Carron.
 Ampho - vaccin intestinal
 Ronchèse.
 Anthracalcine.
 Atural.
 Benzocarbine.
 Binoxol.
 Bioentérase.
 Biolactyl Fournier.
 Bismokaol.
 Bismuth B 3.
 Bismuth (Crème de) du
 Dr Quesneville.
 Bismuth Desleaux.
 Bismuth Tulasne.
 Bulgarine Thépénier.
 Calcional.
 Carb.
 Carbagol Marinier.
 Carbofixine Longuet.
 Carbophos.
 Casaldyl.
 Chéralys Comprimés).

Colisel.
 Dragécalcion.
 Elixir Godfrin.
 Entéro antigènes.
 Entérobyl.
 Entérofagos.
 Entéroformine.
 Entéropansement du Dr
 Zizine.
 Entéro Vaclydun.
 Formocarbine.
 Gélotanin.
 Gmet (extraits).
 Hopogan.
 Kerlactine.
 Larosan Roche.
 Marrubiase.
 Métacarbine.
 Nigérine.
 Oxyléine.
 Pancarbo Hardy.
 Panlabyl.
 Panstomase.
 Passicarbène.
 Phosphate Pinard.
 Rhizotanin Chapotot.
 Sodogastrol Lagoutte.
 Stupho.
 Térébine.
 Zymatine.

II. — APPAREIL DIGESTIF. T. G.

ANTIÉMÉTISANTS

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Alsodine. | Lichénose Ducloy. |
| Antispasmyl. | Métacitrine. |
| Atural. | Milkase. |
| Azym. | Mothersills Seasick Remedy |
| Bi-Citrol Marinier. | Nigérine. |
| Bradygastrine. | Novatropine. |
| Cétrarose Gigon. | Papaine Trouette-Perret. |
| Citrofluyl. | Sirop Teyssède. |
| Citrosodine Longuet. | Somnicones Béral. |
| Digestonic. | Spasmoryl. |
| Elixir eupeptique Tisy. | Surparine. |
| Elixir Grez. | Syntropan Roche. |
| Génatropine. | Vin Raimoa Tonic. |
| Granules Chanteaud. | Zymogastrine Kervan. |

ANTISEPTIQUES INTESTINAUX ANTIFERMENTESCIbles

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Acatar. | Boldorhéine. |
| Acolitol. | Bolène. |
| Agarase. | Bulgarine Thépénier. |
| Agozymase. | Carb. |
| Allisatine Sandoz. | Carbagol Marinier. |
| Alucol Wander. | Carbalkaloïdes. |
| Ahunosal. | Carbargyre. |
| Amibiasine. | Carbobel. |
| Amidal. | Carbo-combrosmol. |
| Amiphène Carron. | Carbofixine Longuet. |
| Ampho - vaccin intestinal | Carbolactyl bilié. |
| Ronchèse. | Carbolactyl simple. |
| Amybdine. | Carbolin Midy. |
| Anacidase. | Carbomucil. |
| Aniodol. | Carbonate de Bismuth. — |
| Anthracalcine. | Tablettes Perroud. |
| Anthraseptol. | Carbonésie. |
| Argion. | Carbophos. |
| Azym. | Carbos. |
| Belcarmine. | Carbosanis. |
| Bensomine. | Carbotrigon. |
| Benzocarbine. | Casaldyl. |
| Binoxal. | Charbon Fraudin. |
| Bio-entérase. | Charbon Tissot. |
| Biolactyl Fournier. | Cheralys (comprimés). |
| Bis-Ka-Ma. | Chloramine Freyssinge. |
| Bismokaol. | Chlorobyl. |
| Bismusodine. | Cholagol. |
| Bismuth B 3. | Choléine Lactique. |
| Bismuth (Crème de) du | Choléluine. |
| D ^r Quesneville. | Choléolactol Daguin. |
| Bismuth Desleaux. | Citrobacilline. |
| Bismuth Tulasne. | Citrocarbène. |
| Boldobyl. | Colisel. |
| Boldoine Eparvier. | Comprimés Galac. |

II. — APPAREIL DIGESTIF. T. S.

ANTISEPTIQUES INTESTINAUX ANTIFERMENTESCIBLES

| | |
|---|------------------------|
| Comprimés Proto Gambier. | Magécarine. |
| Crésentyl. | Métacarbine. |
| Cryptargol Lumière. | Microlyse. |
| Digastrine. | Mycidol Badel. |
| Entériode. | Néo-collargol. |
| Entéro-antigènes. | Nigérine Vincent. |
| Entérobyl. | Novolactol Daguin. |
| Entérofagos. | Oxyléine. |
| Entéroformine. | Ozothine. |
| Entérohépatine. | Panbiline. |
| Entéropansement du D ^r Zizine. | Pancarbo Hardy. |
| Entéro Vaclydun. | Pangestyl Narty. |
| Entéroxin. | Pancrébile. |
| Entéryl. | Panlabyl. |
| Eugastrol. | Paralactine Byla. |
| Euphoryl. | Passicarbonate. |
| Evobiline. | Peptomaltone Déjardin. |
| Evolaxine. | Perquinol. |
| Exonérol. | Poudre Paterson. |
| Ferments lactiques Fabre. | Progaster. |
| Formocarbène. | Proto Gambier. |
| Formocarbos. | Radiogastrol. |
| Galabactéine. | Rectopanbiline. |
| Gastéose. | Rhizotanin Chapotot. |
| Gastiasc. | Sal Sodyl. |
| Gastrocarbène. | Salvébyl. |
| Génécarmine. | Sanluol. |
| Glyco-lactimase. | Sodésyl. |
| Glyco-thymoline. | Sodogastrol. |
| Goménol glutinules. | Stomophile. |
| Hopogan Bocquillon. | Stomoxygène. |
| Hormuclases. | Sulfohyl. |
| Iodure d'amidon Lumière. | Sulfoïdol Robin. |
| Jécofluy. | Sulfo Thiorine. |
| Jécopeptol. | Sulfureux Pouillet. |
| Kénol. | Tapo. |
| Kerlactine. | Terpoxyl interne. |
| Koumyl. | Thoroxyl. |
| Lac Ser. | Tréparsol. |
| Lactaris. | Triseptine. |
| Lactimase. | Ur clar. |
| Lactobacilline. | Uribiline. |
| Lactochol. | Urométhyl. |
| Lactolaxine Fyda. | Urosalyl. |
| Lactoseptyl. | Urosalyl méthylé. |
| Lactosérum Lavril. | Uvargol. |
| Laxopeptine Girard. | Vitacholine. |
| Levuro-Maltine Déjardin. | Yaourtine. |
| | Zymatine Lescène. |

II. — APPAREIL DIGESTIF. T. G.

ANTISPASMODIQUES ET SÉDATIFS

| | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Acolitol. | Génomorphine. |
| Aérocid. | Gmet (extraits). |
| Aérophagyl. | Granules Chanteaud. |
| Algosédine. | Kaobrol. |
| Amphotonyl. | Kinéchol. |
| Ampoules de Pantopon Roche. | Laristine Roche. |
| Ampoules de Spasmalgine Roche. | Lubrokyl. |
| Antispasmyl. | Magécarine. |
| Belcarmine. | Morpherolinn Leisyn. |
| Bellafoline Sandoz. | Narcyl. |
| Benzylol. | Novatropine. |
| Bismokaol. | Oléthyle benzyle. |
| Bismuth B 3. | Pancarbo Hardy. |
| Bismuth (Crème de) du Dr Quesneville. | Pansolanée. |
| Bismuth Desleaux. | Papavéryl. |
| Bismuth Tulasne. | Paquets Védé. |
| Bromo-Garnal. | Paradol. |
| Calcomagnésie. | Paratyronc. |
| Calmag Na. | Pavéron Dausse. |
| Calmosuppos sédatifs. | Polypeptine. |
| Capsules Bruel. | Poudre Danica. |
| Carbatropine. | Poudre Paterson. |
| Cétrarose Gigon. | Pulmocardine. |
| Chloridia. | Pulsamone. |
| Citrophos. | Rhodazil. |
| Codérax. | Sal Sodyl. |
| Colisel. | Sédobrol Roche. |
| Colloïl Leisyn. | Sédogastrine. |
| Cratægus Gmet. | Sédol. |
| Dialacétine Ciba. | Sirops Henry Mure. |
| Digastrine. | Sirop Teyssèdre. |
| Digestonic. | Somnicones Béral. |
| Dragécalcion. | Spasmacol. |
| Elixir Godfrin. | Spasmalgine Roche. |
| Euphoryl. | Spasmalone. |
| Extrait Hamyd. | Spasmine Jolly. |
| Florhépatine. | Spasmoryl. |
| Freinospasmyl. | Spasneuro. |
| Gastrocarbène. | Stomobrol. |
| Gastronalbine. | Suppoalgos Lagoutte. |
| Gastrosodine. | Suppositoires au Nestosyl. |
| Gastrozymase. | Suppositoires Pyrax. |
| Génatropine. | Surparine. |
| Génhyoscyamine. | Syntropan Roche. |
| | Vagosédyl. |
| | Valbrol. |
| | Zaryl. |

II. — APPAREIL DIGESTIF. T. G.

CHOLAGOGUES

- | | |
|--|--|
| <p> Acatar. Adipolysine. Agobyl. Agocholine. Agozymase. Anaclasine. Anthraseptol. Antibillieux Fuzor. Arthrila. Arvensyl. Bensamine. Bi-Citrol Marinier. Bikréol. Biléyl Fournier. Biliase Raby. Biliboldo. Bilifluine. Biliogastrine Cheillon. Billabstine. Bio-entérase. Bisalicylate. Boldine Houdé. Boldobyl. Boldo Gmet. Boldoine Eparvier. Boldolactic Lagoutte. Boldorhéine. Boldo-Verne. Boléase Monal. Cachets Pachaut. Calmaby. Caparlem. Capsules Haarlem Bardet. Carbo-combrosmol. Carbolactyl bilié. Cascarine Leprince. Catalyl Mg. Cholélyse. Chloromagnésion. Chlor-magnésium Fisch. Chlorumagène. Cholagol. Cholécystine. Choléfluine. Choléine Camus. Choléine Lactique. Choléocombrétol boldinisé. Choléokinase. Choléolactol Daguin. Choléolax. Choléopectine. Cholépan Longuet. </p> | <p> Cholérène. Chophytol Rosa. Chophytol Rosa injectable. Citralin. Citrocarbène. Citropaïne du Dr Fontal. Citrosodine Longuet. Colchi-Sal. Colloïl Leisyn. Comprimés Proto Gambier. Comprimés Vichy-Etat. Coprex. Crinocardine. Crypthiol. Cuscutine Foulon. Cyto-magnésium Oliviero. Décholestrol. Delbiase. Dolophos. Drainochol. Dynosthène. Ektal. Elixir Spark. Elkin (dragées, granules). Entéro-antigènes. Entérobil Dehaussy. Entéryl. Equisetol. Ergépatine. Ergocoline. Euchol Morellet. Euglyma. Euonymine Paul Thibault. Evobiline. Evonyl. Felamine Sandoz. Fluobyl. Fluocholine. Fluokol. Frugeolines Vichy. Formocitrine. Fosfomagnyl. Gastéose. Gastiasse. Gastrosodine. Gouttes Magalo. Grains de Vals. Granules Chanteaud. Granulés Edges. Gravural. Hépadrainase. </p> |
|--|--|

II. — APPAREIL DIGESTIF. T. G.

CHOLAGOGUES

| | |
|---|-------------------------------------|
| Hépalomel Védé. | Plasma de Quinton. |
| Hépatie Efa du D ^r Leca- cheux. | Polypeptonal. |
| Hépatodiase. | Précikase. |
| Hépatomanganol. | Progaster. |
| Hépatosodine. | Prométhine. |
| Hépatozyl Caldo. | Protiodine dragées. |
| Hexafel. | Proto Gambier. |
| Isalaxine. | Pyurol. |
| Jécosfluy. | Romarantyl Trouette Per- ret. |
| Jécol. | Romarène. |
| Jécoceptol. | Saint-Aré. |
| Kénol. | Sal Sodyl. |
| Kinechol. | Salicylate de soude Clin |
| Kodos. | Salsanos. |
| Labyfax. | Salvébyl. |
| Lac-Ser. | Saucholine. |
| Lactobyl. | Sédosalyl. |
| Lactochol. | Sel hépatique U. N. Ar- quevaux. |
| Lactosérum Lavril. | Sels Intar. |
| Laxatifs Miraton Châtel- Guyon. | Sels Mags. |
| Magnésium Hardy. | Selunic. |
| Magnésotubes Robinet. | Solurol. |
| Magnogène. | Stomoxigène. |
| Magsalyl Mg. | Sufrolax Crosnier. |
| Métacitrine. | Sulfobyl. |
| Movébil. | Sulfolax. |
| Néotrophène. | Thiocitran. |
| Oléocidase. | Tisane hépatique Lahaye. |
| Oléoformine Corbière. | Toniveinine. |
| Olliricyl. | Trisalyl. |
| Olivéol. | Triseptine. |
| Opobyl. | Ultraformine. |
| Opochol. | Uribiline. |
| Orthogastrine. | Uroformine Gobey. |
| Orthogénol. | Urol. |
| Panbiline. | Urométhyl. |
| Pancrébile. | Urométine Lambiotte. |
| Panlabyl. | Vichy purgatif. |
| Panstomase. | Vitacholine. |
| Paradoline. | Vitacuroil Savare. |
| Peptamine magnésée. | Vulcase. |
| Pepto-magnésie Vassal. | Zymatine Lescène. |
| Pilules du D ^r Debouzy. | |

EUPEPTIQUES — STOMACHIQUES

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Agozymase. | Anaclasine Ranson. |
| Alcasodine. | Anapeptone Vassal. |
| Algostérine Oliviero. | Anthraccalcine. |
| Amunine. | Appétyl. |
| Amylodiastase Thépenier. | Atural. |

II. — APPAREIL DIGESTIF. T. G.

EUPEPTIQUES-STOMACHIQUES

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Azym. | Mangaine. |
| Bi-Citrol Marinier. | Mangano-phosphal. |
| Bikréol. | Marinol. |
| Biocéane. | Mésogastrine. |
| Biophorine. | Métacitrine. |
| Biophylactine Mg. | Milkase. |
| Biovigorine. | Morrhuxine. |
| Boldine Houdé. | Novolactol Daguin. |
| Cachets Roche de Thiocol. | Nuphos. |
| Calmaby. | Pangestyl Narty. |
| Carbocitrol. | Panstomase. |
| Carottase. | Papaine Trouette-Perret. |
| Choléocombrétol boldinisé. | Peptodiase. |
| Citrocarbine. | Peptone Vassal. |
| Citropaïne du Dr Fontal. | Peptosthénine Choay. |
| Citrophos. | Philogastrine. |
| Citrosodine Longuet. | Phosoforme. |
| Colloïl Leysin. | Phosphonine Soulié. |
| Comprimés Roche de Thio- | Plasmarine. |
| col. | Pluribiase. |
| Diastopepsine Richepin. | Polypeptine. |
| Digestif Harvey. | Proxytol. |
| Doloma. | Quassia Kina Rabot. |
| Dolophos. | Quassine Houdé. |
| Dyspeptine Hepp. | Quinquina Gmet. |
| Elixir Bonjean. | Réalphène Buisson. |
| Elixir Ducro. | Recrésal. |
| Elixir Grez. | Romarantyl. |
| Elixir Spark. | Romarène. |
| Elkin (dragées, granules). | Salsanos. |
| Emgé Lumière. | Sal Sodyl. |
| Enzypan. | Sélor n° 1. |
| Eupeptique Monavon. | Sélunic. |
| Fénucine. | Sérobiol. |
| Fénurobur. | Sirop Roche au Thiocol. |
| Formocitrine. | Stoméol. |
| Fosfoxyll Carron. | Strychnotonine. |
| Gastrosodine. | Sulfobyl. |
| Gastrozymase. | Suryali. |
| Gmet (extraits). | Tachygastrine Ducloy. |
| Granulé Cabasson. | Thiocol Roche. |
| Granules Chanteaud. | Tonax. |
| Hémofer. | Uvé (gouttes). |
| Hépalomel Védé. | Vanadarsine Guillaumin. |
| Hépatodiase. | Vin de Chassaing. |
| Hépaxine. | Viosten. |
| Ionyl. | Virmonal Piam. |
| Jécoluyl. | Zymatine. |
| Logaphos. | Zymogastrine Kervan. |

II. — APPAREIL DIGESTIF. T. G.

LAXATIFS — PURGATIFS

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Adipolysine. | Entéryl. |
| Agarase. | Equisétol. |
| Agarol. | Ergépatine. |
| Agobyl. | Ergocoline. |
| Agocholine. | Evolaxine. |
| Agozymase. | Evonyl. |
| Aloïne Houdé. | Exobol. |
| Anthraxeptol. | Exonérol. |
| Arthrilax. | Fluobyl. |
| Arvensyl. | Frugéolines Vichy. |
| Belcarmine. | Fucosine. |
| Bileyl Fournier. | Gélor. |
| Biliase Raby. | Génécarmine. |
| Biliboldo. | Grains de Vals. |
| Bilifluine. | Granules Chanteaud. |
| Billabstine. | Granules Edges. |
| Bis-Ka-Ma. | Hépadrainase. |
| Boldine Houdé. | Hépalomel Védé. |
| Boldo Gmet. | Hépatosodine. |
| Boldobyl. | Hépatozyl Caldo. |
| Boldorhéine. | Hexafel. |
| Boldo Verne. | Hormobiline. |
| Boléase Monal. | Huillaxine. |
| Bolène. | Huile Crolas. |
| Cachets Pachaut. | Hydrastis Gmet. |
| Carbatropine. | Infangyl. |
| Carbolactyl bilié. | Innerclean. |
| Carbolin Midy. | Isacène Roche. |
| Carbomucine. | Isalaxine. |
| Cascara Eparvier. | Ispaghul. |
| Cascara Midy. | Kénol. |
| Cascarine Leprince. | Kinechol. |
| Catalyl Mg. | Kodos. |
| Cellu-son. | Labylox. |
| Chlormagnésium Fisch. | Lactobyl. |
| Chloromagnésion. | Lactolaxine Fydau. |
| Cholagol. | Lactosérum Lavril. |
| Choléine Camus. | Lait de Magnésie Phillips. |
| Choléine Lactique. | Lansoyl. |
| Choléocombretol boldinisé. | Laxamalt. |
| Choléokinase. | Laxatif Miraton Châtel-Gu- |
| Choléolax. | yon. |
| Citralin. | Laxopeptine Girard. |
| Colchi Sal. | Levure Zymaculine. |
| Comprimés Pantolaxine du | Limonade citrose Vichy. |
| D ^r Boveil. | Limonade Godfrin. |
| Coprex. | Lin Tarin. |
| Cuscutine Foulon. | Listose Vicario. |
| Drainochol. | Loraga. |
| Ektal. | Magnélax. |
| Elkin (dragées, granules). | Mucilaxine. |
| Entéromucine. | Mucinum. |

II. — APPAREIL DIGESTIF. T. G.

LAXATIFS-PURGATIFS

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Mucyllium. | Saucholine. |
| Néo Laxatif Chapotot. | Sedlitz Chantcaud. |
| Néotrophène. | Seignet' fruits. |
| Normacol. | Sel hépatique U. N. Ar- |
| Nujol. | quevaux. |
| Oléo mel. | Sirop de la Maternité. |
| Oliricyl Hardy. | Sirop Sentini. |
| Opobyl. | Sonène. |
| Opochol. | Spasmoryl. |
| Opovacuoline. | Stomoxygène. |
| Panbiline. | Sulfolax. |
| Pancrébile. | Sulfothiorine. |
| Paragélase. | Suppositoires Chaumel. |
| Parolagar. | Suppositoires Pachaut. |
| Parvula. | Suryali. |
| Pasta Palm. | Tamar Indien Grillon. |
| Pilules du D ^r Debouzy. | Tamarine. |
| Poudre laxative de Vichy. | Taxol. |
| Poudre Rocher laxative. | Thaolaxine. |
| Précikase. | Thiocitran Thévenot. |
| Prostigmine Roche. | Tisane hépatique Lahaye. |
| Prunagar. | Uribiline. |
| Prunine Sentini. | Varilaxine. |
| Puragar. | Vasolaxine. |
| Purganol Daguin. | Vichy purgatif. |
| Purgos. | Vitacholine. |
| Rectopanbiline. | Vitacuirol Savare. |
| Ricilax. | Vulcase. |
| Romarène. | Yaourtine. |
| Saint-Aré. | Zymatine Lescène. |
| Salvébyl. | |

PANSEMENTS GASTRIQUES

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Antinéase. | Gastrocarbone. |
| Biomucine. | Gastropansement du D ^r Zi- |
| Bismokaol. | zine. |
| Bismuth B 3. | Gélogastrine Licardy. |
| Bismuth (Crème de) du | Kaobrol. |
| D ^r Quesneville. | Kaolinase. |
| Bismuth Desleaux. | Métacarbène. |
| Bismuth Tulasne. | Mucobismuthine. |
| Calmaby. | Nigérine. |
| Calmag Na. | Pangastrol. |
| Carb. | Passicarbène. |
| Carbagol Marinier. | Poudre Danica. |
| Carbonate de Bismuth. | Poudre Paterson. |
| Carbosanis. | Sel d'Ewald. |
| Charbon Fraudin. | Stal Kosal. |
| Colloyl Leysin. | Stoméol. |
| Doloma. | Stomobrol. |
| Formocarbène. | Tablettes Perroud. |
| Gastrocaol. | Zymatine. |

II. — APPAREIL DIGESTIF. T. G.

STIMULANTS DE LA SÉCRÉTION ET DE LA MOTILITÉ GASTRIQUE

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Acécoline. | Hépalomel Védé. |
| Adipolysine. | Hépatosodine. |
| Adrénaline Clin. | Isotonyl Bouret. |
| Adrénaline Invar. | Labylix. |
| Adrénaline Sauba. | Laxopeptine Giraud. |
| Adrénine. | Logaphos. |
| Agozymase. | Mésogastrine. |
| Allisatine Sandoz. | Métacitrine. |
| Alsodine. | Milkase. |
| Bi-Citrol Marinier. | Pandrénaline. |
| Chlorhydrol. | Pangestyl Narty. |
| Chloridia. | Peptodiase. |
| Cholépan Longuet. | Peptone Vassal. |
| Chophytol Rosa. | Phosphonine Soulié. |
| Chophytol Rosa injectable. | Phylla Dyn. |
| Digastrine. | Polyferments Laleuf. |
| Elixir Ducro. | Polypeptine. |
| Elixir du D ^r Mialhe. | Recrésal. |
| Elixir Eupeptique Tisy. | Romarantyl. |
| Elixir Grez. | Romarène. |
| Elkin (dragées, granules). | Sal Sodyl. |
| Emgé Lumière. | Sels Intar. |
| Fosfoxyll Carron. | Sérobiol. |
| Gastrépatine. | Sodésyl. |
| Gastricine du D ^r E. Du- | Sodogastrol. |
| hourcau. | Stomarol. |
| Gastronaldine. | Tachygastrine Ducloy. |
| Gastrozymase. | Tridigestine Dalloz. |
| Génécarimine. | Virmonal Piam. |
| Génésérine. | Zymatine. |
| Granulé Cabasson. | |
| Granules de Pantofort du | |
| D ^r Boveil. | |

II. — APPAREIL DIGESTIF. T. S.

AÉROPHAGIE — DILATATION DE L'ESTOMAC

Voir aussi :

Antispasmodiques.
Diététique.

Adipolysine.
Aérocid.
Aérophagyl.
Alcalinose.
Amphotonyl.
Anthracalcine.
Anthraseptol.

Appétyl.
Azym.
Benzocarbine.
Bi-Citrol Marinier.
Bismusodine.
Bismuth (Crème de) du
D^r Quesneville.
Bismuth (Crème de) chlo-
romagnésienne du D^r
Quesneville.
Bismuth Desleaux.

II. — APPAREIL DIGESTIF. T. S.

AÉROPHAGIE — DILATATION DE L'ESTOMAC

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Bismuth Tulasne. | Hépatosodine. |
| Blocs Vécot. | Isofonyl Bouret. |
| Bolcitol. | Kaobrol. |
| Calcomagnésie. | Lait de Magnésie Phillips. |
| Calmag Na. | Laxopeptine. |
| Carb. | Mésogastrine. |
| Carbagol Marinier. | Métacarbène. |
| Carbocitol. | Nigérine. |
| Carbo-combrosmol. | Normogastrol. |
| Carbomucine. | Oxyléine. |
| Carbonate de bismuth. — | Pancarbo Hardy. |
| Tablettes Perroud. | Pancréatose Idon. |
| Carbonésie. | Pangastrol. |
| Carbophos. | Pangestyl Narty. |
| Carbosanis. | Paradol. |
| Charbon Fraudin. | Passicarbène. |
| Charbon Tissot. | Peptodiase. |
| Chloridia. | Peptone Vassal. |
| Citrocarbène. | Philogastrine. |
| Citrofluyl. | Phosphobrom. |
| Digastrine. | Phosoforme. |
| Dyspeptine Hepp. | Poudre Paterson. |
| Elixir eupeptique Tisy. | Pulsamone. |
| Elixir Spark. | Sel d'Ewald. |
| Entéroformine. | Sel de Hunt. |
| Eupeptique Monavon. | Sels Mags. |
| Féculyse Heudebert. | Sodolactine. |
| Formocarbène. | Spasmine Jolly. |
| Formocarbos. | Splénocarbène. |
| Freinospasmyl. | Stal Kosal. |
| Gastrocalcine. | Stoméol. |
| Gastrocaol. | Stomobrol. |
| Gastrocarbène. | Stomophile. |
| Gastrozymase. | Vagosédine. |
| Hépatodiase. | |

ALLERGIES — ANAPHYLAXIES

Voir aussi :

Cholagogues.

Laxatifs.

Shock.

Urticaire.

Allergantyl Miluc.

Anaclasine Ranson.

Anapeptone Vassal.

Atural.

Biophyllactine M. G.

Boldo Gmet.

Calcozymase.

Carbolactyl billé.

Cethocal du Dr Lemay.

Chlor-magnésium Fisch.

Chloro-magnésion.

Cholagol.

Choléfluyl.

Dragécalcion.

Dragées Elkin.

Elixir Grez.

Emgé Lumière.

Entéro-antigènes.

Entéroformine.

Euphoryl.

Evobiline.

Fluokol.

II. — APPAREIL DIGESTIF. T. S.

ALLERGIES — ANAPHYLAXIE

Formocarbine.
Formocarbos.
Grains d'Ephédrine Béral.
Granules Edgès.
Hémostatique Coudert.
Humoro-stabiline.
Hyposulfène.
Jabosulfène.
Jécosluy.
Lactoprotéide Carrion.
Métacarbine.
Mucyllium.
Organi-calcion simple.
Pancréastase Defresne granulée.

Peptalmine.
Peptalmine magnésinée.
Peptogyl A. et L.
Peptonal.
Peptone Vassal.
Phylactone Byla.
Polypeptonal.
Prézymase.
Protiodyne (dragées).
Spasmoryl.
Thiocitrane Thévenot.
Triseptine.
Végelact.

ANOREXIES

Voir aussi :

Diététique.
Eupeptiques.
Produits vitaminés.
Toniques.

Algoستérine Oliviero.
Aminine.
Appétyl.
Ardogène.
Arsécrinol.
Arséniode.
Arsylène Roche.
Ascoléine Rivier.
Biliogastrine.
Biocalcose.
Biocatalyseur Rolland.
Biocéane.
Biocholine
Bionéol.
Biophorine.
Biophylactine M. G.
Biotrignon.
Biovigorine.
Boldine Houdé.
Boldo Gmet.
Boldoïne Eparvier.
Boldo Verne.
Calmaby.
Carbotrignon.
Carnine Lefrancq.
Cimarsényl.
Clupéyl.
Colloïdogénine du D^r Bayle.
Crinhémol.
Cytobiase.

Cyto-sérum Corbière.
Dyspeptine Hepp.
Elixir Ducro.
Elixir eupeptique Tisy.
Elixir Grez.
Elixir Spark.
Euphoryl.
Fénucalcium.
Fénucine.
Fénugrène.
Fénurobur.
Férydal.
Flétase.
Fosfoxy.
Gaduamine.
Gaduase.
Gaiarsol.
Gasthréma.
Gastricine du D^r E. Du-
hourcau.
Gmet (extraits).
Granulé Cabasson.
Hémofer.
Hémostra.
Hémoviris.
Hopogan.
Hormocline.
I. A. M.
Insuline buccale Fornet.
Ionyl.
Jécosluy.
Juglanrégine André.
Logaphos.
Mangano-phosphal.
Marimine.
Marinol.

II. — APPAREIL DIGESTIF. T. S.

ANOREXIES

Morisland.
Néoarsite.
Nucléigène.
Orcalcine.
Ozobiase.
Pancrinol du D^r Debat.
Pangaduine.
Peptodiase.
Peptone Vassal.
Percalcine.
Persodine Lumière.
Phosoforme.
Phosphonine Soulié.
Phostyl.
Phylla Dyn.
Phytine Ciba.
Phytosplénol Plé.
Plasma de Quinton.
Plasmarine.
Quassia-quina Rabot.
Quassine Houdé.
Quinquina Gmet.
Réalphène Buisson.
Recrésal.

Reconstituant Mary.
Sanas.
Sélor n° 1.
Sérobiol.
Sirop Roche au Thiocol.
Solution quinquina Bardet.
Splénarmone.
Stomobrol.
Stovafer.
Strychnotonine.
Tachygastrine Ducloy.
Terpoxyl interne.
Tonax.
Tonikéine Chevretin.
Tonucyl.
Total-Tonic.
Uvé (gouttes).
Vanadarsine Guillaumin.
Vichy purgatif.
Vin de Vial.
Viosten.
Vitamyl.
Zimbyl.
Zymatine irradiée.

CHOLÉCYSTITES — ANGIOCHOLITES

Voir aussi :

Antispasmodiques et Sédatifs
Cholagogues.
Diététique.
Instrumentation.

Adipolysine.
Agobyl.
Agozymase.
Ampho - vaccins Ronchèse.
Amybdine.
Anaclasin.
Anthraseptol.
Arvensyl.
Baldisédan.
Belcarmine.
Bensamine.
Benzocarbine.
Bi-Citrol Marinier.
Bikréol.
Billogastrine.
Bilivaccin anticolibacil-
laire.
Billabstine.
Binoxol.

Boldine Houdé.
Boldobyl.
Boldo Gmet.
Boldoïne Eparvier.
Boldolactic Lagoutte.
Boldorhéine.
Boldo Verne.
Boléase Monal.
Bolène.
Bucmine.
Bulgarine Thépénier.
Calmaby.
Caparlem.
Capsules Haarlem Bardet.
Carbo-combrosmol.
Carbolactyl bilié.
Chlormagnésium.
Chloro-magnésion.
Cholécystine.
Choléine lactique.
Choléo-combrétol boldinisé.
Choléokinase.
Choléolax.
Cholépan Longuet.
Cholérène.

II. — APPAREIL DIGESTIF. T. S.

CHOLÉCYSTITES — ANGIOCHOLITES

| | |
|--|------------------------------------|
| Chophytol Rosa. | Mésothine Rhemda. |
| Chophytol Rosa injectable. | Microlyse. |
| Comprimés Proto-Gambier. | Movébil. |
| Cytomagnésium Oliviero. | Mucyllium. |
| Décholesterol. | Oléocidase. |
| Delbiase. | Oléoformine Corbière. |
| Drainochol. | Olivéol. |
| Dynosthiène. | Opobyl. |
| Ektal. | Opochol. |
| Entéro-antigènes. | Orthogénol. |
| Entérobyl Dehaussy. | Oxyléine. |
| Entérofagos. | Panbiline. |
| Entéroformine. | Pancrébile. |
| Entéropansement du D ^r Zi- zine. | Pangestyl Narty. |
| Entérovaclydun. | Panlabyl. |
| Entéryl. | Panstomase. |
| Equisetol. | Peptalmine magnésie. |
| Ergépatine. | Peptomagnésie Vassal. |
| Euchol Morellet. | Peptone Vassal. |
| Eugastrol. | Perquinol. |
| Euonymine Paul Thibault. | Pilules du D ^r Debouzy. |
| Evobiline. | Polyformine. |
| Evonyl. | Précikase. |
| Félamine Sandoz. | Prométhine. |
| Ferments lactiques Fabre. | Protiodine dragées. |
| Fluobyl. | Proto-Gambier. |
| Fluocholine. | Pyoformine. |
| Fluokol. | Pyrélaïne Collas. |
| Formocarbine. | Pyurol. |
| Formocarbos. | Radiotropine. |
| Formocitrine. | Romarantyl. |
| Granions (Les). | Romarène. |
| Granulés Chanteaud. | Saucholine. |
| Gravural. | Sodothiol. |
| Hamacitro. | Solurol. |
| Hépadrainase. | Spasmoryl. |
| Hépalomel Védé. | Sufrolax Crosnier. |
| Hépatie Efa du D ^r Leca- cheux. | Surparine. |
| Hépatosodine. | Suryali. |
| Hexotal. | Syntropan Roche. |
| Iodhéma. | Thiocitran Thévenot. |
| Jécofluy. | Tisane hépatique Lahaye. |
| Jécol. | Triseptine. |
| Jécopeptol. | Ultraformine. |
| Kénol. | Uraseptine Rogier. |
| Labyfax. | Uribiline. |
| Lactosérum Lavril. | Urisanine. |
| Lysaxins L. M. L. | Urobuccol Malmanche. |
| Métacarbine. | Uroformine Gobey. |
| Métacitrine. | Urol. |
| | Urométhyl. |
| | Urométine Lambiotte. |

II. — APPAREIL DIGESTIF. T. 8.

CHOLÉCYSTITES — ANGIOCHOLITES

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Uromil. | Vaccin Ronchèse (am- |
| Urosalyl. | pho-vaccins). |
| Urosalyl méthylé. | Vitacholine. |
| Urosan Dufayard. | Vitacurool Savare. |
| Vaccin antirhumatismeal | Vulcase. |
| (immuno-vaccins). | |

CIRRHOSSES

Voir aussi :

| | |
|------------------------------------|---|
| <i>Cholagogues.</i> | Equisetol. |
| <i>Diététique.</i> | Ergépatine. |
| <i>Opothérapie.</i> | Euchol Morellet. |
| Adipolysine. | Euonymine Paul Thibault. |
| Agobyl. | Evobiline. |
| Agocholine. | Fluobyl. |
| Bi-Citrol Marinier. | Fosfomagnyl. |
| Biléyl Fournier. | Granules Chanteaud. |
| Biliase Raby. | Hépadrainase. |
| Biliboldo. | Hépalomel Védé. |
| Bilifluine. | Hépatozyl Caldo. |
| Biliogastrine Che villon. | Hépatie Efa du D ^r Lecacheux |
| Billabstine. | Hépatomanganol. |
| Boldine Houdé. | Hormantoxone. |
| Boldo Gmet. | Jécofluy. |
| Boldobyl. | Kinéchol. |
| Boldolactic Lagoutte. | Lancéryl. |
| Boldorhéine. | Magnésium Hardy. |
| Boldo Verne. | Magnéso-tubes Robinet. |
| Boléase Monal. | Movébil. |
| Calcium Sandoz. | Néphryl. |
| Capsules Haarlem Bardet. | Oléofor mine Corbière. |
| Carbolactyl Bilié. | Olivéol. |
| Chlormagnésium. | Opochol. |
| Chloromagnésion. | Organi-calcion simple. |
| Cholé cystine. | Panbiline. |
| Choléine Lactique. | Pancrébile. |
| Choléocombrétol boldinisé. | Pan stomase. |
| Choléokinase. | Paradol. |
| Choléolax. | Précikase. |
| Cholépan Longuet. | Proto-Gambier. |
| Cholé rène. | Pyurol. |
| Chophytol Rosa. | Romarantyl. |
| Chophytol Rosa injectable. | Romarène. |
| Comprimés Proto-Gambier. | Sal Sodyl. |
| Dépuriole du D ^r Robert | Salvébyl. |
| Weber. | Saucholine. |
| Diurobromine. | Sodésyl. |
| Diurocardine. | Sodogastrol. |
| Dragécalcion. | Sodothiol. |
| Drainochol. | Técarine. |
| Ektal. | Tisane hépatique Lahaye. |
| Endopancrine. | Triseptine. |
| Entérob yl Dehaussy. | Urol. |
| | Urométhyl. |

II. — APPAREIL DIGESTIF. T. S.

CONGESTION DU FOIE — FOIE CARDIAQUE

Voir aussi :

Cholagogues.

Diététique.

Instrumentation.

Opothérapie.

Adipolysine.

Agarase.

Agobyl.

Agocholine.

Agozymase.

Alcasodine.

Aloïne Houdé.

Anacidase.

Angitan.

Antibillieux Fuzor.

Arthrilax.

Arvensyl.

Benzocarbène.

Bi-Citrol Marinter.

Bikréol.

Biléyl Fournier.

Biliase Raby.

Biliboldo.

Bilifluine.

Billogastrine Chevillon.

Billabstine.

Boldine Houdé.

Boldo Gmet.

Boldoïne Eparvier.

Boldobyl.

Boldolactic Lagoutte.

Boldorhéine.

Boldo Verne.

Boléase Monal.

Bolène.

Bucmine.

Caparlem.

Capsules Haarlem Bardet.

Carbocitrol.

Carbo combrosmol.

Carbolactyl bilié.

Carbolactyl simple.

Cascarine Leprince.

Catalyl Mg.

Chéralys (comprimés).

Chlormagnésium Fisch.

Chloromagnésion.

Cholagol.

Cholépan Longuet.

Choléfluine.

Choléine Camus.

Choléine Lactique.

Cholélyse.

Choléocombrétol boldinisé.

Choléokinase.

Choléo-Lactol Daguin.

Choléolax.

Choléopeptine.

Cholérène.

Chophytol Rosa.

Chophytol Rosa injectable.

Citralin.

Comprimés Vichy-Etat.

Crinocardine.

Crypthiol.

Cuscutine Foulon.

Décholesterol.

Diurène.

Diurétique Gmet.

Dolophos.

Drainochol.

Ektal.

Elixir Spark.

Elkin (dragées, granules).

Endopancrine.

Entéro antigènes.

Entérobyl Dehaussy.

Entéroformine.

Entéryl.

Equisétol.

Ergépatine.

Ergocoline.

Euchol Morellet.

Euonymine Paul Thibault.

Evobiline.

Evonyl.

Fluobyl.

Fluocholine.

Fluokol.

Formocarbène.

Formocarbos.

Fosfomagnyl.

Gastrépatine.

Gastroclean.

Gastronaldine.

Gastrosodine.

Gouttes Magalo.

Grains de Vals.

Granules Chanteaud.

Granules Edgès.

Gravural.

Hépadrainase.

Hépatodiase.

II. — APPAREIL DIGESTIF. T. S.

CONGESTION DU FOIE — FOIE CARDIAQUE

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Hépatosodine. | Peptone Vassal. |
| Hépatozyl Caldo. | Pilules du D ^r Debouzy. |
| Hépaxine. | Polyferments Laleuf. |
| Hexafel. | Polypeptonal. |
| Hydrastis Gmet. | Précikase. |
| Isalaxine. | Progaster. |
| Jécofluyt Hardy. | Prométhine. |
| Jécol. | Pyurol. |
| Jécopeptol. | Romarantyl. |
| Kinéchol. | Romarène. |
| Kodos. | Salicylate de soude Clin. |
| Lactolaxine Fydau. | Salsanos. |
| Lacto-sérum Lavril. | Sal Sodyl. |
| Lait de magnésie Phillips. | Salurol. |
| Lancéryl. | Saucholine. |
| Magnésium Hardy. | Sédosalyl. |
| Magnéso-tubes Robinet. | Sels Mags. |
| Magsalyl Mg. | Selunic. |
| Métacarbène. | Spasmoryl. |
| Métacitrine. | Sufrolax Crosnier. |
| Métaux colloïdaux A. Lancien. | Suryali. |
| Movébil. | Tisane hépatique Lahaye. |
| Olliricyl Hardy. | Toniveinine. |
| Opobyl. | Trisalyl. |
| Opochol. | Triseptine. |
| Orthogénol. | Uribiline. |
| Panbiline. | Urol. |
| Pancrébile. | Urométhyl. |
| Pangestyl Narty. | Vichy purgatif. |
| Paradol. | Vitacholine. |
| Peptalmine magnésinée. | Vulcase. |
| Peptomagnésie Vassal. | Zymatine. |

DYSENTERIE — CHOLÉRA

Voir aussi :

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Amibiase. | Ampho-vaccins Ronchèse. |
| Antidiarrhéiques. | Amybdine. |
| Antiseptiques intestinaux. | Aniodol. |
| Antispasmodiques et sédatifs. | Argion. |
| Bactériophages. | Bacté-phages. |
| Bactériothérapie. Ferments lactiques. | Benzocarbène. |
| Dietétique. | Biferments lactiques Fabre. |
| Sérums Vaccins. | Billivaccin. |
| | Billabstine. |
| | Bioentérase. |
| | Biolactyl Fournier. |
| | Bismuth Desleaux. |
| | Bismuth Tulasne. |
| | Bulgare Thépénier. |
| | Carb. |
| | Carbagol Marinier. |
| | Carbalcaloïdes. |
| | Carbolactyl simple. |
| Acolitol. | |
| Allisatine Sandoz. | |
| Alucol Wander. | |
| Alunosal. | |
| Amibiasine. | |
| Amidal. | |
| Amiphène Carron. | |

II. — APPAREIL DIGESTIF. T. S.

DYSENTERIE — CHOLÉRA

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Carbonate de bismuth. — | Kerlactine. |
| Tablettes Perroud. | Koumyl. |
| Céphœmétine. | Lactaris. |
| Charbon Fraudin. | Lactimase. |
| Charbon Tissot. | Lactobacilline. |
| Chloramine Freyssinge. | Lactochol. |
| Chlorobyl. | Larosan Roche. |
| Colisel. | Leucoseptyl. |
| Comprimés Galac. | Levure B 17. |
| Comprimés Proto-Gambier. | Malarsan. |
| Crésentyl. | Marrubiase. |
| Cryptargol Lumière. | Métacarbine. |
| Elixir Bonjean. | Mycidol Badel. |
| Elixir Godfrin. | Nigérine. |
| Entéro-antigènes. | Oxyléine. |
| Entérofagos. | Pancarbo Hardy. |
| Entéroformine. | Panlabyl. |
| Entérohépatine. | Passicarbone. |
| Entéro-lactique. | Pâte Spécia. |
| Entéro-pansement du D ^r | Physiosthénine. |
| Zizine. | Plasma de Quinton. |
| Entéroxin Leclerc. | Proto-Gambier. |
| Ferments lactiques Fabre. | Stupho. |
| Formocarbine. | Suppositoires Corbière. |
| Gastrocaol. | Térébine. |
| Glyco-thymoline. | Tréparsol. |
| Hopogan. | Ultra-levure. |
| Insévaccin. | Vaccins Clin. |
| Institut Pasteur Sérums. | Vacciphages. |
| Institut Pasteur Vaccins. | Yaourtine. |
| Iodure d'amidon Lumière. | |

DYSPEPSIES

Voir aussi :

| | |
|--|--------------------------|
| Alcalins. | Agozymase. |
| Analgésiques internes. | Alcalinose. |
| Antiémétisants. | Alcasodine. |
| Antispasmodiques et Sédatifs. | Algosédine. |
| Diététique. | Allisatine Sandoz. |
| Eupeptiques. | Alsodine. |
| Opothérapie. | Alucol Wander. |
| Pansements gastriques. | Amylodiastase Thépénier. |
| Stimulants de la sécrétion et de la motilité gastrique. | Anacidase. |
| Toniques. | Anthraccalcine. |
| Adrénaline Clin. | Antibilieux Fuzor. |
| Adrénaline Invar. | Antispasmyl. |
| Adrénaline Sauba. | Appétyl. |
| Adrénine. | Argion. |
| Agobyl. | Arthrilax. |
| Agocholine. | Azym. |
| | Bellafoline Sandoz. |
| | Benzocarbine. |
| | Bi-Citrol Marinier. |

II. — APPAREIL DIGESTIF. T. S.

DYSPEPSIES

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Bikréol. | Digestonic. |
| Biliogastrine Cheillon. | Doloma. |
| Billabstine. | Dolophos. |
| Biomucine. | Drainochol. |
| Biophylactine M. G. | Dyspeptine Hepp. |
| Biovigorine. | Elixir Bonjean. |
| Bismokaol. | Elixir Ducro. |
| Bismuth B 3. | Elixir du D ^r Mialhe. |
| Bismuth (Crème de) chloro- | Elixir eupeptique Tisy. |
| romagnésienne du D ^r | Elixir Grez. |
| Quesneville. | Elixir Spark. |
| Bismuth Desleaux. | Elkin (dragées, granules). |
| Bismuth Tulasne. | Emgé Lumière. |
| Bolcitol. | Entéro-Antigènes. |
| Boldolactic Lagoutte. | Entéroformine. |
| Bromo-Garnal. | Enzypan. |
| Calmaby. | Equisétol. |
| Calmag-Na. | Ergépatine. |
| Carb. | Eugastrol. |
| Carbagol Marinier. | Eupeptique Monavon. |
| Carbobel. | Eusomnine Bellières. |
| Carbocitol. | Fluobyl. |
| Carbonate de bismuth. — | Formocarbine. |
| Tablettes Perroud. | Formocarbos. |
| Carbonésie. | Gastéose. |
| Carbos. | Gastiase. |
| Carbosanis. | Gastrépatine. |
| Cétrarose Gigon. | Gastricine du D ^r E. Du- |
| Charbon Fraudin. | hourcau. |
| Charbon Tissot. | Gastrocalcine. |
| Chéralys (comprimés). | Gastrocaol. |
| Chlorhydrol. | Gastroclean. |
| Choridia. | Gastronaldine. |
| Choléine Camus. | Gastropansement du D ^r Zi- |
| Choléolax. | zine. |
| Cholérène. | Gastrosodine. |
| Citralin. | Gastrozymase. |
| Citrocarbène. | Génatropine. |
| Citrofluyl. | Génécarmine. |
| Citropaine du D ^r Fontal. | Généserine. |
| Citropeptol. | Glycothymoline. |
| Citrophos. | Gmet (extraits). |
| Citrosodine Longuet. | Gouttes Magalo. |
| Colloïl Leisyn. | Grains de Vals. |
| Comprimés Vichy-Etat. | Granules Chanteaud. |
| Crème de Bismuth chloro- | Hamacitro. |
| magnésienne du D ^r Ques- | Hépalomel Védé. |
| neville. | Hépatodiase. |
| Crème de Bismuth du D ^r | Hopogan Bocquillon. |
| Quesneville. | Iodure d'Amidon Lumière. |
| Diasto-pepsine Richepin. | Ionyl. |
| Digastrine. | Isotonyl Bouret. |
| Digestif Harvey. | Ispaghul. |

II. — APPAREIL DIGESTIF. T. S.

DYSPEPSIES

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Jécopeptol. | Protiodyne. |
| Kaobrol. | Proxylol. |
| Kinéchol. | Quassine Houdé. |
| Kimosine Rogier. | Radiogastrol. |
| Lait de Magnésie Phillips. | Rectopanbiline. |
| Larosane Roche. | Romarantyl. |
| Levure Fraîche Mycéta. | Romarène. |
| Lubrokak. | Salsanos. |
| Magécarbine. | Sal Sodyl. |
| Mangaine. | Salvébyl. |
| Mésogastryl. | Saicholine. |
| Métacarbène. | Sédergine. |
| Métacitrine. | Sédobrol Roche. |
| Mucicarbos. | Sédogastrine. |
| Mucobismuthine. | Sel de Hunt. |
| Nigérine Vincent. | Sel d'Ewald. |
| Normogastrol. | Sel digestif B6-M6-C6. |
| Novatropine. | Selunic. |
| Novolactol Daguin. | Sels Mags. |
| Oenophos. | Sirop Roche au Thiolcol. |
| Opobyl. | Sodésyl. |
| Orthogastrine. | Sodogastryl. |
| Orthogénol. | Sodolactine. |
| Panbiline. | Spasmacol. |
| Pancréanne. | Spasmoryl. |
| Pancréastase Defresne granulée. | Staphylase du Dr Doyen. |
| Pancréatose Idon. | Stomarol. |
| Pancrébille. | Stomaxine. |
| Pandrénaline. | Stoméol Vichy. |
| Pangastrol. | Stomobrol. |
| Pangestyl Narty. | Stomophile. |
| Papaine Trouette-Perret. | Stomoxygène. |
| Paquets Védé. | Sulfobyl. |
| Paradol. | Suryali. |
| Passicarbonate. | Syntropan Roche. |
| Peptamine. | Tablettes Perroud. |
| Peptamine magnésée. | Tachygastrine Ducloy. |
| Peptodiase. | Tapo. |
| Peptogil A. L. | Thiocitran Thévenot. |
| Peptonal. | Thiolcol Roche. |
| Peptone Vassal. | Tisane hépatique Lahaye. |
| Peptosthénine Choay. | Tonax. |
| Philogastrine. | Tridigestine Dalloz. |
| Phoscamine. | Triseptine. |
| Phosforme. | Végélaet. |
| Pluribiase. | Vichy Purgatif. |
| Polyferments Laleuf. | Vin de Chassaing. |
| Polypeptine. | Vitaminol. |
| Polypeptonal. | Vitamyl. |
| Poudre Bellada. | Yaourtine. |
| Poudre Paterson. | Zymatine. |
| Progaster. | Zymogastrine. |

II. — APPAREIL DIGESTIF. T. S.

ENTÉRITES AIGÜES - DIARRHÉES - COLIQUES — FERMENTATIONS INTESTINALES

Voir aussi :

Analgésiques internes.
Antiseptiques intestinaux.
Antispasmodiques.
Bactériophages.
Bactériothérapie. — Fer-
ments lactiques.
Cataplasmes.
Diététique.
Laxatifs.
Opothérapie.
Sérums Vaccins.

Acolitol.
Agarase.
Algosédine.
Allisatine Sandoz.
Aloysine.
Alucol Wander.
Alunozal.
Amibiasine.
Amidal.
Amiphène Carron.
Ampho - Vaccin Intestinal
Ronchèse.
Amunine.
Amylodiastase Thépenier.
Anapeptone Vassal.
Aniodol.
Anthracalcine.
Anthrseptol.
Antigénines.
Antispasmyl.
Antivirus.
Argion.
Arthrilax.
Atural.
Azym.
Bacté-phages.
Belcarmine.
Bellafoline Sandoz.
Benzocarbine.
Benzylol.
Bikréol.
Binoxol.
Bioentérase.
Biolactyl Fournier.
Bis-Ka-Ma.
Bismokaol.
Bismuth B 3.
Bismuth (Crème de) du
D^r Quesneville.

Bismuth Desleaux.
Bismuth Tulasne.
Bulgarine Thépenier.
Cachets Roche de Thiocol.
Carb.
Carbagol Marinier.
Carbargyre.
Carbobel.
Carbo-combrosmol.
Carbofixine Longuet.
Carbolactyl Bilié.
Carbolactyl simple.
Carbolin Midy.
Carbomucil.
Carbonate de Bismuth. —
Tablettes Perroud.
Carbonésic.
Carbophos.
Carbos.
Carbosanis.
Casaldyl.
Cephoémétine.
Charbon Fraudin.
Charbon Tissot.
Chéralys (comprimés).
Chloramine Freyssinge.
Chlorhydrol.
Chlorobyl.
Citrocarbène.
Citropaine du D^r Fontal.
Citropeptol.
Colisel.
Colloïl Leisyn.
Comprimés Galac.
Comprimés Proto-Gambier.
Coréine.
Cryptargol Lumière.
Digastrine.
Digestif Harvey.
Digestonic.
Dragécalcion.
Dragées Elkin.
Doloma.
Dyspeptine Hepp.
Elixir Bonjean.
Elixir eupeptique Tisy.
Elixir Godfrin.
Elixir Grez.
Elixir Spark.
Emgé Lumière.
Entériode.
Entéro-antigènes.

II. — APPAREIL DIGESTIF. T. S.

ENTÉRITES AIGÜES - DIARRHÉES - COLIQUES FERMENTATIONS INTESTINALES

- | | |
|---|---|
| Entérobyl Dehaussy. | Levure B 17. |
| Entérofagos. | Levuromaltine Déjardin. |
| Entéroformine. | Magistère de Bismuth Fouché. |
| Entérohépatine. | Magnélax. |
| Entéromucine. | Marrubiase. |
| Entéropansement du D ^r Zizine. | Métacarbine. |
| Entérovaclydun. | Mucicarbos. |
| Entéroxin Leclerc. | Mucobismuthine. |
| Entéryl. | Mucyllium. |
| Eugastrol. | Nigérine Vincent. |
| Exonérol. | Novatropine. |
| Ferments lactiques Fabre. | Novolactol Daguin. |
| Formocarbine. | Ouataplasme du D ^r Langlebert. |
| Formocarbos. | Oxyléine. |
| Gastéose. | Ozothine. |
| Gastrépatine. | Panbiline. |
| Gastrocaol. | Pancarbo Hardy. |
| Gastrocarbone. | Pancréatose Idon. |
| Gastroclean. | Pancrébile. |
| Gastrozymase. | Pangastrol. |
| Gélopansements gastro-intestinaux. | Pangestyl Narty. |
| Gélotanin. | Panlabyl. |
| Génatropine. | Pansolanée. |
| Génécarmine. | Panstomase. |
| Génistéнал. | Paradol. |
| Glyco-lactimase. | Paralactine Byla. |
| Glyco-thymoline. | Passicarbone. |
| Goménoléos. | Peptogyl A et L. |
| Gouttes Daynoc. | Peptone Vassal. |
| Hexafel. | Perquinol. |
| Hopogan Bocquillon. | Plasma de Quinton. |
| Insévaccin. | Polypeptine. |
| Iodure d'Amidon Lumière. | Poudre Paterson. |
| Kaolinase. | Proto-Gambier. |
| Kerlactine. | Proxytol. |
| Koumyl. | Radiogastrol. |
| Labyllax. | Rectopanbiline. |
| Lac-Ser. | Rhizotanin Chapotot. |
| Lactaris. | Sal Sodyl. |
| Lactimase. | Sanluol. |
| Lactobacilline. | Sel d'Ewald. |
| Lactocalcine. | Septicémine Cortial. |
| Lactochol. | Sirop Henry Mure. |
| Lactolaxine Fydau. | Sirop Teyssèdre. |
| Lactoseptyl. | Sodésyl. |
| Lactosérum Lavril. | Sodogastrol. |
| Lait de Magnésie Phillips. | Spasmalgine Roche. |
| Lansoyl. | Spasmalone. |
| Larosán Roche. | Spasmoryl. |

II. — APPAREIL DIGESTIF. T. S.

ENTÉRITES AIGÜES - DIARRHÉES - COLIQUES FERMENTATIONS INTESTINALES

Stomobrol.
Stomoxygène.
Stovarsol.
Stupho.
Surparine.
Syntropan Roche.
Tablettes Perroud.
Tapo.
Thoroxyl.
Triluès.
Triseptine.
Ultra-Levure.

Uribilline.
Uvargol.
Vaccins Clin.
Vaccins Ronchèse (ampho-
vaccins).
Vaccinothérapie atoxique
Cépède.
Vacciphages.
Vagosédyl.
Yaourtine.
Zymatine.

ENTÉRITES CHRONIQUES. APPENDICITE CHRONIQUE

Voir aussi :

Antidiarrhéiques.
Antiseptiques intestinaux.
Bactériophages.
Bactériothérapie.
Cataplasmes.
Cholagogues.
Dietétique.
Instrumentation.
Laxatifs.
Opothérapie.
Sérums Vaccins.

Acolitol.
Adipolysine.
Agarase.
Alcalinose.
Alcasodine.
Alunozal.
Amibiasine.
Amidal.
Amiphène Carron.
Ampho-Vaccin Intestinal
Ronchèse.
Amylodiastase Thépenier.
Anacidase.
Anapeptone Vassal.
Aniodol.
Anthracalcine.
Anthrseptol.
Antigénines.
Antispasmyl.
Antivirus.

Anxiol.
Argion.
Arthrilaax.
Atural.
Bacté-phages.
Bellafoleline Sandoz.
Benzocarbène.
Bikréol.
Biléyl Fournier.
Biliase Raby.
Biliboldo.
Bilifluine.
Biliogastrine.
Bilivaccin Anticolibacil-
laire.
Biolaetyl Fournier.
Bis-Ka-Ma.
Bismokaol.
Bismusodine.
Bismuth (Crème de) du
D^r Quesneville.
Bismuth (Crème de) chlo-
romagnésienne du D^r
Quesneville.
Bismuth Desleaux.
Bismuth Tulasne.
Bolcitol.
Boldobyl.
Boléase Monal.
Bolène.
Bulgarine Thépenier.
Calcium Francalcion.
Calcium Sandoz.

II. — APPAREIL DIGESTIF. T. S.

ENTÉRITES CHRONIQUES. APPENDICITE CHRONIQUE

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Calcivitam. | Delbiase. |
| Carb. | Diastopepsine Richepin. |
| Carbagol Marinier. | Digastrine. |
| Carbalcaloïdes. | Digestif Harvey. |
| Carbargyre. | Doloma. |
| Carbatropine. | Dolophos. |
| Carbofixine Longuet. | Dynosthène. |
| Carbolactyl bilié. | Dyspepsine Hepp. |
| Carbolactyl simple. | Elixir Godfrin. |
| Carbolin Midy. | Elixir Grez. |
| Carbonate de Bismuth Per- | Elixir Spark. |
| roud. | Entériode. |
| Carbonésie. | Entéro-antigènes. |
| Carbophos. | Entérofagos. |
| Carbos. | Entéroformine. |
| Carbosanis. | Entérohépatine. |
| Casaldyl. | Entéromucine. |
| Charbon Fraudin. | Entéro-Vaclydun. |
| Charbon Tissot. | Entéroxin. |
| Chéralys (comprimés). | Enzypan. |
| Chloramine Freyssinge. | Eugastrol. |
| Chlorical. | Evolaxine. |
| Chlorhydrol. | Exonérol. |
| Chlorobyl. | Ferments lactiques Fabre. |
| Chlorocalcion. | Formine Adrian. |
| Chlorumagène. | Formocarbine. |
| Cholagol. | Formocarbos. |
| Cholécystine. | Francalcion. |
| Choléine Camus. | Frugeolines Vichy. |
| Choléine lactique. | Galabactéine. |
| Choléo-combrétol boldinisé. | Gastrépatine. |
| Cholélyse. | Gastroclean. |
| Choléokinase. | Génatropine. |
| Choléolactol Daguin. | Génécarmine. |
| Cholérène. | Génisténal. |
| Citrocarbène. | Génomorphine. |
| Citropaïne du D ^r Fontal. | Glucolactimase. |
| Colisel. | Glucothymoline. |
| Colitique. | Goménoléos. |
| Colloïl Leisyn. | Gouttes Daynoc. |
| Comprimés Galac. | Granules Chanteaud. |
| Comprimés Vichy-Etat. | Granules Edgès. |
| Coprex. | Hépalomel Védé. |
| Coréine. | Hépatodiase. |
| Crème de Bismuth chloro- | Hépatozyl Caldo. |
| magnésienne du D ^r Ques- | Hexafel. |
| neville. | Hopogan Bocquillon. |
| Crème de Bismuth du D ^r | Hormobiline. |
| Quesneville. | Huile Crolas. |
| Cryptargol Lumière. | Immunizols Grémy. |
| Cyto-magnésium Oliviero. | Immuno — Vaccins. |

II. — APPAREIL DIGESTIF. T. S.

ENTÉRITES CHRONIQUES APPENDICITE CHRONIQUE

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Insévacin. | Pancréanne. |
| Iodure d'amidon Lumière. | Panlabyl. |
| Isalaxine. | Pansolanée. |
| Ispaghul. | Panstomase. |
| Jécol. | Papavéryl. |
| Jécopeptol. | Paradol. |
| Kaolinase. | Paralactine Byla. |
| Kerlactine. | Passicarbonate. |
| Koumyl. | Peptalmine. |
| Labyfax. | Peptalmine magnésinée. |
| Lac-Ser. | Peptogil A. et L. |
| Lactaris. | Peptomagnésie Vassal. |
| Lactimase. | Peptone Vassal. |
| Lactobacilline. | Pilules du D ^r Debouzy. |
| Lactobyl. | Plasma de Quinton. |
| Lactocalcine. | Polyferments Laleuf. |
| Lactolaxine Fyda. | Polypeptine. |
| Lactoseptyl. | Poudre Paterson. |
| Lactosérum Lavril. | Progaster. |
| Lansoyl. | Protidyne Dragées. |
| Laxamalt. | Proxtyl. |
| Laxatif Miraton Châtel-Guyon. | Réalphène Buisson. |
| Levure B 17. | Rectopanbiline. |
| Levure Zymaculine. | Romarantyl. |
| Levuro-maltine Déjardin. | Romarène. |
| Lin Tarin. | Sal Sodyl. |
| Listose Vicario. | Selunic. |
| Lysaxins L. M. L. | Sérums Clin. |
| Magnogène. | Sirops Henry Mure. |
| Métacarbène. | Sodésyl. |
| Métacitrine. | Sodogastrol. |
| Microlyse. | Spasmacol. |
| Morphéroinn Leisyn. | Spasmalgine Roche. |
| Mucicarbos. | Spasmoryl. |
| Mucilaxine. | Stal-Kosal. |
| Mucobismuthine. | Staphylase du D ^r Doyen. |
| Mucyllium. | Stomobrol. |
| Néo-collargol. | Stomoxygène. |
| Nigérine Vincent. | Suryali. |
| Normacol. | Syntropan Roche. |
| Novatropine. | Tablettes Perroud. |
| Novolactol Daguin. | Tapo. |
| Ollricyl Hardy. | Taxol. |
| Opobyl. | Térozone. |
| Opochol. | Tonikéine Chevreton. |
| Orthogastrine. | Tréparsol. |
| Oxyléine. | Tridynol. |
| Panbiline. | Triluès. |
| Pancalcion. | Triseptine. |
| Pancarbo Hardy. | Ultra-Levure. |
| | Uribiline. |

II. — APPAREIL DIGESTIF. T. S.

ENTÉRITES CHRONIQUES APPENDICITE CHRONIQUE

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Uvargol. | Vasolaxine. |
| Vaccins Clin. | Vichy purgatif. |
| Vaccins Ronchèse (ampho- vaccins). | Vitacholine. |
| Vaccinothérapie atoxique | Vulcase. |
| Cépède. | Yaourtine. |
| Vacciphages. | Zymatine. |

GASTRALGIES

Voir aussi :

| | |
|--|--|
| <i>Alcalins.</i> | Citralin. |
| <i>Analgésiques externes.</i> | Citrofluyl. |
| <i>Antispasmodiques et Sédatifs.</i> | Citrophos. |
| <i>Instrumentation.</i> | Citrosodine Longuet. |
| <i>Pansements gastriques.</i> | Codérax. |
| <i>Sédatifs.</i> | Colloïl Leisyn. |
| Alcalinose. | Comprimés Vichy-Etat. |
| Alcasodine. | Digastrine. |
| Algosédine. | Digestif Harvey. |
| Alucol Wander. | Digestonic. |
| Ampoules de Pantopon Ro- che. | Doloma. |
| Ampoules de Spasalgine Roche. | Dyspeptine Hepp. |
| Antispasmyl. | Ektal. |
| Arthrilax. | Elixir Bonjean. |
| Bellafoline Sandoz. | Elixir eupeptique Tisy. |
| Bi-Citrol Marinier. | Elixir Grez. |
| Biomucine. | Ergépatine. |
| Bismokaol. | Eugastrol. |
| Bismuth B 3. | Eupeptique Monavon. |
| Bismuth (Crème de) du D ^r Quesneville. | Extrait Hamyd. |
| Bismuth Desleaux. | Florhépatine. |
| Bismuth Tulasne. | Freinospasmyl. |
| Bromo-Garnal. | Gastéose. |
| Calcomagnésie. | Gastiase. |
| Calmaby. | Gastrocaol. |
| Calmag Na. | Gastronaldine. |
| Carb. | Gastropansement du D ^r Zi- zine. |
| Carbagol Marinier. | Gastrosodine. |
| Carbobel. | Gastrozymase. |
| Carbocitrol. | Gélogastrine Licardy. |
| Carbonate de Bismuth. — Tablettes Perroud. | Génatropine. |
| Carbonésie. | Génistéнал. |
| Cétrarose Gigon. | Gmet (extraits). |
| Charbon Tissot. | Granules Chanteaud. |
| Chloridia. | Hépadrainase. |
| Choléolax. | Hopogan. |
| | Jécoceptol. |
| | Kaobrol. |
| | Kaolinase. |
| | Lait de Magnésie Phillips. |
| | Lubrokak. |

II. — APPAREIL DIGESTIF. T. S.

GASTRALGIES

Magécarine.
 Mésogastrine.
 Métacitrine.
 Mucobismuthine.
 Nésal.
 Névralgol Brossard.
 Normogastrol.
 Orthogastrine.
 pancarbo Hardy.
 pancréastose Idon.
 pansolanée.
 paquets Védé.
 paradol.
 peptone Vassal.
 physioscyamine.
 polypeptine.
 poudre Danica.
 poudre Paterson.
 Radiogastrol.
 Salsanos.

Sal Sodyl.
 Sédobrol Roche.
 Sédogastrine.
 Sédol.
 Sel d'Ewald.
 Sel de Hunt.
 Sel digestif Bé-Mé-Cé.
 Sirops Henry Mure.
 Sédosyl.
 Sodogastrol.
 Spasmacol.
 Spasmalone.
 Stal-Kosal.
 Stoméol Vichy.
 Stomobrol.
 Stomophile.
 Suryali.
 Tablettes Perroud.
 Théinol.
 Zymatine.

GASTRO-ENTÉRITES DE L'ENFANCE DIARRHÉES INFANTILES

Voir aussi :

Antidiarrhétiques.
Antiemétisants.
Antiseptiques intestinaux.
Antispasmodiques et sédatifs.
Bactériophages
Bactériothérapie.
Colloïdes.
Chimiothérapie.
Diététique.
Vaccins.

Acolitol.
 Alunozal.
 Amibiasine.
 Amidal.
 Amiphène.
 Ampho-vaccin Intestinal
 Ronchèse.
 Amylodiastase Thépenier.
 Aniodol.
 Antigénines.
 Argion.
 Arthrilax.
 Atural.
 Azym.
 Bacillactine Nutricia.
 Bacté-Phages.
 Benzocarbène.

Bi-Citrol Marinier.
 Bioentérase.
 Biolactyl Fournier.
 Bismuth B 3.
 Bismuth (crème de) du
 Dr Quesneville.
 Bismuth Desleaux.
 Bismuth Tulasne.
 Bromure de Calcium (Si-
 rop Henry Mure au).
 Bulgarine Thépenier.
 Carbagol Marinier.
 Carbolactyl simple.
 Carbos.
 Calcoléol.
 Casaldyl.
 Caséone Fabre.
 Chlormagnésium Fisch.
 Chloro-magnésion.
 Citrosodine Longuet.
 Colisel.
 Comprimés Galac.
 Comprimés Proto-Gambier.
 Cryptargol Lumière.
 Diasto-pepsine Richépin.
 Dyspeptine Hepp.
 Elixir Bonjean.
 Elixir Godfrin.
 Elixir Grez.

II. — APPAREIL DIGESTIF. T. S.

GASTRO-ENTÉRITES DE L'ENFANCE DIARRHÉES INFANTILES

| | |
|---|----------------------------|
| Entériode. | Marrubiase. |
| Entéroantigènes. | Métacarbine. |
| Entérofagos. | Milkase. |
| Entéroformine. | Novolactol Daguin. |
| Entérolactyl. | Oxyléine. |
| Entéromucine. | Panbiline. |
| Entéropansement du D ^r Zizine. | Papaïne Trouette - Perret. |
| Entéro Vaclydun. | Paralactine Byla. |
| Entéroxin Leclerc. | Peptogil A et L. |
| Ferments lactiques Fabre. | Peptone Vassal. |
| Formocarbine. | Phosphate Pinard. |
| Gastrozymase. | Plasma de Quinton. |
| Gélotanin. | Poudre Paterson. |
| Glyco-lactimase. | Proto-Gambier. |
| Gmet (extraits). | Proxylol. |
| Goménoléos. | Rectopanbiline. |
| Hopogan Bocquillon. | Sal Sodyl. |
| Insévacin. | Sel de Hunt. |
| Koumyl. | Sodolactine. |
| Kymosine. | Stupho. |
| Lab Lacto Ferment. | Suppositoires Pyrax. |
| Lac-Ser. | Tachygastrine. |
| Lactaris. | Thoroxyl. |
| Lactimase. | Triluès. |
| Lactochol. | Ultra-Levure. |
| Lactosérum Lavril. | Uvargol. |
| Larozan Roche. | Vacciphages. |
| Laxopeptine Girard. | Véguva. |
| Leucoseptyl. | Yaourtine. |
| Levure B 17. | Zymatine Lescène. |
| | Zymogastrine Kervan. |

HYPERCHLORHYDRIE

Voir aussi :

| | |
|-------------------------------|---|
| Alcalins. | Bellafoline Sandoz. |
| Analgésiques internes. | Benzocarbine. |
| Antispasmodiques et sédatifs. | Bi-Citrol Marinier. |
| Diététique. | Biomucine. |
| Pansements gastriques. | Bis-Ka-Ma. |
| | Bismokaol. |
| | Bismusodine. |
| Acécoline. | Bismuth B 3. |
| Alcalinose. | Bismuth (Crème de) du D ^r Quesneville. |
| Alcasodine. | Bismuth Desleaux. |
| Algosédine. | Bismuth Tulasne. |
| Alsodine. | Bradygastrine Ducloy. |
| Alucol Wander. | Calcomagnésie. |
| Anacidase. | Calmag Na. |
| Anthraccalcine. | Carb. |
| Antinéase. | Carbagol Marinier. |
| Antispasmyl. | Carbonate de Bismuth. |
| Azym. | |

II. — APPAREIL DIGESTIF. T. S.

HYPERCHLORHYDRIE

| | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Carbonésic. | Kaolinase. |
| Carbophos. | Lait de magnésie Philipps. |
| Carbos. | Magécarine. |
| Carbosanis. | Mésogastrine. |
| Charbon Fraudin. | Métacitrine. |
| Charbon Tissot. | Mucobismuthine. |
| Chéralys (comprimés). | Nigérine. |
| Citropaine du D ^r Fontal. | Normogastrol. |
| Citrophos. | Novatropine. |
| Citrosodine Longuet. | Orthogastrine. |
| Colloil Leisyn. | Panbiline. |
| Comprimés Vichy-Etat. | Pancarbo Hardy. |
| Digestif Harvey. | Pangastrol. |
| Digestonic. | Pangestyl Narty. |
| Doloma. | Paquets Védé. |
| Dolophos. | Passicarbonate. |
| Entéroformine. | Philogastrine. |
| Féculyse Heudebert. | Polypeptine. |
| Gastrépatine. | Poudre Danica. |
| Gastricine du D ^r E. Du- | Poudre Paterson. |
| hourcau. | Radiogastrol. |
| Gastrocaol. | Salsanos. |
| Gastrocalcine. | Sal Sodyl. |
| Gastrocarbone. | Sédogastrine. |
| Gastroclean. | Sel d'Ewald. |
| Gastronaldine. | Sel de Hunt. |
| Gastro - pansement du D ^r | Sel digestif Bé-Mé-Cé. |
| Zizine. | Sodésyl. |
| Gastrosodine. | Sodogastrol. |
| Gastrozymase. | Sodolactine. |
| Gélogastrine Licardy. | Stal-Kosal. |
| Génatropine. | Stoméol Vichy. |
| Granules Chanteaud. | Stomobrol. |
| Hépatosodine. | Stomophile. |
| Hopogan Bocquillon. | Suryali. |
| Isotonyl Bouret. | Tablettes Perroud. |
| Jécoceptol. | Zymatine Lescène. |
| Kaobrol. | Zymogastrine Kervan. |

HYPOCHLORHYDRIE — HYPOPEPSIE ATONIE GASTRIQUE

Voir aussi :

Diététique.
Eupeptiques.
Stimulants de la sécrétion
et de la motilité gastrique.

Acécoline.
Agozymase.
Allisatine Sandoz.
Alsodine.

Appétyl.
Azym.
Bi-Citrol Marinier.
Boldo Verne.
Calcomagnésie.
Carbocitrol.
Chlorhydrol.
Chloridia.
Digastrine.
Dragées Elkin.

II. — APPAREIL DIGESTIF. T. S.

HYPOCHLORHYDRIE — HYPOPEPSIE ATONIE GASTRIQUE

Dyspeptine Hepp.
Elixir Bonjean.
Elixir Ducro.
Elixir du D^r Mialhe.
Elixir Grez.
Elixir Spark.
Elkin (dragées, granules).
Enzypan.
Eupeptique Monavon.
Gastricine du D^r E. Du-
hourcau.
Gastronaldine.
Gastrozymase.
Génécarmine.
Généserine.
Hépapeptine.
Hépatosodine.
Ionyl.
Ispaghul.
Laby lax.
Magécarine.
Mésogastrine.
Métacitrine.

Normogastrol.
Cénophos.
Orthogénol.
Pancréastase granulée De-
fresne.
Pangestyl Narty.
Panstomase.
Papaine Trouette-Perret.
Peptodiase.
Peptosthénine Choay.
Persodine Lumière.
Phylla Dyn.
Pluriblaste.
Polyferments.
Quassine Houdé.
Sodolactine.
Spasmoryl.
Stomarol.
Sulfohyl.
Tachygastrine Ducloy.
Tridigestine Dalloz.
Vin de Chassaing.

ICTÈRES — CHOLÉMIE

Voir aussi :

Antiseptiques intestinaux.
Cholagogues.
Diététique.
Laxatifs.
Opothérapie.

Adipolysine.
Agarase.
Agobyl.
Agocholine.
Agozymase.
Alcasodine.
Aloïne Houdé.
Anaclasine.
Antibillieux Fuzor.
Arthrillax.
Arvensyl.
Bensamine.
Bi-Citrol Marinier.
Biléyl Fournier.
Biliase Raby.
Biliboldo.
Bilifluine.
Billabstine.
Billogastrine Chevillon.

Bolcitol.
Boldine Houdé.
Boldobyl.
Boldo Gmet.
Boldolactac Lagoutte.
Boldoïne Eparvier.
Boldorhéine.
Boldo Verne.
Boléase Monal.
Bolène.
Bucmine.
Bulgarine Thépénier.
Cachets Pachaut.
Calmaby.
Caparlem.
Capsules Haarlem Bardet.
Carb.
Carbagol Marinier.
Carbo-combrosmol.
Carbolactyl bilié.
Carbolactyl simple.
Carbotrignon.
Cascarine Leprince.
Catalyl Mg.
Chlormagnésium Fisch.
Chloro-magnésion.

II. — APPAREIL DIGESTIF. T. S.

ICTÈRES — CHOLÉMIE

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Cholagol. | Hépatie Efa du Dr Leca- |
| Cholécystine. | cheux. |
| Choléfluine. | Hépatodiase. |
| Choléine Camus. | Hépatomanganol. |
| Choléine lactique. | Hépatosodine. |
| Cholélyse. | Hépatozyl Caldo. |
| Choléocombrétol boldinisé. | Hormantoxone. |
| Choléokinase. | Hormobiline. |
| Choléolactol Daguin. | Huile Crolas. |
| Choléolax. | Hyposulfène. |
| Choléopeptine. | Isalaxine. |
| Cholérène. | Kinéchol. |
| Chophytol Rosa. | Lac-Ser. |
| Chophytol Rosa injectable. | Lacto sérum Lavril. |
| Citropaine du Dr Fontal. | Métacarbène. |
| Citrosodine. | Magsalyl Mg. |
| Comprimés Proto-Gambier. | Métacitrine. |
| Crinocardine. | Movébil. |
| Crypthiol. | Normogastrol. |
| Décholestrol. | Oléocidase. |
| Dépuride du Dr Roger | Oléoformine Corbière. |
| Weber. | Olricyl Hardy. |
| Drainochol. | Olivéol. |
| Ektal. | Opobyl. |
| Endopancrine. | Opochol. |
| Entérobyl Dehaussy. | Orthogénol. |
| Entéroformine. | Panbiline. |
| Entérolactine. | Pancrébile. |
| Entéryl. | Pangestyl Narty. |
| Equisétol. | Paradol. |
| Ergépatine. | Passicarbène. |
| Ergocoline. | Peptomagnésie Vassal. |
| Euonymine Paul Thibault. | Perquinol. |
| Evonymine. | Pilules du Dr Debouzy. |
| Félamine Sandoz. | Précikase. |
| Ferments lactiques Fabre. | Progaster. |
| Florhépatine. | Prométhine. |
| Fluobyl. | Proto-Gambier. |
| Fluocholine. | Proxytol. |
| Fluokol. | Pyrélaïne Collas. |
| Formocarbène. | Pyurol. |
| Frugoline Vichy. | Radiotropine. |
| Formocitrine. | Rectopanbiline. |
| Fosfomagnyl. | Révuosoplasme. |
| Gastrépatine. | Romarantyl. |
| Gastro-sodine. | Romarène. |
| Gouttes Magalo. | Salicylate de soude Clin. |
| Granules Chanteaud. | Sal Sodyl. |
| Gravural. | Salvébyl. |
| Hémopanbiline. | Saucholine. |
| Hépadrainase. | Sels Mags. |
| Hépalomel Védé. | Trisalyl. |

II. — APPAREIL DIGESTIF. T. S.

ICTÈRES — CHOLÉMIE

Triseptine.
Sodisalyne.
Sodothiol.
Soluroil.
Sufrolax Crosnier.
Surparine.
Thiocitran.
Tisane hépatique Lahaye.
Ulcéosine.

Uribiline.
Urométhyl.
Vichy-purgatif.
Vitacholine.
Vitacuroil Savare.
Vulcase.
Yaourtine.
Zymatine Lescène.

INFECTIONS INTESTINALES

Voir aussi :

Antidiarrhéiques.
Antiseptiques intestinaux.
Bactériophages.
Bactériothérapie.
Détiétique.
Laxatifs.
Sérums Vaccins.

Acolitol.
Amibiasine.
Amidal.
Amiphène Carron.
Ampho-vaccin intestinal
Ronchèse.
Anacidase.
Aniodol.
Anthraccalcine.
Argion.
Bacté-phages.
Belcarmine.
Benzocarbène.
Billabstine.
Binoxol.
Biolactyl.
Bismuth Desleaux.
Bismuth (Crème de) du
D^r Quesneville.
Bismuth Tulasne.
Boldoïne Eparvier.
Bolène.
Cachets Spévin.
Calmaby.
Carb.
Carbagol Marinier.
Carbalcaloïdes.
Carbargyre.
Carbocombrosmol.
Carbofixine Longuet.
Carbolactyl bilité.
Carbonate de Bismuth.

Carbophos.
Carbotrignon.
Casaldyl.
Charbon Fraudin.
Charbon Tissot.
Chloramine Freyssinge.
Chlorobyl.
Cholagol.
Choléine Camus.
Choléolactol Daguin.
Citrocarbène.
Colisel.
Colitique.
Comprimés Galac.
Comprimés Proto-Gambier.
Crésentyl.
Cryptargol Lumière.
Digastrine.
Entéro-antigènes.
Entérofagos.
Entéroformine.
Entéro Vaclydun.
Entéroxin Leclerc.
Entéryl.
Ferments lactiques Fabre.
Formocarbène.
Formocarbos.
Galabactéine.
Gastéose.
Gastiasse.
Gastrocarbène.
Gastroclean.
Glycolactimase.
Hopogan Bocquillon.
Immunizols Grémy.
Iodure d'Amidon Lumière.
Kerlactine.
Koumyl.
Labyllax.
Lac-Ser.
Lactaris.

II. — APPAREIL DIGESTIF. T. S.

INFECTIONS INTESTINALES

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Lactimase. | Rectopanbiline. |
| Lactobacilline. | Sodésyl. |
| Lactochol. | Sodogastrol. |
| Lactoprotéide Carrion. | Stomoxygène. |
| Lactoseptyl. | Sulfobyl. |
| Lactosérum Lavril. | Sulfothiorine. |
| Laxopeptine Girard. | Sulfureux Pouillet. |
| Leucoseptyl. | Sulf-Y. |
| Métacarbène. | Tablettes Perroud. |
| Microlyse. | Terpoxyl interne. |
| Mucicarbos. | Triseptine. |
| Mycidol Badel. | Ultraformine. |
| Néo-physio. | Ultra-levure. |
| Nigérine Vincent. | Uraseptine Rogier. |
| Oxyléine. | Ur-Clar. |
| Ozothine. | Uribilline. |
| Panbiline. | Urométhyl Lambiotte. |
| Pancarbo Hardy. | Uvargol. |
| Pancrébile. | Vaccins Ronchèse (ampho- |
| Pangestyl Narty. | vaccins). |
| Panlaby. | Vacciphages. |
| Passicarbène. | Vitacholine. |
| Perquinol. | Yaourtine. |
| Progaster. | Zymatine. |
| Proto-Gambier. | |

INSUFFISANCE HÉPATIQUE

Voir aussi :

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| <i>Allergies.</i> | Billabstine. |
| <i>Cholagogues.</i> | Boldine Houdé. |
| <i>Laxatifs.</i> | Boldobyl. |
| <i>Opothérapie.</i> | Boldo Gmet. |
| <i>Urticaire.</i> | Boldoïne Eparvier. |
| | Boldolactic Lagoutte. |
| Adipolysine. | Boldorhéine. |
| Agarase. | Boldo Verne. |
| Agobyl. | Boléase Monal. |
| Agocholine. | Bolène. |
| Agozymase. | Bucmine. |
| Alcasodine. | Cachets Pachaut. |
| Aloïne Houdé. | Caparlem. |
| Ampho-vaccin intestinal | Capsules Haarlem Bardet. |
| Ronchèse. | Carbocitol. |
| Anaclasine Ranson. | Carbolactyl bilié. |
| Antibilieux Fuzor. | Carbolactyl simple. |
| Arvensyl. | Cascarine Leprince. |
| Bi-Citol Marinter. | Catalyl Mg. |
| Bikréol. | Chéralys (comprimés). |
| Biléyl Fournier. | Chlorhydrol. |
| Biliase Raby. | Chlormagnésium Fisch. |
| Bili boldo. | Chloromagnésion. |
| Bilifluine. | Chlorumagène. |
| Biliogastrine Chevillon. | Cholagol. |
| | Choléfluine. |

II. — APPAREIL DIGESTIF. T. S.

INSUFFISANCE HÉPATIQUE

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Choléine Camus. | Gastroclean. |
| Choléine lactique. | Gastro-Sodine. |
| Choléocombretol boldinisé. | Grains de Vals. |
| Choléokinase. | Granules Chanteaud. |
| Choléolactol Daguin. | Granules Edgès. |
| Choléolax. | Gravural. |
| Cholépan Longuet. | Hépacrine. |
| Cholérène. | Hépadrainase. |
| Cholergine. | Hépagyl. |
| Chophytol Rosa. | Hépalomel Védé. |
| Chophytol Rosa injectable. | Hépatodiase. |
| Citralin. | Hépatomanganol. |
| Citrocarbine. | Hépatosodine. |
| Citrofluyl. | Hépatozyl Caldo. |
| Citropaine du D ^r Fontal. | Hépatrol. |
| Citrophos. | Hépatrol injectable. |
| Citrosodine Longuet. | Hexafel. |
| Comprimés Proto-Gambier. | Hormobiline. |
| Comprimés Vichy-Etat. | Ispaghul. |
| Crinocardine. | Jécol. |
| Crypthiol. | Jécopeptol. |
| Décholestrol. | Kénol. |
| Diasto-pepsine Richepin. | Kinéchol. |
| Diurène. | Labyllax. |
| Dolophos. | Lac-Ser. |
| Drainochol. | Lactobyl. |
| Ektal. | Lactochol. |
| Elixir Spark. | Lactolaxine Fydau. |
| Elkin (dragées, granules). | Lacto-Sérum Lavril. |
| Emgé Lumière. | Lait de magnésie Phillips. |
| Entéro-Antigènes. | Lancéryl. |
| Entéryl. | Laxatif Miraton Châtel-Guyon. |
| Enzypan. | Levure Fraiche Mycète. |
| Equisétol. | Magnésium Hardy. |
| Ergépatine. | Magnéso-tubes Robinet. |
| Euglyma. | Magol Churchill. |
| Euonymine Paul Thibault. | Magsalyl Mg. |
| Euphoryl. | Movébil. |
| Evobiline. | Néotrophène. |
| Evonyl. | Oléofomine Corbière. |
| Félamine Sandoz. | Olriricyl Hardy. |
| Ferments lactiques Fabre. | Olivéol. |
| Florhépatine. | Opobyl. |
| Fluobyl. | Opochol. |
| Fluocholine. | Opothérapies. |
| Fluokol. | Orcalcine. |
| Formocarbos. | Orthogastrine. |
| Formocitrine. | Orthogénol. |
| Fosfomagnyl. | Panbiline. |
| Gastéose. | Pancréatose Idon. |
| Gastiasse. | Pancrébile. |
| Gastrépatine. | |

II. — APPAREIL DIGESTIF. T. S.

INSUFFISANCE HÉPATIQUE

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Pancrinol du D ^r Debat. | Saucholine. |
| Pangaduine. | Sel hépatique U. N. Ar- |
| Pangestyl Narty. | quevaux. |
| Panlabyt. | Selunic. |
| Panstomase. | Sérobiol. |
| Paradol. | Sodothiol. |
| Peptalmine Magnésinée. | Solurot. |
| Peptogyl A et L. | Splénomagnésium. |
| Peptosthénine Choay | Sufrolax Crosnier. |
| Pilules du D ^r Debouzy. | Sulfobyl. |
| Plasma de Quinton. | Sulfolax. |
| Polyferments Laleuf. | Suryali. |
| Polypeptonal. | Tapo. |
| Précikase. | Thiocitrane Thévenot. |
| Progaster. | Tisane hépatique Lahaye. |
| Prométhine. | Trisalyt. |
| Protiodine Dragées. | Triseptine. |
| Proto-Gambier. | Uribiline. |
| Proxylol. | Urol. |
| Pyurol. | Urométhyl. |
| Rectopanbiline. | Uromil. |
| Romarantyl. | Vaccins Ronchèse (ampho- |
| Romarène. | vaccins). |
| Salicylate de soude Clin. | Vichy purgatif. |
| Salsanos. | Vulcase. |
| Sal Sodyl. | Yaourtine. |
| Salvé. | Zymatine Lescène. |
| Salvébyl. | Zymogastrine Kervan. |
| Sanoquinol. | |

INSUFFISANCE PANCRÉATIQUE

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Voir aussi : | Elixir eupeptique Tisy. |
| <i>Opothérapie.</i> | Elkin (dragées, granules). |
| | Emgé Lumière. |
| Bikréol. | Enzypan. |
| Carbolactyl billé. | Opothérapies. |
| Carbolactyl simple. | Pancréanne. |
| Calcozymase. | Pancrébile. |
| Cholépan Longuet. | Peptosthénine Choay. |
| Diasto-peptine Richepin. | Polyferments Laleuf. |

INTOXICATIONS — AUTO-INTOXICATIONS ET SÉQUELLES

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Voir aussi : | Amidal. |
| <i>Antiseptiques internes.</i> | Ampho Vaccins Ronchèse. |
| <i>Cholagogues.</i> | Anaclasine Ranson. |
| <i>Diététique.</i> | Aniodol. |
| <i>Instrumentation.</i> | Azym. |
| <i>Laxatifs.</i> | Benzocarbène. |
| | Biolactyl Fournier. |
| Acolitol. | Billabstine. |
| Alcasodine. | Cachets Spévin. |

II. — APPAREIL DIGESTIF. T. S.

INTOXICATIONS — AUTO-INTOXICATIONS ET SÉQUELLES

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Carb. | Hormantoxone. |
| Carbagol Marinier. | Hopogan Bocquillon. |
| Carbargyre. | Hydroxydase. |
| Carbo combrosmol. | Hyposulfène. |
| Carbofixine Longuet. | Kénol. |
| Carbolactyl bilié. | Kerlactine. |
| Carbolactyl simple. | Lactocalcine. |
| Carbonésie. | Lactoseptyl. |
| Carbos. | Marrubiase. |
| Carbosanis. | Métacarbine. |
| Carbotrigon. | Movébil. |
| Charbon Fraudin. | Naïodine. |
| Charbon Tissot. | Nigérine Vincent. |
| Choléfluine. | Novolactol Daguin. |
| Chophytol Rosa. | Oposerrine Vitaminée. |
| Chophytol Rosa injectable. | Orthogastrinc. |
| Colisel. | Oxyléine. |
| Collubleu. | Pancarbo Hardy. |
| Dépuriodé du Dr Roger Weber. | Passicarbonate. |
| Digastrine. | Précikase. |
| Elkin (dragées, granules). | Radiogastrol. |
| Entéro antigènes. | Rectopaniline. |
| Entéroformine. | Rhizotanin Chapotot. |
| Entérolaxine. | Rhocya Dyn. |
| Entéropansement du Dr Zizine. | Sirop minéral sulfureux Crosnier. |
| Entéro Vaclydun. | Somnicones Béral. |
| Entéryl. | Strychnotonine. |
| Ephédrine naturelle Béral. | Sulfo-Thiorine. |
| Ergocoline. | Sulfolax. |
| Euphoryl. | Sulfureux Pouillet. |
| Formocarbine. | Sulfuryl Monal. |
| Gastrocarbone. | Triseptine. |
| Génostrychnine. | Uribiline. |
| Hépatomel Védé. | Vagoriane. |
| Hépatosodine. | Yaourtine. |

LITHIASÉ BILIAIRE. — COLIQUES HÉPATIQUES

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Voir aussi : | Agozymase. |
| <i>Analgésiques externes.</i> | Algosédine. |
| <i>Analgésiques internes.</i> | Ampoules de Pantopon Roche. |
| <i>Anesthésiques locaux.</i> | Ampoules de Spasmalgine Roche. |
| <i>Cholagogues.</i> | Anthraseptol. |
| <i>Dietétique.</i> | Antispasmyl. |
| <i>Opothérapie.</i> | Baldisédan. |
| Acatar. | Bensamine. |
| Adipolysine. | Benzocarbine. |
| Agobyl. | Benzylol. |
| Agocholine. | |

II. — APPAREIL DIGESTIF. T. S.

LITHIASE BILIAIRE. - COLIQUES HÉPATIQUES

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Biléyl Fournier. | Florhépatine. |
| Billabstine. | Fluobyl. |
| Biliase Raby. | Fluokol. |
| Bili boldo. | Frugéolines Vichy. |
| Bilifluine. | Formocarbène. |
| Biliogastrine Chevillon. | Formocitrine. |
| Boldine Houdé. | Génomorphine. |
| Boldobyl. | Gravural. |
| Boldo Gmet. | Hépadrainase. |
| Boldoine Eparvier. | Hépalomel Védé. |
| Boldorheïne. | Hépatie Efa du Dr Leca- |
| Boldo Verne. | cheux. |
| Boléase Monal. | Hépatomanganol. |
| Bucmine. | Hépatosodine. |
| Calmo suppos sédatifs. | Hépatozyl Caldo. |
| Caparlem. | Hexafel. |
| Capsules Bruel. | Hexotal. |
| Capsules Haarlem Bardet. | Hyposulfène. |
| Carbolactyl bilié. | Kinéchol. |
| Chlormagnésium Fisch. | Labyfax. |
| Chloromagnésion. | Lacto-sérum Lavril. |
| Cholagol. | Lysarthrol. |
| Cholécystine. | Mésothine Rhemda. |
| Choléfluine. | Métacarbène. |
| Choléine Camus. | Microlyse. |
| Choléine lactique. | Morphéorinn Leisyn. |
| Cholélyse. | Movébil. |
| Choléolactol Daguin. | Oléocidase. |
| Choléolax. | Oléoformine Corbière. |
| Choléopeptine. | Oléthyle Benzyle. |
| Cholépan. | Olivéol. |
| Cholérène. | Opobyl. |
| Chophytol Rosa. | Opochol. |
| Chophytol Rosa injectable. | Panbiline. |
| Cibalgine. | Pancrébile. |
| Citralin. | Pangestyl Narty. |
| Crypthiol. | Papavéryl. |
| Décholestrol. | Paradol. |
| Dialyl. | Peptomagnésie Vassal. |
| Diasclérol. | Pilules du Dr Debouzy. |
| Drainochol. | Pipérazine Midy. |
| Ektal. | Pipérazyl. |
| Elixir Spark. | Potion Adol. |
| Entérobyl Dehaussy. | Prométhine. |
| Entéroformine. | Pyrélaïne Collas. |
| Entéryl. | Rectopanbiline. |
| Equisétol. | Rhodazil. |
| Ergépatine. | Romarantyl. |
| Euonymine Paul Thibault. | Romarène. |
| Euphytol. | Saint-Aré. |
| Evobiline. | Salsanos. |
| Evonyl. | Sal Sodyl. |

II. — APPAREIL DIGESTIF. T. S.

LITHIASE BILIAIRE. — COLIQUES HÉPATIQUES

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Salvébyl. | Térozone. |
| Saucholine. | Thiocitran Thévenot. |
| Sédatuline Christiaens. | Tisane hépatique Lahaye. |
| Sédol. | Triseptine. |
| Sélamon. | Uralisol. |
| Sel hépatique U. N. Arque- vaux. | Uraseptine Rogier. |
| Sel de lithine effervescent. | Urisalyl. |
| Sodisalyne. | Urobuccol Malmanche. |
| Sodothiol. | Uroflux |
| Soluro. | Uroformine Gobey. |
| Spasmalgine Roche. | Urométhyl. |
| Spasmalone. | Urométine Lambiotte. |
| Spasmoxine. | Urophile. |
| Spasmoryl. | Urosalyl. |
| Spicanol. | Urosalyl méthylé. |
| Sufrolax Crosnier. | Urozéa. |
| Suppoalgos Lagoutte. | Véralgine. |
| Suryali. | Vitacholine. |
| Syntropan Roche. | Vitacurool Savare. |
| | Vulcase. |

RECTITES — FISSURES ANALES. PRURIT ANAL

Voir aussi :

| | |
|---|----------------------------|
| <i>Analgésiques externes.</i> | Hémorroïdine pommade. |
| <i>Analgésiques internes.</i> | Hémorroïdine suppositoires |
| <i>Antiprurigineux.</i> | Hirudinase. |
| <i>Antiseptiques externes pom- mades.</i> | Holosplénine. |
| <i>Instrumentation.</i> | Iodex. |
| <i>Laxatifs.</i> | Lynévol. |
| <i>Sérums Vaccins.</i> | Mictasol. |
| | Mucyllium. |
| | Néo-collargol. |
| | Nestosyl. |
| Acésine Guillaumin. | Onction Leisyn. |
| Adrépatine. | Percaïnal Ciba. |
| Anusol Mialhe. | Pommade au Nestosyl. |
| Baume Suelta. | Pommade Logeais. |
| Coalt Derma. | Pyo-amphogel Ronchèse. |
| Cratægus Gmet. | Rectagine. |
| Crayon antifissure Domer- gue. | Rhagadine Bracquemond. |
| Créosoforme Lambiotte. | Salantale. |
| Dermacide. | Suppo-gynals. |
| Dermo-Dulcis Lagoutte. | Suppositoires au Nestosyl. |
| Ektogan. | Suppositoires Logeais. |
| Entéro antigènes. | Térébline. |
| Glyco-thymoline. | Thigénol Roche. |

II. — APPAREIL DIGESTIF. T. S.

SATURNISME — COLIQUES DE PLOMB

Voir aussi :

Analgésiques internes.
Antiseptiques internes.
Antiseptiques intestinaux.
Diététique.
Laxatifs.

Acécoline.
 Antispasmyl.
 Azufrol.

Collubleu.
 Dépuriodé du D^r Roger Weber.
 Opoferine vitaminée.
 Rhocya Dyn.
 Sulfureux Pouillet.
 Sulfuryl Monal.
 Sulphium.
 Sulf Y.

STÉNOSES DU PYLORE

Voir aussi :

Analgésiques internes.
Antispasmodiques et sédatifs.
Diététique.
Pansements gastriques.

Alcalinose.
 Alsodine.
 Ampoules de Spasmalgine Roche.
 Antispasmyl.
 Bismusodine.
 Bismuth B 3.
 Bismuth (Crème de) du D^r Quesneville.
 Bismuth Desleaux.
 Bismuth Tulasne.
 Bradygastrine Ducloy.

Calmag Na.
 Colloïl Leisyn.
 Digastrine.
 Gastrocarbone.
 Gastropansement du D^r Zizine.
 Génatropine.
 Granules Chanteaud.
 Oléthyle-Benzyle.
 Papavéryl.
 Peptone Vassal.
 Perparine.
 Sodolactine.
 Spasmoryl.
 Spasneurol.
 Stal Kosal.
 Surparine.
 Syntropan Roche.

STOMATITES — GINGIVITE — MUGUET

Voir aussi :

Antiseptiques externes comprimés.
Antiseptiques externes liquides.
Antiseptiques externes pomades.

Acridia.
 Ampho-tablettes Ronchèse.
 Bacillactine Nutricia.
 Bacté Ricyl.
 Bulgarine Thépenier.
 Colarsénol.
 Collutoire V. E. Doumer.
 Collunovar.
 Dragées Bengué au Menthol.
 Edistol.

Electrocuprol.
 Fluosalyl Beaugourdon.
 Galform Lambiotte.
 Gargarisme du Mont-Dore.
 Glyco M.
 Glyco-thymoline.
 Gosiérine Dalloz.
 Gouttes Daynoc.
 Inolène.
 Inoxyl.
 Mésoforme.
 Mexyl.
 Néol.
 Nestosyl.
 Odarsol.
 Pastilles M. B. C.
 Pâte gingivale à l'acétylarsan.
 Perquinol.

II. — APPAREIL DIGESTIF. T. S.

STOMATITES — GINGIVITE — MUQUET

Pharyngaseptyl.
Pulvéol.
Salychlore Lavire.
Sanogyl.
Sanoram.
Saubarsinol.
Séphydine.
Septolan.

Solarsyl.
Solution huileuse au Nesto-
syl.
Spirogyl.
Staphylase du D^r Doyen.
Stovaine.
Triluès.
Tripyoril.

TUBERCULOSE INTESTINALE

Voir aussi :

Antiseptiques intestinaux.
Diététique.
Instrumentation.
Toniques.

Acatar.
Acolitol.
Alucol.
Alunosal.
Amibiasine.
Amidal.
Amiphène Carron.
Amydbine.
Benzocarbine.
Bulgarine Thépenier.
Carbagol Marinier.
Carbolactyl simple.
Carbophos.
Carbotrignon.
Colloïdogénine du D^r Bayle.

Créoformine.
Créositoires.
Dragécalcion.
Elixir Grez.
Entéroformine.
Formocarbine.
Gmet (extraits).
Hormocline.
Kerlactine.
Métacarbine.
Murones du D^r Robert
Jacques.
Ozothine.
Peptone Vassal.
Phymo-stéryl Leisyn.
Pilules V. E. Doumer.
Stupho.
Sulf-Y.
Triseptine.
Zimbyl.

ULCÈRES DE L'ESTOMAC ET DU DUODÉNUM

Voir aussi :

Alcalins.
Analgsésiques internes.
Diététique.
Hémostatiques.
Pansements gastriques.

Alcalinose.
Alucol Wander.
Ampoules de Spasmalgine
Roche.
Angioxyl.
Antinéase.
Antispasmyl.
Biomucine.
Bis-Ka-Ma.
Bismokaol.
Bismusodine.

Bismuth B 3.
Bismuth Desleaux.
Bismuth (Crème de) du
D^r Quesneville.
Bismuth (Crème de) chlo-
romagnésienne du D^r
Quesneville.
Bismuth Tulasne.
Bradygastrine Ducloy.
Calmaby.
Calmag Na.
Carbonate de bismuth. —
Tablettes Perroud.
Carbosanis.
Colloïl Leisyn.
Digestonic.
Doloma.
Eugastrol.

II. — APPAREIL DIGESTIF. T. S.

ULCÈRES DE L'ESTOMAC ET DU DUODÉNUM

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Gastrocalcine. | Passicarbonate. |
| Gastrocaol. | Peptone Vassal. |
| Gastronaldine. | Perparine. |
| Gastropansement du Dr Zizine. | Poudre Danica. |
| Gastrozymase. | Poudre Paterson. |
| Gélogastrine Licardy. | Radiogastrol. |
| Génomorphine. | Sédogastrine. |
| Hémopectal. | Sédol. |
| Kaobrol. | Sel d'Ewald. |
| Kaolinase. | Sel de Hunt. |
| Laristine Roche. | Sodolactine. |
| Larozan Roche. | Spasmoryl. |
| Magécarine. | Stal Kosal. |
| Morphéroïnn Leisyn. | Stoméol. |
| Mucobismuthine. | Stomobrol. |
| Nigérine. | Stomophile. |
| Novatropine. | Surparine. |
| Oxyléine. | Syntropan Roche. |
| Pangastrol. | Tablettes Perroud. |
| Paquets Védé. | Zymatine Lescène. |

III. - APPAREIL GÉNITO-URINAIRE. T. G.

ANTISEPTIQUES GYNÉCOLOGIQUES

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Airoglyce. | Dysmine Favrot. |
| Anexol. | Donagol. |
| Aniodol. | Ektogan Bocquillon. |
| Argycuprol. | Electrargol. |
| Aristargol. | Eranol. |
| Aseptone. | Eucalyptine Lebrun. |
| Asepto-poudre. | Eugaline. |
| Aseptovules. | Evine. |
| Bacté ricyl. | Flavurool. |
| Bain Salvia. | Glucolactol. |
| Boricine Meissonnier. | Glyco-M. |
| Borostyrol Schlatter. | Glyco-thymoline. |
| Camphocalyptol. | Goménovules. |
| Céthocal du Dr Lemay. | Gynarsol. |
| Chlocci. | Hydralin. |
| Clonazone Daufresne. | Inolène. |
| Coaltar saponiné Le Boeuf. | Inosepta. |
| Colpophile. | Iodex. |
| Comprimés d'Alibour. | Juranol. |
| Comprimés Guillaumin. | Lacpinine. |
| Comprimés vaginaux Leisyn. | Lactosmose. |
| Créosoforme Lambiotte. | Lauréol médicinal. |
| Cryptargol Lumière. | Leucagine. |
| Dermacide. | Leucolyse. |
| | Lusoforme. |

III. - APPAREIL GÉNITO-URINAIRE. T. G.

ANTISEPTIQUES GYNÉCOLOGIQUES

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Magnésovules. | Pilules Hélieniennes. |
| Mésosome. | Poudre Chaumel. |
| Métacuprol. | Produits Maïas. |
| Métricine. | Réthragine. |
| Métritols. | Salubrine Phénix. |
| Microlyse. | Sanoformine. |
| Mycidol Badel. | Savon Mollard. |
| Natrosyl. | Séphydine. |
| Néo-collargol. | Septolan. |
| Néol. | Sérelbé du D ^r Blaizot. |
| Néothorium Millot. | Sétirtem comprimés. |
| Nithium Buisson. | Spyrolides. |
| Oléovules. | Sulfureux Pouillet. |
| Ovules Chaumel. | Sunoxol. |
| Ovules Inséva. | Tampol Roche. |
| Ovules Intima. | Térébine. |
| Ovules Rhemda radio- | Térozone. |
| actis. | Terpoxyl externe. |
| Ovules Roche. | Tochlorine. |
| Ovules au Terpoxyl. | Uvargol. |
| Pennès (Produits). | Vioforme Ciba (et ovules au |
| Péricols. | Vioforme). |
| Perquinol. | Vitargyl. |

ANTISEPTIQUES URINAIRES EXTERNES

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Aïroglyce. | Hermophényl Lumière. |
| Anexol. | Iodex. |
| Aniodol. | Leucolyse. |
| Argycuprol. | Nitrolyse. |
| Aseptopoudre. | Nithium Buisson. |
| Boricine Meissonnier. | Oléovules. |
| Chlocci. | Préventyl. |
| Clonazone Daufresne. | Réthragine. |
| Colpophile. | Salvatyl. |
| Comprimés Guillaumin. | Santal Monal. |
| Cryptargol Lumière. | Séphydine. |
| Electrargol. | Sérelbé du D ^r Blaizot. |
| Evine. | Térozone. |
| Flavuro. | Terpoxyl externe. |
| Glyco-thymoline. | Tochlorine. |
| Goménoléos. | Vioforme. |
| Gonacrine. | Vitargyl. |
| Gynarsol. | Yptor. |

ANTISEPTIQUES URINAIRES INTERNES

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Absuric. | Anthraccalcine. |
| Acatar. | Anthrseptol. |
| Ampho-vaccins Ronchèse. | Argion. |
| Amybdine. | Arhéol. |
| Aniodol. | Aseptone. |

III. - APPAREIL GÉNITO-URINAIRE. T. G.

ANTISEPTIQUES URINAIRES INTERNES

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Baldisédan. | Paradol. |
| Belcarmine. | Pelvisiformine. |
| Bensamine. | Phaguryl. |
| Benzocarbène. | Pilules V. E. Doumer. |
| Biliogastrine Chevillon. | Progone. |
| Binoxol. | Pyri-pyridium. |
| Bucmine. | Pyurol. |
| Canol. | Santal Midy. |
| Caparlem. | Solurol. |
| Cinurool Rosa. | Solvuric. |
| Dismine Favrot. | Terpine Gonnon. |
| Diurocystine. | Terpine granulée Baron. |
| Elatine Bouin. | Terpoxyl interne. |
| Elgine Julien. | Triseptine. |
| Entéroformine. | Ultraformine. |
| Eumictine. | Uraseptine Rogier. |
| Fokiényl. | Ur Clar. |
| Formocarbène. | Uréal Chanteaud. |
| Formocitrine. | Uribiline. |
| Goménoléos. | Uriclarine. |
| Gravural. | Urisanine. |
| Hexorcène. | Urobuccol Malmanche. |
| Hexotal. | Uroflux. |
| Iodhéma. | Uroformine Gobey. |
| Kaviase. | Uroiodine. |
| Métacarbène. | Urol. |
| Métaformine. | Urométhyl. |
| Métaux colloïdaux A. Lancien. | Urométine Lambiotte. |
| Microlyse. | Uromil. |
| Mictasol. | Urophile. |
| Mictophile Richer. | Uroquinol. |
| Mictoseptol. | Urosalyl Méthylé. |
| Mictualine. | Urosalyl. |
| Oxyléine. | Urosan Dufayard. |
| Ozothine. | Uro Tisan. |
| | Uvargol. |

BALSAMIQUES

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Acatar. | Goménol. |
| Arhéol. | Kaviase. |
| Baldisédan. | Phaguryl. |
| Blennopiat. | Santal Midy. |
| Bucmine. | Santal Monal. |
| Caparlem. | Térébine. |
| Capsules Haarlem Bardet. | Terpine Gonnon. |
| Diurocystine. | Terpine granulée Baron |
| Eumictine. | Terpoxyl interne. |
| Fokiényl. | Urisanine. |
| Gmet (extraits). | |

III. - APPAREIL GÉNITO-URINAIRE. T. G.

DÉCONGESTIFS PELVIENS

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Adrépatine. | Juranol. |
| Æsculase. | Magnésouvules. |
| Agomensine Ciba. | Ménatol. |
| Anusol. | Mensuosédyl. |
| Artériovecinine. | Mictasol. |
| Bain Carré. | Mictualine. |
| Biopausine. | Néo-thorium Millot. |
| Cuprémone simple et F. | Oléovules. |
| Cyproveinol. | Ovules Chaumel. |
| Do-Sa-No-Sal. | Ovules Intima. |
| Extrait Hamyd. | Ovules Vaccin Ivago de |
| Fluerase. | Goldenberg. |
| Fluxine (gouttes). | Paradol. |
| Hamamélis Gmet. | Pelviformine. |
| Hamamélis Grandval. | Phlébos. |
| Hémoluol. | Prostaphile Leisyn. |
| Hémopausine. | Prostatols Beauxis-La- |
| Hémorroïdine gouttes. | grave. |
| Hémoveine. | Proveinase Midy. |
| Hexotal. | Québralgine Fouché. |
| Hydrastis Gmet. | Suppositoires au Nestosyl. |
| Indhaméline Lejeune pluri- | Tampol Roche. |
| glandulaire. | Térozone. |
| Indhaméline Lejeune simple. | Tot'Hamélis. |
| Ivago de Goldenberg vaccin « M ». | Ur Clar. |
| Ivago-coli (buvable). | Utersan. |
| | Variphile |
| | Veinalgol. |

GALACTOGÈNES

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Blotrigon. | Maltosan. |
| Extrait de Malt français | Malt Wander ou Gloma. |
| Déjardin. | Maltea moser cristallisé. |
| Fantine. | Nuphos. |
| Farine de Malt Heudebert. | Nutromalt. |
| Farine maltée Favrichon. | Opothérapies. |
| Fénugrène. | Phosoforme. |
| Fosfoxyl Carron. | Phosphonine Soulié. |
| Galactogil. | Phytine Ciba. |
| Lactagol. | Recrésal. |
| Malt Ethel. | Sérobiol. |
| Malt français Déjardin | Sérogyné. |
| (Extrait de). | Végéphos. |
| Malt Pailleté. | Virmonal Piam. |

III. - APPAREIL GÉNITO-URINAIRE. T. G.

HÉMOSTATIQUES UTÉRINS

Arhémapectine.
 Calcional.
 Calcium Francalcion.
 Calcium Sandoz.
 Calcisthénine.
 Calcivitam.
 Chlorocalcion.
 Clisémine Longuet.
 Coagulène Ciba.
 Dragécalcion.
 Dragées ferro - ergotées Mannet.
 Elixir ferro-ergoté Mannet.
 Ergotine Lamante.
 Eugynol Grandval.
 Extrait Hamyd.
 Fluxine (gouttes).
 Francalcion.
 Gynergène Sandoz.
 Hamamélis Gmet.

Hémaxol.
 Hémoalciopectine.
 Hémogénol Dausse.
 Hémopausine.
 Hémosamine.
 Hémostatique Coudert.
 Hémostatique Goy.
 Hémostyl.
 Hydrastis Gmet.
 Hydrastine Houdé.
 Lugocalcion.
 Opothérapies.
 Pancalcion.
 Pituilobine.
 Plasmocalcium.
 Post-hypophyse Choay.
 Sécacornine Roche.
 Sérum Oliviero.
 Tot-Hamélis.

RÉGULATEURS DES RÈGLES SÉDATIFS UTÉRO-OVARIENS

Æsculase.
 Agomensine Ciba.
 Aigue d'Or.
 Algocratine.
 Algor.
 Algoséline.
 Ampoules de Spasmalgine Roche.
 Androstine Ciba.
 Antélobine.
 Antidouleur Barbessou.
 Aphloïne Trouette-Perret.
 Artério-veinine.
 Asciatine.
 Basedowine.
 Benzylol.
 Biopausine.
 Cachets du D^r Boveil.
 Calmant Meunier.
 Calmosuppos sédatifs.
 Cantéine Bouteille.
 Capsules Joret et Homolle.
 Catéményl.
 Causyth.
 Cérébrine Fournier.
 Chloral bromuré du D^r Du-bois.
 Cibalgine.
 Crédone.
 Cuprémone simple et R.

Curatine Brunet.
 Curogène.
 Cyproveinol.
 Demalgon.
 Dioséine Prunier.
 Dragées ferro-ergotées Mannet.
 Elixir ferro-ergoté Mannet.
 Endo-Ovarine.
 Endothymusine.
 Eugynol Grandval.
 Féminadène.
 Ferovarine Vitalis.
 Férydal.
 Florhépatine.
 Fluérase.
 Fluxine (gouttes).
 Follestrine Grémy.
 Follicormone buccale Hinglais.
 Folliculine Choay.
 Folliculine Crinex.
 Folliculine Roussel.
 Follilobine du D^r Frayssé.
 Gmet (extraits).
 Grains céphalgifuges.
 Gynocalcion.
 Gynœstryl.
 Hamamélis Gmet.
 Hamamélis Grandval.

III. - APPAREIL GÉNITO-URINAIRE. T. G.

RÉGULATEURS DES RÈGLES — SÉDATIFS UTÉRO-OVARIENS

| | |
|--|----------------------------|
| Hémagène Tailleur. | Oxydovarine Paris. |
| Hémaxol. | Paradol. |
| Hémoductyl. | Phlébos. |
| Hémoluol. | Phytomensyl. |
| Hémopausine. | Pilules héléniennes. |
| Hémophiline Planche. | Pyréthane. |
| Hémorroïdine gouttes. | Québralgine Fouché. |
| Hémosamine. | Rénovol. |
| Hirudinase. | Sanaféine. |
| Holovarine. | Sanédrine. |
| Hormovarine Byla. | Sédofoline. |
| Hormuclases. | Sérogyné. |
| Hova (tablettes). | Sistex. |
| Indhaméline Lejeune pluri- glandulaire. | Sistomensine Ciba. |
| Indhaméline Lejeunesimple. | Spasmalgine Roche. |
| Indoberbérine. | Spasmalone. |
| Inogyl. | Spasmoneurol. |
| Irénine Gonnon. | Stopral. |
| Jouvamélys. | Suppoalgos. |
| Kalmigraine. | Suppo-gynals. |
| Lutéovar. | Suppositoires au Nestosyl. |
| Magnogène. | Surparine. |
| Ménatol. | Syntropan Roche. |
| Ménosédine. | Tablettes Zéva. |
| Mensuosédyl. | Térozone. |
| Mictasol. | Thyrocréine Grémy. |
| Néalgyl Bottu. | Toniveinine. |
| Néospasmodyl. | Triglandine. |
| Neurovarol. | Utersan. |
| Ocréine Grémy. | Valovarine. |
| Œstrobrol. | Valovosan. |
| Oléthyle benzyle. | Veinalgol. |
| Ovaire Fournier. | Veinogène. |
| Ovaire Iscovesco. | Veinopausine. |
| Ovules Chaumel. | Veinosine. |
| Ovules Intima. | Veralgine. |
| | Viscovéine. |

III. - APPAREIL GÉNITO-URINAIRE. T. S.

ALBUMINURIE — AZOTÉMIE — URÉMIE — ANURIE

Voir aussi :

Diététique.

Diurétiques.

Tonicardiaques.

Albuol Leisyn.

Benzobromine.

Benzoiodhydrique.

Blocs Vécór.

Cachets Spévin.

Cafédrine.

Calcional.

Calcisthénine.

Calcium Francalcion.

Calcium Sandoz.

III. - APPAREIL GÉNITO-URINAIRE. T. S.

ALBUMINURIE — AZOTÉMIE — URÉMIE — ANURIE

Calcivitam.
 Canol.
 Cardiosthénine.
 Chlorical.
 Chlorocalcion.
 Chophytol Rosa.
 Chophytol Rosa injectable.
 Cynurol Rosa.
 Dépuriode du D^r Roger Weber.
 Diuréphédrine.
 Diurétique Gmet.
 Diurobromine.
 Diurocalcine Gros.
 Diurocardine.
 Dragécalcion.
 Euchol Morellet.
 Eupnine Vernade.
 Fluobyl.
 Francalcion.
 Gravural.
 Gui Byla.
 Gui Gmet.
 Guipsine.
 Guitose.
 Hépalomel Védé.
 Hormantoxone.
 Inorénol.
 Lacto sérum Lavril.
 Lancéryl.
 Lichénose Ducloy.
 Lugocalcion.
 Néphryl.
 Neptal.
 Organicalcion simple.

Orthogénol.
 Pancalcion.
 Paradol.
 Pepto-Kola Robin.
 Plasmocalcium.
 Pneumogéine Renard.
 Poudre Danica.
 Quinuryl.
 Rénion Vincardi.
 Santhéose.
 Scillarène Sandoz.
 Sclérosérum.
 Sels de lithine efferves-
 cents.
 Silicyl.
 Solurol.
 Tapo.
 Técarine.
 Théisine Dubat.
 Théobromine Invar.
 Théobromose Dumesnil.
 Théobryl Roche.
 Théocalcium.
 Théosalvose.
 Théovadyl.
 Théoverine Laleuf.
 Théoxanthine.
 Trinitrine papavérine La-
 leuf.
 Uribiline.
 Urol.
 Urométhyl.
 Urozéa.
 Viscum Zyma.

ALLAITEMENT — CREVASSES DU SEIN

Voir aussi :

Analgésiques internes.
Analgésiques locaux.
*Antiseptiques externes pom-
 mades.*
Cataplasmes.
Diététique.
Galactogènes.
Laxatifs.
Opothérapie.
Produits vitaminés.
Toniques.

Adrénocalcine.
 Antiphlogistine.

Arcica.
 Baume Delacour.
 Baume de la Maternité.
 Baume du D^r Baissade.
 Baume Robernard.
 Biotrigon.
 Borostyrol Schlatter.
 Calci-sténine.
 Calcium Francalcion.
 Calcium Sandoz.
 Calcivitam.
 Calcoléol.
 Caséone Fabre.
 Céréossine Dehaussy.
 Colloïdogénine du D^r Bayle.

III. - APPAREIL GÉNITO-URINAIRE. T. S.

ALLAITEMENT — CREVASSES DU SEIN

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Chlorical. | Mancobène. |
| Chlorocalcion. | Méta-titane. |
| Crescol Buisson. | Minergil. |
| Dermoduleis. | Minervol. |
| Diadermine. | Morisland. |
| Diamine. | Nucléigène. |
| Dragécalcion. | Nuphos. |
| Eczémacrème Boissy. | Nutromalt. |
| Ektogan. | Onction Leisyn. |
| Ergorone. | Opocalcium du D ^r Guer- |
| Erythéma. | sant. |
| Extrait de malt français | Opocalcium irradié du D ^r |
| Déjardin. | Guersant. |
| Fénucalcium. | Opocobalt. |
| Fénucine. | Opodermine. |
| Fénugrène. | Opothérapies. |
| Férydal. | Organocalcion simple et |
| Fixase. | endocrinien. |
| Fixase irradiée. | Ostéogène. |
| Flétase. | Pancalcion. |
| Fluoganèse. | Pangermine. |
| Fosfoxyl Carron. | Percainal Ciba. |
| Francalcion. | Percalcine. |
| Gaduamine. | Phosphates du D ^r Pinard. |
| Galactogil. | Phosphate vital de Jacques- |
| Gastrhéma. | maire. |
| Gaurol. | Phosphofluor Beynet. |
| Génosthéniques (gouttes). | Phosphonine Soulié. |
| Glandocalcine. | Phytine Ciba. |
| Glycérophosphate Dalloz. | Phytogyl. |
| Glycérophosphate Robin. | Phytosplénol Plé. |
| Glyctone phosphatée Char- | Plasmocalcium. |
| rière. | Pommade au Nestosyl. |
| Granulé Cabasson. | Pommade Logeais. |
| Hémofer. | Pommade Noelline. |
| Hémoglobine Deschiens. | Prodynase. |
| Hémostérine. | Pyo-amphogel Ronchèse. |
| Holos. | Quina Baron. |
| Holovarine. | Rhagadine Bracquemond. |
| Inotyol. | Rozoderme. |
| Iodex. | Sénophile. |
| Lactagol. | Sérobiol. |
| Limol Churchill. | Sérogyne. |
| Liposplénine. | Splénomanganol. |
| Lugocalcion. | Stérogyl. |
| Lynévol. | Sthénoxal. |
| Malt Ethel. | Sur-bi-cal. |
| Malt français Déjardin (Ex- | Tégéol. |
| trait de). | Terpoxyl externe. |
| Maltea Moser. | Tonicardine Gonnon. |
| Malt pailleté. | Tonique Gonnon. |

III. - APPAREIL GÉNITO-URINAIRE. T. S.

ALLAITEMENT — CREVASSES DU SEIN

Tricalcine.
 Ultravitamine 4.
 Uvéphorine.
 Uvestérol.
 Valovarine.
 Végéphos.
 Vigostérol.
 Vin de Baudon.

Vin de Vial.
 Virmonal Piam.
 Vitamine Cortial.
 Vitaminol.
 Vitène.
 Vivoléol.
 Zomine.
 Zymatine irradiée.

BLENNORRAGIE — URÉTHRITES — ORCHITES

Voir aussi :

Analgésiques internes.
Antiseptiques externes sa-
von, ovules, crayons.
Antiseptiques urinaires
externes.
Balsamiques.
Diététique.
Instrumentation.
Sérums Vaccins.

Absuric.
 Acatar.
 Aïroglyce.
 Anexol.
 Aniodol.
 Antiphlogistine.
 Antiptol.
 Argycuprol.
 Arhéol.
 Bacté ricyl.
 Baldisédan.
 Baume Adol.
 Baume Aroma.
 Baume Lartigol.
 Bensamine.
 Blennopiat.
 Blennosine Fornet.
 Buccurol.
 Bucmine.
 Comprimés Guillaumin.
 Comprimés vaginaux Leisyn.
 Cryptargol Lumière.
 Cynurol Rosa.
 Dismine Favrot.
 Diurocystine.
 Donagol.
 Electrargol.
 Elgine Julien.
 Eumictine.
 Evine.

Favurol.
 Fokiényl.
 Gonacrine.
 Gonagone.
 Gono Vaclydun.
 Gynarsol.
 Gynéco Vaclydun.
 Hermophényl Lumière.
 Héxorène.
 Héxotal.
 Institut Pasteur Vaccins.
 Iodex.
 Ivago de Goldenberg vac-
 cin « G ».
 Kaviase.
 Lysaxins.
 Métaformine.
 Microlyse.
 Mictasol.
 Mictophile Richer.
 Mictoseptol.
 Mictualine.
 Néo Dmégon.
 Néo Tannurgyl.
 Oléovules.
 Onguent Fréval.
 Osmo-Vaccin Bréant.
 Ovules au Nestosyl.
 Ovules Roche.
 Paradol.
 Pelviformine.
 Phaguryl.
 Pilules V. E. Doumer.
 Préventyl.
 Progone.
 Prostatols Beauxis
 Lagrave.
 Rectagine.
 Réthragine.
 Rhéantine Lumière.
 Salantale.

III. - APPAREIL GÉNITO-URINAIRE. T. S.

BLENNORRAGIE — URÉTHRITES — ORCHITES

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Salvatyl. | Urosan Dufayard. |
| Santal Midy. | Vaccin Demonchy. |
| Santal Monal. | Vaccinothérapie atoxique |
| Séphydine. | Cépède. |
| Sérelbé du Dr Blaizot. | Vaccins atoxiques stabi- |
| Solution huileuse au Nes- | lisés. |
| tosyl. | Vaccins bactériens I. O. D. |
| Sulfarsénol. | Vaccins Bruschettini. |
| Térozone. | Vaccins Clin. |
| Terpoxyl externe. | Vaccins intradermiques et |
| Ur Clar. | Gelées vaccins Ivago de |
| Uriclarine. | L. Goldenberg. |
| Urisanine. | Vaccins Virultra. |
| Urobuccol Malmanche. | Vaclydun. |
| Uroformine Gobey. | Vitargyl. |
| Urométhyl. | Yptor. |
| Urométine Lambiotte. | Zymbil. |
| Urosalyl. - Urosalyl Méthylé. | |

CHANCRE MOU

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Voir aussi : | Dmelcos. |
| Antiseptiques externes pou- | Nithium Bulsson. |
| dres. | Séphydine. |
| Antiseptiques urinaires | Vioforme Ciba (et ovules au |
| externes. | Vioforme). |
| Sérums Vaccins. | |

CYSTITES — PROSTATITES — PROSTATISME

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Voir aussi : | Baldisédan. |
| Analgésiques externes. | Bensamine. |
| Analgésiques internes. | Benzocarbine. |
| Antiseptiques urinaires | Bilivaccin anticolibacillaire. |
| externes. | Binoxol. |
| Antiseptiques urinaires in- | Biolactyl Fournier. |
| ternes. | Blennopiat. |
| Antispasmodiques. | Blennosine Fornet. |
| Instrumentation. | Buccurol. |
| Sérums Vaccins. | Bucmine. |
| Absuric. | Calmant Meunier. |
| Acatar. | Calmo-suppos Sédatifs. |
| Adrépatine. | Canol. |
| Aïroglyce. | Caparlem. |
| Ampho-vaccins Ronchèse. | Capsules Haarlem Bardet. |
| Anexol. | Catalyl Mg. |
| Aniodol. | Chlormagnésium. |
| Anthracalcine. | Chloromagnésion. |
| Anusol Mialhe. | Colitique. |
| Arhéol. | Comprimés Guillaumin. |
| Bacté-phages. | Cryptargol Lumière. |
| | Cynurol Rosa. |

III - APPAREIL GÉNITO-URINAIRE. T. S.

CYSTITES — PROSTATITES — PROSTATISME

| | | |
|--------------------------|-----------|----------------------------|
| Cyproveinol. | | Néo-collargol. |
| Cyto-magnésium | Oliviero. | Néo-Dmégon. |
| Dismine Favrot. | | Oléthyle-Benzyle. |
| Diurocystine. | | Orthogénol. |
| Elatine Bouin. | | Osmo-vaccin Bréant. |
| Electrargol. | | Paradol. |
| Elgine Julien. | | Pelviiformine. |
| Entéroantigènes. | | Perquinol. |
| Entérofagos. | | Phaguryl. |
| Entéroformine. | | Pilules V. E. Doumer. |
| Ephédrampoules Béral. | | Pneumo-lipase. |
| Eumictine. | | Pommade Logeais. |
| Extrait Hamyd. | | Progone. |
| Flavurool. | | Prostaphile Leisyn. |
| Fokiényl. | | Prostatols Beauxis La- |
| Formocarbène. | | grave. |
| Formocitrine. | | Pyri Pyridium. |
| Glyco-thymoline. | | Pyurool. |
| Goménoléos. | | Rectagine. |
| Gonagone. | | Rectopanbiline. |
| Gono Vaclydun. | | Réthragine. |
| Gravural. | | Santal Midy. |
| Guipsine. | | Santal Monal. |
| Guitose. | | Sérelbé du Dr Blaizot. |
| Gynéco Vaclydun. | | Solurol. |
| Hamamélis Gmet. | | Solution hulleuse au Nes- |
| Hamamélis Grandval. | | tosyl. |
| Hémostatique Coudert. | | Solvuric. |
| Hémypnal Ciba. | | Spasmoryl. |
| Hermophényl Lumière. | | Suppo-gynals. |
| Héxorcène. | | Suppositoires Logeais. |
| Héxotal. | | Suppositoires au Nestosyl. |
| Immunizols Grémy. | | Surparine. |
| Ivago de Goldenberg Vac- | | Syntropan Roche. |
| cin « U ». | | Térozone. |
| Ivago-colî buvable. | | Terpine Gonnon. |
| Juranol. | | Terpine granulée Baron. |
| Kalmigraine. | | Tot Hamélis. |
| Kaviase. | | Triseptine. |
| Kodos. | | Uralysol. |
| Lysaxins L. M. L. | | Uraseptine Rogier. |
| Magnésium Hardy. | | Ur Clar. |
| Magnéso tubes Robinet. | | Uréol Chanteaud. |
| Magnogène. | | Uribiline. |
| Mésolithine Rhemda. | | Uriclarine. |
| Métacarbène. | | Urisalyl. |
| Métaformine. | | Urobuccol Malmanche. |
| Microlysine. | | Ultraformine. |
| Mictasol. | | Uroflux. |
| Mictophile Richer. | | Uroformine Gobey. |
| Mictoseptol. | | Urol. |
| Mictualine. | | Urométhyl. |

III. - APPAREIL GÉNITO-URINAIRE. T. S.

CYSTITES — PROSTATITES — PROSTATISME

Urométine Lambiotte.
Uromil.
Urophile.
Urosalyl. — Urosalyl méthylé.
Urosan Dufayard.
Uvargol.
Vaccins Bruschetti.

Vaccins Ronchèse (ampho-vaccins).
Vaccins intradermiques et Gelées Vaccins Ivago de L. Goldenberg.
Vacciphages.
Vacydun.
Zymbil.

FIBROMES

Voir aussi :

Analgésiques.
Antiseptiques externes.
Hémostatiques.
Instrumentation.
Tumeurs.

Anéo Leisyn.
Backérine.
Bain Carré.
C 40.
Ergotine Lamante.
Evine.
Extrait Hamyd.
Fluxine (gouttes).
Gloxines.
Gynergène Sandoz.
Hamamélis Gmet.
Hamamélis Grandval.

Hémaxol.
Hémocalciopectine.
Hémostatique Coudert.
Hémostatique Goy.
Hémostyl.
Hydrastine Houdé.
Hydrastis Gmet.
Néolyse et Néolyse radioactive.
Orthogénol.
Oxydothyridine Paris.
Péricols du Dr Legros.
Plombyl.
Sérum Oliviero.
Thorix (Thorium X Rhemda).
Tot'Hamélis.
Utersan.

GROSSESSE — ACCOUCHEMENT AVORTEMENT

Voir aussi :

Antiémétiques.
Antiseptiques externes comprimés.
Antiseptiques externes liquides.
Antiseptiques gynécologiques.
Diététique.
Instrumentation.
Laxatifs.
Produits vitaminés.

Adrénocalcine.
Ampho-vaccin Ronchèse.
Amoules de Spasalgine Roche.
Aminine.
Anexol.

Aniodol.
Antipiol.
Antivirul.
Arcica.
Arhémapectine.
Aristargol.
Arsécrinol.
Aseptone.
Bacté-ricyl.
Belhémine.
Biotrigrin.
Boricine Meissonnier.
Calcigénol Pinard.
Calciline.
Calcisthénine.
Calcium Francalcion.
Calcium Sandoz.
Calcivitam.
Calcoléol.

III. - APPAREIL GÉNITO-URINAIRE. T. S.

GROSSESSE — ACCOUCHEMENTS AVORTEMENTS

| | |
|--|--|
| Calmosuppos sédatifs. | Hémostatique Coudert. |
| Céréossine Dehaussy simple. | Hémostatique Goy. |
| Céréossine irradiée. | Hémostérine irradiée. |
| Chloraseptine Optima. | Hémypnal Ciba. |
| Chlorical. | Holos. |
| Chlorocalcion. | Holovarine. |
| Clonazone Daufresne. | Indoberbérine. |
| Colpophile. | Ivago coli buvable. |
| Colloïdogénine du D ^r Bayle. | Lactosmose. |
| Comprimés Guillaumin. | Laurénol médicinal. |
| Curogène. | Leucolyse. |
| Dragécalcion. | Lichénose Ducloy. |
| Dragées ferro-ergotées Mannet. | Liposplénine du D ^r Groc. |
| Ektogan Bocquillon. | Lugocalcion. |
| Electrargol. | Lusoforme. |
| Elixir Ducro. | Mancobène. |
| Elixir du D ^r Mialhe. | Mésoforme. |
| Elixir ferro-ergoté Mannet. | Métavaccin. |
| Ergorone. | Mictasol. |
| Ergotine Lamante. | Minergine. |
| Evine. | Morisland. |
| Fénucalcium. | Mycidol Badel. |
| Fénucine. | Natrosyl. |
| Férydal. | Nucléigène. |
| Fixase. | Nuphos. |
| Fixase irradiée. | Œnophos. |
| Flétase. | Opocalcium du D ^r Guersant. |
| Fluoganèse. | Opocalcium irradié du D ^r Guersant. |
| Fosfoxyll Carron. | Opocobalt. |
| Francalcion. | Organi-calcion simple et endocrinien. |
| Gastrhéma. | Ostéogène. |
| Gaurol. | Ovules au Terpoxyl. |
| Génosthéniques (gouttes). | Ovules Inséva. |
| Glandocalcine. | Pancalcion. |
| Globexine. | Pangermine. |
| Glycéro-phosphate Dalloz. | Pelviformine. |
| Glycéro-phosphate Robin. | Percalcine. |
| Glyco-thymoline. | Péricols. |
| Glyctone phosphatée Charrière. | Phosphates du D ^r Pinard. |
| Granulé Cabasson. | Phosphate total de Jacquemaire. |
| Gynergène Sandoz. | Phospho fluor Beynet. |
| Hamamélis Gmet. | Phosphonine Soulié. |
| Hémagène Tailleur. | Phylla Dyn. |
| Hémofer. | Physocrisine. |
| Hémoglobine Deschiens. | Phytine Ciba. |
| Hémopectal. | Phytogyl. |
| Hémo plasmine du D ^r Morelli. | Phyto lécithine. |
| Hémosamine | Phytosplénol Plé. |

III. - APPAREIL GÉNITO-URINAIRE. T. S.

GROSSESSE — ACCOUCHEMENTS AVORTEMENTS

Pituitobline Byla.
Plasma de Quinton.
Plasmocalcium.
Polyminéral Fort.
Post hypophyse Choay.
Produits Maïas.
Prodynase.
Pyréthane.
Quina Baron.
Rectopaniline.
Salubrine Phénix.
Sécacornine Roche.
Sédol
Séphydine.
Sérobiol.
Sérogyné.
Sérum Clin.
Spasmalgine Roche.
Spasmalone.
Splénomanganol.
Spyrolides.
Stérogyl.
Sthénoxal.
Stillargol.
Suppositoires au Nestosyl.
Sur-bi-cal.
Tensédine.

Tensol Laurençon.
Térébine.
Térozone.
Terpoxyl externe.
Tonique Gonnon.
Tricalcine.
Utersan.
Uvéphorine.
Uvestérol.
Vaccin Ronchèse Ampho-
Vaccin.
Vagosédine.
Valovarine.
Végéphos.
Vin de Gonnon.
Vin de Vial.
Viosten.
Virmonal Plam.
Vitamine Cortial.
Vitaminol.
Vitastérol.
Vitène.
Vitergomine.
Vivoléol.
Zomine.
Zymatine irradiée.

IMPUISSANCE — SPERMATORRHÉE

Voir aussi :

Opothérapie.
Toniques.

Alexime.
Ampolases.
Androcalcion H.
Androstine Ciba.
Cérébroil Leisyn.
Cérébro-lipase.
Dragées Yse.
Eufosyl Vély.
Ferandrine Vitalis.
Fosfoxyl Carron.
Fosyls Carron.
Glandimbine Lafran.
Granulé Cabasson.
Granules Chanteaud.
Granules de Pantofort du
D^r Boveil.
Hémoviris.
Néo-Tannurgyl.
Neuropol.

Nuphos.
Oenophos.
Opothérapies.
Orex.
Phosoforme.
Phospharsol.
Phosphonine Soullé.
Recrésal.
Sécacornine Roche.
Sérobiol.
Sérodausse antitoxisényl.
Sérogyné.
Stimyl.
Strychnal Longuet.
Tannurgyl.
Triglandol.
Vagoriane.
Valovosan.
Viradène.
Virmonal Plam.
Yo-Androl.
Yohimbine Vicario.

III. - APPAREIL GÉNITO-URINAIRE. T. S.

INCONTINENCE D'URINE

Voir aussi :

Antispasmodiques.
Modificateurs du sympathique.

Anurique Dupleix (incontinence infantile).

Benzylol.

Borosodine Lumière.

Cyto-sirop.

Dragées ferro - ergotées Mannet.

Elixir ferro - ergoté Mannet.

Ephédromel.

Epical.

Ergotine Lamante.

Fosfoxyll Carron.

Granulé Cabasson.

Mictasol.

Nuphos.

Pelviiformine.

Phosoformine.

Phosphonine Soulié.

Plasma de Quinton.

Rangol.

Recrésal.

Sécacornine Roche.

Sérobiol.

Sirop Lecœur.

Strychnotonine.

Vagosédyl.

Virmonal Piam.

INFECTION PUERPÉRALE

Voir aussi :

Antipyrétiques.

Antiseptiques gynécologiques.

Antiseptiques internes.

Bactériophages.

Bactériothérapie. Ferments lactiques.

Chimiothérapie.

Sérums Vaccins.

Toni-cardiaques.

Ampho-vaccins Ronchèse.

Aniodol.

Antigénines.

Arsénobenzènes Clin.

Eucalyptine Lebrun.

Goménoléos.

Granions (Les).

Inosepta.

Liposeptine.

Métaux colloïdaux A. Lancien.

Néo-physio.

Nucléatol.

Oléobyl.

Physiosthénine.

Produits Malas.

Protiodyré.

Pyoformine.

Quinquina Gmet.

Sephydine.

Septicémine Cortial.

Sérum Clin.

Solucamphre Delalande.

Sulfarsénol.

Térozone.

Terpoxyl interne.

Ultraformine.

Utérostreptine.

Vaccinothérapie atoxique Cépède.

Vaccins Bruschettini.

Vaccins bactériens I. O. D.

Vaccins Virultra.

Vaccins Ronchèse Ampho-vaccins.

Vaclydun. — Staphylo Vaclydun.

Zymbil.

III. - APPAREIL GÉNITO-URINAIRE. T. S.

INSUFFISANCE RÉNALE NÉPHRITES CHRONIQUES NÉPHRITES AIGÜES

Voir aussi :

Diététique.
Diurétiques.
Opothérapie.
Toni-cardiaques.

Absuric.
Acatar.
Adoverne.
Agozymase.
Albuol Leisyn.
Alliocardia.
Anthracalcine.
Antonal.
Benzo-Iodhydrique.
Cachets Spévin.
Cafédrine.
Calci-Sténine.
Calcium Francalcion.
Calcium Sandoz.
Calcivitam.
Canol.
Chlorical.
Chloro-Calcion
Citralin.
Cynurol Rosa.
Dépuriode du D^r Roger
Weber.
Détensyl.
Diurène.
Diurétique Gmet.
Diurobromine.
Diurocalcine Gros.
Diurocardine.
Dragécalcion.
Entérofagos.
Euglyma.
Eutensyl Grémy.
Fluobyl.
Francalcion.
Gastéosc.
Gouttes Fluvia.
Gravural.
Gultose.
Gui Byla.
Gui Gmet.

Guipsine.
Inorenol.
Iodaubépine.
Lacto-sérum Lavril.
Lancéryl.
Lugocalcion.
Mictasol.
Néphryl.
Normatensol Bouret.
Orthogénol.
Pancalcion.
Paradol.
Pelviformine.
Plasmocalcium.
Pneumogéine Renard.
Poudre Danica.
Pyurol.
Rénion Vincardi.
Santal Midy.
Santal Monal.
Scillarène Sandoz.
Sclérosérol.
Silguine.
Silicyl.
Soluro.
Técarine.
Théisine Dubat.
Théobromine Invar.
Théobromose Dumesnil.
Théobryl Roche.
Théocalciodé.
Théosalvose.
Théovadyl.
Théovérine Laleuf.
Théoxanthine.
Tonicardine Gonnon.
Uribiline.
Triseptine.
Urisanine.
Urol.
Urométhyl.
Uromil.
Uroquinol.
Urosalyl. — Urosalyl mé-
thylé.
Zimbyl

III. - APPAREIL GÉNITO-URINAIRE. T. S.

LITHIASÉ RÉNALE COLIQUES NÉPHRÉTIQUES

Voir aussi :

Analgésiques externes.
Analgésiques internes.
Anesthésiques locaux.
Antiseptiques internes.
Diététique.
Dissolvants uriques.
Opothérapie.

Absuric.
Aigue d'or.
Algosédine.
Ampoules de Pantopon Roche.
Ampoules de Spasmalgine Roche.
Anthrseptol.
Antispasmyl.
Anti-urique de Contrexéville.
Bensamine.
Benzylol.
Billogastrine Chevillon.
Boldoine Eparvier
Buccurol.
Canol.
Caparlem.
Capsules Haarlem Bardet.
Capsules Bruel.
Cholagol.
Cibalgine.
Crypthiol.
Cynürol Rosa.
Dialyl.
Diasclérol.
Dismine Favrot.
Elatine Bouin.
Elgine Julien.
Euphysol.
Florhépatine.
Formocitrine.
Génomorphine.
Gravural.
Hémostatique Coudert.
Hémostatique Goy.
Hexotal.
Kodos.
Lysarthrol.
Mésothine Rhemda.
Métaformine.
Microlyse.

Mictoseptol.
Morpheroïnn Leisyn.
Oléthyle Benzyle.
Papavéryl.
Paradol.
Pipérazine Midy.
Pipérazyl.
Potion Adol.
Pyrélaïne Collas.
Pyréthane.
Pýurol.
Rhodazil.
Salsanos.
Sanoquinol.
Santal Midy.
Santal Monal.
Sédol.
Sédopavérine.
Sel hépatique U. N. Arquevaux.
Sels de Lithine effervescents.
Sirops Henry Mure.
Sodothiol.
Solurol.
Solvuric.
Spasmalgine Roche.
Spasmoryl.
Spicanol.
Suppoalgos.
Suppositoires au Nestosyl.
Surparine.
Syntropan Roche.
Théosalvose.
Théoxanthine.
Tillane.
Triseptine.
Uralysol.
Uraseptine Rogier.
Urazine.
Uréol Chanteaud.
Uribiline.
Uriclarine.
Urisuine.
Urisanine.
Urobuccol Malmanche.
Uroclase.
Uroflux.
Uroformine Gobey.
Uroïodine.
Urométhyl.

III. - APPAREIL GÉNITO-URINAIRE. T. G.

LITHIASÉ RÉNALE COLIQUES NÉPHRÉTIQUES

Urométine Lambiotte.
Uromil.
Urophyle.
Uroquinol.
Urosalyl.

Urosalyl méthylé.
Urosan Dufayard.
Urozea.
Véralgine.

PUBERTÉ — MENSTRUATION — MÉNOPAUSE

Voir aussi :

Analgésiques externes.
Anémie.
Antispasmodiques.
Décongestifs pelviens.
Hémostatiques utérins.
Hypertension.
Instrumentation.
Laxatifs.
Opothérapie.
Régulateurs des règles.
Sédatifs.

Agomensine Ciba.
Aigue d'or.
Algocratine.
Algor.
Algosédine.
Amphotonyl.
Ampoules Bolssy d'Iodure
de potassium.
Ampoules de Spasmalgine
Roche.
Androstine Ciba.
Androsthénol.
Antélobine.
Antidouleur Barbessou.
Antonol.
Aphloïne Trouette-Perret.
Arhémapectine Gallier.
Artérase.
Artério-Vélnine.
Asciatine.
Balnéradol.
Basedowine.
Benzylol.
Bionéol.
Biopausine.
Bursol.
Calmant Meunier.
Calmosuppos sédatifs.
Calsédine.
Cantéine Bouteille.
Capsules Joret et Homolle

Cateményl.
Causyth.
Cérébrine Fournier.
Chloral bromuré du D^r Du-
bois.
Cibalgine.
Clisémine Longuet.
Coagulène Ciba.
Cratægus Gmet.
Credone Dehaussy.
Cuprémonne simple et « F »
Curatine Brunet.
Curogène.
Cyproveinol.
Détensyl.
Dioséine Prunier.
Do-Sa-No-Sal.
Dragées ferro - ergotées
Mannet.
Endo-ovarina.
Endopancrine.
Endothymusine.
Entéro-antigènes.
Ephédrine Houdé.
Ergotine Lamante.
Eugynol Grandval.
Euphytose.
Extrait Hamyd.
Extrait de malt français
Déjardin.
Féminadène.
Ferandrine Vitalis.
Fer ovarine Vitalis.
Florhépatine.
Fluérase.
Fluveinose Mauchant.
Fluxine (gouttes).
Folestrine Grémy.
Follicormone buccale Hin-
glais.
Folliculine Choay.
Folliculine Crinex.
Folliculine Roussel.
Follilobine.

III. - APPAREIL GÉNITO-URINAIRE. T. S.

PUBERTÉ — MENSTRUATION — MÉNOPAUSE

Fosfoxyl Carron.
 Freinix.
 Freinospasmyl.
 Gerol Testart.
 Glycocarpine.
 Gmet (extraits).
 Gouttes de Serû.
 Gouttes Nican.
 Grains céphalgifuges.
 Granulé Cabasson.
 Gui Byla.
 Gui Gmet.
 Guipsine.
 Guitose.
 Gynocalcion.
 Gynœstryl.
 Hamaméline Roya.
 Hamamélis Gmet.
 Hamamélis Grandval.
 Hémagène Tailleur.
 Hémaxol.
 Hémocalcine.
 Hémocalciopectine.
 Hémoductyl.
 Hémoduol.
 Hémopausine.
 Hémio-Phagostyl.
 Hémophiline-Planche.
 Hémorrhoidine gouttes.
 Hémosamine.
 Hémostatique Coudert.
 Hémostatique Goy.
 Hémovéine.
 Hexaranol.
 Hirudinase.
 Holovarine.
 Hormovarine Byla.
 Hormuclases.
 Hova (tablettes).
 Hydrastine Houdé.
 Hydrastis Gmet.
 Indhaméline Lejeune simple.
 Inogyl.
 Iodamélis Logeais.
 Irénine Gonnon.
 Jouvamélys.
 Kalmigraine.
 Lachésine.
 Lugocalcion.
 Luteovar.
 Magnésium Hardy.

Magnésio-tubes Robinet.
 Magol Churchill.
 Mangratines.
 Ménatol.
 Ménosédine.
 Mensuosédyl.
 Mictasol.
 Néalgyl Bottu.
 Néospasmodyl.
 Nésal.
 Neurovarol.
 Ocréine Grémy.
 Œstrobol.
 Oléthyle Benzyle.
 Opoferine Vitaminée.
 Orex.
 Orthogénol.
 Ovaire Fournier.
 Ovaire Iscovesco.
 Ovules Chaumel.
 Ovules au Nestosyl.
 Ovules au Terpoxyl.
 Oxydovarine Paris.
 Ozothine.
 Panglandine Couturieux.
 Papavéryl.
 Paradol.
 Paxène.
 Pelviformine.
 Perofreinix.
 Phlébos.
 Phosoforme.
 Phosphobrom.
 Phosphonine Soulié.
 Phyto-Lécithine.
 Phytomensil.
 Plasmosthène.
 Protonic.
 Proveinase Midy.
 Pulsamone.
 Pyréthane.
 Québralgine Fouché.
 Recresal.
 Rénovol.
 Rhodazil.
 Sanaféine.
 Sanédrine.
 Sécacornine Roche.
 Sédofoline.
 Sénecol.
 Sérobiol.
 Sérodausse ovarien.

III. - APPAREIL GÉNITO-URINAIRE. T. S.

PUBERTÉ — MENSTRUATION — MÉNOPAUSE

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Sérogène. | Tot-Hamélls. |
| Sistex. | Triglandine. |
| Sistomensine Clba. | Triglandol. |
| Spasmalgine Roche. | Vagoriane. |
| Spasmalone. | Vagosédyl. |
| Spasmine Jolly. | Valériane Byla. |
| Spasmoneurol. | Valovarine. |
| Spicanol. | Valovosan. |
| Stimyl. | Variphile. |
| Stopral. | Vascurol. |
| Sulfarsiode. | Vaso-Neurine. |
| Suppoalgos. | Veinalgol. |
| Strychnotonine. | Veinogène. |
| Suppo-Gynals. | Veinopausine. |
| Suppositoires au Nestosyl. | Veinosérum. |
| Surparine. | Veinosine. |
| Sympathyl. | Veinotrope. |
| Tablettes Zéva. | Veralgine. |
| Théinol. | Viosten. |
| Thyrocréine Grémy. | Viradène. |
| Thyrénine Grémy. | Viscoveine. |
| Toniveinine. | Vitacrines. |

PYÉLONÉPHRITES

Voir aussi :

| | |
|--|------------------------------------|
| <i>Analgésiques internes.</i> | Caparlem. |
| <i>Antiseptiques urinaires internes.</i> | Capsules Haarlem Bardet. |
| <i>Bactériophages.</i> | Carbagol Marinier. |
| <i>Diététique.</i> | Colitique. |
| <i>Insuffisance rénale.</i> | Coli-Vaclydun. |
| Absuric. | Cynurol Rosa. |
| Acatar. | Dismine Favrot. |
| Ampho-vaccins Rönchèse. | Elatine Bouin. |
| Amybdine. | Elgine Julien. |
| Aniodol. | Entérofagos. |
| Anthracalcine. | Entéroformine. |
| Anthraseptol. | Entéro-pansement du D ^r |
| Antigénines. | Zizine. |
| Argion. | Entéro-Vaccin Lumière. |
| Arhéol. | Eumictine. |
| Bacté-phages. | Flavurool. |
| Baldisedan. | Fokiényl. |
| Bensamine. | Formocarbène. |
| Benzocarbène. | Formocitrine. |
| Bilivaccin anticolibacillaire. | Gravural. |
| Binoxol. | Héxorcène. |
| Bucmine. | Hexotal. |
| Canol. | Immunizols Grémy. |
| | Iodhema. |
| | Ivago-Coli buvable. |

III. - APPAREIL GÉNITO-URINAIRE. T. S.

PYÉLONÉPHRITES

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Ivago de Goldenberg vac- | Solurol. |
| cin « U ». | Solvuric. |
| Lacto-sérum Lavril. | Terpine Gonnon. |
| Levure B 17. | Terpine granulée Baron. |
| Lysaxins L. M. L. | Théocalciode. |
| Mésobine Rhemda. | Triseptine. |
| Métacarbène. | Ultraformine. |
| Métaformine. | Uraseptine Rogier. |
| Métaux colloïdaux A. Lan- | Ur-Clar. |
| cien. | Uréol Chanteaud. |
| Microlyse. | Uribiline. |
| Mictasol. | Uriclarine. |
| Mictophile Richer. | Urisanine. |
| Mictoseptol. | Urobuccol Malmanche. |
| Mictualine. | Uroformine Gobey. |
| Mucobismuthine. | Urol. |
| Osmo-vaccin Bréant. | Urométhyl. |
| Oxyléine. | Uroméline Lamblotte. |
| Paradol. | Uromil. |
| Pelviiformine. | Uroquinol. |
| Pilules V. E. Doumer. | Urosalyl. — Urosalyl mé- |
| Pneumo-Lipase. | thylé. |
| Perquinol. | Urosan Dufayard. |
| Progone. | Uvargol. |
| Pyoformine. | Vaccins Bruschettini. |
| Pyri-Pyridium. | Vaccins Ivago. |
| Pyurol. | Vaccins Ronchèse. — Am- |
| Santal Midy. | pho-vaccins. |
| Santal Monal. | Vacciphages. |
| Septicémine Cortial. | Vaclydun. |
| Sérums Cün. | Zimbyl |

VOMISSEMENTS INCOERCIBLES — ÉCLAMPSIE

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Voir aussi : | Gui Gmet. |
| <i>Antiémétisants.</i> | Guipsine. |
| <i>Antispasmodiques.</i> | Guitose. |
| <i>Dietétique.</i> | Gynoestryl. |
| Adrénaline Clin. | Insuline buccale F ornet |
| Adrénaline Sauba. | Lichénose Ducloy. |
| Adrénine. | Pandrénalline. |
| Adrénoïdes Béral. | Perparine. |
| Agomensine. | Phosphohrom. |
| Alsodine. | Plasma de Quinton. |
| Belladénal Sandoz. | Sel d'Ewald. |
| Bromiase. | Sel digestif Bé-Mé-Cé. |
| Canol. | Sérogène. |
| Cétrarose Gigon. | Somnicones Béral. |
| Cratægus Gmet. | Somnifène Roche. |
| Elixir du Dr Mialhe. | Surparine. |
| Folliculine Roussel. | Valovosan. |
| Gravidostyl. | Vin Raimoa Tonic. |
| Gui Byla. | Zymatine. |

IV. — APPAREIL RESPIRATOIRE. T. G.

ANTIDYSPNÉIQUES

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Acécoline camphre. | Frelnix. |
| Acodros. | Freinospasmyl. |
| Adoverne. | Frénasina. |
| Adrénaline Clin. | Garéphédrine. |
| Adrénaline Invar. | Génomorphine. |
| Adrénaline Sauba. | Gouttes Eryl. |
| Adrénine. | Grains d'éphédrine Béral. |
| Adrénoïdes Béral. | Humoro-stabiline. |
| Adréphédrine Béral. | Hypophédrine. |
| Alzine. | Iodéine Montagu. |
| Ampoules Boissy. | Iodosalva Evesque. |
| Ampoules de Pantopon Roche. | Képhédryl. |
| Antiasthme Bengalais. | Lobéline Bruneau. |
| Antiasthmine Dehaussy. | Lobéline Sandoz. |
| Aséphéine. | Morphéorinn Leisyn. |
| Asthmasédine. | Nasopon. |
| Asthmo-actine. | Nucléocardyl. |
| Benzoquinol. | Oliphédrol. |
| Cafédrine. | Oléophédrine Béral. |
| Capsules Kuuchner. | Pandrénaline. |
| Citrophédrine. | Papavérine. |
| Diuréphédrine. | Peptone Vassal. |
| Efryl. | Pérofreinix. |
| Elixir thiogalacolé Arquevaux. | Pneumogéine Renard. |
| Ephedrapoules Béral. | Poudre Escoufflaire. |
| Ephedrasmine. | Pulmodion. |
| Ephédrine Houdé. | Pulmodynol. |
| Ephédrinol Béral. | Rénaleptine. |
| Ephédrocamphe. | Rhino-glottyl. |
| Ephédrocure. | Rhino-pharynxoll. |
| Ephédromel Béral. | Salypsol. |
| Ephéiodine Béral. | Sérum antiasthmatique de Heckel. |
| Ephétropine Béral. | Tercodal. |
| Eupnine Vernade. | Terpoxyl interne. |
| Eupnogénol. | Théocalciode. |
| Eusomnine Bélières. | Tiodine Cognet. |
| | Valérothéine Domergue. |

ANTISEPTIQUES DES VOIES RESPIRATOIRES

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Alcamféol. | Benzoquinol. |
| Alliocardia. | Borhéol. |
| Aloysine. | Bronchodermine. |
| Amborhinol. | Bronchoseptol Lauriat. |
| Aniodol. | Cachets Kapytan. |
| Antiasthmatique Domergue. | Cachets Roche au Thiocol. |
| Azufrol. | Camphocalypsol. |
| Balmiga. | Capsules Dartois. |
| Balsamol Lescène. | Capsules Noguès. |
| | Castanol. |

IV. — APPAREIL RESPIRATOIRE. T. G.

ANTISEPTIQUES DES VOIES RESPIRATOIRES

| | |
|--|--|
| Chlorinol. | Pulmosédor. |
| Cimarsényl. | Pulmosérum. |
| Codéphryl. | Pulmositoires. |
| Codobromyl. | Pulvéol. |
| Codocol. | Purargol. |
| Comprimés Roche de Thio- col. | Résyl. |
| Créoformine. | Rhinadrol. |
| Créositoires. | Rosalyl. |
| Créosuppocampbre. | Sanex inhalant. |
| Elbon Ciba. | Sélor n° 1 et 2. |
| Elixir thiogaïacolé U. N. | Septolan. |
| Arquevaux. | Sérums Clin. |
| Emgé Lumière. | Sirop Cassibor. |
| Ethyl-Pneumine Lersam. | Sirop de créosote Vacheron. |
| Eucalyptine Lebrun. | Sirop de Gaïarsol. |
| Gaïacamphre. | Sirop de glycérophosphate Vacheron. |
| Gaïarsol. | Sirop Famel. |
| Gatercodéine Domergue. | Sirop Gribell. |
| Germose. | Sirop Mireille. |
| Goménol. | Sirop pectoral du D ^r Pyot. |
| Gouttes Daynoc. | Sirop Roche au Thiocol. |
| Gouttes Eryl. | Sirop Viano. |
| Hylol. | Solution Pautauberge. |
| Inhalation Lancosme. | Stillargol. |
| Inhalol. | Sulphydral Chanteaud. |
| Inhalo-sel. | Sulfo-thiorine. |
| Inhaloxyl. | Sulfureux Pouillet. |
| Iodex. | Sulf-Y. |
| Iodonésyl. | Sulphium. |
| Iodosalva. | Térébline. |
| Marrucol. | Térozone. |
| Murones du D ^r Robert Jacques. | Terpine Gonnon. |
| Opocalcium du D ^r Guer- sant. | Terpine granulée Baron. |
| Oxymenthol Perraudin. | Terpoxyl interne. |
| Ozothine. | Thiosote. |
| Pectine Oberlin. | Thio-terpine Dalin. |
| Perles Taphosote. | Touranol. |
| Perubore | Touranyl. |
| Phosote Lambiotte. | Tubérol. |
| Pneumostyl Daguin. | Vaccins Ronchère, (ampho- vaccins). |
| Pulmodynol. | Vaclydun. |
| Pulmofluide. | Vagosédyl. |

ANTISPASMODIQUES — SÉDATIFS DE LA TOUX

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Acobella. | Anaquinine Lescène. |
| Æthone. | Antispasmyl. |
| Amphostène. | Aquintol Petit-Mialhe. |
| Ampoules Spasmalgine Roche. | Aséphéine. |
| | Asthmasédine. |

IV. — APPAREIL RESPIRATOIRE. T. G.

ANTISPASMODIQUES — SÉDATIFS DE LA TOUX

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Asthmo-actine. | Gouttes Narkay. |
| Balsamol Lescène. | Gouttes Nican. |
| Bellafoline Sandoz. | Granulé des Vosges. |
| Benzoquinol. | Guéthural. |
| Benzyanil. | Hergénol. |
| Benzylol. | Hypophédrine. |
| Bronchodermine. | Infangyl Carlier. |
| Bronchoforme. | Iodéine Montagu. |
| Bronchoseptol Lauriat. | Iodotensyl. |
| Broncosol. | Kuchol. |
| Cachets Kapytan. | Lenadryl. |
| Cachets Roche de Thiocol. | Lucodal. |
| Cafédrine. | Marubore. |
| Camphocalyptol. | Miroxyl. |
| Capsules et sirop Préga | Narcyl. |
| Capsules Kuchner. | Néopulmine. |
| Capsules Noguès. | Oléthyle Benzyle. |
| Castanol. | Papavéryl. |
| Codéphryl. | Pâte Mireille. |
| Codérax. | Pérofreinix. |
| Codobromyl. | Phosphogalaïacol Mary. |
| Codocol. | Pilka (gouttes). |
| Codoforme. | Pilules bronchotoniques Ar- |
| Comprimés Nican. | co. |
| Comprimés Roche de Thio- | Pneumogénol. |
| col. | Primulyse. |
| Créoformine. | Pulmocardine. |
| Créositoires. | Pulmodion. |
| Créosuppocamphre. | Pulmodynol. |
| Dicodéine Lafran. | Pulmosfluide. |
| Elatine Bouin. | Pulmogrog. |
| Elbon Ciba. | Pulmosédon. |
| Elixir thiogalaïacolé Arque- | Pulmosérum. |
| vaux. | Pulmositoires. |
| Ephédromel Béral. | Pulmoverne. |
| Ephéiodine Béral. | Quinthéryl. |
| Ephétropine Béral. | Quintozone. |
| Eucalyptine Lebrun. | Résyl. |
| Eupavéryl Pachaut. | Rhinaquintine Lescène. |
| Euphon. | Rhodazil. |
| Freinix. | Rosalyl. |
| Frénasma. | Salyptol Narty. |
| Germose. | Sélor n° 1. |
| Glottyl. | Septolan. |
| Gouttes Blagny. | Sirop Brahma. |
| Gouttes bronchophiles An- | Sirop Famel. |
| dré. | Sirop de Gafarsol. |
| Gouttes Eryl. | Sirop Gribell. |
| Gouttes Leconte. | Sirop Mireille. |
| Gouttes Linober. | Sirop Noguès. |
| Gouttes Malone. | Sirop pectoral du Dr Pyot |

IV. — APPAREIL RESPIRATOIRE. T. G.

ANTISPASMODIQUES — SÉDATIFS DE LA TOUX

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Sirop Vacheron au gaiacol. | Thiosote. |
| Sirop Viano. | Thio-terpine Dalin. |
| Soderséine. | Touranol. |
| Spasmalgine Roche. | Touranyl. |
| Spasmoneural. | Tubérol. |
| Spasneurol. | Vaccins Clin. |
| Surparine. | Valériflor. |
| Tercodal. | Valérobromine Legrand. |
| Terkal Monal. | Valérothéine Domergue. |
| Thiosédal. | Valthène. |

BALSAMIQUES

| | |
|---|-------------------------------------|
| Acatar. | Pulmocardine. |
| Balsamol. | Pulmodion. |
| Blagny (gouttes et dragées). | Pulmosérum. |
| Cachets Roche de Thiocol. | Pulmositoires. |
| Capsules Dartois. | Pulmoverne. |
| Capsules Kuchner. | Résyl. |
| Capsules Noguès. | Salyptol Narty. |
| Comprimés Roche de Thiocol. | Sirop de Gaiarsol. |
| Créoformine. | Sirop de Glycérophosphate Vacheron. |
| Créosal Dubois. | Sirop Famel. |
| Créositoires. | Sirop Gribell. |
| Créo-suppo-camphre. | Sirop Mireille. |
| Elatine Bouin. | Sirop Vacheron au gaiacol. |
| Eucalyptine Lebrun. | Sulfuryl Monal. |
| Gomenol. | Sulfureux Pouillet. |
| Gouttes Eryl. | Sulf-Y. |
| Gouttes livoniennes de Trouette-Perret. | Térébine. |
| Murones du Dr Robert Jacques. | Terkal Monal. |
| Perles Taphosote. | Terpine Gonnon. |
| Phosote Lambiotte. | Thiocol Roche. |
| Phosphogaiacol Mary. | Thiosote. |
| | Thio-Terpine Dalin. |

MODIFICATEURS SÉCRÉTOIRES — EXPECTORANTS

| | |
|------------------|----------------|
| Alcamfétol. | Créositoires. |
| Algatan. | Diuréphédrine. |
| Alzine. | Glottyl. |
| Asthmasédine. | Infangyl. |
| Balsamol. | Iodosalva. |
| Bronchoseptol. | Marrubène. |
| Broncosol. | Marubore. |
| Cachets Kapytan. | Miroxyl. |
| Codéphryl. | Pulmosfluy. |
| Codocol. | Pulmosedor. |

IV. — APPAREIL RESPIRATOIRE. T. G.

MODIFICATEURS SÉCRÉTOIRES EXPECTORANTS

Pulmositoires.
Rosalyl.
Septolan.
Sirop pectoral du D^r Pyot.
Solution Pautauberge.
Sulfothiorine.

Sulfureux Pouillet.
Sulfuryl Monal.
Sulphium.
Tercodal.
Touranol.
Touranyl.

IV. — APPAREIL RESPIRATOIRE. T. S.

ADÉNOPATHIE TRACHÉO-BRONCHIQUE

Voir aussi :

Antiseptiques des voies respiratoires.

Antispasmodiques.

Diététique.

Produits vitaminés.

Sérums Vaccins.

Toniques.

Adrénargol.
Aethone.
Algane.
Algatan.
Algotérine Oliviero.
Arséniode.
Biocéane.
Biotrignon.
Bronchodermine.
Broncosol.
Camphocalyptol.
Capsules et sirop Préga.
Cinalose.
Codobromyl.
Colloïde Dubois.
Colloïdogénine du D^r Bayle.
Comprimés Nican.
Créositoires infantiles.
Curlode.
Curiode arsénié.
Cytobiase.
Cyto-manganol Corbière.
Dicaliode.
Energine iodée de Berck.
Eniode Lefebvre.
Eranol.
Ergostol Violet.
Eucalyptine Lebrun.

Fénurobur.
Flétase.
Fludiose.
Fucoglycine du D^r Gressy.
Gaduamine.
Gaduase.
Germose.
Glottyl.
Gmet (extraits).
Gouttes bronchophiles André.
Gouttes Linober.
Gouttes Malone.
Gouttes Narkay.
Gouttes Nican.
Hémagénine Giraud.
Hémato-iodine.
Huile de foie de morue médicinalement suractivée Rhône-Poulenc.
Huile iodée Finikoff.
I. A. M.
Infangyl Carlier.
Iodalose Galbrun.
Iodarsenic Guiraud ou
Gouttes Paidophiles.
Iodassium.
Iodex.
Iodocalcium.
Iodogénol Pépin.
Iodomaisine globules.
Iodométine.
Iodonésyl.
Juglanrégine André.
Lipiodol Lafay.
Lipoiodine Cib²
Liposplénine.

IV. — APPAREIL RESPIRATOIRE. T. S.

ADÉNOPATHIE TRACHÉO-BRONCHIQUE

| | |
|---|--|
| Maglodyl. | Polyiodure Gonnon. |
| Mancobène. | Pulmositoires. |
| Marimine. | Quinquina Gmet. |
| Marinol. | Résyl. |
| Micelliodé. | Rhocya Dyn. |
| Miroxyl. | Rhodine. |
| Morisland Irradié. | Salyptol Narty. |
| Morrhualène Gautier. | Sanas. |
| Morrhuétine Jungken et Morrhuétine Jungken vitaminée. | Sérum végétal du D ^r Cu- guillère. |
| Morruxine. | Sirop Brahma. |
| Morubiase | Sirop de glycérophosphates Vacheron. |
| Murones du D ^r Robert Jacques. | Sirop Gribell. |
| Narcyl. | Sirop Mireille. |
| Oléochrysine Lumière. | Sirop Tinardon. |
| Opocobalt. | Stérogyl. |
| Paniode. | Sulfarsiodé. |
| Pectine Oberlin. | Sulfureux Pouillet. |
| Pépiodon. | Tannocalcine. |
| Phosphogalocol Mary. | Triradol. |
| Phospholéose Demasles. | Tubérol. |
| Phytogyl. | Uroiodine. |
| Pilka (gouttes). | Vin Girard. |
| Plasma de Quinton. | Viosten. |
| Plasmarine. | Vitamine Cortial. |

ASTHME — ASTHME DES FOINS

Voir aussi :

| | |
|---|---|
| <i>Antidyspnéïques.</i> | Amphotonyl. |
| <i>Antiseptiques des voies res- piratoires.</i> | Ampho-vaccins Ronchèse. |
| <i>Cataplasmes. — Révulsifs.</i> | Ampoules Boissy iodure de potassium. |
| <i>Instrumentation.</i> | Ampoules de Pantopon Ro- che. |
| <i>Opothérapie.</i> | Anaclasine Ranson. |
| <i>Sérums Vaccins.</i> | Anapeptone Vassal. |
| <i>Toni-cardiaques.</i> | Anaquinine. |
| Adrénaline Clin. | Angitan. |
| Adrénaline Invar. | Antiasthme Bengalais. |
| Adrénaline Sauba. | Anti-asthme Dehaussy. |
| Adrénine. | Antispasmyl. |
| Adrénoïdes Béral. | Arséniodé Buriat. |
| Adréphédrine Béral. | Aséphéine. |
| Aethone. | Asthmo-Actine. |
| Alcamfétol. | Asthmosédine. |
| Algatan. | Azigol Thévenot. |
| Alliocardia. | Balsamol Lescène. |
| Alzine. | Belladénal Sandoz. |
| Amborhinol. | Bellafole Sandoz. |
| Amphostène. | Benzoquinol. |
| | Benzyanyl. |

IV. — APPAREIL RESPIRATOIRE. T. S.

ASTHME — ASTHME DES FOINS

- | | |
|---|---------------------------------------|
| Benzylol. | Essoforme. |
| Biophyllactine M. G. | Eupavéryl Pachaut. |
| Boldo Gmet. | Euphysol. |
| Bronchodermine. | Eupnine Vernade. |
| Bronchoforme. | Eupnogénol. |
| Broncosol. | Freinix. |
| Cachets Kapytan. | Freinospasmyl. |
| Cachets Roche de Thiocol. | Frénasma. |
| Cacodyle Gonnon. | Garéphédrine. |
| Cafédrine. | Génisténa. |
| Calcozymase. | Génomorphine. |
| Caparlem. | Germose. |
| Capsules Haarlem Bardet. | Globules Fumouze iodure de potassium. |
| Capsules Noguès. | Glycocarpine. |
| Capsules et sirop Préga. | Gouttes Blagny. |
| Carboiodure Fraudin. | Gouttes bronchophiles André. |
| Céthocal du D ^r Lemay. | Gouttes Linober. |
| Cinalose. | Gouttes Narkay. |
| Codéphryl. | Gouttes Nican. |
| Collo-iodé Dubois. | Grains d'Ephédrine Béral. |
| Comprimés Nican. | Hectine. |
| Comprimés Roche de Thiocol. | Hergénol. |
| Corizol. | Hormantoxone. |
| Créoformine. | Humoro-stabiline. |
| Créo-suppo-camphre. | Hycl. |
| Curiode. | Hypophédrine. |
| Curiode arsenié. | I. A. M. |
| Cytophédrine. | Immunizols Grémy. |
| Dépuride du D ^r Roger Weber. | Iodalose Galbrun. |
| Désensibilysine. | Iodamélis Logeais. |
| Dicaliode. | Iodassium. |
| Diuréphédrine. | Iodaubépine. |
| Dragécalcion. | Iodéine Montagu. |
| Efryl. | Iodogénol Pépin. |
| Elatine Bouin. | Iodo-Maisine globules. |
| Elixir thiogaiacolé Arquevaux. | Iodométine. |
| Eniode Lefebvre. | Iodone Robin. |
| Entéro-antigènes. | Iodonésyl. |
| Ephédrampoules Béral. | Iodonucléol. |
| Ephédrasmine. | Iodosalva Evesque. |
| Ephédrine Houdé. | Iodotensyl. |
| Ephédrisol Béral. | Iodurase. |
| Ephédrocampbre. | Iodure Pachaut. |
| Ephédrocure. | Ivago de Goldenberg Vaccin « A ». |
| Ephédromel Béral. | Jabosulfène. |
| Ephéiodine Béral. | Képhédril. |
| Ephétropine Béral. | Kluchol Reineaud. |
| Eranol. | Kodos. |
| Ergotine Lamante. | Lipiodol Lafay. |

IV. — APPAREIL RESPIRATOIRE. T. S.

ASTHME — ASTHME DES FOINS

- | | |
|--|--|
| <p> Lipoiodine Ciba. Magiodyl. Mangarsenic. Marubor. Marrucol. Métaux colloïdaux A. Lan- cien. Micelliode. Miroxyl. Morphéorinn Leisyn. Naïodine Logeais. Nasopon. Natirose. Néopancarpine. Néopulmine. Néo-Riódine. Oléophédrine Béral. Oliphédrol. Oléthyle Benzyle. Organicalcion simple. Oxymenthol Perraudin. Ozothine. Pandrépatine. Paniode. Papavéryl. Pectine Oberlin. Pépiodon. Peptalnine. Pepto Magnésie Vassal. Peptone Vassal. Perofreinix. Pílka (gouttes). Pneumogéine Renard. Pneumogénol. Pneumo-Lipase. Poly-iodure Gonnon. Polypeptonal. Poudre Escouflaire. Primulyse. Protiodyne. Protiodyne dragées. Pulmodynol. Pulvéol. Quinthéryl. Quintozone. Rénaleptine. Révulsif liquide Boudin. Rhino-Glottyl. Rhinopharynxoíl </p> | <p> Rhocya Dyn. Rhodazil. Riódine. Rythmos Leisyn. Sanédrine. Sanex-Inhalant. Sédoneurol Dehaussy. Sédopavérine. Sérum antiasthmatique de Heckel. Sirop Gribell. Sirop minéral sulfureux Crosnier. Sirop Noguès. Solucamphre éphédriné. Spasmoneural. Stovédrine. Sulfarsiode. Sulfo-thiorine. Sulfureux Pouillet. Sulfuryl Monal. Surparine. Sympathocrine. Sympathyl. Tercodal. Térozone. Terpoxyl interne. Théocalciode. Thio-Terpine Dalin. Tiodine Cognet. Triglandol. Trinitrine caféinée Dubois. Trinitrine Roussel. Trinitrine - papavérine La- leuf. Triniverine. Uroiodine. Vaccin antiasthmatique du professeur Minet. Vaccinothérapie atoxique Cépède. Vaccin Ivago de Golden- berg (antiasthmatique). Vaccins Ronchèse. — An- pho-vaccins. Vagosédyl. Valérothéine Domergue. Valthène. Vioxyl Mouneyrat. </p> |
|--|--|

IV. — APPAREIL RESPIRATOIRE. T. S.

CONGESTIONS PULMONAIRES PNEUMONIE AIGÜE BRONCHO-PNEUMONIES

Voir aussi :

Antidyspnéiques.
Antiseptiques des voies respiratoires.
Antispasmodiques. — Sédatifs de la toux.
Bactériothérapie. — Ferments lactiques.
Cataplasmes. — Révulsifs.
Diététique.
Hémostatiques.
Instillations O. R. L.
Instrumentation.
Modificateurs sécrétoires. —
Expectorants.
Sérums Vaccins.
Toni-cardiaques.

Adrénaline Clin.
Adrénaline Invar.
Adrénaline Sauba.
Adrénine.
Adrénoides Béral.
Alcamfétol.
Ampho-vaccin pulmonaire
Ronghèse.
Anacamphre.
Antiphlogistine.
Balsamol Lescène.
Bi-Citrol Marinier.
Bronchodermine.
Bronchoseptol Lauriat.
Broncho-Vaclydun.
Broncosol.
Cachets Kapytan.
Cachets Roche de Thiocol.
Cacodyle Gonnon.
Cadior.
Camphocalyptol.
Camphodausse.
Campho-Spartéine Dubois.
Camphostyl Lacroix.
Camphydryl Robin.
Castanol.
Cinalose.
Citralin.
Citrosuyl.
Citrophos.
Citrosodine Longuet.

Codéphryl.
Codobromyl.
Comprimés Nican.
Comprimés Roche de Thiocol.
Coramine.
Créoformine.
Créositoires.
Créo-suppo-camphre.
Dénol.
Diurétique Gmet.
Elbon Ciba.
Electrargol.
Elixir Ducro.
Ercecrhinol.
Ethyl-Pneumine Lersam.
Eucalyptine Lebrun.
Frénasma.
Gaiacamphre.
Germose.
Glottyl.
Goménoléos.
Gouttes Blagny.
Gouttes Linober.
Iliamacitro.
Immuno-vaccin broncho-pulmonaire.
Institut Pasteur Sérums.
Institut Pasteur Vaccins.
Iodex.
Ivago de Goldenberg vaccin « A ».
Lantol.
Leucoseptyl.
Lipodéterpenol.
Liposeptine.
Lobéline Bruneau.
Lobéline Sandoz.
Lugocalcion.
Marrucol.
Murones du D^r Robert Jacques.
Mycolysine du D^r Doyen.
Myothermine.
Natibaine.
Néo-Physio.
Nucléocardyl.
Pandrénaline.
Pectine Oberlin.

IV. — APPAREIL RESPIRATOIRE. T. S.

CONGESTIONS PULMONAIRES PNEUMONIE FRANCHE AIGÜE BRONCHO-PNEUMONIES

Phosoforme.
Phosote Lambiotte.
Pilka (gouttes).
Pneumostyl Daguin.
Prévalidine.
Protiodyne.
Pulmodynol.
Pulmosédor.
Pulmosérum.
Pulmositoires.
Pulmoverne.
Pyoformine.
Quintozol.
Résyl.
Révulsif liquide Boudin.
Révulsif Milko.
Révulsif Procipha.
Salyptol Narty.
Sécacornine Roche.
Selor n° 1 et 2.
Septicémine Cortial.
Sinapol.
Sinaseptic.
Sirop Famel.
Sirop de Gaïarsol.
Sirop Gribell.
Sirop Mireille.
Sirop Noguès.
Sirop pectoral du D^r Pyot.
Sirop Roche au Thlocol.
Sirop Vacheron au Gaïacol.

Sirop Viano.
Solucamphre Delalande.
Staphylase du D^r Doyen.
Sthénoléine.
Térébine.
Terkal Monal.
Térozone.
Terpoxyl interne.
Tiocol Roche.
Thiosote.
Thio-Terpine Dalin.
Touranol.
Touranyl.
Tubérol.
Vaccin anti-pneumonique du professeur Minet.
Vaccin de Weill et Dufourt.
Vaccinothérapie atoxique Cépède.
Vaccins bactériens I. O. D.
Vaccins Clin.
Vaccin Ivago de L. Goldenberg.
Vaccins Ronchèse (amphavaccins).
Vaccins Virultra.
Vacyldun.
Vaso-Neurine.
Vésicatoire rose Beslier
Zimbyl.

COQUELUCHE — TOUX SPASMODIQUES

Voir aussi :

Antispasmodiques Sédatifs de la toux.
Antispasmodiques (Système nerveux).
Bactériophages.
Cataplasmes. — Révulsifs.
Sérums Vaccins.

Acobella.
Acodros.
Adrénaline Clin.
Adrénaline Invar.
Adrénaline Sauba.
Adrénoides Béral.
Adrénine.

Aethone.
Alliocardia.
Alzine.
Amphosthène.
Ampoules Boissy.
Ampoules de Spasmalgine.
Roche.
Anaquintine Lescène.
Aquintol Petit-Mialhe.
Balsamol Lescène.
Bellafoline Sandoz.
Benzoquinol.
Benzylol.
Bronchodermine.
Bronchoforme.
Bronchospéptol.

IV. — APPAREIL RESPIRATOIRE. T. S.

COQUELUCHE — TOUX SPASMODIQUES

| | |
|-------------------------------------|---|
| Cachets Roche de Thiocol. | Néopancarpine. |
| Cafédrine. | Neurocalcium. |
| Camphocalyptol. | Oléthyle-Benzyle. |
| Capsules Noguès. | Pandrénaline. |
| Capsules et sirop Préga. | Papavéryl. |
| Capsules Kuchner au mé- captol. | Paroxyl. |
| Castanol. | Pectine Oberlin. |
| Cocaïne Midy. | Perofreinix. |
| Codéphryl. | Pilka Gouttes. |
| Codérax. | Prévalidine. |
| Codobromyl. | Pulmodion. |
| Codocol. | Pulmogrog. |
| Codoforme. | Pulmofluide. |
| Comprimés Nican. | Pulmosédon. |
| Comprimés Roche de thio- col. | Pulmositoires. |
| Coramine Ciba. | Pulmoverne. |
| Créoformine. | Pulvéol. |
| Créositoires. | Quinino-phytine Ciba. |
| Dicodéine Lafran. | Quinthéryl. |
| Dragécalcion. | Quintozol. |
| Efryl. | Rénaleptine. |
| Elixir thiogaïacolé Arque- vaux. | Révulsif Milko. |
| Ephédromel Béral. | Révulsif Procipha. |
| Ergotine Lamante. | Rhinaquintine Lescène. |
| Eucalyptine Lebrun. | Rosalyl A et B. |
| Eupavéryl Pachaut. | Salypsol Narty. |
| Freinix. | Sanex-Inhalant. |
| Frénasma. | Sirop Brahma. |
| Gatercodéine. | Sirop de Gaïarsol. |
| Germose. | Sirop de glycérophosphates Vacheron. |
| Glottyl. | Sirop Famel. |
| Glycocarpine. | Sirop Gribell. |
| Goménol-éther. | Sirop Mireille. |
| Gouttes Blagny. | Sirop Noguès. |
| Gouttes Daynoc. | Sirop pectoral du D ^r Pyot. |
| Gouttes Eryl. | Sirop Roche au Thiocol. |
| Gouttes Leconte. | Sirop Vacheron au Gaïacol. |
| Gouttes Malone. | Sirop Viano. |
| Gouttes Narkay. | Sodérséine. |
| Gouttes Nican. | Solution Pautauberge. |
| Hergénol. | Spasmalgine Roche. |
| Ilyol. | Sulfoxyl. |
| Infangyl Carlier. | Sulfureux Pouillet. |
| Kluchol Remeaud. | Sulfuryl Monal. |
| Lucodal. | Surparine. |
| Marubor. | Tercodal. |
| Miroxyl. | Térébine. |
| Narcyl. | Terpine granulée Baron. |
| Néo-Dmétys. | Thiocol Roche. |
| | Thio-Terpine Dalin. |
| | Thiosedal. |

IV. — APPAREIL RESPIRATOIRE. T. S.

COQUELUCHE — TOUX SPASMODIQUES

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Touranol. | Vaccins bactériens I. O. D. |
| Touranyl. | Vaccins Clin. |
| Tubérol. | Vaccins Ronchèse (ampho- |
| Vaccinothérapie atoxique | vaccins). |
| Cépède. | Valérobromine Legrand. |
| Vaccins atoxiques stabili- | Valthène. |
| sés. | Véganine. |

EMPHYSÈME PULMONAIRE SCLÉROSE PULMONAIRE

Voir aussi :

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <i>Antidyspnéiques.</i> | Dépuriode du D ^r Roger |
| <i>Antispasmodiques. — Cal-</i> | Weber. |
| <i>manants de la toux.</i> | Désensibilysine. |
| <i>Cataplasmes. — Révulsifs.</i> | Dicaliode. |
| <i>Instrumentation.</i> | Diuréphédrine. |
| <i>Modificateurs sécrétoires. —</i> | Efryl. |
| <i>Expectorants.</i> | Elatine Bouin. |
| <i>Sérums Vaccins.</i> | Elixir thlogalacolé Arque- |
| <i>Toni-cardiaques.</i> | vaux. |
| <i>Toniques. Reminéralisants.</i> | Eniode Lefebvre. |
| <i>— Recalcifiants.</i> | Entéro-antigènes. |
| Algatan. | Ephéiodine Béral. |
| Alliocardia. | Ephétropine Béral. |
| Alzine. | Eranol. |
| Ampoules Boissy. | Eucalyptine Lebrun. |
| Antiasthme Bengalais. | Euphysol. |
| Anti-asthmine. | Eupnine Vernade. |
| Arséniode Buriat. | Eupnogénol. |
| Asthmasédine. | Freinix. |
| Asthmo-Actine. | Freinospasmyl. |
| Benzo-iodhydrine. | Frénasma. |
| Benzoquinol. | Garéphédrine. |
| Cachets Kapytan. | Globules Fumouze iodure |
| Cafédrine. | de potassium. |
| Camphocalyptol. | Gouttes Blagny. |
| Capsules Kuchner au mé- | Gouttes Narkay. |
| captol. | Humoro-stabiline. |
| Carboiodure Fraudin. | Hypophédrine. |
| Céthocal du D ^r Lemay. | Inhalation Lancosne. |
| Cinalose. | Iodalose Galbrun. |
| Collo-Iode Dubois. | Iodamélis Logeais. |
| Coramine Ciba. | Iodassium. |
| Cortiodé. | Iodaubépine. |
| Créoformine. | Iodéine Montagu. |
| Créo-suppo-camphre. | Iodogénol Pépin. |
| Curiode. | Iodo-Malsine (globules). |
| Curiode arsenié. | Iodométine. |
| Cytophédrine. | Iodone Robin. |
| | Iodonésyl. |
| | Iodonucléol. |

IV. — APPAREIL RESPIRATOIRE. T. S.

EMPHYSÈME PULMONAIRE SCLÉROSE PULMONAIRE

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Iodo-Salva Evesque. | Pulmodynol. |
| Iodurase. | Pulmosérum. |
| Iodure Pachaut. | Quinthéryl. |
| Kodos. | Révuksif liquide Boudin. |
| Lipiodol Lafay. | Rhocy Dyn. |
| Lipoiodine Ciba. | Riodine. |
| Magiodyl. | Sirop Gribell. |
| Mangarsenic. | Sirop minéral sulfureux |
| Micelliode. | Crosnier. |
| Miroxyl. | Sirop Noguès. |
| Murones du Dr Robert | Sulfo-thiorine. |
| Jacques. | Sulfur concentré Dax. |
| Nalodine Logcais. | Sulfureux Pouillet. |
| Néo-Physio. | Tercodal. |
| Néo-Riodine. | Térozone. |
| Opotonine. | Terpine Gonnon. |
| Oxymenthol Perraudin. | Terpine granulée Baron. |
| Ozothine. | Théocalciodé. |
| Paniode. | Tlodine Cognet. |
| Pectine Oberlin. | Touranol. |
| Pépiodon. | Touranyl. |
| Pérofreinix. | Uroiodine. |
| Pneumogéine Renard. | Vaccin antiasthmatique du |
| Pneumogénol. | professeur Minet. |
| Pneumo-Lipase. | Valérothéine Domergue. |
| Polyiodure Gonnon. | |

ŒDÈME AIGU DU POUMON

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Voir aussi : | Digitaline cristallisée Mla- |
| <i>Instrumentation.</i> | lhc-Petit. |
| <i>Toni-cardiaques.</i> | Digitaline Invar. |
| Acécoline spartéinée. | Digitaline Nativelle. |
| Acécoline-camphre. | Diurétique Gmet. |
| Adoverne. | Granules Chanteaud. |
| Ampoules Boissy. | Natibaine. |
| Avistyl. | Natirose. |
| Coramine Ciba. | Ouabaine Arnaud. |
| Digilanatine. | Tétranitrol Roussel. |
| Digilanide Sandoz. | Trinitrine caféinée Dubois. |
| Digimialbaine. | Trinivérine. |
| | Zimbyl. |

PLEURÉSIES

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Voir aussi : | Dietétique. |
| <i>Algies.</i> | Diurétiques. |
| <i>Analgésiques externes.</i> | <i>Instrumentation.</i> |
| <i>Analgésiques internes.</i> | Toniques. — Reminérali- |
| <i>Antispasmodiques. — Cal-</i> | sants. — Recalcifiants. |
| <i>manants de la toux.</i> | Tuberculose (traitement spé- |
| <i>Cataplasmes. — Révuksifs.</i> | cifique). |

IV. — APPAREIL RESPIRATOIRE. T. S.

PLEURÉSIES

Antiphlogistine.
 Balsamol Lescène.
 Bi-Citrol Marinier.
 Bronchodermine.
 Calcium Francalcion.
 Calcium Sandoz.
 Calcivitam
 Chlorical.
 Chloro-Calcion.
 Cinalose.
 Colloïdogénine du D^r Bayle.
 Créositoires.
 Dragécalcion.
 Electrargol.
 Eucalyptine Lebrun.
 Francalcion.
 Goménoléos.
 Iodex.
 Lipodéterpénol.
 Marrucol.
 Métaux colloïdaux A. Lan-
 cien.

Molène.
 Myoral.
 Myothermine.
 Neptal.
 Organi-calcion simple.
 Pancalcion.
 Pectine Oberlin.
 Pneumo-Lipase.
 Pulmositoires.
 Quinquina Gmet.
 Révulsif liquide Boudin.
 Révulsif Milko.
 Révulsif Procipha.
 Sirop de Gaiarsol.
 Sthénoléine.
 Strepto-vaclydun.
 Térozone.
 Triradol.
 Vésicatoire rose Beslier.
 Zimbyl.

TRACHÉITES — TRACHÉO-BRONCHITES AIGUES — BRONCHITES CHRONIQUES

Voir aussi :

Analgésiques locaux.
Antidyspnéiques.
Antispasmodiques — Cal-
manants la toux.
Antiseptiques des voies
respiratoires.
Cataplasmes. — Révulsifs.
Inhalations.
Instillations O. R. L.
Modificateurs sécrétoires. —
Balsamiques.
Modificateurs sécrétoires. —
Expectorants.
Toni-cardiaques.
Vaso-constricteurs Déconges-
tifs.

Acatar.
 Acobella.
 Acodros.
 Aethone.
 Alcamfétol.
 Algatan.
 Algostérine Oliviero.
 Allicardia.
 Aloysine.

Alzine.
 Amborhinol.
 Ampho-tablettes Ronchèse.
 Ampho-vaccins Ronchèse.
 Amphostène.
 Anaquintine Lescène.
 Anjodol.
 Antiasthme Bengalais.
 Anti-Asthmine.
 Antiphlogistine.
 Arcanan.
 Ascoléine Rivier.
 Aséphéine.
 Asthmo-actine.
 Azufrol.
 Balmiga.
 Balsamol Lescène.
 Benzoquinol.
 Biocéane.
 Boréol.
 Bronchodermine.
 Bronchoforme.
 Bronchoseptol Lauriat.
 Broncho-Vaclydun.
 Broncosol.
 Cachets Kapytan.
 Cachets Roche de Thiocol.

IV. — APPAREIL RESPIRATOIRE. T. S.

TRACHÉITES — TRACHÉO-BRONCHITES AIGÜES — BRONCHITES CHRONIQUES

- | | |
|---|---|
| Cafédrine. | Galacampfire. |
| Camphocalyptol. | Germose. |
| Capsules Dartois. | Gernal. |
| Capsules Kuchner au mé- captol. | Glottyl. |
| Capsules et sirop Préga. | Glyco-Thymolline. |
| Capsules Noguès. | Goménol capsules. |
| Carboiodure Fraudin. | Gouttes Blagny. |
| Castanol. | Gouttes bronchophiles An- dré. |
| Cinalose. | Gouttes Daynoc. |
| Cinéyl. | Gouttes Eryl. |
| Cocaïne Midy. | Gouttes Leconte. |
| Codéphryl. | Gouttes Linober. |
| Codérax. | Gouttes Livoniennes de Trouette-Perret. |
| Codobromyl. | Gouttes Malone. |
| Codocol. | Gouttes Nican. |
| Codoforme. | Granulés des Voges |
| Colloïdogénine du D ^r Bayle. | Guéthural. |
| Comprimés Roche de Thio- col. | Guttoléol. |
| Corizol. | Hergénol. |
| Cortiode. | Histogénol. |
| Coryphédrine. | Hyol. |
| Créoformine. | Hypophédrine. |
| Créosal Dubois. | I. A. M. |
| Créositoires infantiles. | Immunizols Grémy. |
| Créo-suppo-camphre. | Immuno - vaccin broncho- pulmonaire. |
| Curiode. | Infangyl Carlier. |
| Curiode arsenié. | Inhalation Lancosme. |
| Dépuriode du D ^r Roger Weber. | Inhalol. |
| Dicaliode. | Inhalo-Sel. |
| Dicodéine Lafran. | Inhaloxyl. |
| Diuréphédrine. | Iodalose Galbrun. |
| Dragécalcion. | Iodamélis Logeais. |
| Efryl. | Iodarsenic Guiraud ou Gouttes Paidophiles. |
| Elatine Bouin. | Iodassium. |
| Elbon Ciba. | Iodéine Montagu. |
| Elixir thiogaïacolé Arque- vaux. | Iodex. |
| Eniode Lefebvre. | Iodogénol Pépin. |
| Ephédromel Béral | Iodo-Maisine Globules. |
| Ephéiodine Béral. | Iodométine. |
| Eranol. | Iodone Robin. |
| Ercérhinol. | Iodonésyl. |
| Eucalyptine Lebrun. | Iodonucléol. |
| Euphon. | Iodo-Salva Evesque. |
| Euphysol. | Iodurase. |
| Eupnine Vernade. | Iodure Pachaut. |
| Eupnogénol. | Lenadryl. |
| Eupnol. | Léniforme. |

IV. — APPAREIL RESPIRATOIRE. T. S.

TRACHÉITES — TRACHÉO-BRONCHITES AIGÜES — BRONCHITES CHRONIQUES

Limol Churchill.
 Lipiodol Lafay.
 Lipiodine Ciba.
 Lucodal.
 Magiodyl.
 Marinol.
 Marrubène.
 Marubor.
 Micelliodé.
 Miroxyl.
 Morisland.
 Morrubiase.
 Mycolysine.
 Myothermine.
 Narcyl.
 Nasobore.
 Néopulmine.
 Néo-Riodine.
 Nucléigène.
 Nucléophorine.
 Olisol.
 Opocalcium du D^r Guer-
 sant.
 Opocobalt.
 Opotonine.
 Oxymenthol Perraudin.
 Ozothine.
 Paniode.
 Pâte Mireille.
 Pectine Oberlin.
 Pépiodon.
 Perles Taphosote.
 Perubore.
 Pharyngaseptyl.
 Phosote Lambiotte.
 Phosphogalacol Mary.
 Pilka (gouttes).
 Pneumogéine Renard.
 Pneumogénol.
 Pneumo-Lipase.
 Pneumoseptyl Daguin.
 Polyiodure Gonnon.
 Poudre Escoufflaire.
 Prévalidine.
 Primulyse.
 Pulmodion.
 Pulmodynol.
 Pulmosuide.
 Pulmogrog.
 Pulmosédor.
 Pulmosérum.

Pulmositoires.
 Pulmoverne.
 Pulvéol.
 Quinthéryl.
 Quintozol.
 Résyl.
 Révulsif liquide Boudin.
 Révulsif Milko.
 Révulsif Procipha.
 Rhinacridyl.
 Rhinaquintine Lescène.
 Rhinol.
 Rhino-Liposeptine.
 Rhizotanin Chapotot.
 Rhocya Dyn.
 Riodyne.
 Rosalyl A. et B.
 Salyptol Narty.
 Sanex-Inhalant.
 Sédorhinol.
 Septolan.
 Sinapol.
 Sinaseptic.
 Sirop Brahma.
 Sirop Cassibor.
 Sirop de créosote Vacheron.
 Sirop de Galarsol.
 Sirop de glycérophosphates
 Vacheron.
 Sirop Famel.
 Sirop Gribell.
 Sirop minéral sulfureux
 Crosnier.
 Sirop Mireille.
 Sirop Noguès.
 Sirop pectoral du D^r Pyot.
 Sirop Roche au thiocol.
 Sirop Vacheron au galacol.
 Sirop Viano.
 Solution Pautauberge.
 Staphylase du D^r Doyen.
 Stillargol.
 Sulfa.
 Sulfan.
 Sulfarstode.
 Sulfhydral Chanteaud.
 Sulfoïdol Robin.
 Sulfo-Thiorine.
 Sulfoxyl.
 Sulfur concentré Dax.
 Sulfureux Pouillet.

IV. — APPAREIL RESPIRATOIRE. T. S.

TRACHÉITES — TRACHÉO-BRONCHITES AIGÜES. — BRONCHITES CHRONIQUES

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Sulfuryl Monal. | Thiosedal. |
| Sulf-Y. | Thiosote. |
| Sulphium. | Thio-Terpine Dalin. |
| Tercodal. | Touranol. |
| Térébine. | Touranyl. |
| Terkal Monal. | Vaccin de Weill et Dufourt. |
| Térozone. | Vaccins Ronchèse. — (Ampho-vaccins). |
| Terpine Gonnon. | Vaclydun. |
| Terpine granulée Baron. | Valérothéine Domergue. |
| Thiocol Roche. | Vésicatoire rose Beslier. |
| Thiorine. | |

V. — CHIRURGIE THÉRAPEUTIQUE EXTERNE. T. G.

ANESTHÉSIIQUES

| | |
|---------------------|------------------|
| Allocaïne Lumière. | Delcaïne Roques. |
| Balsoforme. | Percaïnal. |
| Chloréthyle Bengué. | |

ANTISEPTIQUES EXTERNES COMPRIMÉS

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Aloysine. | Métacuprol. |
| Anexol. | Métritols. |
| Antodol. | Néothorium Millot. |
| Chloccl. | Perquinol. |
| Clonazone Daufresne. | Salubrine. |
| Comprimés d'Alibour. | Sanoformine. |
| Comprimés Guillaumin. | Sanoram. |
| Eugaline. | Sétirtem comprimés. |
| Leucolyse. | Spyrolides. |

ANTISEPTIQUES EXTERNES LIQUIDES

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Allbourine. | Biolactyl Fournier. |
| Ampho-Vaccins | Boricine Meissonnier. |
| panse-ments Ronchèse. | Borostyrol Schlatter. |
| Anaquinine. | Coaltar saponiné Le Beuf. |
| Anexol. | Dermacide. |
| Aniodol. | Donagol. |
| Bacté-Ricyl. | Electrargol. |

V. — CHIRURGIE

THÉRAPEUTIQUE EXTERNE. T. G.

ANTISEPTIQUES EXTERNES — LIQUIDES

Flavurol.
 Glyco-Thymoline.
 Goménol.
 Gouttes Daynoc.
 Hermophényl Lumière.
 Inolène.
 Inosepta.
 Iodex.
 Laurenol médicinal.
 Lusoforme.
 Mycidol Badel.
 Néol.
 Pennès (Produits).
 Pyroléol Edet.

Rogerma.
 Salubrine Phénix.
 Salychlore.
 Séphydine.
 Septolan.
 Stillargol.
 Sunalcol.
 Sunoxol.
 Térébine.
 Terpoxyl externe.
 Thigénol Roche.
 Tochlorine.
 Vinaigre de Pennès.

ANTISEPTIQUES EXTERNES — POMMADÉS

Acécalex.
 Alibourine.
 Baume du D^r Baissade.
 Baume Séléria.
 Borostyrol Schlatter.
 Créosoforme Lambiotte.
 Dermacide.
 Dermo-rhinistol.
 Ektogan Bocquillon.
 Electrargol.
 Flavurol.
 Ganderma.
 Gelée Vaccin Ivago (anti-pyogène).
 Goménol onguent.
 Inosepta.
 Iodex.
 Iodomaisine (pommade).
 Iodure d'amidon Lumière.

Lynévol.
 Méta-Titane.
 Métavaccin.
 Néo-collargol.
 Onction Leisyn.
 Onguent Fréval.
 Pommade au Nestosyl.
 Pommade Inséva.
 Pommade Raimoa.
 Propidex.
 Pyo-amphogel Ronchèse.
 Rozoderme.
 Sédothiol.
 Stéramine.
 Tégéol.
 Térozone.
 Ulcérine Berger.
 Uvéoline.
 Vioforme Ciba.

ANTISEPTIQUES EXTERNES — POUDRES

Anexol.
 Aniodol.
 Biolactyl Fournier.
 Boricine Meissonnier.
 Bulgarine Thépénier.
 Clonazone Daufresne.
 Créosoforme Lambiotte.
 Ektogan Bocquillon.

Evine.
 Gynarsol.
 Iodure d'Amidon Lumière.
 Leucolyse.
 Poudre Chaumel.
 Septométrol Vély.
 Vioforme Ciba (et ovules au Vioforme).

V. — CHIRURGIE

THÉRAPEUTIQUE EXTERNE. T. G.

ANTISEPTIQUES EXTERNES, SAVONS, OVULES, CRAYONS

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Aniodol. | Mexyl. |
| Aseptovules. | Néothorium Millot. |
| Comprimés vaginaux Leisyn. | Nitium Buisson. |
| Créositoires. | Ovules Chaumel. |
| Créosoforme Lamblotte. | Ovules Inséva. |
| Dermacide. | Ovules Intima. |
| Ektogan Bocquillon | Ovules au Nestosyl. |
| Electrargol. | Ovules Rhemda radio-actifs |
| Evine. | Ovules Roche. |
| Flavurrol. | Péricols. |
| Glucolactol. | Perquinol. |
| Goménol savon. | Savons Mollard. |
| Juranol. | Tampols Roche. |
| Laurénol médicinal. | Uvargol. |
| Leucagine. | Uvéoline. |
| Magnésovules. | Vioforme végétal. |
| | Yptor. |

BAINS

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Bain Bagnor radio-actif. | Ozothine. |
| Bain Carré. | Pennès (Produits). |
| Bain Flévar. | Salvenase. |
| Bain Salvia. | Sulfureux Pouillet. |
| Balnéradol. | Sulfuryl Monal. |
| Boricine Meissonnier. | Ulcéobalnéine. |
| Lacpinine. | |

CATAPLASMES — RÉVULSIFS

| | |
|--|--------------------------|
| Anaquinine Lescène. | Ozothine. |
| Baume Adol. | Quintozol. |
| Cataplasme du D ^r Le- lièvre. | Révulsif liquide Boudin. |
| Fango Fisch et C ^{ie} . | Révulsif Milko. |
| Myothermine. | Révulsif Procipha. |
| Ouataplasme du D ^r Lan- glebert. | Sinaplasme. |
| | Sinapol. |
| | Térébine. |

CICATRISANTS

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Acécolex. | Dermorhinistol. |
| Baume Robernard. | Détergine. |
| Baume Selenia. | Donagol. |
| Baumix. | Eczéda. |
| Cimarsényl. | Eczémacrème Boissy |
| Coaltar saponiné Le Beuf. | Goménol. |
| Créosoforme Lamblotte. | Hémostatique Coudert. |
| Dermoradol. | Inotyol. |

V. — CHIRURGIE THÉRAPEUTIQUE EXTERNE. T. G.

CICATRISANTS

| | |
|---------------------------------------|--|
| Insuline Byla. | Pyroléol Edet. |
| Insuline Phyloze. | Rogerma. |
| Lactosmose. | Rozoderme. |
| Léotamine. | Septolan. |
| Lynevol. | Tégéol. |
| Méta-Titane. | Térébine. |
| Minergol. | Terpoxyl externe. |
| Onction Leisyn. | Ulcérine Berger. |
| Opodermyl. | Ulcérophile Nosan. |
| Plasthamelyne. | Vioforme Ciba (et ovules au Vioforme). |
| Pommade Raimoa. | Vulnérine du D ^r Bergen. |
| Pommade V. E. Doumer. | |
| Poudre et Pommade d'insuline Phyloze. | |

V. — CHIRURGIE THÉRAPEUTIQUE EXTERNE. T. S.

ADÉNITES

Voir aussi :

| | |
|--|--|
| <i>Analgésiques.</i> | Eranol. |
| <i>Antiseptiques externes pommades.</i> | Flétase. |
| <i>Dietétique.</i> | Fludiose. |
| <i>Produits vitaminés.</i> | Gaduamine. |
| <i>Toniques.</i> | Glandocalcyl. |
| <i>Tuberculose.</i> | Hématoiodine. |
| | Hémoviris. |
| | Hormocline. |
| | Huile iodée Finikoff. |
| Algostérine Oliviero. | Iodarsenic Guiraud ou Gouttes Paidophiles. |
| Biocéane. | Iodaseptine Cortial. |
| Cimarsényl. | Iodassium. |
| Cinnozyl. | Iodentérol. |
| Colloïdogénine du D ^r Bayle. | Iodex. |
| Curiode. | Iodocalcium. |
| Curiode arsénié. | Iodomaisine pommade. |
| Cytobiase. | Iodométine. |
| Cytomanganol Corbière. | Iodonésyl. |
| Dépuriodé du D ^r Roger Weber. | Iodorucléol. |
| Dicaliode. | Juglanrégine André. |
| Dragécalcion. | Lipoiodine. |
| Energine iodée de Berck. | Liposplénine. |
| Enlode Lefebvre. | Lipovita. |
| Ergostol Violet. | Marimine. |

V. — CHIRURGIE THÉRAPEUTIQUE EXTERNE. T. S.

ADÉNITES

| | |
|---|-------------------------------------|
| Marinol. | Sérum végétal du D ^r Cu- |
| Mésothorium Buisson. | guillère. |
| Micelliode. | Sirop de Lovel. |
| Molène. | Sirop Girard. |
| Morisland. | Sirop Tinardon. |
| Morsine. | Stannion. |
| Morubiase. | Stannoxyd. |
| Murones du D ^r Robert | Staphylocide. |
| Jacques. | Staphylostanol. |
| Onguent Fréval. | Stérogyl. |
| Opocobalt. | Sulfarsiode. |
| Paniode. | Tannocalcine. |
| Panxylon. | Tonique Roche. |
| Phosphogalacol Mary. | Tricalcine. |
| Phospholéose Demasles. | Triradol. |
| Phytogyl. | Uroiodine. |
| Plasmarine. | Uvestérol. |
| Polyiodure Gonnon. | V. A. V. |
| Poudre Mass plastique. | Vin Girard. |
| Rob Lechaux. | Vitamine Cortial. |

BRÛLURES — CICATRICES VICIEUSES

Voir aussi :

| | |
|--|---------------------------------------|
| Analgésiques externes. | Electrargol. |
| Antiprurigineux. | Gelées-vaccins Ivago (anti- |
| Antiseptiques externes liqui- | pyogènes). |
| des. | Gélicurine. |
| Antiseptiques externes pom- | Glyco-thymoline. |
| mades. | Goménoléos. |
| Cicatrisants. | Immunizols Grémy. |
| Instrumentation. | Inotyol. |
| Kératoplastiques. | Insulanol. |
| | Iodex. |
| | Juranol. |
| Acéclex. | Lactosmose. |
| Arapal. | Laurénol médicinal. |
| Baume Daynoc. | Linévol. |
| Baumix. | Lyzacrème L. M. L. |
| Belbémine. | Métacuprol. |
| Boricine Meissonnier. | Méta-Titane. |
| Borostyrol Schlatter. | Métavaccin. |
| Cataplasme du D ^r Lelièvre | Néo-collargol. |
| Coaltar saponiné Le Beuf. | Néol. |
| Créosoforme Lambiotte. | Nestosyl. |
| Dermoradol. | Onction Lelsyn. |
| Dermorhinistol. | Opodermyl. |
| Détergine. | Quataplasme du D ^r Langle- |
| Diadermine. | bert. |
| Eczéda. | Ozothine. |
| Eczémacrème Boissy. | Percainal Ciba. |
| Ektogan Bocquillon. | Perquinol. |

V. — CHIRURGIE THÉRAPEUTIQUE EXTERNE. T. S.

BRÛLURES — CICATRICES VICIEUSES

Pommade au Nestosyl.
Pommade Bertol Vichy.
Pommade Raimoa.
Pommade V. E. Doumer.
Poudre Mass Plastique.
Propidex.
Pyo-amphogel Ronchèse.
Pyroléol Edet.
Rhagadine Bracquemond.
Rogerma.
Rozoderme.
Sanorma.
Sédothiol.
Sédophile.
Solution huileuse au Nestosyl.

Stéramine.
Tégéol.
Térébine.
Térozone.
Terpoxyl externe.
Thigénol Roche.
Tulle Gras Lumière.
Tulle Rose Beslier.
Ulcérine Berger.
Ulcérophile Nosan.
Uvargol.
Vaccins Virultra.
Véralgine.
Vioforme Ciba.
Vulnérine du D^r Bergen.

ENTORSES, FRACTURES, HYDARTHROSES

Voir aussi :

Analgésiques externes.
Analgésiques internes.
Analgésiques locaux.
Cataplasmes. — Révulsifs.
Instrumentation.
Produits vitaminés.
Toniques.

Benzylocalcium.
Biosine Le Perdriel.
Cataplasme du D^r Lellèvre.
Cellona.
Céréossine.
Crème résolutive du D^r Rap.
Dragécalcion.
Elastoplaste.
Fortossan irradié.
Fosfoxyl Carron.
Fosyls Carron.
Gaurol.
Génomorphine.
Glandex phoscalcique.
Glandocalcyl.
Glycérophosphate Dalloz.
Glycérophosphate Robin.
Glycéro-Gloma.
Granulé Cabasson.
Hémostérine.
Holos.
Iodex.
Mancobène.
Morisland.
Néovaryl.

Nucléigène.
Nuphos.
Opocalcium du D^r Guer-sant.
Opocalcium irradié du D^r Guersant.
Organi-calcion simple et endocrinien.
Parathyrocalcine Moncour.
Percalcine.
Phosphates du D^r Pinard.
Phosphate Vital de Jacquemaire.
Phospho-Fluor Beynet.
Phytogyl.
Phyto Splénol Plé.
Pommade au Nestosyl.
Poudre Mass plastique.
Prodynase.
Silicyl.
Spicanol.
Stérogyl.
Sylcase.
Térébine.
Tricalcine.
Uvéphorine.
Uvéstérol.
Végéphos.
Végétol.
Vésicatoire rose Beslier.
Virmonal Piam.
Vitamine Cortial.
Vitergomine.

V. — CHIRURGIE THÉRAPEUTIQUE EXTERNE. T. S.

FURONCLES — FURONCULOSE — ANTHRAX ABCÈS — PANARIS — PHLEGMONS PIQURES D'INSECTES

Voir aussi :

Analgésiques externes.
Analgésiques internes.
Antiprurigineux.
Antiseptiques.
Antiseptiques externes liquides.
Antiseptiques externes pommades.
Antiseptiques intestinaux.
Bactériophages.
Bactériothérapie. — Ferments lactiques.
Cataplasmes.
Diététique.
Laxatifs.
Sérums Vaccins.

Albuplast Vigier.
Alibourine.
Allergantyl Miluc.
Ampho-vaccins Ronchèse.
Anasectol.
Anexol.
Antifuronculeux Domergue.
Antigénines.
Antiphlogistine.
Antipiol.
Antivirus.
Arapal.
Aseptoradol.
Bacté-phages.
Baume du D^r Baissade.
Boricine Meissonnier.
Borstyrol Schlatter.
Bulgarine Thépenier.
Cataplasme du D^r Lellèvre.
Clonazone.
Coaltar saponiné Le Beuf.
Comprimés d'Alibour.
Comprimés Guillaumin.
Comprimés Levure Mycéta.
Créosoforme.
Dépuriode du D^r Roger Weber.
Dermacide.
Elastoplaste.

Electrargol.
Emplâtres Rogé Cavaillès.
Entéro-Antigènes.
Entérofagos.
Evolaxine.
Ferments lactiques Fabre.
Flavurool.
Ganderma.
Gelée-vaccin Ivago.
Glésol.
Glyco-thymoline.
Gomenoléos.
Gouttes Daynoc.
Hermophényl Lumière.
Immunizols Grémy.
Inolène.
Inosepta.
Institut Pasteur Vaccins.
Iodex.
Iodo-Malsine (pommade).
Ivago de Goldenberg Vaccin « D ».
Ivago gelées-vaccins.
Ivago-sta buvable.
Lactoprotéide Carrion.
Lactosmose.
Leucolyse.
Levure B. 17.
Levure fraîche Mycéta.
Levure Zymaculine.
Levuro-Maltine Déjardin.
Lipodéterpénol.
Lysacrème L. M. L.
Lysaxins L. M. L.
Métacuprol.
Méta-Titane.
Métaux colloïdaux A. Lancien.
Méta-Vaccin.
Mycidol Badel.
Mycolysine du D^r Doyen.
Néol.
Néo-collargol.
Néo-physio.
Nestosyl.
Onguent Fréval.
Osmo-vaccin Bréant.

V. — CHIRURGIE THÉRAPEUTIQUE EXTERNE. T. S.

FURONCLES — FURONCULOSE — ANTHRAX — ABCÈS — PANARIS — PHLEGMONS PIQURES D'INSECTES

| | |
|---|--|
| Quataplasme du D ^r Langlebert. | Sulfureux Pouillet. |
| Percaïnal. | Sunalcol. |
| Perquinol. | Sunoxol. |
| Polyiodure Gonnon. | Tapo. |
| Pommade au Nestosyl. | Tégéol. |
| Propidex. | Térébine. |
| Propidon. | Térozone. |
| Protiodyne. | Terpoxyl externe. |
| Pyo-Amphogel Ronchèse. | Themsaline. |
| Pyo-Vaclydun. | Thiophyl. |
| Rogerma. | Tochlorine. |
| Salantale. | Triseptine. |
| Sanoram. | Tulle gras Lumière. |
| Sédothiol. | Tulle rose Beslier. |
| Séphydine. | Ulcérophile Nosan. |
| Septicémine Cortial. | Ultra-Lévure. |
| Septolan. | Uvargol. |
| Sérums Clin. | Uvéoline. |
| Spicanol. | Vaccinothérapie atoxique Cépède. |
| Stalysine. | Vaccins Bruschettini. |
| Stanion. | Vaccins atoxiques stabilisés |
| Stannobardane. | Vaccins bactériens I. O. D. |
| Stannoxyl. | Vaccins Clin. |
| Staphylagone. | Vaccins Ronchèse. — Am- pho-vaccins. |
| Staphylase du D ^r Doyen. | Vaccins Sténé. |
| Staphylocide Audras. | Vaccins intradermiques et gelées-vaccins Ivago de L. Goldenberg. |
| Staphylo-Coccine Fraquet. | Vacciphages. |
| Staphylothanol. | Vaclydun. |
| Staphylo-Vaclydun. | |
| Streptoderme. | |
| Sulfodermol Flahaut. | |

OSTÉITES — OSTÉOMYÉLITES

Voir aussi :

| | |
|-------------------------|---|
| Bactériophages. | Cimarsényl. |
| Diététique. | Colloïdogénine du D ^r Bayle. |
| Produits vitaminés. | Dicaliode. |
| Toniques. | Electrargol. |
| Sérums vaccins. | Eranol. |
| | Fosfoxyl Carron. |
| | Fosyls Carron. |
| Adrénocalcine. | Granulé Cabasson. |
| Ampho-vaccins Ronchèse. | Immunizols Grémy. |
| Antipiol. | Institut Pasteur Vaccins. |
| Bacté-phages. | Iodentérol. |
| Benzylocalcium. | Iodomaisine pommade. |
| Calcigénol Pinard. | Lipodéterpénol. |
| Calciline. | Liposeptine. |

V. — CHIRURGIE THÉRAPEUTIQUE EXTERNE. T. S.

OSTÉITES — OSTÉO-MYÉLITES

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Ozothine. | Uvéphorine. |
| Nuphos. | Vaccinothérapie atoxique |
| PhosphofluorBeynet. | Cépède. |
| Phosphonine Soulié. | Vaccins bactériens I. O. D. |
| Recrésal. | Vaccins Bruschetti. |
| Salantale. | Vaccins Clin. |
| Sérobiol. | Vaccins intradermiques et |
| Sérums Clin. | Gelées Vaccins Ivago de |
| Septicémine Cortial. | L. Goldenberg. |
| Staphylagone. | Vaccins Ronchèse (ampho- |
| Staphylase du Dr Doyen. | vaccins). |
| Staphylococcine Fraquet. | Vaccins Virultra. |
| Staphylostanol. | Vacciphages. |
| Sylcase. | Vaclydun. |
| Térébine. | V. A. V. |
| Terpoxyl externe. | Virmonal Piam. |

PANSEMENTS — PLAIES — FISTULES ULCÈRES

Voir aussi :

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Analgsiques externes. | Arapal. |
| Analgsiques internes. | Bactéphages. |
| Anesthsiques locaux. | Bacté Ricyl. |
| Antiprurigineux. | Baume Robertard. |
| Antiseptiques externes li- | Baume Sélénia. |
| quides. | Belhémine. |
| Antiseptiques externes pom- | Biolactyl Fournier. |
| mades. | Boricine Meissonnier. |
| Antiseptiques externes pou- | Borostyrol Schlatter. |
| drés. | Bulgarine Thépénier. |
| Antiseptiques externes sa- | Camphydryl Robin. |
| vons. | Cataplasme du Dr Lelièvre. |
| Bactériophages. | Chloci. |
| Bactériothérapie Ferments | Cinnozyl. |
| lactiques. | Clonazone Daufresne. |
| Cicatrisants. | Coaltar saponiné Le Beuf. |
| Instrumentation. | Comprimés d'Alibour. |
| Kératoplastiques. | Comprimés Guillaumin. |
| Sérums Vaccins. | Créosoforme Lambiotte. |
| | Dermodulcis. |
| | Dermoral. |
| Acécolex. | Dermorhinistol. |
| Alibourine. | Diadermine. |
| Aloysine (pommade). | Ektogan Bocquillon. |
| Ampho-vaccins Ronchèse. | Elastoplaste. |
| Anexol. | Electrargol. |
| Aniodol. | Emplâtres Rogé Cavallès. |
| Antigénines. | Eranol. |
| Antiphlogistine. | Flavuro. |
| Antipiol. | Ferroxylene. |
| Antivirus. | Francoplaste. |

V. — CHIRURGIE

THÉRAPEUTIQUE EXTERNE. T. S.

PANSEMENTS — PLAIES — FISTULES ULCÈRES

- | | |
|------------------------------------|--|
| Galabactéine. | Poudre et Pommade d'insuline Phyloze. |
| Gelée vaccin Ivago (anti-pyogène). | Poudre Mass plastique. |
| Glyco-Thymoline. | Propidex. |
| Goménoléos. | Pyo-Amphogel Ronchèse. |
| Gouttes Daynoc. | Pyo-Vaclydun. |
| Hémostyl. | Pyo-Vaclydun Pansement. |
| Hermophényl Lumière. | Pyroléol Edet. |
| Inolène. | Rhagadine Bracquemond |
| Inosepta. | Rogerma. |
| Inotyol. | Rozoderme. |
| Insulanol. | Salantale. |
| Insuline Byla. | Salasenyl (poudre). |
| Insuline Phyloze. | Salubrine Phénix. |
| Iodex. | Sanoram. |
| Iodocalcium. | Sédothiol. |
| Iodure d'amidon Lumière. | Séphydine. |
| Ivago-pyo (buvable). | Septolan. |
| Ivago de Goldenberg Vaccin « P ». | Sérum Oliviero. |
| Juranol. | Sérums Clin. |
| Lactosmose. | Solution huileuse au Nestosyl. |
| Laurénol médicinal. | Stéramine. |
| Léotaminé. | Stillargol. |
| Leucolyse. | Sunalcol. |
| Lusoforme. | Sunoxol. |
| Lynévol. | Tégéol. |
| Lysaxins L. M. L. | Térébine. |
| Lysacrème L. M. L. | Terpoxyl externe. |
| Méta-Titane. | Themsaline. |
| Méta-Vaccin. | Tochlorine. |
| Mycidol Badel. | Tulle gras Lumière. |
| Néo-collargol. | Tulle rose Beslier. |
| Néol. | Ulcéobande. |
| Nestosyl. | Ulcéoplaque. |
| Nitium Buisson. | Ulcéosine. |
| Onction Leisyn. | Ulcérophile Nosan. |
| Opodermyl. | Uvargol. |
| Quataplasme du Dr Langlebert. | Uvéoline. |
| Ozothine. | Vaccins Clin. |
| Percainal. | Vaccins Ronchèse. |
| Perquinol. | Vaccins Virultra. |
| Pommade au Nestosyl. | Vacciphages. |
| Pommade Fornet. | Vaclydun. |
| Pommade Raimoa. | Veinogène. |
| Pommade V. E. Doumer. | Veinotrope. |
| Poudre Chaumel. | Vioforme Ciba (et ovules au Vioforme). |
| | Vulnérine du Dr Bergen. |

VI. — DIÉTÉTIQUE

Aliment Tinardon.
 Amino-sel-Byla.
 Babeurre Dardelet.
 Babeurre Guigoz.
 Babeurre La Faye.
 Babeurre sec Nestlé (Ele-
 don).
 Beef Lavoix.
 Bio-Sel.
 Blédine Jacquemaire.
 Carottase.
 Carypaine.
 Caséone Fabre.
 Céréales Bébé Favrichon.
 Céréales granulé Favrichon.
 Curoraisin.
 Decorpa.
 Dextrosol.
 Diases.
 Dryco.
 Elixir Dussaud.
 Extrait de malt français
 Déjardin.
 Farines de régime Bloch.
 Farines de son Soyolk.
 Féculyse Heudebert.
 Forcival.
 Jus de raisin Pampryl.
 Galactogil.
 Guigoz (lait en poudre).
 Kymosine Rogier.

Lacto-sérum Lavril.
 Lait Dardelet (modifié).
 Lait Gallia.
 Lait Guigoz.
 Levuro-maltine Déjardin.
 Maïzena.
 Malt Ethel.
 Malt pailleté.
 Maltea Moser cristallisé.
 Maltosan.
 Malt Wander ou Gloma.
 Nergine Heudebert.
 Nestogène Nestlé.
 Nutromalt.
 Orthozomine.
 Pain essentiel.
 Pain Massé Sana.
 Pain Redeuil.
 Pains spéciaux Heudebert.
 Peptomaltone Déjardin.
 Phosphatine Falières.
 Phosphogène Favrichon.
 Raisin quotidien.
 Sinaqua Nutricia.
 Sucre Edulcor.
 Thé d'oranger Joseph Nè-
 gre.
 Végélact.
 Véguva.
 Vitaminol.
 Voka.

VII. — INSTRUMENTATION — APPAREILS

Albuplast Vigier.
 Bande de crêpe Néoplastex.
 Boules Quiès.
 Cellona.
 Compresseif Beslier.
 Dosurine (trousses).
 — Elastoplaste.
 — Ferroxyline.
 — Francoplaste.
 — Hypnos.
 — Gobillettes.
 Inhalo-Bol.

Optiplaste.
 Oxy-injecteur du Dr Fia-
 lip.
 Polycautére.
 Penghawar des Iles.
 Poudre Mass Plastique.
 Séro-pulvérisateur I. M.
 Tulle Rose Beslier.
 Ulcéobande.
 Ulcéoplaque.
 Velpeau (bandes de crêpe).

VIII. — MALADIES DE LA NUTRITION ET PAR CARENCE. T. G.

ACCÉLÉRATEURS DE LA NUTRITION

| | |
|---|-----------------------------|
| Actiphos. | Endoxidine. |
| Adipolysinc. | Energine iodée de Berck. |
| Adral. | Eranol. |
| Algatan. | Ergostol Violet. |
| Algostérine Olivier. | Fénucine. |
| Antidiabétique Reclus. | Fénugrène. |
| Ampoules névrosthéniques | Fludiose. |
| Dausse. | Fondant iodotannique. |
| Androcalcion. | Forxol. |
| Androstine Ciba. | Fosfomagnyl. |
| Antasthène. | Fosfoxyl Carron. |
| Antiphi. | Fosyls Carron. |
| Ardogène. | Fucoiodine. |
| Arrhénuclène Bergevin. | Fucusol. |
| Arsécrinol. | Gaduase. |
| Arséniode Buriat. | Globules Fumouze à l'io- |
| Arsistrychnal Longuet. | dure de potassium. |
| Arsylène Roche. | Granules de Pantofort du |
| Arvensyl. | D ^r Boveil. |
| Biocatalyseur Rolland. | Hémagénine Giraud. |
| Biocéane. | Hémocytosérum Corbière. |
| Biogénol Demasle. | Hémostérine irradiée. |
| Bionéol. | Hémoviris. |
| Biotrigon. | Hépatomanganol. |
| Cachets Spévin. | Huile de foie de morue |
| Cacodyle Gonnon. | Rhône-Poulenc. |
| Cacodyline Jammes. | I. A. M. |
| Carottase. | Insuline Léo. |
| Cérébroil Leisyn. | Iodalose Galbrun. |
| Chlorhydrol Fouché. | Iodarsenic Guiraud (gouttes |
| Chophytol Rosa. | paidophiles). |
| Chophytol Rosa injectable. | Iodaubépine. |
| Cimarsényl. | Iode organique Boissy. |
| Colloïdogénine du D ^r Bayle. | Iodinjectol Jammes. |
| Créagénol. | Iodocalcium. |
| Créosal Dubois. | Iodogénol Pépin. |
| Crénocardine. | Iodomaisine Globules. |
| Curiodé. | Iodométine. |
| Curiodé arsénié. | Iodone Robin. |
| Cytomanganol Corbière. | Iodonucléol. |
| Cytopan. | Iodo-vitasine. |
| Cyto-sirop. | Ionyl. |
| Diabétosan. | Juglanrégine André. |
| Diasthogène Dehaussy. | Lécithine Vacheron. |
| Diastogène F. Dehaussy. | Lipiodol. |
| Dicallode. | Lipoiodine Ciba. |
| Doloma injectable. | Magiodyl. |
| Dysthène. | Mancobène. |
| Elixir Ducro. | Manganésia. |
| Eniode Lefebvre. | Mangano-phosphat Julien. |

VIII. — MALADIES DE LA NUTRITION ET PAR CARENCE. T. G.

ACCÉLÉRATEURS DE LA NUTRITION

| | |
|--|---------------------------------|
| Mangarsenic. | Quassine Houdé. |
| Mangratinés. | Quinoldine Duriez. |
| Marinol. | Quinquina Gmet. |
| Micelliode. | Reconstituant Mary. |
| Morrhualène Gautier. | Rectopaniline. |
| Morrhuétine Jungken. | Rhocya Dyn. |
| Morrhuétine Jungken vita- minée. | Riodine. |
| Morrhuxine. | Sanguil. |
| Morsine. | Sérifer Laurençon. |
| Murones du D ^r Robert Jacques. | Sérogine. |
| Néarsyte. | Sérum névrosthénique Frayse. |
| Néo-Rhomnol. | Sirop Girard. |
| Néo-Riodine. | Splényl. |
| Néo-Tannurgyl. | Sthénoléine. |
| Nervocithine Tissot. | Sthénoxal. |
| Neurocol. | Stimyl |
| Neurotrophol Byla. | Strychnal Longuet. |
| Nucléarsitol Robin. | Strychnarsitol Robin. |
| Nucléasine. | Sulfo-thiorine. |
| Nucléigène. | Sulfureux Pouillet. |
| Nucléophorène. | Sulfurion. |
| Nuclergol. | Sulfuryl Monal. |
| Oenophos. | Sulphium. |
| Okamine. | Surrasthénine. |
| Opophos. | Syphonéol. |
| Oxyol Leisyn. | Taburol Monal. |
| Paniode. | Térozone. |
| Panvita. | Tiodine Cognet. |
| Pepiodon Henry. | Tonax. |
| Peptone Vassal. | Tonuclyl. |
| Percalcine. | Tonudol. |
| Phosbiose. | Traphéine. |
| Phosoforme. | Uro-iodine. |
| Phosol. | Uvé (gouttes). |
| Phospharsol. | Uvéphorine. |
| Phosphate Pinard. | Vanadarsine Guillaumin. |
| Phosphonéol Demasles. | Vanucléol. |
| Phylla Dyn. | Vin de Vial. |
| Phytosplénol Plé. | Vin Girard. |
| Phytine Ciba. | Viosten. |
| Plasmarine. | Vitacurool Savare. |
| Plasmosthène. | Vioxyl Mounceyrat. |
| Prodynase. | Viradène |

VIII. — MALADIES DE LA NUTRITION ET PAR CARENCE. T. G.

DISSOLVANTS URIQUES — ANTI-GOUTTEUX

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Absuric. | Quinsal. |
| Algonal. | Rhocya Dyn. |
| Algophagine. | Salsanos. |
| Ampoules Reipar. | Salysérum. |
| Anégrine. | Sambul. |
| Antalgot Dalloz. | Sanoquinol Ciba. |
| Antialgos Christiaens. | Sédosalyl. |
| Antisciatique P. Chambon. | Sel hépatique U. N. Ar- |
| Antituriq. de Contrexé- | quevaux. |
| ville. | Sels Intar. |
| Ascéine. | Sels de Lithine efferves- |
| Atomine. | cents. |
| Atophan Cruet. | Séotral Leisyn. |
| Atophanyl. | Solurol. |
| Atoquinol Ciba | Solvuric. |
| Benzoiodhydrine. | Térozone. |
| Biliogastrine Cheillon. | Théocalciode. |
| Bisalicylate. | Ulmacétyl. |
| Cachets Van-Sol. | Uralysol. |
| Catalgine. | Uraseptine Rogier. |
| Citralin. | Urazine. |
| Colchi-Sal-Midy. | Uréol Chanteaud. |
| Crypthiol. | Urisluine. |
| Cynuroi Rosa. | Urisanine. |
| Dialyl. | Urobuccol Malmanche. |
| Diasclérol. | Uroclase. |
| Diurétique Gmet. | Uroflux. |
| Dolysine. | Uroformine Gobey. |
| Euphysol. | Uroiodine. |
| Gmet (extraits). | Urométhyl. |
| Gravural. | Urométine Lambiotte |
| Kodos. | Uromil. |
| Mésotinine Rhemda. | Urophényl. |
| Métaformine. | Urophile. |
| Métophan. | Uroquinol. |
| Novacétine Prunier. | Urozan Dufayard. |
| Orthogénol. | Urozéa. |
| Pipérazine Midy. | Viophan. |
| Pipérazyl. | |

MÉDICAMENTS D'ÉPARGNE

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Antidiabétique Monavon. | Gmet (extraits). |
| Biophorine Girard. | Insuline Léo. |
| Biotrigon. | Kola caféinée Aubert. |
| Composé Gmet. | Kola granulée Astier. |
| Diastogène Dehaussy. | Kola Monavon. |
| Diastogène F. Dehaussy. | Kolatines. |
| Disthène. | Maté-Douglas. |
| Elixir Ducro. | Pepto-kola Robin. |
| Extrait de Malt français | Peptomaltone Déjardin. |
| Déjardin. | Suppositoires Lagoutte. |
| Glycolaïne Robin. | Vin de Vial. |

VIII. — MALADIES DE LA NUTRITION ET PAR GARENCE. T. G.

PRODUITS VITAMINÉS — PRODUITS IRRADIÉS

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Algane. | Morubiasc. |
| Amunine. | Nucléasine. |
| Amylodiastase Thépenier. | Nucléigène. |
| Ascoléine Rivier. | Nuclergol. |
| Benzylcalcium. | Opocalcium irradié du Dr |
| Blédine Jacquemaire. | Guersant. |
| Calcoléol. | Opoferine vitaminée. |
| Carottase. | Oponuclyl irradié Trouette- |
| Crussol. | Perret. |
| Cytobiase. | Organi-calcion endocrinien. |
| Ergorone. | Pangaduine. |
| Ergostol Violet. | Pangermine. |
| Extrait de malt français | Panvita. |
| Déjardin. | Phosphates du Dr Pinard. |
| Fixase irradiée. | Phylla Dyn. |
| Flétase. | Phytine Ciba. |
| Fortossan irradié. | Phytogyl. |
| Gaduamine. | Phyto-vitamines Plé. |
| Gaduase. | Sanas. |
| Hémostérine irradiée. | Splénomanganol. |
| Huile de foie de morue mé- | Splényl. |
| dicinale suractivée Rhône- | Stérogyl. |
| Poulenc. | Ultravitamine 4. |
| Irrastérine. | Uvéphorine. |
| Jécofluy. | Uvestérol. |
| Léotamine. | Véguya. |
| Levure Mycéta (compri- | Vigostérol. |
| més). | Vin Lux Gaillac mousseux. |
| Levure Zymaculine. | Viosten. |
| Levuro-maltine Déjardin. | Vitacalcine Moncour. |
| Lipovita. | Vitacholine. |
| Maltéa Moser. | Vitadone. |
| Malt français Déjardin (ex- | Vitaglyc. |
| trait de). | Vitamine Cortial. |
| Maltosan. | Vitaminol. |
| Malt Wander ou Gloma. | Vitamorrhueine. |
| Marimine. | Vitamyl irradié. |
| Minergil. | Vitène. |
| Morisland irradié. | Vitacurool Savare. |
| Morrhuéine Jungken. | Vivoléol. |
| Morrhuéine Jungken vita- | Zomine. |
| minée. | Zymatine irradiée |

RÉGULATEURS DE LA NUTRITION

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Adrénaline Clin. | Algonal. |
| Adrénaline Invar. | Antisciatique P. Chambon. |
| Adrénaline Sauba. | Cachets Spévin. |
| Adrénine. | Calmaby. |
| Adrénoïdes Béral. | Catalgine. |

VIII. — MALADIES DE LA NUTRITION ET PAR CARENCE. T. G.

RÉGULATEURS DE LA NUTRITION

| | |
|---|---------------------------|
| Chlormagnésium Fisch. | Magnéso-tubes Robinet. |
| Chloromagnésion. | Mésothorium Buisson. |
| Chlorure d'ammonium | Nuphos. |
| Bréant. | Oenophos. |
| Cholépan Longuet. | Opophos. |
| Chophytol Rosa. | Orthogénol. |
| Colloïdine Laleuf. | Panostyl. |
| Colloïdogénine du D ^r Bayle. | Pandrénaline. |
| Colloïde Dubois. | Phosphonine Soulié. |
| Ektophanol. | Plasmarine. |
| Endodermol. | Réalphène. |
| Euchol Morellet. | Recrésal. |
| Euglyma. | Réparateur Thuau. |
| Fosfoxyl Carron. | Sérobiol. |
| Fucus Gmet. | Sulfur concentré Dax. |
| Gérol Testart. | Syphonéol. |
| Glandex phoscalcique. | Tanno-calcine. |
| Granulé Cabasson. | Théocalciodé. |
| Hémocalcine. | Thyroidine. |
| Hépalomel Védé. | Triglandol. |
| Hormocrinol. | Uroclase. |
| Ionyl. | Vin antidiabétique Talon. |
| Jugland Gmet. | Viosten. |
| Kodos. | Virmonal Piam. |
| Lipoïdine Ciba. | Viscosérum. |
| Magnésium Hardy. | Zymatine irradiée. |

VIII. — MALADIES DE LA NUTRITION ET PAR CARENCE. T. S.

ACÉTONÉMIE

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Voir aussi : | Insuline Léo. |
| <i>Régulateurs de la nutrition.</i> | Insulyl Roussel. |
| Antidiabétique Requis. | Juglane. |
| Comprimés Vichy-État. | Oxyol Leisyn. |
| Insuline Buccale Fornet. | Phosoforme. |
| Insuline Byla. | Salvé. |

ALCALOSE

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Voir aussi : | Ionyl. |
| <i>Régulateurs de la nutrition.</i> | Oenophos. |
| Actiphos. | Oxyol Leisyn. |
| Chlorure d'ammonium | Phosoforme. |
| Bréant. | Saint-Aré. |
| Génacide. | Sélamon. |
| | Uroclase. |

VIII. — MALADIES DE LA NUTRITION ET PAR CARENCE. T. S.

ARTHRITISME

Voir aussi :

Analgésiques externes.
Analgésiques internes.
Diététique.
Dissolvants uriques.
Diurétiques.
Instrumentation.
Opothérapie.
Rhumatismes chroniques.
 Absuric.
 Actiphos.
 Adipolysine.
 Alcamfétol.
 Algophagine.
 Algonal.
 Ampoules Boissy Iodure de Potassium.
 Antiurique de Contrexéville.
 Arséniode Buriat.
 Arthrilax.
 Arvensyl.
 Atophan Cruet.
 Atophanyl.
 Atoquinol Ciba.
 Azufrol.
 Bain carbogazeux Wolo.
 Bain Carré.
 Bain Salvia.
 Baumolacpinine.
 Bi-Citrol Marinier.
 Biliogastrine Chevillon.
 Bisalicylate.
 Bolcitol.
 Calcozymase.
 Calmaby.
 Caparlem.
 Capsules Haarlem Bardet.
 Carboiodure Traudin.
 Chlomag.
 Choléine lactique.
 Citralin.
 Collo-iodé Dubois.
 Curiode.
 Curiode arsénié.
 Cynurol Rosa.
 Décholestrol.
 Dépurgatif Rob Lechaux.

Dépuriode du Dr Roger Weber.
 Dialyl.
 Diasclérol.
 Dolophos.
 Dolysine.
 Ektophanol.
 Elgine Julien.
 Eniode Lefebvre.
 Equisétol.
 Eranol.
 Euphysol.
 Fosfoxyll Carron.
 Fosyls Carron.
 Globules Fumouze à l'iodure de potassium.
 Gmet (extraits).
 Granulé Cabasson.
 Gravural.
 Hépalomel Védé.
 Hexotal.
 Hydroxydase.
 Inorénol.
 Iodalose Galbrun.
 Iodassium.
 Iodex.
 Iodinjectol Jammes.
 Iodogénol Pépin.
 Iodo-Maisine globules.
 Iodométine.
 Iodone Robin.
 Iodonésyl.
 Iodonucléol.
 Jécosluyt.
 Kodos.
 Levure fraîche Mycéta.
 Lipiodol Lafay.
 Lipoiodine Ciba.
 Litharsyne.
 Lysarthrol.
 Magiodyl.
 Mésothine Rhemda.
 Mésothorium Buisson.
 Mésothorium Rhemda.
 Métacitrine.
 Métaformine.
 Micelliode.
 Morisland.
 Myoden.
 Néo-Riodine.

VIII. — MALADIES DE LA NUTRITION ET PAR CARENCE. T. S.

ARTHRITISME

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Néo-Séti. | Sulfobyl. |
| Nitroyl Leisyn. | Sulfoïdol Robin. |
| Novacétine Prunier. | Sulfolax. |
| Nuphos. | Sulfo-thiorine. |
| Opochol. | Sulfur concentré Dax. |
| Orthogénol. | Sulfureux Pouillet. |
| Ozothine. | Sulfurion. |
| Panbil. | Sulfuryl Monal. |
| Paniode. | Sulphium. |
| Paradoline. | Suppoalgos Lagoutte. |
| Pépiodon Henry. | Térozone. |
| Phosoforme. | Théocalciode. |
| Phosphonine Soulié. | Thiocitran Thévenot. |
| Pipérazine Midy. | Thiorine. |
| Pipérazyl. | Thorix (Thorium X Rhem- da). |
| Poudre Danica. | Tiliane. |
| Progaster. | Tiodine Cognet. |
| Pyrélaïne Collas. | Trisaly. |
| Recrésal. | Triseptine. |
| Rectopaniline. | Trynol. |
| Rhésal Vicario. | Ulmacétyl. |
| Rhocya Dyn. | Ulmarène Gigon. |
| Riodine. | Uralysol. |
| Romarène. | Uraseptine Rogier. |
| Salsanos. | Uréol Chanteaud. |
| Salysérum. | Urisfluine. |
| Sanoquinol Ciba. | Uroclase. |
| Santhéose. | Uroflux. |
| Sédosalyl. | Uroformine Gobey. |
| Sel hépatique U. N. Ar- quevaux. | Uroïodure. |
| Sels Intar. | Urométhyl. |
| Sels de lithine efferves- cents. | Urométine Lambiotte. |
| Sel Pennès. | Uromil. |
| Selunic. | Urophényl. |
| Sérobiol. | Urophile. |
| Seti. | Uroquinol. |
| Silicyl. | Uro-Tisan. |
| Sodothiol. | Urozan Dufayard. |
| Solurol. | Urozéa. |
| Solvuric. | Viophan. |
| Stopral. | Virmonal Piam. |
| Sufrolax Crosnier. | Vulcase. |
| Sulfarsiode. | Zymatine Lescène. |

VIII. — MALADIES DE LA NUTRITION ET PAR CARENCE. T. S.

ASTHÉNIE — SURMENAGE CONVALESCENCES

Voir aussi :

Accélérateurs de la Nutrition.

Diététique.

Instrumentation.

Opothérapie.

Produits vitaminés.

Toniques. — Reminéralisants. — Recalcifiants.

Adral.

Adrénaline Clin.

Adrénaline Invar.

Adrénaline Sauba.

Adrénine.

Adrénocalcine.

Adrénoïdes Béral.

Algane.

Algotan.

Algotérine Oliviero.

Ampoules névrosthéniques Dausse.

Amunine.

Anacamphre.

Androsthénol.

Angitan.

Antasthène.

Antiphi.

Appétyl.

Arcica.

Ardogène.

Arrhénuclène Bergevin.

Arsécrinol.

Arséniode Buriat.

Arsistrychnal Longuet.

Arsylène Roche.

Ascoléine Rivier.

Bain Carré.

Balnéradol.

Baumolacpinine.

Benzylocalcium.

Biocalcose.

Biocatalyseur Rolland.

Biocéane.

Biodynamine.

Biodynol.

Biogénol Demasles.

Bionéol.

Biophorine Girard.

Biosine Le Perdriel.

Biotrignon.

Bióvigorine.

Cachets Spévin.

Cacodyle Gonnon.

Cacodyline Jammes.

Cadior.

Calciline.

Calci-sthénine.

Calcium Sandoz. —

Calcium Francalcion.

Calcivitam.

Calmaby.

Carbotrignon.

Carnine Lefrancq.

Catalyl Mg.

Cérébro-Lipase.

Cérébroïl Leisyn.

Cérébrosthénine Dalin.

Céréossine Dehaussy.

Céréossine irradiée Dehaussy.

Chlorical.

Chlormagnésium.

Chloro-magnésion.

Cholergine.

Cimarsényl.

Cinalose.

Cinnozyl.

Clupeyl.

Colloidogénine du Dr Bayle.

Composé Gmet.

Créagénol.

Crinhémol.

Crinocardine.

Crino-Sérum.

Crino-sthényl.

Cytomagnésium Oliviero.

Cyto-Manganol Corbière.

Cyto-Sérum Corbière.

Cytopan.

Cyto-sirop.

Delbiase.

Dialyl.

Diastogène Dehaussy.

Diastogène F. Dehaussy.

Dialstabiline.

Dolophos.

Dragées névrosthéniques.

VIII. — MALADIES DE LA NUTRITION ET PAR CARENCE. T. S.

ASTHÉNIE — SURMENAGE CONVALESCENCES

| | |
|---------------------------------|--|
| Dynosthène. | Gouttes phosphosthéniques |
| Elixir Ducro. | Dausse. |
| EnerGINE iodée de Berck. | Gouttes Magalo. |
| EnerGINE phosphorée de Berck. | Granoxyl. |
| Ergostol Violet. | Granulé Cabasson. |
| Eufosyl Vély. | Granules Chanteaud. |
| Euglyma. | Granules de Pantofort du Dr Boveil. |
| Exhépa. | Hectine. |
| Fa-Ner-Val. | Hémagénine Giraud. |
| Fénucine. | Hémoantitoxine Sofos. |
| Fénugrène. | Hémocalcine. |
| Fénurobur. | Hémo - cyto sérum Corbière. |
| Férandrine Vitalis. | Hémogénol Dausse. |
| Fer intraveineux Fraisse. | Hémoglobine Deschiens. |
| Fer Larcade. | Hémopaniline. |
| Ferrovarine Vitalis. | Hémo-phagostyl. |
| Ferrophytine Ciba. | Hémoplasme Lumière. |
| Férydal. | Hémo plasmine du Dr Morelli. |
| Fixase. | Hémostra Roche. |
| Fixase irradiée. | Hémostyl. |
| Flétase. | Hémotal. |
| Fludiosc. | Hémoviris. |
| Fluodyle. | Hépacrine. |
| Fluoganèse. | Hépagyl. |
| Fortossan Ciba. | Hépaphos. |
| Fortossan irradié. | Hépatrol. |
| Forxol. | Hépatrol injectable. |
| Fosfomagnyl. | Hipposarcine Roy |
| Fosfoxyl Carron. | Histogénol. |
| Fosyls Carron. | Holos. |
| Francalcion. | Hormocline. |
| Gaduase. | Hormovitol. |
| Gasthréma. | Hormuclases. |
| Gaurol. | Huile de foie de morue médicinalesuractivée Rhône-Poulenc. |
| Génacide. | Hydroxydase. |
| Génosthéniques (gouttes). | I. A. M. |
| Génostrychnine. | Ifranol. |
| Gérol Testart. | Iodarsénic Guiraud. |
| Glandex phoscalcique. | Iodocalcium. |
| Glandimbine Lafran. | Ionyl. |
| Glandocalcyl. | Jemalt Wander. |
| Globexine. | Juglanrégine André. |
| Glycérophosphate Dalloz. | Kola caféinée Aubert. |
| Glycérophosphate Robin. | Kola granulée Astier. |
| Glycétone phosphatée Charrière. | |
| Glykolaïne Robin. | |

VIII. — MALADIES DE LA NUTRITION ET PAR CARENCE. T. S.

ASTHÉNIE — SURMENAGE CONVALESCENCES

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Kola Monavon. | Opocalcium du D ^r Guer- |
| Kolatines. | sant. |
| Lauriatol. | Opocalcium irradié du D ^r |
| Lécithine Vacheron. | Guersant. |
| Limol Churchill. | Opocobalt. |
| Lipocérébrine Chevreton. | Oponuclyl irradié Trouette- |
| Liposplénine du D ^r Groc. | Perret. |
| Lipovita. | Opophos. |
| Logaphos. | Opostyl Bouty. |
| Magiodyl. | Orcalcine. |
| Magnésium Hardy. | Orex. |
| Magnéso-tubes Robinet. | Organi-calcion simple et |
| Magnogène. | endocrinien. |
| Mancobène. | Orthogénol. |
| Mangano-Phosphal Julien. | Orthozomine. |
| Mangarsenic. | Ostéogène. |
| Mangratinés. | Ozobiase. |
| Marinol. | Ozobiase opothérapique. |
| Maté Douglas. | Pancrinol du D ^r Debat. |
| Malt Pailleté. | Pancalcion. |
| Mésothorium Buisson. | Pandrénaline. |
| Mésothorium Rhemda. | Pangaduine. |
| Minergil. | Panostyl. |
| Morisland irradié. | Panvita. |
| Morrhualène Gautier. | Panxylon. |
| Morrhuéline Jungken. | Parathyrocalcine Moncour. |
| Morrhuéline Jungken vita- | Pepto Kola Robin. |
| minée. | Peptone Vassal |
| Morrhuxine. | Percalcine. |
| Morsine. | Persodine Lumière. |
| Morubiase. | Phagostyl. |
| Musculosine Byla. | Phagostyl Mangané. |
| Néoarsite. | Phosbiose. |
| Néo-calciline. | Phoscamine. |
| Néo-Neurosine Prunier. | Phosoforme. |
| Néo-Rhomnol. | Phosol. |
| Néo-Tannurgyl. | Phospharsol. |
| Nervocithine Tissot. | Phospho-Fluor Beynet. |
| Neurotrophol Byla. | Phospholéose Demasles. |
| Névrosthénine Freyssinge. | Phosphonine Soulié. |
| Nucléarsitol Robin. | Phosphopinal Juin. |
| Nucléasine. | Phostyl |
| Nucléatol Robin. | Phylla Dyn. |
| Nucléigène. | Phytine Ciba. |
| Nucléophorène. | Phytogénine Byla. |
| Nuclergol. | Phytogyl. |
| Nuphos. | Phyto Lécithine. |
| Oenophos. | Phytosplénol Plé. |
| Okamine. | Phyto-vitamines Plé. |

VIII. — MALADIES DE LA NUTRITION ET PAR CARENCE. T. S.

ASTHÉNIE — SURMENAGE CONVALESCENCES

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Plasma de Quinton. | Stérogyl. |
| Plasmarine. | Stimyl. |
| Plasmosthène. | Stovafer. |
| Plurion. | Strychnal Longuet. |
| Pneumo-Lipase. | Strychnarsitol Robin. |
| Poliol Churchill. | Surrasthénine. |
| Prodynase. | Syphonéol. |
| Progaster. | Taburol Monal. |
| Prosthénase Galbrun. | Tanno-calcine. |
| Protonic. | Terpoxyl interne. |
| Quassia-Kina Rabot. | Thalassotonine Vadam. |
| Quergémol. | Thorium X Rhemda. |
| Quina Baron. | Thorix. |
| Quina pepsiné Blot. | Tonax. |
| Quinarsol antianémique. | Tonikéine Chevreton. |
| Quinéine. | Tonique Gonnon. |
| Quiniophytine. | Tonique Roche. |
| Quinoidine Duriez. | Tonuclyl. |
| Quinquina Gmet. | Tonudol. |
| Radiogastrol. | Total-Tonic. |
| Réalphène Buisson. | Traphéine. |
| Reconstituant Mary. | Tréphonyl. |
| Recrésal. | Ultravitamine 4. |
| Réparateur Thuau. | Uvé (gouttes). |
| Rhizotantin. | Uvéphorine. |
| Rhomonol. | Uvéstérol. |
| Salicylate de soude Clin. | Vanadarsine Guillaumin. |
| Sanas. | Vanucléol. |
| Sanguil. | Végéphos. |
| Sels Intar. | Vigostérol. |
| Sérifer Laurençon. | Vin de Baudon. |
| Sérobiol. | Vin de Bugeaud. |
| Sérogène. | Vin de Carnéose. |
| Séroma Rey. | Vin Girard. |
| Sérosthényl Bouty. | Vin Raimoa Tonic. |
| Sérum Neuropsychique. | Vin de Vial. |
| Sérum Névrosthénique. | Viosten. |
| Fraisse. | Vioxyl Mouneyrat. |
| Sérum Oliviero. | Viradène. |
| Sirop Girard. | Virmonal Piam. |
| Sirop de Lovel. | Visco-sérum. |
| Solution quinquina Bardet. | Vitacalcine Moncour. |
| Spectrol. | Vitacholine. |
| Splénarmone. | Vitacrine. |
| Spléno-Magnésium | Vitagermine. |
| Splénomanganol. | Vitamine Cortial. |
| Splényl. | Vitaminol. |
| Sthénoléine. | Vitamorrhéine. |
| Sthénoxal. | Vitamyl. |

VIII. — MALADIES DE LA NUTRITION ET PAR CARENCE. T. S.

ASTHÉNIE — SURMENAGE CONVALESCENCES

Vitastérol.
Vitène.
Vivoléol.
Zymatine irradiée.

Zimbyl.
Zomine.
Zoocythine.
Yo-Androl.

AVITAMINOSE

Voir aussi :

Diététique.
Instrumentation.
Produits irradiés.

Algane.
Aminine.
Amylodiastase Thépenier.
Ascoléine Rivier.
Benzylcalcium.
Calcoléol.
Carottase.
Comprimés Levure Mycéta.
Crescol Buisson.
Cytobiase.
Ergorone.
Flétase.
Fortossan irradié.
Huile de foie de morue
médicinale suractivée
Rhône-Poulenc.
Marimine.
Morisland.

Opocalcium irradié du D^r
Guersant.
Oponuclyl irradié Trouette-
Perret.
Organi-calcion endocrinien.
Pangaduine.
Phylla Dyn.
Phyto-vitamines Plé.
Splényl.
Ultravitamine 4.
Uvéphorine.
Uvestérol.
Véguva.
Viosten.
Vitacalcine Moncour.
Vitadone.
Vitagermine.
Vitaminol.
Vitamorrhaine.
Vitamyl.
Vitène.
Vivoléol.
Zymatine irradiée.
Zimbyl.

DIABÈTE

Voir aussi :

Diététique.
Furunculose.
Opothérapie.
Régulateurs de la nutrition.

Antidiabétique Monavon.
Antidiabétique Requis.
Arcica.
Canol.
Catalyl Mg.
Chéralys (comprimés).
Cholépan Longuet.
Chophytol Rosa.
Citralin.

Décholestrol.
Diabétifuge.
Diabétosan.
Diasclérol.
Dosurine (trousses).
Endopancrine.
Fénucine.
Ferment pur de raisin.
Fosfoxyl Carron.
Fosyls Carron.
Granulé Cabasson.
Hépto-Manganol.
Illoglandol « Roche ».
Insuline buccale Fornet.
Insuline Byla.

VIII. — MALADIES DE LA NUTRITION ET PAR CARENCE. T. S.

DIABÈTE

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Insuline Léo. | Pilules lithuranées du Dr |
| Insutyl. | Boveil. |
| Ionyl. | Pipérazine Midy. |
| Jugland Gmet. | Pipérazyl. |
| Juglanc. | Plasmarine. |
| Lécithine Vacheron. | Plasmosthène |
| Léotamine. | Pommade Fornet. |
| Levure fraîche Mycéta. | Prodynase. |
| Lobuline. | Progaster. |
| Magol Churchill. | Quina Pepsiné Blot. |
| Manganésia. | Quinarsol antianémique. |
| Mangano-Phosphal. | Quinino-phytine Ciba. |
| Mangarsenic. | Recrésal. |
| Minergil. | Sambul. |
| Nuphos. | Sanas. |
| Œnophos. | Sels de lithine effervescents. |
| Opochol. | Sérobiol. |
| Orthogénol. | Sinahin. |
| Ovaire Iscovesco. | Sucre Edulcor. |
| Oxyol Leisyn. | Synthaline B. |
| Ozobiase. | Total-Tonic. |
| Pain Redeuil. | Ulcéosine. |
| Pancréanne. | Vagotonine. |
| Pancrépatine Laleuf. | Vin antidiabétique Talon. |
| Panvita. | Vin de Bugeaud. |
| Pepto-Kola Robin. | Vitaglyc. |
| Phosoforme. | Vioxyl Mouneyrat. |
| Phosphonine Soulié. | Virmonal Piam. |
| Pilules du Dr Séjournet | Vitamyl. |
| | Zoocythine. |

GOUTTE

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Voir aussi : | Antalgol Dalloz. |
| <i>Accélérateurs de la nutri-</i> | Antialgos Christiaens. |
| <i>tion.</i> | Antiphlogistine. |
| <i>Cataplasmes. — Révulsifs.</i> | Antiurique de Contrexé- |
| <i>Diététique.</i> | ville. |
| <i>Dissolvants uriques anti-</i> | Arthrilax. |
| <i>goutteux.</i> | Ascéine. |
| <i>Opothérapie.</i> | Atomine. |
| Absuric. | Atophan Cruet. |
| Aigue d'Or. | Atophanyl. |
| Alcamfétol. | Atoquinol Ciba. |
| Algatan. | Baume Adol. |
| Algophagine. | Baume Aroma. |
| Algonal. | Baume Bengué |
| Ampoules Reipar. | Baume Lartigol. |
| Anaclasine. | Benzo-iodhydride. |
| Anégrine. | Bétul-Ol Midy. |
| | Bi-Citrol Marinier. |

VIII. — MALADIES DE LA NUTRITION ET PAR CARENCE. T. S.

GOUTTE

- | | |
|---|--------------------------------|
| Billogastrine Cheillon. | Iodonucléol. |
| Buccurol. | Iodurase. |
| Bulgarine Thépenier. | Iodure Pachaut. |
| Cachets du Dr Boveil. | Irénine Gonnon. |
| Cachets Van Sol. | Ixium Buisson. |
| Calcozymase. | Jécofluyl. |
| Calmant Meunier. | Kalmigraine. |
| Caparlem. | Levure fraîche Mycéta. |
| Capsules Haarlem Bardet. | Lipiodol Lafay. |
| Catalgine. | Lipoiodine Ciba. |
| Citralin. | Lysarthrol. |
| Causyth. | Magiodyl. |
| Citrofluyl. | Mésothine Rhemda. |
| Colchi-Sal Midy. | Mésothorium Rhemda. |
| Collo-Iode Dubois. | Métacitrine. |
| Cryogénine Lumière. | Métaformine. |
| Crypthiol. | Métophan. |
| Cynurol Rosa. | Micelliode. |
| Décholestrol. | Myoden. |
| Dépuratif Rob Lechaux. | Néalgyl Bottu. |
| Dépuriodé du Dr Roger Weber. | Néo-Riodine. |
| Dialyl. | Novacétine Prunier. |
| Diasclérol. | Opochol. |
| Dicaliode. | Orthogénol. |
| Diurétique Gmet. | Ozothine. |
| Dolysine. | Paradol. |
| Ektophanol. | Pépiodon. |
| Elgine Julien. | Phosoforme. |
| Eranol. | Pipérazine Midy. |
| Globules Fumouze à l'iodure de potassium. | Pipérazyl. |
| Gmet (extraits). | Polyiodure Gonnon. |
| Granules Chanteaud. | Pyrélaïne Collas. |
| Gravural. | Pyréthane. |
| Guipsine. | Rhésal Vicario. |
| Guifose. | Rhocya Dyn. |
| Hexaranol. | Riodine. |
| Hexotal. | Salénal Ciba. |
| Hydroxydase. | Salène Ciba. |
| Iodalose Galbrun. | Salsanos. |
| Iodassium. | Salysérum. |
| Iodex. | Sambul. |
| Iodhéma. | Sanoquinol Ciba. |
| Iodinjectol Jammes. | Santhéose. |
| Iodogénol Pépin. | Sel Hépatique U. N. Arquevaux. |
| Iodo-Maisine Globules. | Sels Intar. |
| Iodométine. | Sels de Lithine effervescents. |
| Iodone Robin. | Séotral Leisyn. |
| Iodonésyl. | Sodésyl. |

VIII. — MALADIES DE LA NUTRITION ET PAR CARENCE. T. S.

GOUTTE

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Sodogastrol. | Uraseptine Rogier. |
| Sodothiol. | Urazine. |
| Soluro. | Uréol Chanteaud. |
| Solvurie. | Uribiline. |
| Spécifique Béjean. | Urisanine. |
| Stopral. | Urobuccol Malmanche. |
| Sulfo-thiorine. | Uroclase. |
| Sulfureux Pouillet. | Uroflux. |
| Sulfurion. | Uroformine Gobey. |
| Sulfuryl Monal. | Uroiodine. |
| Sulphium. | Urométhyl. |
| Suppoalgos Lagoutte. | Urométine Lambiotte. |
| Térozone. | Uromil. |
| Théosalvose. | Urophényl. |
| Théoxanthine. | Urophile. |
| Thiorine. | Uroquinol. |
| Thorix. — (Thorium X Rhémida). | Urosan Dufayard. |
| Tiodine Cognet. | Urozéa. |
| Ulmacétyl. | Veralgine. |
| Uralysol. | Viophan. |

OBÉSITÉ

Voir aussi :

| | |
|--------------------------------|---|
| Accélérateurs de la nutrition. | Dépuriodé du Dr Roger Weber. |
| Diététique. | Dialyl. |
| Opothérapie. | Diasclérol. |
| Régulateurs de la nutrition. | Dicaliode. |
| Adipolysine. | Dinitra Dyn. |
| Algatan. | Dragécalcion. |
| Androsthénol. | Endo-ovarina. |
| Androstine Ciba. | Endothymusine. |
| Anti-urique de Contrexéville. | Endoxidine. |
| Arthrila. | Eniode Lefebvre. |
| Benzo-Iodhydrine. | Eranol. |
| Bi-Citrol Marinier. | Fer-Ovarine Vitalis. |
| Cachets Spévin. | Follestrine Grémy. |
| Chophytol Rosa. | Follicormone buccale Hinglais. |
| Chophytol Rosa injectable. | Folliculine Crinex. |
| Colloïdine Laleuf. | Folliculine Cristallisée du Dr Roussel. |
| Collo-Iode Dubois. | Fucus Gmet. |
| Crinex. | Fucusol. |
| Crino-sérum. | Globules Fumouze iodure de potassium. |
| Crypthiol. | Gravural. |
| Curiode. | Gyncestryl. |
| Décholestrol. | Hépat-Manganol. |
| Dépuratif Rob Lechaux. | Holovarine. |

VIII. — MALADIES DE LA NUTRITION ET PAR CARENCE. T. S.

OBÉSITÉ

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Hormocrinol. | Orthogénol. |
| Hormovarine Byla. | Oxydothyryne Paris. |
| Iodalose Galbrun. | Panglandine Couturieux. |
| Iodassium. | Paniodé. |
| Iodaubépine. | Pepiodon. |
| Iodinjectol Jammes. | Rhocya Dyn. |
| Iodogénol Pépin. | Riodine. |
| Iodo-Maisine Globules. | Salsanos. |
| Iodométine. | Sanoquinol. |
| Iodone Robin. | Sels Intar. |
| Iodonésyl. | Sélunio. |
| Iodonucléol. | Sodésyl. |
| Iodo-Thyroïdine Catillon. | Sodogastrol. |
| Iodurase. | Théocalciode. |
| Iodure Pachaut. | Thyrocréine Grémy. |
| Jécofluy. | Thyroïdine. |
| Hydroxydase. | Thyroxine Roche. |
| Kodos. | Tiodine Cognet. |
| Lipiodol Lafay. | Triglandine. |
| Lipiodine Ciba. | Triglandol. |
| Lysarthrol. | Uroïdine. |
| Magiodyl. | Valovarine. |
| Micelliode. | Vascurol. |
| Néo-Riodine. | Vichy-purgatif. |
| Opochol. | |

PHOSPHATURIE

Voir aussi :

*Toniques. — Reminérali-
sants. — Recalcifiants.*

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Adrénaline Clin. | Fixase. |
| Adrénaline Invar. | Fixase irradiée. |
| Adrénaline Sauba. | Fosfomagnyl. |
| Adrénine. | Fosfoxyl Carron. |
| Adrénocalcine. | Fosyls Carron. |
| Adrénoïdes. | Glandex Phoscalcique. |
| Antiphi. | Granulé Cabasson. |
| Arsécrinol. | Hémocalcine. |
| Benzylocalcium. | Hexotal. |
| Biosine. | Holos. |
| Calcigénol Pinard. | Hormovitol. |
| Colloïdogénine du Dr Bayle. | Ionyl. |
| Cyto-sirop. | Lécithine Vacheron. |
| Dolophos. | Limol Churchill. |
| Doloma. | Lipovita. |
| Doloma injectable. | Logaphos. |
| Dysthène. | Mangano-Phosphal Julien. |
| Elixir Ducro. | Mancobène. |
| Fénucalcium. | Néo-Tannurgyl. |
| | Neuropol. |
| | Neurosine Prunier. |
| | Nucléigène. |
| | Nuclergol. |

VIII. — MALADIES DE LA NUTRITION ET PAR CARENCE. T. S.

PHOSPHATURIE

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Nuphos. | Phytosplénol Plé. |
| Œnophos. | Plasmarine. |
| Opocalcium du D ^r Guer- | Plasmosthène. |
| sant. | Poliol Churchill. |
| Opocalcium irradié du D ^r | Prodynase. |
| Guersant. | Radiogastrol. |
| Opocobalt. | Recrésal. |
| Opophos. | Rhomnol. |
| Pandrénaline. | Sanas. |
| Pangaduine. | Sanguil. |
| Parathyrocalcine Moncour. | Sérobiol. |
| Peptomaltone Dejardin. | Sur-Bi-Cal. |
| Percalcine. | Tanno-calcine. |
| Phosoforme. | Tonax. |
| Phospharsol. | Uraseptine Rogier. |
| Phosphates du D ^r Pinard. | Urosan Dufayard. |
| Phosphate Vital de Jacque- | Uro-Tisan. |
| maire. | Uvéphorine. |
| Phospho-Fluor Beynet. | Uvéstérol. |
| Phosphonine Soulié. | Végéphos. |
| Phostyl. | Viosten. |
| Phytine Ciba. | Virmonal Piam. |
| Phytogénine Byla. | Vitamine Cortial. |
| Phytogyl. | Vitène. |

RACHITISME — LYMPHATISME — ATHREPSIE TROUBLES DE LA CROISSANCE

Voir aussi :

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Anorexie. | Amylodiastase Thépenier. |
| Bains. | Androsthénol. |
| Dietétique. | Antasthène. |
| Eupeptiques. | Antiphi. |
| Instrumentation. | Arcica. |
| Opothérapie. | Ardogène. |
| Produits vitaminés. | Arsécrinol. |
| Toniques. — Reminérali- | Arséniode Buriat. |
| sants. — Recalcifiants, | Arsylène Roche. |
| | Ascoléine Rivier. |
| Adral. | Bactioxyne. |
| Adrénaline Clin. | Bain Carré. |
| Adrénaline Invar. | Baume Lartigol. |
| Adrénaline Sauba. | Baumolacpinine. |
| Adrénine. | Benzylocalcium. |
| Adrénocalcine. | Biocalcose. |
| Adrénoides Béral. | Biocéane. |
| Algane. | Bionéol. |
| Algatan. | Biosine Le Perdriel. |
| Algostérine Oliviero. | Biotrigon. |
| Amunine. | Cachets Roche de Thiocol. |
| | Calciline. |

VIII. — MALADIES DE LA NUTRITION ET PAR CARENCE. T. S.

RACHITISME — LYMPHATISME — ATHREPSIE TROUBLES DE LA CROISSANCE

| | |
|--|---|
| Calci-Sténine. | Energine phosphorée de Berck. |
| Calcional. | Eniode Lefebvre. |
| Calcium Francalcion. | Epical. |
| Calcium Sandoz. | Ergostol Violet. |
| Calcivitam. | Eranol. |
| Calcoléol. | Ergorone. |
| Carbotrignon. | Fénucine. |
| Carnine Lefrancq. | Fenugrène. |
| Carottase. | Fenurobur. |
| Cérébrosthénine Dalin. | Ferrophytine Ciba. |
| Céréossine Dehaussy simple. | Férydal. |
| Céréossine Dehaussy irradiée. | Fixase. |
| Chlorical. | Fixase irradiée. |
| Chloro-Calcion. | Flétase. |
| Cimarsényl. | Fludiose. |
| Cinnozyl. | Fluoganèse. |
| Clupéyl. | Fortossan Ciba. |
| Collo-iode Dubois. | Fortossan irradié. |
| Colloïdogénine du D ^r Bayle. | Forxol. |
| Comprimés Roche de Thio-col. | Fosfomagnyl. |
| Créagénol. | Fosfoxyl. |
| Créosal Dubois. | Fosyls. |
| Crescogénol. | Francalcion. |
| Crinhémol. | Fucoglycine du D ^r Gressy. |
| Crino-sérum. | Fucus Gmet. |
| Crino-stényl. | Gaduamine. |
| Crussol. | Gaduase. |
| Curiode. | Gasthréma. |
| Curiode arsénié. | Gaurol. |
| Cytobiase. | Génosthéniques (gouttes). |
| Cyto-Manganol Corbière. | Gérol Testart. |
| Cytopan. | Glandocalcyl. |
| Cyto-sérum Corbière. | Globexine. |
| Cyto-sirop. | Glycérophosphate Dalloz. |
| Dépuriodé du D ^r Roger Weber. | Glycérophosphate Robln. |
| Diastogène Dehaussy. | Glyctone phosphatée Charrière. |
| Dicaliode. | Gmet (extraits). |
| Doloma. | Granoxyl. |
| Doloma injectable. | Granulé Cabasson. |
| Dolophos. | Granules de Pantofort du D ^r Boveil. |
| Dragécalcion. | Hémagénine Giraud. |
| Dryco. | Hémato-Iodine. |
| Elixir Ducro. | Hémoantitoxine Sofos. |
| Endothymusine. | Hémocalcine. |
| Energine iodée de Berck. | Hémo-Cyto-Sérum Corbière |
| | Hémoglobine Deschiens. |

VIII. — MALADIES DE LA NUTRITION ET PAR CARENCE. T. S.

RACHITISME — LYMPHATISME — ATHREPSIE TROUBLES DE LA CROISSANCE

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Hémopanbiline. | Mancobène. |
| Hémophagostyl. | Mangano-Phosphal Julien. |
| Hémoplasé. | Mangratinés. |
| Hémoplasmine. | Marimine. |
| Hémostérine irradiée. | Marinol. |
| Hémostra. | Marrucol. |
| Hémostyl. | Mésothorium Rhemda. |
| Hémotal. | Micelliode. |
| Hémovirís. | Minergil. |
| Hépacrine. | Morisland irradié. |
| Hépagyl. | Morrhualène Gautier. |
| Héparfer. | Morrhuéline Jungken vita- |
| Hépaphos. | minée. |
| Hépartergol. | Morrhuxine. |
| Hépatrol. | Morsine. |
| Hépatrol injectable. | Morubiase. |
| Histogénol. | Murones du D ^r Robert |
| Holos. | Jacques. |
| Hormovitol. | Musculosine Byla. |
| Hormuclases. | Néo-Calculine. |
| Huile de foie de morue. | Néo-Neurosine Prunier. |
| médicinale suractivée | Néo-Tannurgyl. |
| Rhône-Poulenc. | Neurocalcium. |
| I. A. M. | Neuropol. |
| Insuline buccale Fornet. | Neurosine Prunier. |
| Insuline Byla. | Nucléarsitol Robin. |
| Insuline Léo. | Nucléasine. |
| Iodalose Galbrun. | Nucléigène. |
| Iodarsenic Guiraud ou | Nucléargol. |
| gouttes paidophiles | Nuphos. |
| Iodaseptine Cortial. | Opocéphos. |
| Iodassium. | Okamine. |
| Iodocalcium. | Opocalcium du D ^r Guer- |
| Iodogénol Pépin. | sant. |
| Iodo-Maisine Globules. | Opocalcium irradié du D ^r |
| Iodométine. | Guersant. |
| Iodonucléol. | Opocobalt. |
| Irrastérine. | Oponuclyl irradié Trouette- |
| Jémalt Wander. | Perret. |
| Jugland Gmet. | Opophos. |
| Juglanrégine André. | Opostyl Bouty. |
| Lécithine Vacheron. | Opotonine. |
| Limol Churchill. | Orcalcine. |
| Lipiodol Lafay. | Organi-calcion simple et |
| Lipiodine Ciba. | endocrinien. |
| Liposplénine du D ^r Groc. | Orthozomine. |
| Lipovita. | Ostéogène. |
| Lugocalcion. | Ostéoglandulol. |
| Magol Churchill. | Ozobiase. |

VIII. — MALADIES DE LA NUTRITION ET PAR CARENCE. T. S.

RACHITISME-LYMPHATISME-ATHREPSIE TROUBLES DE LA CROISSANCE

| | | |
|--------------------------------------|------------|---|
| Pancalcion. | | Riodine. |
| Pandrénaline. | | Sanas. |
| Pancréastase | Defresne | Sanguil. |
| granulée. | | Serifer Laurençon. |
| Pancrinol du D ^r Debat. | | Sérobiol. |
| Pangaduine. | | Sérodausse infantile. |
| Pangermine. | | Sérogyné. |
| Panglandine | Couturier. | Sérum Oliviero. |
| Paniode. | | Sirop de glycérophosphates |
| Panostyl. | | Vacheron. |
| Panvita. | | Sirop Girard. |
| Panxylon. | | Sirop de Lovel. |
| Parathyrocalcine Moncour. | | Sirop minéral sulfureux |
| Pépiodon. | | Crosnier. |
| Pepto-Fer Jaillet. | | Sirop Roche au Thiocol. |
| Percalcine. | | Sirop Tinardon. |
| Persodine Lumière. | | Solution Quinquina Bardet. |
| Phosbiol. | | Solution Pautauberge. |
| Phoscamine. | | Spectrol. |
| Phosoforme. | | Splénarmone. |
| Phosol. | | Splénomanganol. |
| Phosphates du D ^r Pinard. | | Sthénoléine. |
| Phosphate Vital de Jacquemaire. | | Stérogyl. |
| Phospho-Fluor Beynet. | | Sthénoxal. |
| Phosphogalaccol Mary. | | Sulfureux Pouillet. |
| Phospholéose Demasles. | | Sulfuryl Monal. |
| Phosphonine Soulié. | | Tanno-Calcine. |
| Phostyl. | | Tannurgyl du D ^r Le Tanneur. |
| Phylla Dyn. | | Thiocol Roche. |
| Phytine Ciba. | | Thyroxine Roche. |
| Phytogénine. | | Tonikéine Chevreton. |
| Phyto-Lécithine. | | Tonique Gonnon. |
| Phytosplénol Plé. | | Tonique Roche. |
| Phyto-vitamines Plé. | | Tonucyl. |
| Plasma de Quinton. | | Tonudol. |
| Plasmarine. | | Tréphonyl. |
| Plasmocalcium. | | Tricalcine. |
| Plasmosthène. | | Triglandol. |
| Pollol Churchill. | | Utraviamine 4. |
| Prodynase. | | Uvé (gouttes). |
| Prosthénase Galbrun. | | Uvéphorine. |
| Quinoidine Duriez. | | Uvéstérol. |
| Quinquina Gmet. | | Valovarine. |
| Reconstituant Mary. | | Vanadarsine Guillaumin. |
| Recrésal. | | Végéphos. |
| Rénaleptine. | | Véguva. |
| Rhocya Dyn. | | Vigostérol. |
| Rhomnol. | | Vin de Baudon. |

VIII. — MALADIES DE LA NUTRITION ET PAR CARENCE. T. S.

RACHITISME — LYMPHATISME — ATHREPSIE TROUBLES DE LA CROISSANCE

Vin de Carnéose.
Vin Girard.
Viosten.
Vioxyl Mouneyrat.
Virmonal Piam.
Vitacalcine Moncour.
Vitadone.
Vitamine Cortial.

Vitaminol.
Vitamorrhaine.
Vitamyl.
Vitène.
Vivoléol.
Zomine.
Zoocythine.

RHUMATISMES CHRONIQUES ALGIES RHUMATISMALES — LUMBAGO

Voir aussi :

Accélérateurs de la nutrition.
Analgésiques internes.
Arthritisme.
Cataplasmes. — Révulsifs.
Dissolvants uriques.
Opothérapie.
Régulateurs de la nutrition.
Sérums Vaccins.

Absuric.
Actiphos.
Aigue d'Or.
Alcacyl Wander.
Alcamfétol.
Algatan.
Algophagine.
Algonal.
Algor.
Allochrysine Lumière.
Ampoules Boissy à l'iodure de potassium.
Ampoules Reipar.
Anaclasine.
Anégrine.
Antalgol Dalloz.
Antialgos Christiaens.
Antidouleur Barbessou.
Antiphlogistine.
Arthrilax.
Antisciatique P. Chambon.
Antiuurique de Contrexéville.
Ascéine.
Asciatine.
Atomine.
Atophan Cruet.
Atophanyl.

Atoquinol Ciba.
Azufrol.
Bain Bagnor radio-actif.
Bain Carré.
Bain Salvia.
Balnéradol.
Baume Adol.
Baume Aroma.
Baume Bengué.
Baume Iki.
Baume Rhodia.
Baume du Dr Serin de Gail-lac.
Baumolacpinine.
Bensamine.
Benzo-iodhydriene.
Betulol Midy.
Bi-Citrol Marinier.
Bilio-gastrine Chevillon.
Bisalicylate.
Cachets du Dr Boveil.
Cachets Van-Sol.
Cador.
Calcium Francalcion.
Calcozymase.
Calmant Meunier.
Carboiodure Fraudin.
Catalgine.
Causyth.
Cérébrine Fournier.
Chéloïdine.
Chlomag.
Cibalgine.
Citralin.
Citrofluyl.
Colchi-Sal Midy.
Collo-iode Dubois.
Crédone Dehaussy.
Crésopirine.

VIII. — MALADIES DE LA NUTRITION ET PAR CARENCE. T. S.

RHUMATISMES CHRONIQUES ALGIES RHUMATISMALES — LUMBAGO

| | |
|--|-------------------------------|
| Cryogénine Lumière. | Iodométine. |
| Crypthiol. | Iodone Robin. |
| Curatine Brunet. | Iodonésyl. |
| Curiode. | Iodonucléol. |
| Curogène. | Iodurase. |
| Cynurol Rosa. | Iodure Pachaut. |
| Demalgon. | Ionyl. |
| Dépuratif Rob Lechaux. | Irénine Gonnon. |
| Dépuriode du D ^r Roger Weber. | Ixium Buisson. |
| Dialacétine Ciba. | Jabosulfène. |
| Dialyl. | Kalmigraine. |
| Diasclérol. | Kodos. |
| Dicaliode. | Lipiodol Lafay. |
| Dolysine. | Lipoiodine Ciba. |
| Ektophanol. | Lysarthrol. |
| Elgine Julien. | Magiodyl. |
| Eniode Lefebvre. | Magnésium Hardy. |
| Entéro-Antigènes. | Magnéso-tubes Robinet. |
| Eranol. | Mésothine Rhemda. |
| Erythra Dyn. | Mésothorium Buisson. |
| Euphysol. | Mésothorium Rhemda. |
| Fango Fisch et C ^o . | Métacitrine. |
| Follicormone Hinglais. | Métaformine. |
| Fosfoxyl Carron. | Métaux colloïdaux A. Lancien. |
| Francalcion. | Métophan. |
| Globules Fumouze iodure de potassium. | Micelliode. |
| Grains Céphalgifuges. | Morrhualène Gautier. |
| Granions (Les). | Myochrisine. |
| Granulé Cabasson. | Myoden. |
| Granules Chanteaud. | Myoral. |
| Gravural. | Myothermine. |
| Hamaméliode. | Naiodine Logeais. |
| Hexonérol. | Néalgyl Bottu. |
| Hexotal. | Néoral. |
| Hydroxydase. | Néo-Riodine. |
| Immunizols Grémy. | Néo-Séti. |
| Inorénol. | Névralgol Brossard. |
| Iodalose Galbrun. | Nitroyl Leisyn injectable. |
| Iodamélis. | Nopirine Vicario. |
| Iodaseptine Cortial. | Novacétine Prunier. |
| Iodassium. | Oléochrysine Lumière. |
| Iodex. | Opothérapies. |
| Iodhéma. | Orthogénol. |
| Iodinjectol Jammes. | Ozothine. |
| Iodogénol Pépin. | Paniode. |
| Iodo-Maisine (globules et pommade). | Paradol. |
| | Paratyrone. |
| | Pépiodon. |

VIII. — MALADIES DE LA NUTRITION ET PAR CARENCE. T. S.

RHUMATISMES CHRONIQUES ALGIES RHUMATISMALES — LUMBAGO

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Phosoforme. | Sulfuryl Monal. |
| Phosphonine Soulié. | Sulphium. |
| Pilules V. E. Doumer. | Suppoalgos. |
| Pipérazine Midy. | Suppopirine. |
| Pipérazyl. | Térozone. |
| Polyiodure Gonnon. | Thénol. |
| Potion Adol. | Théocalciode. |
| Pyrelaine Collas. | Théosalvose. |
| Pyréthane. | Théoxanthine. |
| Quinsal. | Thigénol Roche. |
| Recrésal. | Thiorine. |
| Révulsif liquide Boudin. | Thorium X. Rhemda. |
| Révulsif Procipha. | Thyrocréine Grémy. |
| Rhésal Vicario. | Thyroïdine. |
| Rhocya Dyn. | Tiodine Cognet. |
| Rhoféine. | Triglandine. |
| Riodine. | Triglandol. |
| Salénal Ciba. | Trisalyl. |
| Salène Ciba. | Ulcéosine. |
| Salicylate de soude Clin. | Ulmacétyl. |
| Salsanos. | Ulmarène Gigon. |
| Salysérum. | Ultraformine. |
| Sambul. | Uralysol. |
| Sanoquinol Ciba | Uraseptine Rogier. |
| Santhéose. | Urazine. |
| Sédarthryl. | Uréol Chanteaud. |
| Sedosalyl. | Urifluine. |
| Sel hépatique U. N. Ar- | Urisanine. |
| quevaux. | Urobuccol Malmanche. |
| Sels Intar. | Uroclase. |
| Sel n° 2. | Uroflux. |
| Sels de Lithine efferves- | Uroformine Gobey. |
| cents. | Uroïodine. |
| Senecol. | Urométhyl. |
| Séotral Leisyn. | Urométine Lambiotte. |
| Sérobiol. | Uromil. |
| Sodothioli. | Urophényl. |
| Solurol. | Urophile. |
| Solvuric. | Uroquinol. |
| Spécifique Béjean. | Urosan Dufayard. |
| Spicanol. | Urozéa. |
| Sthénoléine. | Vaccin antirhumatisme/ |
| Sulfodermol Flahaut. | (Immunovaccin). |
| Sulfoidol Robin. | Véganine. |
| Sulfur concentré Dax | Véralgine. |
| Sulfureux Pouillet. | Viophan. |
| Sulfurion. | Virmonal Piam. |

IX. — MALADIES DE LA PEAU. T. G.

ANTIPRURIGINEUX

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Acéclex. | Liquidix. |
| Acésine Guillaumin. | Lynévol. |
| Aloplastine. | Métacuprol. |
| Allergantyl Miluc. | Méta-Titane. |
| Arthrila. | Minervol. |
| Baume du D ^r Baissade. | Nestosyl. |
| Baume Duret. | Nisaméline. |
| Baume Panthésine Sandoz. | Onction Leisyn. |
| Baume Robertard. | Onguent Fréval. |
| Baume Séléria. | Percaïnal Ciba. |
| Camphydryl Robin. | Plasthaméline. |
| Coalt-Derma. | Pommade Inseva. |
| Colpophile. | Pommade crème Ludin. |
| Cratægus Gmet. | Pommade au Nestosyl. |
| Dermacide. | Poudre Noëline. |
| Dermofagine. | Sapolan. |
| Dermo-plastol Dumesnil. | Sarcoptol. |
| Dermosplénine. | Sédothiol. |
| Eczéda. | Solution huileuse au Nesto- |
| Eczémacrème Boissy. | syl. |
| Eczosec. | Stovaine. |
| Ephédermine Béral. | Streptoderme. |
| Euphoryl. | Sulfex. |
| Holosplénine. | Tégéol. |
| Hyposulfène. | Thionaphte. |
| Intrait de Valériane Dausse | Ulcéosol. |
| Laccodermes. | Ulcérine Berger. |

ANTISEPTIQUES

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Acéclex. | Evine. |
| Alibourne. | Flavuro. |
| Aloysine (pommade). | Ganderma. |
| Anaxéryl. | Gelée Vaccins Ivago (anti- |
| Aniodol. | pyogène). |
| Aristargol. | Gouttes Daynoc. |
| Azufrol. | Iodex. |
| Baume du D ^r Baissade. | Iodosan. |
| Baume Duret. | Laurénol Médicinal. |
| Baume Séléria. | Liquidix. |
| Baumix. | Lynévol. |
| Boricine Meissonnier. | Métacuprol. |
| Borostyrol Schlatter. | Méta-Titane. |
| Camphydryl Robin. | Méta-vaccin. |
| Coalt-Derma. | Néo-Collargol. |
| Colpophile. | Néol. |
| Comprimés d'Alibour. | Olcalan. |
| Créosoforme Lambiotte. | Onction Leisyn. |
| Cryptargol Lumière. | Pommade Kléos. |
| Dermofagine. | Poudre Noëline. |
| Dermo-Rhinistol. | Pyo-amphogel Ronchèse. |
| Ektogan. | Pyroléol Edet. |
| Eranol. | Savons Mollard. |

IX. — MALADIES DE LA PEAU. T. G.

ANTISEPTIQUES

Séphydine.
Sulfex.
Sunoxol.
Streptoderme
Stéramine.
Sunalcol.
Tégéol.
Térébine.
Terpoxyl externe.

Thigénol Roche.
Tubes Chauvin.
Tulle rose Beslier.
Ulcéosol.
Ulcérine Berger.
Uvéoline.
Vioforme Ciba (et ovules au vioforme).

KERATOPLASTIQUES

Acéclex.
Aloplastine.
Baumix.
Belhémène.
Borostyrol Schlatter.
Dermacide.
Dermoplastol Dumesnil.
Dermoradol.
Dermorhinistol.
Eczémacrème Boissy.
Eczosec salicylé.
Ektogan.
Erythéma.
Gélicurine.
Insulanol.
Insuline Phyloze.
Lynévol.
Méta-Titane.
Onction Leisyn.
Opodermyl.

Plasthaméline.
Pommade Aiphème.
Pommade-crème Ludin.
Pommade Raimoa.
Pommade V. E. Doumer.
Poudre et Pommade d'Insuline Phyloze.
Poudre Mass plastique.
Rogerma.
Rozoderme.
Sapolan.
Tégéol.
Térébine.
Thigénol Roche.
Tulle rose Beslier.
Ulcéoplaque. — Ulcéobande.
Ulcérophile Nosan.
Vioforme Ciba.
Vulnérine du D^r Berger.

IX. — MALADIES DE LA PEAU. T. S.

ACNÉ

Voir aussi :

Antiseptiques externes liquides.
Antiseptiques externes pommades.
Antiseptiques intestinaux.
Bactériophages.
Bactériothérapie.
Diététique.

Laxatifs.
Sérums Vaccins.

Allergantyl Miluc.
Ampho-Vaccins Ronchèse.
Anaxéryl.
Anthracalcine.
Arthrilaix.
Artensyl.

IX. — MALADIES DE LA PEAU. T. S.

ACNÉ

- | | |
|--|-------------------------------------|
| Aseptoradol. | Mucyllium. |
| Azufrol. | Néobiol. |
| Baume du D ^r Baissade. | Néotrophène. |
| Baume Duret. | Osmo-Vaccin Bréant. |
| Boldolactic. | Panbiline. |
| Cachets Spévin. | Paralactine Byla. |
| Cataplasme du D ^r Lelièvre. | Pommade Aiphème. |
| Chlomag. | Pommade au Nestosyl. |
| Eholéfluine. | Pommade Kléos. |
| Chophytol Rosa. | Poudre Mass Plastique. |
| Chophytol Rosa injectable. | Précikase. |
| Comprimés Levure Mycéta. | Protidyne injectable. |
| Crino-Sérum. | Pyo Amphogel Ronchèse. |
| Delbiase. | Pyrelaine Collas. |
| Denisoline. | Rectopanbiline. |
| Dépuriodé du D ^r Roger. | Rob Lechaux. |
| Weber. | Salantale. |
| Dermacide. | Sapolan. |
| Dermo-Dulcis Lagoutte. | Savons Mollard. |
| Dermo-Plastol Dumesnil. | Sels Intar. |
| Dermoradol. | Séphydine. |
| Dynosthène. | Sirop minéral sulfureux |
| Eczosec Sulfo-camphré. | Crosnier. |
| Elkin (dragées granules). | Sodothiol. |
| Entéro-antigènes. | Stalysine. |
| Euglyma. | Stanion. |
| Euphoryl. | Stannobardane Henry. |
| Evolaxine. | Stannoxyd. |
| Fluokol. | Staphylagone. |
| Ganderma. | Staphylase du D ^r Doyen. |
| Gatran. | Staphylocide Audras. |
| Gelée vaccin Ivago « D ». | Staphylo-Coccine Fraquet. |
| Glésol. | Staphyloethanol. |
| Glyco-Thymoline. | Sulfa. |
| Hyposulfène. | Sulfex. |
| Immunizols Grémy. | Sulfobyl. |
| Inotylol. | Sulfocrème Liless. |
| Iodex. | Sulfo-Thiorine. |
| Ivago-Sta (buvable). | Sulfodermol Flahaut. |
| Jugland Gmet. | Sulfureux Concentré Dax. |
| Juranol. | Sulfureux Pouillet. |
| Levure B 17. | Sulfurion. |
| Levure fraîche Mycéta. | Sulfuryl Monal. |
| Levurine extractive. | Sulphium. |
| Levuro Maltine Déjardin. | Tégéol. |
| Levure Zymaculine. | Terpoxyl externe. |
| Liquidix. | Thiophyl. |
| Lynévol. | Thiorine. |
| Magnésium Hardy. | Vaccinothérapie atoxique |
| Magnésio-tubes Robinet. | Cépède. |
| Magnogène. | Vaccins atoxiques stabili- |
| Métaux colloïdaux A. Lan- | sés. |
| cien. | Vaccins bactériens I. O. D. |

IX. — MALADIES DE LA PEAU. T. S.

ACNÉ

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Vaccins Clin. | Vaccins Ronchèse Ampho- |
| Vaccins intra-dermiques et | Vaccins. |
| gelées-vaccins Ivago de | Vaccins Sténé. |
| L. Goldenberg. | Vaclydun. |
| Vaccins Virultra. | Vitacholine. |

ALOPÉCIES

| | |
|-----------------|----------------------|
| Acépilline. | Pommade Crème Ludin. |
| Dermacide. | Sapolan. |
| Gatran. | Savons Mollard. |
| Glycocarpine. | Séphydine. |
| Iodex. | Sulfex. |
| Néobiol. | Sulfodermol Flahaut. |
| Pommade Lenoir. | Vuleapil. |

CREVASSES — GERÇURES — ENGELURES

Voir aussi :

| | |
|--|-------------------------------------|
| <i>Anesthésiques locaux.</i> | Ephédermine Béral. |
| <i>Antiprurigineux.</i> | Erythéma. |
| <i>Antiseptiques externes pom-</i> | Fludiose. |
| <i>madés.</i> | Gélicurine. |
| <i>Antiseptiques externes pou-</i> | Inotyol. |
| <i>dres.</i> | Iodex. |
| <i>Kératoplastiques.</i> | Juranol. |
| Acécoline. | Laccodermes. |
| Acéclex. | Liquidix. |
| Acésine Guillaumin. | Lynévol. |
| Albuplast Vigier. | Lysacrème L. M. L. |
| Aloplastine. | Méta-Titane. |
| Androstine Ciba. | Minervol. |
| Antipiol. | Myothermine. |
| Baume Delacour. | Nestosyl. |
| Baume de la Maternité. | Onction Leisyn. |
| Baume du D ^r Baissade. | Ozothine. |
| Baume Panthésine Sandoz. | Percaïnal Ciba. |
| Baume Robernard. | Plasthamélyne. |
| Borostyrol Schlatter. | Pommade Kléos. |
| Cataplasme du D ^r Lelièvre. | Pommade au Nestosyl. |
| Coalt Derma. | Propidex. |
| Créosoforme Lambiotte. | Pyo-Amphogel Ronchèse. |
| Cimarsényl. | Pyroléol Edet. |
| Dermo-Dulcis Lagoutte. | Rhagadine Bracquemond. |
| Dermo-Dulcis Lagoutte. | Rozoderme. |
| Dermofagine. | Savons Mollard. |
| Dermo-rhinistol. | Séphydine. |
| Eczéda. | Stéramine. |
| Eczémacrème Boissy. | Sulfarsiode. |
| Eczosec. | Tégéol. |
| Ektogan Bocquillon. | Térébine. |
| | Ulcérine Berger. |
| | Vulnépine du D ^r Bergen. |

IX. — MALADIES DE LA PEAU. T. S.

ECZÉMAS

Voir aussi :

- | | |
|--|---|
| <p> <i>Analgésiques externes.</i> <i>Antiprurigineux.</i> <i>Antiseptiques externes pommades.</i> <i>Antiseptiques intestinaux.</i> <i>Bactériophages.</i> <i>Bactériothérapie. — Ferments lactiques.</i> <i>Cholagogues.</i> <i>Diététique.</i> <i>Laxatifs.</i> <i>Opothérapie.</i> <i>Sérums Vaccins.</i> <i>Acécolex.</i> <i>Actiphos.</i> <i>Alcasodine.</i> <i>Alibourine.</i> <i>Allergantyl Miluc.</i> <i>Aloplastine.</i> <i>Amibiasine.</i> <i>Anaclasine Ranson.</i> <i>Anaxeryl.</i> <i>Anthracalcine.</i> <i>Arthrilax.</i> <i>Arvensyl.</i> <i>Aseptoradol.</i> <i>Azigol Thévenot.</i> <i>Azufrol.</i> <i>Baume du D^r Baissade.</i> <i>Baume Duret.</i> <i>Baume Robernard.</i> <i>Baume Sélénia.</i> <i>Bioentérase.</i> <i>Biophylactine Mg.</i> <i>Boldolactic.</i> <i>Cachets Spévin.</i> <i>Cataplasme du D^r Lelièvre.</i> <i>Céthocal du D^r Lemay.</i> <i>Chlormagnésium Fisch.</i> <i>Chloro-Magnésion.</i> <i>Cholécystine.</i> <i>Chophytol Rosa.</i> <i>Chophytol Rosa injectable.</i> <i>Colloïdogénine du D^r Bayle.</i> <i>Comprimés Galac.</i> <i>Comprimés Levure Mycéta.</i> <i>Crescogénol.</i> <i>Crino-Sérum.</i> <i>Cytomagnésium Oliviero.</i> <i>Delbiase.</i> </p> | <p> <i>Dépuriole du D^r Roger Weber.</i> <i>Dermacide.</i> <i>Dermofagine.</i> <i>Dermo-Plastol Dumesnil.</i> <i>Dermoradol.</i> <i>Dermo-rhinistol.</i> <i>Dermosplénine.</i> <i>Dialyl.</i> <i>Dicaliode.</i> <i>Dolophos.</i> <i>Dragécalcion.</i> <i>Dynosthène.</i> <i>Eczéda.</i> <i>Eczémacrème Boissy.</i> <i>Eczosec.</i> <i>Ektogan Bocquillon.</i> <i>Elkin (dragées granules).</i> <i>Emplâtres Rogé-Cavaillès.</i> <i>Entéro-Antigènes.</i> <i>Entéro-Pansement du D^r Zizine.</i> <i>Ephédermine Béral.</i> <i>Epicral.</i> <i>Erythéma.</i> <i>Euglyma.</i> <i>Euphoryl.</i> <i>Euskine.</i> <i>Ferments lactiques Fabre.</i> <i>Flavurool.</i> <i>Fluokol.</i> <i>Ganderma.</i> <i>Gatran.</i> <i>Glyco-Thymoline.</i> <i>Gouttes Daynoc.</i> <i>Hépatie Efa du D^r Leca- cheux.</i> <i>Holosplénine.</i> <i>Hormantoxone.</i> <i>Humoro-Stabiline.</i> <i>Hydroxydase.</i> <i>Hyposulfène.</i> <i>I. A. M.</i> <i>Immunizols Grémy.</i> <i>Inotyol.</i> <i>Inoxémol.</i> <i>Intrait de Valériane Dausse.</i> <i>Iodarsenic Guiraud ou gouttes païdophiles.</i> <i>Iodex.</i> <i>Iodo-Maisine (pommade).</i> </p> |
|--|---|

IX. — MALADIES DE LA PEAU. T. S.

ECZÉMAS

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Iodonésyl. | Protiodyne dragées. |
| Jabosulfène. | Pyo-Amphogel Ronchèse. |
| Juranol. | Pyrelaine Collas. |
| Laccodermes. | Pyroléol Edet. |
| Levurine extractive. | Rhocya Dyn. |
| Levuro-Maltine Déjardin. | Rob Lechaux. |
| Liquidix. | Rozoderme. |
| Lysacrème L. M. L. | Salantale. |
| Magnésium Hardy. | Salve. |
| Magnéso-tubes Robinet. | Salvebyl. |
| Magnogène. | Sapolan. |
| Métacuprol. | Sarcoptol. |
| Méta-Titane. | Sels Intar. |
| Métaux colloïdaux A. Lan- | Sirop minéral sulfureux |
| cien. | Crosnier. |
| Minervol. | Sodothiol. |
| Mucyllium. | Solution huileuse au Nes- |
| Néopancarpine. | tosyl. |
| Néotrophène. | Splénocrisine. |
| Nestosyl. | Streptoderme. |
| Nigérine. | Sulfa. |
| Nisaméline Trouette-Perret. | Sulfarsénol. |
| Nitium Buisson. | Sulfobyl. |
| Normatensol Bouret. | Sulfodermol Flahaut. |
| Onction Leisyn. | Sulfo-Thiorine. |
| Opodermyl. | Sulfoxy. |
| Orthogénol. | Sulfur concentré Dax. |
| Ouataplasme du Dr Langle- | Sulfureux Pouillet. |
| bert. | Sulfurion. |
| Pancréastase Defresne gra- | Sulfuryl Monal. |
| nulée. | Sulphium. |
| Pancréatose Idon. | Tapo. |
| Peptalmine. | Tégéol. |
| Pepto-Magnésie Vassal. | Térébine. |
| Percaïnal Ciba. | Thigénol Roche. |
| Phosoforme. | Thiocitran Thévenot. |
| Pipérazine Midy. | Thionaphte. |
| Pipérazyl. | Thiorine. |
| Plasma de Quinton. | Thyroidine. |
| Polypeptonal. | Triseptine. |
| Pommade Alphème. | Ulcéosol pommade. |
| Pommade au Nestosyl. | Ulcéosol poudre. |
| Pommade Bertol-Vichy. | Ulcérophile Nosan. |
| Pommade crème Ludin. | Ultra-Levure. |
| Pommade Inseva. | Vaccins Virultra. |
| Pommade Kléos. | Végélect. |
| Pommade Lenoir. | Vioforme Ciba et Ovules au |
| Pommade Raimoa. | Vioforme. |
| Pommade V. E. Doumer. | Vitacholine. |
| Poudre Mass plastique. | Vitamyl. |
| Précikasc. | Vulcase. |
| Prézymase. | Vulnérine du Dr Bergen. |
| Protiodyne. | Zymatine Lescène. |

IX. — MALADIES DE LA PEAU. T. S.

ERYTHÈMES — INTERTRIGO

Voir aussi :

Antiseptiques externes liquides.
 Antiseptiques externes pommades.
 Antiseptiques externes poudres.
 Antiseptiques intestinaux.
 Cholagogues.
 Sérums Vaccins.
 Allergantyl Miluc.
 Aloplastine.
 Bacillactine.
 Baume Duret.
 Baume de la Maternité
 Baume du D^r Baissade.
 Baume Robernard.
 Borostyrol Schlatter.
 Carbolactyl simple.
 Coalt-Derma.
 Dermacide.
 Dermo-Dulcis Lagoutte.
 Dermofagine.
 Dermo-Plastol Dumesnil.
 Dermoradol.
 Dermo-Stalys du D^r Wagon.
 Diadermine.
 Dialine.
 Eczéda.
 Eczémacrème Boissy.

Ephédermine Béral.
 Erythéma.
 Euphoryl.
 Ganderma.
 Hormantoxone.
 Inotyol.
 Iodex.
 Liquidix.
 Lynévol.
 Lysacrème.
 Méta-Titane.
 Minervol.
 Nestosyl.
 Onction Leisyn.
 Opodermyl.
 Opothérapies.
 Percainal Ciba.
 Plasthamélyne.
 Pommade Aiphème.
 Pommade au Nestosyl.
 Pommade Bertol-Vichy.
 Pommade crème Ludin.
 Pommade Kléos.
 Pommade Noëlline
 Poudre Noëlline.
 Poudre Satine.
 Pyo-Amphogel Ronchèse.
 Rhagadine Bracquemond.
 Rozoderme.
 Sapolan.
 Streptoderme.

HERPÈS

Voir aussi :

Antiprurigineux.
 Antiseptiques externes liquides.
 Antiseptiques externes pommades.
 Antiseptiques externes poudres.
 Antiseptiques intestinaux.
 Cholagogues.
 Laxatifs.
 Choléolax.
 Choléopectine.
 Dépuriole.
 Dermo-Dulcis Lagoutte.
 Dermofagine.
 Dermo-plastol Dumesnil.

Dermoradol.
 Ektal.
 Ektogan Bocquillon.
 Entéro-Pansement du D^r
 Zizine.
 Ergépatine.
 Euphoryl.
 Ganderma.
 Humoro-Stabiline.
 Iodo-Thyroidine Catillon.
 Levurine extractive.
 Liquidix.
 Lynévol.
 Métacuprol.
 Nestosyl.
 Nitium Buisson.
 Paralactine Byla.
 Percainal.

IX. — MALADIES DE LA PEAU. T. S.

HERPÈS

| | |
|----------------------|---------------------|
| Phosoforme. | Staprolysat. |
| Pommade au Nestosyl. | Sulfoxyl. |
| Rob Lechaux. | Sulfurion. |
| Sanoquinol Ciba. | Sulfuryl Monal. |
| Saucholine. | Sulfureux Pouillet. |
| Séphydine. | Thyroidine. |

IMPETIGO

Voir aussi :

| | |
|--|-------------------------------------|
| <i>Antiseptiques externes pommades.</i> | Juranol. |
| <i>Antiseptiques intestinaux.</i> | Laccodermes. |
| <i>Bactériophages.</i> | Lauréol médicinal. |
| <i>Bactériothérapie.</i> | Levuro-Maltine Déjardin. |
| <i>Cholagogues.</i> | Liquidix. |
| <i>Laxatifs.</i> | Méta-Titane. |
| <i>Sérums Vaccins.</i> | Méta-Vaccin. |
| Alibourine. | Morrhualène Gautier. |
| Ampho-Vaccins Ronchèse. | Nestosyl. |
| Aniodol. | Onction Leisyn. |
| Arapal. | Pommade Aïphème. |
| Aristargol. | Pommade au Nestosyl. |
| Arthrilax. | Pommade crème Ludin. |
| Arvensyl. | Pommade Kléos. |
| Baume du D ^r Baissade. | Poudre Mass plastique. |
| Baume Duret. | Pyo-Amphogel Ronchèse. |
| Boricine Meissonnier. | Rob Lechaux. |
| Borostyrol Schlatter. | Salantale. |
| Colpophlle. | Sarcoptol. |
| Comprimés d'Alibour. | Séphydine. |
| Crino-Sérum. | Stalysine. |
| Curiodé. | Stanion. |
| Curiodé Arsénié. | Stannobardane Henry. |
| Dépuriodé du D ^r Roger Weber. | Stannoxy. |
| Dermacide. | Staphylagone. |
| Dermo-Lulcis Lagoutte. | Staphylase du D ^r Doyen. |
| Dermofagine. | Staphylocide Audras. |
| Dermo-Plastol Dumesnil. | Staphylo-Coccine Fraquet. |
| Emplâtres Rogé-Cavaillès. | Staphylothanol. |
| Entéro-Antigènes. | Streptoderme. |
| Euphoryl. | Sulfodermol Flahaut. |
| Flavuro. | Tapo. |
| Fludiose. | Tégéol. |
| Ganderma. | Térébine. |
| Humoro-Stabiline. | Terpoxyl externe. |
| Inosepta. | Thionaphte. |
| Iodarsenic Guiraud ou Gouttes Paidophiles. | Thiophyl. |
| Iodex. | Thyroidine. |
| Iodo-Maisine (pommade). | Vaccins Ronchèse Ampho-Vaccins. |
| | Vaccins Virultra. |
| | Vaclyderm. |
| | Vaclydun. |
| | Vulnérine du D ^r Bergen. |

IX. — MALADIES DE LA PEAU. T. S.

MYCOSES — SYCOSIS

Voir aussi :

Antiseptiques externes.
Sérums Vaccins.

Anaxéryl.
Antipiol.
Baume du Dr Baissade.
Baume Duret.
Baume Séléria.
Cadior.
Cimarsényl.
Collo-Iode Dubois.
Cortiode.
Crescogénol.
Dépuriode du Dr Roger
Weber.
Dermacide.
Dicaliode.
Eczosec.
Eniode Lefebvre.
Eranol.
Flavuiol.
Ganderma.
Gelée Vaccin Ivago « D ».
Globules Fumouze à l'iodure de potassium.
I. A. M.
Inosepta.
Iodassium.
Iodex.
Iodogénol Pépin.
Iodo-Maisine Globules.
Iodo-Maisine Pommade.
Iodone Robin.
Iodonésyl.
Iodonucléol.
Iodurase.
Iodure Pachaut.
Ivago de Goldenberg Vaccin « D ».

Ivago-Sta (buvable).
Levure B 17.
Levure fraîche Mycéta.
Levurine extractive.
Lipiodol Lafay.
Lipiodine Ciba.
Liquidix.
Magiodyl.
Méta-Vaccin.
Néo-Riodine.
Onction Leisyn.
Paniodé.
Pommade crème Ludin.
Pommade Lenoir.
Pyo-Amphogel Ronchèse.
Rhocya Dyn.
Riodine.
Sapolan.
Savons Mollard.
Séphydine.
Stalysine.
Stanion.
Stannoxyll.
Staphylagone.
Staphylase du Dr Doyen.
Staphylocide Audras.
Staphylo-Coccine Fraquet.
Staphylothanol.
Streptoderme.
Sulfarsiode.
Sulfodermol Flahaut.
Sulfoxyl.
Sulfuryl Monal.
Sunalcol.
Sunoxol.
Thionaphte.
Tiodine Cognet.
Vacciphages.

PHTIRIASE — TEIGNE — GALE

Alibourine.
Anaxéryl.
Coalt Derma.
Nestosyl.
Onction Angelini.

Percaïnal.
Pommade au Nestosyl.
Pommade Lenoir.
Sarcoptol.
Végétol.

IX. — MALADIES DE LA PEAU. T. S.

PITYRIASIS

Aloplastine.
Anaxéryl.
Denisoline.
Dermacide.
Dermo-Dulcis Lagoutte.
Dermofagine.
Dermo-Plastol Dumesnil.
Eczéda.
Eczosec.
Ektogan Bocquillon.
Ephédermine Béral.
Euskine.
Ganderma.
Gatran.

Holosplénine.
Iodex.
Liquidix.
Métaux colloïdaux A. Lancien.
Néobiol.
Pommade Lenoir.
Pyrelaine Collas.
Sapolan.
Savon Mollard.
Sulfobyl.
Sulfodermol Flahaut.
V. A. V.

PRURIGO — DARTRES — PRURITS

Voir aussi :

Analgésiques externes.
Anesthésiques locaux.
Antiprurigineux.
Diététique.
Laxatifs.
Sédatifs.

Agobyl.
Agocholine.
Allergantyl Miluc.
Aloplastine.
Anthracalcine.
Antipiol.
Arthrilax.
Arvensyl.
Aseptoradol.
Azigol Thévenot.
Baume du D^r Baissade.
Baume Duret.
Baume Panthésine Sandoz.
Baume Robernard.
Biliogastrine.
Biophylactine Mg.
Boldolactic.
Borostyrol Schlatter.
Cataplasme du D^r Lelièvre.
Cholécystine.
Choléfluine.
Choléolax.
Chophytol Rosa.
Chophytol Rosa injectable.
Cimarsényl.
Coalt-Derma.
Colpophile.
Comprimés Galac.
Cytomagnésium Oliviero.

Delbiase.
Dépuriode du D^r Roger Weber.
Dermacide.
Dermo-Dulcis Lagoutte.
Dermo-Plastol Dumesnil.
Dermoradol.
Dermosplénine.
Dialine.
Dragécalcion.
Drainochol.
Dynosthène.
Eczémacrème Boissy.
Eczosec.
Entéro-pansement du D^r Zizine.
Ektal.
Entéro-antigènes.
Entérobyl Dehaussy.
Ephédermine Béral.
Ergépatine.
Erythéma.
Euglyma.
Euphoryl.
Ferments lactiques Fabre.
Fluokol.
Ganderma.
Holosplénine.
Hormantoxone.
Humoro-stabiline.
Hyposulfène.
Inotyol.
Inoxémol.
Insulanol.
Intrait de Valériane Dausse.
Jabosulfène.
Kinéchol.

IX. — MALADIES DE LA PEAU. T. S.

PRURIGO — DARTRES — PRURITS

Laccodermes.
 Levuro-Maltine Déjardin.
 Levure Zymaculine.
 Liquidix.
 Lynévol.
 Métacuprol.
 Méta-Titane.
 Minervol.
 Néotrophène.
 Nestosyl.
 Nisaméline Trouette-Perret.
 Onction Leisyn.
 Opodermyl.
 Orthogénol.
 Pancréatose Idon.
 Peptalmine.
 Percaïnal Ciba.
 Plasma de Quinton.
 Plasthamélyne.
 Polypeptonal.
 Pommade Alphème.
 Pommade au Nestosyl.
 Pommade Bertol-Vichy.
 Pommade crème Ludin.
 Pommade Fornet.

Pommade Inseva.
 Pommade Lenoir.
 Poudre Mass plastique.
 Rob Lechaux.
 Salvé.
 Salvébyl.
 Sapolan.
 Sarcoptol.
 Saucholine.
 Savon Mollard.
 Sédothiol.
 Sels Intar.
 Sels Mags.
 Séphydine.
 Sodothiol.
 Splénocrisine.
 Sulfex.
 Tégéol.
 Thiocitran Thévenot.
 Thionaphte.
 Thiorine.
 Ulcéosol Pommade.
 Ulcéosol Poudre.
 Vitacholine.
 Zymatine Lescène.

PSORIASIS

Voir aussi :

Antiprurigineux.

Allergantyl Miluc.
 Anaxéryl.
 Arsylène Roche.
 Aseptoradol.
 Baume du Dr Baissade.
 Baume Duret.
 Cacodyle Gonnon.
 Chlomag.
 Chophytol Rosa.
 Chophytol Rosa injectable.
 Cimarsényl.
 Crescogénol.
 Cytomagnésium Oliviero.
 Delbiase.
 Dépuriode du Dr Roger Weber.
 Dermacide.
 Dermo-Plastol.
 Dermoradol.
 Dicaliode.
 Dolophos.

Dynosthène.
 Emplâtres Rogé-Cavaillès.
 Enésol.
 Entéro-Antigènes.
 Erythéma.
 Euphoryl.
 Euskine.
 Follicormone Hinglais.
 Ganderma.
 Gatran.
 Granions (Les).
 Holosplénine.
 I. A. M.
 Immunizols Grémy.
 Iodarsénic Guiraud ou Gouttes Paidophiles.
 Iodo-Maisine pommade.
 Ixium Buisson.
 Levure fraîche Mycéta.
 Levurine extractive.
 Levure Zymaculine.
 Liquidix.
 Oléochrysine Lumière.
 Onction Leysin.

IX. — MALADIES DE LA PEAU. T. S.

PSORIASIS

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Phagostyl. | Streptoderme. |
| Phagostyl Mangané. | Sulfarsénol. |
| Plasma de Quinton. | Sulfex. |
| Pommade Lenoir. | Sulfobyl. |
| Psoréon. | Sulfodermol Flahaut. |
| Psothanol. | Thionaphte. |
| Rob Lechaux. | Thorix (Thorium X Rhem- da). |
| Sapolan. | Tiodine Cognet. |
| Savon Mollard. | Ultra Levure. |
| Sirop minéral sulfureux | V. A. V. |
| Crosnier. | |

PYODERMITES

Voir aussi :

| | |
|--|-------------------------------------|
| Antiseptiques externes li- quides. | Ivago Sta buvable. |
| Antiseptiques externes pom- mades. | Ivago Pyo buvable. |
| Antiseptiques externes pou- dres. | Juranol. |
| Antiseptiques intestinaux. | Lactoprotéide Carrion. |
| Bactériophages. | Laurénol médicinal. |
| Bactériothérapie. — Fer- ments lactiques. | Levure B. 17. |
| Cholagogues. | Liquidix. |
| Diététique. | Lysacrème L. M. L. |
| Laxatifs. | Métaux colloïdaux A. Lan- cien. |
| Pansements. | Méta-Vaccin. |
| Sérums Vaccins. | Onction Leisyn. |
| Alibourine. | Osmo-Vaccins Bréant. |
| Ampho-Vaccins Ronchèse. | Pommade crème Ludin. |
| Aniodol. | Pyo-amphogel Ronchèse. |
| Antipiol. | Pyo-vaclycun. |
| Arapal. | Salantale. |
| Aristargol. | Séphydine. |
| Arthrila. | Stalysine. |
| Baume Sélénia. | Stanion. |
| Boricine Meissonnier. | Stannoxy. |
| Borostyrol Schlatter. | Staphylagone. |
| Comprimés d'Alibour. | Staphylase du D ^r Doyen. |
| Créosoforme Lambiotte. | Staphylocide Audras. |
| Dermacide. | Staphylo-Coccine Fraquet. |
| Dermo-Dulcis Lagoutte. | Staphylotanol. |
| Flavuro. | Streptoderme. |
| Ganderma. | Sulfex. |
| Gelée Vaccin Ivago « P ». | Tapo. |
| Glésol. | Tégéol. |
| Inotyol. | Terpoxyl externe. |
| Ivago de Goldenberg Vac- cin « P ». | Thorix (Thorium X Rhem- da). |
| | Uvéoline. |
| | Vaccins Clin. |
| | Vaclyderm. |
| | Vaclydun. |
| | Vitadone. |

IX. — MALADIES DE LA PEAU. T. S.

SÉBORRHÉE

Allergantyl Miluc.
Azufrol.
Baume du D^r Baissade.
Cimarsényl.
Denisoline.
Dermacide.
Dermo-Dulcis Lagoutte.
Dermo-Rhinistol.
Ektogan.
Euphoryl.
Ganderma.
Gatran.
Hyposulfène.
Juranol.
Liquidix.

Néoblol.
Pommade Lenoir.
Précikase.
Poudre Mass plastique.
Pyrelaine Collas.
Sapolan.
Sarcoptol.
Savons Mollard.
Séphydine.
Sodothioli.
Sulfex.
Sulfocrème Liless.
Sulfodermol Flahaut.
Vulcapil.

TUBERCULOSE CUTANÉE — LUPUS

Aloysine (pommade).
Céthocal du D^r Lemay.
Cinalose.
Colloïdogénine du D^r Bayle.
Dicaliodé.
Doloma.
Electrocuprol.
Huile iodée Finokoff.
Iodex.
Métaux colloïdaux A. Lan-
cien.
Molène.

Murones du D^r Robert
Jacques.
Myoral.
Nitium Buisson.
Onction Leisyn.
Percaine Ciba.
Pommade au Nestosyl.
Sthénoléine.
V. A. V.
Vigostérol.
Vulnérine du D^r Bergen.
Zimbyl.

TUMEURS DE LA PEAU — VERRUES

Voir aussi :

Cancer.
C. 40.
Catalyl Mg.
Chlormagnésium Fisch.
Chloro-magnésion.
Delbiase.
Dolophos.
Dynosthène.

Formule Jacquemaire n° 60
Gloxines.
Gouttes Magalo.
Magnésium Hardy.
Magnésio-tubes Robinet.
Magnogène.
Néolyse et Néolyse radio-
active.
Phosphomagnésium.
Verrulyse.

IX. — MALADIES DE LA PEAU. T. S.

ULCÈRES VARIQUEUX

Voir aussi :

Antiseptiques externes liquides.
 Antiseptiques externes pommades.
 Antiseptiques externes poudres.
 Bactériophages.
 Bactériothérapie. — Ferments lactiques.
 Hémorroïdes.
 Cicatrisants.
 Instrumentation.
 Kératoplastiques.
 Pansements.
 Sérums Vaccins.
 Acécolex.
 Acécoline.
 Alibourine.
 Aloplastine.
 Angioxyl.
 Angitan.
 Baumix.
 Belhémine.
 Borostyrol Schlatter.
 Cataplasme du D^r Lelièvre.
 Cataményl.
 Céthocal du D^r Lemay.
 Cimarsényl.
 Colpophile.
 Cyproveinol.
 Dermo-Dulcis Lagoutte.
 Dermoradol.
 Dermorhinistol.
 Ektogan.
 Elastoplaste.
 Emplâtres Rogé-Cavaillès.
 Endopancrine.
 Entéro-antigènes.
 Epicral.
 Fluérase.
 Fluxine (gouttes).
 Glyco-thymoline.
 Gouttes de Serû.
 Hamaméline Roy.
 Hamamélis Gmet.
 Hamamélis Grandval.
 Hémorroïdine Gouttes.
 Immunizols Grémy.
 Indoberbéline.

Inotyol.
 Insulanol.
 Insuline Phyloze.
 Iodassium.
 Iodex.
 Lactosmose.
 Léotamine.
 Lysacrème L. M. L.
 Néo-Collargol.
 Néol Bottu.
 Nestosyl.
 Nitium Buisson.
 Onction Leisyn.
 Percainal Ciba.
 Phlébos.
 Pommade au Nestosyl.
 Pommade Bertol-Vichy.
 Pommade crème Ludin.
 Pommade Fornet.
 Pommade Raimoa.
 Pommade V. E. Doumer.
 Poudre Mass plastique.
 Poudre et Pommade d'Insuline Phyloze.
 Protiodine ampoules.
 Proveinase Midy.
 Pyo Amphogel Ronchèse.
 Pyroléol Edet.
 Rénovol.
 Rhagadine Bracquemond.
 Rogerma.
 Rozoderme.
 Séphydine.
 Stéramine.
 Stieptoderme.
 Tégéol.
 Térébine.
 Tulle rose Beslier.
 Ulcéoplaque - Ulcéobande.
 Ulcéosol.
 Ulcérine Berger.
 Ulcérophile Nozan.
 Uvéoline.
 Vaccins Clin.
 Veinogène.
 Veinotrope.
 Veinotrope poudre.
 Velpeau (bandes crêpe).
 Vioforme Ciba.
 Viscoveine.
 Vulnérine.

IX. — MALADIES DE LA PEAU. T. S.

URTICAIRE

Voir aussi :

Anaphylaxie.
 Antiprurigineux.
 Antiseptiques intestinaux.
 Bactériothérapie.
 Cholagogues.
 Diététique.
 Laxatifs.
 Agocholine.
 Ailergantyl Miluc.
 Aloplastine.
 Aloysine.
 Anaclasine Ranson.
 Anapeptone Vassal.
 Anthracalcine.
 Arthrila.
 Arvensyl.
 Aseptoradol.
 Azygol Thévenot.
 Azotyl.
 Biliogastrine.
 Biophylactine Mg.
 Boldolactie.
 Calci-sténine.
 Calcium Francalcion.
 Calcivitam.
 Calcozymase.
 Carbolactyl Bilié.
 Chlorical.
 Chlormagnésium.
 Chloro-magnésion.
 Cholécystine.
 Cholésuine.
 Choléolax.
 Choléopectine.
 Chophytol Rosa.
 Chophytol Rosa injectable.
 Dépuriode du Dr Roger Weber.
 Dermacide.
 Dermo-Plastol Dumesnil.
 Dermosplénine.
 Dragécalcion.
 Drainochol.
 Eczosec.
 Ektal.
 Elkin (dragées granules).
 Entéro-Antigènes.
 Entérobil Dehaussy.
 Ergépatine.
 Euglyma.
 Euphoryl.

Fluocol.
 Francalcion.
 Gastéose.
 Gélcurine.
 Hémostatique Couderc.
 Humoro-stabiline.
 Hyposulfène.
 Iodarsenic Guiraud ou Gouttes Païdophiles.
 Jabosulfène.
 Kinéchol.
 Lactoseptyl.
 Levure B. 17.
 Levure fraîche Mycéla.
 Levurine extractive.
 Levure zymaculine.
 Liquidix.
 Lugocalcion.
 Métaux colloïdaux A. Lancien.
 Néopancarpine.
 Nestosyl.
 Organicalcion.
 Panbiline.
 Pancalcion.
 Pancréastase Defresne granulé.
 Pancréatose Idon.
 Pancrébile.
 Peptalmine.
 Pepto-magnésie Vassal.
 Peptonal.
 Peptone Vassal.
 Phylactone Byla.
 Plasthamélyne.
 Polypeptonal.
 Pommade au Nestosyl.
 Précikase.
 Prézymase.
 Protiodine.
 Protiodine dragées.
 Salvébyl.
 Saucholine.
 Sédothiol.
 Sels Intar.
 Sels Mags.
 Sulfodermol Flahaut.
 Sulfo-Thiorine.
 Thiocitran Thévenot.
 Triseptine.
 Vitacholine.
 Zymatine Lescène.

X. — MALADIES INFECTIEUSES. T. G.

ANTIPYRÉTIQUES

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Alcacyl Wander. | Névralgol Brossard. |
| Algocratine. | Panfébrine. |
| Algor. | Pyréthane. |
| Antigrippine Midy. | Quinarsol fébrifuge. |
| Arcanan. | Quinoforme Lacroix. |
| Ascéine. | Quininophytine Ciba. |
| Cachets du Dr Boveil. | Quiniostovarsol. |
| Calmant Meunier. | Quinquina Gmet. |
| Calmosuppos-sédatifs. | Quinsal. |
| Camphocalyptol. | Rhoféine. |
| Catalgine. | Salyptol Narty. |
| Cryogénine Lumière. | Sanaféine. |
| Curatine Brunet. | Septicémine Cortial. |
| Demalgon. | Solution Quinquina Bardet. |
| Elbon Ciba. | Sthénoléine. |
| Erythra Dyn. | Stopral. |
| Eucalyptine Lebrun. | Suppopirine. |
| Gouttes Daynoc. | Suppositoires Pyrax. |
| Grains céphalgifuges. | Terpoxyl interne. |
| Irénine Gonnon. | Thermocédone. |
| Kalmigraine. | Véganine. |
| Névoral Rafey. | |

ANTISEPTIQUES INTERNES

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Acatar. | Eucalyptine Lebrun. |
| Acridia. | Formocitrine. |
| Alcacyl Wander. | Gambéol. |
| Alcamfétol. | Glyco-Thymoline. |
| Algophagyne. | Goménoléos. |
| Amiphène Carron. | Gonacrine. |
| Ampho-Vaccins Ronchèse. | Granions (Les). |
| Ampoules Reipar. | Iodaseptine. |
| Aniodol. | Iodinjectol Jammes. |
| Antalgot Dalloz. | Iodo-Maisine. |
| Antigrippine Midy. | Lactoseptyl. |
| Arcanan. | Lantol. |
| Argion. | Liposeptine. |
| Bensamine. | Métaformine. |
| Bio-entérase. | Mictophile Richer. |
| Boricine Meissonnier. | Mictoseptol. |
| Catalgine. | Néo-Collargol. |
| Causyth. | Néo-Physio. |
| Chloramine Freyssinge. | Ovules au Terpoxyl. |
| Cinnozyl. | Oxyléine. |
| Comprimés Proto-Gambier. | Panxylon. |
| Cryptargol Lumière. | Pennés (produits). |
| Dicaliode. | Perquinol. |
| Dioradin. | Proto-Gambier. |
| Electrargol. | Pyoformine. |
| Electrocuprol. | Quinoidine Duriez. |
| Elgine Julien. | Rectopanbiline. |
| Eranol. | Septicémine Cortial. |
| Ethyl-Pneumine Lersam. | Sulfan. |

X. — MALADIES INFECTIEUSES. T. G.**ANTISEPTIQUES INTERNES**

| | |
|--------------------|----------------------|
| Térébine. | Uroformine Gobey. |
| Terpoxyd interne. | Uroiodine. |
| Themsaline. | Urol. |
| Tridynol. | Urométhyl |
| Triseptine. | Urométine Lambiotte. |
| Ultra-formine. | Urosalyl. |
| Uraseptine Rogier. | Urosan Dufayard. |
| Ur-Clar. | Urozéa. |
| Urisanine. | Uvargol. |

BACTÉRIOPHAGES

| | |
|---------------|-------------|
| Bacté-phages. | Kerlactine. |
| Entérofagos. | Probios. |

**BACTÉRIOTHÉRAPIE
FERMENTS LACTIQUES**

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Bacillactine. | Lactobacilline. |
| Biolactyl Fournier. | Lactocalcine. |
| Bulgarine Thépenier. | Lactochol. |
| Caséone Fabre. | Lactolaxine Fyda. |
| Comprimés Galac. | Lactoseptyl. |
| Entéroxin. | Lacto-sérum Lavril. |
| Ferments lactiques Fabre. | Lactosmose. |
| Galabactéine. | Levuro-Maltine Déjardin. |
| Glyco-lactimase. | Ovules Inséva. |
| Inorhinyl. | Paralactine Byla. |
| Kerlactine. | Pommade Inséva. |
| Koumyl. | Tapo. |
| Lactaris. | Yaourtine. |
| Lactimase. | |

CHIMIOTHÉRAPIE — COLLOÏDES

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Alcamfétol. | Lantol. |
| Causyth. | Liposeptine. |
| Comprimés Proto-Gambier. | Mésothorium Buisson. |
| Diénol. | Mésothorium Rhemda. |
| Dioradin. | Microlyse. |
| Ektofanol. | Mycolysine du Dr Doyen. |
| Electrargol. | Néo-Collargol. |
| Electrocuprol. | Orargol Amicros. |
| Electrosélénium. | Salypsol Narty. |
| Erythra Dyn. | Septicémine Cortial. |
| Eucalyptine Lebrun. | Stanion. |
| Gonacrine. | Sthénoléine. |
| Granions (Les). | Stovafer. |
| Ifranol. | Thorix (Thorium X Rhemda). |
| Lactoprotéide Carrion. | |

X. — MALADIES INFECTIEUSES. T. G.

SÉRUMS — VACCINS

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Ampho-tablettes Ronchèse. | Ovules Inséva. |
| Ampho-vaccins Ronchèse. | Pommade Inséva. |
| Antigénines. | Propidex. |
| Antipiol. | Propidon. |
| Antivirus. | Pyo-Amphogel Ronchèse. |
| Arapal. | Pyo-Vaclydun. |
| Billivaccin. | Rhéantine Lumière. |
| Blennosine. | Rhino-Vaclydun. |
| Broncho Vaclydun. | Salantale. |
| Cardiostreptine. | Sérelbé. |
| Colitique. | Séro comprimés I. M. |
| Coli Vaclydun. | Sérolactyl I. M. |
| Dmelcos. | Sérums Clin. |
| Gonagone. | Stalysine. |
| Entéro-antigènes. | Staprolysat. |
| Entérofagos. | Staphylo-Vaclydun. |
| Entérovaccins Lumière. | Strepto-Vaclydun. |
| Entéro-Vaclydun. | Utéro-streptine. |
| Entéroxin Leclerc. | Vaccin anti-asthmatique du |
| Gono-Vaclydun. | P ^r Minet. |
| Gynéco-Vaclydun. | Vaccin Demonchy anti gono. |
| Immunizols Grémy. | Vaccin de Weill et Dufourt. |
| Immuno-vaccin. | Vaccinothérapie atoxique |
| Inorhinyl. | Cépède. |
| Inoxyl. | Vaccins atoxiques stabilisés. |
| Insévaccins. | Vaccins bactériens I. O. D. |
| Institut Pasteur Sérums. | Vaccins Bruschettini. |
| Institut Pasteur Vaccins. | Vaccins Clin. |
| Ivago-Coli (buvable). | Vaccins Ivago de Golden- |
| Ivago de Goldenberg. | berg. |
| Ivago Pyo buvable. | Vaccins Ronchèse (ampho- |
| Lyxasins L. M. L. | vaccins). |
| Néo-Dmégon. | Vaccins Sténé. |
| Néo-Dmétys. | Vaccins Virultra. |
| Néophysio. | Vacciphages. |
| Osmo Vaccins Bréant. | |

X. — MALADIES INFECTIEUSES. T. S.

COLIBACILLOSE

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Voir aussi : | <i>Instrumentation.</i> |
| <i>Antiseptiques internes.</i> | <i>Laxatifs.</i> |
| <i>Antiseptiques intestinaux.</i> | <i>Sérums Vaccins.</i> |
| <i>Bactériophages.</i> | |
| <i>Bactériothérapie. — Fer-</i> | <i>Amibiasine.</i> |
| <i>ments lactiques.</i> | <i>Amiphène Carron.</i> |
| <i>Dietétique.</i> | <i>Antigénines.</i> |

X. — MALADIES INFECTIEUSES. T. S.

COLIBACILLOSE

Anthraseptol.
 Antivirus.
 Bactérophages.
 Bensamine.
 Benzocarbène.
 Bilivaccin.
 Binoxol.
 Bioentérase.
 Bismuth B. 3.
 Bismuth Desleaux.
 Bismuth Tulasne.
 Carb.
 Carbagol Marinier.
 Carbargyre.
 Carbolactyl Bilié.
 Colisel.
 Formocarbène.
 Mictasol.
 Néo-Collargol.
 Néo-Tannurgyl.
 Néphryl.

Œnophos.
 Oxyléine.
 Ozothine.
 Passicarbonate.
 Perquinol.
 Pyoformine.
 Pyri-pyridium.
 Pyuriol.
 Stomoxycène.
 Terpoxy interne.
 Thoroxyl.
 Triseptine.
 Ultra-formine.
 Ultra-levure.
 Uraseptine Rogier.
 Ur-Clar.
 Uribiline.
 Uriclarine.
 Urométhyl.
 Uvargol.

DIPHTÉRIE

Voir aussi :

Antipyrétiques.
Antiseptiques internes.
Bactériophages.
Gargarismes.
Instillations.
Sérums Vaccins.
Toni-cardiaques.

Colarsénol.
 Dragécalcion.

Institut Pasteur sérums.
 Institut Pasteur Vaccins.
 Liposeptine.
 Néo-physio.
 Physiosthénine.
 Recrésal.
 Rhinadrargol.
 Rhinaquintine Iescène.
 Séphydine.
 Sérums Clin.

ERYSIPÈLE

Voir aussi :

Antipyrétiques.
Antiseptiques externes.
Antiseptiques internes.
Bactériophages.
Chimiothérapie.
Sérums, Vaccins.
 Alibourine.
 Ampho-Vaccins Ronchèse.
 Aniodol.
 Antigénines.
 Antipiol.
 Antivirus.

Bucmine.
 Collo-iode Dubois.
 Electrargol.
 Glyco-thymoline.
 Goménoléos.
 Iodex.
 Leucoseptyl.
 Liposeptine.
 Lysaxins L. M. L.
 Naso-Sulfolarsan.
 Néo-physio.
 Nucléatol Robin.
 Polyvaline du D^r Bayle.
 Propidon.

X. — MALADIES INFECTIEUSES. T. S.

ÉRYSIPIÈLE

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Protiodyne ampoules. | Themsaline. |
| Recrésal. | Thigénol Roche. |
| Salantale. | Vaccinothérapie atoxique |
| Séphydine. | Cépède. |
| Septicémine Cortial. | Vaccins Bruschetti. |
| Sérums Clin. | Vaccins Ronchèse. |
| Strepto-vaclydun. | Vaclyderm. |
| Sulfarsénol. | Vaclydun. |
| Térébine. | Vulnérine du D ^r Bergeu. |

FIÈVRES ÉRUPTIVES — LÈPRE

Voir aussi :

Antiseptiques internes.

Antithermiques.

Dietétique.

Toniques.

Sérums Vaccins.

Acridia.

Adrénargol.

Ampho-vaccins Ronchèse.

Aniodol.

Ascéine.

Bucmine.

Camphocalyptol.

Cryogénine.

Diérol.

Elgine Julien.

Erythra Dyn.

Eucalyptine.

Goménoléos.

Lantol.

Leucoseptine.

Liposeptine.

Métaformine.

Métaux colloïdaux A. Lancien.

Mictoseptol.

Micolysine du D^r Doyen.

Nasopon.

Oléochrysine Lumière.

Orargol Amicros.

Panfèbrine.

Phytinate de quinine Ciba.

Polivaline du D^r Bayle.

Poudre Mass plastique.

Purargol.

Pyréthane.

Quinino-phyline Ciba

Quinquina Gmet.

Recrésal.

Rhinadrargol.

Rhino-liposeptine.

Séphydine.

Septicémine Cortial.

Sirop Famel.

Sirop de Galarsol.

Sulphydral Chanteaud.

Suppositoires Pyrax.

Terpoxyl interne.

Théosalvose.

Tuberol.

Urisanine.

Zimbyl.

GRIPPE

Voir aussi :

Analgésiques internes.

Antipyrétiques.

Antiseptiques internes.

Antispasmodiques. Calmants de la toux.

Asthénie.

Bactériophages.

Neurotoniques.

Sérums, Vaccins.

Tonicardiaques.

Acodros.

Acridia.

Adrénargol.

Aigue d'Or.

Alcacyl Wander.

Alcamfétol.

Algocratine.

Amborhinol.

Ampho-Vaccins Ronchèse.

Anaquinine Lescène.

Aniodol.

Antalgal Dalloz.

X. — MALADIES INFECTIEUSES. T. S.

GRIPPE

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Anthracalcine. | Electrargol. |
| Antidouleur Barbessou. | Elgine Julien. |
| Antigénines. | Elixir Bonjean. |
| Antigrippine Midy. | Elixir Ducro. |
| Appétyl. | Erцерhinol. |
| Arcanan. | Erythra Dyn. |
| Ardogène. | Ethyl-Pneumine Lersam. |
| Arsécrinol. | Eucalyptine Lebrun. |
| Arsi-strychnal Longuet. | Euchol Morellet. |
| Ascéine. | Germose. |
| Asciatine. | Goménoléos. |
| Bactéphages. | Gouttes bronchophiles. |
| Balmiga. | Gouttes Leconte. |
| Balsamol Lescène. | Gouttes Narkay. |
| Biophorine Girard. | Gouttes Nican. |
| Bronchitol. | Granulé des Vosges. |
| Bronchoforme. | Guéthural. |
| Bronchoseptol Lauriat. | Hépalomel Védé. |
| Broncho-Vaclydun. | Hexotal. |
| Cachets du D ^r Boveil. | H yol. |
| Cachets Kapytan. | Ifranol. |
| Cachets Roche de Thiocol. | Immunizols Grémy. |
| Cacodyle Gonnon. | Inhalation Lancosme. |
| Calmant Meunier. | Inorhinyl. |
| Camphocalyptol. | Iodométine. |
| Camphodausse. | Irénine Gonnon. |
| Campho-spartéine Dubois. | Ivago de Goldenberg. — |
| Camphostyl Lacroix. | Vaccins « A ». |
| Camphydryl Robin. | Kalmigraine. |
| Catalgine. | Kola caféinée Aubert. |
| Causyth. | Kola granulée Astier. |
| Cérébrine Fournier. | Kola Monavon. |
| Cérébrosthénine Dalin. | Kolatines. |
| Cinnozyl. | Lactoprotéide Carrion. |
| Citro-Collargol. | Lantol. |
| Codobromyl. | Léniforme. |
| Comprimés Roche de Thio- | Leucoseptyl. |
| col. | Liposeptine. |
| Coryphédrine. | Marrubène. |
| Crédone Dehaussy. | Marrucol. |
| Créoformine. | Métaformine. |
| Créositoires. | Métaux colloïdaux A. Lan- |
| Créo-suppo-camphre. | cien. |
| Crésopirine. | Mictoseptol. |
| Cryogénine Lumière. | Miroxyl. |
| Curatine Brunet. | Mycolysine du D ^r Doyen. |
| Curogène. | Myothermine. |
| Cyto-sérum Corbière. | Nasargine. |
| Dépuriodé du D ^r Roger | Nasopon. |
| Weber. | Nazinette. |
| Diénol. | Néo-Collargol. |
| Dioradin. | Néo-physio. |

X. — MALADIES INFECTIEUSES. T. S.

GRIPPE

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Néopulmine. | Sirop Brahma. |
| Néo-Rhomnol. | Sirop Cassibor. |
| Névoral Rafey. | Sirop de créosote Vacheron. |
| Névralgol Brossard. | Sirop de Gaïarsol. |
| Nopirine Vicario. | Sirop Famel. |
| Œnophos. | Sirop Roche au Thiocol. |
| Orargol Amicros. | Sirop Vacheron au Gaïacol. |
| Oxyléine. | Solucamphre Delalande. |
| Oxymenthol Perraudin. | Solution Pautauberge. |
| Ozothine. | Staphylase du D ^r Doyen. |
| Panfébrine. | Staphylococcine Fraquet. |
| Panxylon. | Sthénoléine. |
| Pâte Mireille. | Stopral. |
| Phagostyl. | Strychnal Longuet. |
| Phagostyl Mangané. | Sulphyral Chanteaud. |
| Phosote Lambiotte. | Sulfoxyl. |
| Pilules V. E. Doumer. | Sulfureux Pouillet. |
| Pneumo-lipase. | Sulfuryl Monal. |
| Polyvaline du D ^r Bayle. | Suppopirine. |
| Potion Adol. | Suppositoires Pyrax. |
| Prévalidine. | Tanno-calcine. |
| Primulyse. | Tapo. |
| Protidyne. | Terpoxyd interne. |
| Protonic. | Themsaline. |
| Pulmodynol. | Thiocol. |
| Pulmofluide. | Tubérol. |
| Pulmositoires. | Uraseptine Rogier. |
| Pulmo Verne. | Urisanine. |
| Pulvéol. | Uroformine Gobey. |
| Purargol. | Uroïodine. |
| Pyoformine. | Urol. |
| Pyréthane. | Urométhyl. |
| Quergénol. | Uromoméline Lambiotte. |
| Quinarsol. | Uromil. |
| Quinéine. | Urosan Dufayard. |
| Quinino-phytine Ciba. | Uvargol. |
| Quinoïdine Duriez. | Vaccin antigrippal du P ^r |
| Quinquina Gmet. | Minet. |
| Quinsal. | Vaccinothérapie atoxique |
| Recrésal. | Cépède. |
| Résyl. | Vaccins atoxiques stabilisés. |
| Rhinaquintine Lescène. | Vaccins injectables Virul- |
| Rhino-glottyl. | tra. |
| Rhino-liposeptine. | Vaccins intradermiques et |
| Rhoféine. | gelées-vaccins Ivago de |
| Salyptol Narty. | L. Goldenberg. |
| Sanaféine. | Vaccins Ronchèse (Ampho- |
| Sanex Inhalant. | Vaccins). |
| Sénécol. | Vaclydun. |
| Septicémine Cortial. | Véganine. |
| Septolan. | Zaryl. |
| Sérum Clin. | Zimbyl. |

X. — MALADIES INFECTIEUSES. T. S.**OREILLONS**

Anaquintine.
 Bucmine.
 Goménoléos.
 Iodex.
 Liposeptine.
 Polyvaline du D^r Bayle.

Suppositoires Pyrax.
 Terpoxyl interne.
 Tubérol.
 Véganine.
 Véralgine.

RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU**Voir aussi :**

Analgésiques externes.
Analgésiques internes.
Antipyrétiques.
Bactériophages.
Cataplasmes. Révulsifs.
Chimiothérapie. Colloïdes.
Sérums Vaccins.
Toni-cardiaques.

Alcalyl Wander..
 Algocratine.
 Algophagine.
 Ampho-vaccins Ronchèse.
 Ampoules Reipar.
 Anégrine.
 Ascéine.
 Atophan Cruet.
 Atophanyl Cruet.
 Atoquinol Ciba.
 Baume Adol.
 Baume Aroma.
 Baume Bengué.
 Baume Lartigol.
 Baume Rhodia.
 Bisalicylate.
 Bucmine.
 Cachets du D^r Boveil.
 Calmant Meunier.
 Cardio-streptine.
 Crédone Dehaussy.
 Crésopirine.
 Dolysine.
 Ektophanol.
 Endodermol.
 Erythra Dyn.
 Grains céphalgifuges.
 Immunizols Grémy.
 Immuno-vaccin antirhumatismal.

Iodex salicylé.
 Kalmigraine.
 Liposeptine.
 Magsalyl Mg.
 Myoden.
 Naïodine Logeais.
 Nopirine Vicario.
 Nucléocardyl.
 Panfébrine.
 Paradol.
 Pyréthane.
 Révulsif liquide Boudin.
 Révulsif Procipha.
 Rhésal Vicario.
 Rhocya Dyn.
 Salénal Ciba.
 Salène Ciba.
 Salicylate de soude Clin.
 Salysérum.
 Sambul.
 Sanaféine.
 Sédarthryl.
 Sédocalcyl.
 Septicémine Cortial.
 Sodisalyne.
 Spécifique Béjean.
 Sulfoïdol Robin.
 Sulfur concentré Dax.
 Sulfurion.
 Suppopirine.
 Thorix (Thorium X Rhemda).
 Triglandol.
 Trisalyl.
 Ulmarène Gigon.
 Véganine.
 Véralgine.
 Viophan.

X. — MALADIES INFECTIEUSES. T. S.

ROUGEOLE

Voir aussi :

Antipyrétiques.

Toniques.

Acridia.

Adrénargol.

Camphocalyptol.

Causyth.

Créositoires infantiles.

DiénoI.

Erythra Dyn.

Eucalyptine Lebrun.

Nasopon.

Pulmositoires.

Pulmoverne.

Pyroléol Edet.

Recrésal.

Rhino-liposeptine.

Sirop de Gaïarsol.

Sulfhydryal Chanteaud.

Suppositoires Pyrax.

SEPTICÉMIES

Voir aussi :

Antipyrétiques.

Antiseptiques internes.

Bactériophages.

Chimiothérapie.

Toni-cardiaques.

Sérums-Vaccins.

Alcamfétol.

Ampho-vaccins Ronchèse.

Aniodol.

Antigénines.

Ascéine.

Bactéphages.

Cador.

Camphodausse.

Campho-spartéine Dubois.

Camphostyl Lacroix.

Camphydryl Robin.

Ginnozyl.

Cryogénine.

DiénoI.

Electrargol.

Eucalyptine Lebrun.

Goménoléos.

Gonacrine.

Granions (Les).

Imunizols Grémy.

Institut Pasteur Sérums.

Lantol.

Leucoseptyl.

Lipodéterpénol. 3

Liposeptine.

Métaux colloïdaux A. Lancien.

Mycolysine du D^r Doyen.

Néo-physio.

Nitroyl Leisyn injectable.

Orargol Amicros.

Panfébrine.

Panxylon.

Physiosthénine.

Polyvaline du D^r Bayle.

Progone.

Propidon.

Protidyne injectable.

Pyoformine.

Recrésal.

Septicémine Cortial.

Sérums Clin.

Solucamphre Delalande.

Stalysine.

Stanion.

Staphylagone.

Staphylo-Vaclydun.

Strepto-Vaclydun.

Suppo-pyrax.

Térozone.

Terpoxyl interne.

Themsaline.

Vaccinothérapie Cépède.

Vaccins ~~at~~atoxiques stabilisés.

Vaccins bactériens I. O. D.

Vaccins Bruchettini.

Vaccins Clin.

Vaccins Ivago.

Vaccins Ronchèse. Ampho-

Vaccins.

Vaccins Stené.

Vaccins Virultra.

Vacciphages.

Vaclydun.

Zimbyl.

X. — MALADIES INFECTIEUSES. T. S.

TYPHOÏDE ET PARATYPHOÏDES

Voir aussi :

Antipyrétiques.
Antiseptiques internes.
Antiseptiques intestinaux.
Bactériophages.
Chimiothérapie.
Diététique.
Sérums-Vaccins.

Ampho-Vaccins Ronchèse.
Aniodol.
Antigénines.
Bactérophages.
Bilivaccin.
Casaldyl.
Causyth.
Chloramine Freyssinge.
Cryogénine Lumière.
Cryptargol Lumière.
Dioradin.
Entérofagos.
Entéro-Vaccin Lumière.
Eucalyptine Lebrun.

Goménoléos.
Immunizols Grémy.
Institut Pasteur Vaccins.
Lantol.
Leucoseptyl.
Liposeptine.
Métaux colloïdaux A. Lancien.
Néo-physio.
Nucléatol Robin.
Panbiline.
Panfébrine.
Physiosthénine.
Polyvaline du Dr Bayle.
Pyoformine.
Recrésal.
Septicémine Cortial.
Sérums Clin.
Sthénoléine.
Uvargol.
Vaccins bactériens-I. O. D.
Vaccins Ronchès & Ampho-Vaccins.

ZONA

Voir aussi :

Analgésiques internes.
Analgésiques externes.
Instrumentation.
Sérums-Vaccins.

Acécoclex.
Algocratine.
Algor.
Baumadol.
Baume Aroma.
Baume Bengué.
Cachets du Dr Bovcil.
Calmant Meunier.
Cataplasme du Dr Lelièvre.
Choléopeptine.
Crésotanol.
Curatine Brunet.
Dragécalcion.
Erythra Dyn.
Glyco-thymoline.

Kalmigraine.
Naïodine Logeais.
Néopancarpine.
Néo-physio. — Physiosthénine.
Nestosyl.
Névoral Rafey.
Névralgol Brossard.
Percainal Ciba.
Pommade au Nestosyl.
Pyroléol Edet.
Rectopanbiline.
Rozoderme.
Sanaféine.
Staprolysat.
Sulfarsénol.
Suppositoires Pyrax.
Ulmacétyl.
Véganine.
Véralgine.

XI. — MALADIES PARASITAIRES.

AMIBIASE

Voir aussi :

Diététique.
Instrumentation.
Produits vitaminés.
Toniques.
Tuberculose.
 Absuric.
 Amibiasine.
 Amiphène Carron.
 Amybdine.
 Arsaminol.
 Arsénobenzènes Clin.
 Bismuth Desleaux.
 Bismuth Tulasne.
 Caparlem.
 Chrysémine Longuet.

Cryptargol Lumière.
 Crésentyl.
 Géranine.
 Malarsan.
 Nigérine.
 Oxyfuge.
 Oxyléine.
 Panlabyl.
 Pâte Spécia.
 Prévarsyl.
 Sanluol.
 Stovafer.
 Stovarsol.
 Suppositoires Corbière.
 Tréparsinyl.
 Tréparsol.

HELMINTHIASE

Arsénobenzènes Clin.
 Bioentérase.
 Bismuth B 3.
 Bismuth Desleaux.
 Bismuth Tulasne.
 Carbonate de Bismuth.
 Chénantol.
 Chrysémine.
 Crésentyl.
 Curoxyure.
 Géranine.
 Glyco-thymoline.
 Granules Chanteaud.
 Mycidol Badel.
 Oxyfuge.

Oxyléine.
 Salvé.
 Stovarsol.
 Sulfa.
 Sulfureux Pouillet.
 Sulfuryl Monal.
 Tablettes Perroud.
 Ténifuge Bardet.
 Ténifuge Castel.
 Ténifuge du Dr Jacquet.
 Ténifuge français du Dr E.
 Dubourcau.
 Ténifuge Kirn.
 Vermifuge Cornet.
 Vermirène Audibert.

MALADIE DU SOMMEIL

Arsaminol.
 Arsénomyl.
 Bismuthoidol Robin.

Prévarsyl.
 Triluès.

PALUDISME

Voir aussi :

Anémies.
Antipyrétiques.
Cholagogues.
Insuffisance hépatique.
Toniques.
 Analgénine.
 Arsaminol.

Arsénomyl.
 Arsylène Roche.
 Bionéol.
 Biotrignon.
 Cachets du Dr Boveil.
 Cacodyle Gonnon.
 Catalyl Mg.
 Chophytol Rosa.
 Chophytol Rosa injectable.

XI. — MALADIES PARASITAIRES.

PALUDISME

| | |
|--|---------------------------|
| Diéménal. | Plurion. |
| Euchol Morellet. | Prévarsyl. |
| Férydal. | Pyréthane. |
| Ferrocodile et Ferricodile. | Quergémol. |
| Florhépatine. | Quinacrine. |
| Gamétoxyl. | Quina pepsiné Blot. |
| Gastrhéma. | Quinarsol antianémique. |
| Gouttes Daynoc. | Quinarsol fébrifuge. |
| Hectargyre. | Quinéine. |
| Hectine. | Quinicardine. |
| Hémoglobine Deschiens. | Quinio-stovarsol. |
| Hémostyl. | Quininophytine Ciba. |
| Hépalomel Védé. | Quinoforme Lacroix. |
| Ifranor. | Quinoïdine Duriez. |
| Iodaseptine Cortial. | Quinquina Gmet. |
| Iodonésyl. | Septicémine Cortial. |
| Malarsan. | Sérifer Laurençon. |
| Mangratinés. | Sérobiol. |
| Néoarsite. | Séroma Rey. |
| Nucléarsitol Robin. | Solucamphre quininé. |
| Opothérapie du D ^r Frayssé. | Solution quinquina Bardel |
| Orcalcine. | Sthénoléine. |
| Panbiline. | Sulfarsénol. |
| Panfébrine. | Syphonéol. |
| Panostyl. | Taburol Monal. |
| Panstomase. | Triluès. |
| Phagostyl. | Vanadarsine Guillaumin. |
| Phagostyl mangané. | Vin de Bugeaud. |
| Pilules V. E. Doumer. | |

PARASITES DE L'INTESTIN ET DES VOIES BILIAIRES

| | |
|-----------------------|--|
| Amibiasine. | Oxyléine. |
| Binoxol. | Pyrélaïne Collas |
| Bioentérase. | Rectagine. |
| Bismuth B. 3. | Rectopanbiline. |
| Bismuth Desleaux. | Rosalyl. |
| Bismuth Tulasne. | Salvé. |
| Caparlem. | Sulfa. |
| Carbalcaloïdes. | Sulfureux Pouillet. |
| Carbonate de Bismuth. | Sulfuryl Monal. |
| Chénantol. | Sulf-Y. |
| Chrysémine Longuet. | Tablettes Perroud. |
| Crésentyl. | Tænifuge Bardet. |
| Curoxyure. | Tænifuge Castel. |
| Gambéol. | Tænifuge français du D ^r E. |
| Géranine. | Duhourcau. |
| Glyco-thymoline. | Tænifuge Jacquet. |
| Granules Chanteaud. | Tréparsinyl. |
| Malarsan. | Vermifuge Cornet. |
| Nuco-Bismuthine. | Vermirène Audibert. |
| Oxyfuge. | |

XII. — OPHTALMOLOGIE.

ANESTHÉSIIQUES LOCAUX

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Allocaïne Lumière. | giques Chibret Optima. |
| Aristargol. | Pommades au Nestosyl. |
| Baume Panthésine Sandoz. | Scurocaïne. |
| Blüyl. | Solution huileuse au Nesto- |
| Chloraseptine Optima. | syl. |
| Collyres Chibret. | Stillargol. |
| Delcaïne Roques. | Thigénol Roche. |
| Nestosyl. | Tubes Blache. |
| Panthésine Sandoz. | Tubes Dulcis. |
| Percaïne Ciba. | Tubes du D ^r Guiraud. |
| Pommades aseptiques Dul- | Tubes ophtalmologiques |
| cis. | Ferlux. |
| Pommades ophtalmolo- | Tubes Strana. |

ANTISEPTIQUES LOCAUX

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Aniodol. | Pommades ophtalmolo- |
| Aristargol. | giques Chibret Optima. |
| Blüyl. | Poudre Chaumel. |
| Boricine Meissonnier. | Pyo-amphogel Ronchèse. |
| Cléarol. | Rosaseptor. |
| Collyres Chibret. | Térébine. |
| Comprimés d'Alibour. | Thigénol Roché. |
| Cryptargol Lumière. | Tubes Blache. |
| Electrargol. | Tubes du D ^r Guiraud. |
| Flavurool. | Tubes Dulcis. |
| Glyco-Thymoline. | Tubes ophtalmologiques |
| Inosepta ophtalmique. | Ferlux. |
| Optraex Famel. | Tubes Strana. |
| Opsomyl. | Vitargyl. |
| Pommades aseptiques Dul- | |
| cis. | |

BAINS D'YEUX

| | |
|-----------------|------------------------|
| Antipiol. | Pommades ophtalmolo- |
| Aristargol. | giques Chibret Optima. |
| Cléarol. | Poudre Chaumel. |
| Hamamélis Gmet. | Rosaseptor. |
| Optraex Famel. | |

INSTILLATIONS — COLLYRES

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Adrénaline Clin. | Orargol Amicros. |
| Adrénaline Invar. | Pandrénaline. |
| Adrénaline Sauba. | Panthésine Sandoz. |
| Adrénine. | Percaïne Ciba. |
| Allocaïne Lumière. | Rhinofluine. |
| Antipiol. | Sérélbé du D ^r Blaizot. |
| Blüyl. | Stillargol. |
| Collyres Chibret. | Térébine. |
| Electrocuprol. | |

XII. — OPHTALMOLOGIE.

POMMADES

Antiphlogistine.
Eczéda.
Méta-Vaccin.
Nitium Buisson.
Onction Leisyn.
Percainal Ciba.
Pommades aseptiques Dulcis.

Pommades ophtalmologiques Chibret Optima.
Salantale.
Tubes Blache.
Tubes du Dr Guiraud.
Tubes Dulcis.
Tubes ophtalmologiques Ferlux.
Tubes Strana.

XIII. — OPOTHÉRAPIE.

Adipolysine.
Agomensine.
Ampolases.
Androcalcion H et E.
Androsthérol.
Androstine Ciba.
Antélobine.
Arsécrinol.
Basedowine.
Carbolactyl bilié.
Cholépan Longuet.
Colloïdine.
Colloïdogénine du Dr Bayle.
Colloïdote Dubois.
Crinex.
Crinocardine.
Crino-sthéryl.
Endo-ovarina.
Endothymusine.
Féminadène.
Folestrine Grémy.
Follicormone buccale Hinglais.
Folliculine Choay.
Folliculine cristallisée du Dr Roussel.
Folli-lobine.
Gastricine.
Glandex phoscalcique.
Gravidostyl.
Gynœstryl.
Gynocalcion.
Hematoéthyroïdine.
Hémocalcine.
Hémoglobine Deschiens.

Hémoplasé.
Hémostyl.
Hémovaine.
Hépathemo.
Holosplénine.
Holovarine.
Hormocrinol.
Hormovarine Byla.
Hormuclases.
Indhaméline Lejeune pluriglandulaire.
Inogyl.
Inorénol.
Lutéovar.
Néo-Calciline.
Nervocithine.
Neurovarol.
Ocréine Grémy.
Oestrobrol.
Opoferrine vitaminée.
Opostyl Bouty.
Opothérapie Bouty.
Opothérapie Byla associée.
Opothérapie Byla simple.
Opothérapie Carrion.
Opothérapie Choay.
Opothérapie du Dr Frayssé.
Opothérapie Fournier.
Opothérapie Iscovesco.
Opothérapie Moncour.
Opothérapiques Pellissier.
Opozones Lumière.
Orchidine Optima.
Orex.
Ovaire Fournier.

XIII. — OPOTHÉRAPIE.

Ovaire Iscovesco.
 Oxydothyridine Pâris.
 Oxydovarine Pâris.
 Pancrébile.
 Panglandine Couturieux.
 Paratyridine.
 Peptosthénine Choay.
 Pitullobine Byla.
 Post-hypophyse Choay.
 Proxystases.
 Sédofofine.
 Sérodausse antitoxisényl.
 Sérodausse ovarien.
 Sérodausse infantile.
 Sérogyne.

Sistex.
 Sistomensine Ciba.
 Splénocrisine.
 Stomarol.
 Synchrones Choay.
 Térozone.
 Thyridine Grémy.
 Thyrocrisine Grémy.
 Thyroxine Roche.
 Triglandine.
 Valovarine.
 Vitacrine.
 Yo-Androl.
 Yo-gynine.

XIV. — OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE. T. G.

ANALGÉSQUES GÉNÉRAUX

Acobella.
 Acodros.
 Alcacyl Wander.
 Algocratine.
 Antigrippine Midy.
 Cachets du D^r Boveil.
 Chloral Bromuré du D^r Du-
 bois.
 Cibalgine.
 Coryzol.

Crédone Dechaussy.
 Curatine Brunet.
 Curogène.
 Erythra.
 Pyrélaine Collas.
 Somnicones Béral.
 Spasmalone.
 Véganine.
 Véralgine.

ANALGÉSQUES LOCAUX

Allocaïne Lumière.
 Aminoléine.
 Anaquintine.
 Baume Bengué.
 Baume Panthésine Sandoz.
 Camphydryl Robin.
 Cocaïne Midy.
 Delcaïne Roques.
 Dragées Bengué au Men-
 thol.
 Ephédrasmine.
 Ephédrocamphre.
 Eupnol.
 Fornose.
 Nestosyl.
 Osmoléine.

Otalgox.
 Otoléine.
 Pastilles M. B. C.
 Pâte Mireille.
 Percaïne Ciba.
 Pharyngaseptyl.
 Pharyngoléine.
 Rhino-glottyl.
 Rhino Salva.
 Sodisalyne.
 Solution huileuse au Nesto-
 syl.
 Stovaïne.
 Stovédrine.
 Stovoléine.

XIV. — OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE. T. G.**ANTISEPTIQUES**

| | |
|---------------------------------|--|
| Adenoseptyl. | Nazinette. |
| Adrénargol. | Néo-chloral Nau. |
| Aminoléine. | Oéreliode. |
| Ampho-tablettes Ronchèse. | Olisol. |
| Ampho-vaccins Ronchèse. | Osmoléine. |
| Anaquinine Lescène. | Otoléine. |
| Anexol. | Pastilles M. B. C. |
| Aniodol. | Pâte Neyret. |
| Argion. | Perquinol. |
| Argybil. | Pharyngaseptine. |
| Arhine. | Pharyngoléine. |
| Aristargol. | Phosorine. |
| Aseptorhine. | Purargol. |
| Bacté-Ricyl. | Résocaine. |
| Boricine Meissonnier. | Rhinacridyl. |
| Bulgarine Thépenier. | Rhinadrargol. |
| Camphocalyptol. | Rhinaspir. |
| Camphydryl Robin. | Rhinodrops Béral. |
| Clonazone Daufresne. | Rhino-Glottyl. |
| Collubleu. | Rhinol. |
| Corizol. | Rhinopharynxoïl. |
| Dermo-rhinistol. | Salychlore. |
| Dragées Bengué au Men- thol. | Sedorhinol. |
| Ephédrocamphre. | Séphydine. |
| Ephedrolénol. | Septolan. |
| Eucalyptine Lebrun. | Sinaseptic. |
| Eupnol. | Solarsyl. |
| Fornose. | Stillargol. |
| Galform Lambiotte. | Stovoléine. |
| Gargarisme du Mont Dore. | Sulfan. |
| Glyco M. | Sulphydral Chanteaud. |
| Glyco-Thymoline. | Sulfoxyl. |
| Goménoléos. | Sulfureux Pouillet. |
| Gosiérine Dalloz. | Sulfuryl Monal. |
| Gouttes Daynoc. | Sulf Y. |
| Iodex. | Térébine. |
| Iodo-Maisine. | Terpoxyl externe. |
| Leniforme. | Thigénol Roche. |
| Leucolyse. | Tubes Ferlux. |
| Mésiforme. | Uvargol. |
| Mucosodine. | Vaso-rhinol adrénaliné. |
| Nasargine. | Vaso-rhinol (simple et men- tholé). |
| Nasobore. | Vitargyl. |

GARGARISMES — COLLUTOIRES — LAVAGES

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Ampho-tablettes Ronchèse. | Clonazone Daufresne. |
| Anaquinine. | Colarsénol. |
| Anexol. | Collunovar. |
| Bacté-Ricyl. | Collutoires V. E. Doumer. |
| Boréol. | Edistol. |

XIV. — OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE. T. G.

GARGARISMES — COLLUTOIRES — LAVAGES

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Gargarisme du Mont-Dore. | Perubore. |
| Glyco-M. | Pharyngaseptyl. |
| Goménol. | Pharyngoléine. |
| HyoI. | Pulvéol. |
| Inhalation gargarisme Vo- | Rhinol. |
| caldop. | Saubarsinol. |
| Inolène. | Sédorhinol. |
| Iodassium. | Séphydine. |
| Leucolyse. | Septolan. |
| Mucosodine. | Sodisalyne. |
| Nasobore. | Solarsyl. |
| Néo-chloral Nau. | Sulfureux Pouillet. |
| Néol. | Térébine. |
| Orargol. | Terpoxyl externe. |
| Ozothine. | Vocaldop. |

INHALATIONS

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Anaquintine. | Perubore. |
| Balmiga. | Pharyngaseptyl. |
| Boréol. | Pulvéol. |
| Edistol. | Quintozol. |
| Eucalyptine Lebrun. | Rhinol. |
| Goménol. | Sanex inhalant. |
| HyoI. | Sédorhinol. |
| Inhalation gargarisme Vo- | Septolan. |
| caldop. | Sulfur concentré Dax. |
| Inhalation Lancoïne. | Sulfureux Pouillet. |
| Inhalol. | Sulfuryl Monal. |
| Inhalo-sel. | Térébine. |
| Inhaloxyl. | Terozone. |
| Nasobore. | Vocaldop. |
| Ozothine. | |

INSTILLATIONS — PULVÉRISATIONS

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Adénoseptyl. | Delcaine Roques. |
| Adrénargol. | Edistol. |
| Amborhinol. | Electrargol. |
| Ampho-vaccins Ronchèse. | Ephédrampoules Béral. |
| Anaquintine Lescène. | Ephédrasmine. |
| Antigénines. | Ephédrocamphre. |
| Antipyol. | Ephédroléol. |
| Argybil. | Ephédrisol Béral. |
| Aseptorhine. | Ephédrocure. |
| Bactéphages. | Ercérhinol. |
| Bacté-Ricyl. | Essoforme. |
| Camphocalyptol. | Eucalyptine Lebrun. |
| Citrolargol. | Glyco-M. |
| Corizol. | Goménoléos-Nasal. |

XIV. — OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE. T. G.**INSTILLATIONS — PULVÉRISATIONS**

Guttoléol.
 Hyol.
 Inorhynyl.
 Iodex.
 Képhédryl.
 Lenadryl.
 Léniforme.
 Nasargine.
 Nasobore.
 Néo-collargol.
 Oéréliode.
 Oliphédrol.
 Oléophédrine Béral.
 Olisol.
 Orargol Amicros.
 Otagolex.
 Otoléine.
 Purargol.
 Rhinacridyl.
 Rhinadrargol.

Rhinaquintine Lescène.
 Rhinaspir.
 Rhinodrops Béral.
 Rhinofluine.
 Rhinogénol.
 Rhino-glottyl.
 Rhino-Liposeptine.
 Rhinopharynxoïl.
 Rhino-Vaclydun Corbière.
 Sinuzyl.
 Stillargol.
 Stovédrine.
 Sulfa.
 Sulfureux Pouillet.
 Sulfuryl Monal.
 Térébine.
 Tubérol.
 Uvargol.
 Vaso-rhinol (simple et mentholé).

POMMADES

Acécolex.
 Aminoléine.
 Aniodol.
 Antipyol.
 Dermo-rhinistol.
 Eczéda.
 Ektogan.
 Electrargol.
 Ephédrorhinol.
 Eupnol.
 Fornose.
 Gelée-vaccin Ivago (anti-pyogène).
 Goménol-Rhino.
 Inosepta.
 Iodex.

Nasopon.
 Nasosulfolarsan.
 Onction Leisyn.
 Osmoléine.
 Percainal Ciba.
 Perquinol.
 Phosorine.
 Résocaïne.
 Rhinol.
 Rhinosalva.
 Sédorhinol.
 Sinuzyl.
 Stovédrine.
 Stovoléine.
 Tubes Chauvin.
 Vaso-rhinol adrénaline.

POUDRES

Arhine Lambiotte.
 Aristargol.
 Biolactyl Fournier.
 Boricine Meissonnier.
 Bulgarine Thépenier.
 Cimatrïyl.
 Ektogan.
 Inhalation gargarisme Vo-caldon.

Kydalose.
 Pharyngaseptyl.
 Pulvéol.
 Rhinaspir.
 Salasényl (poudre).
 Vioforme Ciba.

XIV. — OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE. T. G.

*** VASO-CONSTRICTEURS — DÉCONGESTIFS**

Adrénaline Clin.
 Adrénaline Invar.
 Adrénaline Sauba.
 Adrénargol.
 Adrénine.
 Allocaine Lumière.
 Amborhinol.
 Aminoléine.
 Anaquintine.
 Coryzol.
 Efryl.
 Ephédrampoules Béral.
 Ephédrasmine.
 Ephédrolénol.
 Ephédro-Rhinol.
 Ergotine Lamante.
 Eupnol.
 Ferroxyline.
 Fornose.
 Hémostatique Coudert.

Hémostatique Goy.
 Kidoline.
 Lénadryl.
 Osmoléine.
 Otalgolex.
 Otoléine.
 Pandrénaline.
 Pharyngoléine.
 Rénaleptine.
 Rhinaquintine Lescène.
 Rhinodrops Béral.
 Rhino-glottyl.
 Rhino-Salva.
 Sédorhinol.
 Sinaseptic.
 Stovédrine.
 Stovoléine.
 Sulfan.
 Vasorhinol Adrénaline.

XIV. — OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE. T. S.

ANGINES AIGÜES

Voir aussi :

Analgésiques internes.
Antipyrétiques.
Antiseptiques externes.
Bactériophages.
Bactériothérapie. Ferments
lactiques.
Gargarismes.
Inhalations.
Instillations.
Sérums Vaccins.
Vaso-constricteurs déconges-
tifs. (O. R. L.)

Acridia.
 Adénoseptyl.
 Adrénargol.
 Alcacyl Wander.
 Aminoléine.
 Ampho-tablettes Ronchèse.
 Ampho-vaccins Ronchèse.
 Anaquintine Lescène.
 Anexol.

Argion.
 Bacté-Ricyl.
 Baume Bengué.
 Boréol.
 Capsules Küchner au Mé-
 captol.
 Cibalgine.
 Clonazone Daufresne.
 Cocaïne Midy.
 Colarsénol.
 Collunovar.
 Collutoire V. E. Doumer.
 Corizol.
 Crédone Dehaussy.
 Dragées Bengué au Menthol
 Edistol.
 Electrargol.
 Erythra.
 Galform Lambiotte.
 Gargarisme du Mont-Dore.
 Glyco-M.
 Glyco-thymoline.
 Gosiérine Dalloz.

XIV. — OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE. T. S.**ANGINES AIGÜES**

Gouttes Daynóc.
 Hamamélis Gmet.
 Inolène.
 Iodassium.
 Leucolyse.
 Mésoforme.
 Mucosodine.
 Nasobore.
 Néo-chloral Nau.
 Néol.
 Oéreliode.
 Oxymenthol Perraudin.
 Pastilles M. B. C.
 Pâte Mireille.
 Perubore.
 Pharyngaseptyl.
 Pharyngoléine.
 Pulvéol.
 Purargol.
 Pyréthane.
 Rhinacridyl.
 Rhinol.
 Rhino-liposeptine.
 Rhino-Vaclydun Corbière.
 Salychlore.

Saubarsinol.
 Sédorhinol.
 Séphydine.
 Septicémine Cortial.
 Septolan.
 Séro-comprimés I. M.
 Sérolactyl I. M.
 Sirop Cassibor.
 Sodisalyne.
 Solarsyl.
 Staphylase du Dr Doyen.
 Staphylo-coccine Fraquet.
 Sulphydral Chanteaud.
 Sulfo-thiorine.
 Sulfuryl Monal.
 Térébine.
 Terpoxy externe.
 Themsaline.
 Thiorine.
 Vaccins Sténé.
 Vaclydun.
 Vaso-rhinol adrénaline.
 Vaso-rhinol simple et mentholé.

ANGINE DE VINCENT

Voir aussi :

Angines aiguës.

Adrénargol.
 Anexol.
 Arsénobenzènes Clin.
 Colarsénol.
 Collunovar.
 Collutoire V. E. Doumer.
 Iodosan.
 Nasobore.
 Néo-Chloral Nau.
 Néol.
 Néophysiosthénine.

Novarsénobenzol Billon.
 Odarsol.
 Rhino-liposeptine.
 Rhino Vaclydun Corbière.
 Sodarsinol.
 Séphydine.
 Septicémine Cortial.
 Solarsyl.
 Sulfarsénol.
 Suppositoires Corbière.
 Themsaline.
 Tréparsol.
 Triluès.

BOURDONNEMENTS D'OREILLES — SURDITÉ

Voir aussi :

Artério-sclérose.

Acécoline.
 Acœgénol.
 Anaquintine.
 Athérollysine.
 Audigénine.
 Collo-iode Dubois.

Décholestrol.
 Détensyl.
 Dicaliode.
 Eranol.
 Globules Fumouze à l'iodure de potassium.
 Glycocarpine.
 Gouttes Fluvia.
 Guimelinde.

XIV. — OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE. T. S.

BOURDONNEMENTS D'OREILLES — SURDITÉ

Hamamélis Gmet.
Hémoductyl.
Hypotan.
Otoléine.
Paniode.
Sédopancrine.
Silguine.
Silicyl.
Solvosclérose.

Spasmosédine.
Surparine.
Tensédine.
Tensol Laurençon.
Tiodine Cognet.
Vaso-neurine.
Vasonitryl.
Verticurine.

CORYZAS (AIGU, CHRONIQUE)

Voir aussi :

Bactériophages
Inhalations.
Instillations.

Acodros.
Adénoseptyl.
Adrénaline Clin.
Adrénaline Invar.
Adrénaline Sauba.
Adrénargol.
Adrénine.
Amborhinol.
Aminoléine.
Ampho-vaccin rhino-pharyngien Ronchèse.
Anaquintine.
Aniodol.
Antigrippine Midy..
Arcanan.
Argion.
Argybil.
Arhine.
Aristargol.
Aseptorine.
Bacté-phages.
Biolactyl Fournier.
Boréol.
Bulgarine Thépenier.
Camphocalyptol.
Cimatryl.
Citrolargol.
Corizol.
Coryphédrine.
Curatine.
Dermo-rhinistol.
Edistol.
Electrargol.
Ephédrampoules Béral.
Ephédrasmine.

Ephédrisol Béral.
Ephédrocamphre.
Ephédrine Houdé.
Ephédrocure.
Ephédrolénol.
Ephédro-rhinol.
Ercérhinol.
Erythra.
Essoforme.
Eucalyptine Lebrun.
Eupnol.
Fornose.
Glyco-M.
Glyco-thymoline.
Goménoléos
Gouttes bronchophiles
André.
Gouttes Nican.
Grains d'éphédrine Béral.
Granulé des Vosges.
Guttoléol.
Hydrorrhéol.
Hyal.
Hypophédrine.
Immuno - vaccin broncho-pulmonaire.
Inhalation Lancosme.
Inhalation Vocaldop.
Inhalol.
Inhalo-sel.
Inhaloxyl.
Inorhinyl.
Iodex.
Juranol.
Képhédryl.
Kidoline.
Kinectine.
Kydalose.
Lenadryl.
Leniforme.

XIV. — OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE. T. S.

CORYZAS (AIGUS, CHRONIQUES)

Mucosodine.
 Nasargine.
 Nasobore.
 Nasopon.
 Naso-sulfarsan.
 Nazinette.
 Néo-chloral Nau.
 Néo-Collargol.
 Néopancarpine.
 Néo-physio.
 Oéréliode.
 Oliphédrol.
 Oléophédrine Béral.
 Orargol Amicros.
 Osmoléine.
 Ozothine.
 Pandrénaline.
 Percainal.
 Perubore.
 Phosorine.
 Protiodyne injectable.
 Pulvéol.
 Purargol.
 Quintosol.
 Résocaine.
 Rénaleptine.
 Rhinacridyl.
 Rhinadrargol.
 Rhinaquintine.
 Rhinaspir.
 Rhinodrops Béral.
 Rhinofluine.
 Rhinogénol.
 Rhino-Glottyl.
 Rhinol.

Rhino-liposeptine.
 Rhino-pharynxoil.
 Rhino-Salva.
 Rhino-Vaclydun Corbière.
 Salantale.
 Salex inhalant.
 Sédorhinol.
 Séphydine.
 Séro-comprimés I. M.
 Sérolactyl I. M.
 Sinusyl.
 Solution huileuse au Nesto-
 syl.
 Spicanol.
 Staphylase du Dr Doyen.
 Stillargol.
 Stopral.
 Stovédrine.
 Stovoléine.
 Térébine.
 Térozone.
 Terpoxyl externe.
 Tubérol.
 Vaccins intradermiques et
 Gelées-vaccins Ivago de
 L. Goldenberg.
 Vaccins Virultra.
 Vaccins Ronchèse. — (Am-
 pho-vaccins).
 Vaccins Sténé.
 Vaclydun.
 Vaso-rhinol adrénaliné.
 Vaso-rhinol simple et men-
 tholé.
 Vitargyl.

CORYZA SPASMODIQUE — RHUME DES FOINS

Voir aussi :

Allergies.
Bactériophages.
Inhalations.
Instillations.

Acatar.
 Adrénargol.
 Adréphédrine Béral.
 Amborhinol.
 Amphotonyl.
 Anaciasine Ranson.
 Anapeptone Vassal.
 Anaquintine Lescène.

Antiasthme Bengalais.
 Aséphéine.
 Balmiga.
 Biophylatine Mg.
 Cafédrine.
 Coryphédrine.
 Coryzol.
 Efryl.
 Electrargol.
 Entéro-antigènes.
 Ephédrampoules Béral.
 Ephédrasmine.
 Ephédrine Houdé.
 Ephédrisol Béral.

XIV. — OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE. T. S.

CORYZA SPASMODIQUE — RHUME DES FOINS

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Ephédrocamphre. | Néopancarpine. |
| Ephédrocure. | Oléophédrine Béral. |
| Ephédrolénol. | Oliphédrol. |
| Ephédrorhinol. | Olisol. |
| Essoforme. | Osmoléine. |
| Eupnol. | Ozothine. |
| Fornose. | Perofreinix. |
| Freinix. | Poudre Escoufflaire. |
| Frénasma. | Protiodyne injectable. |
| Glyco-M. | Pyréthane. |
| Glyco-Thymoline. | Quintosol. |
| Goménol. | Rhinaquintine Lescène. |
| Gains d'éphédrine Béral. | Rhinaspir. |
| Hectine. | Rhinodrops Béral. |
| Hydrorrhéol. | Rhino-Glottyl. |
| Hypophédrine. | Rhinofluine. |
| Iodex. | Rhino-liposeptine. |
| Jabosulfène. | Rhino-Salva. |
| Képhédryl. | Sanédrine. |
| Kidoline. | Sanex inhalant. |
| Kinectine. | Spasmonéural. |
| Lenadryl. | Stovédrine. |
| Lugocalcion. | Stovoléine. |
| Mucosodine. | Sulfoxyl. |
| Nasopon. | Térozone. |
| Nazinette. | Terpoxyl externe. |

LARYNGITES AIGÜES, CHRONIQUES

Voir aussi :

*Antispasmodiques, sédatifs
de la toux.*
Cataplasmes.
Vaso-constricteurs décon-
gels.

| | |
|--|------------------------|
| Acobella. | Citrolargol. |
| Acodros. | Cocaine Midy. |
| Adénoseptyl. | Codérax. |
| Adrénargol. | Codoforme. |
| Aminoléine. | Comprimés Nican. |
| Ampho-tablettes Ronchèse. | Corizol. |
| Antigrippine Midy. | Curiode. |
| Arcanan. | Curiode arsénié. |
| Balmiga. | Dicodéine Lafran. |
| Boréol. | Dragées Bengué au Men- |
| Bronchoforme. | thol. |
| Camphocalyptol. | Edistol. |
| Capsules Kuchner au Mé- | Efryl. |
| captol. | Ephédrasmine. |
| Capsules Noguès. | Ephédrocamphre. |
| Cataplasme du D ^r Lelièvre. | Ephédrocure. |
| | Ephédrolénol. |
| | Eucalyptine Lebrun. |
| | Euphon. |
| | Fornose. |
| | Galform Lambiotte. |
| | Gatercodéine Domergue. |
| | Glottyl. |

XIV. — OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE. T. S.

LARYNGITES AIGÜES, CHRONIQUES

- | | |
|---|-----------------------------------|
| Glyco-M. | Pulmodynol. |
| Glyco-Thymoline. | Quinthéryl. |
| Goménoléos. | Quintosol. |
| Gosiérine Dalloz. | Révuksif liquide Boudin. |
| Gouttes bronchophiles André. | Révuksif Milko. |
| Gouttes Daynoc. | Révuksif Procipha. |
| Gouttes Eryl. | Révuksoplasmé. |
| Gouttes Linober. | Rhinacridyl. |
| Gouttes Malone. | Rhinadrargol. |
| Gouttes Nican. | Rhinaquintine Lescène. |
| Granulé des Vosges. | Rhinogénol. |
| Guttoléol. | Rhino-Glottyl. |
| Hyal. | Rhinol. |
| Infangyl Carlier. | Rhinopharynxol. |
| Inhalation gargarisme Vocaldop. | Rhino-Salva. |
| Inhalation Lancosme. | Salypsol Narty. |
| Inhalol. | Sclérosérum. |
| Inhalo-sel. | Sédorhinol. |
| Inhaloxyl. | Séphydine. |
| Iodex. | Septolan. |
| Képhédryl. | Sérolactyl I. M. |
| Lenadryl. | Sinaseptic. |
| Léniforme. | Sinuzyl. |
| Miroxyl. | Sirop Brahma. |
| Mucosodine. | Sirop de créosote Vacheron. |
| Murones du D ^r Robert Jacques. | Sirop minéral sulfureux Crosnier. |
| Narçyl. | Sirop de Sirtal. |
| Nasargine. | Sirop Vacheron au Galacal. |
| Nasobore. | Spicanol. |
| Nasopon. | Stillargol. |
| Néol. | Sulfothiorine. |
| Néophysio. | Sulfoxyl. |
| Néopulmine. | Sulfureux Pouillet. |
| Oéreléode. | Sulfuryl Monal. |
| Oliphédrol. | Sulphium. |
| Olisol. | Térébine. |
| Ozothine. | Térozone. |
| Pastilles M. B. C. | Terpine Gonnon. |
| Pâte Mireille. | Terpine granulée Baron. |
| Perubore. | Thio-terpine Dalin. |
| Pharyngaseptyl. | Thiosédal. |
| Pharyngoléine. | Vaccins Virultra. |
| Physiosthénine. | Valthène. |
| Pilka (gouttes). | Vaso-rhinol (simple et mentholé). |
| Pulmodion. | Vocaldop. |

XIV. — OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE. T. S.

LARYNGITE STRIDULEUSE

Voir aussi :

Antispasmodiques, sédatifs de la toux.

Cataplasmes.

Vaso - constricteurs décongestifs.

Anaquinine.

Cataplasme du D^r Lelièvre.

Ephédrolénol.

Gouttes Malone.

Infangyl Carlier.

Kidoline.

Lobéline Bruneau.

Lobéline Sandoz.

Sédoneurol Dehaussy

Spasmalgine Roche.

Spasmalone.

Spasmoneural.

OTITES — MASTOÏDITES

Voir aussi :

Analgésiques externes.

Analgésiques internes.

Analgésiques généraux.

Analgésiques locaux.

Antiseptiques O. R. L.

Bactériophages.

Chimiothérapie - colloïdes.

Instillations.

Sérums-Vaccins.

Amborhinol.

Ampho-vaccins Ronchèse.

Anaquinine Lescène.

Anexol.

Aniodol.

Antiplol.

Audigénine.

Bacté-phages.

Boricine Meissonnier.

Cachets du D^r Boveil.

Cibalgine.

Citrolargol.

Curatine.

Dermo-rhinistol.

Edistol.

Electrargol.

Ercérhinol.

Guttoléol.

Immunizols Grémy.

Ivago de Goldenberg. Vac-

cin « P ».

Képhédryl.

Kydalose.

Lysaxins L. M. L.

Mucosodine.

Nasargine.

Naso-sulfolarsan.

Nazinette.

Nestosyl.

Oéréliode.

Orargol Amicros.

Osmo-vaccin Bréant.

Otagolex.

Protiodine injectable.

Pyréthane.

Salantale.

Sédoorhinol.

Séphydine.

Septolan.

Solution huileuse au Nesto-

syl.

Térébine.

Terpoxyl externe.

Vaccinothérapie atoxique

Cépède.

Vaccin Ivago de Golden-

berg.

Vaccins Virultra.

Vaccins Ronchèse. (Am-

pho-vaccins).

Vasorhinol (simple et men-

tholé).

Véganine.

Vitargyl.

XIV. — OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE. T. S.

OZÈNE

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Acécoclex. | Nazinette. |
| Acécoline. | Oliphédrol. |
| Anexol. | Osmoléine. |
| Antipiol. | Résocaine. |
| Argion. | Rhinaquintine Lescène. |
| Argybil. | Rhinaspir. |
| Arhine Lambiotte. | Rhinofluine. |
| Aseptor. | Rhino-Glottyl. |
| Boricine Meissonnier. | Rhino-liposeptine. |
| Bulgarine Thépenier. | Rhino-pharynxoil. |
| Cimatryl. | Séphydine. |
| Cortiode. | Sérolactyl I. M. |
| Dermorhinistol. | Stovoléine. |
| Ektogan Bocquillon. | Sulfo-thiorine. |
| Ephédrocamphre. | Sulfureux Pouillet. |
| Ephédrocure. | Sulfuryl Monal. |
| Ephédrolénol. | Térébine. |
| Eupnol. | Terpoxyl externe. |
| Fornose. | Thiorine. |
| Glyco-M. | Vaccinothérapie atoxique |
| Inhalation Lancosme. | Cépède. |
| Ivago de Goldenberg Vac- | Vaccins intradermiques et |
| cin « R ». | Gelées Vaccins Ivago de |
| Kydalose. | L. Goldenberg. |
| Mucosodine. | Vaccins Sténé. |
| Naso-sulfolarsan. | |

PHARYNGITES AIGÜES

Voir aussi :

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| <i>Analgésiques internes.</i> | Camphocalyptol. |
| <i>Anesthésiques locaux.</i> | Camphydryl Robin. |
| <i>Gargarismes.</i> | Castanol. |
| <i>Inhalations.</i> | Citrolargol. |
| <i>Instillations.</i> | Cocaine Midy. |
| <i>Vaso-constricteurs déconges-</i> | Codérax. |
| <i>tifs.</i> | Dermo-rhinistol. |
| Acridia. | Dragées Bengué au Men- |
| Adénoseptyl. | thol. |
| Adrénargol. | Edistol. |
| Amborhinol. | Electrargol. |
| Aminoléine. | Ephédrasmine. |
| Ampho-tablettes Ronchèse. | Ephédrocamphre. |
| Antigrippine Midy. | Ephédrolénol. |
| Arcanan. | Ercérhinol. |
| Argion. | Eucalyptine Lebrun. |
| Argybil. | Euphon. |
| Arhine Lambiotte. | Fornose. |
| Bacté-phages. | Galform Lambiotte. |
| Balmiga. | Gargarisme du Mont-Dore. |
| Boréol. | Gatercodéine Domergue. |
| | Glottyl. |
| | Glyco-M. |

XIV. — OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE. T. S.

PHARYNGITES AIGÜES

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Glyco-Thymoline. | Pharyngoléine. |
| Goménoléos. | Phosorine. |
| Gosiérine Dalloz. | Pulvéol. |
| Gouttes Daynoc. | Purargol. |
| Gouttes Eryl. | Rhinacridyl. |
| Gouttes Linober. | Rhinadrargol. |
| Granulé des Vosges. | Rhinofluine. |
| Guttoléol. | Rhino-Glottyl. |
| H yol. | Rhinol. |
| Immunizols Grémy. | Rhino-liposeptine. |
| Inhalation gargarisme Vo- | Rhino-pharynxoil. |
| caldop. | Rhino-Salva. |
| Inhalation Lancosme. | Rhino Vaclydun Corbière. |
| Inhalol. | Séphydine. |
| Inhalo-sel. | Sérolactyl I. M. |
| Inhaloxyl. | Stovaine. |
| Inolène. | Sulfan. |
| Inorhinyl. | Sulfoxyl. |
| Lénadryl. | Sulfureux Pouillet. |
| Léniforme. | Sulfuryl Monal. |
| Nasargine. | Sulphium. |
| Nasobore. | Terpine Gonnon. |
| Nasopon. | Terpine granulée. |
| Naso-sulfolarsan. | Terpoxyl externe. |
| Nazinette. | Tubérol. |
| Néo-chloral Nau. | Vaccins pansements Virul- |
| Néol. | tra. |
| Néo-physio. — Physiosthé- | Vaccins Ronchèse. — (Am- |
| nine. | pho-vaccins.) |
| Oéréliode. | Vaccins Sténé. |
| Oxymenthol Perraudin. | Vaclydun. |
| Pastilles M. B. C. | Vaso-Rhinol adrénaliné. |
| Pâte Mireille. | Vaso-Rhinol simple et men- |
| Perubore. | tholé. |
| Pharyngaseptyl. | Vocaldop. |

RHINO-PHARYNGITES CHRONIQUES

Voir aussi :

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| <i>Analgésiques externes.</i> | Adrénine. |
| <i>Antiseptiques O. R. L.</i> | Algostérine Oliviero. |
| <i>Gargarismes.</i> | Amborhinol. |
| <i>Inhalations.</i> | Aminoléine. |
| <i>Instillations.</i> | Ampho-Vaccin rhino-pa- |
| <i>Sérums-Vaccins.</i> | ryngien Ronchèse. |
| <i>Vaso-constricteurs déconges-</i> | Anaquinine. |
| <i>tifs.</i> | Argion. |
| Acatar. | Argybil. |
| Adrénaline Clin. | Arhine Lamblotte. |
| Adrénaline Invar. | Aseptor. |
| Adrénaline Sauba. | Aseptorhine. |
| Adrénargol. | Bacté-phages. |
| | Balmiga. |
| | Biocéane. |

XIV. — OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE. T. S.

RHINO-PHARYNGITES CHRONIQUES

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Boréol. | Osmo-vaccins Bréant. |
| Camphocalyptol. | Oxymenthol Perraudin. |
| Citrolargol. | Ozothine. |
| Cocaïne Midy. | Pandrénaline. |
| Corizol. | Pastilles M. B. C. |
| Dermo-rhinistol. | Pâte Mireille. |
| Dragées Bengué au men- | Pharyngaseptyl. |
| thol. | Pharyngoléine. |
| Edistol. | Phosorine. |
| Electrargol. | Plasmarine. |
| Entéroantigènes. | Résocaïne. |
| Ephédrasmine. | Rhinaquintine Lescène. |
| Ephédrocamphre. | Rhinofluine. |
| Ephédrocure. | Rhino-Glottyl. |
| Ephédrolénol. | Rhinol. |
| Ephédro-rhinol. | Rhino-liposeptine. |
| Essoforme. | Rhino-Vaclydun Corbière. |
| Eucalyptine Le Brun. | Salantale. |
| Euphon. | Salychlore Lavire. |
| Fornose. | Slérosérum. |
| Galform Lambiotte. | Séro-comprimés I. M. |
| Gargarisme du Mont-Dore. | Sérolactyl I. M. |
| Glottyl. | Stillargol. |
| Goménol. | Stovédrine. |
| Gosiérine Dalloz. | Sulfa. |
| Guttoléol. | Sulfan. |
| Immunizols Grémy. | Sulfoidol Robin. |
| Inhalation gargarisme Vo- | Sulfo-thiorine. |
| caldop. | Sulfoxyl. |
| Inhalo-sel. | Sulfur concentré Dax. |
| Inhaloxyl. | Sulfureux Pouillet. |
| Inorhinyl. | Sulfurion. |
| Iodo-Maisine. | Sulfuryl Monal. |
| Lénadryl. | Sulphium. |
| Mygdal. | Térozone. |
| Nasargine. | Thiorine. |
| Nasobore. | Vaccins Ronchèse. (Am- |
| Nasopon. | pho-vaccins). |
| Néo-physio. — Physios- | Vaccins Virultra. |
| thénine. | Vaclydun. |
| Oéréliode. | Vaso-rhinol adrénaliné. |
| Oliphédrol. | Vaso-rhinol simple et men- |
| Olisol. | tholé. |

SINUSITES

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Voir aussi : | Sérums-Vaccins. |
| Analgésiques externes. | Vaso-constricteurs déconge- |
| Analgésiques internes. | tifs. |
| Antiseptiques O. R. L. | |
| Inhalations. | Adénoseptyl. |
| Instillations. | Adrénargol. |
| Pommades. | Amborhinol. |

XIV. — OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE. T. S.

SINUSITES

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Aminoléine. | Néo-Collargol. |
| Ampho-vaccins Ronchèse. | Oléophédrine Béral. |
| Anaquintine Lescène. | Oliphédro. |
| Anexol. | Olisol. |
| Aniodol. | Orargol Amicros. |
| Antigénines. | Osmoléine. |
| Antipiol. | Osmo-vaccins Bréant. |
| Argion. | Ozothine. |
| Argybil. | Perubore. |
| Bacté-phages. | Pharyngaseptyl. |
| Balmiga. | Pharyngoléine. |
| Biolactyl Fournier. | Phosorine. |
| Boréol. | Pulvéol. |
| Bulgarine Thépenier. | Purargol. |
| Cibalgine. | Pyréthane. |
| Cimatryl. | Résocaine. |
| Citrolargol. | Rhinacridyl. |
| Corizol. | Rhinadrargol. |
| Curatine. | Rhinaquintine Lescène. |
| Edistol. | Rhinaspir. |
| Electrargol. | Rhinogénol. |
| Ephédrampoules Béral. | Rhino-Glottyl. |
| Ephédrasmine. | Rhinol. |
| Ephédrisol Béral. | Rhino-liposeptine. |
| Ephédrocamphre. | Rhino-pharynxoil. |
| Ephédrocure. | Rhino-Salva. |
| Ephédrolénol. | Salantale. |
| Ephédrorhinol. | Sanex-Inhalant. |
| Ercérhinol. | Séphydine. |
| Essoforme. | Sédorhinol. |
| Eupnol. | Sérolactyl I. M. |
| Fornose. | Sinuzyl. |
| Glyco-Thymoline. | Stillargol. |
| Goménol-Rhino. | Stovédrine. |
| Guttoléol. | Stovoléine. |
| Immunizols Grémy. | Sulfa. |
| Inhalation Vocaldop. | Sulfureux Pouillet. |
| Inhalol. | Sulfuryl Monal. |
| Inhalo-sel. | Térébine. |
| Inhaloxyl. | Terpoxyl externe. |
| Inolène. | Uvargol. |
| Ivago de Goldenberg. — | Vaccin Ivago de Golden- |
| Vaccin « P ». | berg. |
| Képhédryl. | Vaccins Ronchèse. (Am- |
| Kydalose. | pho-vaccins). |
| Lénadryl. | Vaccins Virultra. |
| Léniforme. | Vagostabyl. |
| Nasargine. | Vaso-rhinol simple men- |
| Nasobore. | tholé et adrénaliné. |
| Nasopon. | Véganine. |
| Naso-sulfolarsan. | Vitargyl. |
| Nazinette. | |

XIV. — OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE. T. S.

VÉGÉTATIONS ADÉNOÏDES — ADÉNOÏDITES

Voir aussi :

Antiseptiques (O. R. L.).

Inhalations.

Instillations.

Pommades.

Toniques.

Vaso-constricteurs Décongestifs.

Adénoseptyl.

Adrénargol.

Algotérine Oliviero.

Amborhinol.

Aminoléine.

Anaquinine Lescène.

Anexol.

Aniodol.

Argybil.

Aristargol.

Aseptorhine.

Bacté-phages.

Bacté-ricyl.

Biocéane.

Cinol.

Collunovar.

Curiode.

Curiode arsénisé.

Dicaliode.

Edistol.

Electrargol.

Ephédrasmine.

Ephédrocamphre.

Ephédrolénol.

Ercérhinol.

Eupnol.

Fornose.

Galform.

Gargarisme du Mont-Dore.

Glyco-M.

Glyco-Thymoline.

Goménol.

Guttoléol.

I. A. M.

Iodométine.

Kidoline.

Lenadryl.

Mygdal.

Nasargine.

Nasopon.

Naso-sulfolarsan.

Nazinette.

Odarsol.

Osmoléine.

Pharyngoléine.

Phosorine.

Plasmarine.

Purargol.

Rhinaquinine Lescène.

Rhinodrops Béral.

Rhinogénol.

Rhino-Glottyl.

Rhinol.

Rhino-pharynxoil.

Rhino-Vaclydun Corbière.

Rhino-Salva.

Sédorhinol.

Sérolactyl I. M.

Spicanol.

Stillargol.

Stovoléine.

Sulfan.

Tubérol.

Vaso-rhinol adrénaliné.

Vaso-rhinol simple et mentholé.

Vitargyl.

XV. — RADIOGRAPHIE.

Diagnothorine.

Foriode.

Gélobarine.

Géo-Baryum.

Lipiodol Lafay.

Radiopaque Heudebert.

Radiotétrane Gérard.

XVI. — STOMATOLOGIE.

Voir aussi :

Analgésiques externes.
 Analgésiques internes.
 Gargarismes.
 Toniques.
 Sérums-Vaccins.
 Anesthésiques locaux.
 Rachitisme.
 Bactériophages.
 Antiseptiques externes com-
 primés.
 Antiseptiques externes li-
 quides.
 Ampho-tablettes Ronchèse.
 Ampho-vaccins Ronchèse.
 Anexol.
 Arsénogeyl.
 Baume Panthésine Sandoz.
 Boricine Meissonnier.
 Bromure de calcium (sirop
 Henry Mure au).
 Calciline.
 Calcium Sandoz.
 Chloro-calcion.
 Clonazone Daufresne.
 Coaltar saponiné Le Beuf.
 Curatine.
 Dragées Bengué au Men-
 thol.
 Fluosalyl Beaugourdon.
 Gelée vaccin Ivago (anti-
 pyorrhéique).
 Glyco-Thymoline.
 Goménol-dentifrice.
 Gosiérine Dalloz.
 Gouttes Daynoc.
 Grains céphalgifuges.
 Hémostérine irradiée.
 Inoxyl.
 Iodosan.

Ivago de Goldenberg. —
 Vaccin « B ».
 Laurénol médicinal.
 Lait de magnésie Phillips.
 Leucolyse.
 Mésosome.
 Néalgyl.
 Néo-chloral Nau.
 Néol.
 Nestosyl.
 Odarsol.
 Opophos.
 Pastilles M. B. C.
 Pâte dentifrice Ivago.
 Pâte gingivale à l'acétylar-
 san.
 Percaine Ciba.
 Pharyngaseptyl.
 Phytogyl.
 Prodynase.
 Pyrèthane.
 Salychlore Lavire.
 Sanogyl.
 Sanoram.
 Séphydine.
 Septicémine Cortial.
 Solution huileuse au Nesto-
 syl.
 Spirogyl.
 Stérogyl.
 Stovaine.
 Sulfarsénol.
 Terpoxy externe.
 Tochlorine.
 Triluès.
 Tripyoryl.
 Vaccin Ivago de Golden-
 berg.
 Véralgine.
 Vitamine Cortial.

XVII. — SYPHILIS.

PRÉVENTIFS

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Comprimés Vaginaux Lei- syn. | Préventyl. Salvatyl. |
|---------------------------------|---------------------------|

XVII. — SYPHILIS.

TRAITEMENT ARSENICAL

| | |
|--|-------------------------|
| Acétylarsan. | Pentalues. |
| Arsaminol. | Phagosthyl. |
| Arsénobenzènes Clin. | Plurion. |
| Arsénomyl. | Prévarsyl. |
| Arsénos-solvant. | Rhodarsan. |
| Arsylène Roche. | Rob Oberlin. |
| Cacodyline Jammes. | Sirop Morlas. |
| Elixir Spes du D ^r Guiraud. | Stovarsol. |
| Galyl. | Sulfarsénol. |
| Gastrolues. | Suppositoires Corbière. |
| Hectine. | Tréparsol. |
| Myovarsyl. | Trilues. |
| Novarsénobenzol Billon. | Uclarsyl. |
| Nucléarsitol Robin. | |

TRAITEMENT BISMUTHIQUE

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Benzo-bismuth Millot. | Muthanol. |
| Biazan. | Néocardyl. |
| Bis-Hyd. | Néo-Trépol. |
| Bismhydral. | Olbia. |
| Bismuthion. | Quinby. |
| Bismuthoïdol. | Quinby soluble. |
| Bivatol. | Rubyl. |
| Granions (Les). | Sol-bi Fraisse. |
| Iodo-bismuthate de Quinine Fraisse. | Solmuth. |
| Iodo-bismuth Ercé. | Spirochtan. |
| Lipobismuth Ercé. | Stérobi. |
| Métaux colloïdaux A. Lancien. | Trépobiur. |
| | Trépol. |

TRAITEMENT IODURÉ

| | |
|---|------------------------|
| Ampoules Boissy, iodure de potassium. | Iodo Maisine globules. |
| Carboiodure Fraudin. | Iodone Robin. |
| Collo-iodé Dubois. | Iodonésyl. |
| Curiode. | Iodonucléol. |
| Curiode Arsenié. | Iodurase. |
| Dépuriode du D ^r Roger Weber. | Iodure Pachaut. |
| Dicaliode. | Lipiodol Lafay. |
| Elixir Duret. | Lipiodine Ciba. |
| Eranol. | Magiodyl. |
| Globules Fumouze à l'iodure de potassium. | Micelliodé. |
| Granions (Les). | Néo-Riodine. |
| Iodalose Galbrun. | Pépiodon Henry. |
| Iodassium. | Riodine. |
| Iodogénol Pépin. | Rob Cabanes. |
| | Rob Oberlin. |
| | Tiodine Cognet. |
| | Uroiodine. |

XVII. — SYPHILIS.

TRAITEMENT MERCURIEL

| | |
|--|------------------------------------|
| Arquéritol Lescure. | Novargyre. |
| Bis-Hyd. | Novolug. |
| Bismhydral. | Pilules Myosotis. |
| Calmaby. | Rob Cabanès. |
| Capsules grises Cabanes. | Rob Oberlin. |
| Crescogénol. | Salvé. |
| Cyanhermine. | Sféol. |
| Elixir Duret. | Sirop Morlas. |
| Elixir Spès du D ^r Guiraud. | Supparygres du D ^r Fau- |
| Epicral. | cher. |
| Gambéol. | Suppositoires Hymel. |
| Granions (Les). | Suppositoires Rocav. |
| Granules Chanteaud. | Suppositoires Sféat. |
| Hermophényl Lumière. | Syphonéol. |
| Huile grise Ercé. | Véryl. |
| Leucostyl. | |

TRAITEMENT MIXTE

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Bismhydral. | Salvé. |
| Crypthermol Dehaussy. | Sirop Névra. |
| Elixir Hymel. | Spirochtan.. |
| Elixir Iodépuratif Pépin. | Sulfarsiode |
| Enésol. | Sulfoidol Robin. |
| Hectargyre. | Sulfosine. |
| Hygiodine Ludin. | Sulfur concentré Dax. |
| Oléochrysine Lumière. | Sulfureux Pouillet. |
| Rob Cabanès. | Sulfuryl Monal. |
| Rob Oberlin. | Tréparsinyl. |

XVIII. — SYSTÈME NERVEUX. T. G.

ANALGÉSIIQUES EXTERNES

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Allocaïne Lumière. | Nisaméline Trouette-Per- |
| Baume Adol. | ret. |
| Baume Aroma. | Percaïnal Ciba. |
| Baume Bengué. | Percaïne Ciba. |
| Baume Lartigol. | Pommade au Nestosyl. |
| Baume Panthésine Sandoz. | Rhésal Vicario. |
| Baume du D ^r Serin de | Salénal Ciba. |
| Gaillac. | Salène Ciba. |
| Baume Rhodia. | Solution huileuse au Nesto- |
| Bétul-Ol-Midy. | syl. |
| Dolysine. | Spicanol. |
| Iodex. | Suppo-Gynals. |
| Nestosyl. | Suppositoires au Nestosyl. |
| | Ulmarène Gigon. |

XVIII. — SYSTÈME NERVEUX. T. G.

ANALGÉSQUES INTERNES

| | |
|--|----------------------------------|
| Acodra. | Granules Chanteaud. |
| Aigue d'Or. | Hémypnal Ciba. |
| Aicacyl Wander. | Hypalène. |
| Algocratine. | Irénine Gonnon. |
| Algophagine. | Kalmigraine. |
| Algor. | Mensuosédyl. |
| Allonal Roche. | Métophan. |
| Allophaquina. | Morpheroïnn Leisyn. |
| Amphotonyl. | Naïodine Logeais. |
| Ampoules de Pantopon Roche. | Neuréol. |
| Ampoules Reipar. | Neuro-Calcium. |
| Analgénine. | Neuseda. |
| Anégrine. | Nevoral Rafey. |
| Antalgol Dalloz. | Nevralgol Brossard. |
| Antidouleur Barbessou. | Nisaméline Trouette-Perret. |
| Antigrippine Midy. | Nopirine Vicario. |
| Arcanan. | Optalidon Sandoz. |
| Ascéine. | Paderyl. |
| Asciatine. | Pantopon Roche. |
| Atomine. | Paverol Dausse. |
| Atophan Cruet. | Plexarine. |
| Atophanyl. | Potion Adol. |
| Broméine Montagu. | Pulsamone. |
| Cachets du D ^r Boveil. | Pyréthane. |
| Cachets Van-Sol. | Quinoidine Duriez. |
| Calmant Meunier. | Quinsal. |
| Campho-Salyl Fraisse. | Rhoféine. |
| Causyth. | Sambul. |
| Cérébrine Fournier. | Sédarthryl. |
| Cibalgine. | Sanaféine. |
| Chloral bromuré du D ^r Du- bois. | Sédol. |
| Crédone Dehaussy. | Sirop du D ^r Gélinau. |
| Crésopirine. | Somnicones Béral. |
| Cryogénine Lumière. | Soporigène Delqué. |
| Curatine Brunet. | Spasmalone. |
| Curogène. | Spécifique Béjean. |
| Demalgon. | Stopral. |
| Dialacétine Ciba. | Suppoalgos. |
| Didial Ciba. | Suppopirine. |
| Dolysine. | Théball. |
| Dragées Lumeval. | Theinol. |
| Emerson's Bromo-Seltzer. | Thermocédone. |
| Erythra Dyn. | Valériane Gmet. |
| Génomorphine. | Véganine. |
| Grains Céphalgifuges. | Véralgine. |
| | Viophan. |

XVIII. — SYSTÈME NERVEUX. T. G.

ANESTHÉSIIQUES GÉNÉRAUX

Balsoforme.

ANESTHÉSIIQUES LOCAUX

| | |
|---|--------------------------------|
| Allocaïne Lumière. | Nestosyl. |
| Baume Panthésine Sandoz. | Percaïne Ciba. |
| Baume du D ^r Serin de Gaillac. | Scurocaïne. |
| Chloréthyle Bengué. | Solution huileuse au Nestosyl. |
| Delcaïne Roques. | Stovaïne. |

ANESTHÉSIIQUES RACHIDIENS

| | |
|--------------------|-------------|
| Delcaïne Roques. | Scurocaïne. |
| Panthésine Sandoz. | Stovaïne. |
| Percaïne Ciba. | |

ANTISPASMODIQUES

| | |
|---|------------------------------|
| Adonal. | Féminadène. |
| Aérocid. | Francalcion. |
| Aérophagyl. | Freinospasmyl. |
| Alepsal. | Garéphédrine. |
| Amphostène. | Genhyoscyamine. |
| Amphotonyl. | Génisténal. |
| Ampoules Spasmalgine Roche. | Génoscopolamine. |
| Anaural. | Hova (tablettes). |
| Angiosédine. | Hyoscyamine Houdé. |
| Antispasmyl. | Intrait de Valériane Dausse. |
| Anxiosédine. | Iodotensyl Dubois. |
| Azigol Thévenot. | Lobéliane Laleuf. |
| Belladénal Sandoz. | Lubrokak. |
| Bellafoline Sandoz. | Néospasmodyl. |
| Benzoflorine Julien. | Neurène. |
| Benzylol. | Neuréal. |
| Biopausine. | Neuridor. |
| Bromure de Calcium (Sirop Henry Mure au). | Neurobore. |
| Capsules Bruel. | Neurocalcium. |
| Calcium Francalcion. | Neurotensyl. |
| Chloral bromuré du D ^r Dubois. | Neuseda. |
| Chlorical. | Névrosan. |
| Comitiol. | Novo-Brol. |
| Cratægus Gmet. | Oléthyle Benzyle. |
| Dialacétine. | Paderyl. |
| Disonyl. | Pancalcion. |
| Dragées Lumeval. | Pansolanée. |
| Dragécalcion. | Paradol. |
| Ephétropine. | Paratyronie. |
| Eupavéryl Pachaut. | Passiflorine. |
| Euphytose. | Paxène. |
| | Plasmocalcium. |
| | Rlexorine. |

XVIII. — SYSTÈME NERVEUX. T. G.**ANTISPASMODIQUES**

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Poudre anti-épileptique | Tribromure Gigon. |
| Cassarini. | Vagoriane. |
| Pulsamone. | Valbornine Rogier. |
| Rangol. | Valbrol. |
| Rhodazil. | Valédyl. |
| Rutonal. | Valénal Novalis. |
| Sédergine. | Valérianate Grignon. |
| Sédol. | Valérianate Pierlot. |
| Sédoneurol Dehaussy. | Valériane Byla. |
| Sédopavérine. | Valériane Gmet. |
| Sédosine. | Valériane Pachaut. |
| Somnicones Béral. | Valérianose Gigon. |
| Spartoval. | Valérinodor Malmanche. |
| Spasmalgine Roche. | Valérium Paul Thibault. |
| Spasmine Jolly. | Valéromenthol. |
| Spasmonéural. | Valéronal. |
| Spasmosédine. | Valovarine. |
| Spasneurol. | Vagosédyl. |
| Suppoalgos Lagoutte. | Vagostabyl. |
| Sympathocrine. | Véganine. |
| Sympathoriane. | Vérianne. |
| Sympathyl. | Véronidia. |

HYPNOTIQUES

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Adonal. | Hypalène. |
| Alepsal Genévrier. | Isonal. |
| Allonal Roche. | Lobéliane Laleuf. |
| Amphotonyl. | Lukrokal. |
| Ampoules de Pantopon Roche. | Morpheroïnn Leisyn. |
| Anaural. | Nésal. |
| Angiosédine. | Neuréal. |
| Anxiosédine. | Neuridor. |
| Aphosal. | Neurinase. |
| Asciatine. | Neuroflorine. |
| Béatol. | Noctisédy. |
| Bromadyl Vicario. | Optalidon Sandoz. |
| Bromo-Garnal. | Padéry. |
| Calsedine. | Pantopon Roche. |
| Capsules Brue. | Passiflorine. |
| Chloral bromuré du Dr Du- | Pavéron Dausse. |
| bois. | Paxène. |
| Chloralosane. | Phénacodine. |
| Dialacétine Ciba. | Plexorine. |
| Dial Ciba. | Polybromure Gonnon. |
| Didial Ciba. | Rutonal. |
| Disonyl. | Sandoptal. |
| Eusomnine Bélières. | Sédergine. |
| Gardénal. | Sédormid Roche. |
| Genistenal. | Sédopavérine. |
| Hyoscyamine Houdé. | Sédosine. |
| | Sirop du Dr Gelineau. |

XVIII. — SYSTÈME NERVEUX. T. G.

HYPNOTIQUES

Somnifène Roche.
 Somnicones.
 Somnopol.
 Somnothyrid.
 Sonéryl.
 Soporalose.
 Soporigène Delqué.
 Suppoalgos.
 Thébail.

Valbornine Rogier.
 Vagosédyl.
 Valédyl.
 Valériflore.
 Valérobromine Legrand.
 Valéronal.
 Valovarine.
 Vériane Buriat.
 Véronidia.

MODIFICATEURS DU SYMPATHIQUE ET DU PARASYMPATHIQUE

Acécolline.
 Adonal.
 Adrénaline Clin.
 Adrénaline Invar.
 Adrénaline Sauba.
 Adrénine.
 Adréphédrine Béral.
 Alepsal Genévrier.
 Amphosthène.
 Amphotonyl.
 Ampoules Spasmalgine
 Roche.
 Anacrasine Ranson.
 Anaural.
 Androcalcion E.
 Androcalcion H.
 Androstine.
 Angiosédine.
 Anxiol.
 Anxiosédine.
 Ballotyl.
 Basedowine.
 Belladénal Sandoz.
 Bellafoline Sandoz.
 Calcium Francalcion.
 Calcivitam.
 Campho-Spartéine Dubois.
 Chlorical.
 Chloral bromuré du D^r Du-
 bois.
 Chlorumagène.
 Cratægus Gmet.
 Cytomagnésium Oliviero.
 Delbiasé.
 Disonyl.
 Dynasthène.
 Emge Lumière.
 Ephédrine Houdé.
 Eupavéryl

Euphytose.
 Fa-Ner-Val.
 Francalcion.
 Freinospasmyl.
 Freinix.
 Garéphédrine.
 Génatropine.
 Génésérine.
 Génisténal.
 Glycocarpine.
 Grains d'Ephédrine Béral.
 Granulés Chanteaud.
 Gynergène Sandoz.
 Hormuclases.
 Humoro-Stabilline.
 Hypotan.
 Lobéliane Laleuf.
 Magnésium Hardy.
 Magnésio-tubes Robinet.
 Néospasmodyl.
 Neuridor.
 Neurinase.
 Neurotensyl.
 Neuseda.
 Névrosan.
 Novo-Brol.
 Nuphos.
 Pancalcion.
 Pansolanée.
 Pandrénaline.
 Phosphonine Soullé.
 Plasmocalcium.
 Plexorine.
 Pragmoline.
 Pyréthane.
 Recrésal.
 Rénaeptine.
 Rutonal.
 Sédergine.

XVIII. — SYSTÈME NERVEUX. T. G.**MODIFICATEURS DU SYMPATHIQUE
ET DU PARASYMPATHIQUE**

Sédoneurol Dehaussy.
Spasmosédine.
Sympathocrine.
Sympathoriane.
Sympathyl.
Syntropan Roche.
Tensédine.

Vagoriane.
Vagosédyl.
Vagostabyl.
Vagotonine.
Valénal Novalis.
Vasonitryl.
Virmonal Piam.

NEURO-TONIQUES

Adrénaline Clin.
Adrénaline Sauba.
Adrénine.
Adrénoïdes Béral.
Ampoules Névrosthéniques
Dausse.
Androsthénol.
Antasthène.
Antiphi.
Arcica.
Ardogène.
Arrhénuclène Bergevin.
Arsécrinol.
Arsi-Strychnal Longuet.
Arsylène Roche.
Benzylocalcium.
Biodynamine.
Biodynol.
Biogénol Demasles.
Bionéol.
Biophorine Girard.
Biosine Le Perdriel.
Biotrignon.
Campho Spartéine Dubois.
Carbotrignon.
Cérébro-Lipase.
Cérébrosthénine Dalin.
Chlormagnésium Fisch.
Chloro-Magnésion.
Chlorumagène.
Chophytol Rosa.
Clupeyl.
Colloïdogénine du D^r Bayle.
Composé Gmet.
Créagénol.
Cytopan.
Cyto-Sérum Corbière.
Diastogène Dehaussy.
Granules de Pantofort du
D^r Boveil.
Histogénol.

Hormovitol.
Humoro-stabiline.
I. A. M.
Ionyl.
Kola caféinée Aubert.
Kola granulée Astier.
Kolatines.
Lauriatol.
Lécithine Vacheron.
Limol Churchill.
Logaphos.
Magnésium Hardy.
Mangano-Phosphal Julien.
Maté Douglas.
Morisland.
Morsine.
Néo-Rhomnol.
Néotrophène.
Neuropol.
Neurosine Prunier.
Neurotropol Byla.
Névrosthénine Freyssinge.
Novatropine.
Nucléarsitol Robin.
Nucléasine.
Nucléigène.
Nucléophorène.
Nuphos.
Cenophos.
Opocalcium du D^r Guer-
sant.
Opocalcium irradié du D^r
Guersant.
Oponuclyl irradié Trouette-
Perret.
Opostyl Bouty.
Opothérapie du D^r Fraysse.
Orex.
Pandrénaline.
Percalcine.
Phagosthyl mangané.

XVIII. — SYSTÈME NERVEUX. T. G.

NEURO-TONIQUES

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Phosbiose. | Sérum névrosthénique Frais |
| Phosoforme. | se. |
| Phosol. | Stimyl. |
| Phospharsol. | Strychnal Longuet. |
| Phosphate Vital de Jacquemaire. | Strychnarsitol Robin. |
| Phospho-Fluor Beynet. | Strychtonine. |
| Phospholéose Demasles. | Taburol Monal. |
| Phosphonine Soulié. | Théinol. |
| Phosphopinal Juin. | Thorix (Thorium X Rhem-da). |
| Phostyl. | Tonikéine Chevreton. |
| Phylla Dyn. | Tonique Gonnon. |
| Phytine Ciba. | Tonique Roche. |
| Phytogénine Byla. | Tonuclyl. |
| Phyto-Lécithine. | Traphéine. |
| Plasma de Quinton. | Vanucléol. |
| Plasmarine. | Végéphos. |
| Plasmosthène. | Vin de Vial. |
| Quina pepsiné Blot. | Viosten. |
| Quinarsol antianémique. | Vioxyl Mouneyrat. |
| Quinoidine Duriez. | Viradène. |
| Réparateur Thuau. | Virmonal Piam. |
| Rhomnol. | Visco-Sérum. |
| Sanguil. | Vitacalcine Moncour. |
| Sérogyne. | Vitacrine. |
| Séroma Rey. | Vitène. |
| Sérosthényl Bouty. | Yo-androl. |
| Sérum neuropsychique. | Yo-gynine. |

SÉDATIFS

| | |
|-------------------------------|--|
| Adonal. | Broméine Montagu |
| Algosedine. | Bromiase. |
| Alepsal Genévrier. | Bromo-Garnal. |
| Allonal Roche. | Bromogénol Pépin. |
| Amphosthène. | Bromo-Maisiné. |
| Amphotonyl. | Bromone Robin. |
| Ampoules de Pantopon Roche. | Bromovose. |
| Ampoules de Spasalgine Roche. | Cachets du D ^r Boveil. |
| Anaural. | Calcibronat « Sandoz ». |
| Angiosédine. | Calmocardine. |
| Anxiosédine. | Calsédine. |
| Ascéine. | Cantéine Bouteille. |
| Atomine. | Capsules Bruel. |
| Azigol Thévenot. | Chloral bromuré du D ^r Du-bois. |
| Bain Carré. | Cibalgine. |
| Béatol. | Comitiol. |
| Belladénal Sandoz. | Comprimés Kléos. |
| Benzylol. | Curatine. |
| Borosodine Lumière. | Dial Ciba. |
| | Dragées du D ^r Gelineau. |

XVIII. — SYSTÈME NERVEUX. T. G.**SÉDATIFS**

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Dragées Lumeval. | Sédatose. |
| Euphytose. | Sédergine. |
| Eusomine Bélières. | Sédobrol Roche. |
| Féminadène. | Sédol. |
| Gardénal. | Sédoneurol Dehaussy. |
| Génisténal. | Sédospartéine. |
| Génomorphine. | Sédormid Roche. |
| Hova (tablettes). | Sédosine. |
| Hypalène. | Sirop du Dr Gelineau. |
| Intrait de Valériane Dausse. | Sirop Teyssèdre. |
| Iodaubépine. | Somnicones Béral. |
| Isonal. | Somnothyrid. |
| Kalmobrol. | Soporalse. |
| Lobéliane Laleuf. | Spasmine Jolly. |
| Lubrokal. | Spasmosédine. |
| Magbromyl. | Spasneural. |
| Morphéroinn Leisyn. | Stopral. |
| Nésal. | Strychnotonine. |
| Neurène. | Suppoalgos. |
| Neuréol. | Suppositoires au Nestosyl. |
| Neuridor. | Suppositoires Pyrax. |
| Neurinase. | Sympathocrine. |
| Neurobore. | Tartrate borico-potassique |
| Neurocalcium. | Pachaut. |
| Neuroflorine. | Thébaïl. |
| Névrosan. | Tribromure Gigon. |
| Noctisedyl. | Vagosédyl. |
| Novo-Brol. | Valbornine Rogier. |
| Optalidon Sandoz. | Valedyl. |
| Padéryl. | Valérianate Grignon. |
| Panéopon Roche. | Valérianate Pierlot. |
| Paradol. | Valériane Byla. |
| Passiflorine. | Valériane Gmet. |
| Pavéron Dausse. | Valériane Pachaut. |
| Paxène. | Valérianose Gigon. |
| Phosphobrom. | Valériflore. |
| Plexorine. | Valérinodor Malmanche. |
| Polybromure Gonnon. | Valérium Paul Thibault. |
| Poudre anti-épileptique Casarini. | Valérobromine Legrand. |
| Rangol. | Valéromenthol. |
| Rénovol. | Valéronal. |
| Rutonal. | Véganine. |
| | Vérianne Buriat. |
| | Véronidia Buisson. |

XVIII. — SYSTÈME NERVEUX. T. S.

ALGIES — CÉPHALÉES — MIGRAINES — MIGRAINE OPHTALMIQUE — NÉVRALGIES SCIATIQUE — NÉVRITES

Voir aussi :

Allergies.
Analgésiques externes.
Analgésiques internes.
Antispasmodiques.
Antiseptiques intestinaux.
Antispasmodiques (système nerveux.)
Arthritisme.
Cataplasmes. — Révulsifs.
Cholagogues.
Diététique.
Dissolvants uriques.
Hypnotiques.
Instrumentation.
Laxatifs.
Neuro-toniques.
Sédatifs.
Syphilis.

Acécoline.
Adonal.
Agocholine.
Agozymase.
Aigue d'Or.
Alcacyl Wander.
Alepsal Genèvevriér.
Algocratine.
Algor.
Algosédine.
Allonal Roche.
Allophaquina.
Amphotonyl.
Ampoules Boissy.
Ampoules de Pantopon Roche.
Ampoules Reipar.
Anaclasine Ranson.
Analgénine.
Anapeptone Vassal.
Anégrine.
Antalgol Dalloz.
Antialgos Christiaens.
Anthraseptol.
Antidouleur Barbessou.
Antigrippine Midy.
Antisciaticque P. Chambon.
Arsi-strychnal Longuet.
Ascéine.

Asciatine.
Atophan Cruet.
Atophanyl.
Atoquinol.
Bain Bagnor.
Bain Carré.
Balnéradol.
Baume Adol.
Baume Bengué.
Baume Ciba.
Baume Panthésine Sandoz.
Baume du D^r Serin de Gaillac.
Baume Lartigol.
Baume Rhodia.
Bétul-Ol-Midy.
Biophorine.
Biophylactine M. G.
Broméine Montagu.
Bromo-Garnal.
Bromogénol Pépin.
Cachets du D^r Boveil.
Cachets Van-Sol.
Calcibronat « Sandoz ».
Calmant Meunier.
Camphro-Salyl Fraisse.
Catalgine.
Causyth.
Cérébrine Fournier.
Chloral bromuré du D^r Du-bois.
Chloréthyle Bengué.
Cholagol.
Cholécystine.
Choléfluine.
Chophytol Rosa.
Cibalgine.
Crédone Dehaussy.
Crésopirine.
Cryogénine Lumière.
Curatine Brunet.
Curogène.
Demalgon.
Dépuriode du D^r Roger Weber.
Detensyl.
Dialacétine Ciba.
Dialyl.
Didial Ciba.

XVIII. — SYSTÈME NERVEUX. T. S.**ALGIES — CÉPHALÉES — MIGRAINES —
MIGRAINE OPHTALMIQUE — NÉVRALGIES
SCIATIQUE — NÉVRITES**

Dolysine.
 Dragées Lumeval.
 Emerson's Bromo Seltzer.
 Entéro-antigènes.
 Ephédro-rhinol.
 Erythra Dyn.
 Euphoryl.
 Eusomnine Bélières.
 Fluokol.
 Fosfoxyl Carron.
 Freinospasmyl.
 Gastronaldine.
 Génistenal.
 Génomorphine.
 Glykolaïne Robin.
 Grains céphalgifuges.
 Granions (Les).
 Gynergène Sandoz.
 Humoro-stabiline.
 Hypalène.
 Iodex.
 Iodinjectol Jammes.
 Iodométine.
 Irénine Gonnon.
 Ixium Buisson.
 Jabosulfène.
 Kalmigraine.
 Lipiodol Lafay.
 Lysarthrol.
 Mésothine Rhemda.
 Mésothorium.
 Métaux colloïdaux A. Lancien.
 Métophan.
 Morphéorinn Leisyn.
 Mucyllum.
 Myoden.
 Naïodine Logeais.
 Néalgyl Bottu.
 Néo-Séti.
 Nésal.
 Neurène.
 Neuréol.
 Neuridor.
 Neuseda.
 Névorol Rafey.
 Névralgol Brossard.
 Nisaméline Trouette-Perret.
 Noctisédyll.

Nopirine Vicario.
 Normatensol Bouret.
 Novo-Brol.
 Nuphos.
 Optalidon Sandoz.
 Paderyl.
 Paradol.
 Pavéron Dausse.
 Peptalmine.
 Peptogil A. et L.
 Peptonal.
 Peptone Vassal.
 Percaïne.
 Phosoforme.
 Phylactone Byla.
 Pilules V. E. Doumer.
 Pipérazine Midy.
 Piperazyl.
 Plasma de Quinton.
 Polycautére.
 Polypeptonal.
 Pôtion Adol.
 Poudre Cassarini.
 Protiodyne.
 Protiodyne dragées.
 Phytine Ciba.
 Quinoïdine Duriez.
 Recrésal.
 Révulsif liquide Boudin.
 Révulsif Milko.
 Révulsif Procipha.
 Rhésal Vicario.
 Rhoféine.
 Salène Ciba.
 Salénal Ciba.
 Salicéral.
 Salicylate de soude Clin.
 Salvébyl.
 Salysérum.
 Sambul.
 Sanaféine.
 Sédarthryl.
 Sédatuline.
 Sédobrol Roche.
 Sédosalyll.
 Sel hépatique U. N. Arquevaux.
 Sénécol.
 Sérobiol.
 Seti.

XVIII. — SYSTÈME NERVEUX. T. S.

ALGIES — CÉPHALÉES — MIGRAINES MIGRAINE OPHTALMIQUE — NÉVRALGIES SCIATIQUES — NÉVRITES

Sinarol.
Sirop Cassibor.
Sirop du D^r Gelineau.
Somnicones Béral.
Spartoval.
Spasmalgine Roche.
Spasmalone.
Spasmoneural.
Spasneuroi.
Spécifique Bejean.
Spicanol.
Staprolysat.
Stopral.
Stovédrine.
Strychnal Longuet.
Strychnotonine.
Suppoalgos.
Suppo-Gynals.
Suppopirine.
Suppositoires Pyrax.
Theinol.
Thermocédone.
Thorix (Thorium X Rhem-
da).
Tiliane.
Trisalyl.

Ulmacétyl.
Ulmarène Gigon.
Vaccin antirhumatismal
(Immuno-vaccin).
Vagoriane.
Vagosedyl.
Vagostabyl.
Valérianate Grignon.
Valérianate Pierlot.
Valériane Byla.
Valériane Gmet.
Valérianose Gigon.
Valérium Paul Thibault.
Valérobromine Legrand.
Valéromenthol.
Valérothéine Domergue.
Valovarine.
Valovosan.
Vaso-Neurine.
Véganine.
Veinoposine.
Véralgine.
Vériane Buriat.
Vésicatoire Rose Beslier
Viophan.
Virmonal Piam.

CONGESTION CÉRÉBRALE — HÉMORRAGIE CÉRÉBRALE — RAMOLLISSEMENT CÉRÉBRAL HÉMIPLÉGIE

Voir aussi :

Toni-cardiaques.
Vaso - dilateurs artériels.

Acécoline.
Angioxyl.
Antonal.
Artérase.
Artérior-Vincardi.
Artério-Veinine.

Cardi-Sédine.
Détensyl.
Diurétique Gmet.
Epical.
Pragmoline.
Rhocya Dyn.
Sécacornine Roche
Silguine.
Tiodine Cognet.
Verticurine.

XVIII. — SYSTÈME NERVEUX. T. S.

ENCÉPHALITES — MÉNINGITES MÉNINGO-ENCÉPHALITES ET LEURS SEQUELLES

Adonal.
Alepsal Genèvevriér.
Antasthène.
Belladéna Sandoz.
Bellafoline Sandoz.
Benzoflorine Julien.
Cérébroil Leisyn.
Eranol.
Genhyosclamine.
Génoscopolamine.
Hyoscyamine Houdé.

Mycolysine.
Naïodine.
Pansolanée.
Pyoformine.
Pyréthane.
Septicémine Cortial.
Staprolysat.
Sulfosine.
Urseptine Rogier.
Uroformine Gobey.

GOITRE EXOPHTALMIQUE

Voir aussi :

Antispasmodiques (système nerveux).
Insomnies.
Opothérapie.
Syphilis.

Acécoline.
Amphostène.
Ampoules Boissy (à l'iodure d'éthyle).
Angioxyl.
Basedowine.
Belladéna.
Bellafoline Sandoz.
Benzoflorine.
Cardiosthénine.
Colloïode Dubois.
Cratægus Gmet.
Dépuriode.
Dicalioide.
Diiodotyrosine Roche.
Endopancrine.
Eranol.
Freinospasmyl.
Genhyoscyamine.
Glycocarpine.
Gynergène Sandoz.
Hématoéthéroïdine.
Hormuclases.
Iodalose Galbrun.
Iodassium.
Iodaubépine.

Iodogénol Pépin.
Iodo-Maisine Globules.
Iodométine.
Iodone Robin.
Iodonucléol.
Iodothyroïdine Catillon.
Iodurase.
Lipiodol Lafay.
Lipiodine Ciba.
Magbromyl.
Néo-Riodine.
Neurène.
Neuréol.
Neurinase.
Néospasmodyl.
Novo-Brol.
Oxydothyroïne Paris.
Pansolanée.
Paxène.
Plexorine.
Riodine.
Sédoneurol Dehaussy.
Sédosalyl.
Somnifène Roche.
Somnothyrid.
Spasmine Jolly.
Spasneural.
Théocalciode.
Thyrocréine Gremy.
Thyroxine Roche.
Thyrénine Gremy.
Val'ovarine.
Vériane Buriat.

XVIII. — SYSTÈME NERVEUX. T. S.

HYSTÉRIE — ÉPILEPSIE — CHORÉE

Voir aussi :

Antispasmodiques (système nerveux).

Hypnotiques.

Sédatifs.

Adonal.

Alepsal Genévrier.

Allonal Roche.

Amphostène.

Amphotonyl.

Ampoules de Spasmalgine Roche.

Anaural.

Angiosédine.

Anxiosédine.

Arsylène Roche.

Azigol Thévenot.

Baumolacpinine.

Béatol.

Belladénal Sandoz.

Bellafoline Sandoz.

Benzoflorine Julien.

Borosodine Lumière.

Broméine Montagu.

Bromiase.

Bromo-Garnal.

Bromogénol Pépin.

Bromo-Maisine.

Bromone Robin.

Bromovose.

Calcibronat « Sandoz ».

Chloral bromuré du D^r Du-bois.

Comititol.

Comprimés Kléos.

Dialacétine Ciba.

Dragées du D^r Gelineau.

Eusomnine Bélières.

Fosfoxy.

Freinospasmyl.

Gardénal.

Genhyoscyamine.

Génisténal.

Granulé Caresmel.

Hémostérine irradiée.

Humoro-stabiline.

Intrait de Valériane Dausse.

Isonal.

Kalmobrol.

Lipocérébrine.

Lobéliane Laleuf.

Lubrokak.

Magbromyl.

Morphéorinn Leisyn.

Néospasmodyl.

Nésal.

Neurène.

Neuréal.

Neuridor.

Neurinase.

Neurobore.

Neurocalcium.

Neuroflorine.

Neuropol.

Novo-Brol.

Paderyl.

Pansolanée.

Paxène.

Phénacodine.

Phosphobrom.

Plexorine.

Polybromure Gonnon.

Poudre anti-épileptique Cassarini.

Pulsamone.

Rangol.

Rutonal.

Sédatoze.

Sédergine.

Sédobrol.

Sédoneurol Dehaussy.

Sédopavérine.

Sédosine.

Sirop du D^r Gelineau.

Sirops Henry Mure.

Somnicones Béral.

Somnifène Roche.

Somnothyryl.

Soporalse.

Spasmine Jolly.

Spasmo-Neural.

Spasneurol.

Strychnotonine.

Suppositoires Pyrax.

Tablettes Hova.

Tartrate borico-potassique Pachaut.

Tribromure Gigon.

Vaccin antirhumatismal (Immuno-vaccin).

Valbornine Rogier.

Valbrol.

XVIII. — SYSTÈME NERVEUX. T. S.

HYSTÉRIE — ÉPILEPSIE — CHORÉE

Valedyl.
Valénal Novallis.
Valérianate Grignon.
Valérianate Pierlot.
Valériane Byla.
Valériane Gmet.
Valériane Pachaut.
Valérianose Gigon.
Valériflore.
Valérinodor Malmanche.

Valérium Paul Thibault.
Valérobromine Legrand.
Valéromenthol.
Valéronal.
Vanadarsine Guillaumin.
Valovarine.
Valovosan.
Vériane Burlat.
Véronidia Buisson.
Viscum Zyma.

INSOMNIES — NERVOSISME

Voir aussi :

Antispasmodiques (système nerveux.)

Hypnotiques.

Modificateurs du sympathique et du parasymphatique.

Neurotoniques.

Adonal.
Alepsal Genèvevriér.
Allonal Roche.
Amphosthène.
Amphotonyl.
Ampoules de Pantopon Roche.
Ampoules de Spasmalgine Roche.
Anaclasine Ranson.
Aناural.
Angiosédine.
Anxiosédine.
Aphosal.
Asciatine.
Bain Carré.
Ballotyl.
Baumolacpinine.
Béatol.
Belladénal Sandoz.
Bellafoline Sandoz.
Benzosflorine Julien.
Borosodine Lumière.
Boules Quies.
Bromadyl Vicario.
Broméine Montagu.
Bromiase.
Bromo-Garnal.
Bromogénol Pépin.
Bromo-Maisine.
Bromone Robin.

Bromovose.
Bromure de calcium (sirop Henry Mure au).
Cachets du D^r Bovell.
Calcibronat « Sandoz ».
Calsédine.
Cantéine Bouteille.
Capsules Bruel.
Chloral bromuré du D^r Dubois.
Chloralosane.
Codérax.
Dialacétine Ciba.
Dial Ciba.
Didial Ciba.
Disonyl.
Doloma injectable.
Dragées du D^r Gelineau.
Dragées Gmet.
Dragées Hecquet.
Dragées Lumeval.
Dragées Névrosthéniques Yse.
Dysthène.
Ephétropine.
Euphytose.
Eusomnine Bélières.
Féminadène.
Férydal.
Fosfoxyll Carron.
Fosyls Carron.
Gardénal.
Génisténal.
Génomorphine.
Gobillettes Hypnos.
Granulé Cabasson.
Granulé Caresmel.
Granules Chanteaud.
Grains Céphalifuges.

XVIII. — SYSTÈME NERVEUX. T. S.

INSOMNIES -- NERVOSISME

Hématoéthyrôidine.
 Hormovitol.
 Humoro-stabiline.
 Hyoscyamine Houdé.
 Hypalène.
 Intrait de Valériane Dausse.
 Kalmobrol.
 Lipocérébrine Chevretin.
 Lobéliane Laleuf.
 Lubrokal.
 Magbromyl.
 Morphérolinn Leisyn.
 Néospasmodyl.
 Nésal.
 Neurène.
 Neuréol.
 Neuridor.
 Neurinase.
 Neurobore.
 Neurocalcium.
 Neuroflorine.
 Neurotensyl.
 Neuseda.
 Névrosan.
 Nuphos.
 Noctisédyll.
 Novo-Brol.
 Optalidon Sandoz.
 Paderyl.
 Paradol.
 Passiflorine.
 Pavéron Dausse.
 Paxène.
 Phénacodine.
 Phosphobrom.
 Phosphonine Soulié.
 Phytine Ciba.
 Plexorine.
 Polybromure Gonnon.
 Poudre anti-épileptique
 Cassarini.
 Poudre Danica.
 Pulsamone.
 Rangol.
 Recrésal.
 Rutonal.
 Sandoptal.
 Sedergine.
 Sédobrol Roche.
 Sédol.

Sédoneurol Dehaussy.
 Sédormid Roche.
 Sédosine.
 Sérobiol.
 Sirop du Dr Gelineau.
 Sirop Teyssèdre.
 Sirops Henry Mure.
 Somnicones Béral.
 Somnifène Roche.
 Somnothyrid.
 Soneryl.
 Soporalose.
 Soporigène Delqué.
 Spasmalgine Roche.
 Spasmine Jolly.
 Suppoalgos Lagoutte.
 Suppositoires Pyrax.
 Sympathocrine.
 Sympathoriane.
 Sympathyl.
 Tablettes Hova.
 Tartrate borico-potassique
 Pachaut.
 Thébaïl.
 Tribromure Gigon.
 Vagoriane.
 Vagosédyl.
 Vagostabyl.
 Valbornine Rogier.
 Valbrol.
 Valédyl.
 Valénal Novalis.
 Valérianate Grignon.
 Valérianate Pierlot.
 Valériane Byla.
 Valériane Gmet.
 Valériane Pachaut.
 Valérianose Gigon.
 Valériflore.
 Valérinodor Malmanche.
 Valérium Paul Thibault.
 Valérobromine Legrand.
 Valéromenthol.
 Valéronal.
 Valérothéine Domergue.
 Valovarine.
 Véganine.
 Vériane Buriat.
 Véronidia Buisson.
 Virmonal Piam.

XVIII. — SYSTÈME NERVEUX. T. S.

NEURASTHÉNIE — NÉVROSE D'ANGOISSE

Voir aussi :

Antispasmodiques (système nerveux).

Diététique.

Hypnotiques.

Insomnies.

Modificateurs du sympathique et du parasymphatique.

Neurotoniques.

Opothérapie.

Sédatifs.

Adonal.

Alepsal Genèvevriér.

Allonal Roche.

Amphosthène.

Amphotonyl.

Ampoules de Spalmagine Roche.

Ampoules Névrosthéniques Dausse.

Anaural.

Angiosédine.

Angioxyl.

Antasthène.

Antiphi.

Anxiosédine.

Arcica.

Ardogène.

Arrhénuclène Bergevin.

Arsécrinol.

Arsi-Strychnal Longuet.

Arsylène Roche.

Balneradol.

Baumolacpinine.

Béatol.

Belladéal Sandoz.

Bellafoline Sandoz.

Benzoflorine Julien.

Biocatalyseur Rolland.

Biodynamine.

Biodynol.

Biogénol Demasles.

Bionéol.

Biophorine Girard.

Biosine Le Perdiel.

Biotrignon.

Borosodine Lumière.

Broméine Montagu.

Bromiase.

Bromo-Garnal.

Bromogénol Pépin.

Bromo-Maisine.

Bromone Robin.

Bromovose.

Calcibronat « Sandoz ».

Calmocardine.

Cantéine Bouteille.

Capsules Bruel.

Carbotrignon.

Cérébro-Lipase.

Cérébroil Leisyn.

Cérébrosthénine Dalin.

Chloral bromuré du D^r Du-bois.

Chloralosane.

Chlorumagène.

Clupéyl.

Colloïdogénine du D^r Bayle.

Comitiol.

Composé Gmet.

Cratægus Gmet.

Créagénol.

Cytopan.

Cyto-Sérum Corblère.

Demalgon.

Dialacétine Ciba.

Dial Ciba.

Didial Ciba.

Diastogène Dehaussy.

Diastogène F. Dehaussy.

Disonyl.

Doloma injectable.

Dragées du D^r Gellineau.

Dragées Lumeval.

Dragées Névrosthéniques Yse.

Dysthène.

Eufosyl Vély.

Euglyma.

Euphytose.

Eusomnine Bélières.

Fa-Ner-Val.

Féminadène.

Fer Ovarine Vitalis.

Férydal.

Forxol.

Fosfoxy Carron.

Fosyls Carron.

Gardénal.

Génistenal.

Génomorphine.

Génosthéniques.

Génostrychnine.

XVIII. — SYSTÈME NERVEUX. T. S.

NEURASTHÉNIE — NÉVROSE D'ANGOISSE

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Glandex phoscalcique. | Neurinase. |
| Glandimbine Lafran. | Neurobore. |
| Glycérophosphate Dalloz. | Neurocalcium. |
| Glycérophosphate Robin. | Neuroflorine. |
| Gouttes phosphosthéniques | Neuropol. |
| Dausse. | Neurosine Prunier. |
| Granules de Pantofort du | Neurotensyl. |
| D ^r Boveil. | Neurotrophol Byla. |
| Hémocalcine. | Neuséda. |
| Hémotal. | Névrosan. |
| Hémoviris. | Névrosthénine Freyssinge. |
| Hormovitol. | Noctisedyl. |
| Histogénol. | Novo-Brol. |
| Humoro-stabiline. | Nucléarsitol Robin. |
| Hypalène. | Nucléasine. |
| I. A. M. | Nucléigène. |
| Intrait de Valériane Dausse. | Nucléophorène. |
| Ionyl. | Nuphos. |
| Isonal. | Œnophos. |
| Ixium Bulsson. | Opocalcium du D ^r Guer- |
| Kalmobrol. | sant. |
| Kola caféinée Aubert. | Opocalcium irradié du D ^r |
| Kola granulée Astier. | Guersant. |
| Kola Monavon. | Opocobalt. |
| Kolatines. | Oponuclyl irradié Trouette- |
| Lauriatol. | Perret. |
| Lécithine Vacheron. | Opothérapies. |
| Limol Churchill. | Orthogénol. |
| Lipocérébrine Chevreton. | Ostéoglandulol. |
| Liposplénine du D ^r Groc. | Paderyl. |
| Lobéliane Laleuf. | Panglandine Couturieux. |
| Logaphos. | Pansolanée. |
| Lubrokak. | Paradol. |
| Magbromyl. | Passiflorine. |
| Magnésium Hardy. | Pavéron Dausse. |
| Magnéso-tubes Robinet. | Paxène. |
| Mancobène. | Pepto-Kola-Robin. |
| Mangano-Phosphal Julien. | Peptone Vassal. |
| Maté Douglas. | Percalcine. |
| Minergyl. | Persodine Lumière. |
| Morisland. | Phagosthyl. |
| Morphéroinn Leisyn. | Pagosthyl mangané. |
| Morsine. | Phénacodine. |
| Musculosine Byla. | Phosbiose. |
| Néo-Neurosine Prunier. | Phosma. |
| Néo-Rhomnol. | Phosoforme. |
| Néospasmodyl. | Phosol. |
| Néotrophène. | Phospharsol. |
| Nésal. | Phosphates du D ^r Pinard. |
| Neurène. | Phosphate Vital de Jac- |
| Neuréol. | quemaire. |
| Neuridor. | Phosphobrom. |

XVIII. — SYSTÈME NERVEUX. T. S.

NEURASTHÉNIE — NÉVROSE D'ANGOISSE

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Phospho-Fluor Beynet. | Sympathoriane. |
| Phospholéose Demasles. | Sympathyl. |
| Phosphonine Soulié. | Tablettes Hova. |
| Phosphopinal Juin. | Taburol Monal. |
| Phostyl. | Thébaïl. |
| Phylla Dyn. | Thorix (Thorium X Rhem- da). |
| Phytine Ciba. | Tonikéïne Chevreton. |
| Phytogénine Byla. | Tonique Gonnon. |
| Phyto-Lécithine. | Tonique Roche. |
| Plasma de Quinton. | Tonuclyl. |
| Plasmarine. | Total-Tonic. |
| Plexorine. | Tribromure Gigon. |
| Poliol Churchill. | Ultravitamine 4 |
| Polybromure Gonnon. | Vagosedyl. |
| Poudre anti-épileptique Cassarini. | Vagostabyl. |
| Protonic. | Valbornine Rogier. |
| Pulsamone. | Valbrol. |
| Rangol. | Valédyl. |
| Recrésal. | Valénal Novalis. |
| Réparateur Thuau. | Valérianate Grignon. |
| Rhomnol. | Valérianate Pierlot. |
| Rutonal. | Valériane Byla. |
| Sanguil. | Valériane Gmet. |
| Sédergine. | Valériane Pachaut. |
| Sédobrol Roche. | Valérianose Gigon. |
| Sédoneurol Dehaussy. | Valériflore. |
| Sédormid Roche. | Valérinodor Malmanche. |
| Sédosine. | Valérium Paul Thibault. |
| Sérobiol. | Valérobromine Legrand. |
| Sédopavérine. | Valéromenthol. |
| Sérosthényl Bouty. | Valéronal. |
| Sérum Neuropsychique. | Valovarine. |
| Sérum Névrosthénique Fraisie. | Valovosan. |
| Sirops Henry Mure. | Vanadarsine Guillaumin. |
| Somnifène Roche. | Vanucléol. |
| Somnicones Béral. | Véganine. |
| Somnothyrid. | Végéphos. |
| Soporalose. | Vériane Burlat. |
| Spasalgine Roche. | Véronidia Buisson. |
| Spasmine Jolly. | Vin de Vial. |
| Spasmonéural. | Viosten. |
| Spasneurol. | Vioxyl Mouneyrat. |
| Splénomanganol. | Viradène. |
| Stimyl. | Visco-Sérum. |
| Strychnotonine. | Vitacalcine Moncour. |
| Strychnal Longuet. | Vitacrine. |
| Strychnarsitol Robin. | Vitène. |
| Sympathocrine. | Yo-Androl. |
| | Yo-gynine |

XVIII. — SYSTÈME NERVEUX. T. S.

PARALYSIE AGITANTE

Voir aussi :

Analgésiques internes.
Antispasmodiques (système nerveux.)
Modificateurs du sympathique.
Sédatifs.

Arsylène Roche.
 Belladénal Sandoz.
 Bellafoline Sandoz.
 Chlormagnésium Fisch.
 Chloro-Magnésion.
 Chloral bromuré du Dr Du-bois.

Comititol.
 Delbiase.
 Dynosthène.
 Endopancrine.
 Genhyoscyamine.
 Genoscopolamine.
 Hyoscyamine Houdé.
 Naïodine.
 Pansolanée.
 Sédol.
 Sédoneurol Dehaussy.
 Staprolysat.
 Sympathoriane.
 Syntropan Roche.

PARALYSIES PÉRIPHÉRIQUES

Voir aussi :

Instrumentation.

Arsi-Strychnal Longuet.

Génostrychnine.
 Granules Chanteaud.
 Plasma de Quinton.
 Strychnal Longuet.

TICS — CONVULSIONS — DÉLIRES

Voir aussi :

Antispasmodiques.
Modificateurs du sympathique et du parasympathique.
Sédatifs.

Adonal.
 Alepsal Genèvevriër.
 Allonal Roche.
 Amphotonyl.
 Ampoules de Pantopon Roche.
 Ampoules de Spasmalgine Roche.
 Anaural.
 Angiosédine.
 Anxiosédine.
 Azigol Thévenot.
 Baumolacpinine.
 Beatol.
 Belladénal Sandoz.
 Benzylol.
 Borosodine Lumière.
 Bromiase.
 Bromo-Garnal.
 Bromogénol Pépin.
 Bromo-Maisine.
 Bromone Robin.

Bromovose.
 Bromure de Calcium (Sirop Henry Mure au).
 Calcibronat Sandoz.
 Calcium Francalcion.
 Calcium Sandoz.
 Calcivitam.
 Calsédine.
 Cérébroil Leisyn.
 Chloral bromuré du Dr Du-bois.
 Chlorical.
 Chloro-Calcion.
 Comititol.
 Comprimés Kléos.
 Crino-Sérum.
 Dialacétine Ciba.
 Dial Ciba.
 Didial Ciba.
 Dragées du Dr Gelineau.
 Dragées Lumeval.
 Epicral.
 Eusomnine Bélières.
 Francalcion.
 Gardénal.
 Genhyoscyamine.
 Génisténal.
 Génomorphine.

XVIII. — SYSTÈME NERVEUX. T. S.

TICS — CONVULSIONS — DÉLIRES

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Humoro-stabilline. | Sédopavérine. |
| Hyoscyamine Houdé. | Sédosine. |
| Intrait de Valériane Dausse | Sirops Henry Mure. |
| Isonal. | Sirop Teyssèdre. |
| Kalmobrol. | Somnifène Roche. |
| Lipocérébrine Chevreton. | Somnopol. |
| Lobéliane Laleuf. | Somnothyrid. |
| Magbromyl. | Spasalgine Roche. |
| Morphéroinn Leisyn. | Spasmine Jolly. |
| Nesal. | Spasmoneural. |
| Neurène. | Spasneuroi. |
| Neuréol. | Suppositoires Pyrax. |
| Neuridor. | Tablettes Hova. |
| Neurinase. | Tartrate borico-potassique |
| Neurobore. | Pachaut. |
| Neurocalcium. | Thébaïl. |
| Neuroflorine. | Théinol. |
| Neuropol. | Tribromure Gigon. |
| Novo-Brol. | Valbornine Rogier. |
| Paderyl. | Valbrol. |
| Pancalcion. | Valédyl. |
| Paratyroné. | Valénal Novalis. |
| Paveron Dausse. | Valérianate Grignon. |
| Paxène. | Valérianate Pierlot. |
| Phytosplénol. | Valériane Buriat. |
| Phosphobrom. | Valériane Gmet. |
| Plasmocalcium. | Valériane Pachaut. |
| Plexorine. | Valérianose Gigon. |
| Polybromure Gonnon. | Valériflore. |
| Poudre anti-épileptique | Valérinodor Malmanche. |
| Cassarini. | Valérium Paul Thibault. |
| Pulsamone. | Valérobromine Legrand. |
| Rangol. | Valéromenthol. |
| Rutonal. | Valéronal. |
| Sédergine. | Végélaet. |
| Sédobrol Roche. | Vériane Buriat. |
| Sédoneuroi Dehaussy. | Véronidia Buisson. |

XIX. — TUBERCULOSE

AMAIGRISSEMENT

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Voir aussi : | Amunine. |
| <i>Diététique.</i> | Angiolymphé du D ^r Roux. |
| <i>Instrumentation.</i> | Ardogène. |
| <i>Produits vitaminés.</i> | Arsécrinol. |
| <i>Toniques.</i> | Arséniode Buriat. |
| Adral. | Arsi-Strychnal Longuet. |
| Algane. | Arsylène Roche. |
| | Ascoléine Rivier. |

XIX. — TUBERCULOSE

AMAIGRISSEMENT

| | |
|---|--------------------------------------|
| Biocalcose. | Liposplénine du D ^r Groc. |
| Biocholine. | Mangarsenic. |
| Biodynol. | Minergil. |
| Biodynamine. | Morisland. |
| Biogénol Demasle. | Nucléasine. |
| Biotrignon. | Nucléigène. |
| Cacodyle Gönnon. | Nuphos. |
| Cacodyline Jammes. | Œnophos. |
| Carnine Lefrancq. | Okamine. |
| Cadior. | Opocalcium irradié du D ^r |
| Carbotrignon. | Guersant. |
| Cérébroil Leisyn. | Opostyl Bouty. |
| Cimarsényl. | Orthozomine. |
| Cinnozyl. | Ozobiase. |
| Cytocholine. | Ozobiase opothérapique. |
| Cinalose. | Ozothine. |
| Clupeyl. | Pancrinol du D ^r Debat. |
| Colloïdogénine du D ^r Bayle. | Panstomase. |
| Créagénol. | Panxylon. |
| Crinhémol. | Peptone Vassal. |
| Crinosthényl. | Phagostyl Mangané. |
| Crino-Sérum. | Phosoforme. |
| Curiodé Arsénié. | Phosol. |
| Cytobiase. | Phosphates du D ^r Pinard. |
| Cyto-Manganol Corbière. | Phosphonine Soulié. |
| Cytopan. | Phylla Dyn. |
| Cyto-Sérum Corbière. | Phytine Ciba. |
| Diastogène Dehaussy. | Phyto-Splénol Plé. |
| Diastogène F. Dehaussy. | Réalphène Buisson. |
| Doloma injectable. | Recrésal. |
| Endopancrine. | Selor n° 2. |
| Fénucalcium. | Sérobiol. |
| Fénucine. | Sérogyne. |
| Fénugrène. | Splénomangol. |
| Fénurobur. | Splényl. |
| Fosfoxyl Carron. | Sulf-Y. |
| Fosyls Carron. | Tonax. |
| Gasthrema. | Tonucyl. |
| Globexine. | Total-Tonic. |
| Granulé Cabasson. | Uvéphorine. |
| Hémo-Cyto Sérum. | Vanadarsine Guillaumin. |
| Hémofer. | Vin de Vial. |
| Hormocline. | Vin Girard. |
| Hormovitol. | Viosten. |
| Insuline buccale Fornet. | Vioxyl Mouneyrat. |
| Insuline Byla. | Virmonal. |
| Insuline Leo. | Vitadone. |
| Insulyl. | Vitaglyc. |
| Iodo-calcium. | Zomine. |
| Jemalt Wander. | Zoocythine. |
| Juglanrégine André. | Zymatine irradiée. |
| Lauriatol. | |

XIX. — TUBERCULOSE

ANTISEPTIQUES GÉNÉRAUX

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Acatar. | Iodo-Maïsine (globules). |
| Alcamfétol. | Iodométine. |
| Algatan. | Iodone Robin. |
| Alliocardia. | Iodonésyl. |
| Allochrysine Lumière. | Iodonucléol. |
| Aloysine. | Lipiodol Lafay. |
| Aniodol. | Lipiodine Ciba. |
| Azotyl. | Lita. |
| Cachets Roche au Thiocol. | Magiodyl. |
| Capsules Dartois. | Métaformine. |
| Cholergine. | Micelliode. |
| Cimarsényl. | Myochrysine. |
| Cinalose. | Murones du Dr Robert |
| Cinnozyl. | Jacques. |
| Collo-iode Dubois. | Néo-Riodine. |
| Comprimés Roche au Thiocol. | Okamine. |
| Créosal Dubois. | Oléochrysine Lumière. |
| Créositoires. | Paniode. |
| Créo-suppo-camphre. | Panxylon. |
| Curiode. | Pépiodon Henry. |
| Curiode arsénié. | Pneumostyl Daguin. |
| Cynéil. | Pulmosérum. |
| Dicaliode. | Pulmositoires. |
| Dioradin. | Rhocya Dyn. |
| Electrocuprol. | Riodine. |
| Eniode Lefebvre. | Selor 1 et 2. |
| Eranol. | Sirop de Gaïarsol. |
| Eucalyptine Lebrun. | Sirop Girard. |
| Goménoléos. | Solucamphre gaïacolé. |
| Gouttes Daynoc. | Solution Pautauberge. |
| Granions (Les). | Térozone. |
| Huile Gallina. | Terpoxyl interne. |
| Iodalose Galbrun. | Triradol. |
| Iodaseptine Cortial. | Tridynol. |
| Iodassium. | Uroïodine. |
| Iodogénol Pépin. | Urométhyle. |
| | Zimbyl |

MÉDICATIONS LOCALES

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Balmiga. | Eucalyptine Lebrun. |
| Benzoquinol. | Goménoléos. |
| Bronchodermine. | Panxylon. |
| Créosoforme Lambiotte. | Révulsif liquide Boudin. |
| Eranol. | Ur-Clar. |

XIX. — TUBERCULOSE

TONIQUES — REMINÉRALISANTS RECALCIFIANTS

- | | |
|-------------------------------------|---|
| Actiphos. | Chloro-Calcion. |
| Adral. | Cimarsényl. |
| Adrénaline Clin. | Cinalose. |
| Adrénaline Invar. | Cinnozyl. |
| Adrénaline Sauba. | Clupeyl. |
| Adrénine. | Colloïdogénine du D ^r Bayle. |
| Adrénocalcine. | Composé Gmet. |
| Adrénoldes Béral. | Créagénol. |
| Algane. | Créosal Dubois. |
| Algostérine Oliviero. | Crescogénol. |
| Aminine. | Crinhémol. |
| Amylodiastase Thépenier. | Crino-Sérum. |
| Androcalcion E. | Crinosthényl. |
| Angiolymphé du D ^r Roux. | Crussol. |
| Anacamphre. | Curiode arsénié. |
| Antasthène. | Cytobiase. |
| Antiphi. | Cytocholine. |
| Ardogène. | Cyto-Manganol Corbière. |
| Arsécrinol. | Cytopan. |
| Arséniode Buriat. | Cyto-Sérum Corbière. |
| Arsi-Strychnal Longuet. | Cyto-Sirop. |
| Arsylène Roche. | Dépuriodé du D ^r Roger |
| Ascoléine Rivier. | Weber. |
| Bactioxyné. | Diastogène Dehaussy. |
| Benzyllocalcium. | Diastogène F. Dehaussy. |
| Biocalcose. | Doloma. |
| Biocholine. | Doloma injectable. |
| Biodynamine. | Dolophos. |
| Biogénol Demasles. | Dragécalcion. |
| Bionéol. | Dragées Hecquet. |
| Biophorine Girard. | Dysthène. |
| Biosine Le Perdriel. | Elixir Ducro. |
| Biotrigon. | Energine iodée de Berck. |
| Biovigorine. | Energine phosphorée de |
| Cacodyle Gonnón. | Berk. |
| Cacodyline Jammes. | Eufosyl Vely. |
| Calcigénol. | Exhepa. |
| Calciline. | Fa-Ner-Val. |
| Calcional. | Fénucalcium. |
| Calci-Sténine. | Fénucine. |
| Calcium Sandoz. | Fénurobur. |
| Calcium Francalcion. | Fénugrène. |
| Calcivitam. | Fer Larcade. |
| Calcoléol. | Fixase. |
| Carbophos. | Fixase irradiée. |
| Carbotrigon. | Flétase. |
| Carnine Lefrancq. | Fluodyle. |
| Cerebroil Leisyn. | Fluoganèse. |
| Cérébrosthénine Dalln. | Fortossan Ciba. |
| Céréossine Dehaussy simple. | Fortossan irradié. |
| Céréossine irradiée. | Forxol. |
| Chlorical. | Fosfomagnyl. |

XIX. — TUBERCULOSE

TONIQUES — REMINÉRALISANTS RECALCIFIANTS

- | | |
|---|---|
| <p> Fosfoxyl Carron. Fosyls Carron. Francalcion. Fucoglycine du D^r Gressy. Gaduamine. Gaduase. Gasthrema. Gaurol. Génosthéniques (Gouttes.) Génostrycamine. Glandex phoscalcique. Glandimbine Lafran. Glandocalcyl. Globexine. Glycérophosphate Dalloz. Glycérophosphate Robin. Glyctone phosphatée Charrière. Glykolaïne Robin. Gouttes phosphosthéniques Dausse. Granions (Les). Granoxyl. Granulé Cabasson. Granules Chanteaud. Granules de Pantofort du D^r Boveil. Hectine. Hémagénine Giraud. Hémato-Iodine. Hémoantitoxine Sofos. Hémocalcine. Hémo-Cyto-Sérum Corbière. Hémofer. Hémogénol Dausse. Hémoglobine Deschiens. Hémopanbiline. Hémo-Phagosthyl. Hémoplasme Lumière. Hémoplasmine. Hémostérine irradiée. Hémostra « Roche ». Hémostyl. Hémotal. Hépacrine. Hépagyl. Hépaphos. Héparfer. Héparmoné. Hépatergol. Hépathémo. </p> | <p> Hépatrol. Hépatrol injectable. Hipposarcine Roy. Histogénol. Holos. Hormuclases. Huile de foie de morue médicinale suractivée Rhône Poulenc. Huile Gallina. I. A. M. Iodarsénic Guiraud ou Gouttes Païdophiles. Iodentérol. Iodocalcium. Ionyl. Irrastérine. Jemalt Wander. Juglanrégine André. Kola caféinée Aubert. Kola granulée Astier. Kola Monavon. Kolatines. Lauriatol. Lécithine Vacheron. Levuro-maltine Déjardin. Limol Churchill. Lipocérébrine Chevreton. Liposplénine du D^r Groc. Lugocalcion. Magnécythine. Magol Churchill. Mancobène. Mangano-Phosphal Julien. Mangarsenic. Mangratinés. Marimine. Marinol. Marrucol. Maté Douglas. Minergil. Morisland irradié. Morrhualène Gautier. Morrhuétine Jungken. Morrhuétine Jungken vitaminée. Morrhuxine. Morubiase. Muronés du D^r Robert Jacques. Musculosine Byla. </p> |
|---|---|

XIX. — TUBERCULOSE

TONIQUES — RÉMINÉRALISANTS RÉCALCIFIANTS

Myochrysine.
 Néoarsite.
 Néo-calciline.
 Néolyse.
 Néolyse radio-active.
 Néo-Neurosine Prunier.
 Néo-Rhomnol.
 Néo-Tannurgyl.
 Nervocithine Tissot.
 Neuropol.
 Neurosine Prunier.
 Neurotrophol Byla.
 Névrosthénine Freyssinge.
 Nucléarsitol Robin.
 Nucléigène.
 Nucléophorène.
 Nuclésine.
 Nuphos.
 Cénophos.
 Okamine.
 Oléochrysine Lumière.
 Opocalcium du D^r Guersant.
 Opocalcium irradié du D^r Guersant.
 Opoferrine vitaminée.
 Oponuclyl irradié Trouette-Perret.
 Opophos.
 Opostyl Bouty.
 Opothérapie du D^r Fraisse.
 Orcalcine.
 Organi-calcion simple et endocrinien.
 Ostéogène.
 Ostéoglandulol.
 Ozobiase.
 Ozobiase opothérapique.
 Pancalcion.
 Pancrinol du D^r Debat.
 Pangaduine.
 Pangermine.
 Panostyl.
 Panstomase.
 Panvita.
 Panxylon.
 Parathyrocalcine Moncour.
 Pepto-fer Jaillet.
 Pepto-Kola Robin.
 Peptone Vassal.
 Percalcine.

Phagostyl.
 Phagosthyl mangané.
 Phosbiose.
 Phoscamine.
 Phosoforme.
 Phosol.
 Phospharsol.
 Phosphates du D^r Pinard.
 Phosphate Vital de Jacquemaire.
 Phospho-Fluor Beynet.
 Phospholéose Demasles.
 Phosphonine Soulié.
 Phosphopinal Juin.
 Phostyl.
 Phylla Dyn.
 Phymostéryl Leisyn.
 Phytine Ciba.
 Phytogénine Byla.
 Phytogyl.
 Phyto-Lécithine.
 Phytosplénol Pié.
 Phyto-vitamines Pié.
 Plasma de Quinton.
 Plasmarine.
 Plasmocalcium.
 Plasmosthène.
 Pneumo-Lipase.
 Poliol Churchill.
 Poudre Danica.
 Prodynase.
 Pulmosérum.
 Quina pepsiné Blot.
 Quina Baron.
 Quinarsol antianémique.
 Quinoidine Duriez.
 Quinquina Gmet.
 Reconstituant Mary.
 Recrésal.
 Rhizotanin.
 Rhomnol.
 Sanas.
 Sanguil.
 Selor n^o 2.
 Sérifer Laurençon.
 Sérobiol.
 Sérosthényl Bouty.
 Sérum neuro-psychique.
 Sérum névrosthénique Fraisse.
 Sérum Oliviero.

XIX. — TUBERCULOSE

TONIQUES — RÉMINÉRALISANTS RÉCALCIFIANTS

| | |
|---|-------------------------|
| Sirop de Gaiarsol. | Total Tonic. |
| Sirop de Glycérophosphates Vacheron. | Traphéine. |
| Sirop de Lovel. | Tréphonyl. |
| Sirop Famel. | Tricalcine. |
| Sirop Girard. | Tridynol. |
| Sirop Tinardon. | Ultra-vitamine 4. |
| Solucamphre cholestériné. | Uvé (gouttes). |
| Solution Quinquina Bardet. | Uvéphoriné. |
| Solution Pautauberge. | Uvestérol. |
| Spectrol. | Vanadarsine Guillaumin. |
| Splénarmone. | Végéphos. |
| Spléno-magnésium. | Vériane Buriat. |
| Splénomanganol. | Vigostérol. |
| Stérogyl. | Vin de Baudon. |
| Sthénoléine. | Vin de Bugeaud. |
| Sthénoxal. | Vin de Carnéose. |
| Stimyl. | Vin de Vial. |
| Strychnal Longuet. | Vin Girard. |
| Strychnarsitol Robin. | Viosten. |
| Sur-bi-cal. | Vitaglyc. |
| Taburol Monal. | Vioxyl Mouneyrat. |
| Tanno-calcine. | Virmonal Piam. |
| Tannurgyl du D ^r Le Tanneur. | Viscosérum. |
| Terkal Monal. | Vitacalcine Moncour. |
| Tonax. | Vitadone. |
| Tonikéine Chevreton. | Vitamine Cortial. |
| Tonique Gonnon. | Vitamorrhaine. |
| Tonique Roche. | Vitamyl. |
| Tonuclyl. | Vitène. |
| Tonudol. | Vivoléol. |
| | Zomine. |
| | Zoocythine. |

TRAITEMENT SPÉCIFIQUE

| | |
|---|--|
| Allochrysine Lumière. | Moréthyl Dausse. |
| Cadior. | Myoral. |
| C. B. K. | Myochrysine. |
| Cimarsényl. | Oléochrysine Lumière. |
| Cinéyl. | Oléo-sanocrysine Mollgaart. |
| Colloïdogénine du D ^r Bayle. | Phymo-stéryl Leisyn. |
| Créositoires. | Pulvita. |
| Crisalbine. | Sanocrysine de Mollgaart. |
| Crysiodal. | Sérum de Jousset. |
| Hémoantitoxine Sofos. | Sérum végétal du D ^r Cuguillière. |
| Institut Pasteur Vaccins B. C. G. | Tébéphaguine Fornet. |
| Lipaurol. | V. A. V. |
| Molène. | Zimbyl. |

XIX. — TUBERCULOSE

TRAITEMENT SYMPTOMATIQUE — SUEURS

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Acécoline. | Ozobiase. |
| Ampoules de Spasmalgine Roche. | Phymo-stéryl Leisyn. |
| Antispasmyl. | Pragmoline. |
| Génatropine. | Sécacornine Roche. |
| Genhyoscyamine. | Spasmalgine Roche. |
| Granules Chanteaud. | Syntropan Roche. |
| Novatropine. | Zimbyl. |

XX. — TUMEURS — CANCER.

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Anaclasine Ranson. | Métaux colloïdaux A. Lancien. |
| Anéo Leisyn. | Naïonide Logeais. |
| Antinéase. | Néothorium Rhemda. |
| Arcica. | Néolyse et Néolyse radioactive. |
| Backérine. | Néo-Neurosine Prunier. |
| Biopausine. | Néophage. |
| C. 40. | Néoral. |
| Calmaby. | Néotrophène. |
| Catalyl Mg. | Néosuline. |
| Cérébroil Leisyn. | Nestosyl. |
| Chlomag. | Œnophos. |
| Chlormagnésium Fisch. | Organi-calcion endocrinien. |
| Chloro-Calcion. | Orthogénol. |
| Chloromagnésion. | Patholysine. |
| Chlorophyle du Dr David. | Peptone Vassal. |
| Chlorumagène. | Percalcine. |
| Cibalgine. | Phagosthyl. |
| Colloil Leisyn. | Phagosthyl mangané. |
| Cytomagnésium Oliviero. | Phosbiose. |
| Delbiase. | Phoscamine. |
| Doloma. | Phosphomagnésium. |
| Doloma injectable. | Plombyl. |
| Dolophos. | Plurion. |
| Dysthène. | Poudre Danica. |
| Electrocuprol. | Prodynase. |
| Electrosélénium. | Prostaphile Leisyn. |
| Elixir Ducro. | Pyréthane. |
| Fosfomagnyl. | Radio-Mordant Leisyn. |
| Fosyls Carron. | Séliénol. |
| Génomorphine. | Séphydine. |
| Gloxines. | Séroma Rey. |
| Gouttes Magalo. | Spléno-magnésium. |
| Granions (Les). | Syphonéol. |
| Hopogan Bocquillon. | Thorix (Thorium X Rhemda). |
| Ixium Buisson. | Traphéne. |
| Magnécythine. | Véralgine. |
| Magnésie Drouet et Plet. | Vernis à la Diachusine. |
| Magnésium Hardy. | Vin Raimoa Tonic. |
| Magnésio-Tubes Robinet. | |
| Magnogène. | |
| Mésothorium Buisson. | |



DICTIONNAIRE DE SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES



83218

2015



ABSURIC

Le meilleur solvant de l'acide urique.
Le plus puissant antiseptique urinaire.

Composition. — Citro-lactate de lithine.
Pipérazine, urotropine, sulfosalicylate de quinoléine.

Indications. — Affections des reins et de la vessie (néphrites, pyélo-néphrites, cystites, urétrites, etc.). Goutte, arthritisme, gravelle, rhumatismes, artériosclérose, dysenterie amibienne.

Posologie. — 4 à 6 cuillerées à café par jour dans un demi-verre d'eau sucrée.
Le flacon : 16 fr.

Laboratoire de l'ABSURIC
17, rue de Provence — PARIS (IX^e).

ACATAR

(*α* privatif, contre le catarrhe).
Médication balsamique par excellence.

Composition. — Pilules glutinisées à base de Baume de Tolu, Terpènes d'Abiès, Cinnamo-benzoate de soude, Goudrons de pinus et Juniperus (Harlem), Argent colloïdal.

Indications thérapeutiques. — Véritable balsamique très doux n'irritant pas les reins, médication antiseptique et anti-infectieuse, modifiant les sécrétions, applicable dans tous les écoulements aigus ou chroniques, toutes manifestations catarrhales irritatives ou douloureuses des voies urinaires, bronchiques, biliaires, intestinales (cystites, cystalgies, gonorrhées, prostatorrhées, néphrites, toutes pyélo-néphrites tuberculose rénale ou intestinale, etc...).

Mode d'emploi. — Dose moyenne : 9 pilules par jour en 3 fois.

Le flacon : 16 francs

Laboratoires BEAUXIS-LAGRAVE

74, quai de Jemmapes — PARIS (X^e).

Tél. : Botzaris 38-78.

ACÉCOLINE-SOLUTION

Chlorure d'acétylcholine en solution anhydre et stable, directement injectable par voie intramusculaire.

Boîtes de 6 ampoules dosées à 2, 5, 10 ou 20 cgr.

Propriétés. — L'*Acécoline-solution* dilate les artères de la périphérie, résout les spasmes vasculaires et régularise la circulation périphérique. Elle renforce en outre puissamment le tonus des muscles lisses et rééquilibre le système neuro-végétatif.

L'*Acécoline-solution* est parfaitement tolérée, elle n'a pas de contre-indication.

Indications et posologie :

- 1° *Affections artérielles périphériques* : Artérites chroniques, syndrome de Raynaud : 20 à 60 cgr. par jour.
- 2° *Affections veineuses périphériques* : Ulcères variqueux, 10 cgr. par jour ; Phlébites 10 à 40 gr. par jour.
- 3° *Affections vasculaires générales* : Hypertension artérielle, angine de poitrine : 10 à 20 cgr. par jour.
- 4° *Affections neurologiques* : Ramollissement cérébral, 20 à 40 cgr. par jour ; troubles de la ponction lombaire, 20 cgr. ; sciatique 20 cgr. par jour.
- 5° *Indications ophtalmologiques et oto-rhino-laryngologiques* : Spasmes de l'artère centrale de la rétine, 20 à 40 cgr. par jour ; Glaucome, 20 cgr. par jour. Vertiges labyrinthiques, Bourdonnements d'oreilles, Ozène, 10 à 20 cgr. par jour.
- 6° *Indications gastro-entérologiques* : Hypochlorhydrie, Hyperchlorhydrie, 20 à 40 cgr. par jour. Atonie vésiculaire, 10 à 20 cgr. par jour.
- 7° *Indications phthisiologiques* : Sueurs profuses des tuberculeux, 2 à 4 cgr. par jour.

Boîtes de 6 ampoules de 10 cgr. — Prix : 30 francs.

Laboratoires L. LEMATTE et G. BOINOT

52, rue La Bruyère — PARIS

Adresse télégraphique : Chevrematte 90-Paris.

ACÉCOLINE-SPARTÉINE

Vaso-dilatateur et Toni-cardiaque

| | |
|---|----------|
| Acécoline (Chlorure d'Acétylcho- line) | 0 gr. 10 |
| Spartéine (Sulfate) | 0 gr. 05 |

Hypertension avec insuffisance cardiaque. Accidents d'insuffisance ventriculaire gauche.

Posologie. — Injection 1 à 3 ampoules par jour.

Prix : 30 francs.

ACÉCOLINE-CAMPBRE

Vaso-dilatateur et Eupnéique.

| | |
|---|----------|
| Acécoline (Chlorure d'Acétylcho- line) | 0 gr. 10 |
| Campbre..... | 0 gr. 20 |

Dyspnée des hypertendus. Asthénie des hypertendus.

Posologie. — 1 ampoule matin et soir.

Prix : 30 francs.

ACÉCOLINE-YOHIMBINE

Hypotenseur et Sympathicolytique.

| |
|--|
| Acécoline (Chlorure d'Acétylcholine). 0 gr. 10 |
| Yohimbine..... 0 gr. 01 |

Hémorragies cérébrales et méningées. Hypertensions paroxystiques.

Contre-Indications. — Ramollissement cérébral et spasmes des artères rétiniennes.

Posologie. — 1 ampoule matin et soir, 2 ampoules dans les cas d'urgence.

Prix : 30 francs.

ACÉCOLEX

Pâte trophique à l'Acécoline.

Traitement des Ulcères variqueux des Plaies atones et des Dermatoses

(Chlorure d'Acétylcholine ; fenchone ; oxydes de zinc, de titane ; ichtyol, etc...)

Cicatrisation rapide et sédation des douleurs.

Le tube. Prix : 15 francs.

Laboratoires L. LEMATTE et G. BOINOT

52, rue La Bruyère. — PARIS

Adresse télégraphique : Chevrematte 90-Paris.

ACEPILINE

Composition. — Acétone très pur, Alcool, Pilocarpine, Essences aromatiques stimulantes déterpénées.

Indications. — Alopecies post-fébriles, Alopecies séborrhéiques.

Posologie. — Chaque matin peigner au démêloir et à la brosse dure, puis friction à l'Acepiline avec une brosse à dents demi-dure, raie par raie pendant 10 minutes pour la femme, ou durant 5 minutes sur toute la tête pour l'homme. Quand les cheveux morts cesseront de tomber, continuer par périodes d'une semaine de temps en temps.

Prix : 25 francs.

Laboratoire FLAHAUT

74, rue Monge — PARIS (V^e).

ACÉSINE GUILLAUMIN

Composition. — Pommade à base d'extrait de capsules surrénales de chlorétone et de stovaïne.

Propriétés. — Agent analgésique et vasoconstricteur de grande efficacité, dont les propriétés peuvent être utilement mises à profit, en particulier dans le cas d'hémorroïdes externes ou internes.

Indications. — Hémorroïdes, fissures et prurit de l'anus, démangeaisons de la même région, engelures, gerçures.

Mode d'emploi. — L'Acésine se présente en tubes d'étain. On applique gros comme un pois de la pommade sur les hémorroïdes externes ; quand les hémorroïdes sont internes, visser, sur le tube, la canule qui l'accompagne et introduire la pommade dans le rectum. Renouveler les applications 3 ou 4 fois par jour.

Prix : 15 francs.

Laboratoires ANDRÉ GUILLAUMIN

13, rue du Cherche-Midi — PARIS.

ACÉTYLARSAN

4 oxy — 3 acétylamino — phényl — 1 arsinat de diéthylamine.

Solution aqueuse neutre et stérile, non irritante, injectable dans le muscle ou le tissu cellulaire sous-cutané. Bien toléré. Toxicité réduite.

Indications. — Arsénothérapie de la Syphilis et de certaines protozooses par les voies sous-cutanée ou intramusculaire.

Présentations et posologie. — *Acétylarsan pour adultes* : solution à 23,6 p. 100, 1 cc. = 0 gr. 05 d'Arsenic. Ampoules de 3 cc. (Boîtes de 10).

Acétylarsan infantile : solution à 9,4 p. 100, 1 cc. = 0 gr. 02 d'Arsenic. Ampoules de 2 cc. (Boîtes de 10.)

Injectations hebdomadaires ou bi-hebdomadaires (consulter la Notice spéciale).

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

ACOBELLA

Le médicament sédatif de la Toux.

Forme. — Comprimés très assimilables, très actifs et ne provoquant pas de dyspepsie. Présenté en boîte de 20 comprimés.

Formule. — Bromoforme, 0,02 ; Codéine, 0,01 ; Extrait de racines d'Aconit, 0,0025 ; Extrait de Belladone, 0,0025 ; Extrait de Jusquiame, 0,0025 ; Extrait de Drosera, 0,003 ; Extrait de Grindelia, 0,002 ; Extrait de lobellie, 0,01 ; Benzoate de soude, 0,01 ; Poudre de Dover, 0,06 pour 1 comprimé.

Posologie. — 2 à 8 comprimés par 24 heures à avaler sans croquer, avec un peu d'eau.

Indications. — Traitement de toutes les toux rebelles et fréquentes, des laryngites, trachéites, trachéo-bronchites aiguës, de la coqueluche et de la bacilliose pulmonaire.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 403-1.

Prix : 11 fr. 50.

Laboratoire HOCQUETTE

191, faubourg Saint-Antoine — PARIS.
Tél. : Diderot 04-71.

ACODROS

Composition. — Préparation à base d'aconitine stabilisée, XX gouttes contiennent 1/10^e de milligramme d'Alcaloïde.

Action thérapeutique. — Décongestif, sédatif, analgésique, diaphorétique.

Indications. — Grippe, coryza, inflammations et infections de l'appareil respiratoire.

Mode d'emploi. — *Adultes* : XV à XX gouttes 2 à 3 fois par jour dans un liquide quelconque.

Enfants (au-dessous de 5 ans) ; 2 gouttes par année d'âge.

Prix : 10 francs.

Laboratoires BOUVELOT

62, rue d'Antibes — CANNES. (A.-M.).

ACOÉGÉNOL

Principes actifs. — Iodures de rubidium, de césium, de potassium, de sodium, iode, mimotannin (tannin extrait du mimosa), teintures d'aconit, de gelsemium, de cimicifuga et de ballote.

Action. — Action principale sur la nutrition, action secondaire sur la circulation et enfin action antispasmodique et sédative.

Indications. — Bourdonnements, vertiges, surdité.

Mode d'emploi. — Se prend avec de l'eau sucrée ou non, avec de l'eau vineuse ou avec une infusion.

Posologie. — Dose moyenne : 2 cuillerées à café par jour, vingt-quatre jours par mois, une cuillerée après chacun des deux principaux repas. On peut augmenter la dose et prendre une troisième cuillerée à café le soir en se couchant. (Il est bon, surtout s'il y a de l'otosclérose, de prendre les gouttes Chauvin, à l'Audisclérocure.)

Prescription. — Il est bon de faire suivre le produit du nom patronymique et de prescrire ainsi : un Acoégénol Chauvin.

Le flacon : 20 francs.

Établissements Alfred CHAUVIN
AUBENAS (Ardèche).

ACOLITOL

Topique intestinal.

Composition. — Charbon organique pur, Charbon activé, Carbonate de calcium pur amorphe, Salicylate de Bismuth, Peroxyde de magnésium, Belladone pulvérisée titrée.

Présentation. — Granulé et poudre.

Propriétés. — Topique intestinal de choix, à pouvoir adsorbant et adsorbant élevé, neutralisant et sédatif. Régularise les réactions chimiques du milieu intestinal, entrave les fermentations anormales et les putréfactions, modifie la flore microbienne.

Indications. — Colites, entérocolites, stases colitiques, fermentations, intoxications, auto-intoxications, dysenteries, entérite des tuberculeux, Colibacilliose.

Posologie. — 1 cuillerée à entremets délayée dans 1/2 verre d'eau le matin à jeun et une 1/2 heure avant les repas de midi et du soir.

Prix : 16 francs.

LANCOSME — 71, avenue Victor-Emmanuel-III — PARIS (VIII^e).

ACRIDIA « LERSAM »

Désinfectant des cavités bucco-pharyngées.

Composition. — Comprimés dosés à 2 mgr. de chlorure de 3-6 diamino, 10 méthylacridinium et agréablement aromatisés au suc de réglisse.

Indications thérapeutiques. — Puissant bactéricide indiqué comme préventif des maladies infectieuses en périodes d'épidémies et dans le traitement des affections de la bouche et du pharynx : stomatites, angines, pharyngites, grippe, scarlatine, coqueluche, infections saisonnières.

Sterilisation des porteurs de germes diphtériques et méningococciques.

Doses. — Enfants et adultes : sucer 1 ou 2 comprimés par heure. Peut s'employer concurremment avec le soluté RHINACRIDYL (voyez ce mot).

Prix. La boîte : 7 francs. Admis aux Assurances Sociales.

Echantillon, Littérature :

Laboratoires LERSAM

92, boulevard Murat. — PARIS (XVI^e). | 3

ACTIPHOS

A base de Phosphates Monométalliques de Magnésium, associés au Calcium, Manganèse et Fer.

Caractéristiques. — Puissant modificateur du pH dans tous les cas d'alcalose sanguine.

Reminéralisateur et reconstituant puissant dans toutes les affections diathésiques caractérisées par un *Déséquilibre acido-basique* ou une *Déminéralisation*.

Mode d'action. — Rétablit l'équilibre acido-basique sans toucher à la réserve alcaline et sans déminéralisation par l'action de ses *Radicaux phosphatés non saturés*.

Avantages. — 1° Un effet plus rapide et plus énergique que l'*Acide phosphorique* officinal ou les autres Préparations spécialisées usuelles à base de cet acide, dont l'action est lente, puisqu'ils doivent d'abord faire subir une transformation totale à la réserve alcaline et l'acidification est faible, car l'acide carbonique est faible et l'élimination gazeuse est rapide.

2° Une augmentation plus régulière de l'acidité sanguine et une reminéralisation prolongée, contrairement à ce qui se passe avec les acidifiants énergiques, tels que les *Chlorures alcalins* : $\text{NH}^4 \text{Cl}$ ou Ca Cl^2 bouleverseurs trop brusques du métabolisme minéral et aqueux et exerçant une action irritative sur les muqueuses gastriques.

3° Un effet acidifiant en agissant uniquement sur la teneur en CO^2 libre du sang, sans porter atteinte à la réserve alcaline. Le métabolisme minéral est donc intégralement préservé, tout en augmentant et en équilibrant la concentration en ions H du sang.

Forme. — Ampoules buvables de 3 cc.

Posologie. — Dose de 24 heures :

Adultes : 1 à 6 ampoules suivant avis médical, à prendre pendant les principaux repas dans un verre d'eau, de vin blanc ou de sirop de fruit.

Enfants : 1 à 3 ampoules suivant l'âge à prendre pendant les repas dans un verre d'eau ou de sirop de fruit.

Laboratoires PROCHIMAL

10, rue de Florence — PARIS (VIII°)

Tél. : Europe 40-31.

ADÉNOSEPTYL

Pour instillations et pulvérisations nasales.

Formule. — Collargol, argyrol, Protargol, adrénaline, goménol, eucalyptol.

Propriétés thérapeutiques. — Infections du nez et de la gorge.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 884-1.

Prix : 15 francs.

Pharmacie BLOUIN

50, rue de Turenne — PARIS.

ADIPOLYSINE

PRÉPARATION CHOLAGOGUE ET OPTHÉRAPIQUE POLYVALENTE

RÉGULATRICE DE LA NUTRITION par modification physiologique de l'assimilation PARTICULIÈREMENT EFFICACE CONTRE L'OBÉSITÉ

Sans action élective sur la glande thyroïde

SANS RÉGIME

SANS DANGER

Une seule formule pour les deux sexes

— PRÉSENTATION —

PRÉSENTÉE SOUS FORME DE DRAGÉES
rendues inaltérables par un enrobage soluble dans l'eau

— AVANTAGES —

ASSOULIT L'ORGANISME

NE DÉPRIME

NE TROUBLE

PAS LE SUJET

PAS LE CŒUR

AUCUNE CONTRE-INDICATION

— COMPOSITION —

1° Poudres salines :

| | |
|-------------------------------|----------|
| Phosphate de soude..... | 0 gr. 04 |
| Sulfate de soude..... | 0 gr. 05 |
| Sulfate de magnésium..... | 0 gr. 06 |
| Bicarbonate de soude..... | 0 gr. 05 |
| Citrate monosodique..... | 0 gr. 06 |
| Bromure de calcium..... | 0 gr. 05 |
| Hyposulfite de magnésium..... | 0 gr. 02 |

2° Poudres d'organes :

| | |
|-----------------------|-----------|
| Poudre d'estomac..... | 0 gr. 02 |
| — de duodénum..... | 0 gr. 01 |
| — d'intestin..... | 0 gr. 02 |
| — de foie..... | 0 gr. 05 |
| — de pancréas..... | 0 gr. 04 |
| — de rate..... | 0 gr. 03 |
| — de surrénale..... | 0 gr. 002 |
| — de thyroïde..... | 0 gr. 001 |
| — d'hypophyse..... | 0 gr. 001 |

pour 1 dragée

N. B. — Les poudres salines, chimiquement pures, sont toujours desséchées avant leur emploi. Aussi, la dose de chaque poudre inscrite dans la formule correspond-elle approximativement à un poids double du sel officinal de même nom.

Le sulfate de magnésium introduit dans l'estomac avec les autres éléments constitutifs de l'« Adipolysine » donne forcément naissance à du chlorure de magnésium sous l'influence des chlorures alimentaires et des chlorures du liquide gastrique. Or, chacun sait la valeur thérapeutique du chlorure de magnésium.

Les préparations opothérapiques employées sont faites à partir d'organes frais rigoureusement sélectionnés et contrôlés, puis desséchés dans le vide et à froid avant d'être pulvérisés. Ces préparations sont garanties pures et sans odeur. Leur conservation est indéfinie.

EFFETS PHYSIOLOGIQUES DE L'ADIPOLYSINE

Les effets physiologiques de l'« Adipolysine » dépendent essentiellement des moments où se produisent les décharges biliaires après l'absorption de quantités données de ce produit médicamenteux cholagogue par rapport aux heures des repas.

— PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES —

Selon le moment de son administration

L'ADIPOLYSINE

FAIT MAIGRIR LES OBÈSES

accélère les digestions lentes

ou guérit la constipation

— INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES —

Obésité sous toutes ses formes

Digestions lentes

Constipation opiniâtre

Aérophagie — Insuffisance du Foie — Entérite

— MODE D'EMPLOI ET DOSES —

Les dragées s'avalent et ne se croquent pas.

DOSES MOYENNES POUR 24 HEURES

ADULTES :

OBÉSITÉ : 3 dragées à la fois 1/2 heure exactement avant chacun des 2 principaux repas.

DIGESTIONS LENTES : 3 dragées à la fois au milieu de chacun des 2 principaux repas.

CONSTIPATION : 3 dragées à la fois le matin à jeun et 3 également le soir au coucher

tous les jours pendant plusieurs mois consécutifs ou
même plusieurs années avec intervalles de repos.

Pour la durée du traitement, se conformer aux indications du Médecin.

ADOLESCENTS : 2/3 des doses ci-dessus.

ENFANTS : 1/3 des doses ci-dessus.

— PRIX DE VENTE IMPOSÉ —

Le flacon de 60 dragées (Modèle unique): 20 fr.

LABORATOIRES DU DOCTEUR L. DELALBRE

PRODUITS PHARMACEUTIQUES SPÉCIALISÉS

Ophothérapie - Colloïdothérapie micellaire - Phytothérapie

DÉPOT GÉNÉRAL

2, R. CLAUDE MATRAT - ISSY-LES-MOULINEAUX (Seine)

Fabrication Française.

Téléph. : MICHELET 24-11.

G. R. LANG, Pharmacien de 1^{re} classe

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

ADONAL VICARIO**Phényl-éthyl-malonyl-urée.**

Comprimés à 10 centigrammes.

Sédatif énergique — hypnotique.

Anticonvulsivant, son emploi constitue le traitement de choix du mal comitial.

La forme spéciale des comprimés permet la division facile soit en quatre parties égales, soit en deux parties égales (2 centigrammes et demi ou 5 centigrammes).

Doses habituelles. — De 2 centigrammes et demi à 30 centigrammes par jour, à prendre loin des repas.

Le flacon de 15 comprimés : 8 francs.

Laboratoires VICARIO

17, boulevard Haussmann — PARIS (IX^e).

ADOVERNE « ROCHE »

Glucosides cardiotoniques de l'*Adonis vernalis*.

Action thérapeutique. — Cardiotonique, diurétique, eupnéique, neuro-sédative. Complète, remplace ou continue l'action de la digitale

Indications thérapeutiques. — Toutes les insuffisances cardiaques et rénales. — Asthénies cardiaques, dyspnée, arythmies, œdème pulmonaire, œdèmes périphériques, hydropisies, etc.

Avantages. — Étalonnage physiologique. — Activité optima toujours identique. — Toute l'action utile de la plante elle-même. — Pas d'accumulation. — Pas d'accoutumance. — Pas de toxicité aux doses thérapeutiques. — Emploi facile. — Tolérance remarquable.

Posologie. — XL gouttes ou 4 granules ou un suppositoire = 1 cc. d'une solution à 5 p. 1 000 des glucosides cardiotoniques de l'*Adonis vernalis*.

Modes d'emploi. — Par voie buccale : XX à XL gouttes ou 2 à 4 granules, 1 à 2 fois par jour et plus dans un peu de tisane ou de liquide.

Par voie rectale : 1 suppositoire une à trois fois par jour.

Adoverne « Roche »

Gouttes (flacon de 15 cc.).

Granules (flacon de 60).

Suppositoires (boîte de 6).

Enregistré au Laboratoire national de contrôle des médicaments sous les n^{os} 504-2(*gouttes*), 504-3(*granules*).

Produits

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}

10, rue Crillon — PARIS (IV^e).

ADRAL

Constitution. — Poudre d'Algues sélectionnées, stabilisées, et privées de leurs sels minéraux.

Principes actifs. — 1° *Iode combiné organique* : modificateur le plus puissant de l'assimilation générale ;

2° *Éléments organiques de choix* : Protéines, Graisses, Hydrates de Carbone.

Indications. — *Suraliment spécifique* pour bacillaires, convalescents et amaigris.

Avantages. — *Augmentation* rapide du poids des malades.

Formes. — *Cachets pour adultes* : 2 à 5 par jour. Prix : 17 fr. 50.

Granulé pour enfants : 2 cuillerées à café par jour. Prix : 17 fr. 50.

Laboratoires ROBERT et CARRIERE
37, rue de Bourgogne — PARIS.

ADRÉNALINE CLIN

Adrénaline lévogyre chimiquement pure,
exempte de toute adrénaline racémique.
Pouvoir rotatoire : 53°3.

Propriétés. — Agent vaso-constricteur et hémostatique, ayant une action cardiotonique, antidépressive et antitoxique. Analgésique léger et antichoc.

Excitateur du système nerveux sympathique.

Indications. — Anesthésie locale, hémorragies ; phénomènes de collapsus, de choc ; syncope chloroformique ; infections générales avec adynamie ; asthme ; vomissements incoercibles de la grossesse ; intoxications aiguës ; asthénie ; crises nitritoïdes ; certaines algies ; ostéomalacie ; rachitisme ; maladie d'Addison ; certaines affections oculaires, etc...

Formes. — 1° *Solution aqueuse* (Chlorhydrate d'Adrénaline) au 1/1000. — Flacons de 5, 10, 30 cc. (20 gouttes = 0 gr. 001).

2° *Ampoules injectables* (Solution aqueuse), dosées à 1/10, 1/4, 1/2, 1 milligramme par cc.

3° *Ampoules compte-gouttes* de 10 cc. pour Collyres. (Solution aqueuse à 1/1000). Instillations nasales : (Solution huileuse en ampoules compte-gouttes de 25 cc.

4° *Granulés* au 1/4, 1/2, 1 milligramme. — Flacons de 50 granules.

5° *Suppositoires* au 1/2 milligr.

Formes associées (cocaine, etc...) en ampoules.

Laboratoires CLIN, COMAR et Cie.
20, rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS.

ADRÉNALINE INVAR

Produit soumis au **contrôle physiologique** le plus rigoureux, donne les plus sûres garanties de *pureté chimique* et d'*activité constante*.

Action. — Vaso-constricteur, hémostatique, stimulant circulatoire, coexcitant du sympathique, fixateur du calcium.

Indications. — Rachitisme, coqueluche, tuberculose, dyspepsies atoniques, hyposthénies, asthme, hémoptysie, etc.

Formes. — Ampoules de 1 cc. boîtes de 6 ampoules au millig. Solution au millième, flacons de 5. et 10 grammes.

Le flacon de 10 grammes au Public : 9 fr.

Pharmacie Centrale de France

7, rue de Jouy — PARIS (IV^e).

ADRÉNALINE SAUBA

Forme. — *Tablettes divisibles en deux parties rigoureusement égales.*

Composition. — Chaque tablette équivaut à 5 gouttes de solution d'Adrénaline à 1/1000^e ; chaque demi-tablette à 2 gouttes et demie.

Avantages. — Stabilisation du principe actif. Lenteur obligatoire de l'absorption laissant le médicament un assez long temps au contact des muqueuses.

Propriétés thérapeutiques. — *Vaso-constricteur, Hémostatique, Stimulant de la circulation, Reminéralisant par fixation des sels de chaux et de magnésie.*

Indications. — Hémoptysie, Hémorragies internes, Hématémèse, Tuberculose, Rachitisme, Asthme, Accès pernicieux du paludisme, Crise nitritoïde, Iodisme, Maladie d'Addison, Vomissements de la grossesse.

Mode d'emploi.

Adultes : 4 tablettes par jour.

Enfants : 2 à 4 demi-tablettes suivant l'âge.

Les tablettes ne doivent pas être croquées ; les laisser fondre dans la bouche.

Prix : 10 francs.

Laboratoires SAUBA
MONTREUIL-PARIS

ADRÉNARGOL

(Ampoule Nasale)

Adrénaline associée aux sels d'argent.

Avantages. — Bactéricide énergique. Ni irritant, ni toxique.

Indications. — Antisepsie préventive et curative du rhino-pharynx, Sinusites, Rhinites, Coryzas, Angine, Grippe, etc.

Mode d'emploi. — IV à V gouttes dans chaque narine, matin, midi et soir.

Prix : 15 francs.

Laboratoires

J. BRESSIER, Docteur en pharmacie.

102, rue Vincent — MARSEILLE.

Concessionnaires :

Les Laboratoires NOVALIS

OULLINS (Rhône).

ADRÉNINE

Solution d'Adrénaline au 1 ‰

Action. — L'**ADRÉNINE** possède une action :

- 1° Sur la pression sanguine ;
- 2° Sur le cœur ;
- 3° Sur les fibres musculaires lisses et plus électivement sur celles des petits vaisseaux ;
- 4° Sur la nutrition.

Posologie :

Per os, Cent gouttes à doses fractionnées (toutes les heures, par exemple).

Injectons sous-cutanées, 1 à 10 mmgr. par séries d'injections dans les 24 heures.

Prix : 18 francs.

Laboratoire du Dr MIALHE

8, rue Favart — PARIS.

ADRÉNOCALCINE

Recalcifiant par excellence.

Formes :

Poudres. — Cachets. — Granulés.

Composition :

Association de glycérophosphates, hypophosphites, phosphates, fluorure de chaux et magnésie.

Posologie :

3 doses par jour.

Prix : Cachets : 12 fr. Granulé 10 fr.
Poudre 10 fr.

Laboratoire ADAM

Docteur en pharmacie
GRANVILLE (Manche).

ADRÉNOÏDES BÉRAL

Comprimés pour l'administration efficace de l'adrénaline par voie buccale.

Composition. — Chaque Adrénoïde contient 1/4 de milligramme d'adrénaline stabilisée, ce qui correspond à V gouttes de la solution d'adrénaline au millième.

Propriétés. — Toutes les propriétés de l'adrénaline *per os*, avec cet avantage que l'absorption des Adrénoïdes par la muqueuse buccale met l'adrénaline à l'abri des altérations causées par le suc gastrique et évite sa destruction au niveau du foie.

« Depuis 1904, j'emploie systématiquement l'adrénaline et ai presque exclusivement recours à l'administration par voie buccale. Les résultats obtenus ne me permettent pas de douter de son efficacité. Netter. »
Bulletin Société Biologie, mai 1922.

Mode d'emploi. — Laisser fondre les *Adrénoïdes* dans la bouche.
« C'est perdre l'avantage de l'absorption par la muqueuse buccale que de les avaler. »

Posologie. — Un *Adrénoïde* toutes les 2, 3 ou 4 heures, soit de 6 à 12 par jour.

Indications. — Toutes Affections aiguës ou chroniques avec asthénie ou dépression circulatoire, Tuberculose, Etats hémogéniques, Purpuras, Vomissements incoercibles, Etat de dépression post-opératoire.

Formuler : Adrénoïdes Béral. Une boîte : 12 francs.

Laboratoire BÉRAL

194, rue de Rivoli — PARIS

ADRÉPATINE

POMMADE-SUPPOSITOIRES

Association pluriglandulaire.

Composition. — *Extraits d'Organes*: Foie, Surrénale, Thyroïde, Hypophyse, Prostate.

Extraits Végétaux: Marron d'Inde frais stabilisé, Cupressus, Hamamelis.

Excipient antiseptiques et Calmant.

Propriétés et Indications thérapeutiques. — *L'Adrépatine* est une préparation pharmaceutique qui :

- 1° Par les extraits polyglandulaires englobés ;
- 2° Par les propriétés hypertensives de certains de ses composants ;
- 3° Par son action vaso-constrictive locale ;
- 4° Par son excipient à la fois anesthésique et antiseptique est destinée à combattre non seulement l'expression anatomique et les complications de l'affection primitive, mais encore à remédier aux troubles organiques et fonctionnels qui président à la formation des hémorroïdes. Son emploi est tout spécialement indiqué dans le traitement des *Hémorroïdes internes et externes, des Rectites, Prostatites, du Prurit anal et des Fistules.*

Mode d'emploi. — De 1 à 3 suppositoires (ou applications de pommade) par 24 heures. Le tube de Pommade est muni d'une canule rectale.

Boîte de 15 suppositoires..... 12 fr. 50

Tube de pommade avec canule rectale..... 12 fr. 50

Laboratoires LALEUF

51, rue Nicolo — PARIS (XVI^e).

ADRÉPHÉDRINE BÉRAL

Ampoules de 2 centicubes pour injections sous-cutanées.

Composition. — 1/4 milligramme d'Adrénaline et 2 centigrammes d'Ephedrine naturelle par centicube.

Propriétés. — Toutes les propriétés de l'adrénaline sous-cutanée, mais avec cette différence avantageuse qu'à dose égale elle est moins toxique, plus maniable et surtout d'une durée d'action beaucoup plus prolongée. De plus, cette action n'est pas suivie de la réaction hypotensive adrénalinique. Elle présente donc tous les avantages de l'adrénaline sans ses inconvénients.

Indications. — Toutes celles de l'adrénaline sous-cutanée, notamment : *Accès d'asthme déclenchés, Etats de choc avec défaillance circulatoire périphérique et collapsus* (chocs thérapeutiques, sériques, anaphylactiques, opératoires, etc.), *Etats hémogéniques, Purpuras, Anémies, Hémoptysies, etc.*

Posologie. — De 1 à 4 centicubes sous-cutanés. Chez sujet neuf, débiter par 1 centicube. Comme pour l'adrénaline, éviter la voie musculaire qui pourrait exposer à injecter dans un petit vaisseau.

Prix : la boîte de 5 : 14 francs.

Formuler : Adréphédrine. Une boîte.

Laboratoire BÉRAL

194, rue de Rivoli — PARIS.

AÉROCID

Conception entièrement nouvelle.

Traitement opothérapique de l'aérophagie et de ses conséquences.

Basé sur l'action de la parathyroïde dans le métabolisme du calcium, dont le rôle antispasmodique a été mis en évidence par de nombreux auteurs.

Formule :

| | |
|--------------------|-------|
| Parathyroïde | 0,001 |
| Hypophyse | 0,05 |
| Splénine | 0,05 |
| Surrénine | 0,05 |
| Hépatine | 0,30 |

Indications. — Aérophagie, Asthme, Emphysème, Fausse angine de poitrine, Insomnie.

Dose et mode d'emploi. — Un cachet ou deux comprimés le matin au réveil, un le soir en se couchant.

Prix : 18 francs.

Laboratoire du D^r MIALHE

8, rue Favart — PARIS.

AÉROPHAGYL

Indications. — Spécifique de l'Aérophagie et de ses conséquences : insomnies, troubles cardiaques, nerveux et pulmonaires, toutes gastrites nerveuses.

Posologie. — 1 comprimé délayé dans un demi-verre d'eau, au milieu des repas. En cas de crise 2 comprimés à la fois.

Enfants, 1/2 doses.

Composition. — Combinaison complexe constituée par l'association, à une faible dose d'uroformine, du citrate de sodium et des ions Br. et Ca.

Boîte de 45 comprimés : 14 fr.

Echantillons gratuits :

Laboratoires G. BEYTOUT

12, boulevard Saint-Martin — PARIS (X^e).

Tél. : Nord 76-85.

AESCULASE

Composition. — Alcoolature de marron d'Inde stabilisée, extraits d'hamamélis et de capsicum.

Propriétés thérapeutiques. — Action vasoconstrictive énergique et constante sur le système veineux périphérique. Action régulatrice de la circulation, puissant analgésique, antihémorroïdaire.

Indications. — Tous les troubles circulatoire
Puberté, Ménopause, Hémorroïdes.

Mode d'emploi.

Troubles de la circulation : XV gouttes avant les deux repas. Hémorroïdes : pour éviter les crises X gouttes avant les deux repas.

Dans les crises aiguës : XXX à L gouttes 2 fois par jour.

Prix : 12 francs.

Laboratoire MICHELON

20, boulevard Heurteloup — TOURS (I.-et-L.).

ÆTHONE

*Antispasmodique, sédatif de la Coqueluche
et de la Toux.*

Doses. — Pour les enfants, administrer :

| | | |
|------------------------|---|--|
| 5 à 6 fois par jour | { | de 1 mois à 1 an : I goutte par mois d'âge. |
| | | De 1 à 2 ans : XII à XX gouttes. |
| | | De 2 à 5 ans : XX à XXV gouttes. |
| | | De 5 à 10 ans : XXV à XXX gouttes. |
| | | De 10 à 15 ans : XXX à XXXV gouttes, et plus s'il est nécessaire. |

2° Pour les adultes, administrer : 5 à 6 fois par jour : L à LX gouttes dans une quantité suffisante d'eau sucrée, de sirop de tolu additionné d'eau, ou dans une infusion de Guimauve sucrée avec du miel. L'Æthone doit être administré 1/2 heure avant, ou 2 heures après le repas.

Prix : 10 fr. 80 le flacon.

Laboratoire de l'ÆTHONE

9, rue Boissonnade — PARIS.

AGARASE

Composition :

Comprimés à base d'agar-agar, de ferments lactiques et d'extraits végétaux.

Action :

Réveille la tonicité de l'intestin, lubrifie la muqueuse, dissocie le bol fécal, supprime les fermentations.

Avantages :

Petits comprimés très faciles à avaler; enrobage soluble dans l'intestin évitant les réactions gastriques; répartition de la dose active en plusieurs comprimés, ce qui évite une action brutale sur un segment isolé du tube digestif.

Pas d'accoutumance, pas de coliques.

Indications :

La constipation sous toutes ses formes, colites, entérocolites, entérite muco-membraneuse, appendicite chronique.

Céphalées, obésité, artériosclérose, affections du foie.

Dermatoses.

Mode d'emploi :

Trois comprimés à chacun des principaux repas à prendre avec une gorgée d'eau sans croquer.

Pour les enfants, deux comprimés à chacun des repas.

Prix : 10 francs.

Laboratoire G. REAUBOURG

2, rue Boucicaut — PARIS (XV^e)

Bureaux : 31, rue St-Georges — PARIS (IX^e)

AGAROL

Traitement rationnel de la constipation.

Emulsion stable et homogène, sans goût, sans arôme artificiel, *miscible à tous liquides* (lait, eau sucrée ou non, infusions, potages).

Composition. — Huile de paraffine neutre et de haute viscosité, Agar-Agar, Phénol-phtaléine.

Indications. — Toutes formes de constipations, auto-intoxications ; utile aux atoniques, femmes enceintes, nourrices ; constipation post-opératoire. Absence totale d'inconvénients.

Action physiologique. — Lubrifie l'intestin, pénètre et ramollit le résidu alimentaire, active le péristaltisme sans provoquer l'irritation ou la constipation secondaire consécutive à l'usage des purgatifs usuels. Ne trouble nullement les fonctions de la digestion, ne cause ni nausées, ni coliques. Absence complète de suintement. Aucune accoutumance.

Dose et mode d'emploi :

Adultes : de 1 à 4 cuillerées à café, soit pur, soit dilué, le soir, au coucher ; si nécessaire, répéter la dose le lendemain matin.

Enfants : 1/2 à 2 cuillerées à café, suivant l'âge, pur ou dilué.

Le flacon de 210 cc. : 24 francs belges.

Prière d'adresser toutes demandes de renseignements et d'échantillons aux :

Laboratoires SUBSTANTIA, S. A.

53, rue du Poinçon — BRUXELLES.

AGOBYL**Le drain des voies biliaires.****Composition :**

Peptone, Sulfate de magnésie, Camomille, Extrait de réglisse.

Formes :

Granules : 1 à 2 cuillers à café le matin à jeun dans un peu d'eau tiède, ou infusion de camomille.

Cachets : 1 avant les repas.

Dragées : 2 à 4 par jour.

Laboratoire FOUCHERE

RIVE-DE-GIER (Loire).

AGOCHOLINE

Stimulant hépato-billaire.

Forme.

Granulé soluble aromatisé à la menthe ou sans arôme.

Composition.

Sulfate de Magnésie desséché.

Peptone sèche purifiée.

Propriétés thérapeutiques.

Excite la sécrétion et l'excrétion biliaires.

Réalise le drainage des voies biliaires *per os* et le rend facile en clientèle.

Indications.

Congestion du foie et de la vésicule biliaire.

Lithiase biliaire.

Ictère et Cholémie,

Cholécystites chroniques.

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|------------------------------|
| Certains troubles digestifs | { | Gastropathies réflexes, | } d'origine hépato-biliaire. |
| | | Inappétence, | |
| Certains troubles généraux | { | Nausées, | |
| | | Constipation. | |
| Certains troubles généraux | { | Céphalée, Migraines, Asthénie, | } d'origine hépato-biliaire. |
| | | Vertiges, Urticaire et Prurit, | |
| | | Certaines dermatoses. | |

Contre-Indications. (Temporaires.)

Cholécystites aiguës.

Diarrhées aiguës.

Posologie :

Adultes : 1 à 3 cuillerées à café le matin à jeûn, dans un demi-verre d'eau chaude.

Enfants : A partir de 3 ans, 1/4 à 1 cuillerée à café, suivant l'âge.

N. B. — Il est bon de commencer par les doses faibles et de les augmenter progressivement, suivant la tolérance du malade.

Prix : 17 fr. 50

Laboratoires du Docteur ZIZINE

Docteur en Médecine, Docteur en Pharmacie.

Ex-interne en Pharmacie, Lauréat des Hôpitaux.

Lauréat des Fac. de Méd. de Paris et Bordeaux.

24 et 26, Rue de Fécamp — PARIS (XII^e)

Tél. : Diderot 28-96.

AGOMENSINE CIBA

Hormone ovarienne hydrosoluble

(physiologiquement contrôlée.)

Action physiologique. — Congestionnante de la muqueuse utérine, stimulante de l'ovaire, aide au déclanchement du flux menstruel et favorise l'apparition ou le développement des caractères sexuels post-pubertaires.

Indications :

- I. — Aménorrhée, flux menstruel trop peu abondant, règles trop espacées. Malaises qui précèdent ou qui accompagnent la menstruation.
- II. — Troubles de la ménopause, naturelle ou chirurgicale (en association avec la Sistomensine).
- III. — Douleurs viscérales et malaises généraux liés à un flux peu abondant.

Comprimés. — Ampoules.

Doses. — 3 à 9 comprimés par 24 heures, 1 ampoule par jour ou tous les 2 jours.

Le flacon de 20 comprimés : 13 francs.

— de 40 — : 22 —

— de 100 — : 50 —

La boîte de 4 ampoules : 20 —

(Voir Sistomensine.)

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND

109-113, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.

AGOZYMASE

Granulé de saveur aromatique.

Composition. — Sulfate de soude desséché, Sulfate de Magnésie desséché, Chlorure de magnésium, Peptone purifiée, Extrait de boldo.

Indications :

- 1° *Maladies des voies biliaires* : Congestion du foie, Cirrhose, Atonie et Stase vésiculaires, Cholécystite.
- 2° *Maladies gastro-intestinales* : Dyspepsie, Atonie gastrique, Flatulence, Constipation.
- 3° *Maladies cutanées* : Prurits généralisés et localisés, Urticaires, Eczémas, Prurigos, etc.
- 4° *Action dérivative intestinale* : Dans l'Hypertension artérielle, les Néphrites chroniques, les Migraines, les Céphalées.

Posologie. — 1 à 3 cuillerées à café de granulé au réveil dans une infusion chaude ou dans eau de Vichy pendant 10 jours.

À renouveler après 5 jours de repos.

Prix : 15 francs.

Laboratoire

71, avenue République — CHAMPIGNY (Seine).

AIGUE D'OR

Analga du D^r Redier.

Composition :

| | | |
|-------------------------------|-------|-------------------------------|
| Diméthyle amido-antipyrine... | 0,25 | } pour un verre à liqueur. |
| Salicylate de pyramidon..... | 0,25 | |
| Héroïne | 0,001 | |
| Plantes sédatives. | Q. S. | |

Propriétés. — Action thérapeutique du Diméthyle amido-antipyrine et du Salicylate de Pyramidon *considérablement renforcée* par la dose minime d'Héroïne. L'action tonique de l'alcool corrige l'action déprimante des calmants.

Indications. — Névralgies, Migraines, *Dysménorrhées*, *Tranchées utérines*, Douleurs dentaires, Coliques néphrétiques, Gripes.

Posologie. — 1 verre à liqueur renouvelé, si nécessaire, 1/2 heure après.

Efficacité plus grande dans une tasse d'infusion.

Enfants : 1/2 ou 1/4 de dose, selon âge.

Sans contre-indication.

Présentation. — Liqueur agréable.

Le flacon : 13 fr. 50.

Laboratoire de L'AIGUE D'OR

53 bis, boulevard de la Liberté — LILLE (Nord).

AIROGLYCE

Composition. — Préparation bismuthée (oxyiodogallate de bismuth spécialement porphyrisée).

Mode d'action. — Réalise le pansement et l'antiseptie de la muqueuse urétrale.

Indications. — Blennorragie aiguë (période du déclin). Blennorragie chronique, en association avec dilatation, massages, etc.

Mode d'emploi. — Après avoir uriné, agiter le flacon et injecter, à l'aide d'une seringue urétrale, 5 cc. de liquide, conserver l'injection 2 minutes, puis progressivement jusqu'à 5 minutes. Eviter d'uriner autant que possible après l'injection.

Injection 20 francs

Ovules: Agent thérapeutique de choix dans le traitement des métrites, vaginites, ulcérations du col, etc.

Suppositoires : Prostatites. Hémorroïdes.

Prix : Ovules : 18 francs. — Supposit. : 15 francs.

Laboratoires PIALOUX

55, rue de Chabrol — PARIS (X^e).

ALBUOL LEISYN

Formuler : 1 flacon ALBUOL LEISYN liqueur ; 1 boîte ALBUOL LEISYN poudre.

Mode d'emploi. — 1 à 2 cuillerées à café, soit 3 à 6 cuillerées à café par jour d'ALBUOL liqueur, une heure avant ou une heure après les repas, dans une tasse de tisane faite avec une cuillerée à soupe ras bord d'ALBUOL poudre.

Indications. — Toutes albuminuries et cécité albuminurique.

Action. — Fait rapidement tomber le taux de l'albumine urinaire. L'effet du médicament se prolonge longtemps après la cessation du traitement.

Composition. — Réducteurs électrolytiques solubles associés aux toni-cardiaques.

ALBUOL liqueur : Maïs, Muguet, Gui, Tannates suractivés par procédé spécial.

ALBUOL poudre : Composés tanniques complexes préparés par procédé au Sélénium et activés par procédé électrique EVOO.

Aucune contre-indication. Innocuité absolue.

Les Laboratoires LEISYN

1 bis, rue Molitor — PARIS (XVI^e).

Téléphone : Auteuil 14-73. — C. C. postaux : PARIS 1075-98.

Adresse télégraphique : LABOLEISYN-PARIS.

ALBUPLAST VIGIER

Composition :

Sparadrap adhésif caoutchouté à l'oxyde de zinc.

Avantages :

Suppression des bandes de pansement. — Préparé avec des substances adhésives de première qualité. — Ne se décolle jamais. — Supporté par les épidermes les plus délicats. — Se conserve très longtemps — Variétés sur toile à voile et tissu extensible.

Indications :

Contention des pansements. — Traitement des dermatoses (urticaire, érythème polymorphe, ichtyose, furonculose).

Laboratoires VIGIER et Cie

Jean HUERRE et Cie

9, rue de la Gare — LEVALLOIS-PERRET.

ALCACYL WANDER

Composition. — Acétylsalicylate de chaux 0,5, alucol 0,4 pour un comprimé.

Sans action sur l'estomac, le cœur et les reins.

Forme. — Comprimés.

Indications. — Analgésique, antithermique, anti-infectieux, sudorifique.

Est utilisé dans : rhumatismes, névralgies, migraines, sciaticques, lumbagos, courbatures, gripes, maux de tête, de gorge et de dents.

Doses. — *Adultes* : 1 à 2 comprimés désagregés dans un peu d'eau sucrée, avaler ensuite un demi-verre d'eau pour activer l'effet.

A répéter si nécessaire 3 à 4 fois dans les 24 heures.

Enfants : 1/4 ou 1/2 comprimé, suivant l'âge, 3 à 4 fois par jour.

La boîte : 7 fr. 50.

P. BASTIEN, pharmacien.
CHAMPIGNY-SUR-MARNE.

ALCALINOSE

Composition. — Citrate, Phosphate, Sulfate de sodium desséchés et chimiquement purs, Bicarbonate de sodium saturé.

Action. — L'ALCALINOSE fait diminuer le taux de l'acidité gastrique sans le faire disparaître; régularise les sécrétions digestives; excite la motricité de l'estomac et diminue la durée du transit gastrique.

Mode d'emploi. — 1 à 2 cuillerées-mesure avant les repas dans 1/2 verre d'eau, ou 2 à 3 cuillerées mesure le matin à jeun dans 1/2 verre d'eau.

Indications. — Dyspepsies hypersthéniques et maladies de Reichmann, Ulcères digestifs, Sténoses pyloriques, Suites de gastro-entérostomie et de pyloréctomie, Aérophagie et Dilatation gastrique, Gastropathies nerveuses, Entérites et Colites chroniques, Acidose.

Prix : 7 fr. 50.

Laboratoires CORBIERE
27 rue Desrenaudes, — PARIS.
Téléphone : Carnot 78 11.

ALCAMFÉTOL

Composition :

| | |
|--|----------|
| Iodométhylate d'hexaméthylènetétramine (iode réel 45 %) | 0 gr. 10 |
| Camphosulfonate de sodium (camphre soluble), | 0 gr. 20 |
| Glycéryl Gaïacol. | 0 gr. 01 |
| Eau bi-distillée, q. s. pour | 2 cc. |

Avantages thérapeutiques. — 4 médications essentielles : de l'Iode, de l'Urotropine, du Camphre et du Gaïacol.

En une seule formule : *Solution aqueuse, stérilisée, à Ph constant.*

Indications. — Toutes infections chroniques ou aiguës (septicémies). Défaillance circulatoire. Troubles respiratoires. Maladies de la nutrition.

Forme. — Boîte de 10 ampoules de 2 cc. 20 francs au public.

Posologie. — Injections hypodermiques ou intramusculaires indolores. La voie intraveineuse n'est indiquée que pour les cas urgents. Elle n'apparaît pas nécessaire pour les traitements courants.

Adultes : 1 à 3 ampoules de 2 cc. par jour.

Enfants : 1/2 à 1 ampoule de 2 cc. par jour.

L'Alcamfétol étant d'une innocuité absolue, ces doses peuvent être augmentées, dans les cas particulièrement graves, *mais sous la surveillance du médecin.*

Laboratoires DOR

DORANTOWICZ, Pharmacien.

17 bis, avenue Parmentier — PARIS (XI°).

ALEPSAL

Comprimés

Grâce à l'association Phényléthylmalonylurée, belladone et caféïne l'ALEPSAL supprime les crises convulsives et les équivalents, fait disparaître les troubles du caractère sans exercer aucune action défavorable ni sur l'intelligence, ni sur la mémoire. — Toujours bien supporté et sans accoutumance.

3 Dosages : 1° Comprimés à 0 gr. 10 de Phényléthylmalonylurée.

2° Comprimés à 0 gr. 05 de Phényléthylmalonylurée.

3° Comprimés à 0 gr. 015 ou doses fractionnées.

Indications. — (comp. à 0,10) — Epilepsie. — Insomnies rebelles (petits dosages). — Etats anxieux. — Troubles neuro-cardiaques. — Angine de poitrine. — Spasmes cardiaques et vasculaires.

Posologie. 1° Epilepsie Adultes : Débuter par 2 ou 3 comprimés par jour (dosage à 0,10). Se rappeler que les doses initiales doivent être continuées très longtemps sans changements ni interruptions et qu'en cas de diminution dans les doses, on devra procéder très lentement et par paliers successifs. — 2° Etats anxieux. Troubles neuro-cardiaques. Terreurs nocturnes. Quelques comprimés à 0,015 espacés dans la journée. — 3° Enfants, Doses variables selon l'âge.

Bibliographie. — Communication à la Société Médico-Psychologique de Paris (1921). Thèse Dr Labarthe (1926). — Dr Rodiet, Médecin-chef des Asiles (Traitement de l'Epilepsie 1927). Professeur de Pathologie. G. Ferrua de Turin. Précis Clinique de l'Epilepsie (1931).

Prix : 8 et 9 francs.

Laboratoires GENEVRIER

45, rue du Marché à NEUILLY — (SEINE).

ALGANE

Cytoplasma de *Laminaria Flexicaulis* déminéralisé par un procédé spécial qui respecte les principes de cette Algue. C'est l'origine de la partie active de l'huile de foie de morue.

Composition. — L'Algane agit :

- 1° Par son iode lié à la matière organique (2 mgr. par gr.).
- 2° Par ses traces catalytiques d'éléments minéraux (As, Mn, Mg, Fe, etc.).
- 3° Par ses graisses, ses protéines et hydrates de carbone qui en font un puissant suraliment.
- 4° Et surtout par sa haute teneur en vitamines naturelles A et D (sous forme d'algostérine, pigments carotinoïdes, fucoxanthiques et chlorophylliens).

Action. — Celle de l'huile de foie de morue, mais singulièrement exaltée et plus complète, en raison de sa plus grande richesse en vitamines A. Résultats plus constants, le produit étant soumis à un contrôle biologique.

Les deux plus remarquables actions de l'Algane consistent :

- 1° En une augmentation rapide de poids.
- 2° En l'accroissement du pouvoir anti-infectieux de l'organisme.

Présentation :

- 1° Cachets dosés à 1 gr. 25.
- 2° Granulés fondants renfermant 0 gr. 50 de poudre par cuillerée à café.

Posologie. — Chaque cachet correspond à 125 unités de vitamines D et 150 unités de vitamines A. Un cachet représente la quantité de vitamines D d'une cuillerée à soupe d'une bonne huile de foie de morue et la quantité de vitamines A de 3 cuillerées à soupe.

Adultes : 4 cachets par jour au minimum (2 au début de chaque repas).

Enfants : jusqu'à 15 ans, 1 à 2 cachets par jour ou 2 à 6 cuillerées à café de granulés. Ces doses peuvent être augmentées sans inconvénient.

Administration du granulé. — Le granulé peut être absorbé directement comme une friandise : on le croque, puis on l'avale en s'aidant d'une gorgée d'un liquide quelconque. On peut également le dissoudre au préalable dans une petite quantité d'eau ou de lait.

Note. — L'Algane en granulé possède un goût difficilement perceptible. Chez les sujets constipés, le mucilage contenu dans le produit provoque un effet laxatif qui ne peut être que bienfaisant.

Prix de la boîte (cachets ou granulés) : 16 francs.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 994/1 et 2.

Laboratoire de l'ALGANE

G. RENARD, Pharmacien.

145, rue Saussure — PARIS (17°)

ALGATAN

Composition. — Hyposulfi-iodotannate de soude en milieu sulfocalcique fluoré. (Iode entièrement assimilable sans iodisme.)

Formes. — Cachets dosés à 1 gramme.
Comprimés dosés à 0 gr. 50.

Indications thérapeutiques. — *Tuberculose pulmonaire, intestinale et osseuse, Artério-sclérose, Emphysème, Asthme, Catarrhe bronchique, Affections cardio-vasculaires, Rachitisme, Tertiariisme, Déchéance physique.*

Dose et mode d'emploi :

Enfants de 3 à 5 ans : 1/2 cachet ou 1 comprimé.

Enfants de 5 à 10 ans : 1 cachet ou 2 comprimés.

Enfants de 10 à 15 ans : 2 cachets ou 4 comprimés.

Adultes : 2 à 6 cachets ou 4 à 12 comprimés.

Par jour au moment des principaux repas.

Prix : 14 francs.

Laboratoires de L'ANIODOL

3 à 9, rue des Alouettes — NANTERRE (SEINE).

ALGOCRATINE

(Phénylamidoxanthine.)

Présentation. — Cachets de 0 gr. 75 (assimilation plus rapide que la forme Comprimés).

Produit de prescription médicale.

Ne renferme aucun hypnotique.

Indications thérapeutiques. — Migraines, névralgies, sciaticques, grippe, algies cancéreuses. En général, toute douleur d'origine nerveuse. Recommandée particulièrement dans les *règles douloureuses*.

Aucune action hypnotique. Pas d'accoutumance. Elimination extrêmement rapide sans fatigue des reins. Tolérée parfaitement par l'estomac.

Posologie. — Un cachet dès les premiers symptômes de douleurs, un second une heure après si nécessaire.

Trois cachets par 24 heures.

Prix : 7 francs.

LANCOSME

71, avenue Victor-Emmanuel-III — PARIS (VIII^e).

ALGONAL

Traitement des affections rhumatismales, Arthrite, Goutte, Poly-arthrite.

En capsules kératinisées à base de iodure de lithium, Essence de Salicylate de Méthyl pur et désodorisé, Colchicine et Urotropine.

Mode d'emploi :

3 capsules le matin avant le petit déjeuner et 2 le soir avant le dîner.

Prix : 18 francs.

Dépôt général :

Laboratoires UNIS-SPÈS

14, rue Demarquay — PARIS (X^e).

ALGOPHAGINE

Capsules glutinisées contenant 1/10 de milligramme de colchicine dissous dans l'essence de Gaulthéria pure, iodure de lithium et formine.

Indications :

Médication intensive pour le traitement raisonné des Affections rhumatismales de toute nature. Névralgie faciale.

Posologie :

Trois capsules, le matin avant le premier déjeuner et deux le soir avant le dîner, accompagnées d'un verre d'eau bicarbonatée (Vals, Vichy) ou hypominéralisée (Vittel, Evian).

Prix : 20 francs.

Laboratoires UNIS-SPÈS

14, rue Demarquay — PARIS.

ALGOR

| | |
|-----------------------------------|------|
| Analgésine chimiquement pure..... | 0,35 |
| Pyramidon chimiquement pur | 0,35 |
| Stovaine | 0,01 |
| Liqueur de cerises..... | Q.S. |

Par cuillerée à soupe.

Avantages. — Risques d'intoxications (congestion, blocage des reins, dépression du cœur) écartés par la sélection des produits entrant dans sa composition. Ne contient ni opium, ni morphine.

Indications. — Affections rhumatismales. Règles douloureuses. Névralgies faciales. Douleurs tabétiques et cancéreuses. Douleurs d'accouchements. Paludisme. Coliques hépatiques. Dans toutes les Algies.

Posologie :

Adultes : 1 à 3 cuillerées à soupe par 24 heures.

Enfants : De 7 à 10 ans, 1 cuillerée à café.

Au-dessus de 10 ans, 3 cuillerées à café par 24 heures.

Présentation. — Sous forme de liqueur de cerise à titre alcoolique faible (10 degrés).

Le flacon : 15 francs.

Laboratoire de l'ALGOR

V. BIAT

137, Grand'Rue — ROUBAIX

ALGOSEDINE

Calme en 15 minutes toutes les viscéralgies : coliques stomacales, intestinales, hépatiques, utérines. Les spasmes du tube digestif. Dyspepsies hyperchlorhydriques ou nerveuses.

Posologie. — *Adultes :* XXX gouttes 4 fois par jour.

Prix : 12 fr. 50.

Laboratoires P. DORDIN

56-58, Grande-Rue

HARNES (Pas-de-Calais).

ALGOSTÉRINE OLIVIÉRO

Liposoluble d'algues marines pélagiques.

Stérol Chlorophylle d'algues.

Pigments carotinoïdes et fucoxanthiques.

Le foie de Morue intègre l'*algostérine* des algues, c'est à ce principe que l'huile de foie de Morue doit ses propriétés thérapeutiques.

Indications. — L'ALGOSTÉRINE OLIVIÉRO renferme tous les principes utiles à la *croissance* des jeunes enfants. Elle a une action marquée dans la *calcémie* et est indiquée dans toutes les *dystrophies musculaires et osseuses*, dans toutes les *carences* par *avitaminose*, dans les bronchites.

Doses. — II à XVI gouttes, et plus, 2 fois par jour. *Innocuité absolue. Pas d'hypervitaminose. Pas d'ossification trop rapide.*

Prix : 18 francs.

Laboratoire de Biothérapie OLIVIÉRO

BOULOGNE-SUR-SEINE (Paris-Ouest).

Tél. : Molitor 27-06.

ALIBOURINE B. E. A.

Formes :

1° Pommade en tube de 50 grammes environ.

Composition :

Sulfates de zinc et de cuivre chimiquement purs, Camphre, Oxyde de zinc, Essence de Niaouli, Extrait d'Hamamélis et de Millepertuis, Lano-vaseline.

Indications :

Eczémas suintants, Impétigo, Teigne, Plaies, Ulcères variqueux, Erysipèle.

2° Solution concentrée : Flacon de 60 cc.

Composition :

A base de sulfates de cuivre et de zinc purs, donne, diluée dans un litre d'eau, une solution se rapprochant d'une Eau d'Alibour un tiers et chimiquement pure. Ces deux préparations n'irritent jamais.

Prix : 7 francs.

Laboratoires B. E. A

Ch. BEHA, Pharmacien de 1^{re} classe. — Belfort.

ALIMENT TINARDON

Nutrition. — Recalcification. — Reminéralisation.

Forme. — Poudre dosée pour la préparation, soit au lait, soit à l'eau, d'un entremets agréable.

Composition :

| | | | |
|----------------------------------|------|---------------------|------|
| Carbonate de chaux... | 0,30 | Lactose | 2,50 |
| Phosphate de chaux... | 0,20 | Caséine purifiée... | 0,50 |
| Glycéroph. de chaux .. | 0,05 | Arrow-Root..... | 4 " |
| Magnésie | 0,05 | Sucre | 12 " |
| Eléments céréalo-légumineux..... | 5 " | Cacao vanillé | 8,50 |

Pour 2 mesures.

Posologie. — *Enfants* : 1 à 2 mesures par jour.

Adultes : 2, 3 ou 4 mesures par jour.

Indications. — Dégénérescence infantile, Scrofule, Convalescence chez l'enfant et l'adulte.

Prix : 15 francs.

Laboratoire OBERLIN

J. Tinardon, Pharmacien de 1^{re} classe
de la Faculté de Pharmacie de Paris.
17, rue Cadet — PARIS.

ALLERGANTYL MILUC

Modificateur du terrain humoral

SOLUTION INTERNE. — Rate désalbuminée, Bardane stab., Saponaire, Noyer, Berbérís.

Indications thérapeutiques. — Rétablit l'équilibre normal du système endocrino-sympathique : Furonculose, Eczémas, Allergies cutanées, etc.

Mode d'emploi. — *Furonculose* : 3 cuillerées à soupe par jour pendant la première semaine pour diminuer ensuite progressivement.

Dermatoses : 2 cuillerées à dessert par jour pendant 20 jours par mois.

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau, 1/4 d'heure avant les repas.

Prix : 16 francs.

POMMADE. — Noyer, Saponaire.

Traitement externe synergique complétant l'action de l'ALLERGANTYL, solution interne, dans la cure des dermatoses.

Prix : 9 francs.

Laboratoires MILUC

L. RAGOUCY, Pharmacien
37, rue Raspail — IVRY-PARIS.

ALLIOCARDIA

Régulateur de la Tension artérielle. Antiseptique pulmonaire de choix.

Médicament cardiotonique non toxique.

Composition. — Synergie médicamenteuse à 5 éléments constitutifs : Allium sat, Cratægus, Camphora, Eucalyptol, Spartéine).

Le tout en pilules glutinisées, s'absorbant seulement en milieu intestinal et sans action malodorante sur l'haleine.

Indications. — Tous états pathologiques associant coeur et poulmon.

Hypertension solitaire ou associée avec syndrome aortique. Sclérose rénale. Gangrène pulmonaire. Bronchites fétides. Abcès du poulmon. Coqueluche. Asthme. Catarrhe. Emphysème. Dyspnées asthmatiformes. Adjuvant dans les tuberculoses pulmonaires à forme conjective et avec expectoration.

Doses. — 6 à 10 pilules par jour, prises par 3 ou 4, de préférence une heure avant les repas.

Enfants : au-dessus de 5 ans, demi-dose.

Prix : 16 francs.

Peut être prescrit aux Assurés Sociaux.

Laboratoire BERGER

14, rue des Pyramides. — PARIS

ALLISATINE « SANDOZ »

Composition. — Tous les principes actifs de l'Allium Sativum fixés sur du charbon activé et présentés en dragées, inodores, insipides.

Propriétés. — Stimulant des fonctions gastriques, puissant anti-diarrhéique. Hypotenseur. Tolérance parfaite.

Posologie. — 2 à 4 dragées d'Allisatine, trois fois par jour, à la fin des repas.

Prix

du flacon de 30 dragées : 12 francs.

Produits SANDOZ

20, rue Vernier — PARIS (XVII^e).

ALLOCAÏNE LUMIÈRE

Anesthésie locale, régionale et rachidienne.

Constitution. — (Chlorhydrate de paramino, benzoyl, diéthyl, amino, éthanol).

Les solutions allocaïne-adréraline sont d'une conservation parfaite et rigoureusement inaltérable. Elles présentent des garanties exceptionnelles d'efficacité et d'asepsie.

Propriétés. — Pouvoir anesthésique équivalent à celui de la cocaïne. Toxicité 7 fois moindre. Durée de l'anesthésie nettement supérieure. Nullement irritante pour les tissus, son administration laisse intacts les centres bulbaires. Aucune modification de la nutrition générale et des tissus.

L'anesthésie rachidienne obtenue est caractérisée par l'intégrité qu'elle laisse aux centres nerveux supérieurs (excitabilité réflexe cérébrale, fonctions intellectuelles).

Indications. — Les mêmes que pour la cocaïne. L'Allocaïne Lumière est mise dans le commerce sous la forme d'ampoules prêtes à l'emploi, aux titrages suivants :

Solution A à 1/2 p. 100, pour anesthésie locale 1 a. 25 cc. : 10 francs.
 Solution AA à 1 p. 100, pour anesthésie locale 3 a. 10 cc. : 17 francs.
 Solution B à 2 p. 100, pour anesthésie régionale 6 a. 2 cc. : 12 francs.
 Solution BB à 2 p. 100, pour art dentaire 100 a. à 1 cc. : P. P. M.
 Solution C. à 5 p. 100, pour rachianesthésie 6 a. à 3 cc. : 16 francs.
 Solution J. à 10 p. 100, pour badigeonnage usage externe et divers 5 a. à 2 cc. : 16 francs.

LABORATOIRES LUMIÈRE

45, rue Villon — LYON.

ALLOCHRYSSINE LUMIÈRE

Chrysothérapie par voie intramusculaire.

Traitement de choix des Tuberculoses et des Rhumatismes chroniques infectieux.

Constitution. — Thiopropanol sulfonate double d'or et de sodium.

Propriétés. — Injectée sous la peau ou dans les muscles, s'absorbe facilement ; sa toxicité est très faible.

Cette préparation donne la possibilité d'appliquer la méthode chrysothérapique sans avoir recours à la voie intraveineuse, d'une utilisation toujours délicate et souvent dangereuse, ni sans avoir à redouter les graves accidents si fréquents avec les sels d'or même administrés à doses modérées.

Indications. — Sa parfaite innocuité facilite un emploi large de la chrysothérapie, et la facilité remarquable avec laquelle elle est absorbée permet d'étendre cette méthode, sans arrière-pensée, aux cas bénins où il est normal de ne vouloir faire courir aucun risque au malade. Une indication toute particulière : le rhumatisme chronique infectieux où les résultats dépassent toutes les espérances, Pas de contre-indications formelles, cependant agir avec prudence dans les insuffisances hépatiques profondes, les lésions rénales (albuminurie), les lésions intestinales.

Dans les cas très rares de troubles anaphylactoïdes, la substitution au solvant spécial d'une ampoule EMGE LUMIÈRE en évite le retour.

Présentation. — Boîte contenant deux ampoules pour une préparation extemporanée de la solution : une de 2 cc. d'Allochryssine ; une de 8 cc. de sérum artificiel.

3 dosages : 0 gr. 05, 0 gr. 10, 0 gr. 20.

Prix : 16 francs, 20 francs, 24 francs.

LABORATOIRES LUMIÈRE

45, rue Villon — LYON.

ALLONAL « ROCHE »

ANALGÉSIQUE RENFORCÉ

Action thérapeutique. — L'Allonal Roche est l'isopropylallylbarbiturate de diméthylamino-antipyrine, il représente les propriétés calmantes bien connues de la diméthylamino-antipyrine augmentées des propriétés sédatives et hypnotiques de l'acide isopropylallylbarbiturique ($C^{10} H^{14} O^3 Az^2$).

Indications thérapeutiques. — Douleurs, abcès, névralgies empêchant le sommeil ; insomnies légères ou tenaces associées à des phénomènes douloureux ou infectieux ou causées par le surmenage, la fatigue, la neurasthénie ; agitation, excitation, délires, etc.

Avantages. — L'Allonal Roche ne contient ni opium, ni morphine, ni scopolamine, ni hyoscine, ni aucune substance du tableau B. Il peut être utilisé avec succès dans un grand nombre de cas où l'opium et la morphine sont indiqués. Il n'est pas toxique aux doses thérapeutiques qui peuvent être d'ailleurs largement dépassées ; il ne donne pas lieu à des phénomènes d'accoutumance et il est toujours bien supporté ; il calme la douleur, apaise l'excitation, donne un sommeil calme, physiologique, suivi d'un réveil normal ; il n'a aucune action nocive ni sur le cœur, ni sur les reins, ni sur les poumons.

Comprimés.

Chaque flacon contient 12 comprimés. Chaque compr. = 0,16 isopropylallylbarbiturate de diméthylamino-antipyrine.

Doses et mode d'emploi. — 1 à 3 comprimés par 24 h. et plus selon les cas. Avaler les comprimés sans les croquer, avec un peu d'eau ou de tisane, 1/2 h. av. ou 2 h. après les prises d'aliments.

Enregistré au Laboratoire national de contrôle des médicaments sous le n° 504-5.

Produits

F. HOFFMANN-LA ROCHE et C^{ie}

10, rue Grillon — PARIS (IV^e).

ALLOPHAQUINA

Le cachet analgésique rationnel.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des médicaments sous le n° 223-3.

Allophanate de benzyle 10 cgr.

Diméthylaminoantipyrine 30 —

Poudre de quinquina 10 —

Mécanisme d'action. — L'Allophanate (éther cristallisé, pur et stable) donne, par hydrolyse « in vivo », de l'alcool de benzyle dont les propriétés antispasmodiques sont bien connues et, par dédoublement, de l'urée naissante capable d'entretenir la perméabilité rénale pendant qu'agit, cette fois sans brutalité, la diméthylaminoantipyrine.

Toutes les Algies. — Articulaires, musculaires, nerveuses : 1 à 3 cachets par jour.

La boîte de 10 cachets : Prix : 10 francs.

Laboratoire du Jécol

3, rue Watteau — COURBEVOIE (Seine).

ALOÏNE HOUDÉ

Granules titrés à 4 centigrammes.

Aloïne Houdé

Principe actif cristallisé de l'aloès des Barbades.

Doses et mode d'emploi :

Comme laxatif :

1 à 2 granules le soir au repas.

Comme purgatif :

3 à 4 granules le soir en se couchant.

Laboratoires HOUDÉ

9, rue Dieu — PARIS.

ALOPLASTINE

La première pâte à l'eau spécialisée.

Ne présente pas les inconvénients des pommades à base de corps gras.

Ne tache pas le linge.

Répond à une classique formule de l'Hôpital Saint-Louis.

Indications. — Érythèmes fessiers des nourrissons, érythèmes intertrigo, rougeurs. Eczémas aigus et subaigus, eczémas suintants, coups de soleil, engelures, prévention des escarres, eczématisation des plaies, prurit, etc. Dermites irritables, dermites artificielles, eczémas des blanchisseuses et des laveuses, etc.

Mode d'emploi. — Étendre en couche mince sur la peau. Recouvrir ou non de gaze.

S'enlève à l'eau bouillie ou à l'huile d'amande douce ou de paraffine.

Il existe également une poudre d'Aloplastine.

Prix de vente :

Pâte : 12 francs le tube de 100 gr.

Poudre : 8 francs la grande boîte poudreuse.

Laboratoires Biologiques de l'île de France.

19, Avenue d'Orléans — PARIS (XIV^e).

ALOYSINE

Pilules à base de suc d'ail.

Sans saveur, sans odeur, ne communiquant à l'haleine aucune odeur alliagée.

Indications. — Entérites, Hypertension artérielle, Tuberculose, Bronchites chroniques, Catarrhes, Gangrène pulmonaire, Urticaire.

Posologie. — 6 à 8 pilules par jour (dans le traitement de l'hypertension interrompre 48 heures tous les 2 jours).

Pommade Aloysine. — Tuberculoses externes, Plaies suppurées, Dermatoses, etc.

Prix de vente { pilules : 10 fr. la boîte ;
pommade : 7 fr. le tube.

Laboratoire GOUZÈNE,

139, rue de Paris, à PANTIN (Seine).

ALSODINE

Poudre composée de sels alcalins et de lactose.

En faisant dissoudre 1 cuillerée à café de cette poudre dans une tasse à thé d'infusion tiède non sucrée, ce qui représente 125 centimètres cubes de liquide, on obtient une solution de degré cryoscopique $\Delta = 0,38$.

Prescrire cette dose après le repas de midi et du soir, ou au moment des crises douloureuses, chaque fois que les troubles observés pourront être rapportés à une évacuation incomplète ou retardée de l'estomac.

Dyspepsie, hyperchlorhydrie, affections du pyllore, atonie, aérophagie, vomissements de la grossesse.

Prix : 9 francs.

Dépôt O. C. P.

71, rue du Temple — PARIS.

Laboratoires B. O. L.

M. BERGER

29, faubourg Bourgogne — ORLÉANS.

ALUCOL WANDER

(Hydrate d'alumine colloïdal)

Réducteur d'HCl.

Nouvelle thérapeutique gastro-intestinale parce que : l'Alucol n'est pas une formule complexe mais un corps chimiquement défini obtenu selon un procédé spécial.

1° Protection de la muqueuse stomacale par le mucilage colloïdal que forme l'ALUCOL, au contact du suc gastrique hyperacide.

2° Fixation par cette masse mucilagineuse des principes fermentescibles et entéro-toxines.

Formes. — Cachets, comprimés, paquets poudre, granulés, cachet Belladonés.

Les paquets (dose spéciale 3 gr., pour pansement gastrique et traitement des états aigus).

Doses. — Un à deux cachets ou comprimés une heure avant et une ou deux heures après chacun des principaux repas. Le contenu d'un paquet délayé dans un peu d'eau sucrée, le matin à jeun, une demi-heure avant le petit déjeuner et environ deux heures après le repas, midi et soir.

Le traitement peut être renforcé sans inconvénient suivant avis du médecin.

La boîte cachets : 8 fr. La boîte comprimés : 12 fr. La boîte paquets : 12 fr.

La boîte granulés : 15 fr. La boîte cachets Alucol belladoné : 10 fr.

P. BASTIEN, pharmacien

CHAMPIGNY (Seine)

ALUNOZAL

Salicylate aluminique basique.

Associe aux effets antiseptiques de l'acide salicylique l'action astringente et absorbante de l'alumine sous état gélatineux. Tolérance parfaite.

Indications :

Diarrhées aiguës et chroniques de toute nature, Diarrhée des nourrissons.

Posologie :

Adultes : 2 à 10 comprimés ou 2 à 10 cuillerées à café de granulés par 24 heures.

Enfants : 1 à 4 cuillerées à café de granulés par 24 heures.

Société Parisienne d'Expansion Chimique
« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

ALZINE

Composition. — Dionine, Lobélie, Belladone, Polygala, Iodure de Sodium, 0,15 par pilule.

Forme. — Pilules enrobées au gluten F1/ de 40.

Indications. — Asthme, Emphysème, Spasmes bronchiques, Catarrhe.

Doses. — Cas aigus : 4 à 6 pilules par jour.
Après la crise : 2 à 3 pilules par jour.

Dose préventive. — 1 à 2 pilules par jour pendant 10 jours, cesser 10 jours et reprendre.

Prix : 17 francs.

Laboratoires L. BOIZE et G. ALLIOT
9, avenue Jean-Jaurès — LYON

AMBORHINOL

Double ampoule (compte-gouttes) nasale à l'Ephédrine et à l'argent colloïdal chimique en solutions séparées. Médication plus spécialement réservée aux enfants.

Décongestif et calmant, sans contre-coup dilatateur, par la sol. d'Ephédrine végétale à 1 p. 100.

Bactéricide puissant par la sol. d'argent colloïdal albuminée à 1 p. 100.

Les deux médicaments faciles à employer par instillations nasales successives.

Indications. — Inflammations et infections nasopharyngiennes, adénoidites, otites, grippe, rhino-bronchites, asthme infantile et de l'adulte, coryza spasmodique.

Mode d'emploi. — Instiller 2 à 3 fois par jour dans chaque narine IV à V gouttes de la solution I (Ephédrine), et quelques minutes après IV à V gouttes de la solution 2 (ag. colloïdal).

Prix : 22 francs.

Laboratoires A. REGAGNON et C^o

276, rue Lecourbe — PARIS (XV^e).

Tél. Vaugirard 26-30.

AMIBIASINE

Extrait de *Garcinia* composé.

Fournisseur des Ministères des Colonies et de la Guerre.
Non toxique. Sans contre-indication.

Présentation :

Forme liquide : Solution brune stabilisée, de saveur amère, en flacon de 60 cc. (12 cuillerées à café titrées à 0 gr. 10 de principe actif par cuillerée).

Forme comprimés : comprimés dragéifiés titrés à 0 gr. 05 de principe actif, en étui de 2 tubes : 40 comprimés.

Propriétés. — Désinfectant intestinal et anti-parasitaire puissant, anti-diarrhéique énergique sans action constipante, calmant des douleurs abdominales et du ténésme sans opiacés. Cicatrise la muqueuse intestinale et rétablit l'intégrité fonctionnelle du foie.

Indications. — Toutes parasitoses intestinales : Amibe, *Lambia*, *Trichomonas*, *Schistosomum Mansoni*, *Ankylostomes*, Dysenteries et diarrhées de toutes natures et origines, aiguës et chroniques. Diarrhée symptomatique des tuberculeux, des appendicites chroniques des typhoïdes, Hémorragies intestinales, *Melœna*, Entérites chroniques, muco-membraneuses, entéro-colites, Fermentations intestinales, fétidité des selles, Colibacillose, eczéma.

Diarrhées infantiles (voir BIOENTÉRISE).

Posologie. — En faisant prendre l'AMIBIASINE dans de l'eau sucrée ou, mieux, du café noir sucré, on lui enlève toute amertume. Les comprimés doivent être avalés avec un peu d'eau sans être croqués.

Formes aiguës : 6 à 9 cuillerées à café ou 8 à 12 comprimés par jour.

Formes chroniques : 3 à 6 cuillerées à café ou 4 à 8 comprimés par jour.

Administrier le médicament à cette dose et dès amendement des symptômes ramener les doses à 3 cuillerées à café ou 4 comprimés par jour. Pendant une huitaine de jours.

Cure d'entretien : 2 cuillerées ou 3 comprimés par jour, 10 jours par mois pendant 1 à 3 mois.

Régime habituel des entéritiques en notant de s'abstenir du lait, des œufs, du bouillon de légumes. Boisson : thé léger ou eau sucrée.

Diarrhée infantile. — Formule AMIBIASINE BB : 1 à 3 cuillerées à café par jour jusqu'à disparition du syndrome diarrhée.

Prix du flacon :

Solution : 16 francs. — *Comprimés* : 12 francs.

Laboratoire de l'AMIBIASINE

69, rue de Wattignies — PARIS.

AMIDAL

Amidon paraffiné. — Ferments lactiques.

Forme. — Poudre, comprimés, cachets, dragées.

Indications. — Fermentations intestinales, constipation, entérite muco-membraneuse, selles fétides, diarrhées, dysenterie, entérites symptomatiques des maladies aiguës, choléra infantile, entérite tuberculeuse, putréfactions intestinales, artério-sclérose, appendicite chronique.

Mode d'emploi. — Deux à 3 cuillerées à café ou 6 à 8 comprimés, cachets ou dragées par jour.

Prix au public :

La boîte de Poudre : 12 francs.

(Boîte aluminium).

La boîte, Comprimés, Cachets : 16 francs.

Le flacon de Dragées : 15 francs.

Le tube de Comprimés : 8 francs.

Laboratoire AMIDO

A. BEAUGONIN, pharmacien

4, place des Vosges — PARIS (IV^e).

AMINOLÉINE

Composition. — Butelline, adrénaline, essence de niaouli camphre, baume du Pérou, borate de soude, benzoate de soude, analgésine, vaseline, huile de vaseline.

Propriétés. — Antiseptique, analgésique, vaso-constrictive et décongestive.

Indications. — Toutes affections des voies respiratoires supérieures : Coryza, Sinusite, Laryngite, Pharyngite, Rhino-pharyngite, et toutes infections et inflammations du carrefour rhino-pharyngien.

Présentation et prix. — Un tube : 12 francs.

Deux dosages : *Adultes* et *Enfants*.

Posologie et mode d'emploi. — *Adultes et enfants* : matin, midi et soir, placer gros comme un pois d'AMINOLÉINE à l'entrée de l'orifice narinaire et aspirer fortement en obturant l'autre narine. Pratiquer la même opération sur l'autre côté.

**Laboratoires de Thérapeutique
oto-rhino-laryngologique.**

72, rue de Bagneux — MONTROUGE (Seine).

Tél. : Alésia 02-41.

AMINO-SEL BYLA

(En flacons-salières.)

Composition. — Renferme des corps chimiquement définis, *extraits des féculents et des fruits* : glutamates et tartrates alcalins.

Propriétés. — *Condiment haulement sapide*, absolument inoffensif, de conservation indéfinie. Communique aux aliments *la véritable saveur* du SEL, en même temps que l'arome de la viande.

Indications. — Tous régimes achlorurés et déchlorurés, albuminurie, affections circulatoires, hépatiques, néphrites aiguës, scarlatine, etc.

Mode d'emploi. — Saupoudrer les aliments avant de les consommer, au goût de chaque malade (ne jamais faire cuire avec les aliments).

Prix : 8 francs.

Les Établissements BYLA

26, avenue de l'Observatoire, PARIS.

AMIPHÈNE CARRON

Le plus puissant antiseptique intestinal.

Nouvel Antidiarrhélique iodé.

Présenté en cachets de 25 centigrammes de : Dioxyphène iodo-sulfonate de potasse C₆ H₄ O₅ SKI + 3 aq.

Création du Laboratoire Carron, l'*Amiphène* contient 31 p. 100 de son poids en iode dissimulé et possède les qualités suivantes :

- 1° *Ne fatigue pas l'estomac*, parce que inattaquable par le suc gastrique.
- 2° *Toxicité nulle. Pas d'iodisme.* Chez l'animal, le chat supporte par kilo et sans aucun trouble *per os* 5 grammes d'Amiphène ; en injection sous-cutanée : 2 gr. 50. Tolérance absolue chez l'homme avec de hautes doses et un traitement prolongé (observations multiples).
- 3° *Antisepsie intestinale parfaite.* Combat les fermentations et les putréfactions intestinales (nombreuses analyses coprologiques).
- 4° *Rapidité de l'action curative.* Remarquable.

Indications. — Toutes les diarrhées quelle qu'en soit l'étiologie, aiguës ou chroniques, Diarrhées banales, Fermentations ou putréfactions intestinales, Entérocrites muco-membraneuses, Diarrhées tuberculeuses, Diarrhées colibacillaires, Diarrhées des pays chauds, suites de Dysenterie.

Mode d'emploi et posologie. — 2 à 8 cachets par jour à prendre au début de chaque repas.
Alcaliniser l'intestin dans le cas d'acidité pathologique.

Boîte de 12 cachets : 20 francs.

(C. R. Académie de médecine, 19 novembre 1929 ;
Société de gastro-entérologie, décembre 1929 ;
Société de pathologie exotique, décembre 1929 ;
Société de pathologie exotique, janvier 1931.)

Echantillons et littérature sur demande aux

Laboratoires CARRON

69, rue de Saint-Cloud — CLAMART (Seine).

AMPHOSTHÈNE

Composition. — Tartrate d'Eséridine, Intrait de Valériane, *Intrait* de Ballote stab., Intrait de Gui.

Formes. — Ampoules et dragées.

Mode d'action. — Activant du vague et frénateur de l'hyperexcitabilité du Sympathique.

Indications. — Troubles nerveux vago-sympathiques, États psychonévrosiques. Eréthisme cardio-vasculaire, Syndrome solaire, Toux spasmodiques, Trachéites spasmodiques et saisonnières, Asthme, Rhume des foins.

Mode d'emploi. — Sympathicotonie pure : 1 à 2 ampoules par jour.

Prix : 25 francs.

Dystonie associée et toux spasmodique : 1 à 2 dragées avant chaque repas.

Prix : 22 fr. 50.

Laboratoires des Produits VELY
132, avenue Victor-Hugo — PARIS (XVI^e).

AMPHO-TABLETTES RONCHÈSE

Comprimés à base d'Ampho-vaccin rhino-pharyngien.

Composition. — Chaque comprimé de 0 gr. 30 contient le résidu sec de son poids de bouillon-vaccin à base de : *pneumocoques*, *pneumobacilles de Friedlander*, *streptocoques*, *micrococcus catarrhalis*, *coccobacilles de Pfeiffer*, *entérocoques*, *staphylocoques* et 40 millions de chacun de ces germes stérilisés et stabilisés par le brome qui est ensuite neutralisé.

Indications. — Véritable gargarisme sec aux antiviruses immunisant et curatif. — *Traitement des angines, irritations de la gorge*, toutes les infections buccales : *gingivo-stomatites*, *pyorrhée alvéolaire*, *accidents de dents de sagesse*, etc... — Leur rôle prophylactique en période de grippe est des plus importants.

Doses. Mode d'emploi. — La dose moyenne est de 10 à 15 comprimés par jour, à sucer lentement.

Pour les enfants en bas âge, broyer le comprimé dans une cuiller à café et faire sucer la poudre obtenue d'un goût agréable.

Le flacon de 70 comprimés : 14 francs.

Laboratoires des Ampho-Vaccins

A.-D. RONCHÈSE, Docteur en Pharmacie

Laboratoires : 6, rue Rothschild — NICE.

Services Commerciaux : 7, rue Foncet — NICE.

Dépôts à PARIS : 62, rue Charlot.

AMPHOTONYL « LERSAM »

Sédatif spécifique du système vago-sympathique.

Composition :

| | |
|--|-------|
| Phényl-éthyl-malonyl-urée (<i>gardénal</i>)... | 0,02 |
| Extrait de belladone..... | 0,002 |
| Para-acetphénétidine (<i>phénacétine</i>)..... | 0,10 |
| Extrait fluide d'aubépine..... | 0,05 |

pour un comprimé.

Forme pharmaceutique. — Comprimés dragéifiés.

Indications thérapeutiques. — Analgésique. Sédatif général. *S'emploie dans tous les états anxieux, névrosiques.* Spasmes douloureux. Palpitations, Insomnies, Dyspepsies nerveuses, Asthme, Troubles endocriniens, névralgies, etc.

Action très efficace. Aucune contre-indication.

Doses. — 2 à 6 comprimés ou plus par jour, entre les repas.

Prix : Le tube de 40 comprimés : 16 fr. (Admis aux A. S.).

Échantillons, littérature :

Laboratoires LERSAM

92, boulevard Murat. — PARIS (XVI°).

AMPHO-VACCINS RONCHÈSE

Lysat bactérien, ou filtrats de cultures, et bactéries entières.

Vaccins injectables : anti-infectieux, anti-staphylococcique, intestinal, pulmonaire, urinaire.

Vaccins à ingérer : amphi-quintivaccin (contre la coqueluche), anti-infectieux, anti-staphylococcique, antityphoïdique T. A. B. (curatif), intestinal, pulmonaire, urinaire.

Vaccins pansements : antipyogène, rhinopharyngien. *Pyo-amphogel* (gelée molle à base d'Ampho-Vaccin pansement antipyogène). *Ampho-Tablettes* (comprimés à base d'ampho-vaccin rhino-pharyngien).

Composition, avantages, Indications, posologie

Voir page 282, **Ampho-Tablettes.**

— 1604, **Vaccins Ronchèse.**

— 1275, **Pyo-Amphogel.**

AMPOLASES

Composition. — Extraits totaux ovariens, orchitiques, rate et foie, préparés à froid et maintenus en suspension isotonique avec toutes leurs propriétés physiologiques. Ampolases O, Ampolases G, Ampolases R et Ampolases F. Ampolases Para N.

Indications. — Troubles des fonctions génitales. Dépression.

Doses. — Absorption par voie buccale d'une ou deux ampoules par jour, contenant 20 à 33 0/0 de produit actif.

Durée du traitement : 12 jours au moins par mois.

La boîte de 6 ampoules : 18 francs.

OPOLASES

Composition. — Dragées contenant à l'abri de l'air les différents produits opothérapiques prélevés aseptiquement dès l'abat et desséchés par froid et l'air sec.

Avantages. — Ces produits sont dosés de telle sorte qu'ils permettent aisément les combinaisons individuelles les plus variées.

Principaux produits. — *Opolases* : Ovaires « O », Ovaire et Thyroïdine « O. T. », Thyroïde « T. », Surrénale totale « S. », Ovaïress Surrénales-Hypophyse-Thyroïdine « P. », Testicules-Surrénale-Hypophyse-Cérébrine « P. M. », Mammaire « M. », Hypophyse « H. », G Testiculaires.

Parathyroïde à 1/10 de millig. — Thyroïde à 1/10 de millig. (Ttt).

La boîte : 18 et 16 francs.

Laboratoire E. VERGELOT, 163, rue de Flandre — PARIS (XIX^e).

Enregistré au Laboratoire nat. des médic. sous les n^{os} 997-1 à 997-15.

AMPOULES BOISSY

d'Iodure de potassium

Pour injections hypodermiques.

Formule. — Ampoules de 2 cc. contenant :

| | |
|-------------------------|-----------|
| KI pur stabilisé | 0 gr. 10 |
| Iodure de codéine | 0 gr. 001 |

En solution aqueuse.

Indications. — Médication extrêmement active des *accidents rhumatismaux*, en particulier : *rhumatismes articulaires et déformants, névrites, sciaticques*. Amélioration très rapide dès la 3^e ou 4^e injection, suivie d'une guérison durable. Résultats remarquables contre les accidents de la *ménopause*, et toutes applications classiques des iodures.

Propriétés thérapeutiques. — Injections indolores (grâce à l'iodure de codéine) ou peu douloureuses, toujours bien supportées. Diffusion immédiate sans aucun accident d'iodisme.

Mode d'emploi. — 1 ampoule par jour, en injection sous-cutanée profonde (ou intramusculaire).

Prix : 18 francs la boîte de 10 ampoules.

Laboratoires BOISSY

15, rue Belgrand — PARIS (XX^e).

AMPOULES BOISSY

pour inhalations.

AMPOULES BOISSY DE NITRITE D'AMYLE.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 160-1

Indications. — *Angines de poitrine, Hémoptysies, Syncopes, Crises gastriques du Tabès, Mal de mer, Migraines, etc.*

AMPOULES BOISSY D'IODURE D'ÉTHYLE.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 160-4

Indications. — *Asthme, Emphysème, Coqueluche, Dyspnées de toute nature.*

Mode d'emploi. — Chaque ampoule est renfermée dans un étui en papier absorbant, qu'il ne faut pas retirer. Briser les deux pointes de l'ampoule en pliant l'étui vers les deux bouts et respirer le liquide qui s'évapore, en plaçant l'étui dans le creux de la main.

Prix : 15 fr. la boîte de 12 ampoules.

Établissements SOUDAN

48, rue d'Alésia — PARIS (XIV°)

AMPOULES DE PANTOPON

« ROCHE »

(Opium total injectable.)

1 amp. de 1 cc. — 0,02 ctg. de Pantopon « Roche ».

Doses et mode d'emploi. — *Adultes* : 1 à 3 amp. par 24 heures et plus. *Enfants* : 1/4 à 1/2 amp. par année d'âge et par 24 heures.

Indications thérapeutiques. — Toutes celles de l'opium, de la morphine et de leurs dérivés.

Le PANTOPON « ROCHE » représente tous les alcaloïdes de l'opium sous forme de chlorhydrates solubles et injectables.

- 0,01 ctg. de Pantopon « Roche ».
- 0,50 ctg. de teinture d'opium.
- 0,025 mgr. d'extrait d'opium.
- 0,005 mgr. de morphine.

Boîtes de 3, 6 et 12 ampoules.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le numéro 504-22.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie.

10, rue Crillon — PARIS (IV°).

AMPOULES DE SPASMALGINE « ROCHE »

(Antispasmodique vrai.)

Composition. — Chaque ampoule contient :

Un centigramme Pantopon « Roche ».

Deux centigrammes Papavérine « Roche »,

Un milligramme Atrinal « Roche ».

(Voir page spéciale Spasmalgine « Roche ».)

Indications thérapeutiques. — *Tous les états spasmodiques et notamment coliques hépatiques et néphrétiques, spasmes du larynx, de l'estomac, de l'intestin, coliques, sueurs, diarrhées des tuberculeux, dysménorrhée, angine de poitrine, toux spasmodique, excitation ante et post-opératoire, accouchements difficiles, tous états d'hyperexcitabilité, etc.*

Doses et mode d'emploi. — Dose moyenne : 1 à 2 ampoules par jour. Dose forte : 2 à 4 ampoules par jour (par voies hypodermique et intramusculaire).

Enregistré au Laboratoire national de contrôle des médicaments sous le n° 504-37.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et C^{ie}
10, rue Crillon — PARIS (IV^e).

AMPOULES NÉVROSTHÉNIQUES DAUSSE

Administration indolore de la Strychnine par voie sous-cutanée, en association avec divers reconstituants et toninervins.

Indications. — Asthénie, neurasthénie, surmenage physique et intellectuel, dépression nerveuse, adynamie.

I. — Névrosthéniques simples.

La dose de strychnine est constante : 1, 2, 3, ou 4 milligr. par ampoule, selon la demande. Le type en est la série suivante :

Série A : { Cacodylate de soude 0 gr. 05 par cc.
Strychnine (Sulfate) 1, 2, 3 ou 4 milligr.,
suivant la demande.

II. — Névrosthéniques progressives.

Administration de la strychnine à doses progressivement croissantes. Chaque série comprend 24 ampoules et renferme 16 dosages de strychnine allant de 1 à 10 mill. Le type en est la formule suivante :

Série A : { Cacodylate de soude 0 gr. 05 par cc.
Sulfate de strychnine.

Prix : 20 francs.

Laboratoires DAUSSE
4, rue Aubriot — PARIS (IV^e)

AMPOULES REIPAR

Composition. — Acide salicylique d'origine végétale et stabilisé par des procédés spéciaux.

Indications. — Tous les rhumatismes vrais, toutes les algies rhumatismales, Sciaticques.

Action. — Curative certaine, sédative très rapide.

Mode d'emploi. — En injections sous-cutanées, suivant les indications de la notice.

Prix : 15 fr. la boîte de 10 ampoules de 2 cc.

Echantillon gratuit à réception d'une simple carte de visite adressée au

Laboratoire du REIPAR

LUCQUY — (Ardennes).

AMUNINE

Vitamine A.

Composition. — Solution huileuse de *Vitamine A* de croissance et anti-infectieuse concentrée et physiologiquement titrée en unités (1 cc = 1.500 unités Javillier). Chocolatés d'AMUNINE titrés à 1.800 unités J

Propriétés thérapeutiques. — L'Amunine a pour effet de compléter les rations alimentaires, toujours déficientes en Vitamine A.

Indications. — L'Amunine est indiquée : chez l'enfant, dans tous les cas où l'on constate une *insuffisance du développement*, un *arrêt de la croissance*, ou les *irrégularités dans la courbe du poids*. — Chez l'adulte, dans les *diarrhées*, la *fatigue générale*, l'*amaigrissement*, la *perte de l'appétit*, et en général, pour mettre un organisme affaibli à l'abri des infections. — Elle est également indiquée dans la *grossesse*.

Prix : 18 francs.

Posologie. — En flacon de 24 cc., solution dans l'huile d'olive. — Jusqu'à un an : XX gouttes ; de 1 à 10 ans : XL gouttes. — *Adultes et adolescents* : LX gouttes par jour, à mélanger à l'alimentation ordinaire, et dans du lait tiède pour les tout petits. — Chocolatés : 1 à 4 par jour.

Prix : 20 francs.

Les Établissements BYLA

26, avenue de l'Observatoire — PARIS.

AMYBDINE

Composition. — A base d'acide 7 iodo 8 oxyquino-
léine 5 sulfonique solubilisé par addition d'une
proportion titrée de bicarbonate de sodium,
ainsi solubilisé cet acide contient 27 p. 100 d'iode
environ.

Indications. — Traitement spécifique des dysente-
ries amibiennes et bacillaires.

Traitement de certaines maladies infectieuses des
voies urinaires et biliaires.

Forme :

1° Pilules dosées à 0 gr. 25 (bicarbonate de soude
compris).

En flacon de 25 et 50 pilules.

2° Poudre solubilisée.

En flacon de 10 gr., 25 gr., 50 gr.

Laboratoires du PERQUINOL

J. E. PAGNIEN, Docteur en Pharmacie

22, cité Trévisé — PARIS

Tél. : Provence 54-43.

AMYLODIASTASE THÉPÉNIER

Phosphates, Diastases et Vitamines de croissance
des Céréales germées.

Formes. — Comprimés et Sirop.

Indications thérapeutiques. — Entérite et Dys-
pepsie (salivaire et pancréatique), Tuberculose,
Rachitisme, Palpitations (d'origine digestive).
Maladies par carence, digestion des féculents.

Mode d'emploi. — Deux comprimés ou deux
cuill. à café de sirop 3 fois par jour après les
repas. Préparation des bouillies : Délayer un ou
deux comprimés écrasés d'amylodiastase ou une
cuillerée à café de sirop dans une bouillie ne dé-
passant pas 60°.

Prix : le flacon sirop . 17 fr. 50 ;

La boîte de comprimés : 13 fr. 75.

**Laboratoire des Ferments
du Docteur A. THÉPÉNIER**

10 et 12, rue Clapeyron — PARIS.

R. C. 150.854

ANACAMPHRE

Camphre hydrosoluble indolore.

Constitution. — Solution à 22 p. 100 de camphocarbonate d'amino-éthanol. 1 cc. = 0 gr. 10 de camphre droit.

Avantages. — A. *Sur l'huile camphrée.*

Remplace l'huile camphrée dans toutes ses applications. Action plus rapide et plus régulière. Possibilité d'utiliser la voie intraveineuse dans les cas graves. Facilités d'emploi, en raison de l'absence de tout corps gras (Possibilité d'user d'aiguilles très fines).

B. *Sur les campho-sulfonates.*

Jamais de douleur, meilleure tolérance.

Jamais d'abcès éloignés.

Action plus complète (le dégagement du camphre est plus facile avec la série carbonique qu'avec la série sulfonique).

C. *Sur les succédanés du camphre.*

Ceux-ci ne dégagent pas de camphre. Action moins sûre.

Indications. — Toutes celles de l'huile camphrée : Adynamie, collapsus, shock, défaillances cardiaques, grandes hémorragies, affections cardiaques dépressives, pneumonies, broncho-pneumonies, hémoptysies, etc...

Mode d'emploi. — *Adultes* : Jusqu'à 2 grammes de camphre par 24 heures. *Enfants* : 1 à 2 cgr. par année d'âge.

Injectons intraveineuses. — Fractionner et injecter lentement.

Prix : Boîte 6 amp. de 1 cc. : 8 fr. 75 — Boîte 6 amp. de 2 cc. : 10 fr. 75

Laboratoires ROBERT et CARRIERE

37, rue de Bourgogne — PARIS (VII^e).

ANACIDASE

Poudre absorbante, anti-acide, anti-fermentescible.

Facilite les digestions ;

Décongestionne le foie ;

Désinfecte l'intestin.

Prix au public : 10 francs.

Aux médecins pro-pharmaciens : 5 fr. (même par unité) chez les grossistes.

Par postaux franco gare 4 fr. 50, par minimum de 20 unités demandées au :

Laboratoire MEUNIER

11, boulevard Davout

AUXERRE (Yonne).

Tél. : 5-94.

ANACLASINE RANSON

Antianaphylaxie, Ocytophylaxie, Prophylaxie anticancéreuse.

L'Anaclasine Ranson (άντα — contre, χλασις — choc) est une préparation anti-anaphylactique polyvalente et cytophyllactique.

Forme. — Comprimés et Granulé.

Action. — Elle évite le choc anaphylactique, désensibilise l'organisme, stimule la fonction cellulaire. améliore l'état hépato-biliaire, rétablit l'équilibre sympathique, régularise la tension, entrave l'apparition et l'évolution du cancer.

Composition. — L'Anaclasine comprend, d'une part, de l'hyposulfite de magnésium et des composés halogénés du Magnésium associés à l'Hyposulfite de soude, et d'autre part, de multiples Polypeptides spécifiques (20 peptones différentes).

Indications. — Anaphylaxie alimentaire, états hépatiques, intolérance digestive, déficience hépatique, intoxication alimentaire, migraines, insomnies, vertiges, eczéma, urticaire, maladie de Quincke, asthme, dyspnée, rhume des foins, coryzas spasmodiques, tachycardies, arythmies, arthritisme, tumeurs bénignes, cancer.

Doses journalières. — *Adultes* : 3 à 5 comprimés par jour, 1/2 heure avant les repas, ou 4 à 6 cuillerées à café de granulé.

Enfants : de 1 à 3 comprimés par jour, ou 1 à 2 cuillerées à café de granulé.

Durée du traitement : minimum 15 jours.

Prix : Granulé, 18 francs. — Comprimés : 15 francs,

Laboratoires de l'OPOCALCIUM

A. RANSON, Docteur en Pharmacie.

121, avenue Gambetta — PARIS.

Tél. : Ménil. 62-81, 62-82,

ANALGÉNINE OBERLIN

Deux formes : A, solution. B, cachets.

A. Solution.

Une cuillerée à soupe contient :

| | |
|------------------------------|----------|
| Pyramidon..... | 0 gr. 30 |
| Antipyrine | 0 gr. 30 |
| Bromhydrate de quinine | 0 gr. 10 |
| Caféine | 0 gr. 05 |

Solution agréablement aromatisée au café. A diluer dans une tasse à café d'eau chaude plus ou moins sucrée suivant le goût de chacun.

Prix : 14 fr. 50.

B. Cachets.

Même formule, mais phénacétine au lieu de pyramidon.

Indications. — Migraines, Névralgies, Sciatique, Paludisme.

Prix : 11 francs.

Laboratoire OBERLIN

J. TINARDON, Pharmacien de 1^{re} classe,
de la Faculté de Pharmacie de Paris

17, rue Cadet — PARIS.

ANAPEPTONE VASSAL

Forme et Composition. — Comprimés de Peptones Polyvalentes de viande, de poisson, d'œuf, de lait, de gélatine, de végétaux.

Propriétés thérapeutiques. — Anti-anaphylactique par excellence. Traitement rationnel des migraines, asthme, urticaires, troubles intestinaux.

La boîte : 18 francs.

Échantillon gratuit sur demande.

Établissements Léon DANJOU

LILLE

ANAQUINTINE LESCENE

Composition. — Aldéhydes benzylocinnamiques Thymol Eucalyptol.

Forme. — Liquide rosé pour usage externe entièrement miscible à l'eau (inhalations froides, compresses, gargarismes.)

Indications. — Rhumes, Sinusites, Grippe, Toux nerveuses, Coqueluche, Prophylaxie des contagions, angines.

Mode d'emploi. — *Pure* : pulvérisations ou aspersions dans les pièces sur vêtements, draps, linge, *mouchoirs*.

Inhalations froides sur mouchoir et dans les mains.

Diluée (Toux, coqueluche) : *compresses* sur la gorge et la poitrine. Diluer dans 4 parties d'eau chaude. Recouvrir de coton cardé ou d'une étoffe de laine. Laisser en place toute la nuit.

Gargarisme : angines, adénoïdites, 1/2 cuillerée à café d'Anaquintine plus une cuillerée à café de Borate de Soude dans un verre d'eau, chaude.

Prix : 12 francs sans compresse ; 15 francs avec compresse.

Anaquintine gouttes nasales.
(Voir RHINAQUINTINE.)

Laboratoires LESCENE

PARIS, 58, rue de Vouillé. — LIVAROT (Calvados).
Tél. : Vaugirard 08-19.

ANAURAL

Forme. — Comprimés dragéifiés.

Composition. — Gardénal, rutonal, borotartrate de calcium.

Indications. — Épilepsie essentielle, épilepsie jacksonienne, Prurits.

Doses. — 2 à 3 comprimés par jour.

Prix : 20 francs (20 jours de traitement).

Laboratoires LAMAR

1, place Forbin

AIX-EN-PROVENCE

ANAXERYL

Enregistré au Lab. Nat. de Contrôle
des Médicaments sous le n° 363-25 et 26.

Forme. — Pommade (tube) et savon.

Composition. — Dioxyanthranolsulfonate de sodium, Thioélaïdinosulfonate de sodium, Huile de Bouleau, Résorcine, Baume du Pérou.

Propriétés pharmacodynamiques. — Réducteur, Antiparasitaire, Antiseptique.

Indications. — Toutes dermatoses sèches ou squameuses, Psoriasis, Parakératoses, Affections parasitaires, Mycoses, etc...

Mode d'emploi. — Appliquer l'ANAXERYL en massant légèrement. Enlever l'excès de pommade avec un tampon d'ouate.

Le tube (grand modèle) : 11 francs (en France)

Laboratoires A. BAILLY

15, rue de Rome — PARIS (VIII^e)

ANDROCALCION

Forme H

Composition. — Association de Calcium, de Magnésium, de Phosphore, combinée à la Théobromine, à l'Iodaseptine et à l'Extrait orchitique.

Indications. — Accidents de la Ménopause masculine, *Préventif* des troubles de la Cinquantaine, *Traitement* de ses accidents.

Propriétés. — Agit à la fois sur le système nerveux sympathique, sur l'état général, sur la tension artérielle, sur les fonctions cardiaques. Par son extrait orchitique, apporte à l'organisme le stimulant qui lui manque.

Préparation. Doses. Quatre dragées à prendre trois fois par jour (soit 12 par 24 heures) douze jours par mois.

Forme E

Composition. — Lactate de Calcium, Glycérophosphate de Magnésium, Iodaseptine, *Lobe antérieur d'hypophyse*. Extrait orchitique.

Indications. — Accidents de la Puberté masculine : troubles de croissance et de développement chez l'adolescent.

Présentations et Doses. — Dragées à avaler sans croquer. Prendre 3 fois par jour 3 à 4 dragées par 24 heures, 12 jours par mois.

Prix : 22 francs.

Laboratoires CORTIAL

7, rue de l'Armorique — PARIS.

ANDROSTHÉNOL

Opothérapie sthénique masculine.

Complexe buvable d'extrait orchitique et d'extrait thymique.

Indications :

Chez l'enfant : retards de croissance, troubles de la puberté, syndrome adiposo-génital, cryptorchidie, intelligence tardive.

Chez l'adulte : asthénie intellectuelle, musculaire ou génitale ; sénilité précoce.

Posologie :

Enfants : 1 ampoule par jour.

Adultes : 1 à 2 ampoules par jour, dans un peu d'eau, loin des repas ou à jeun de préférence.

Présentation :

Boîte de 10 ampoules buvables : 24 francs.

Laboratoires du Docteur DEBAT

60, rue de Monceau — PARIS (VIII^e).

ANDROSTINE CIBA

Hormone orchitique issue de la lignée spermatogénétique.

Action physiologique. — *Chez la femme* : Equilibrante de la sécrétion ovarienne et du système nerveux. (peut se formuler en association avec Agomensine ou Sistomensine suivant le cas). — *Chez l'homme* : Activateur de la spermatogenèse. — *Dans les deux sexes* : Active le métabolisme basal, la combustion des graisses et des sucres.

Indications. — *Chez la femme* : Troubles de la ménopause et de la puberté. Anxiété génitale, érotomanie, onanisme. Troubles liés à la continence. Aménorrhée rebelle. *Chez l'homme* : Infantilisme, impuissance. *Dans les deux sexes* : Obésité, engelures, acrocyanose, diabète. Comprimés, ampoules.

Doses. — 2 à 6 comprimés par jour, 1 ampoule par jour ou tous les 2 jours.

Le flacon de 40 comprimés : 15 francs.

La boîte de 4 ampoules : 20 —

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND

109-113, Boulevard de la Part-Dieu — LYON

ANÉGRINE

Composition :

Acide quinoléfique carbonique, associé à l'Arbutine, à la phénolactine et au cascara.

Action :

Élimination rapide de l'acide urique. — Augmentation du pouvoir de sécrétion et d'excrétion du rein. — Excitation de la fonction cholagogue du foie.

Indications :

Goutte. — Rhumatisme articulaire aigu et chronique. — Sciatique. — Lumbago, etc.

Mode d'emploi :

Cas aigus, 6 à 8 comprimés ou cachets par jour, en 2 ou 3 fois, dans un peu d'eau, pendant 3 ou 4 jours, diminuer progressivement les doses jusqu'à 4 comprimés ou cachets par jour. — Cas chroniques : 3 à 4 comprimés ou cachets par jour, pendant 8 à 15 jours. Cesser 8 jours et reprendre.

Prendre les comprimés ou cachets au commencement des repas avec les premiers aliments.

Prix : Comprimés : 16 fr. 95. — Cachets : 18 fr. 10.

Laboratoires RIVIER

26 et 28, r. Saint-Claude — PARIS. Tél. : Archives 01-01.

ANEO-LEISYN

Formuler : 1 boîte 15 ampoules **ANEO LEISYN.**

Présentation. — Ampoules de 4/5 cc. environ.

Technique. — Injecter chaque jour 1 ampoule entière hypodermiquement. Après les 20 ou 25 premières injections, on peut adopter la voie intramusculaire. Pour les tumeurs visibles ou que l'on peut atteindre facilement, telles que la prostate, injecter de préférence en plein dans la tumeur.

La dose de 1 ampoule par jour (dimanches et fêtes compris) est un minimum au-dessous duquel on ne doit jamais tomber. On peut injecter jusqu'à 4 ampoules par jour, sans aucun inconvénient, dans les cas graves.

Indications. — Cancers, Cancroïdes, Carcinomes, Epithéliomas, Epulis, états pré-cancéreux, Néoformations, Sarcomes, Tumeurs malignes, etc... Anti-récidivant puissant après intervention chirurgicale.

Action. — Médication modifcatrice anti-proliférante, régulatrice de l'équilibre cellulaire. Agit avec une extrême rapidité. Amélioration fréquente en quelques semaines, souvent même en quelques jours, de l'état local et général. Nettoyage rapide des lésions. Cicatrisation des ulcérations. Assèchement des suppurations. Suppression progressive de la fétidité. Modification des territoires cancéreux et de leur voisinage. La plupart du temps, évolution nette vers la guérison.

Dans la généralité des cas, diminution rapide et suppression de la douleur.

Composition. — Acide acétique, Acide citrique, Acide phosphorique, Alumine, Albumine, Chaux, Chlore, Fer (oxydé et préparé par procédé spécial), Potasse, Soude, Essence antiseptique, formant un liquide vecteur préparé par procédé spécial au Sodium et gaz acétylène à hautes températures et à très hautes pressions, et activé électriquement par procédé EVOO.

Aucune toxicité. Innocuité absolue. Aucun inconvénient. Pas de contre-indication.

Échantillonnage. — Afin de faciliter l'expérimentation nous consentons à céder à chaque médecin, d'après nos disponibilités, une seule boîte de 15 ampoules d'ANEO LEISYN, force D, au prix de 50 francs (52 fr. 50 contre remboursement). Ce prix de 50 francs, qui ne représente qu'une partie de notre prix coûtant, ne peut être accordé qu'une seule fois et ne peut être utilisé par un médecin ayant déjà été échantillonné en ANEO LEISYN.

Les Laboratoires LEISYN

1 bis, rue Molitor — PARIS (XVI^e).

Téléphone : Auteuil 14-73 C. C. postaux : PARIS 1075-98.

Adresse télégraphique : LABOLEISYN-PARIS.

ANEXOL

Antiseptique chloré, parfumé, non irritant.

Formes. — Double boîte de 80 comprimés.

Boîte de 40 —

Principe actif. — Sel sod. acid. sulfam.
Toluène monoch. (chloramine T.)

Doses. — Pour 1 litre d'eau chaude :

Stérilisation de l'eau 1 comprimé.

Gargarismes 1 à 2 comprimés.

Urologie et gynécologie.. 2 à 4 —

Pansement des plaies ... 4 à 6 —

La dissolution des comprimés d'Anexol se fait immédiatement, même à froid.

Prix : 14 fr. la double boîte. La boîte : 8 fr.

LABORATOIRES DROUET ET PLET

RUEIL-MALMAISON (S.-et-O.).

ANGIOLYMPHE DU Dr ROUS

Prétuberculose — Tuberculose.

Dans toutes ses manifestations : Pulmonaire, Ganglionnaire, Osseuse, Péritonéale, Rénale, Intestinale.

Indications :

Dans les formes pulmonaires.

DIMINUTION et **DISPARITION** de la Dyspnée, de la Toux, de l'Expectoration, des Sueurs, de la Fièvre et de tous les Symptômes.

AUGMENTATION de l'appétit, du poids, des forces, du sommeil, amélioration rapide de l'état général.

DIMINUTION, DEGENERESCENCE et **DISPARITION** des BACILLES DE KOCH et autres micro-organismes pathogènes.

Dans les formes ganglionnaires, osseuses, rénales, etc.

Amélioration rapide de tous les symptômes. Une boîte suffit d'ordinaire pour donner un commencement d'amélioration sensible.

Posologie. — De 2 à 5 cc. en une injection dans la fesse, faite quotidiennement, par série de 8 à 12, et reprise après 10 à 12 jours d'interruption.

Prix : 30 francs.

Laboratoire de l'ANGIOLYMPHE

4 bis, rue Hébert — COURBEVOIE.

MORO, ph. de 1^{re} cl., 15, av. de la Défense, Puteaux.

ANGIOSEDINE

Comprimés.

Propriétés thérapeutiques. — Antispasmodique, sédatif du système nerveux.

Formule. — Ext. mou de passiflore, de crataegus, de jusquiame, gardénal, nitrite de soude, extrait de muguet, de gui, d'hamamélis, marron d'Inde, d'hydrastis, hypophyse et silicate de soude.

Forme. — Comprimés dragéifiés de 0,50.

Posologie. — 2 à 6 comprimés par jour.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 614-1.

Prix : 20 francs.

Pharmacie M. CORTOT

36, rue des Archives — PARIS (IV^e).

ANGIOXYL

Nature. — Extrait pancréatique hypotenseur à action trophique sur les vaisseaux, titré physiologiquement.

Indications. — Angine de poitrine, Hypertension artérielle, artériosclérose, artérites de toute nature. Ulcères gastriques, ulcères variqueux. Maladie de Basedow, Anxiétés. Troubles de la Ménopause.

Formes. — 1° Angioxyl-Ampoules, en boîtes de 10 ampoules ; 2° Angioxyl-Sirop, en flacons de 150 cc. environ.

Doses. — De 1 à 3 ampoules par jour en injection intramusculaire pendant 18 jours.

Ou 3 à 4 cuillerées à dessert de sirop par jour.

Aucune contre-indication.

Prix. La boîte de 10 ampoules, 25 francs.

Le flacon de sirop, 18 francs.

Laboratoires du D^r ROUSSEL

97, rue de Vaugirard — PARIS (VI^e).

ANGITAN

Tonique de la circulation de retour.

Composition. — Associe aux deux grands modificateurs du tonus veineux et capillaire, Éphédrine naturelle (0.01 cgr.) et Extrait de surrénales (0,05 cgr.), la médication classique par l'Hammélis et le Marron d'Inde. 1 cgr. de phénylméthyl malonylurée assure une tolérance parfaite à l'éphédrine.

Indications. — Troubles circulatoires de retour. Etats syncopaux et de collapsus, Hypotension artérielle, Asthénie, Dépressions physiques et nerveuses liées à la faiblesse circulatoire. Troubles circulatoires abdominaux et des membres inférieurs. Asthme.

Présentation. — Pilules dragéifiées.

Doses. — 2 à 8 pilules par jour, entre les repas.

Prix : 16 francs.

Laboratoires VINCENT

14, avenue Mac-Mahon — PARIS.

ANIODOL

Le plus puissant antiseptique interne et externe, diffère de tous les antiseptiques par son absence de toxicité et de causticité.

*Combinaison de triformal glycérine
et d'oxyméthylène sulfocarbimide.*

ANIODOL INTERNE

Forme. — Gouttes.

Indications. — Fermentations gastro-intestinales, diarrhée verte des nourrissons, entérites, dysenterie amibienne, gripes, catarrhe des voies aériennes, tuberculose, fièvres infectieuses, fièvre typhoïde.

Mode d'emploi et doses :

Nourrissons : III à V gouttes à chaque tétée.

Enfants : XX à L gouttes.

Adultes : XXX à CC gouttes.

Par jour dans une tasse de lait ou de tisane, soit au moment, soit dans l'intervalle des repas.

ANIODOL EXTERNE

Formes. — Solution normale ; solution concentrée ; comprimés ; poudre ; savons, ovules ; vaseline.

Indications. — Obstétrique, gynécologie, chirurgie générale, maladies vénériennes et des voies urinaires, dermatoses, cancer, ophtalmologie, rhinologie.

Mode d'emploi et doses. — Normale : 1 cuillerée à bouche pour 1 litre d'eau. Concentrée : XXX gouttes ou 1 division pour 1 litre. Comprimés (injections vaginales) 1/2 comprimé pour 1 litre d'eau. Poudre : (remplace les poudres dérivées de l'iode et du phénol). Savon : asepsie et désinfection des mains et des plaies. Ovules (gynécologie) : un ovule le soir. Vaseline : plaies, accouchements, rhinologie.

Prix :

Poudre, comprimés, solution externe : 9 francs.

Solution interne, ovules : 14 francs.

Savon, vaseline : 2 fr. 75.

Laboratoires de l'ANIODOL

3 à 9, rue des Alouettes. — NANTERRE (Seine).

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

ANOÏDE

Traitement des hémorroïdes.
Suppositoires, Pommade.

Formule simple. — Carbonate de bismuth, Oxychlorure de bismuth, Oxyde de zinc, Silicate de magnésie (associés à un excipient spécial de consistance adhésive).

Formule composée. — Carbonate de bismuth, Oxychlorure de bismuth, Oxyde de zinc, Silicate de magnésie (associés à un excipient spécial de consistance adhésive), Adrénaline, Eucaine, Menthol.

Administration. — *Crises aiguës* : Suppositoires Anoïde formule simple. *Cas habituels* : Suppositoires Anoïde, formule composée. Pommade Anoïde.

La caractéristique des suppositoires Anoïde est de réaliser un véritable pansement isolant qui entoure l'hémorroïde d'une enveloppe souple et adhésive dont la viscosité empêche tout frottement irritant contre les tissus voisins.

Mode d'emploi. — *Suppositoires* : Un le soir en se couchant. *Crises aiguës* : Un matin et soir.

Prix : 16 francs.

Pommade : Application locale, matin et soir.

Prix : 13 francs.

Pharmacie ROGÉ-CAVAILLÈS.

M. LACHARTRE, Docteur en Pharmacie, Successeur,
116, boulevard Haussmann — PARIS (VIII^e).

ANTALGOL DALLOZ

Composition. — Quino-Salicylate de pyramidon.

Forme. — Granulé.

Propriétés. — Analgésique par le pyramidon. Antiseptique par l'acide salicylique. Dissolvant de l'acide urique par l'acide quinique.

Indications. — Rhumatisme aigu ou chronique, Goutte, Lumbago, Sciatique, Migraines, Névralgies, Grippe, Contre l'élément Douleur en général.

Dose. — 2 à 4 cuill. à café par jour, à croquer ou à faire dissoudre dans de l'eau.

Le flacon : 15 francs.

Laboratoire DALLOZ

13, boulevard de la Chapelle — PARIS (X^e).

ANTASTHÈNE

Composition. — Reconstituant du système nerveux, à base de glycérophosphates associés à un extrait cérébral et spinal.

Forme. — Comprimés, Ampoules de 2 cc.

Indications. — Reconstituant du système nerveux : particulièrement indiqué dans l'asthénie et tous les états dépressifs quelle qu'en soit l'origine.

MODE D'EMPLOI.

Enfants : 1 injection tous les 2 jours.

2 comprimés par jour aux repas.

Adultes : 1 injection par jour.

4 comprimés par jour aux repas.

Prix : 20 francs la boîte (12 amp. ou 50 compr.).

Produits biologiques CARRION

L. CUNY, Docteur en pharmacie

54, faubourg Saint-Honoré — PARIS (VIII^e).

Tél. : Anjou 36-45 (2 lignes groupées.)

ANTÉLOBINE

(Lobe antérieur d'hypophyse.)

Composition. — Hormone sexuelle du lobe antérieur d'hypophyse, physiologiquement titrée.

Propriétés thérapeutiques. — Puissant excitant de l'ovaire, l'Antélobine est la clef du fonctionnement ovarien. Elle agit, par l'intermédiaire de l'ovaire, sur l'ensemble du tractus génital.

Indications. — Tous les cas d'hypofonctionnement ovarien, d'agénésie, et d'hypogénésie sexuelle ; aménorrhée, hypoménorrhée, retards de la puberté, troubles de la ménopause naturelle. N'agissant que par l'intermédiaire de l'ovaire, l'Antelobine est sans action chez les ovariectomisées totales.

Posologie. — En boîtes de 6 ampoules de 2 cc. (solution aqueuse) à 20 unités par ampoule. Six injections sous-cutanées à partir du quinzième jour qui précède la date présumée de la prochaine menstruation.

L'ANTELOBINE agissant aussi sur le tractus génital de l'homme, est utilisée dans l'asthénie sexuelle, la sénilité précoce, les retards de la formation.

Prix : 50 francs.

Les Établissements BYLA

26, avenue de l'Observatoire — PARIS.

ANTHÉMA

Sérum sérique antihémorragique
des D^{rs} Dufour et Le Hello.

Médication fondée sur les propriétés coagulantes du sérum d'animaux en état d'anaphylaxie.

Indications. — Hémorragies et Etats hémorragipares. Hémoptysies. Hémostase pré-opératoire.

Présentation : Boîtes de 1 ampoule de 10 cc.

Posologie et mode d'emploi. — Injection sous-cutanée ou intramusculaire du contenu d'une ampoule de 10 cc., à renouveler au besoin après quelques heures.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

ANTHRACALCINE

Granulé friable.

Composition. — *Charbon animal rigoureusement décyanuré, Benzonaphol, Urotropine.*

Indications thérapeutiques. — Dilatation d'estomac, Pyrosis, Flatulences, Etats pré-ulcéreux, Fermentations intestinales, Ptose abdominale, Aérophagie, Entérite, Affections de la vessie, Auto-intoxications, Dermatoses.

Mode d'emploi. — Une ou deux cuillerées à café après chacun des deux principaux repas.

Prix : 12 francs.

Laboratoires SAUBA
MONTREUIL—PARIS.

ANTHRASEPTOL

du Docteur DAYNEZ

Granulé urotropine, charbon, citrate de soude et magnésie.

Propriétés. — Absorbant, Antiseptique intestinal, biliaire, urinaire, Cholagogue, draine la vésicule. Laxatif léger.

Indications. — Aérophagie, Fermentations intestinales, Colite, Appendicite chronique, Cholécystite, Infections des voies urinaires et biliaires, Migraines, Colibacillose, Syndrome entéro-rénal, Angiocholite, Lithiase.

Doses et mode d'emploi. — 1 à 3 cuillerées à café une heure après le repas, midi et soir.

Prix : 15 francs.

Pharmacie BAUDE
SAINT-AUBERT (Nord).

ANTIALGOS CHRISTIAENS

Spécifique de la Goutte et du Rhumatisme.

Solution diiodo-salicylate de colchicine en solution salicylée donnant à l'analyse élémentaire :

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Acide salicylique | 3 gr. 50 |
| Colchicine..... | 0 gr. 005 |
| Iode (ce qui peut se combiner)..... | 1 gr. environ. |
| Excipient. Q. s. pour 100 cc. | |

Dose et mode d'emploi. — *Accès* : Par 24 heures, 6 cuill. à soupe pleines (100 gr. environ), puis à doses décroissantes. — *Forme chronique* : Une à trois cuill. à soupe, suivant les cas.

Indications thérapeutiques. — Goutte, Rhumatisme, Gravelle, Lumbago, Sciatique, Névralgie rhumatismale, etc.

Expérimenté à l'Institut Physiologique de Nancy et reconnu sans action secondaire sur le cœur, le rein, le foie et l'estomac. *Calme l'accès en 24 heures.*

**LABORATOIRES DE LA PHARMACIE
DE LA PLACE ROYALE**

2, rue du Champ-de-Mars — REIMS
Compte Postal Paris 234-33. R. C. Reims 4478.

ANTIASTHME BENGALAIS

Poudre fumigatoire à base de
Solanées nitrées, digitale et menthol.

**Rétablit l'eupnée. Facilite l'expectoration.
Calme la toux.**

Mode d'emploi. — Faire brûler une pincée de
poudre sur une soucoupe et aspirer doucement
la fumée par les narines.

Indications. — Crises d'asthme, Emphysème,
Oppressions des bronchites chroniques, Catarrhes,
Coryza spasmodique, etc.

Cigarettes Schulzé-Bengalais
aux mêmes principes.

Prix : l'étui (poudre) : 10 francs.
la boîte (cigarettes) : 6 francs.

L. N. C. n^{os} 474-1 et 2.

Laboratoire FAGARD

44, rue d'Aguesseau — BOULOGNE-SUR-SEINE.
Tél. : Molitor 07-05.

ANTI-ASTHME DEHAUSSY

A tout asthme, quelle que soit sa forme, il faut une même médication de fond visant le déséquilibre vago-sympathique commun à tous ces malades.

Médication de fond.

Hypophyse, Surrénale, Euphorbe, Lobelie, Belladone, Arrhénal.

Médication complémentaire

particulière à chaque variété d'asthme.

Médication de la crise :

Antiasthmine E : éphédrine naturelle (à donner par comprimé de demi-heure en demi-heure dès le début de la crise). Sédation en 20 à 30 minutes.

Médication d'entretien :

10 à 20 jours par mois pour éviter la réapparition des crises. Donner suivant les cas :

Antiasthmine A (iodure) : asthme sec.

Antiasthmine B (expectorants, balsamiques) : asthme vieilli avec bronchite chronique et emphysème.

Antiasthmine C (iodure-caféine) : Asthme vieilli avec retentissement cardiaque, dyspnées paroxystiques des vieux scléreux pulmonaires.

Posologie :

Adultes :

Comprimés : 2 à 3 par 24 heures.

Sirop : 2 à 3 cuillerées à soupe par 24 heures.

Pilules : 4 à 6 par 24 heures.

Enfants, 10 ans : demi-dose.

Prix : 16 francs.

Laboratoire DEHAUSSY

66, rue Nationale — LILLE.

ANTIBILIEUX FUZOR

Composition. — *Chionanthus virginiana*, *juglans cinerea*, *iris versicolor*.

Propriétés. — Cholagogue constant, décongestif du système hépato-biliaire.

Indications. — Fièvre bilieuse, congestion du foie, troubles digestifs, à base de dysfonctionnement hépatique, préventif de l'hépatite.

Posologie et mode d'emploi. — Prendre le matin à jeun 1/2 heure avant le déjeuner, 2 cuillerées à café d'ANTIBILIEUX FUZOR dans demi-verre d'eau, tiède de préférence.

Le traitement complet doit durer environ 3 semaines.

Présentation et prix. — Le flacon 125 cc. : 12 fr. 50

Laboratoire de J. M. RICARDOU *

Docteur en Pharmacie

« EVANS DRUG STORE »

46, rue Pierre-Charron — PARIS (VIII^e).

ANTIDIABÉTIQUE MONAVON

A base de kola et sans sucre.

Indications thérapeutiques. — Dans le traitement du diabète, la Kola agit comme un adjuvant qui s'attaque à certains symptômes et qui développe la résistance de l'organisme :

Elle diminue la glycosurie ;

Comme aliment d'épargne, elle agit sur les tissus musculaires en diminuant l'urée, elle agit sur les éléments nerveux en diminuant les phosphates ;

Elle est tonique, reconstituante, et lutte contre l'amaigrissement causé par l'excès de désassimilation.

Composition et Mode d'emploi :

| | | |
|------------------|---|--------------------------------------|
| Elixir contenant | } | 0 gr. 30 extrait de kola par verre à |
| | | liqueur. |
| | | 0 gr. 021 saccharine par verre à li- |
| | | queur. |

Un à 2 verres à liqueur après chaque repas.

Prix : 18 francs.

Produits GONNON

J. et C. GONNON, Pharmaciens

14, rue Victor-Hugo — LYON.

ANTIDIABÉTIQUE REQUIS

Extrait concentré glycériné, inaltérable, de Vitamines B et de Diastases végétales.

Composition. — Feuilles de Noyer, Feuilles de Géranium Robert, Myrtille des Vosges, Boldo, Artichaut, Gui, Combretum R, Noix vomique, Arrhénal.

Propriétés. — Polyurie, Polydipsie, Polyphagie, Acétonurie, Acétonémie, Hyperglycémie, Vertiges, Troubles de la vue, Plaies et dermatoses d'origine diabétique, etc.

Dans les diabètes graves : Auxiliaire précieux de l'insuline à laquelle il convient de l'associer.

Posologie. — *Adultes* : 3 cuillerées à café par jour aux repas soit pur, soit additionné d'eau fraîche aromatisée au citron, à l'orange, à la menthe, etc.

Enfants : 1 cuillerée à café et demie au-dessous de 10 ans diluée dans 3 cuillerées à soupe d'eau fraîche ou de lait, à prendre en 3 fois avant les repas du matin, de midi et du soir.

Prix au public : 30 francs.

Laboratoire des Antidiabétiques REQUIS

171, avenue Félix-Faure — LYON (3°).

ANTIDOULEUR BARBESSOU

Liqueur de goût et de saveur agréables.

Indications. — Migraines, Névralgies, Rages de dents, Rhumatismes; Sciaticques; Lumbagos, Règles douloureuses, Grippe, Algies diverses.

Composition. — Salicyl. double de Dymethylphenyl et d'oxyaminothéine dans un excipient hydroalcoolique sucré aromatisé à l'Angélique.

Posologie. — 2 cuillerées à café : jusqu'à 6 par jour.

Enfants : 1/2 doses.

Avantages. — Action rapide, sûre, constante, pas d'accoutumance. pas d'accumulation.

Prix au public : 8 fr. 50 (le flacon de 10 doses).

Laboratoires BARBESSOU

MARMANDE (Lot-et-Garonne).

ANTIFURONCULEUX DOMERGUE

Principes actifs. — Aniline parasulfonate de Sodium. Méthylpyrazolone. Alcalins. Bardane.

Propriétés. — S'oppose au développement du Staphylocoque. (Réussit même alors que les autres moyens ont échoué.)

Présentation. — Cachets (boîtes de 24).

Durée du traitement. — Minimum 21 jours.

Emploi. — 2 cachets par jour, une demi-heure avant chacun des 2 principaux repas.

La boîte : 16 francs.

Laboratoires DOMERGUE
AGEN (Lot-et-Garonne).

ANTIGÉNINES

Vaccins par voie buccale:

500 milliards de microbes par ampoule de 10 centimètres cubes.

Boîte de 6 ampoules de 10 centimètres cubes.

Prix : 25 francs.

Antigénine C. E.

Colibacilles-Entérocoques : Entérite, Appendicite, Syndrome entéro-rénal, Diarrhée infantile.

Antigénine C.

Colibacilles polyvalents : Colibacilliose, Pyélonéphrites gravidiques.

Antigénine S.

Staphylocoques polyvalents : Anthrax, Furunculose, Staphylococcies.

Antigénine E. P. S.

Entéro-Pneumo-Streptocoques : Grippe et ses complications, Fièvres puerpérales, Angines.

Antigénine T. A. B.

Bacilles typhiques, Para A. et Para B. : Fièvres typhoïde et paratyphoïdes.

Posologie. — Donner le contenu d'un flacon-ampoule dans de l'eau sucrée ou dans une infusion aromatisée au gré du malade, matin et soir bien à jeun, une demi-heure au moins avant toute alimentation.

Aux nouveau-nés et enfants : Donner de un demi à un flacon-ampoule, suivant l'âge.

Vaccins par voie hypodermique.

Même série que les Antigénines, vaccins par voie buccale.

Boîte de 6 ampoules. Prix : 25 francs.

Faire une injection hypodermique, tous les jours ou tous les 2 ou 3 jours, suivant le cas, en commençant par 1/2 centimètre cube, augmenter de 1/2 centimètre cube chaque jour, jusqu'à 2 centimètres cubes.

Bouillon-Antigénine pour pansements.

Boîte de 6 ampoules. Prix : 25 francs

Rhino-Antigénine pour instillation nasale ou otique

Boîte de 4 ampoules. Prix : 15 francs.

Ovules-Antigénines : métrites et toutes leucorrhées.

Boîte de 6 ovules. Prix : 15 francs.

Laboratoire des ANTIGÉNINES

1 place Lucien-Herr — PARIS (V°).

(Anciennement 43, rue Tournefort.)

Gobelins 6-21.

ANTIGRIPPINE MIDY

Cachets

Poudres d'Aconit, de Belladone, de Gelsemium et de Dover, **caféine**, phénacétine et pyramidon, **codéïne** (1 centigr. par cachet). Ni quinine, ni antipyrine.

Doses et mode d'emploi. — GRIPPE, aux premiers frissons, prescrire de préférence : 1 cachet vers 17 heures ; 1 cachet vers 21 heures ; 1 cachet le lendemain matin ; 1 cachet le lendemain soir, si besoin est, dans une boisson chaude (alcoolisée) ou tisane (verveine ou menthe).

Pour les adultes seulement.

Propriétés thérapeutiques. — Antithermique, Analgésique.

Indications. — Etat grippal et fébrile, Courbature, Maux de tête, Névralgies. Influenza et complications.

Prix : 10 francs.

Laboratoires MIDY

67, avenue de Wagram — PARIS (XVII^e).

ANTINÉASE

Composition. — Gélose, kaolin, magnésium hydrocarbonaté. Forme granulée, 50 0/0 des principes médicamenteux.

Propriétés thérapeutiques. — Pansement gastrique, transforme l'excès nuisible d'H-Cl en chlorure de magnésium naissant.

Indications. — Aigreurs, hyperchlorhydrie, ulcère de l'estomac. Prévient le cancer.

Mode d'emploi. — Une cuillerée à café le matin à jeun et 1/2 heure avant les repas de midi et du soir.

Prix : 12 fr. 50.

M. SALAVERT

Pharmacien de 1^{re} classe
SAINTE-FOY-LA-GRANDE (Gironde).

ANTIPHI

Le plus rapide reconstituant. Médication Arsénio-Phosphorée par sensibilisation.

Deux formes. — Elixir. Solution.

Indications. — Etats prétuberculeux. Tuberculoses apyrétiques. Surmenage. Toutes les anémies. Convalescences. Neurasthénies. Enfants chétifs.

Posologie. — *Elixir* : Un petit verre après les deux repas.

Solution : Une cuillerée au milieu des deux repas.

Prix : 14 fr. 50.

Laboratoires de l'ANTIPHI

JEAN CAPIN, Docteur en Pharmacie
ROQUEFORT (Landes).

ANTIPHLOGISTINE

Composition. — Glycérine, kaolin, petite proportion d'iode, d'acides borique et salicylique, huiles essentielles (menthe, gaulthéria. Eucalyptus).

Propriétés. — Chaleur constante pendant 12 à 24 heures. Cataplasme idéal. Action osmotique et exosmotique de la glycérine agissant à travers la peau sur les liquides organiques chargés de microorganismes qu'elle attire et engloutit.

Indications. — Toutes affections nécessitant l'action d'une chaleur constante ou une lutte contre l'infection interne ou externe : Pneumonies, Pleurésies, Bronchites, Rhumatismes Gouttes, Phlegmons, Furoncles, Orchites, Mastites, Conjonctivites, Plaies infectées, Gynécologie, etc.

Particularités. — Pâte molle, se délivre en boîtes fer-blanc embouties d'environ : 150 grammes, 300 grammes, 450 grammes, 900 grammes, 2 kg. 300. Se chauffe au bain-marie, s'applique directement sur la peau; on recouvre d'ouate. Action manifeste et soins rendus faciles.

| | | | |
|-------|--------|----------------|-------------|
| Prix. | Format | O, 150 grammes | : 8 francs. |
| — | — | I, 300 — | : 15 — |
| — | — | II, 450 — | : 23 — |
| — | — | III, 900 — | : 38 — |
| — | — | IV, 2 kg. 300 | : 74 — |

Antiphlogistine gynécologique (boîte format I et guze préparées) : 25 francs.

Laboratoires de l'ANTIPHLOGISTINE

B. TILLIER, Pharmacien

11, rue du Petit-Parc. — SAINT-MAUR, près PARIS.

Tél. : Gravelle 06-44. — R. C. Seine 56-956.

ANTIPIOL

Vaccin filtrat antipyogène polyvalent.
Immunisation locale suivant la méthode de Besredka.

Trois formes :

- 1° Pommade pour pansements non adhérents.
- 2° Ampoules de 10 cc. pour compresses.
- 3° Ampoules de 1 cc. pour oto-rhino
et oculistique.
- 4° Ovules pour gynécologie.

Indications. — Furoncles, Phlegmons, Abscesses, Plaies infectées, Plaies variqueuses, Ostéomyélites, Gercures des seins, Crevasses et toutes blessures ou maladies de la peau. Affections gynécologiques.

Prix : Pommade et ampoules 12 fr. Ovules 18 fr.

Laboratoire de Biologie médicale
7, avenue des Sources — NICE.

ANTIRRHOÏDE

Huile indienne : Balaninum, Lentiscum
Myagrium, Laurinum, Spirea, etc.

Indications. — Traitement des hémorroïdes.

Mode d'emploi. — On nettoie à l'eau tiède les parties à soigner et on sèche avec du coton hydrophile ou un linge fin, puis on imbibe largement avec l'huile ANTIRRHOÏDE la pulpe de l'index et l'on promène ce doigt ainsi mouillé sur les ampoules et bourrelets extérieurs, d'abord, puis à l'intérieur du rectum, en exerçant un léger massage, lentement. L'opération doit durer de cinq à six minutes.

Les applications doivent être faites sans oubli, avant et après chaque garde-robe.

Pour les hémorroïdes internes, employer des SUPPOSICONES ANTIRRHOÏDES qui plongés dans l'huile antirrhoïde doivent être introduits lentement, le malade couché sur le côté et les jambes repliées.

Le grand flacon : 26 fr. — **Le demi-flacon :** 14 fr. 85.

La boîte de supposi-cônes : 12 fr.

Laboratoires BELIERES

19, rue Drouot — PARIS (IX^e).

ANTISCIATIQUE P. CHAMBON

Indications. — Traitement étiologique du *Rhumatisme chronique*, de la *Sciatique*, du *Lumbago* et des différentes manifestations de l'*Arthritisme*. Aucune contre-indication.

Composition. — Association de métaux ionisés catalyseurs d'oxydation (manganèse, magnésium, calcium, nickel, fer et excipient lactosé).

Forme. — Paquets de poudre soluble dans l'eau.

Mode d'emploi très important. — Sept paquets par jour, d'heure en heure, sans discontinuer malgré les repas ; chaque paquet dissous dans une cuillerée à soupe d'eau.

Boîte ordinaire (30 paquets)..... 12 fr. 50

Triple boîte (90 paquets)..... 33 fr. 50

Boîte-Cure (pour 21 jours de traitement)..... 50 fr. »

La Boîte-Cure renferme 21 gros paquets spécialement dosés pour le flacon gradué contenu aussi dans la boîte ; le malade fera dissoudre un paquet dans le flacon plein d'eau, et absorbera toutes les heures, pendant 7 heures, une cuillerée à soupe de cette solution.

Laboratoire P. CHAMBON

place Francheville — PERIGUEUX (Dordogne).

ANTISPASMYL

Composition. — Chaque ampoule contient cinq dixièmes de mgr. de sulfate d'atropine, 5 mgr. de chlorhydrate de morphine, 1 cc. d'eau distillée de laurier-cerise.

Indications. — Spécifique des spasmes douloureux : Ulcères et cancers du tractus digestif (œsophage, estomac, duodénum, intestin), colite spasmodique, coliques de plomb, coliques hépatiques et néphrétiques, asthme (dans les grands accès), etc...

Avantages. — Opium et belladone se complètent pour produire l'action antispasmodique et sédative la plus puissante. L'atropine supprime les nausées dues à la morphine. L'injection est indolore.

Mode d'emploi. — 1 à 2 ampoules par jour en injection sous-cutanée.

Présentation et prix. — Boîte de 6 ampoules de 1 cc. : 14 francs.

Laboratoires RAIMBALDI

30, boulevard Raimbaldi — NICE.

ANTI-URIQUE DE CONTREXÉVILLE

Granulé effervescent dissolvant de l'acide urique et des urates; antiseptique urinaire; anti-floculant.

Composition :

| | |
|---------------------------------|----------|
| Citrate sodique de Pipérazine.. | 4 p. 100 |
| Héxaméthylène-tétramine | 1 — |
| Benzoate de soude..... | 5 — |

Indications. — Lithiase gravelle, Goutte, Obésité, Artério-Sclérose, Rhumatisme déformant et chronique.

Doses. — 2 à 3 cuillerées à dessert par 24 heures dans un verre d'eau immédiatement avant les repas.

Prix : 14 francs.

Maison du Docteur PILLET

5, avenue Victoria — PARIS (IV^e).

ANTIVIRUS

Bouillons-Vaccins filtrés, pour pansements spécifiques microbiens.

Antivirus colibacillaire. — **Antivirus staphylococcique.** — **Antivirus streptococcique.** — **Antivirus mixte (strepto-staphylococcique).**

Antivirus polyvalent (pneumo-strepto-staphylo).

En boîtes de 3 ampoules 10 cc. Prix : 12 francs.

— de 12 — 4 cc. — : 20 francs.

— de 6 — 4 cc. — : 10 francs.

Antivirus puerpéral (streptococcique) en boîtes de 2 ampoules 50 cc. Prix : 20 francs.

Antivirus gonococcique (Gonolyt). En boîtes de 6 ampoules 10 cc. : 24 francs.

Antivirus typhique. } 1 boîte de 1 ampoule rectale de 125 cc. : 20 francs.

Antivirus méliococcique. } 1 boîte de 2 ampoules buccales de 50 cc. : 20 francs.

Atoxicité absolue.

Conservation indéfinie en ampoules scellées.

Antivirus mixte en pommade (Arapal) :

10 francs et 5 francs.

H. VILLETTE, Pharmacien

Produits de « La BIOTHÉRAPIE »

5, rue Paul-Barruel — PARIS (XV^e).

Téléphone : Vaugirard 11-23.

ANTONAL

Traitement rationnel et polyvalent de l'hypertension vasculaire. — Spécifique des scléroses artérielles et viscérales. A base de principes dynamogénétiques du gui. — Diméthylquinoxanthine. — Extrait total hépatique.

Propriétés thérapeutiques. — Médicament d'une grande efficacité par son action à la fois diurétique, antitoxique et hypotensive, d'où son indication dans l'hypertension vasculaire et les maladies qu'elle accompagne : Artériosclérose, Cardiopathies artérielles, Angine de poitrine, Ménopause, Congestions hémorragiques, Néphrites, etc.

Deux formes :

Cachets : 1 à 3 par jour. — Comprimés : 2 à 6 par jour.

Prix : { 12 fr. la boîte de cachets
12 fr. la boîte de comprimés } sans impôt.

Littérature et échantillons :

Laboratoires CARESMEL

2, quai Paul-Bert — TOURS.

Téléphone : 19-42.

ANURIQUE DUPLEX

Composition :

CCl^3CHO — $\text{C}^{11}\text{H}^{12}\text{N}^2\text{O}$ — KBr —
 $\text{C}^{17}\text{H}^{23}\text{NO}^3$.

Indications. — Incontinence d'urine infantile, Chorée, Sommeils agités et Tics nerveux de l'enfance.

Mode d'emploi :

3 ans, 2 cuillerées à café par jour.

5 ans, 3 cuillerées à café par jour.

7 ans, 4 cuillerées à café par jour.

9 à 12 ans, 4 à 6 cuillerées à dessert.

90 à 95 p. 100 de guérisons dans l'Incontinence d'Urine infantile.

Prix : 25 fr.

Laboratoires DREYER-DUFER

VILLIERS-SUR-MARNE (Seine-et-Marne).

Tél. : 1-35.

Echantillon sur demande.

ANUSOL MIALHE

Iodo-résorcino-sulfite de bismuth.

Forme :

Suppositoires : pommade.

Indications :

Hémorroïdes.

Agit également bien contre la constipation, prostatites, etc.

Dose :

Un suppositoire matin et soir.

Prix : 16 fr. 25.

Laboratoire du Dr MIALHE

8, rue Favart — PARIS.

ANXIOSEDINE

Médication sédative et régulatrice du Système nerveux.

Forme. — Sirop.

Composition :

| | |
|---|-------------|
| Codéine | 0,005 |
| Extr. mou de Jusquiame | 0,03 |
| Extr. mou d'Aconit | 0,0025 |
| Extr. mou de Salix Alba..... | 0,30 |
| Extr. fluide de Passiflore | 0,50 |
| Teint. Cratægus Oxyac. | XV gouttes. |
| Sirop d'Ecorces d'oranges amères glycér..... | Q. S. |

Pour une cuillerée à café.

Indications thérapeutiques. — Anxiété, Dyspnée anxieuse, Oppression, Etats spasmodiques, Neurasthénie, Mélancolie, Hypochondrie nerveuse, Angoisse, Toux et insomnies nerveuses,

Dose. — Déséquilibre du système nerveux : 1 cuillerée à café avant chaque repas.

Insomnies nerveuses : 1 à 3 cuillerées à café le soir en se couchant dans une tisane.

Prix : 16 fr.

Echantillons :

Laboratoire de THÉRAPEUTIQUE

74, Faubourg d'Ambrail
EPINAL (Vosges)

APHLOÏNE TROUETTE-PERRET

Elixir contenant en totalité les principes extractifs des plantes tropicales : *Aphloïa*, *Piscidia*, *Hamamelis*, *Hydrastis* et *Viburnum*.

Indications. — Spécifique des troubles de la Ménopause, de la Puberté et du Système veineux (varices et hémorroïdes).
Sédatif utéro-ovarien.

Posologie. — Une à deux cuillerées à café par jour aux principaux repas.
Prix au public : 16 fr.

Laboratoires TROUETTE-PERRET
61, avenue Philippe-Auguste
PARIS (11^e)

APHOSAL

Spécifique de l'insomnie,
Chez les cardiaques, les dyspeptiques, les surmenés.

Composition. — Chloralose chimiquement pur, préparé d'après les travaux des professeurs Ch.-Richet et Hanriot.

Présentation. — Tube de 12 cachets de 20 centigr.

Propriétés thérapeutiques. — Procure un sommeil réparateur, sans cauchemar, avec réveil agréable. Non toxique; sans action sur le rein, ni l'estomac. Tonique du cœur.

Posologie. — Un cachet dans un verre d'eau ou d'infusion avant le coucher.

Prix : 9 fr. 75.

Laboratoire de l'APHOSAL
48 bis, avenue Mozart — PARIS (XVI^e).

APPETYL

Gouttes apéritives à base d'extraits fluides stabilisés de : Gentiane, Simarouba, Condurango, Colombo et Camomille. Extrait délipodé de muqueuse gastrique.

Donne de l'appétit. — Aide la digestion. — Favorise l'assimilation des médicaments.

Ne contient ni AS ni P.

Posologie. — Aucune contre-indication, XV à XX gouttes un quart d'heure avant les repas dans un liquide sucré ou mieux encore sur un morceau de sucre. Enfants : 1/2 dose.

Prix : 15 francs pour 25 à 30 jours de traitement.

Laboratoires de l'APPETYL

37, Avenue de la République Paris (XI^e).

AQUINTOL PETIT-MIALHE

COQUELUCHE

Chloro. — Bromo. — Fluor.

Modifie, dès les premiers jours, la toux. Le malade n'éprouve plus de suffocation ni de vomissements, il retrouve l'appétit et le sommeil.

Doses :

| | | |
|------------------------|--------------|--------------|
| Au-dessous de 6 mois : | 2 à 4 cuill. | à café. |
| Moins de 5 ans : | 3 à 8 | — à café. |
| Moins 15 ans : | 4 à 8 | — à dessert. |
| Adultes : | 5 à 8 | — à soupe. |

Deux flacons sont en général nécessaires pour éviter la rechute.

Prix : 18 fr. 75.

Laboratoire du Docteur MIALHE

8, rue Favart — PARIS.

ARAPAL

Bouillon-Vaccin en pâte molle, non grasse, contenant 75 p. 100 d'Antivirus Strepto-Staphylococcique Mixte de *La Biothérapie*. Son excipient non gras évite toute macération et cloisonnement des exsudats.

Indications. — Furoncles, Anthrax, Pyodermites, plaies infectées, Brûlures, etc...

Présentation. — En tubes.

Grand modèle : 10 francs.

Petit modèle : 5 francs.

H. VILLETTE, Pharmacien

5, rue Paul-Barruel — PARIS (XV^e).

ARCANAN

Marque déposée.

Atophan quininique.... 0 gr. 141

Atophan 0 gr. 134

Bicarbonate sodium pur

(Codex) 0 gr. 225

Forme — Tubes de 10 cachets à 0 gr. 50.

Indications. — Traitement et prophylaxie de la grippe et des affections des voies respiratoires supérieures.

Mode d'emploi. — 3 à 4 fois par 24 heures : 1 cachet après les repas ; accompagner l'emploi de l'Arcanan d'un verre d'eau de Vichy ou d'une autre boisson alcaline.

Prix : 10 francs net (exempt d'impôt).

Laboratoires CRUET

13, rue Miollis — PARIS (XV^e).

ARCICA

Composition. — Ampoules buvables renfermant par dose cinq mgr. d'arséniate de soude associé à tous les principes actifs, tanniques et toniques, de la coca, cola, cannelle et condurango.

Propriétés thérapeutiques. — Reconstituant dans toutes les asthénies, Stimulant de l'organisme.

Indications. — Nutrition défailante ou déficiente, Suites postopératoires, suites d'accouchement, Convalescence, Surmenage, Anémie, Rachitisme tardif, Neurasthénie, Lymphatisme, Diabète.

Nota Bene. — L'Arcica répond aux desiderata de certaines caisses concernant les lois sociales actuelles : ce n'est ni un vin, ni un élixir, ni un aliment. C'est un médicament concentré que le malade peut prendre pur ou additionné, à son goût, de vin liquoreux ou d'eau sucrée.

Dose journalière. — Le contenu d'une ampoule avant le repas de midi. Chez les personnes très anémiées, ou chez les enfants (au-dessus de 12 ans seulement), une demi-ampoule.

Prix : 21 fr. 50

Laboratoire du DELTA

84, rue de Rochechouart — PARIS (IX^e).

Tél. : Trudaine 45-18.

ARDOGÈNE

Elixir fortifiant, Reconstituant physiologique, Stimulant énergique Hyperleucocytaire, Antichlorotique. Goût exquis.

Indications. — Convalescence, Faiblesse générale, Chlorose, sous toutes ses formes, Grippe, Neurasthénie.

Une cuillerée à soupe contient :

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Arrhénal | 15 milligr. |
| Phosphate de soude | 15 centigr. |
| Quinium | 45 milligr. |
| T ^{re} de Noix vomique : | III gouttes. |
| Extrait fluide de kola : | XX gouttes. |

Doses :

Adultes : Une cuillerée à soupe ou un verre à liqueur midi et soir avant les repas.

Enfants : A partir de 10 ans, une cuillerée à café midi et soir avant les repas.

Flacon : 20 francs.

Peut être prescrit aux Assurés Sociaux.

Laboratoire LEPORCQ

9, rue du Temple, ENGHÏEN-LES-BAINS (S.-et-O.).

ARGION

Désinfectant général dans toutes les affections internes et externes.

Infections intestinales, infections rénales, affections stomacales, fièvres infectieuses, affections rhino-pharyngiennes.

Forme. — Comprimés.

Mode d'emploi. — Affections internes.

Adultes : 3 à 6 comprimés par jour, de préférence après les repas. Enfants : 1 à 3 comprimés. Croquer le comprimé ou l'écraser dans un peu d'eau.

Prix : 15 francs.

Laboratoires BELIÈRES

19, rue Drouot — PARIS.

ARGYBIL

Composition. — Complexe d'Argyrol de Barnes (Vitellinate d'argent) et de bile.

Présentation. — Liquide.

Indications. — Traitement de l'ozène, infections aiguës ou chroniques des fosses nasales et du rhino-pharynx. Donne d'excellents résultats en association avec le vaccin local.

Mode d'emploi. — Par le médecin traitant : Badigeonnages. Pour le malade : prescrire en pulvérisations : 2 à 3 coups de poire dans chaque narine, 2 ou 3 fois par jour.

Prix : 15 francs.

LANCOSME

71, avenue Victor-Emmanuel-III — PARIS.

ARGYCUPROL

Association du CUIVRE à l'ARGENT. — Spécifique de la Blennorrhagie. — Non caustique. Indolore. Ne provoque jamais de rétrécissement.

Composition. — Argent colloïdal (10 p. 100), détruit le Gonocoque, Cuivre colloïdal (0,1 p. 100) attaque les microbes associés.

Forme. — Boîtes de 6 ampoules injections.

Indications. — Blennorrhagies aiguës ou chroniques chez l'homme et la femme. Métrites, Vulvites, Vulvo-Vaginites et toutes affections gynécologiques, gonococques ou simples. Ophtalmologie.

Activité remarquable. Tolérance parfaite.

S'emploie en injections urétrales dans les cas aigus, en grands lavages dans les cas chroniques ; en compresses sur les bourses dans les orchites blennorragiques ; en instillations dans les conjonctivites.

Chez la femme : injections urétrales, vaginales, tampons.

Prix : 20 francs.

Laboratoire de l'ANGIOLYMPHE
4 bis, rue Hébert — COURBEVOIE (Seine).

MORO, Pharmacien de 1^{re} classe.
15, avenue de la Défense — PUTEAUX.

ARHÉMAPECTINE GALLIER

Antihémorragique

Admis dans les Hôpitaux de Paris.

Adopté par les Services de Santé de la Guerre et de la Marine.

Solution isotonique, stérile, non toxique, non anaphylactisante de *Pectine*, associée à son coferment m.néral (Calcium).

La **Pectine**, agent hémostatique vrai, augmente le pouvoir coagulant du sang, sans provoquer de modification de la tension, sans action sur les fibres musculaires (H. Violle et L. de Saint-Rat, C. R. Ac. Médéc., 4 nov. 1924).

Formes pharmaceutiques :

Boîte de 4 ampoules de 20 cc. Prix : 20 fr.

Boîte de 2 ampoules de 20 cc. — 12 fr.

Indications et Posologie. — *A titre thérapeutique* : Toutes Hémorragies, Epistaxis, Hémoptyxies, Métorrhagies, etc., Hémorragies post-opératoires, etc.

Faire boire, dans un peu d'eau sucrée, 1 à 4 ampoules en 2 heures, selon la gravité de l'hémorragie.

A titre préventif : Chirurgie générale et spéciale, oto-rhino-laryngologie, odontologie, obstétrique, etc.

Une à quatre ampoules durant les dix heures qui précèdent l'opération.

Dans les cas d'hémorragies massives ou persistantes on se trouvera très bien d'injecter (sous-cutanée ou intramusculaire) 20 cc. d'*Arhémapectine* une ou deux fois dans la journée.

Ne présente aucune contre-indication.

Laboratoire R. GALLIER

Pharm., Ex-interne des Hôpitaux de Paris
38, bd du Montparnasse — PARIS (XV^e).

Téléph. : Littré 98-89.

ARHÉOL

Formule. — $C^{16}H^{24}O$.

Composition. — Principe actif de l'essence de santal.

Forme. — Fl. de 40 capsules contenant chacune 0 gr. 18 environ de produit.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique et analgésique puissant dans toutes les affections des voies urinaires. Produit chimiquement pur n'occasionnant aucune des douleurs provoquées par l'essence de Santal, supérieure elle-même aux essences de Cèdre.

Indications. — Blennorrhagie et blennorrhée, cystites, urétrites, pyélites, pyélo-néphrites.

Dose. — 10, 12 capsules par jour, en 3 fois : le matin, à midi et le soir avant les repas.

Prix : 18 francs.

Laboratoires du D^r P. ASTIER

41, 42, 43 à 47, rue du Docteur-Blanche — PARIS (XVI^e)

ARHINE LAMBIOTTE FRÈRES

Méthylène digalacol tannin. Composé chimiquement défini, ni toxique, ni caustique.

Propriétés thérapeutiques. — Puissant antiseptique, modificateur et désodorisant.

Indications. — Réalise la véritable thérapeutique causale de l'Ozène, en fait disparaître la fétidité et les croûtes, tonifie la muqueuse. Excellent agent curatif du *coryza*, des *rhinites* et *rhinopharyngites*.

Mode d'emploi. — On l'utilise soit en *insufflations*, soit en prises : matin et soir dans l'ozène, après lavage à l'eau bouillie ou boriquée tiède ; 2 ou 3 fois par jour et le soir au coucher dans les *coryzas*, *rhinites*, *moux de gorge*.

Prix : 17 francs.

Littérature et Échantillons :

Produits LAMBIOTTE FRÈRES

20, rue Dumont-d'Urville — PARIS (XVI^e).

124, avenue Rogier — BRUXELLES.

ARISTARGOL

Association 9 parties Ichtyol. 1 Argent colloïdal. Antiseptique, Décongest., cicatrisant. Résolutif. Non caustique.

Ovules à 1 % (Pansem. vag.).

Poudre à 1 % **Alcaline** (Inject. gynécologie, toilette muqueuse, yeux. O. R. L.).

Pommades :

Aristargol à 10 % : Dermatologie-Gynécologie.

Aristargol Stovaïne : Antihémorroïdale (1 % de stovaïne).

Prix de vente au public : 14 francs.

Laboratoire GALBRUN

8 et 10, rue du Petit-Musc — PARIS (IV^e)

ARQUÉRITOL LESURE

Huile injectable d'amalgame d'argent à 40 p. 100 de mercure.

Mode d'emploi. — Identique à celui de l'huile grise : une injection intramusculaire par semaine, correspondant à 8 ou 9 centigrammes Hg.

Indications. — Toutes manifestations syphilitiques.

Avantages. — Injection non douloureuse, absence de nodosités, tolérance parfaite grâce à l'action propre de l'argent, et à son effet favorable sur l'assimilation du mercure.

Adopté par l'Assistance publique et le Ministère de l'hygiène.

Flacon de 5 gr. : 22 fr.

Se fait aussi sous la forme suppositoires.

Pharmacie VIGIER-LESURE

70, rue du Bac — PARIS.

ARRHÉNUCLÈNE BERGEVIN

Composition. — Complexe de Ferro-manganèse codiastatique, Arrhénal, Sulfate de Strychnine et Fluorure de Calcium.

Propriétés. — Hématopoïétique, phagocytogène et névrosthénique.

Indications. — Toutes les anémies et les asthénies, le surmenage des écoliers, et les convalescences.

Mode d'emploi. — De 7 à 11 ans, 1 pilule midi et soir ; 12 à 18 ans, 1 pilule matin, midi et soir ; à partir de 18 ans, 2 pilules midi et soir avant les repas.

Après 8 ou 15 jours de traitement, interrompre pendant une semaine, pour reprendre ensuite jusqu'à guérison.

Prix : 15 francs la boîte de 60 pilules.

G. BERGEVIN

Docteur en pharmacie
CHATEAUDUN (Eure-et-Loir).

ARSAMINOL

Composition. — Solution stérilisée, à la concentration de 26,13 p. 100, de « 3 acétylamino, 4 oxyphénylarsinate de diéthylaminoéthanol », titrée à 0 gr. 05 d'arsenic par cc.

Propriétés. — Produit arsenical pentavalent, injectable par voies sous-cutanée ou intramusculaire, à des doses réellement tréponémicides. Grâce à la technique de sa préparation, qui permet d'obtenir un corps à l'état de pureté parfaite, débarrassé de tous les isomères toxiques et grâce à la présence d'un groupement amino-alcool qui favorise la très large tolérance de l'organisme pour le produit, l'Arsaminol n'a aucun des inconvénients des arsénobenzènes ou des autres arsenicaux pentavalents.

Injections indolores.

Indications. — Syphilis dans toutes ses manifestations ; spirochètoses, amibiases, trypanosomiasés, paludisme.

Posologie. — Consulter notices spéciales.

Formes. — Ampoules de 3 cc. (0 gr. 15 d'As.) et de 5 cc. (0 gr. 25 d'As.).

Pour les Enfants : Arsaminol infantile, solution dosée à 13,06 p. 100 en ampoules de 1 cc. 5 (1 cc. correspond à 0 gr. 025 d'arsenic).

Laboratoires CLIN. — COMAR et Cie.

20, rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS.

ARSÉCRINOL « LERSAM »

Médication spécifique des asthénies.

Composition :

Eléments catalyseurs sous forme organique : arsenic, fer, phosphore, manganèse.

Eléments opothérapiques : extraits totaux de foie et capsules surrénales.

Forme pharmaceutique. — Granulé très agréable, fondant.

Indications thérapeutiques. — *Toutes les asthénies et déficiences organiques.* Grippe, états pré-tuberculeux, dépression générale, convalescence, surmenage intellectuel, retards de croissance, rachitisme, grosseur, anémies, etc.

Action très efficace. Aucune contre-indication.

Doses. — *Enfants* : 1 à 3 cuillerées à café par jour.

Adultes : 4 — — —

Croquer au milieu ou avant les repas. Arrêter le traitement pendant quelques jours et reprendre.

Prix : Le grand tube : 20 fr. (Admis aux A. S.).

Échantillons, littérature :

Laboratoires LERSAM

92, boulevard Murat — PARIS (XVI^e.)

ARSÉNIODE BURIAT

Forme Gouttes. — Solution inaltérable de tri-iodure d'arsenic méthylarsinée à 1 p. 100.

Indications. — Tuberculoses torpides à manifestations lymphatiques, chlorose symptomatique de tuberculose, anémies, convalescences (fixation d'oxygène).

Emphysème pulmonaire et manifestations du syndrome asthmatico-arthritique.

L'Arséniodé donne toujours de l'appétit.

Mode d'emploi. — Doses moyennes.

Enfant : II gouttes par 24 heures et par année d'âge.

Adultes : XV à XXX gouttes, 2 fois par jour.

Prix : 14 fr.

Laboratoire BURIAT

25, rue Copernic — PARIS (XVI^e.)

ARSÉNOBENZÈNES CLIN

(Arsenicaux trivalents.)

NÉO-TRÉPARSÉNAN (Novarsenobenzol Codex)

Dioxydiamidoarsénobenzène méthylène sulfoxylate de soude.
Poudre d'un jaune citron parfaitement homogène, facilement soluble dans l'eau. Elle s'altère en présence de l'oxygène, soit à l'état sec, soit surtout en solution aqueuse.

Indications. — *Syphilis* : toutes ses formes cliniques, toutes ses périodes. Hérédo-syphilis. Traitement d'attaque et de consolidation.

Spirochetoses et infections parasitaires : Paludisme, amibiases, Pian, Recurrente. Angine de Vincent. Infection Puerpérale.

Posologie. — Injections intraveineuses.

Formes. — Boîtes d'une dose. Boîtes de 10 ampoules de même dose. Boîtes de 6 ampoules à doses progressives : 0 gr. 15, 0 gr. 30, 0 gr. 45, 0 gr. 60, 0 gr. 75, 0 gr. 90, 1 gr. 05.

SULFO-TRÉPARSÉNAN

Dioxydiaminoarsénobenzène méthylène sulfonate de soude.

Mêmes caractéristiques et indications que le NÉO-TRÉPARSÉNAN.

Posologie. — Injections sous-cutanées, intramusculaires ou intraveineuses. Une à deux par semaine, à doses progressives.

Formes. — Boîtes d'une dose. Boîtes de 10 ampoules de même dose : 0 gr. 02, 0 gr. 04, 0 gr. 06, 0 gr. 12, 0 gr. 18, 0 gr. 24, 0 gr. 30, 0 gr. 36, 0 gr. 42, 0 gr. 48, 0 gr. 54, 0 gr. 60.

Laboratoires CLIN. — COMAR et Cie.
20, rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS.

ARSENOGÉYL

(Ancienne dénomination : ARSENOGYL)

**Pâte dentifrice à base
de Novarsenobenzol.**

Prévention et traitement des Pyorrhées,
Gingivites, Stomatites simples ou
médicamenteuses, etc...

Le tube : 6 francs.

Laboratoire RAVAUD

6, place de Breteuil — PARIS (XV^e).

Tél. : Ségur 14-85.

ARSÉNOMYL

Nouvel arsénobenzol.

Très puissant tréponémicide en solution aqueuse stable préparée d'avance.

Indications. — Syphilis, Fièvre récurrente, Pian, Maladie du Sommeil.

Formes. — Ampoules pour injections intra-musculaires de solutions d'ARSÉNOMYL aqueuses glucosées préparées d'avance et indolores.

Posologie. — *Adultes* : débiter à 0 gr. 30. Augmenter progressivement les doses à 0 gr. 50, 0 gr. 70, 0 gr. 90, 1 gr. 05, suivant les malades.

Chez l'enfant les doses sont de 0 gr. 005, 0 gr. 01, 0 gr. 02, 0 gr. 03, 0 gr. 05, 0 gr. 10, 0 gr. 15, 0 gr. 20

Prix :

Ampoule 0 gr. 30 : 8 francs. — 0 gr. 50 : 11 fr. 50.
— 0 gr. 70 : 13 francs. — 0 gr. 90 : 14 fr. 50.

Etablissements MOUNEYRAT

12, rue du Chemin-Vert — VILLENEUVE-LA-GARENNE, près Saint-Denis (Seine).

ARSÉDOS-SOLVANT

Adopté par les hôpitaux.

Sérum glucosé avec addition de Gaïacol et de Chlorétone pour injections hypodermiques d'arsénobenzènes,

— Indolores —

Présentation. — Boîtes de 1, 6, 12 ampoules.

Boîte de 1 ampoule : 1 fr. 50.

Boîte de 6 ampoules : 7 fr. 50.

Boîte de 12 ampoules : 14 francs.

Voir *Sulfarsénol*.

Laboratoires de Biochimie Médicale

Ch. Desgrez, Docteur en Pharmacie,
19-21, rue Van Loo — PARIS (XVI^e).

Téléphone : Auteuil 26-62, 04-30.

ARSI-STRYCHNAL LONGUET

Association « Strychnal-Cacodylate de Na »
des dérivés non-toxiques de la strychnine
et de l'arsenic.

Strychnal 0 gr. 01

Cacodylate de Na..... 0 gr. 25

Sérum isotonique Q. S..... 3 cm³

par ampoule.

Injection rigoureusement indolore.

Doses. — 1 à 2 ampoules par jour.

Indications. — Anémie, Convalescence.

(Voir Strychnal Longuet).

La boîte de 12 ampoules de 3 cc. : 18 fr.

Laboratoires LONGUET

34, rue Sedaine — PARIS.

ARSYLÈNE « ROCHE »

Acide allylarsinique.

L'Arsylène « Roche » est un arsenic organique nouveau qui, sur les préparations inorganiques, arsénates, arsénites, liqueur de Fowler, etc., etc., possède l'avantage d'une *toxicité pratiquement nulle*, laquelle permet son emploi à doses élevées, sans craindre la brusque apparition de phénomènes d'arsénicisme tels que sécheresse de la gorge et de la bouche, troubles digestifs et nerveux, symptômes cutanés, bouffées congestives, essoufflement, hyperthermie, etc. ; il est en outre *très bien toléré* par les voies digestives, ne provoque pas de dégagement d'oxyde de cacodyle (odeur alliagée de l'haleine) et il est *utilisé presque complètement* dans l'économie ; peut être substitué en toute sécurité, par le médecin traitant, aux cacodylates généralement employés, dans toutes leurs indications et à toutes doses.

Indications thérapeutiques.

Affections nerveuses et mentales, *sclérose en plaques Parkinson, contractures, chorée, mélancolie, anxiété, maladies de la peau, psoriasis, affections parasitaires, tuberculose au début, anémie grave, période de dépression du traitement Bi ou Hg, toutes les Anémies et toutes les Asthénies.*

Posologie et modes d'emploi.

Thérapeutique intensive. — 1 à 4 ampoules de 5 cc. à 0,20 tous les 2 ou 3 jours en injections intramusculaires ou endoveineuses *absolument indolores.*

Thérapeutique toni-stimulante. — 1 ampoule de 2 cc. à 0,05 par jour et plus par voie hypodermique ou intramusculaire (injections *absolument indolores*). — *Enfants* : 1/4 ou 1/2 dose.

Thérapeutique d'entretien. — *Granules* à 0,01 : 1 à 3 granules. — *Enfants* : 1/4 à 1/2 doses selon l'âge, avant chaque principal repas.

ARSYLÈNE « ROCHE »

Granules : Flacon de 60.

Ampoules de 2 cc. : Boîte de 12.

Ampoules de 5 cc. : Boîte de 12.

Enregistré au Laboratoire national de contrôle des médicaments sous les n^{os} 504-7 (*granules*),

504-8 (*ampoules de 2cc.*), 504-60 (*ampoules de 5 cc.*)

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et C^e
10, rue Crillon — PARIS (IV^e).

ARTERASE

Composition. — Ail, gui, silice, citrate et formiate de soude, marron d'Inde, cupressus, prêle.

Propriétés. — Abaisse la tension artérielle. Diminue la viscosité sanguine. Active la circulation dans les capillaires et les veines. Arrête les hémorragies.

Indications. — Cœur, artères, veines. Présclérose, artériosclérose, hypertension, hémorragies (nasales, oculaires, cérébrales, etc.), hémiplegies, œdèmes. Etats congestifs, vertiges, bourdonnements, troubles visuels. Troubles de la ménopause.

Posologie et mode d'emploi. — 1 à 2 pilules le matin, à midi et le soir, soit 3 à 6 pilules par jour. Continuer 5 jours, cesser 2 jours et recommencer. Au début du traitement, la dose de 6 pilules par jour sera préférée pour être ramenée à 3 par la suite. Pas de contre-indications.

Prix : 15 fr. 80.

Laboratoires Biologiques

E. GILBERT, Docteur en Pharmacie

6, rue du Laos — PARIS (XV°).

ARTÉRION VINCARDI

HYPOTENSEUR

Principes actifs. — Complexes stabilisés extraits du *Viscum album*, de l'*allium sativum*, du *fucus vesiculosus*, du *citrus limonum*. Nitrite sodium.

Forme. — Comprimés lenticulaires glutinisés. **Innocuité absolue**, tolérance parfaite. Pas de contre-indication.

Indications. — Hypotenseur, sclérolysant, diminue la viscosité du sang. — **Action élective** au niveau des capillaires qu'il dégrasse et assouplit. — Artériosclérose. — Hypertension, scléronéphroses, présclérose.

Doses. — 5 à 6 capsules par jour aux principaux repas.

Littérature et échantillons sur demande :

Laboratoire VINCARDI

Ph. VQUIER, pharmacien

14, avenue G.-Clemenceau — NICE (Alpes-Maritimes).

Chèques postaux : Marseille 105-38.

R. C. Nice 9046.

ARTÉRIO-VEININE

Composition. — Crataegus, passiflora, gui, marron d'Inde, hamamélis (Extraits stabilisés), iode peptonisé.

Indications. — Troubles de la Ménopause, artério-sclérose, troubles nerveux, états congestifs quels qu'ils soient.

Forme. — Gouttes.

Doses. — De XX à LX gouttes avant chaque repas.

Prix : 14 francs.

Laboratoires J. KRIEGER

121, avenue de Saint-Ouen
PARIS (XVII^e).

ARTHRILAX

Poudre granulée sodique effervescente.

Deux cuillerées à café = 10 grs de poudre, contiennent

| | |
|----------------------------|----------|
| Sulfate de soude | 1 gr. 40 |
| Phosphate de soude | 0 gr. 60 |
| Citrate de soude | 1 gr. |
| Bicarbonate de soude | 0 gr. 60 |
| Sucre effervescent | Q. S. |

Dose moyenne. — *Adultes* : 1 à 2 cuillerées à café dans un verre d'eau chaude, le matin à jeun, ou bien fractionner en plusieurs doses avant ou après les repas.

Indications. — Arthritisme et ses douleurs, Congestions hépatiques.

Goutte, Obésité, Migraines, Uricémie.

Hypertension artérielle.

Eczémas, Affections de la peau.

Constipation chronique, Infections gastro-intestinales,

Gastro-entérites aiguës, subaiguës.

Gastralgies, Dyspepsies, Gastrites.

En résumé, toutes les indications de la formule de Bourget.

Prix : 18 fr. 50.

Durée du flacon : 2 à 4 semaines.

A. LYONS, Pharmacien

30, rue Monge — PARIS (V^e).

ARVENSYL

Formule :

Phytothérapie associée aux alcalins (Formules dépuratives de BROCCQ).

Une cuillerée à bouche dans un verre d'eau correspond à une infusion de Bardane, Pensée sauvage, Séné lavé à l'alcool, Saponaire, Cassis, Gentiane, et à un verre de la Solution de Bourget.

Indications. — Traitement interne des Dermatoses, Hépatisme, Manifestations cutanées de l'Arthritisme.

Par cuillerées à café, ou cuillerées à bouche suivant le cas, dans un verre d'eau avant les repas ou le matin à jeun.

Prix : 16 francs.

Laboratoires GERDA

163, boulevard de la Croix-Rousse — LYON

ASCÉINE

Analgésique, sédatif, antirhumatismal.

(Acet-salicyl-para-acet-phénétidine-caféine.)

Par l'association synergique de ses composants, l'Ascéine réalise une médication efficace et inoffensive dont l'action principale et immédiate se traduit par l'atténuation ou la disparition de l'élément douleur.

Indications. — Toutes les algies : Névralgies, sciatique, migraine, etc., Grippe. Arthrites aiguës et toutes manifestations fébriles ou rhumatismales.

Doses. — Adultes : 2 à 4 comprimés par jour ; enfants : 1/2 à 2 comprimés.

Le tube de 20 comprimés : 4 fr. 50.

La pochette de 4 comprimés : 1 franc.

LABORATOIRES O. ROLLAND

109-113, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.

ASCIATINE

Diméthylamido-phényl-diméthyl-pyrazolone-butylchloral.

Antinévralgique, analgésique et hypnotique.

Action élective dans le domaine du trijumeau.

Indications. — Douleurs dues aux diverses affections dentaires, douleurs consécutives aux interventions dentaires, névralgies à localisations diverses et particulièrement les névralgies faciales. Lumbago, dysménorrhée, insomnies.

Présentation et posologie. — Comprimés à 0 gr. 25 (boîtes de 3, 12, 24). 1 à 3 comprimés par dose, 4 à 5 comprimés par 24 heures.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

ASCOLÉINE RIVIER

L'ASCOLÉINE est à base de lipolde hépatique phosphoré et iodé. Elle renferme les vitamines A et C, la **vitamine D à l'état naturel**, toutes les vitastérines des cellules hépatiques.

Indications. — Inappétence, anémie, convalescences, bronchite, prétuberculose.

Quatre formes. — *Solution huileuse* : Une cuillerée à café 1/4 d'heure avant chaque repas. Prix : 16 francs.

Comprimés (véritables bonbons) : 1 à 5 comprimés suivant l'âge avant chaque repas. Prix : 16 francs.

Granulés : De quelques grains à une cuillerée à café avant chaque repas suivant l'âge et depuis un an. Prix : 16 francs.

Toutes pharmacies ou à défaut chez :

Henri RIVIER, Pharmacien

26-28, rue Saint-Claude — PARIS.

Tél. Archives 01-01.

ASÉPHÉINE

Dragées répondant à la formule suivante :

| | |
|--------------------------------|-------|
| Chlorhydrate d'éphédrine | 0,01 |
| Bromhydrate de papavérine..... | 0,03 |
| Iodure de codéine | 0,02 |
| Iodure de caféine..... | 0,10 |
| Extrait mou de lobélie | 0,005 |

Par dragée.

Propriétés. — Médicament symptomatique de toutes les variétés d'asthme et de dyspnées asthmatiformes. Action régulière et efficace, tolérance gastrique parfaite. Aucune accoutumance et ne provoque jamais de troubles nerveux.

Indications. — *Asthme* : Atténue les crises, espace les accès, diminue la violence des crises ultérieures et supprime certains symptômes spasmodiques. — Médicament d'entretien électif entre les crises d'asthme. En cas de crises très aiguës, s'il convient d'adjoindre les médications héroïques habituellement employées, l'Aséphéine constitue cependant un traitement très précieux. — *Manifestations respiratoires ou rhinopharyngées de l'asthme, rhume des foins, trachéo-bronchites spasmodiques.* — Prise au début et durant toute la saison critique, l'Aséphéine supprime et atténue les crises. — Par son action calmante et tonique cardiaque légère, elle est indiquée, également, dans les dyspnées asthmatiformes des asthmes vieillissants, des hypertendus, des brightiques.

Formes. — Tubes de 20 Dragées.

Laboratoires CLIN. — COMAR et Cie.
20, rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS.

ASEPTONE

L'antiseptique idéal en gynécologie.

Formule. — Menthol, trioxyméthylène, essence thym, sulfate de cuivre, acide borique, alun (deux formes), poudre et comprimés.

Indications. — Antisepsie des organes génito-urinaux de la femme, métrites, vaginites, salpingites, fleurs blanches, ulcération du col de la matrice, toilette intime.

Avantages. — Odeur agréable, solubilité parfaite, ne tachant pas le linge, ni toxique, ni caustique, décongestive, microbicide, laissant après l'emploi une agréable sensation de fraîcheur et calmant immédiatement les démangeaisons.

Emploi. — *Poudre* : 1 cuillerée à café par litre d'eau bouillie chaude en injections et lavages, matin et soir.
Comprimés : 1 comprimé pour 2 litres, même emploi.

Prescrire : Une aseptone, poudre ou comprimés.

Littérature et échantillons.

Prix au public : 10 francs.

Laboratoires MOULIN

50, rue de la République — PUTEAUX (Seine).

ASEPTO-POUDRE

(Paquets)

Antiseptique désinfectant.

Composition :

Pour un paquet :

| | |
|---------------------------|----------|
| Trioxyméthylène | 0,10 |
| Borate de soude | 6 |
| Essence de thym. | IV gttes |

Indications. — Hygiène intime des deux sexes, suites de couches, pertes fétides, pertes blanches, métrites.

Avantages. — Dissolution parfaite, odeur agréable.

Posologie. — 1 paquet par injection.

Prix : 16 francs.

Laboratoire de Thérapeutique normale
Ch. LAVIRE, Pharmacien de 1^{re} Classe
46, rue de Rome — MARSEILLE (B.-du-R.).

ASEPTORHINE

Huile aromatique, balsamique et antiseptique à base d'éphédrine, d'adrénaline, d'anesthésine et d'huiles essentielles.

Indications. — Désinfection habituelle des fosses nasales, coryza, ozène, rhinites, polypes, ulcérations, protection contre les maladies infectieuses.

Mode d'emploi. — En gouttes ou, mieux, en pulvérisations, 2 ou 3 fois par jour.

Prix : 12 fr. 50.

Dépôt général :

Laboratoire ASEPTOR

21, rue Feydeau — PARIS (II^e).

ASEPTOVULES

Calmant cicatrisant aux essences antiseptiques.

Composition :

| | |
|--|--------|
| Essence de Géranium. | 0,0125 |
| Essence de Thym. | 0,0125 |
| Essence de Verveine. | 0,0125 |
| Essence d'Origan. | 0,0125 |
| Résorcine. | 0, 10 |
| Chloral. | 0, 07 |
| Menthol. | 0, 06 |
| Glycérine solidifiée, Q. S. pour un ovule. | |

Indications :

Métrites, Vaginites, Véritable pansement gynécologique.

Posologie :

Un ovule le soir en se couchant.

Prix : 16 francs.

Laboratoire de Thérapeutique normale

Ch. LAVIRE, Pharmacien de 1^{re} Classe

46, rue de Rome — MARSEILLE (B.-du-R.).

ASTASOL DOUETTEAU

Composition. — Poudres de plantes sélectionnées d'HYDRASTIS et d'HAMAMÉLIS rendues d'assimilation facile.

Formule rationnelle permettant l'emploi de ces deux plantes *sans incompatibilités chimiques*.
Action thérapeutique *plus puissante que celle des extraits et teintures*.

Forme. — Cachets de petit diamètre.

Indications. — Troubles du système veineux, Stases veineuses, Varices, Congestions, Phlébites, Hémorroïdes.

Doses. — 3 cachets par jour avant les repas.

Enregistré au Laboratoire national de contrôle des médicaments sous le n° 233-2.

Prix : 12 francs.

Laboratoires DOUETTEAU frères

20, Faubourg Saint-Honoré — PARIS (VIII^e).

ASTHMASÉDINE

Respiratoire, Décongestif, Cardio-tonique, Diurétique.

Composition. — Pour 1 cuillerée à café :

| | | | |
|-------------------------|-------|--------------------------|-------|
| Chl. d'Ephédrine | 0,015 | Iodure de potassium | 0,20 |
| Gardénal..... | 0,015 | Teinture de belladone... | 0,25 |
| Caféine | 0,10 | Teinture de lobélie..... | 0,50 |
| Benzoate de soude | 0,10 | Excipient spécial | Q. S. |

Traitement de Crise d'Asthme et du Terrain Asthmatique. Asthme. Emphysème. Dyspnées. Troubles Cardio-Vasculaires.

Doses moyennes : *Pour éviter les crises d'asthme :* Prendre entre les accès une cuillerée à café au début des 2 repas, pendant 2 jours. Puis 2 matin et soir au début des repas pendant 10 jours. Cesser 4 ou 5 jours et refaire une cure semblable.

Pendant les crises : 2 cuillerées à café au début des 3 repas, soit 6 par jour dans un peu d'eau sucrée.

En cas de crise subite : et seulement en dehors des périodes de traitement 1 cuillerée à café toutes les heures pendant 4 heures.

Demi-doses pour les *Enfants* à partir de 10 ans.

Prix : 16 fr. 50.

Laboratoires HENRI SCHÉHADÉ,
Pharmacien de la Faculté de Paris.
17, rue Chomel — PARIS (7^e).

ASTHMO-ACTINE

Eupnéique, Antispasmodique, Toni-Cardiaque.
Le plus fort **Elixir antiasthmatique** connu.

Composition. — **Synergie totale :** Respiratoire, circulatoire et sympathique.

Une cuillerée à soupe contient : iodure de caféine 0,50, teinture de lobélie 0,50 ; Ext. thébaïque 5 milligr. Ext. belladone 1 milligr. Ars. de soude 1 milligr. Ext. grindélia 0,10... et,

Nouveauté. — Ext. Aotœa 0,05. Ext. nat. surrénale au 1/1000 0 gr. 07 dans sirop antiasthmatique stimulant diffusible pour 15 cc.

Indications. — Asthmes divers. Emphysème. Dyspnée des gazés, Catarrheux, Intoxiqués, etc...

Action rapide curative et préventive.

Posologie. — **Adultes :** 1 à 3 cuillerées à soupe par jour loin des repas dans un peu d'eau ou de lait. **Enfants :** par cuillerées à café.

Le flacon 210 cc. : 15 fr.

Laboratoires G. BERTHON Pharmacien.
DORNES (Nièvre).

ATHÉROLYSINE

Spécifique de l'Artériosclérose et de ses conséquences.
Silicate de Soude chimiquement pur et Extrait Aqueux de Viscum Album (extrait de Gui avec ses indosés organiques).

Propriétés thérapeutiques. — L'ATHEROLYSINE est le traitement *étiologique et symptomatique* de l'Athérome et des troubles concomitants propres à la cinquantaine (Silicate de Soude, antiscléreux, Viscum Album hypotenseur).

Indications. — Présclérose-Artériosclérose et Hypertension. Toutes Scléroses, Vertiges, Obnubilation intellectuelle, Céphalées, Bourdonnements d'oreilles, Troubles oculaires, Perte de la mémoire, etc.

Formes. — Granulés, comprimés-pastilles.

Posologie. — *Granulés* : 1 à 3 cuillerées à café.

Comprimés : 2 à 6 par jour.

(Conforme aux prescriptions légales, l'Athérolysine peut être prescrite aux Assurés sociaux.)

Le flacon : 14 fr.

Laboratoire JONIDS

DIJON.

ATOMINE

Composition. — Acide phénylcinchoninique, Phosphate de soude.

Indications. — Solvant urato-oxalique en milieu alcalin grâce au phosphate de soude associé ; très bien toléré.

Rhumatismes aigus ou chroniques, Sciatiques, Goutte, Lumbago, Algies, sédatif rapide de la douleur.

Doses. — Cas aigus : 3 à 6 cachets par jour pendant 5 jours ; cesser 5 jours et reprendre.

Cas chroniques ou atténués : 2 cachets par jour pendant 5 jours, cesser 5 jours et reprendre.

Prix : 15 francs.

Absorber avec tisane sucrée.

Laboratoires L. Boize et G. Alliot,
9, avenue Jean-Jaurès — LYON

ATOPHAN-CRUET

Marques déposées.

Acide phénylquinoléine², carbonique⁴.

Produit chimique pur.

Formes :

Boîtes de 20 cachets à 0 gr. 40.

Tubes de 20 comprimés à 0 gr. 40.

Indications. — Rhumatismes, Goutte, Névralgies.

Mode d'emploi. — 2 à 4 cachets ou comprimés par 24 heures, après les repas. Accompanyer l'emploi du médicament de boissons abondantes et alcalines et d'une nourriture riche en hydrates de carbone et pauvre en purines.

Prix : 16 francs net (exempt d'impôt).

Laboratoires CRUET

13, rue Miollis — PARIS (XV^e).

ATOPHANYL

Marque déposée.

Atophan sodique + Salicylate de soude +
Eau stérilisée.

Formes :

Injections intraveineuses, boîtes à 5 amp.
10 cc.

Injections intramusculaires, boîtes à 5 amp.
5 cc. + 5 amp. 1 cc. d'un anesthésique.

Indications. — Formes graves et rebelles du rhumatisme musculaire ou articulaire, goutte, névralgies.

Prix : 36 francs net (exempt d'impôt).

Laboratoires CRUET

13, rue Miollis — PARIS (XV^e).

ATOQUINOL CIBA

Spécifique anti-goutteux

Phénylcinchoninate d'allyle. Solvant de l'acide urique, favorise puissamment son élimination par voie rénale.

Indications. — Diathèse urique en général : Goutte, Rhumatisme goutteux, Dermatoses d'origine arthritique et toutes manifestations uricémiques.

Doses. — Etats aigus : 2 à 4 cachets ou cuillerées à café de granulé par 24 heures.

Etats chroniques : 1 cachet ou cuillerée à café de granulé, 8 ou 10 jours par mois.

La boîte de 20 cachets : 15 francs.

Le flacon de granulé : 18 —

(Voir *Sanoquinol*).

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND
109-113, Boulevard de la Part-Dieu. — LYON.

ATURAL

Composition

Poudre à base d'antilab-ferment et de citrate de soude.

Action :

Produit physiologique, absolument inoffensif, dépourvu de goût, extrait du sérum du jeune veau.

Empêche la coagulation du lait dans l'estomac et en assure la digestion intégrale.

Indications :

Intolérance lactée chez l'enfant et chez l'adulte.

Mauvaise digestion du lait et ses conséquences : vomissements, diarrhée verte des nourrissons, gastro-entérite, troubles digestifs divers.

Mode d'emploi :

Une mesure (environ 1 gr.) pour 100 gr. de lait.

(Ne jamais porter à haute température.)

Prix : 14 francs.

Laboratoires RENARD

35, rue de Paris — CLICHY (Seine).

Tél. : Péreire 14-08.

AUDIGENINE

Forme. — Comprimés.

Composition. — Di-iodo-antipyrine, (2,5 %) et Bromures alcalins (92,5 %).

Indications. — Traitement médical interne de la Sclérose de l'oreille moyenne et du tympan. Surdit . Vertiges. Bourdonnements.

Mode d'emploi. — 2 comprim s au milieu de chaque repas.

(Le traitement doit  tre interrompu 10 jours chaque mois).

Prix : 15 francs.

Litt rature et  chantillons :

Laboratoires E. VAILLANT & Cie

19, rue Jacob — PARIS (VI ).

AZIGOL THEVENOT

Crises convulsives.  tats nerveux.

Composition. — Tartrate Borico-Calcique, Ph nyl  thylmalonylur e. Extrait de Gels mium et de Piscidia.

Forme. — Drag es.

Indications. — Toutes crises nerveuses, Epilepsie, Convulsions. Tous  tats nerveux : Asthme, Prurit, Ecz mas, Urticaire, Hyperexcitabilit , Asthme infantile.

A l'action suspensive des crises par le Ph nyl  thylmalonylur e s'ajoute l'action du borotartrate de chaux, modificateur du tissu nerveux et celle des extraits v g taux qui diminuent la sensibilit  p riph rique et de certains organes; origine des r flexes d clenchant les crises.

Dose. — 2   6 comprim s par jour. On peut continuer le traitement par le Borocalcyl.

Enfants : 1/2   1 comprim  par jour.

Prix du flacon de 40 drag es : 18 francs.

Laboratoires THEVENOT — DIJON.

AZOTYL

Composition. — Lipoïdes spléniques et biliaires, cholestérine, goménol, camphre, irradiés aux rayons ultra-violet.

Forme. — Ampoules et pilules.

Propriétés thérapeutiques. — Etats de dénutrition et de carence. Anémies.

Doses et mode d'emploi :

A. *Ampoules.* — Injections sous-cutanées ou intramusculaires (tous les jours ou tous les 2 jours).

B. *Pilules glutinisées.* — 6 par jour aux repas et dans l'intervalle des piqûres.

Prix de vente au public.

Ampoules : 22 francs. — Pilules : 16 francs.

Laboratoires LOBICA

46, avenue des Ternes — PARIS (XVII^e)

AZUFROL

Soufre colloïdal.

Description. — 1° *Capsules glutinisées* contenant 0 gr. 10 de soufre colloïdal sec, en flacons de 60 capsules ; 2° *Pommade* à 1/15 avec, comme excipients vaseline et lanoline, en tubes d'étain de 45 grammes (usage externe).

Action thérapeutique. — Permet l'absorption du soufre colloïdal sous forme agréable, en évitant l'altération du soufre par le milieu acide de l'estomac, à des doses exactes et de conservation indéfinie.

Indications. — 1° *Capsules* : 4 à 12 par jour contre le rhumatisme chronique, les arthrites, l'acné, la séborrhée, la bronchite chronique, le saturnisme. Pour le traitement intensif, y adjoindre les injections de sulfuron (voir plus loin).

2° *Pommade* : Toutes affections cutanées justiciables du soufre.

Prix : 25 francs.

Laboratoires Ch. COUTURIEUX

18, avenue Hoche — PARIS.

AZYM

S'oppose à la lenteur des digestions.

Présentation. — Poudre.

Composition. — Bicarbonate, Phosphate, Sulfate de Soude, Hydrate de Magnésie, Carbonate de Chaux, Carbonate de Bismuth.

Posologie. — 1 cuillerée à café après le repas : 1 nouvelle cuillerée à café au cours de la digestion si l'on se sent incommodé. *Très jeunes enfants et bébés* : 1/2 ou 1/4 de cuillerée à café.

Indications. — **Hyper et Hypochlorhydrie.** Affections gastro-intestinales de l'enfance. Intoxications alimentaires. Dermatoses d'origine gastrique. Vomissements.

Prix : 14 francs.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 342-2.

Laboratoire PARET

22, rue Guibal — MARSEILLE.

BABEURRE DARDELET

pour Nourrissons ou Adultes

Le Babeurre Dardelet. — Médicament héroïque de la diarrhée verte et entérite. D'un goût agréable, il est non seulement employé pour les Nourrissons, mais aussi pour les Adultes.

La Soupe de Babeurre est du Babeurre additionné de 2 p. 100 d'Arrow-Root.

Ce qui fait la supériorité de ces deux produits est leur homogénéité absolue. Ni dépôts, ni grumeaux. On peut les donner à la tétine.

Conservation sous le vide.

Se fait en 1/4 de litre. Prix : 2 francs départ usine.

Notre emplacement au centre de la France sur une grande ligne nous permet de livrer instantanément toute commande en Province.

(Voir rubrique *Laits* DARDELET).

J. DARDELET

Maison fondée en 1922.

BONNARD (Yonne). Tél. : 4.

(Echantillons. Attestations. Renseignements sur demande).

Pour PARIS Dépôt : **D^r des OUCHES**

58, faubourg Poissonnière (Prov. 82-45).

BABEURRE GUIGOZ

Soupe de babeurre en **poudre**.

Grandes facilités de conservation et de préparation, sans cuisson, en mélangeant la poudre à de l'eau tiède bouillie.

Substantielle, quoique extrêmement digestible en raison de l'adjonction de dextrines : peut être administrée à des nourrissons de quelques jours.

Indications. — Gastro-entérites, Diarrhées infantiles, Eczémas, Réalimentation.

Dose. — De 60 à 200 gr. de poudre par jour pour 400 à 1.300 gr. d'eau suivant l'âge du nourrisson.

Littérature et échantillons :

LE LAIT GUIGOZ

19, rue Jean-Jacques-Rousseau — PARIS (1^{er}).

Tél. : Gutenberg 73-00.

Le *Lait en poudre Guigoz*, voir page 941.

BABEURRE « LA FAYE »

Préparé avec du lait frais à la Ferme de « La Faye » à Marlhès (Loire).

Présentation :

- 1° Babeurre ordinaire (étiquette blanche) aux farines, aussi nourrissant que le lait, d'une digestion très facile. Pour les enfants et les adultes.
- 2° Babeurre léger (étiquette bleue) sans farine, alimentation transitoire, d'une digestion extrêmement facile, convient tout particulièrement aux enfants débiles, aux prématurés, aux vomisseurs. Est tout indiqué également pour les hépatiques.
- 3° Babeurre gras (étiquette rouge) suralimentation. Dans la convalescence, la croissance, peut remplacer le Yoghourt. Plus nourrissant et plus digestible que le lait.

Fournisseur des Hôpitaux, des municipalités de Lyon et de Saint-Etienne depuis 25 ans.

Echantillons et littérature sur simple demande :

JEAN COURBON LA FAYE

Ferme de « La Faye »
MARLHES (Loire).

BABEURRE sec NESTLÉ

“ ÉLÉDON ”

Babeurre acidifié, en poudre, préparé par Nestlé, destiné à la diététique et à l'alimentation normale des nourrissons, enfants et adultes atteints de troubles digestifs.

Composition :

| | | |
|---------------------------|------|---------|
| Matière grasse..... | 14,0 | p. 100. |
| Matières protéiques | 29,5 | — |
| Lactose..... | 40,0 | — |
| Cendres | 6,5 | — |
| Acide lactique..... | 6,0 | — |
| Eau | 4,0 | — |

Pureté absolue (ne contient à l'avance ni sucre, ni farine).

Composition constante, conservation parfaite, bonne valeur nutritive.

Indications. — Diarrhées banales ou graves de l'enfant ou de l'adulte. Dermatoses du nourrisson, Alimentation des intolérants au lait, des prématurés et des enfants menacés par les troubles digestifs (colonies.)

Posologie. — (Voir tableau sur l'étiquette de la boîte).

Prix : la boîte de 250 gr. : 12 francs.

Société NESTLÉ

6, avenue César-Caire — PARIS (VIII^e).

BACILLACTINE NUTRICIA

Ferments lactiques purs vivants.

Forme. — Comprimés et ampoules buvables; (Bacillactine); poudre (Oto-Rhino-Bacillactine).

Indications. — 4 à 8 comprimés ou 1 à 2 ampoules par jour, selon l'âge (le tiers de la dose 1/2 heure avant ou après chaque repas) dans les affections gastro-intestinales, *les troubles digestifs des nourrissons*, rougeurs, eczémas, croûtes de lait, urticaires, digestions laborieuses, les lésions inflammatoires du milieu buccal, etc. Les doses indiquées peuvent être forcées sans aucun inconvénient.

Nota. — La date limite d'utilisation est mentionnée, intérieurement et extérieurement, sur toutes les boîtes de Bacillactine Nutricia; elle vous garantit la fraîcheur et l'activité du produit.

Prix : 10 francs.

Laboratoires NUTRICIA

142, rue Fransman — BRUXELLES II.

BACKERINE

ACTIVÉE

Ferments du Docteur de BACKER et sels de magnésie. Modifiant l'organisme par développement des agents de fermentation.

Formes. — Ampoules Injectables de 1 cc, ampoules Buvables de 5 cc, cachets, dragées.

Indication. — Traitement de toutes les hyperplasies (tumeurs, néoplasmes, fibromes, épithéliomas, carcinomes, sarcomes, etc.).

Mode d'emploi. — Injecter une ampoule SOUS LA PEAU, tous les quatre à six jours ou une à deux ampoules Buvables tous les deux jours. On prescrira en même temps l'usage des dragées ou des cachets de ferments et de sels magnésiens, qui augmentent l'efficacité des injections. Prendre avant les repas, quatre cachets ou huit dragées par jour en moyenne, plus dans les cas d'urgence.

La boîte de 8 ampoules : 25 francs.

La boîte de cachets ou de dragées : 16 francs.

La boîte de 12 ampoules Buvables : 20 francs.

LABORATOIRE AMIDO

A. BEAUGONIN, Pharmacien

4, place des Vosges — PARIS (IV^e).

BACTÉ-PHAGES

du Professeur d'Hérelle.

Préparations de Bactériophages mono ou polymicrobiens.

Mode d'action. — Le Bactériophage de d'Hérelle est un principe :

- 1° Qui détruit et dissout les bactéries.
- 2° Qui se régénère au cours de la lyse.
- 3° Dont l'action lytique se transmet indéfiniment.

Avantages :

- 1° Action puissante et rapide.
- 2° Innocuité absolue.
- 3° Pas de contre-indication.

I. — BACTÉ-INTESTI-PHAGE

Composition. — Mélange de bactériophages polyvalents adaptés aux microbes des voies intestinales (Entérocoques, Coli, Staphylocoques, Streptocoques, etc.).

Indications. — Entérites, Colites, Diarrhées infantiles.

Mode d'emploi — Ingestion buccale : Une ampoule matin et soir dans 20 cent. cubes d'eau alcaline.

Boite 10 comp. Prix : 30 francs.

II. — BACTÉ-COLI-PHAGE

Composition. — Mélange de bactériophages adaptés à de nombreuses variétés de bacilles Coli ou paracoli.

Indications. — Colibacilluries, Pyélites, Pyélonéphrites, Cystites, Métrites, Prostatites, etc.

Mode d'emploi. — Ingestion buccale : une ampoule matin et soir dans 20 cent. cubes d'eau alcaline. Instillation vésicale. (Voir notice explicative.)

Boîte de 10 amp. de 2 cc. Prix : 30 francs.

Très important. — L'action du Bacté-Coli-Phage est nulle en milieu acide. Il est donc nécessaire d'obtenir l'alcalinisation des urines.

III. — BACTÉ-PYO-PHAGE

Composition. — Mélange de bactériophages polyvalents adaptés aux microbes des infections purulentes (Staphylocoques, Streptocoques, Coli, etc.).

Indications. — Furoncles, Anthrax, Panaris, Phlegmons, Ostéites, Plaies infectées.

Mode d'emploi. — Injection « in situ » (méthode RAIGA) dans le foyer même de l'infection ou dans la région enflammée pouvant passer rapidement à l'état aigu.

Boîte de 10 amp. 2 cc. Prix : 30 francs.

Boîte de 4 amp. 2 cc. Prix : 18 francs.

IV. — BACTÉ-STAPHY-PHAGE

Composition :

Mélange de bactériophages adaptés aux diverses variétés de Staphylocoques (Aureus-Citreus-Albus).

Indications :

Furunculoses aiguës et chroniques, Anthrax, Infections urinaires à staphylocoques.

Mode d'emploi :

Injections « in situ » (méthode RAIGA).

Applications locales en cas d'ulcération.

Boîte de 10 amp. 2 cc. Prix : 30 francs.

Boîte de 4 amp. 2 cc. Prix : 18 francs.

V. — BACTÉ-RHINO-PHAGE

Composition. — Mélange de bactériophages polyvalents adaptés aux microbes du rhino-pharynx (Staphylocoques, Streptocoques, Pneumocoques, Entérocoques, etc.).

Indications. — Grippe, Coryza, Rhinopharyngites, Otites, Sinusites.

Mode d'emploi. — Pulvériser suivant la gravité des cas la valeur d'une ou plusieurs ampoules au moyen du pulvérisateur spécial : Pulvolyseur Ercé.

Boîte de 10 amp. 2 cc. Prix : 30 francs.

Boîte de 4 amp. 2 cc. Prix : 18 francs.

VI. — BACTÉ-DYSENTÉRI-PHAGE

Composition. — Mélange de bactériophages polyvalents adaptés aux microbes de la dysenterie bacillaire (Flexner, Shiga, Hiss).

Indications. — Dysenteries bacillaires sous toutes les formes.

Mode d'emploi. — Ingestion : Une ampoule dans un demi-verre d'eau ordinaire froide ; répéter la dose de quatre en quatre heures.

Boîte de 10 amp. 2 cc. Prix : 30 francs.

Agents Généraux:

Laboratoires ROBERT et CARRIÈRE
37, rue de Bourgogne — PARIS.

BACTÉ-RICYL

Antiseptique physique.

agissant par sa Tensio-Négativité.

Puissant bactéricide. Non toxique. Non irritant.

(Odeur et goût agréables — Ne tache pas le linge.)

Composition. — Solution stable, concentrée de ricinoléate de sodium à 20 p. 100.

Indications. — Désinfection de la cavité bucco-pharyngienne. Angines, Amygdalites. Stomatites. Gingivites. Prévention des maladies infectieuses à point de départ pharyngé : Gripes. Fièvres éruptives. Maladies épidémiques. Soins gynécologiques et obstétricaux : Leucorrhées, Vaginites (blennorragiques ou autres). Ulcérations de toute nature, etc.

Mode d'emploi :

Gargarismes, lavages buccaux, pulvérisations :

1 mesure de la pipette jaugée (ou 1/2 cuillerée à café) pour un grand verre d'eau.

Lavages gynécologiques et chirurgicaux :

2 mesures de la pipette jaugée (ou 1 cuillerée à café) pour 1 litre d'eau.

Prix : 10 francs.

Laboratoires A. WELCKER

72, rue du Commerce — PARIS (XV^e). Tél. : Vaugirard 42-40.

BACTIOXYNE

Formes. — Gouttes.

Ampoules pour instillations rectales.

Ampoules pour injections intraveineuses.

Propriétés thérapeutiques. — Manganate calcico-sodico-potassique. Médication antibacillaire, hyperoxydante et recalcifiante.

Indications. — Prétuberculose ganglionnaire et osseuse.

Posologie. — LX à C gouttes 2 fois par jour, de X à XXX gouttes pour les enfants ; en augmentant progressivement de 1 à 2 par jour.

Prix de vente au public : 25 francs.

Laboratoires CARTERET

15, rue d'Argenteuil — PARIS (I^{er}).

BAIN BAGNOR RADIO-ACTIF

Seul approuvé et autorisé par l'établissement thermal de **BAGNOLES-DE-L'ORNE**.

Composition. — Synthèse des éléments minéraux du complexe salin de **BAGNOLES-DE-L'ORNE**. Suractivé par le bromure de radium, l'alun et le bicarbonate de soude.

Présentation. — Un paquet de mélange salin pour un bain de 200 litres. A faire dissoudre au moment de l'emploi.

Indications. — Troubles circulatoires de toutes natures. Phlébites, Varices, Stase veineuse, Rhumatismes chroniques, Névralgies et toutes affections douloureuses.

Posologie. — Cure intensive : 3 bains par semaine pendant 6 semaines.

Cure d'entretien : 1 bain par semaine.

Laboratoires G. TIXIER

55, rue du Centre — PANTIN (Paris-est).

BAIN CARBOGAZEUX WOLO

Forme. — Poudres dont les dissolutions successives dans l'eau du bain sursaturent cette eau d'acide carbonique.

Indications. — Maladies des organes circulatoires (Cœur, Hypertension, Artério-sclérose), Maladies dites d'échanges internes (Goutte, Rhumatismes), du Système nerveux (Névralgie, Neurasthénie, Surmenage cérébral, etc.).

Mode d'emploi. — Verser successivement les sachets 1 et 2 dans le bain en brassant l'eau. Se plonger dans l'eau en laissant agir le dégagement gazeux. La température sera de 30 à 35 degrés, sauf indications spéciales du médecin. Durée du bain : 15 à 20 minutes.

Prix : 8 fr. 45.

Laboratoires FISCH et Cie
4, rue d'Illzach — MULHOUSE

Agence à PARIS :
104, faubourg Poissonnière (X^e).
Tél. : Lamartine 92-52.

BAIN CARRÉ

Bain marin complet.

Composition. — Bain iodo-bromo-chloruré, renfermant intacts tous les sels marins naturels.

Indications. — *Adultes* : nervosisme, asthénie, surmenage, convalescences, rhumatisme, arthritisme.

Enfants : Débilité, lymphatisme, troubles de la croissance, rachitisme.

Gynécologie : Traitement des affections gynécologiques, irrigations vaginales hygiéniques.

Mode d'emploi. — *Adultes* : 1 boîte par bain.

Enfants : 1/2 ou 1/4 de boîte suivant la capacité de la baignoire.

Bains toniques et stimulants : 28° à 34°, 15 minutes.

Bains sédatifs : 34° à 39°, 25 à 40 minutes.

Injectons vaginales : une cuillerée à soupe par litre d'eau chaude.

Prix : 6 francs.

LANCOSME

71, avenue Victor-Emmanuel-III — PARIS (VIII^e.)

BAIN FLÉVAR

Minéral, Synthétique, Radifère.

Traitement à domicile des : Phlébites, Varices, Hémorroïdes et des Troubles de la Circulation veineuse.

Le « FLEVAR » se présente sous la forme d'une poudre qui, par ses analogies chimiques avec les eaux les plus réputées des Sources thermales azotées et chloro-sulfatées calciques et par ses propriétés radio-actives contrôlables, donne à l'eau du bain, pris chez soi, les mêmes résultats thérapeutiques.

LE BAIN FLEVAR produit 250 millimicrocuries d'émanation du Radium (Radon) par bain de 200 litres d'eau.

Son dosage est contrôlé par le service de mesures de l'Institut du Radium.

Il ne se recommande d'aucune station. — Il convient à toutes.

Prix de la boîte pour un bain : 10 francs (impôt compris).

Fabrication et dépôt général :

Laboratoires Pharmaceutiques L. G. TORAUDE

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V^e).

BAIN SALVIA

(Un traitement « aux Eaux » chez soi.)

Composition. — Silicate de magnésie hydraté, bi-carbonate de sodium perborate de sodium, nitrate d'uranium.

Présentation. — Poudre en étui, chaque étui pour un bain.

Indications. — Stases veineuses (Varices, phlébites), arthritisme, rhumatismes et dépression générale. Soins gynécologiques.

Posologie. — Un bain à la température d'environ 37°, pendant 20 minutes, traitement de 21 jours. En gynécologie : 1 cuill. à soupe par litre d'eau.

Prix de la cure de 21 bains Salvia au public : 136 fr. 50 ;
au corps Médical, 91 fr. 50.

Les personnes qui ne peuvent se rendre à une station thermale peuvent faire leur saison chez elles par une série de 21 « Bains Salvia » pendant 21 jours consécutifs.

Cette série peut être encore ordonnée de temps à autre, entre deux cures « aux eaux ».

Pilules Salvia : Traitement interne des stases veineuses, varices, hémorroïdes, ménopause, puberté, par l'extrait mou de *Teskra*.

L'étui de 30 pilules : 15 francs.

Laboratoires VENOT

139, avenue Emile-Zola — PARIS (XV°).

BALDISÉDAN

BALsamique, Diurétique, SÉdatif, ANTiseptique.

Présentation. — Flacon de 50 pilules glutinisées.

Composition. — ACIDE CAMPHORIQUE, hexaméthylène-tétramine, térébenthine de Venise, extrait mou d'uva-ursi, salol, benzo-naphtol.

Indications. — Cystites, Colibacilluries et toutes Pyuries, Pyélo-néphrites, Cholécystites, Gonorrhées et toutes complications.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique et *sédatif* génito-urinaire. Antiseptise et clarifie les urines par modification du pH urinaire.

Contre-indication. — Aucune, tolérance parfaite.

Posologie. — 4 à 5 pilules avant chaque principal repas.

Prix : 16 francs.

Laboratoires Robert COLAS,

133, rue Lecourbe — PARIS.

Tél. : Vaugirard 48-10.

BALLOTYL

Agent le plus efficace
de la **Phytothérapie antispasmodique**
Sédatif du grand sympathique.

Composition. — Ballote stabilisée.

Deux formes pharmaceutiques. —
Gouttes et dragées.

Posologie. — Irritabilité nerveuse, Insomnie, L à C gouttes au coucher ou 1 à 3 dragées.

Etats sympathicotoniques ou vagotoniques,
5 prises de XXX gouttes ou 3 à 5 dragées
par 24 heures.

Prix au public : 15 francs.

**Laboratoire de PHYTOTHERAPIE
de PARIS**

M. GUILLON, Pharmacien.

113, boulevard Voltaire — PARIS (XI^e).

BALMIGA

Tablettes fumigatoires.

Forme pharmaceutique :

Tablettes comprimées effervescentes.

Composition :

Baume du Pérou, Huile de pin sylvestre, Essence d'eucalyptus, Essence de thym, Essence de menthe, Menthol.

Action :

Antisepsie des voies respiratoires par inhalation.

Indications :

Grippe, Bronchite, Extinction de voix, Coryza, Rhinite, Sinusite, Laryngo-trachéites.

Mode d'emploi :

Mettre successivement deux ou trois tablettes *Balmiga* dans un verre d'eau bouillante et prendre deux ou trois fumigations par jour.

Prix : 6 francs.

Laboratoires du Docteur Pierre ROLLAND
Dépôt : 127, Bd St-Michel — PARIS (V^e).

BALNÉRADOL

Bain radioactif en comprimés

Avantages — Action rapide. Dosage facile (bains locaux ou généraux).

Principes actifs — Bromure de Radium, Oxygène naissant, Extrait d'Hamamélis.

Présentation — Comprimés de 4 gr. parfumés à l'essence de pin.

Effets thérapeutiques et Indications. — Action régulatrice des fonctions circulatoires (varices, phlébites, âge critique, artériosclérose). — Stimulation générale de l'organisme (états anémiques, convalescences). — Vitalisation des cellules cutanées. — Action sédative puissante (algies, rhumatismes chroniques, états neurasthéniques et dépressifs).

Doses. — Grand bain, 8 comprimés. Bain local, 1 à 2 comprimés. (Teneur en Radium élément : 33,5 millicrocuries par comprimé).

Prix : 12 francs la boîte de 16 comprimés.

Publicité. — Exclusivement médicale.

Établissements LABORADIUM

33, rue Saint-Jacques — PARIS (V°).

BALSAMOL LESCÈNE

Composition. — Drosera, Scille, Chlorocinnamates, Benzoate et adényde benzylique.

Formes. — Sirop, Comprimés.

Caractéristiques. — Produit non toxique plus calmant que le bromoforme, les composés forméniques et les narcotiques. *Chez les enfants*, il peut être administré à partir de 5 à 6 mois.

Antiseptique des voies respiratoires. Expectorant, Diurétique, Toni-Cardiaque.

Indications. — TOUX, COQUELUCHE, toux émétisante des tuberculeux, asthme *pour des vieillards*. BRONCHITES, GRIPPE, INSOMNIES.

Doses. — *Enfants* de plus de 6 mois : 3 à 10 cuillerées à café par jour suivant l'âge, ou 3 à 10 comprimés.

Adultes : 3 à 5 cuillerées à soupe par jour ou 6 à 15 comprimés par jour. *Insomnies* : 1 cuillerée à soupe le soir au coucher ou pendant la nuit.

Prix : Sirop, 12 francs. Comprimés, 11 fr. 90.

Laboratoires LESCÈNE

PARIS, 58, rue de Vouillé. — LIVAROT (Calvados)

Téléph. : Vaugirard 08-19.

BALSOFORME

Mélange de Schleich
additionné de Gomenol Prevet
(formule du docteur Siauve-Evausy).

Le Balsoforme associe les propriétés du mélange de Schleich à l'action balsamique du Gomenol.

Indication. — **Anesthésie générale, exempte de complications pulmonaires post-anesthésiques.**

Présentation et mode d'emploi. — Ampoules compte-gouttes de 60 grammes. S'administre à l'aide de l'appareil d'Ombrédanne. Une ampoule suffit pour une anesthésie de plus d'une heure.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

BANDE de Crêpe NÉOPLASTEX

en filés Lastex.

Par sa *Plasticité*, **NÉOPLASTEX** est la bande qui épouse sans plis, ni creux, toutes les formes du corps et du visage. Par son *Maintien en place*, **NÉOPLASTEX** rend inutile les renversés, nécessaires jusqu'ici, et l'épingle de fixation (par le glissement de l'extrémité sous la partie déjà bandée).

Par sa *Résistance* à toutes températures, **NÉOPLASTEX** peut être lessivée, repassée au fer chaud et même stérilisée. Par la Conservation du pouvoir qu'elle a de s'étirer et de se rétracter après des usages et des lavages répétés, **NÉOPLASTEX** est une bande vivante et de durée presque illimitée.

Par sa *Minceur*, sa *Légèreté*, son *Invisibilité*. **NÉOPLASTEX** est la bande élégante par excellence, qui s'impose pour les pansements extérieurs ou ceux placés sous des vêtements transparents (bas les plus fins, étoffes ajourées, etc.).

NÉOPLASTEX est la Bande Idéale de Pansement et de soutien. Se fait en 6 cm. et 8 cm. de large.

NÉOPLASTEX

71, Faubourg Saint-Martin — PARIS (X^e).

Dépôts :

O. C. P., 71, rue du Temple — PARIS (III^e).

C. G. P. F., 9 bis, rue Antoine-Bourdelle — PARIS.

BASEDOWINE

Indications. — Maladie de Basedow frustre et constituée. Nervosisme féminin. Instabilité thyroïdo-ovarienne. Psychismes thyroïdo-ovariens. REGLES DOULOUREUSES et PUBERTE.

Composition. — Thyroxine synthétique dosée en quantité extrêmement faible (0 gr. 000125 par comprimé), Ovarine et Hormone Ovarienne lipodique acétosoluble, un dérivé du Bromure en très faible dose.

Particularités. — Médication parfaitement inoffensive.

Traitement d'essai de toutes les déficiences et irrégularités du système sympathico-endocrinien chez la femme.

Posologie. — 2 comprimés le soir au coucher 5 fois par semaine. (A continuer sans danger.)

Prix : 20 francs.

Laboratoire R. GALLIER

38, boulevard Montparnasse — PARIS (XV^e).

BAUME ADOL

Composition. — Préparation à base de : Acide salicylique, Salicylate d'Amyle, *Gaïacol*, Menthol, Chloroforme.

Action thérapeutique. — Analgésique puissant anti-rhumatismal. Suppression de l'odeur désagréable du salicylate de méthyle: *Décongestionnant antifièvre. Action précieuse dans les affections bronchiques et pulmonaires (Gaïacol).*

Indications. — Rhumatismes aigus ou chroniques, goutte, lumbago, *lorticolis*, zona, sciatique, névralgies, migraines, coliques hépatiques et néphrétiques, orchites, etc...

Mode d'emploi. — Faire une friction légère et une onction et recouvrir d'ouate et de tissu imperméable. Une à deux applications par jour.

Prix : 8 fr. 50.

Laboratoire ADOL

L. GIROUD, Pharmacien de 1^{re} classe

78, Cours de la Liberté — LYON.

BAUME AROMA

Spécifique des rhumatismes et des douleurs en général.

Composition et forme. — Baume à base d'essence de plantes aromatiques et des constituants du liniment de Rosen.

| | | | |
|---------------------------|----|--------------------------|---|
| Essences aromatiques..... | 6 | Salicylate d'amylo | 4 |
| Beurre de muscades | 2 | Acide salicylique..... | 3 |
| Vaseline... .. | 60 | | |

Propriétés thérapeutiques. — Analgésique et résolutif puissant.
Odeur agréable.

Indications thérapeutiques. — Rhumatisme aigu et chronique, goutte, lumbago, torticolis, efforts et toutes douleurs musculaires, courbatures, névrites, sciaticques crurale et brachiale, pleurésie sèche, points de côté, foulures, varices.

Mode d'emploi. — Frictionner doucement et longtemps avec le baume pour en faciliter la pénétration recouvrir avec une feuille de coton ordinaire que l'on maintiendra par une bande ou une ceinture, suivant qu'il s'agit d'un membre ou du thorax et des reins.
Faire cette friction suivie du pansement une à deux fois par jour.

Prix : 8 fr. 90.

Laboratoires MAYOLY-SPINDLER

1, place Victor-Hugo — PARIS (XVI^e).

A Bruxelles : LE MARINEL, pharm. 4 avenue Orban Van Volxem.

BAUME BENGUÉ

Analgésique.

Composition. — Menthol, salicylate de méthyle, lanoline.

Indications. — Rhumatisme, goutte, névralgies, points de côté, douleurs abdominales, douleurs de la gorge.

Mode d'emploi. — En onctions deux fois par jour en recouvrant d'une serviette ou flanelle.

Prix : 8 fr.

Docteur BENGUÉ

Pharmacien

16, rue Ballu — PARIS (IX^e).

BAUME DAYNOC

Le spécifique des brûlures.

Le BAUME DAYNOC offre la solution définitive et complète du traitement des brûlures de tous degrés, par son efficacité absolue et la simplicité de son emploi. En effet, une seule application *immédiate*, en couche épaisse, supprime instantanément la douleur et empêche les phlyctènes ; donc pas de plaie.

Aucune préparation préliminaire n'est nécessaire. On étend le BAUME sur toute la surface de la brûlure tel qu'il sort du tube. La peau n'est jamais tachée.

Indications. — Brûlures causées par flamme vive, graisse bouillante, courant électrique, sucre cuit, eau bouillante, vapeur, charbon rouge, métal chauffé à blanc, verre en fusion, etc., toutes sans exception, de la plus légère à la plus grave, relèvent du BAUME DAYNOC.

Prix du grand tube 15 fr. 95 (impôt compris).

Prix du petit tube 8 fr. 50 (impôt compris).

Laboratoires A. LEJEUNE

142, rue de Picpus — PARIS (XII^e).

BAUME DELACOUR

Gerçures et Crevasses des Seins

Gerçures en général.

Baume benzo-tannique

Mode d'emploi. — Laver la crevasse avec de l'eau bouillie et un tampon d'ouate, appliquer le baume et recouvrir les mamelons avec les bouts de sein en métal afin d'éviter le frottement du linge.

Prix du flacon avec deux bouts de sein :
6 fr. 50.

Henry ROGIER, Docteur en Pharmacie

56, boulevard Péreire — PARIS.

BAUME DE LA MATERNITÉ

Composition :

| | |
|------------------------------|-------|
| Chlorhydrate d'amyléine..... | 0,10 |
| Résorcine..... | 0,20 |
| Acide borique..... | 2 gr. |
| Dermatol | 0,50 |
| Baume du Pérou | 0,10 |
| Lano-vaseline..... | Q. S. |

pour un tube.

Propriétés thérapeutiques. — Cicatrisant énergique des crevasses du sein et de toutes les gerçures.

Indications. — Erythème fessier, toutes gerçures en général.

Prix, le tube : 5 fr.

Dépôt : **Laboratoires NOGUES**
7, rue Galvani — PARIS.

BAUME DU D^r BAISSADE

adopté par les hôpitaux de Paris (Saint Louis), et de province; par les Ministères des Colonies et de la Marine.

Composition. — Association de camphre, soufre, goudron, huile de chaulmoogra, de consistance semi-fluide, d'odeur agréable.

Action. — Anti-prurigineux et analgésique, supprime immédiatement les démangeaisons et la douleur. Antiseptique puissant, calme et arrête l'élément inflammatoire des lésions cutanées.

Aucune causticité ; peut être appliqué sur les Eczémas les plus aigus et les plus récents, aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte.

Indications. — Eczémas suintants, secs, aigus, chroniques. Tous les prurits, avec ou sans lésion cutanée. Lichen, Psoriasis, Acné, Folliculites, Furunculose, Impétigo, Séborrhée de la barbe et du cuir chevelu, Sycosis, Gerçures des seins, Papules et Pustules des fièvres éruptives.

Mode d'emploi. — En onction douce (Dermites aiguës), ou énergiques (Dermites chroniques) sur les parties malades, à la main nue ou à l'aide d'un tampon de coton. Recouvrir d'une compresse de gaze.

Un pansement par jour, le soir de préférence.

Ne pas laver la région traitée avant complète guérison ; se contenter d'essuyer et de détacher les squames épidermiques avec un linge.

Prix au public : 10 fr. et 15 fr. 50.

Laboratoire du Baume du D^r BAISSADE

Saint-Loup — MARSEILLE.

BAUME

du Dr Serin de Gaillac.

Indications. — Rhumatismes, Maux de reins, Goutte, Sciaticques, Lumbagos, Torticolis, Entorses, Foulures, Courbatures, Efforts, Névralgies.

Composition. — Pommade en tube à base de térébenthine, Acide orthoxybenzoïque — Extr. Atropa belladonna, odeur agréable.

Mode d'emploi. — Onction deux fois par jour, et recouvrir d'une serviette ou d'une flanelle.

Avantages. — Action sédative résolutive, analgésique.

Prix au public : 10 fr.

Laboratoires BARBESSOU
MARMANDE (Lot-et-Garonne).

BAUME DURET

Créé et adopté à l'hôpital Saint-Louis
(Dermatothérapie).

Composition. — Combinaison de soufre, goudron de Norvège, camphre, huile de cade, résorcine, borate de soude, gaïacol, dans un mélange d'acétone, huile de ricin, lanoline.

Propriétés. — Antiseptique, analgésique, décongestif et cicatrisant. Ni toxique, ni irritant.

Indications. — Eczéma, Lichen, Psoriasis, Acné, Prurigo, Dartres, Parakératoses, Prurit.

Mode d'emploi. — Onction deux fois par jour, recouvrir ensuite d'une compresse de gaze.

Prix : 15 francs.

Enregistré au Laboratoire National du Contrôle des
Médicaments sous le n° 306-3.

H. ROUTIER, Pharmacien de 1^{re} classe
20, rue Saint-Lazare — PARIS.

BAUME LARTIGOL

A base de chloral, camphre, acide salicylique et menthol. Odeur agréable, incolore.

Mode d'emploi. — Etendre avec les doigts sur la région douloureuse et faire des frictions douces pendant 5 minutes.

Indications. — Contre les névralgies et douleurs de toute nature.

Prix. Le tube : 13 fr. 85.

Établissements FUMOUCHE

78, faubourg Saint-Denis — PARIS.

BAUME-PANTHÉSINE « SANDOZ »

A base de Panthésine « Sandoz », anesthésique local.

Propriétés. — Calmant analgésique non révulsif pour toute douleur et névralgie *accessible extérieurement* (douleurs musculaires, articulaires, cutanées) et pour toute démangeaison. Modère les processus inflammatoires en neutralisant par sa réaction basique l'acidité des tissus enflammés et en supprimant les réflexes axoniques.

Indications. — Névralgies intercostales, pleurodynie, névrites, artralgies. Rhumatisme aigu et chronique. Pseudo-rumatisme infectieux. Sciatique. Contusions douloureuses. Coup de soleil. Erythème actinique. Lumbago. Crises hémorroïdales, tout prurit.

Prix : 1/2 tube : 7 francs. — Tube entier (20 gr. env.) : 12 francs.

Produits SANDOZ

20, rue Vernier — PARIS (XVII^e).

BAUME RHODIA

à base de Rheumacylal
(Salicylate de Glycol)

Succédané inodore du salicylate de méthyle.
Ne tache pas le linge.

Indications :

**Traitement externe des douleurs
rhumatismales et des névralgies.**

Présentations et mode d'emploi :

Deux présentations : Forme liquide et
forme crème.

Onctions légères suivies d'enveloppement
ouaté non compressif.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

BAUME ROBERNARD

Composition :

| | |
|----------------------|------|
| Pl. oxy. Fus..... | 30 |
| Phénol Salicyl. | 4 |
| Novoc..... | 0,30 |
| Ad. Lane C. Aq. | 25 |
| Vaseline | 75 |

Propriétés. — Antiseptique, calmant, cicatrisant,
favorise l'épidermogenèse.

Indications. — Coups de soleil, préventif, curatif,
brûlures, à quelque degré qu'elles appartiennent,
infectées ou non. Dermatoses. Eczémas, secs et
suintants.

Mode d'emploi. — Une application matin et soir
Prix : 6 francs.

Dépôt général :

Pharmacie MODERNE

rue Victor-Hugo — MAULEON-SOULE
(Basses-Pyrénées).

BAUME SÉLÉNIA

AU SÉLÉNIUM COLLOIDAL

Propriétés thérapeutiques. — Il en est quatre principales :

Le **Baume Sélénia** est *décongestif*, calme la *démangeaison*, le *prurit*, décape les *téguments*, est *cicatrisant*.

Indications. — Il est le médicament de choix dans le traitement des *Eczémas*, *Pyodermites*, *Ulcérations de la peau*, *Bouton d'Orient* (Clou de Biskra).

Mode d'emploi. — S'applique à froid, mais de *préférence à chaud*, l'action étant ainsi plus immédiatement calmante et plus grande. Dans ce cas, liquéfier le Baume complètement au bain-marie.

Prix du pot : 13 francs.

Echantillon envoyé sur demande.

Préparé par **C. DAVID et ses fils**

Pharmaciens, 49, rue de Bitché — COURBEVOIE (Seine).

BAUME SUELTA

OU POMMADE A L'ESCULÉOL

Composition. — Extrait de Marrons d'Inde stabilisé. Di-Iodosulforésorcinate de Bismuth, Stovaine, Adrénaline, Baume du Pérou, Oxyde de zinc.

Indications et propriétés. — Traitement local des Hémorroïdes externes et internes, fissures, prurit anal. **Sédation immédiate de la douleur, décongestion et vaso-constriction**, anti-sepsie, suppression des hémorragies.

Mode d'emploi. — Onction le matin et après chaque garde-robe. Pansement pour la nuit. Une canule s'adapte au tube pour permettre l'application de la Pommade sur les Hémorroïdes internes.

Prix : 13 francs.

Peut être prescrit aux Assurances Sociales.

MICHEL DELALANDE

16, rue Henri-Regnault — COURBEVOIE (Seine).

BAUMIX

Formule :

| | |
|---------------------------|-----------|
| Menthol | 0 gr. 281 |
| Calomel à la vapeur | 2 gr. 81 |
| Peroxyde de zinc | 7 gr. 025 |
| Baume du Pérou | 5 gr. 62 |
| pour 100 gr. | |

N° d'inscription au Laboratoire de Contrôle 322-1.

Indications thérapeutiques. — Ulcérations variqueuses. Brûlures et toutes plaies de toute nature.

Chaque pot est accompagné d'un mode d'emploi très détaillé.

Livré en pot aluminium de 60 cgr.

Prix : 9 francs.

Toutes Pharmacies et Pharmacie DELAPRÉE
MORTAGNE-SUR-SEVRE (Vendée).

BAUMOLACPINE

pour bains à l'essence de pin.

Forme. — Liquide de fluorescence verte.

Composition. — Essence de pin soluble dans l'eau, ne salissant pas les baignoires.

Indications. — Convalescence, Faiblesse, Débilité, Anémie, Maladies nerveuses, Rhumatismes, Arthritisme.

Posologie. — Une à deux cuillerées à soupe par bain.

| | | | | |
|--------|---|-----------|--------------|-----------|
| Prix : | { | Flacon de | 30 gr ... | 5 fr. 80 |
| | | — de | 150 gr.... | 23 fr. 80 |
| | | — de | 500 gr,... | 60 fr. » |
| | | — de | 1 000 gr.... | 110 fr. » |

Laboratoires FISCH et C^{ie}

4, rue d'Ilzach — MULHOUSE

Agence à Paris : 104, faubourg Poissonnière.

Tél. : Lamartine 92-52.

BÉATOL

Propriétés thérapeutiques. — Sédatif nerveux. Hypnotique.

Indications. — Insomnies, Affections aiguës et chroniques, Intoxications, Maladies nerveuses ou mentales.

1^{re} Forme : AMPOULES

Composition :

| | |
|---------------------------------|---------|
| Diéthylmalonylurée | 0,125 |
| Bromhydrate de scopolamine..... | 0,00012 |

Pour 1 cc. en ampoules de 2 cc.

Mode d'emploi. — Le contenu d'une ampoule en injection sous-cutanée.

2^e Forme : LIQUIDE

Composition :

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Diéthylmalonylurée | 0,18 |
| Extrait de jusquiame | 0,015 |
| Extrait fluide de valériane | 0,10 |

Pour une cuillerée à café.

Mode d'emploi.

- a. *Calmant nerveux* : 1 cuillerée à café le matin au petit déjeuner; renouveler, suivant besoin, dans la journée, la dose de 1 cuillerée à café.
- b. *Hypnotique* : 1 cuillerée à café avant le repas du soir et une seconde cuillerée à café au coucher à prendre dans de l'eau ou une infusion, une troisième cuillerée à café dans la nuit, si besoin.

3^e Forme : COMPRIMÉS

Composition :

| | |
|----------------------------|------|
| Diéthylmalonylurée | 0,18 |
| Intrait de valériane | 0,10 |
| Extrait de jusquiame | 0,02 |

Pour un comprimé.

Mode d'emploi :

- a. *Calmant nerveux* : 1 comprimé le matin au petit déjeuner ; renouveler, suivant besoin, dans la journée la dose de 1 comprimé.
- b. *Hypnotique* : 1 comprimé avant le repas du soir et un second au coucher à prendre dans de l'eau ou une infusion, un troisième comprimé dans la nuit, si besoin.

Prix de vente au public :

Comprimés : 14 francs. — *Liquide* : 14 francs.

Ampoules : 18 francs.

Laboratoires LOBICA

46, avenue des Ternes — PARIS (XVII^e).

BEEF LAVOIX

ou Vin de Lavoix.

Composition. — A base de vieux vin de Banyuls, le Beef Lavoix contient les principes nutritifs de la viande, les principes actifs du quinquina et des phosphates.

Indications. — Convalescence.
Tuberculose.
Epuisement.
Inappétence.
Anémie.
Grossesse.
Allaitement.

Posologie. — Un verre à madère avant ou après chaque repas.

Prix : le flacon, 20 fr. 75 ; le 1/2 flacon, 12 fr. 50

Maison du Docteur PILLET
5, avenue Victoria — PARIS.

BELCARMINE

Association de Belladone, Charbon, Formine.

Formule. — Une cuillerée à café de granulé contient : Teinture de Belladone, teinture de Jusquiame : à à 5 gouttes. Formine 0 gr. 30. Charbon animal 0 gr. 50. Charbon végétal 1 gr.

Présentation. — Granulé fondant de goût agréable.

Indications. — Entérocrites, cholécystites chroniques, angiocholites, fermentations intestinales, constipation chronique, aérophagie.

Mode d'emploi :

Adultes : 2 à 3 cuillerées à café après les repas.

Enfants : 1/2 cuillerée à café 2 fois par jour.

Prix : Flacon modèle courant. 13 francs.

Flacon Cure : 31 francs.

Laboratoire R. THIRODE
Pharmacien de 1^{re} classe
de la Faculté de Nancy.

Ex-Préparateur et Lauréat de Chimie,
33, Grande-Rue — BESANCON.

BELHÉMINE

Ampoules de Sérum pur de Sang de Cheval, Sérum hématopoiétique.

Indications. — Toutes les anémies, hémorragies, fausses-couches. En pansements locaux : plaies, ulcères variqueux, brûlures.

Mode d'emploi. — Par voie buccale : 1 à 2 ampoules par jour.

Prix public : 18 francs la boîte de 6 ampoules.
Compléter le traitement par l'usage de la

SANGUIPLASMINE.

Granulé préparé avec le Caillot sanguin : 2 cuillérées à café par jour.

Prix au public : 12 fr. le flacon.

Littérature et échantillons sur demande :

Laboratoire de Sérothérapie

H. AMMANN, Pharmacien, Licencié ès sciences.
Impasse Adam, 3, BOULOGNE-BILLANCOURT,
Tél. : Molitor 01-90.

BELLADENAL « SANDOZ »

Association de Phényl-éthyl-malonylurée et de Bellafoline.

Sédatif nervin général et des cas résistants.

Indications spéciales. — Epilepsie, angine de poitrine, tremblements, asthme, tous états de crise, anxiété, douleur morale, vomissements de la grossesse.

Présentation. — Tubes de 20 et flacons de 100 et de 500 comprimés.

Boîtes de 5 et de 25 ampoules.

Posologie. — *Comprimés* : 2 à 4 par jour. Dans l'épilepsie, 3 à 5 par jour.

Enfants : 2 à 4 demi-comprimés.

Belladenal injectable : 1 à 4 cc. selon l'intensité des cas.

Prix :

Le tube de 20 comprimés : 12 francs.

La boîte de 5 ampoules : 22 francs.

Produits SANDOZ

20, rue Vernier — PARIS (XVII^e).

BELLAFOLINE « SANDOZ »

Alcaloïdes totaux de la belladone

Antispasmodique à effets constants. Modérateur des sécrétions.

Posologie :

Comprimés : 1 à 2, trois fois par jour.

Gouttes : X à XX, trois fois par jour.

Ampoules : 1/2 à 2 par jour (injections sous-cutanées intramusculaires et intraveineuses indolores).

Sirop : 2 à 6 cuillerées à café par jour.

Naupathie :

Bellafoline : 4 comprimés par jour, un de 2 heures en 2 heures et en plus :

Belladénal : 2 comprimés pris à la fois le soir au coucher.

Prix :

Comprimés : 10 francs. — Gouttes : 12 francs.

Ampoules : 12 francs. — Sirop : 12 francs.

Produits SANDOZ

20, rue Vernier — PARIS (XVII^e).

BELLERGAL « SANDOZ »

Modérateur de l'éréthisme nerveux. Traitement du terrain névropathique et de l'émotivité. Régulateur des dystonies neuro-végétatives. Supérieur aux valérianes et valériانات, plus actif et effets constants.

Composition. — Comprimés dragéifiés renfermant :

Tartrate d'ergotamine (Gynergène) : 0 mgr. 3.

Alcaloïdes totaux de la belladone (Bellafoline), 0 mgr. 1.

Phényl-éthyl-malonylurée : 2 cgr.

Posologie. — *Adultes* : 3 à 4 dragées par jour. Dans les cas résistants, aller jusqu'à 6 dragées par jour puis, quand le calme renaît, revenir à la dose habituelle.

Enfants : 2 à 3 dragées par jour à partir de 5 ans.

Prix :

Flacon de 25 : 12 francs. Flacon de 100 : 42 francs.

Flacon de 250 : 95 francs.

Produits SANDOZ

20, rue Vernier — PARIS (XVII^e).

BENSAMINE

Composition. — Combinaison boro-benzoïque d'Hexaméthylènetétramine. Antiseptique général interne et anti-infectieux puissant. Action combinée du benzoate et de l'urotropine créant dans son absorption humorale et dans son élimination urinaire le milieu acide favorable au dédoublement de l'urotropine en son composant actif, le méthanal (formol).

Indications. — Voies urinaires : urines troubles, alcalines, microbiennes, purulentes. Syndrome entéro-rénal. Pyélites gravidiques, colibacilluries, gravelles.

Etat général : Voies biliaires, coliques hépatiques, ictères, septicémies, rhumatismes, arthralgies.

Formes :

1° Comprimés instantanément solubles à 0 gr. 50 de combinaison active. Dose moyenne : 3 à 6 par jour (avalés ou dissous). — 12 fr. 50

2° Bensamine liquide : Goût agréable, pure ou diluée : 1 cuillerée à café correspondant à 1 comprimé ; 3 à 6 fois par jour. — 14 francs.

Laboratoires BEAUXIS-LAGRAVE

74, quai de Jemmapes — PARIS (X°).

Tél. : Botzaris 38-78.

BENZO-BISMUTH MILLOT

(Ampoules, Antisymphilitique énergique.)

Adopté par le Ministère de la Santé et les Hôpitaux.

Indolores. — Ni abcès. — Ni enkystement.

Le **Benzo-Bismuth**, sel soluble, contient 4 centigrammes de Bismuth métal par injection (soit 0 gr. 20 de sel), quantité nécessaire pour obtenir l'effet thérapeutique maximum avec une absence complète de toxicité, car il s'agit ici de 4 centigrammes de métal intégralement actif puisque intégralement absorbé. Ce qu'on ne peut obtenir avec un sel insoluble.

Le **Benzo-Bismuth**, présenté sous forme de poudre extemporanément soluble, s'injecte dans les muscles de la région fessière haute avec autant de commodité qu'une banale injection de cacylate.

Le traitement se fait par séries de 10, 15 ou 20 injections bi-hebdomadaires ou tri-hebdomadaires en cas d'urgence.

Les résultats thérapeutiques sont tout à fait comparables à ceux qu'on est accoutumé d'attendre des arsénobenzols, sans aucun des dangers ni inconvénients de ces derniers.

Les accidents primaires et secondaires disparaissent rapidement. Les syphilis viscérales et nerveuses sont profondément et durablement influencées.

La réaction de Bordet-Wassermann devient négative dans des délais très courts et reste négative sous l'influence du traitement benzobismuthé.

Vendu en boîtes contenant poudre et solvant pour 5 injections. Prix médical : 12 francs.

Nota. — Le prix médical ne peut être accordé qu'aux commandes adressées directement à nos Laboratoires.

Laboratoires MILLOT

177, rue de Courcelles — PARIS (XVII^e).

Tél. : Étoile 29-54.

BENZOCARBINE

Composition. — Charbon animal chimiquement pur, Formine, Benzonaphtol.

Indications. — Antiseptique intestinal, Aérophagie, Pyrosis, Diarrhées estivales, Appendicite chronique.

Formes. — *Granules* friables homogènes : 1 à 2 cuillers à café par jour à délayer dans un peu d'eau.

Cachets : 3 par jour.

Laboratoire FOUCHERE

RIVE-DE-GIER (Loire).

BENZOFLOLINE JULIEN

Gouttes et Comprimés.

Composition :

| | |
|--|------|
| Benzoate de benzyle et dériv. benzylés. | 10 |
| Extr. fluide valériane fraîche stabil... | 1000 |
| Alcoolature de Passiflora Incarn..... | 1000 |
| Teinture de Cratægeus oxyacantha... | 1000 |

Indications. — Tous les états spasmodiques, Insomnies, Angoisses, Vertiges, Eréthisme cardio-vasculaire, Tachycardies, Arythmies, Palpitations.

Posologie. — Insomnies : L à LX gouttes le soir dans une infusion, ou 1 à 3 comprimés. Spasmes : XXV gouttes ou 1 comprimé 3 ou 4 fois par jour. Prix : Gouttes, 13 fr. Comprimés, 15 fr. — Flacon gratuit sur demande.

Louis JULIEN, Docteur en Pharmacie

105, rue de Rennes — PARIS.

BENZO-IODHYDRINE

La BENZO-IODHYDRINE n'est pas seulement la première réalisation de la cure iodée, sans iodisme (Thèse du Dr Chenal, F. M. Paris, novembre 1896), elle est aussi un corps iodé qui présente une activité thérapeutique très puissante, très étendue et rare parmi les corps iodés.

C'est un médicament iodé hypotenseur diurétique, éliminateur puissant d'acide urique. Ces diverses qualités en font le médicament par excellence des Cardio et des Artérioscléreux, des Goutteux, des Emphysémateux. Chaque capsule de gluten correspond à 30 cgr. de KI.

Doses. — 3 à 10 capsules par jour, aux heures des repas.

Le flacon : 14 francs.

Brochures et échantillons :

G. BRUEL, Pharmacien

36, rue de Paris — COLOMBES (Seine).

BENZOQUINOL

Composition. — Benzoate de quinoléine, pyridine, thymol, benjoin mentholé eucalyptolé, aconit, créosote iodée.

Propriétés. — Antiseptique et anesthésique des voies respiratoires. Sédatif et antispasmodique certain.

Indications. — *Coqueluche, asthme, emphysème, toux nerveuses, dyspnée, bronchites aiguës et chroniques.*

Caractéristiques. — Effet rapide et continu, pas de contre-indication.

Mode d'emploi. — En inhalations, quinze gouttes dans un quart de litre d'eau bouillante, deux à trois inhalations par jour.

Pour les enfants en bas-âge, faire les inhalations au pied du lit dans une chambre bien fermée.

Remarque. — Que le médecin traite la coqueluche par des vaccins, des injections d'éther, de sérum, il est nécessaire de compléter le traitement par des inhalations au benzoquinol.

Prix : 12 francs.

Laboratoires KERFYSI R
DUNKERQUE.

BENZYANYL

Valérianate de benzyle.

Forme. — Capsules glutinisées dosées à 0 gr. 10 de valérianate de benzyle.

Propriétés. — 1° Vasodilatateur et hypotenseur grâce au radical benzyle;

2° Antispasmodique grâce à l'acide valérianique.

Indications. — Hypertension artérielle sous toutes ses formes, Angine de poitrine, Asthme, Coqueluche.

Avantages. — Abaissement simultané de Mx. et de Mn. Suppression rapide des troubles subjectifs. Toxicité nulle, action durable.

Mode d'emploi. — *Hypertension* : 6 capsules par 24 heures à distance des repas.

Autres indications. — *Adultes* : 2 à 6 capsules.

Enfants : 1 à 2 capsules.

Prix :

Boîte 40 capsules : 16 francs.

Laboratoires ROBERT et CARRIÈRE

37, rue de Bourgogne — PARIS

BENZYLOL

Spécifique des affections spasmodiques des organes à musculature lisse, à base de Benzoate de Benzyle et de Benzaldéhyde.

Deux présentations : 1° Gouttes; 2° Perles.

GOUTTES. — Action antispasmodique sur tous les muscles lisses de l'organisme.

Spécifique de l'Hypertension. Asthme vrai. Coliques hépatiques ou néphrétiques. Constipation et diarrhée spasmodiques. Hoquet persistant. Coqueluche. Mal de mer.

Posologie. — *Adultes* : XXX à XL gouttes toutes les 3 ou 4 heures.

Enfants : 2 à 4 gouttes par année, toutes les 3 ou 4 heures.

PERLES. — Spécifique de la Dysménorrhée (règles douloureuses).

Posologie. — Deux perles à un quart d'heure d'intervalle ; 6 à 12 par jour.

Prix : 10 francs.

Laboratoire E. HAUTDIDIER

37, rue Galilée — PARIS (XVI^e).

BETUL-OL MIDY

(Méthyl oléo-salicylate comp.)

Liniment pour l'usage externe, parfaitement absorbé par la peau.

Composition. — Menthol et chloral en solution dans le salicylate de méthyle.

Mode d'emploi. — Imprégner largement un morceau de flanelle rouge, l'appliquer sur la partie douloureuse, recouvrir de taffetas gommé, puis de coton. Renouveler l'application plusieurs fois par jour.

L'absorption du BETUL-OL se fait si rapidement par la peau que 10 minutes après on peut déceler dans l'urine la présence de l'acide salicylique.

Propriétés thérapeutiques. — Calme rapidement les douleurs aiguës de la goutte et du rhumatisme.

Indications. — Lumbago, Sciatiques, Douleurs des articulations, Névralgies.

Prix : 18 francs.

Laboratoires MIDY

67, avenue, de Wagram. — PARIS (XVII^e).

BIAZAN

Solution huileuse parfaitement limpide et incolore permettant de faire proprement une injection intramusculaire non douloureuse d'une quantité de bismuth bien déterminée.

Présentation. — Boîtes de 12 ampoules de 2 cent. cubes rigoureusement titrées à 0 gr. 04 de bismuth métal par cent. cubes.

Propriétés thérapeutiques. — Le Biazan a été étudié et mis au point dans le service de M. le Dr L. Fournier à l'hôpital Cochin. Réunissant les effets rapides des composés hydro-solubles à l'action profonde et prolongée des bismuths insolubles, le Biazan est actuellement la meilleure préparation pour le traitement de la syphilis à toutes ses périodes.

Posologie. — Faire deux fois par semaine une injection intramusculaire de 2 cc. de Biazan. Continuer la série jusqu'à 12 injections. Les 4 à 6 dernières piqûres pourront être faites à 5 et 6 jours d'intervalle. Les doses et le rythme des injections, donnés à titre d'indications générales, sont susceptibles d'être modifiés par le médecin traitant, en particulier chez les vieillards, les débilités et les sujets dont l'état général est mauvais.

Prix : 32 francs.

Laboratoire des ANTIGÉNINES

1, place Lucien-Herr — PARIS (V°).
(anciennement, 43, rue Tournefort.) — Gobelins 26-21.

BI-CITROL MARINIER

**L'Agent rationnel de la Médication
citratée.**

Citrates monosodique et trisodique en granulé
soluble de goût agréable.

**Eupeptique, Cholagogue, Antivisqueux,
Décongestif.**

Posologie :

Dyspepsies, Gastrites, Vomissements :

Une cuillerée à café dans un demi-verre d'eau
chaude, au cours du repas et au moment
des malaises.

Insuffisance hépatique, Arthritisme :

Deux cuillerées à café le matin à jeun dans
un verre d'eau tiède ; ou bien une cuillerée
à café avant chaque repas.

Hyperviscosité sanguine :

(Pléthore, Hypertension, Etats congestifs,
Stases veineuses) :

Une cuillerée à café dans un demi-verre d'eau
trois fois par jour avant les repas.

Pneumonie :

Une cuillerée à café toutes les deux ou trois
heures.

Enfants : 1/4 à 1/2 dose suivant l'âge.

Prix du flacon : 16 francs.

Enregistré au Laboratoire National de Con-
trôle des Médicaments sous le N° 48-1,
le « BI-CITROL » peut être légalement
prescrit aux Assurés sociaux.

Laboratoires G. MARINIER

52, rue de Flandre — PARIS

BIKRÉOL

Régulateur de l'activité digestive et de la nutrition générale.

Composition :

Association d'extrait biliaire .. 0 gr. 20
et de poudre de pancréas 0 gr. 03

Indications. — Toutes les affections de l'estomac, du foie, de l'intestin dans leurs causes et leurs complications, Constipation. — Pas de contre-indication.

Posologie. — 4 à 6 pilules par jour après les repas (2 à 3 après chacun des deux principaux repas à prendre avec une gorgée d'eau). Consulter le médecin.

Prix : 15 francs.

Le *Bikréol* est la médication de base des états infectieux et chroniques.

Littératures et échantillons :

Laboratoires BAPAUME

85, avenue de Neuilly — NEUILLY-SUR-SEINE.

BILAXYL

Le laxatif des Hépatiques.

Composition

Evonymine verte 0 gr. 02
Podophyllin 0 gr. 01
Phénolphthaléine..... 0 gr. 03
Bile pulvérisée 0 gr. 05
Agar-Agar 0 gr. 03
Extrait de Belladone ... 0 gr. 005
Extrait de Jusquiame.. 0 gr. 005

Forme. — Comprimés dragéifiés.

Propriétés. — Laxatif cholagogue, réducteur intestinal.

Doses. — 1 à 2 comprimés au début du repas du soir.

Prix au public : 12 francs les 40 comprimés.

Laboratoires LECONTE

7, rue des Petits-Carreaux — PARIS (II^e).

BILEYL FOURNIER

Sels biliaires

(Extraits de la bile de bœuf.)

Forme. — Globules glutinisés (digestion intestinale).

Dose. — 4 à 8 globules par jour, à prendre vers la fin du repas, par 2 ou 3.

Indicati. ns. — 1° Les causes d'arrêt d'excrétion : lithiase, compressions, ictères subaigus et chroniques par rétention ;

2° Les cas d'insuffisance biliaire : cholémie familiale, entérocolite muco-membraneuse.

L'étui de 60 globules : 14 fr.

Laboratoires FOURNIER Frères

7, rue Biscornet — PARIS (XII^e).

BILIASÉ RABY

Globules d'extrait de fiel de bœuf renfermant tous les principes actifs de la bile.

Mode d'action. — Cholagogue énergique. Le plus constant de tous les agents opothérapiques biliaires.

Indications. — Coliques hépatiques. Ictère. Lithiase biliaire. Entérocolite et constipation par insuffisance biliaire.

Doses. — 4 à 12 globules par jour (aux repas).

Prix : 15 francs.

R. RABY, pharmacien

ASNIÈRES (Seine).

(Échantillons sur demande.)

BILIBOLDO

Forme. — Pilules glutinisées.

Composition. — Ext. de bile dépigmentée, ext. total de feuilles de Boldo, podophyllin, ext. de belladone.

Indications. — Insuffisance hépatique et biliaire, Lithiase biliaire, Ictères, Constipation.

Doses. — 4 à 6 pilules par jour pour les hépatiques ; 1 à 2 pilules pour les constipés.

Prix : 12 francs les 60 pilules.

(15 jours de traitement.)

Laboratoires LAMAR

1, place Forbin — AIX-EN-PROVENCE.

BILIFLUINE

du Dr L. BIGNON, de Vichy.
Traitement de la Lithiase Biliaire
et des Ictères.

Composition. — A base d'oléate de soude et de bile dépigmentée et décholestérinée.

Indications. — Lithiase biliaire. Ictère catarrhal, Ictère par rétention. Constipation. Colite muco-membraneuse. Congestion du foie et cirrhoses sous toutes leurs formes.

Posologie. — 4 pilules ou dragées par jour, au moment des repas : le matin, à midi, à 4 heures et au souper ; ou encore en deux fois à midi et le soir (pilules et sirop).

La boîte de 45 pilules ou dragées. Le flacon de sirop. Prix au public : 16 fr.

Laboratoires « STÉNÉ »

2, Place des Vosges — PARIS (IV^e).

BILIOGASTRINE

Forme. — Granulé légèrement effervescent.

Composition. — Sulfate, Phosphate, Citrate, Bicarbonate de Soude, Pipérazine, Helmitol.

Propriétés. — Draine les Voies biliaires, augmente la Diurèse, nettoie le Rein et l'Intestin.

Indications. — Congestions, Lithiases biliaire et rénale, Cholelscystites, Troubles d'origine hépatique et intestinale : Inappétence, Migraines, Urticaire.

Posologie. — 2 à 3 cuillerées par jour dans un peu d'eau tiède.

Prix : 16 francs.

Laboratoire CHEVILLON

99, rue de Paris — MASSY (Seine-et-Oise).

BILIVACCIN

1° Antityphique.

2° Antidysentérique.

3° Anticholérique.

Vaccination préventive, par VOIE BUCCALE, contre la Typhoïde, les Para A et B, la Dysenterie bacillaire, le Choléra.

Aucune réaction. — Pas de contre-indication.

Aucune limite d'âge.

A prendre à jeun, trois matins de suite une pilule de bile et 1/4 d'heure après, un comprimé de vaccin.

Prix : dose pour adultes : 10 fr. ;

dose pour enfants (moins de 7 ans) : 8 fr.

H. VILLETTE, Pharmacien

Produits de « La Biothérapie »

5, rue Paul-Barruel — PARIS (XV^e).

Téléphone : Vaugirard 11-23.

BILIVACCIN ANTICOLIBACILLAIRE

Vaccination par voie buccale contre toutes affections colibacillaires du tractus intestinal, constipation, colites, appendicites et annexes. Cholécystites, voies urinaires.

N° 1 Bilivaccin coli pur.

N° 2 — coli-entérocoque.

N° 3 — polyvalent (coli-entérocoque-perfringens-proteus).

A prendre le matin à jeun, pendant 18 jours consécutifs, une pilule de bile et 1/4 d'heure après, 2 comprimés de vaccin. Renouveler après repos de 6 jours.

Prix : 20 francs la dose.

H. VILLETTE, Pharmacien

Produits de « La Biothérapie »

5, rue Paul-Barruel — PARIS (XV^e).

Téléphone : Vaugirard 11-23.

BILLABSTINE

Simple et Laxative.

Composition. — Extraits biliaires, Ferments lactiques. Pancréatine, Extraits d'artichauts, Extrait de Coto.
Laxative — Extraits Cascara et Bourdaine, Evonymine-brune.

Posologie. — *Simple* : 4 comprimés par jour un peu avant les repas, midi et soir. En cas de dysenterie grave, la dose peut être augmentée, sans inconvénient jusqu'à 10, 12 ou 14.

Laxative : 1 à 3 comprimés le soir.

Indications. — Dysenteries, Infection intestinale, Lithiase biliaire, Insuffisance hépatique, Cholécystite, Angiocholite, Entérite. *Entérites à forme dysentérique.* Constipation chronique, Atonie de l'intestin.

Prix :

Simple : Le tube, 16 francs. Traitement normal 15 jours.

Laxative : Le tube, 11 francs. 20 à 40 jours de traitement.

Laboratoires BASUYAUX

94, rue Pasteur — FONTENAY-SOUS-BOIS (Seine),

Echantillons sur demande :

Société d'Expansion Thérapeutique,

46, faubourg du Temple — PARIS (XI^e).

X BINOXOL

BISMUTHO-8-Oxyquinoléine.

(Produit synthétique défini et pur.)

Propriétés. — Antiseptique gastro-Intestinal, dépourvu de toute toxicité, dont l'Oxyquinoléine s'élimine par les voies urinaires.

Indications — Diarrhées infectieuses et parasitaires (*oxyures*) fermentations, diarrhées infantiles. Particulièrement efficace dans toutes les formes de tuberculose intestinale.

Antisepsie urinaire : Pyélonéphrites, cystites, urétrites.

Présentation :

Pour *adultes* : tubes de 12 cachets à 0 gr. 50.

Prix : 12 francs.

Pour *enfants* et *bébés* au-dessus de 6 mois : Boîtes de 12 paquets à 0 gr. 25.

Prix : 8 francs.

Posologie. — 2 à 4 cachets ou paquets par jour. Chez les adultes dans les cas graves et les entérites des tuberculeux jusqu'à 8 cachets par jour.

Établissements KUHLMANN

Produits RAL. Spécialités.

145, boulevard Haussmann — PARIS (VIII^e).

BIOCALCOSE

Tonique, Stimulant, Reminéralisant intégral.

Granulé soluble, de saveur très agréable.

Hypophosphites ; Manganèse, Fer, Magnésie et Chaux en combinaison organique avec le glucose ; Fluor ; Silice, etc., dans les proportions où ces corps se trouvent dans l'organisme.

Constitue une véritable synthèse minérale de la matière vivante.

Propriétés thérapeutiques. — Tonique, reminéralisant.

Dose et mode d'emploi. — 1 à 2 cuillerées à café par jour jusqu'à 8 ans ; 3 à 4 au-dessus de cet âge. Croquer ou dissoudre dans un peu d'eau et prendre aux repas.

Prix : 14 francs.

Laboratoires L. LEMATTE et G. BOINOT

52, rue La Bruyère — PARIS.

Télégr. : Chevrematte-90-Paris.

BIOCATALYSEUR ROLLAND

Catalyseur biologique.

Vin tonique, stimulant et reconstituant. Apéritif médicinal de goût agréable, bien toléré par l'estomac. Puissant accélérateur du métabolisme général. Antiasthénique de choix.

| Composition | par litre | Action pharmacodynamique. |
|-------------------------------|-----------|--|
| Métavanate de soude..... | 0 gr. 10 | Catalyseur, spécifique de l'anorexie. |
| Nucléinate de manganèse... | 0 gr. 50 | Catalyseur, régénérateur globulaire. |
| Méthylarsinate de soude... | 0 gr. 50 | Tonique, reconstituant. |
| Glycérophosphate de soude.. | 2 gr. 50 | Tampon, neuro-tonique, |
| Citrate de soude..... | 2 gr. 50 | Tampon, antidyspeptique, |
| Extrait de noix vomique.... | 0 gr. 05 | Excitant du système nerveux. |
| Extraits de Quassia, Colombo. | 0 gr. 10 | } Excitants de l'appareil digestif et des glandes annexes. |
| Extrait de Condurango..... | 0 gr. 20 | |
| Extrait de Gentiane..... | 0 gr. 30 | |
| Vin de Cola au Muscat..... | 1 litre | Toni-cardiaque, diurétique. |

Indications thérapeutiques. — Anémie, Leucémie, Lymphatisme, Amaigrissement, Surmenage. Convalescences et en général : tous états asthéniques, toutes déficiences nerveuses.

Mode d'emploi. — Adultes : un verre à bordeaux avant les 2 principaux repas. Enfants au-dessus de 10 ans ou vieillards : demi-dose.

Prix : 20 fr.

Enregistré au Laboratoire de Contrôle des Médicaments n° 783-I.

Laboratoire F. A. ROLLAND

85, rue Victor-Hugo, — LEVALLOIS-PERRET (Seine).

BIOCÉANE OLIVIÉRO

Eau de mer ionisée pure.

Véritable **Lymphé marine. Sérum marin.**

Ampoules buvables de 10 cc.

Par boîte de 16 ampoules.

Action thérapeutique. — *Athrepsies, Diarrhées* des nourrissons, Colibacillurie. *Toutes Phosphaturies*, le PH urinaire est abaissé à 6-5 1/2.

Toutes déchéances, Fatigues, Surmenages, Précancer.

Doses :

Enfants : 1 à 2 ampoules par jour.

Adultes : 2 à 4 ampoules par jour.

Prix : 18 francs.

Laboratoire de Biothérapie OLIVIÉRO

BOULOGNE-SUR-SEINE (Paris-Ouest).

Tél. : Molitor 27-06.

BIOCHOLINE

d'après les travaux du Prof. J. CARLES et du
D^r F. LEURET.

Constitution. — Chlorhydrate de Choline R. et C. chimiquement pur. Seule préparation contrôlée aux points de vue physiologique et clinique par les auteurs.

Mode d'action. — 1° Amélioration du terrain par l'augmentation régulière et durable du taux de *cholestérol* sanguin, principale condition de la résistance aux infections. Régularisation de la Glycémie.

2° Action génératrice sur les *globules sanguins* et la moelle osseuse. Cette réaction de défense se traduit par la disparition des gros polynucléaires, et l'apparition des mononucléaires de défense.

3° Excitation des fonctions d'élimination et du péristaltisme intestinal.

Indications. — 1° *Toutes les formes de Tuberculoses*: externes ou viscérales, même évolutives, à tous les degrés et à tous les âges.

2° *Tous les cas d'Anémies*: Maigreur, anorexie, hypertrophies ganglionnaires infantiles.

3° Tous les cas d'insuffisances pancréatiques.

Avantages. — Innocuité complète, tolérance parfaite, aucune contre-indication.

Mode d'emploi. — *Ampoules*: 1 injection sous-cutanée, tous les 2 jours, d'une façon continue et sans interruption.

Suppositoires: 1 suppositoire tous les 2 jours par séries de 20 jours.

Présentations :

1° *Ampoules* (1 cc. = 0,02).

Boîtes de 10 ampoules) (type normal) Prix : 25 fr.
Boîtes de 25-50 et 100 ampoules (cures prolongées). Prix : 40 francs, 72 francs, 140 francs.

2° *Suppositoires* (1 suppo = 0,02).

Boîte de 10 suppositoires. Prix : 30 francs.

Laboratoires ROBERT et CARRIERE

37, rue de Bourgogne — PARIS (VII^e).

BIODYNAMINE

Indications générales. — Débilité, Neurasthénie, Phosphaturie, Convalescence, Surmenage intellectuel et tous états asthéniques et atoniques.

1° Ampoules :

| | |
|--------------------------------|------------|
| Sulfate de strychnine..... | 1 milligr. |
| Cacodylate de soude..... | 0 gr. 05 |
| Nucléinate de soude..... | 0 gr. 05 |
| Glycérophosphate de soude..... | 0 gr. 05 |
| Sérum isotonique camphré..... | 1 cc. 3 |

par ampoule.

(1 à 2 ampoules par 24 heures.)

Prix : 13 fr. 75.

2° Gouttes concentrées (facilitant l'administration progressive) : de X à XL gouttes, bien diluées, avant chaque repas, suivant le cas et d'après le tableau :

| | 20 Gouttes cont. | 40 Gouttes cont. | 60 Gouttes cont. | 80 Gouttes cont. | 100 Gouttes cont. |
|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| Sulfate de Strychnine..... | 1 mill. | 2 mill. | 3 mill. | 4 mill. | 5 mill. |
| Méthylarsinate de soude... | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,15 |
| Acide phosphorique..... | 0,15 | 0,30 | 0,45 | 0,60 | 0,75 |

Prix : 11 fr. 75.

3° Elixir : Préparation d'un goût très agréable et contenant par cuillerée à soupe de 15 grammes :

| | |
|------------------------------------|------------|
| Phosphate de soude..... | 0 gr. 060 |
| Acide phosphorique officinal | 0 gr. 053 |
| Méthylarsinate disodique | 0 gr. 012 |
| Sulfate de strychnine..... | 0 gr. 0006 |

2 à 3 cuillerées à soupe par jour.

Prix : 15 fr. 50.

Laboratoire OBERLIN

J. Tinardon, Pharmacien de 1^{re} classe
de la Faculté de Pharmacie de Paris.

17, rue Cadet — PARIS.

BIODYNOL

Composition :

Noix vomique, Hypophosphite de soude, Cola, Manganèse, Écorces d'oranges amères.

Indications :

Asthénie, Neurasthénie, Débilité, Convalescence.

Formes. — *Elixir* : 3 verres à liqueur par jour.

Granules : 4 cuillers à café par jour.

Laboratoire FOUCHERE

RIVE-DE-GIER (Loire).

* BIOENTÉRASE

Admis à l'achat par le Ministère des Colonies.

Ampoules buvables.

Non toxique. Sans contre-indications.

Extrait de *Phyllanthus Casticum*, *Scutia Commersoni*, *Psidium Pomiferum*, *Garcinia Mangoustana*, *Fraxinus Ornus* en solution stabilisée.

Indications. — Diarrhée verte, Gastro-entérite des nourrissons. Choléra infantile, Entérites aiguës, Entérocolite dysentérique.

Propriétés. — Antidiarrhéique et antihémorragique énergique, sans action constipante. Cholagogue. Antiparasitaire et bactéricide puissant. Calmant des douleurs abdominales et du ténésme, sans opiacés, évite l'athrepsie.

Doses. — Faire prendre le médicament dans de l'eau fortement sucrée ou en lavement dans 50 cc. d'eau bouillie.

La BIOENTERASE s'emploie de la naissance à deux ans à la dose quotidienne de 1 à 2 ampoules par année d'âge, suivant l'intensité des symptômes et jusqu'à sédation. Une ampoule tous les 2 jours évite l'athrepsie.

Remplacer le lait par de l'eau bouillie ou eau de riz sucrée.

Prix de la boîte de 6 ampoules buvables : 18 francs.

— — 3 — — 10 francs.

Littérature et échantillons :

69, rue de Wattignies — PARIS.

BIOGÉNOL DEMASLES

Puissant accélérateur de la nutrition.

Granulé. — Contenant, par cuillerée à café :

- 1 centigr. de glycéro-arséniate.
- 0,50 centigr. de phosphates organiques.
- 0 gr. 50 chlorure de magnésium.
- 1 cuillerée à café avant les deux repas.

Prix : 14 francs.

Elixir. — Même composition que le granulé, mais contient de la cola en plus. 1 verre à liqueur avant les repas.

Prix : 14 francs.

Gouttes Arséno Biogénol. — Strychnine, glycéro-arséniate, extraits de quina, cola, coca.

Gouttes Phospho Biogénol. — Strychnine, acide phosphorique, extraits de quina, cola, coca.

Pour XX gouttes, 1 milligr. de strychnine, 5 milligr. de glycéro-arséniate ou 25 cgr. d'acide phosphorique.
Doses moyennes : X à XX gouttes aux 2 repas. Doses progressivement croissantes : jusqu'à CXX gouttes.

Prix : 12 francs.

Ampoules. — De 1 cc. Une ampoule contient :

- | | |
|----------------------------|----------------|
| Glycéro-arséniate..... | 0,01 centigr. |
| Sulfate de strychnine..... | 0,001 milligr. |

Prix : 10 francs.

LABORATOIRES DEMASLES. — VIENNE (Isère).

BIOLACTYL FOURNIER

Symbiose de deux ferments lactiques
orientaux sélectionnés.

Usage médical :

1^o Culture en bouillon :

En boîtes de 10 fl., pour adultes.

La boîte : 24 fr.

En boîte de 6 flacons :

La boîte : 18 francs.

En boîte de 2 fl., pour nourrissons.

La boîte : 8 fr.

En boîte de 6 tubes (pour le caillage du
lait).

La boîte : 7 fr.

2^o Culture sèche ; boîte de 60 comprimés
(4 à 6 par jour).

L'étui : 14 fr.

Indications. — Traitement des putréfac-
tions intestinales et de l'auto-intoxication
digestive.

Usage chirurgical :

1^o Culture liquide, en boîtes de 6 tubes.

La boîte : 7 fr.

2^o Culture sèche en poudre.

La boîte : 7 fr.

Indications. — Pansement des plaies in-
fectées, escarres, vaginites, cystite tuber-
culeuse, affections nasales et laryngées,
pyorrhée alvéolo-dentaire.

Laboratoires FOURNIER Frères

7, rue Biscornet — PARIS (XII^e).

BIOMUCINE

**Protecteur naturel de l'Estomac
et anti-acide idéal.**

Constitution. — La BIOMUCINE ROBERT et CARRIERE est une mucine pure, neutre et stérile, obtenue à partir des muqueuses d'estomac et adaptée à la thérapeutique des affections gastriques.

Action physiologique. — 1° BIOMUCINE = PROTECTEUR NATUREL : Elle recouvre la muqueuse d'un enduit visqueux qui la protège contre les irritations des particules alimentaires et contre toute attaque chlorhydropeptique.
2° BIOMUCINE = ANTI-ACIDE IDEAL : *Le seul réellement physiologique*, puisque c'est le mucus qui à l'état normal assure l'intégrité et le bon fonctionnement de l'estomac.

Avantages. — La BIOMUCINE est :

- 1° SUPERIEURE aux ALCALINS qui saturent toute l'acidité, la mucine ne fixe que les acides en EXCES.
- 2° SUPERIEURE aux POUDRES ABSORBANTES (Bismuth-Kaolin), qui réalisent un enduit imperméable aux suc digestifs et provoquent la constipation. La mucine se laisse pénétrer par la pepsine ; la mucine ne constipe pas.
- 3° SUPERIEURE aux MUCILAGES qui se digèrent, la mucine est indigestible.

La BIOMUCINE est particulièrement remarquable par la RAPIDITE de son action.

Indications. — HYPERACIDITÉ et toutes les affections douloureuses de l'estomac provoquées par elle.

ULCERES gastriques et duodénaux, Ulcères peptiques post-opératoires.

Posologie. — HYPERACIDITÉ : 2 cachets avant chacun des 2 principaux repas.

ULCERES : 2 cachets, 10 minutes avant toute prise de nourriture ; la poudre mise en suspension dans 1/2 verre d'eau.

Prix :

Boîte 24 cachets : 20 fr. — Boîte 100 cachets : 60 fr.

Laboratoires ROBERT et CARRIERE
37, rue de Bourgogne — PARIS.

BIONÉOL

Formes : 1° *Élixir.*

| | Par cuillerée à café. | Par cuillerée à soupe |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Méthylarsinate de soude..... | 1 cgr. | 3 cgr. |
| Acide nucléinique..... | 2 cgr. | 6 cgr. |
| Glycérophosphates..... | 5 cgr. | 15 cgr. |
| Strychnine (noix vomique)..... | 0,1 de mmgr. | 0,3 de mmgr. |

2° *Cachets.*

| | | par cachet |
|--------------------------------|-----------|------------|
| Méthylarsinate de soude..... | 3 cgr. | — |
| Acide nucléinique..... | 6 cgr. | — |
| Glycérophosphates..... | 15 cgr. | — |
| Strychnine (noix vomique)..... | 0,3 mmgr. | — |

Indications. — Anémies, Chlorose Lymphatisme, Tuberculose, Neurasthénie, Paludisme, Débilité générale, Troubles de la croissance et de la puberté. Excitant de l'Appareil digestif.

Posologie :

De 3 à 6 ans, 2 cuillerées à café par jour.
De 6 à 10 ans, 3 — — —
De 10 à 15 ans, 2 cuillerées à dessert par jour.
A partir de 15 ans, 2 cuillerées à soupe ou 2 cachets par jour.

A prendre après les repas.

Prix : *Elixir* : 14 fr., 10 jours de traitement.

Cachets : 14 fr., 15 — — —

Laboratoire du BIONÉOL

14, rue de Périgueux — ANGOULÊME.

BIOPAUSINE

Médication circulatoire énergétique.

Formule :

| | |
|---|----------|
| Extrait stabilisé de Cupressus | 20 gr. |
| Extrait stabilisé de marron d'Inde..... | 12 gr. |
| Extrait stabilisé d'hamamélis | 10 gr. |
| Extrait stabilisé d'anémone | 5 gr. |
| Extrait stabilisé de viburnum..... | 5 gr. |
| Chlorure de magnésium | 3 gr. |
| Acide Phosphorique | 15 gr. |
| Glycérine { | Q. S. p. |
| Eau { | 100 gr. |

Flacon compte-gouttes de 45 cc. Prix : 15 francs.

Particularités. — Agit comme toni-circulatoire, stimulant général (acide phosphorique), antispasmodique et anticancéreux.

Emploi. — 20 à 30 gouttes 3 fois par jour avant les repas, dans un peu d'eau.

Indications. — Ménopause, Hémorroïdes, varices, congestions pelviennes, désordre des fonctions génitales et du système nerveux, chez la femme. Troubles circulatoires en général.

Laboratoires de l'ERGOCOLINE

(Constipation.)

P. TAVERNIER

32, rue de l'Ouest — PARIS
O. C. P. Toutes Drogueries et Pharmacies.

BIOPHORINE GIRARD

Granulé.

Extrait total de kola contenant la caféine, la théobromine et les principes actifs de la noix fraîche ; Glycérophosphate de chaux assimilable, Extrait de quinquina.

Propriétés thérapeutiques :

Régulateur cardiaque, réminéralisant, apéritif, tonique nerveux et musculaire.

Indications :

Asthénies, Adynamie cardiaque, Anémie cérébrale, Dépression nerveuse, Grippe, Convalescences des maladies infectieuses, Surmenage physique et intellectuel.

Dose et mode d'emploi :

3 à 4 cuillerées à café par jour, aux repas, pur ou dans un liquide quelconque. *Enfants* : 1/2 doses.

Prix : 11 francs,

Établissements SOUDAN

48, rue d'Alésia — PARIS (XIV^e).

Enregistré au Laboratoire national n° 405-1.

BIOPHYLACTINE M. G.

Médication polypeptique, hyposulfite et magnésienne.

Forme. — Dragées.

Indications. — Asthme (digestif), coryzas spasmodiques périodiques (rhume des foins), urticaire, eczéma, prurits, maladie de Quincke, migraines, somnolences, rougeurs ou pesanteurs après les repas, vomissements, inappétence, intolérance digestive.

Doses. — Adultes : 2 dragées 1/2 heure avant les 3 repas. — Enfants : une dragée.

Prix du flacon : 15 fr.

Echantillon sur demande.

Préparé par le laboratoire **F. VELLAY**

Pharmacien de 1^{re} classe.

116, avenue Berthelot — VIENNE (Isère).

BIOPLASTINE SÉRONO

Inscrite aux pharmacopées officielles d'Italie et d'Espagne.

Composition. — Emulsion de Lécithine et de Lutéines (éthers de la Cholestérine) dans du sérum physiologique à 0,8 p. 100.

Forme. — La Bioplastine Sérono existe en ampoules de 1 cc. 5 et en ampoules de 5 cc. pour injections intra-musculaires.

Propriétés thérapeutiques :

1° Régularise le métabolisme cellulaire et surtout le renouvellement azoté.

2° Augmente le phosphore organique et inorganique des tissus et provoque une augmentation du poids.

La Bioplastine Sérono est entièrement assimilable.

Indications. — Toutes les formes d'épuisement, arrêt ou retard de la croissance, rachitisme, lymphatisme, anémies et chloroses (néo-formation de globules rouges), dans la neurasthénie (surmenage intellectuel et physique), dans le diabète. S'emploie aussi dans le traitement de la syphilis en association avec la cure mercurielle, et dans les cas de sénilité dû au ralentissement des échanges cellulaires. Est également très indiquée dans le traitement de la tuberculose.

Mode d'emploi. — Une piqûre tous les jours ou tous les 2 jours (intra-fessière).

20 à 30 injections suffisent pour une cure. Ces injections sont indolores.

La boîte de 10 ampoules de 1 cc. 5. Prix : 19 francs.

— 6 — 5 cc. — 28 francs.

Laboratoire du Dr Ch. DENSMORE.

25, rue Dagorno — PARIS (XII^e). Tél. : Dorian 56-71.

BIO-SEL

Le BIO-SEL ne renferme que 3 p. 100 de Chlore (au lieu de 60 p. 100 que renferme le Chlorure de Sodium), c'est-à-dire que la teneur en Chlore d'un repas quelconque n'est pas changée par l'addition de Bio-Sel, puisque la quantité de Chlore qu'il contient est à peu près celle de la moyenne des aliments non salés.

Le Bio-Sel permet donc d'observer le régime déchloruré en conservant aux aliments la saveur salée, indispensable pour ne pas rebuter le malade. Il ne présente aucun inconvénient, danger, ou goût spécial, autre que celui du sel, de sorte qu'il peut être employé sur la table familiale comme le sel ordinaire, à l'insu même du malade.

Indications. — Hyperchlorhydrie, Entérites, Intoxications alimentaires. Eruptions cutanées, Prurit, Insomnie, Agitation, Hypertension, Artério-Sclérose, Œdèmes, Migraines, Insuffisances hépatique, rénale ou cardiaque, Albuminurie, Neurasthénie, Crampes, Convulsions Epilepsie.

Formule. — Nitrate, Sulfate, Tartrate et Bicarbonate de soude, Bromure et Chlorure de Potassium, Phosphate d'Ammonium, Excipient végétal.

Prix :

Salière de 30 gr. : 5 francs. — Boîte de 100 gr. : 12 francs. — Boîte de régime de 250 gr. : 20 francs.

Adresse :

Laboratoires du BIO-SEL

V. MERQUIOL, Pharmacien.

5, rue Diderot — NICE (Alpes-Maritimes).

BIOSINE LE PERDRIEL

Glycérophosphate double de chaux
et de fer.

Ni intolérance, ni constipation, ni coloration
des dents. Reconstituant énergique.

Indications. — Anémie, Chlorose, Rachitisme, Croissance, Convalescence, Surmenage, Neurasthénie, Suite de fractures, Hémorragies.

Doses. — 1 mesure (0,30 de glycérophosphate) à 4 mesures par jour au repas dans eau pure ou sucrée.

Prix : 16 francs.

Laboratoires LE PERDRIEL

11, rue Milton — PARIS (IX^e).

BIOTRIGON

Composition :

Elixir formule A. — Extrait fluide de fénu-grec désodorisé, Arrhénal, Manganèse.

Elixir formule C. — Extrait fluide de fénu-grec désodorisé. Chlorure de Calcium.

Dragées. — Extrait sec de fénu-grec. Phosphate de chaux. Extraits opothérapiques fixateurs.

Propriétés :

Augmentation du poids, des forces, de l'appétit. Amélioration de l'état général.

Indications :

Elixir formule A. — Insuffisance organique, Asthénie, Prétuberculose, Adénopathie, Débilité.

Elixir formule C. — Mêmes indications et malades présentant lésions pulmonaires évolutives.

Dragées. — Mêmes indications, mais plus spécialement pour malades en déplacement.

Mode d'emploi :

Adultes : 1 cuillerée à bouche au moment des repas.

Enfants : 1 cuillerée à café au moment des repas.

Prix du flacon de 1/4 de litre environ :
20 francs.

Laboratoire Jacques LORTHIOIR

22, rue Perceval — PARIS.

BIOVIGORINE

Composition. — Vin vieux d'un goût exquis contenant des produits digestifs (acide chlorhydrique et pepsine) et toniques (éphédrine, vitamines).

Indications. — Augmente l'appétit, donne immédiatement des forces et cela sans créer le moindre énervement.

Posologie. — Un verre à liqueur avant les 2 principaux repas.

Laboratoire de la BIOVIGORINE

4, route de Médoc
LE BOUSCAT, près Bordeaux

BISALICYLATE

Cachets. Granulés.

plus actif que le salicylate de soude. Tolérance gastr. parfaite, saveur agréable. Deux formes : Cachets, Granulés. Chaque cachet contient 75 cgr. Salicylate de soude et 25 cgr. Benzoate de lithine dans un excipient spécialement étudié pour éviter les inconvénients ordinaires de la médication salicylée.

Chaque cuiller à café de granulé correspond à un cachet. (goût agréable).

Rhumatisme, Arthritisme, Uricolytique, Cholagogue.

Prix : 20 francs.

Laboratoires du GASTROCARBONE
SAINT-LOUIS (Bouches-du-Rhône).

BIS-HYD

Bismuth-Hydrargyre.

En ampoules de 2 cc. dosées à 0,048 de Bismuth métal. Suspension huileuse d'éléments *chimiques* : Iodo-bismuthate de quinine; Hydrargyre et cuivre (Catalyseurs) et d'éléments *biologiques* : Lipoides cérébraux et testiculaires. BIS-HYD réalise pour la première fois une *thérapeutique antisyphilitique complète*.

« Accroît par catalyse les forces défensives de l'organisme contre la spirochétose. » (J. Schumacher.)

BIS-HYD exerce dans la Syphilis et la spirochétose en général une double action :

- 1° *Spécifique* vis-à-vis du spirochète par l'ensemble de ses composants chimiques ;
- 2° *Non spécifique* mais immunisante de l'organisme par ses composants biologiques : lipoides cérébraux et testiculaires.

Posologie. — Traitement d'attaque : 1 à 3 ampoules de 2 cc. par semaine (15 à 20 par cure).

Traitement d'entretien : 1 à 2 par semaine (12 par cure)
Les injections indolores seront intramusculaires profondes (point fessier).

Prix de la boîte de 12 ampoules : 36 fr.

Laboratoires GENEVRIER

45, rue du Marché — NEUILLY (Seine).

BIS-KA-MA

Formes pharmaceutiques. — Poudre à l'état de division micellaire.

Composition. — Bismuth (carbonate), Kaolin colloïdal, Magnésie, Mucilages végétaux, Sucre vanillé.

Action. — Réalise le « poudrage » du tube digestif. Anti-acide, modificateur de la flore intestinale, absorbant des gaz.

Indications. — Acidité pré ou post-prandiale : 1 cuillerée à café aux 3 repas.
Constipation chez les hyperchlorhydriques et les entérocolitiques : 1 cuillerée à soupe le matin à jeun.

Le flacon : Prix : 20 francs.

La boîte triple dose : Prix : 45 francs.

Laboratoires DURET et RÉMY
et du Docteur Pierre ROLLAND
ASNIERES (Seine).

BISMHYDRAL

Composition. — Définie et stable de chlorure mercureux léger pur, et d'azotate basique de bismuth spécialement préparés.

Propriétés thérapeutiques. — Réalise l'association et la synergie médicamenteuse du bismuth et du mercure dans le traitement de la syphilis (Docteur Milian). Cholagogue doux.

Indications. — Syphilis (à toutes les périodes et sous toutes ses formes; cure d'entretien discrète par voie buccale, la boîte-vente ne renferme aucun prospectus et ne porte pas d'indication de maladies.)

Insuffisance hépato-biliaire.

Tolérance parfaite, action sûre, aucune toxicité.

Posologie. — Un à deux comprimés une heure avant les deux principaux repas.

Prix : 13 francs.

LANCOSME. — 71, av^e Victor-Emmanuel-III — PARIS (8^e).

BISMOKAOL

Pansement gastrique.

Action. — Associe l'action cicatrisante du bismuth et du kaolin à l'action sédative et analgésique de la belladone et de la codéine. (Ne constipe pas).

Indications. — Ulcères. Hyperchlorhydrie, Gastralgie, etc...

Formule :

| | |
|---------------------------------|------|
| Kaolin colloïdal..... | 60 |
| Carbonate de bismuth léger..... | 5 |
| Magnésie hydratée | 25 |
| Codéine | 0,10 |
| Belladone pulvérisée | 0,10 |
| Pour 100 grammes. | |

Posologie. — De 2 à 4 paquets par jour, avant ou après les repas, de préférence le matin à jeun.

Présentation. — Poudre.

Prix : 14 francs.

Laboratoires DEXO

23, rue Danton — PARIS-LEVALLOIS

BISMUSODINE

Granulée.

Composition. — Une cuillerée à café contient :
0 gr. 50 carbonate de bismuth.
0 gr. 50 citrate de soude état naissant.
1 gr. 50 carbonates de chaux et magnésie.

Indications. — Gastropathies. — Hyperacidité.
— Sténoses pyloriques. — Colites. — Ulcus. —
Antisepsie intestinale.

Mode d'emploi. — 2 à 6 cuillerées à café par
jour délayées dans un demi-verre d'eau ou même
croquées telles, suivant indications du médecin.

Prix : 16 francs.

Laboratoires du **KALMOBROL.**

S. A. R. L.

C. CHAMARD et R. NIEL, Pharmaciens.


3, rue Royet. — LYON-CALUIRE.

BISMUTH B 3

Composition. — Suspension homogène de
sels de Bismuth (carbonate, sous-nitrate
et salicylate) dans un mucilage. Une cuille-
rée à soupe renferme 1 gr. de sels de Bis-
muth.

Indications. — Gastropathies, *Ulcères*, Co-
lites, etc...

Présentation et prix. — Crème aromatisée.

 En flacon de 300 cc. : 20 francs.

En flacon d'un litre : 45 francs.

Posologie. — 1° Affections gastriques, 2 à
4 cuillerées à soupe par jour avant les repas.
2° affections intestinales, 3 cuillerées à soupe
par jour à jeun, ou une heure avant les repas.

Laboratoires L. BORNET

Docteur en Pharmacie, Licencié ès-Sciences.

5, boulevard des Brotteaux — LYON

CRÈME DE BISMUTH

du Docteur QUESNEVILLE.

Préparation créée en 1856 et toujours restée la mieux adaptée à la médication par le Bismuth dans les affections gastro-intestinales.

Composition. — Suspension dans son eau d'hydratation de l'*Hydrate de Bismuth* purifié, obtenu par le procédé spécial du D^r QUESNEVILLE. Précipité gélatineux. Etat de division le plus favorable à son action médicamenteuse. Aucun apport d'acidité. Innocuité absolue.

Indications. — Dyspepsies hyperchlorhydriques, Pyrosis. Spasmes. Douleurs gastriques. En général tous états avec irritation de la muqueuse gastrique. Lésions ulcératives de l'estomac et du duodénum. Entérites dysentériques. Colites infectieuses. Colites muqueuses. Fermentations intestinales. Gaz sulfurés. Entérites des tuberculeux. Diarrhées saisonnières. Tous états inflammatoires et affections lésionnelles du tractus digestif.

Mode d'emploi. — Par cuillerée-mesure (0 gr. 25 Bismuth sans addition de matières étrangères) à prendre dans un peu d'eau ou de lait (lait de bismuth le plus facile à faire accepter).

Posologie. — 2 à 5 cuillerées-mesure 2 à 5 fois par jour (terminer par doses décroissantes).

Prix : le flacon : 19 francs.

CRÈME DE BISMUTH CHLORO-MAGNÉSIENNE

du Docteur QUESNEVILLE

Addition de Chlorure de Magnésium dissous à la Crème de Bismuth du D^r QUESNEVILLE. Médication sans constipation consécutive. Propriétés cytophylactiques et cicatrisantes.

Indications. — Lésions ulcératives. Anciens ulcères. Etats chirurgicaux. Séquelles de maladies infectieuses. En général toutes affections lésionnelles chroniques du tractus digestif.

Posologie. — Prendre dans un peu d'eau, 1 ou 2 fois par jour, une cuillerée à café contenant (0 gr. 60 chlorure de magnésium + 0 gr. 50 d'hydrate de Bismuth + 0 gr. 20 Phosphate bicalcique).

Traitement à prolonger et à reprendre périodiquement.

Prix : le flacon : 16 fr. 50.

Laboratoire QUESNEVILLE

12, rue de Buci — PARIS (VI^e).

Dépôt : Pharmacie COLESSON

5, rue d'Angoulême — PARIS (II^e).

BISMUTH DESLEAUX

Pansement gastro-intestinal idéal

Au carbonate de Bismuth amorphe, obtenu par un procédé de fabrication spécial.

Propriétés thérapeutiques. — Pansement gastro-intestinal de choix, à teneur élevée en bismuth, assurant un tapissage intégral, homogène, uniforme de la muqueuse, joint à une action sédative, protectrice, cicatrisante et anti-infectieuse. Modifie la flore microbienne, met à l'abri des accidents provoqués par le sous-nitrate, supérieur aux produits de substitution (Charbon, kaolin, magnésie, talc).

Indications. — Ulcères et ulcérations gastriques ou duodénales, gastropathies, hyperchlorhydrie, entéropathies, colites, spasmes, colibacilloses, oxyurase.

Présentation. — Poudre impalpable, de goût agréable.

Posologie. — Chaque flacon porte une mesure dont le contenu correspond environ à 6 gr. de produit.

Pansement gastro-intestinal : 12 à 50 gr. par jour suivant les cas, soit 1 à 3 mesures prises à jeun, matin, midi et soir 1/2 heure avant les repas, dans 1/2 verre d'eau ou de tisane.

Colibacillose : 30 à 40 gr. par jour à jeun, pendant 8 jours.

Oxyures. — *Adultes :* 30 à 40 gr. (5 à 7 mesures), *enfants :* 15 à 25 gr. (3 à 4 mesures) par jour, en 2 fois. le matin à jeun, 2 à 3 cures de 7 jours consécutifs (Voir brochure).

Prix : 20 fr.

LANCOSME. — 71, av^e Victor-Emmanuel-III — PARIS (8^e).

BISMUTHION

Description. — Le Bismuthion est une suspension colloïdale isotonique de Bismuth pur dans l'eau distillée, obtenue par procédé électrique et destinée au traitement de la syphilis. En boîtes de 6 ampoules de 3 cc.

Action thérapeutique. — Le Bismuthion s'injecte dans les veines ou les muscles sans précautions spéciales. Il est parfaitement toléré, non toxique, ne provoque aucune réaction douloureuse ou autre, diffuse rapidement dans l'organisme et particulièrement dans les lésions syphilitiques et est facilement éliminé sans irriter les reins. Il paraît agir sur les spirochètes comme *catalyseur*.

Indications. — Le Bismuthion, grâce à son absence de toxicité, est spécialement indiqué pour le traitement des syphilis anciennes qui exigent un long traitement, syphilis nerveuses, tabes, hérédosyphilis.

Prix : 30 francs.

Laboratoires Ch. COUTURIEUX

18, avenue Hoche — PARIS.

BISMUTHOÏDOL

Bismuth colloïdal, à grains fins.

Ampoules.

Titrées à 0 gr. 004 par cc.

Indolores.

Stériles.

Solution aqueuse.

Indications.

Spirillicide.

Syphilis.

Toutes maladies à protozoaires.

Mode d'emploi. — Une ampoule de 2 cc. tous les 2 ou 3 jours dans les cas ordinaires. — Une tous les jours dans les cas graves.

Prix : 24 francs.

Laboratoires ROBIN

13, rue de Poissy — PARIS.

BISMUTH TULASNE

Sous-nitrate de bismuth kaoliné spécialement préparé pour l'emploi à doses élevées.

Indications. — Réalise le véritable pansement gastro-intestinal au sous-nitrate de bismuth (méthode du Prof. Hayem) avec la garantie d'une innocuité absolue.

Estomac : Ulcères, Ulcérations, Gastrites, Hyperchlorhydrie, Spasmes, Aérophagie, Vomissements.

Intestin : Colites, Diarrhées, Intoxications, Troubles fonctionnels
Infection intestinale et troubles annexes : urinaires (colibacillrose), biliaires, nerveux (migraines), circulatoires.

Oxyurose.

Présentation. — Boîte 10 paquets de 10 gr. : 20 fr. Triple boîte : 50 fr.

Posologie. — En général doses massives (10 à 20 gr., 1 à 2 paquets) à prendre en une seule fois le matin, à jeun, dans un verre d'eau pour réaliser le pansement bismuthé de la muqueuse digestive. Les mêmes doses, fractionnées en deux ou trois prises dans la journée, sont indiquées dans certains cas.

Oxyurose : *Adultes* : 15 à 20 gr. tous les matins à jeun pendant 5 jours de suite ; 10 gr. chez les enfants ; 5 gr. chez les tout petits. Intervalle de 6 jours entre chaque cure. Aucun régime spécial. Purgation après chaque cure.

INNOCUITÉ ABSOLUE.

Laboratoires BOUILLET

48, boulevard des Batignolles — PARIS. Marcadet 82-01.

BIVATOL

Formule. — α . Carboxéthyl ; β . Méthyl nonoate basique de bismuth. Le premier des sels de bismuth français présenté en solution huileuse fluide.

Indications thérapeutiques. — Antisypilitique, ayant une action spirillicide intense. Traitement d'attaque et d'entretien. Provoque la négativation rapide et la disparition de tous accidents. A utiliser chez les hérédos.

Présentation. — Ampoules huileuses fluides de 2 cc. contenant 0 gr. 035 de bismuth métal par cc., soit 7 cgr. au total. Boîtes de 12 ampoules constituant une cure.

Posologie. — *Adultes* : 12 injections de 2 cc. faites intramusculaires, à raison d'une tous les 2 jours pendant la première semaine, puis de deux par semaine ensuite

Enfants : 0 cc. 1 par semaine jusqu'à 3 ans ; 0 cc. 5 de 3 à 5 ans ; 1 cc. à 10 ans.

La boîte de 12 ampoules 2 cc. (adultes) : 25 francs.

— 10 — 1 cc. (enfants) : 20 francs.

Laboratoires du Docteur ROUSSEL

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI^e).

BLÉDINE JACQUEMAIRE

Composition. — Aliment rigoureusement complet, tant par sa teneur en albuminoïdes, graisses et hydrates de carbone, que par les éléments minéraux et *facteurs de croissance* (vitamines), extraits de la périphérie du grain de blé (recherches expérimentales effectuées sous la direction de MM. les Prof. Morel et Mouriquand au Lab. de Chimie organique et de tox. de la Faculté de Lyon, de mai 1919 à juillet 1920).

Propriétés. — Entièrement digestible et assimilable par les enfants dès le premier âge. Complément nécessaire du lait dans l'allaitement artificiel.

Indications. — Facilite la digestion du lait. Favorise la croissance et la dentition. Prépare et facilite le sevrage. Régularise d'une façon remarquable les fonctions digestives (Aliment de régime dans les cas suivants ; Diarrhée, Constipation, Gastro-entérites) ; désodorise les selles en modifiant rapidement la flore intestinale.

Particularités. — Ni cacaotée, ni lactée, ni maltée, ni torréfiée, ni étuvée et sans addition d'aucun produit pharmaceutique, la Blédine se conserve d'une façon parfaite, en boîtes de fer-blanc hermétiques, sans modification de goût, ni d'odeur, ni de composition.

Doses. — Du 1^{er} au 4^e mois : 1 *gramme par biberon et par mois d'âge*. Du 5^e au 6^e mois : 1 1/2 à 2 *cuillerées par biberon*. A partir du 7^e mois : 1 *cuillerée à soupe par repas* ; 1 1/2 à 2 *pour les adultes*.

Prix : La boîte 375 grs. 7 fr. 75.

Nota. — La *Blédine* peut se préparer à l'eau. Dans ce cas, doubler les quantités ci-dessus.

Blécao. — Toutes les qualités de la *Blédine* se retrouvent dans le *Blécao*, déjeuner reconstituant, aliment de régime d'une digestibilité exceptionnelle. Prix : La boîte 275 gr. 5 fr. 50.

Établissements JACQUEMAIRE

Société Anonyme au capital de 10.000.000 de frs.
VILLEFRANCHE (Rhône).

BLENNOPIAT

Composition. — Association de : Copahu, Cubèbe, Santal, Sassafras, Térébenthine.

Ancien opiat complet du Codex sous forme pilulaire, *glutinisée*.

Action thérapeutique. — Synergie balsamique efficace, absorption facile, pas de troubles gastriques ni de réaction rénale.

Indications. — Blennorragie à toutes ses périodes et toutes complications dues au gonocoque. Cystites. Urétrites.

Mode d'emploi. — 6 à 12 pilules par jour, au moment des repas.

Prix : 15 francs la boîte.

Laboratoire ADOL

L. GIROUD, Pharmacien de 1^{re} classe
78, Cours de la Liberté — LYON.

BLENNOSINE-FORNET

Vaccin buccal contre la Blennorragie.

Principe actif. — Gonocoques de différentes souches, spécialement préparés.

Indications. — Blennorragies aiguë et chronique, ainsi que leurs complications.

Posologie. — 1 à 3 pilules, trois fois par jour, une 1/2 heure avant les repas jusqu'à réaction locale et générale. Cette réaction, d'ailleurs légère, prouve l'activité spécifique de ce vaccin buccal anti-blennorragique.

Propriétés thérapeutiques. — Préventif et Curatif. Supprime rapidement l'écoulement. Jugule les douleurs. Evite ou guérit toutes complications.

Prix : 45 francs.

Vente et échantillonnage :

Laboratoire de Microbiologie
23, rue du Caire — PARIS (II^e).
Gutenberg : 03-45.

BLOCS « VECOR »

Complexe phytothérapique.

Forme. — Carrés fondants. Succédanés du café et du thé.

Composition. — Gui, Prêle, Aubépine, Oranger, Cassis, Anis.

Indications. — Hypertension, Palpitations, Azotémie, Sclérose, Aérophagie.

Mode d'emploi. — Solution chaude ou froide le matin à jeun.

Prix : 18 francs.

Laboratoires H. AMMANN, Pharmacien
3, Impasse Adam
BOULOGNE-BILLANCOURT.
Tél. : Molitor 01-90.

BLUYL

Collyre bleu spécial.

Composition. — Adrénaline, Cocaïne (Chlorhyd.), Bleu de méthylène, NaCl, Eau distillée d'Hamelis et Roses, Excipient spécial.

Indications. — Conjonctivites chroniques, Conjonctivite des neiges, Larmolements, Trachomes, Iritis, Fatigue oculaire, Hygiène des yeux.

Pas de contre-indication. — Emploi prolongé sans inconvénient. — Soulagement immédiat. — Recommandé aux automobilistes, alpinistes, colonaux.

Posologie. — 2 à 3 gouttes 3 à 4 fois par jour.

Prix. — Le flacon compte-gouttes : 16 francs (toutes pharmacies et O. C. P. Paris).

Laboratoire PHILBERT

6, avenue Mirabeau et 56 Ch. de l'Arbre-Inférieur
NICE.

BOLDINE HOUDÉ

Granules titrés à 1 milligramme.

Boldine Houdé

Principes actifs des feuilles de boldo.

Emplois thérapeutiques :

Maladies du foie, lithiase biliaire, ictère, hépatites, insuffisance hépatique, etc.

Mode d'emploi :

De 3 à 6 par jour, à prendre le midi et le soir, un quart d'heure avant les repas.

Laboratoires HOUDÉ

9, rue Dieu — PARIS.

BOLDOBYL

Composition. — *Extrait de bile, Boldo, Ferments lactiques, Agar-Agar, Podophyllin, Bourdaine.*

Forme. — Dragées.

Propriétés thérapeutiques. — Hépatites, Ictères, Cirrhoses, Constipations chroniques, Lithiase biliaire, Cholécystite, Angiocholite.

Mode d'emploi. — *Coliques hépatiques, Jaunisse, Ictère* : 3 dragées avant les repas de midi et du soir dans un peu d'eau de Vichy. *Fermentations, Auto-intoxications, Fétidité de l'haleine* : 2 dragées avant les repas de midi et du soir dans un peu d'eau de Vichy. *Constipation chronique* : 2 à 4 dragées le soir en se couchant.

Prix : 12 francs.

Laboratoires SAUBA
MONTREUIL (Seine).

BOLDOCRINOL

Anciennement : Boldobiline Jammes

Boldo et Opothérapie biliaire.

Opothérapique utilisé en parfait état d'activité thérapeutique grâce à une date limite d'utilisation portée sur chaque boîte.

Le BOLDOCRINOL est le plus physiologique des cholérétiques. Rééducateur idéal du foie et de l'intestin, il réalise un drainage biliaire sans brutalité, évitant surtout la violente chasse biliaire des sels magnésiens et sodiques.

Constipation, Hépatisme, Infections intestinales, Coliques hépatiques, etc.

6 à 8 comprimés par jour.

La boîte de 60 comprimés : 14 francs.

Laboratoires JAMMES

86, rue Michel-Ange (16^e).

(Tél. : Auteuil 51-85.)

BOLDO GMET

Composition. — Extrait total, liquide, sans alcool ni sucre, renferme *tous* les principes actifs de la feuille de Boldo fragrans : boldine huiles essentielles, matières aromatiques. Correspond à 2 gr. de feuilles fraîches par cuillerée à café.

Propriétés. — Diurétique, cholagogue, stimulant et antiseptique du foie et des voies biliaires.

Indications. — Tous les troubles fonctionnels du foie. Insuffisance. Congestion. Lithiase biliaire. Cholécystite. Anorexie. Constipation. A donner au cours d'un traitement opothérapique ou spécifique pour maintenir l'intégrité du foie.

Posologie. — 1 cuillerée à café dans une tasse d'eau chaude le matin à jeun ou aux repas de midi ou du soir

Prix : le flacon pour un mois, 18 francs.

Laboratoire GMET

27, faubourg Montmartre — PARIS (IX^e).

BOLDOINE ÉPARVIER

Forme. — Granulé fin sucré.

Composition. — 1 cuillerée à café équivaut à 4 gr. de Boldo frais, parties active et aromatique comprises.

Action. — Stimulant général. Cholagogue. Antisep-tique intestinal favorisant l'oxydation et l'éli-mination des déchets (urée).

Indications. — Affections hépatiques. Lithiase biliaire. Lithiase rénale. Ictères. Dyspepsies d'origine hépatique. Anorexie. Atonie des voies digestives. Cachexies.

Posologie. — Après chaque repas, 1 ou 2 cuillerées à café, prises en nature ou dans un peu d'eau chaude.

Prix : 15 francs.

Echantillons et littérature :

Laboratoires ÉPARVIER

26, grande rue Saint-Clair. — LYON.

BOLDOLACTIC LAGOUTTE

Composition et forme. — Comprimés dragéifiés à base de :

| | |
|--------------------------------------|------|
| Ext. de feuilles d'artichaut..... | 0,10 |
| Ext. de boldo..... | 0,05 |
| Ext. biliaires dépigmentés..... | 0,05 |
| Ferments lactiques sélectionnés..... | 0,05 |

Pour un comprimé.

Actions thérapeutiques. — Spécifique des mala-dies de la cellule hépatique et des voies biliaires.

Indications. — Ictère, Cholécystite, Angiocholite, Cirrhoses, Congestion hépatique, Dyspepsie bi-liaire, urticaire et dermatoses.

Mode d'emploi. — 6 comprimés par jour, 3 à midi et 3 le soir avant les repas.

Prix : la boîte de 60 comprimés, 12 francs.

Laboratoire LAGOUTTE

85, cours Albert Thomas — LYON (III^e).

BOLDORHÉINE

Composition. — Capsules glutinisées à base d'extrait de boldo, d'extrait biliaire, de podophyllin et de ferment lactique (conservé à l'état sec, mais vivant, dans un milieu approprié).

Action thérapeutique. — Combat l'insuffisance biliaire, stimule l'activité de la cellule hépatique, active la sécrétion et l'excrétion biliaires, régularise les fonctions intestinales et aseptise le tube digestif.

Indications. — Insuffisances hépatiques et biliaires, ictère, lithiase, etc.

Mode d'emploi. — 2 à 4 capsules, au moment des repas, avec une gorgée d'eau.

Prix : 10 francs.

**LABORATOIRE
DE PHARMACOLOGIE GÉNÉRALE
D^r PH. CHAPELLE**

8, rue Vivienne — PARIS.

BOLDO VERNE

Le cholagogue sûr et régulier.

Composition. — Extrait total des feuilles de Boldo contenant tous les principes actifs : boldine, essence et matières aromatiques.

Indications. — Tous les troubles fonctionnels du Foie et des voies biliaires. Anorexie, Atonie gastrique, Séquelles du Paludisme.

Posologie. — L à C gouttes par jour.

Prix : 15 francs.

Laboratoire VERNE
13, rue Docteur-Mazet — GRENOBLE

BOLÉASE MONAL

Forme. — Globules glutinisés.

Composition. — Bile et boldo, extraits complets et inaltérables.

Dose. — 4 à 6 globules par jour.

Action. — Cholagogue, décongestif et antitoxique.

Indications. — Troubles biliaires et hépatiques. Affections hépatiques : lithiase, ictères, congestions, cholémie, cirrhose, Affections intestinales : entérites muco-membraneuses, constipation, auto-intoxications.

Le flacon de 50 globules : 12 francs.

Laboratoires MONAL & C^{ie}

6, rue Bridaine — PARIS

BOLÈNE

Traitement de la Constipation

Composition. — Héxaméthylènetétramine, Sels biliaires, Pancréatine, Erepsine, Entérokinase, Agar-agar.

Mode d'action. — Désinfection et rééducation de l'intestin par l'association d'acides biliaires à l'héxaméthylènetétramine, le meilleur et le plus actif des antiseptiques biliaires.

Présentation. — Comprimés dragéifiés de 0.50.

Mode d'emploi. — 2 à 6 comprimés et plus par jour.

10 francs la boîte de 60 comprimés.

LABORATOIRES J. M. RICARDOU

Docteur en pharmacie

46, rue Pierre-Charron — PARIS

BORÉOL

Comprimés pour gargarismes et Inhalations.

Composition. — Perborate de soude, bicarbonate de soude. Essence de Wintergreen. Essences de cannelle badiane, menthe, excipient émollient.

Propriétés. — Antiseptique, sédatif et analgésique, déterge et décongestionne les muqueuses.

Indications. — Coryzas, sinusites, angines, pharyngites, laryngites, trachéites et trachéo-bronchites.

Mode d'emploi. — 1° En gargarismes : 1 comprimé dans un demi-verre d'eau bouillie, assez chaude.

2° En inhalations : 1 à 2 comprimés dans un bol d'eau bouillante. Se gargariser ensuite avec la même solution, à la fin de l'inhalation.

Prix du tube de 20 comprimés : 12 francs.

Dépôt général pour la France :

Laboratoire ASEPTOR

21, rue Feydeau — PARIS (II°).

Téléph. : Central 83-15.

BORICINE MEISSONNIER

Tetraborate de Sodium chimiquement pur en poudre fine. Sel défini, cristallisé en rosettes résultant de la combinaison de l'acide orthoborique et du baborate de sodium.

Infiniment supérieur à ses composants par :

1° *Sa pureté.* — Sel cristallisé neutre, non caustique.

2° *Sa solubilité.* — 16 p. 100 à froid } dans
75 p. 100 à l'ébullition } l'eau
parties égales dans la glycérine.

3° *Son pouvoir bactéricide.* — Stérilisante à 6 p. 100.

4° *Sa non-précipitation des alcaloïdes et son inaction sur les métaux.*

Indications. — Succédané des borax impurs et de l'acide borique dans tous leurs emplois. Succédané de l'iodoforme. Hémostatique puissant.

Hygiène et antiseptie générale de la peau et des muqueuses, conjonctivites, otites, ozène, stomatites, dermatoses, voies urinaires, gynécologie, plaies, brûlures. Bains.

Mode d'emploi :

En poudre : Insufflation en gynécologie, ophtalmologie, oto-rhinolaryngologie.

En solution : De 2 à 5 cuillerées à soupe par litre d'eau.

1 cuillerée = 8 gr. **Boricine.**

Prix : 7 fr. 50 net.

Laboratoires Jacques LOGEAS
BOULOGNE-SUR-SEINE, près PARIS.

Tél. : Auteuil 40-15 et 40-16.

BOROSODINE LUMIÈRE

Médication calmante et antispasmodique
des Affections nerveuses de toute nature.

Constitution. — Solution aqueuse de Tartrate boricosodique chimiquement pur dosée à 1 gr. par cc.

Propriétés. — Renferme, à poids égal, une plus forte proportion de bore actif que le Tartrate borico-potassique, beaucoup moins toxique et plus efficace.

Indications. — Agitation, insomnies, délires, hystéries, névroses, chorée et incontinence nocturne d'urine des anormaux instables ou agités. Les améliorations ne sont jamais obtenues aux prix de dépressions nerveuses profondes, elles s'accompagnent, au contraire, d'une amélioration très nette de l'état général, de l'état intellectuel et même du faciès du malade.

Mode d'emploi. — Doses progressives qui varient de 2 à 10 gr. par jour chez l'adulte pouvant être notablement dépassées, sans inconvénient.

La BOROSODINE LUMIÈRE peut, sans inconvénient, être administrée dès le plus bas âge sous forme de SIROP DE BOROSODINE LUMIÈRE exactement dosé à 1 gr. de solution BOROSODINE LUMIÈRE par cuillerée à café.

Doses. — 1 à 2 cuillerées à café par jour dans un peu d'eau sucrée.

Formuler. — *Adultes* : Flacon de Solution BOROSODINE LUMIÈRE.

Enfants : Flacon de SIROP DE BOROSODINE LUMIÈRE.

Prix : 25 francs.

LABORATOIRES LUMIÈRE

45, rue Villon — LYON.

BOROSTYROL SCHLATTER

Spécifique cicatrisant des pertes de substances cutanées ou muqueuses.

Composition et présentation. — 1° Soluté alcoolique ; 2° Pommade ; les deux à base de dérivés terpéniques et de phénols substitués.

Propriétés thérapeutiques. — Régénérateur de la cellule. Anesthésique local. Antiseptique. Non toxique.

Indications. — Plaies, Brûlures, Contusions, Boutons, Aphtes, Piqures, Crevasses du sein, Rougeurs des nourrissons, Ulcères variqueux, Vulvites, Vaginites, Métrites, Prurits.

Mode d'emploi. — Badigeonnages, frictions, pansements adhérents au coton, selon les cas. — Prix : Flacon, 9 fr. 50 ; tube, 8 fr. 75.

Laboratoires MAYOLY-SPINDLER

1, place Victor-Hugo — PARIS (XVI^e)

A Bruxelles : **LE MARINEL**, Pharmacien
4, avenue Orban Van Volxem.

BOULES QUIES

Dormir et travailler au milieu des bruits.

Boules plastiques adoptant exactement la forme du conduit auditif. Point de fusion plus élevé que la température maximum du corps.

Antivibratoires, ne transmettant pas au tympan les vibrations de l'atmosphère qu'elles interceptent.

Indications :

Accessoire précieux de la Thérapeutique, permettant d'assurer le repos de tous les malades.

Souveraines au cours des diverses anesthésies, contre le mal de mer, les bruits de la rue, de l'usine de l'hôtel, etc...

Indispensables aux nageurs pour éviter les otites, dues à l'introduction de l'eau dans les oreilles,

Echantillons sur demande.

BOULES QUIES

47, boulevard Victor — PARIS (XV^e).

BRADYGASTRINE DUCLOY

Modérateur de la Sécrétion gastrique.

Formes. — Granulé. — Comprimés.

Composition. — Acide fumaro-protocétrarique-citrate trisodique-phosphate tricalcique-carbonate et bromure de calcium-magnésie calcinée-terre sigillée.

Propriétés thérapeutiques. — *Antinauséuses* par l'acide fumaro-protocétrarique et le citrate trisodique. *Neutralisantes* par la terre sigillée et la MgO. *Modératrices de la sécrétion* par le phosphate et le bromure de calcium. *Dépourvues d'action excitante secondaire* grâce à la faible proportion de citrate trisodique : 50/0.

Indications. — Toutes hyperchlorhydries et hypersécrétions.

Contre-Indications. — Aucune. Même l'hyperchlorhydrie des cardiaques.

Posologie. — Une dose : 1 cuillerée à café = 3 comprimés.

3 à 6 cuillerées à café de granulé à avaler à sec ou mieux avec une gorgée de liquide ou 9 à 18 petits comprimés à sucer lentement.

Prendre une nouvelle dose : au bout d'un quart d'heure si l'action sédative n'est pas immédiate ; au moment de la réapparition des douleurs si la sédation est passagère.

Ces doses moyennes peuvent être augmentées sans inconvénients et très rapidement si le soulagement se fait attendre. Une fois le soulagement obtenu, diminuer progressivement les doses, mais ne pas cesser brusquement.

La cure peut être continuée plusieurs mois ou renouvelée en cas de besoin.

Prix : 20 francs.

Laboratoires DUCLOY et Cie
ARQUES (Pas-de-Calais).

BROMADYL VICARIO

Brom-diéthyl-acétyl-carbamide.

Comprimés à 50 centigrammes.

Sédatif léger

Particulièrement indiqué dans les troubles neurasthéniques, phobies, etc.

Provoque rapidement le sommeil et, au réveil, ne laisse pas au malade l'impression pénible de dépression nerveuse.

Posologie. — *Comme hypnotique*, 1 ou 2 comprimés dans une infusion chaude, le soir.

Comme sédatif, 1/2 ou 1 comprimé, 3 ou 4 fois par jour, dans l'eau froide.

Le tube de 10 comprimés : 8 francs.

Laboratoires VICARIO

17, boulevard Haussmann — PARIS (IX^e)

BROMÉINE MONTAGU

(Bromhydrate de Codéine.)

Propriétés. — Action sédatrice et analgésique, particulièrement puissante, sans brutalité par suite de l'union des qualités calmantes du Brome et de la Codéine.

Très efficace contre l'élément douleur, sans accoutumance et moins toxique que la plupart des sédatifs.

Indications. — Insomnies, Névralgies, Névrites, Toux nerveuses, Démorphinisation.

Formes pharmaceutiques. — *Ampoules dosées* 0,02 cgr, 15 fr. — *Pilules* : 0,01 cgr. par pilule. Dose : 2 à 8 pilules par jour, 12 fr. 50. *Sirop* : 0,03 par cuillerée à soupe, Dose : 1 à 3 cuill. par jour, 15 fr. — *Gouttes* : X à XXX gouttes, 3 fois par jour, dans un peu d'eau sucrée, 15 fr.

Laboratoire MONTAGU

49, boulevard de Port-Royal — PARIS

BROMIASE

Description. — Capsules glutinisées contenant :

Bromure de potassium..... 0 gr. 30

Bromure d'ammonium..... 0 gr. 20

Levurine extractive..... 0 gr. 10

En flacons de 50 capsules.

Action thérapeutique. — La même que celle des bromures, mais sans bromisme grâce à l'action spécifique de la levurine et à l'enrobage qui ne libère les bromures que dans le milieu alcalin de l'intestin. Préparation de dosage rigoureux, de conservation indéfinie, et ne répugnant pas au malade.

Indications. — 2 à 12 capsules par jour, dans l'épilepsie, la chorée, l'hystérie, les névroses, les vomissements de la grossesse.

Prix : 30 francs.

Laboratoires Ch. COUTURIEUX

18, avenue Hoche — PARIS.

BROMO-GARNAL

Sédatif nervin. Hypnotique.

Composition. — Préparation liquide contenant par cuillerée à café :

Phényl éthyl-malonylurée sodique 0,025

Na Br. chimiquement pur 0,25

■ Phosphoglycérate de Na 0,10

Indications. — *Toutes névropathies* : nervosisme, insomnie, excitation psychique, anxiété, épilepsie, convulsions de l'enfance, etc...

Avantages. — *Forme liquide* : action rapide et sûre, tolérance parfaite. Élimination totale, Innocuité absolue, Pas d'accoutumance, Aucun risque de toxicomanie. *Jamais de dépression consécutive. Ni goût* (après dilution), *ni odeur*. Ne contient ni sucre ni alcool.

Mode d'emploi. — Toujours dilué : eau (sucrée ou non), infusion, lait.

Posologie. — *Adultes*, comme sédatif nervin : de 2 à 4 cuillerées à café par jour, espacées. Comme hypnotique : 2 cuillerées à café au coucher.

Demi-dose pour les enfants au-dessus de 6 ans. Au-dessous, X gouttes par dose et par année d'âge. De 2 à 4 doses par jour.

Prix : 13 fr. 50.

Laboratoire du BROMO-GARNAL

13, rue Boinod — PARIS (XVIII^e).

BROMOGÉNOL PÉPIN

Peptone bromée spéciale
(Voir l'étude sur l'Iodogénol.)

Forme. — Gouttes.

Doses et mode d'emploi. — XX gouttes de Bromogénol Pépin = 0 gr. 50 de Bromures métalliques. A prendre dans un peu d'eau ou d'infusion aromatique. Renouveler plusieurs fois.

Propriétés thérapeutiques. — Médication bromurée très énergique avec un faible poids de brome. Goût agréable. Tolérance parfaite. Préférable aux sirops bromurés et polybromurés.

Indications. — Toutes celles des Bromures métalliques : Affections du système nerveux, Insomnie, Hystérie, Convulsions, Epilepsie, Névralgies, etc.

Prix : 12 fr. 50.

Laboratoires PÉPIN et LEBOUCC
COURBEVOIE (Seine). Tél. : Défense 09-71.

BROMOMAÏSINE

Globules.

Combinaison directe du *Brome* et d'une *Albumine* d'origine strictement *végétale*, sans aucune autre association médicamenteuse.

Propriétés particulières. — Absence d'albumoses ou de peptones d'origine animale. Aucune toxicité. Tolérance absolue même à hautes doses. Suppression complète du bromisme. Disparition de tous les inconvénients dus aux bromures dissimulés ou non. Aucune saturation de l'organisme. Absence de toute altération dans l'estomac. Action directe par solubilité uniquement intestinale.

Indications. — Médication donnant des résultats certains et permettant, si besoin, d'instituer un traitement intensif dans : tous états névropathiques, psychoses de toute nature, excitabilité, convulsions, épilepsies, insomnies, névralgies, spasmes et toutes affections relevant de la bromothérapie.

Posologie. — Chaque globule contient 2 cgr. de brome actif. Quatre globules correspondent comme effet thérapeutique à un gramme de bromure alcalin. *Enfants* : 2 à 6 globules par jour. *Adultes* : 6 à 15 globules et au delà par jour, en 2 fois, au début des repas.

Prix : 15 francs.

Établissements SOUDAN
48, rue d'Alésia — PARIS (XIV^e).
Enregistré au Laboratoire national n° 218-1.

BROMONE ROBIN

Combinaison physiologique de Brome et de Peptone de viande de bœuf.
Gouttes : 40 gouttes correspondent comme effet thérapeutique à 1 gr. de bromure de potassium.

Doses et mode d'emploi. — *Adultes* : XX à L gouttes. *Enfants* : X à XX gouttes.

A prendre en deux fois aux principaux repas dans un peu de boisson.

Propriétés thérapeutiques. — Non toxique, très assimilable. Ne fatigue pas le tube digestif. Pas de bromisme. Tolérance parfaite. Aucun mauvais goût.

Indications. — Excitabilité nerveuse, troubles de la femme, fatigues cérébrales, insomnie des vieillards, convulsions des enfants, hystérie, épilepsie.

Prix : 16 fr. 50.

Laboratoires ROBIN

13, rue de Poissy — PARIS.

BROMOVOSE

Combinaison organique bromo-albuminoïde stable.

Propriétés thérapeutiques. — Grande affinité du brome pour les tissus, élimination beaucoup plus lente qu'avec les bromures alcalins, d'où action thérapeutique plus sûre et plus prolongée par imprégnation des centres nerveux.

Pas de phénomène d'accumulation, ni de bromisme. Tolérance parfaite.

Indications thérapeutiques. — **Insomnies. Excitabilité nerveuse. Palpitations cardiaques. Convulsions. Névroses. Épilepsie, etc.**

Posologie. — XL gouttes à prendre 2 ou 3 fois par jour dans un peu de liquide.

Prix de vente au public : 15 francs.

Laboratoire MADYL

14, rue de Miromesnil — PARIS

Téléphone : Anjou 16-55.

BROMURE DE CALCIUM

(Sirop Henry Mure, au).

Les convulsions de la première enfance, les coliques, les accidents et les douleurs de la dentition, l'agitation, l'insomnie, l'énervement.

Chez les enfants plus grands, le Sirop Henry Mure au Bromure de Calcium est le médicament qu'il faut donner contre les crises nerveuses, la Chorée, les toux nerveuses.

A donner aux enfants irritables, agacés, à ceux qui souffrent de névralgies, qui ont des colères sans motif et qui ne peuvent travailler sans être distraits. Rapidement leur caractère se transforme.

Ce sirop s'emploie aussi comme tonique.

Mode d'emploi. — Le sirop Henry Mure au Bromure de Calcium peut être administré sans danger dès la naissance jusqu'à la puberté.

La dose moyenne est de 2 à 3 cuillerées à café par année d'âge. En raison de l'innocuité du médicament et de la pureté du sel chimique qui entre dans sa préparation, cette dose peut être dépassée sans inconvénient.

Le sirop Henry Mure au Bromure de Calcium, d'un goût très agréable, se prend ordinairement pur. On peut aussi le donner dans du lait ou dans une infusion de tilleul.

L. N. C. 428-4

Laboratoires du Docteur VERMERSCH

71, rue Saint-Jacques — PARIS (V^e).

BRONCHODERMINE

Laboratoires du Docteur TISSOT.

Sous ce nom (déposé) est présenté un nouveau produit à base de *corps gras, spécial, adhérent à la peau*, pour obtenir l'absorption simple et rapide des éléments les plus connus dans le traitement des voies respiratoires : Gaïacol, Sève de Pin, Terpinol, Eucalyptol et Helenine.

La peau est l'agent *dyaliseur, absorbant à grande surface*, le plus actif.

En respectant les *voies stomacales, intestinales et rénales* (ce qui a son prix) on peut traiter par simple application tous les *rhumes, bronchites, pneumonies, gripes, pleurites, danger de bacillose, coqueluches, etc., etc.*

Mode d'emploi. — A tous les âges, étendre une bonne couche de Bronchodermine sur le dos, et au besoin la poitrine, recouvrir d'ouate ou de flanelle la même, jusqu'à la fin du traitement.

Prix : 10 francs.

Laboratoires du Docteur TISSOT

34, boulevard de Clichy — PARIS.

BRONCHOFORME

Composition. — **Sirop** : Teinture de racines d'aconit, belladone, eau de laurier cerise, benzoate de soude, sirop de bourgeons de sapin, de bromoforme composé et de cerises.

Comprimés : Bromoforme, Sulfate de strychnine (faible dose), codéine, arrhénal, terpine et extrait stabilisé de valériane.

Formes pharmaceutiques. — Sirop et Comprimés.

Indications. — Bronchites aiguës ou chroniques, suite de Grippe, Rhumes négligés, Catarrhes, Influenza, Asthme, Coqueluche, Laryngites, Trachéites, etc.

Doses. — **Sirop** : 4 cuillerées à soupe par 24 heures.

Enfants : 3 à 5 cuillerées à café par 24 heures.

Comprimés : 4 à 5 par jour.

Enfants : 7 à 15 ans : 2 à 3 par jour.

Prix du sirop 18 francs

— des comprimés 13 fr. 75

Laboratoires A.-G. DECHATRE

20 bis, rue du Sergent-Godefroy

MONTREUIL — PARIS.

Tél. : Avron 14-69.

BRONCHOSEPTOL-LAURIAT

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptise les bronches et les voies respiratoires. Calme la toux, facilite l'expectoration : fluidifie les sécrétions et tarit le catarrhe des muqueuses bronchiques.

Indications cliniques. — Toutes affections broncho-pulmonaires rhumes, grippe, bronchites, catarrhes, trachéites, broncho-pneumonie tuberculose pulmonaire, gazés de guerre.

Composition. — Chaque comprimé renferme :

| | |
|--|--------|
| Poudre de Dover codéinée (Opium 0,01 remplacé par Codéine 0,01)..... | 0,10 |
| Bromol (Tribromophénol)..... | 0,02 |
| Extrait d'Aconit titré (Codex)..... | 0,0025 |
| Extrait de Belladone (titré Codex)..... | 0,005 |
| Terpine..... | 0,05 |
| Benzoate de Soude..... | 0,10 |

Comprimés glutinisés se dissolvant seulement dans l'intestin et évitant, ainsi l'action émétisante de l'Ipéca à doses répétées.

Mode d'emploi. — **Adultes** : 4 comprimés par jour et 2 dans la nuit, s'il y a lieu.

Enfants : au-dessus de 8 ans, demi-dosé.

Avaler sans sucer ni croquer.

Prix : 11 fr. 90.

Laboratoires LAURIAT

LA GARENNE-COLOMBES (Seine).

BRONCHO-VACLYDUN

Lysats vaccins du Docteur Duchon.

Adopté par les Hôpitaux de Paris.

Composition. — Lysat polyvalent (B. diphtériques, Streptocoques, Pneumocoques, Staphylocoques, B. de Pfeiffer, M. Catarrhalis, Colibacilles).

Indications. — *Enfants, adultes, vieillards* : Grippe, Bronchites profondes, Congestions pulmonaires, Broncho-pneumonies (Rougeole, Coqueluche, Diphtérie), Vaccination pré-opératoire et Accidents pulmonaires post-opératoires, Suppurations pleuro-pulmonaires non fétides.

Posologie. — Première injection de 1/2 cc., les suivantes : 1 cc. tous les jours jusqu'à apyrexie, puis tous les deux jours. Nourrissons, enfants, adultes, mêmes doses. (Voir VACLYDUN, page 1610.)

Présentation, en boîtes de 8 ampoules de 1 cc.

Prix : 40 francs.

La demi-boîte : Prix : 25 francs.

Laboratoires Pharmaceutiques CORBIERE

27, rue Desrenaudes — PARIS (XVII^e).

Tél. : Carnot 78-11.

BRONCOSOL

Spécifique des affections broncho-pulmonaires.

Composition. — Le Broncosol ne se présente que sous la forme de comprimés, chaque comprimé renferme : Codéine, 0 gr. 015 ; Extrait d'aconit, 0 gr. 01 ; Extrait de belladone, 0 gr. 01 ; Terpène, 0 gr. 10 ; Thiocol, 0 gr. 05 ; Ipéca pulvérisé, 0 gr. 02.

Action thérapeutique. — Hypnotique puissant, calmant nerveux, modificateur des sécrétions bronchiques, expectorant parfait, régulateur des actes respiratoires.

Posologie et mode d'emploi :

Adultes : 5 ou 6 comprimés par 24 heures,

Enfants de plus de 10 ans : 2 ou 3 comprimés par 24 heures.

Avaler les comprimés sans les sucer ni les croquer, de préférence dans l'intervalle des repas et au moment des crises.

Prix : 11 francs la boîte de 20 comprimés.

Laboratoires CH. BRÉSIL

12, rue Saint-Gilles — Paris (III^e).

Téléphone : Archives 67-05.

BUCMINE

Buchu-formine.

Composition. — Formine de pureté absolue, complètement indolore, buchu stabilisé. Benzoate de lithine.

Formes et doses. — Granulés de saveur agréable, 2 à 4 cuillerées à café. Comprimés à 0,50, 2 à 4 par jour.

Indications. — Affections des voies biliaires et urinaires. Uricémie infantile. Irritation de l'épithélium urinaire. Maladies infectieuses. Infections entéro-rénales post-grippales.

Prix : 15 francs.

Laboratoires G. WARIN

4, Chaussée de la Muette — PARIS.

BULGARINE THÉPENIER

Culture pure de Ferments lactiques bulgares sur milieu végétal.

Forme. — Bouillon, comprimés et poudre.

Indications thérapeutiques. — Entérite muco-membraneuse, gastro-entérite (des nourrissons et de l'adulte). Diathèse goutteuse, Constipation, Diarrhée, Entérite tuberculeuse, Infections hépatiques (d'origine intestinale), Dysenterie, Dermatoses, Furunculoses, Prophylaxie de la Fièvre typhoïde et du Choléra. *Poudre* : Rhinites, Ozènes, Stomatites, pansement des Plaies.

Modes d'emploi. — *Adultes* : Sucrer 2 comprimés ou boire un verre à madère de Bouillon 4 fois par jour 1/2 heure avant le repas.

Enfants : Demi-dose.

Saupoudrer, insuffler ou priser la Poudre.

Prix : La boîte ou flacon : 12 fr. 50.

Le 1/2 flacon de bouillon : 8 fr. 75.

Laboratoire des Ferments

du Docteur A. THÉPENIER

10 et 12, rue Clapeyron — PARIS

R. C. Seine 150.854.

C 40

Indications thérapeutiques. — Traitement des cancers, fibromes et de toutes tumeurs malignes.

Principe actif. — Savons doubles de Cu et Mg.

Formes :

C 40 Injectable, en boîtes de 10 ampoules de 10 cc. et de 2 ampoules de 5 cc.

C 40 Comprimés. — En flacons de 120.

Doses :

Ampoules. — Faire 3 à 5 séries de 12 à raison d'une ampoule par jour.

Comprimés. — Deux comprimés le midi et deux comprimés le soir, pris en mangeant. Faire suivre le traitement pendant un an.

Prix : 60 fr. la boîte d'ampoules.

22 fr. le flacon de comprimés.

Laboratoires DROUET et PLET

RUEIL-MALMAISON (Seine-et-Oise).

CACHETS DU D^r BOVEIL

à l'Amino-Phéno-Théine.

Calmant infailible de l'élément douleur, quelle qu'en soit l'origine. Tolérance parfaite. Aucune contre-indication.

Indications. — Névralgies, Migraines, Crises de Rhumatisme ou de Goutte, Insomnies, Fièvre, Grippe, Influenza, Courbature, Paludisme, Douleurs menstruelles, Maux de dents, Otite, Mastoïdites et toutes douleurs.

Doses et Mode d'emploi. — Un cachet au moment où l'on souffre, avec un liquide chaud de préférence.

Dose moyenne : 2 à 3 cachets par jour.

Echantillon et littérature sur demande.

Prix : 8 fr. l'étui de 12 cachets.

Enregistré au Laboratoire National de contrôle des médicaments sous le n° 346-1.

Marc PARIS, pharmacien de 1^{re} classe

1, rue Lassalle — LYON (La Boucle) (IV^e.)

CACHETS KAPYTAN

contre la Grippe.

Composition. — Codéine (1 cent. par cachet),
Teinture d'aconit (III gouttes par cachet),
Benzoate de soude, terpine, benzonaphtol.

Propriétés thérapeutiques. — Sédatif de la toux,
fluidifiant les sécrétions bronchiques. Antisepsie
du tube digestif (Grippe, Influenza).

Indications. — Grippe, Bronchites, Asthme pul-
monaire, Rhumes et toutes Affections broncho-
pulmonaires.

Posologie. — 4 cachets dans les 24 heures, pris
entre les repas, dans un grog fortement alcoolisé.

L'étui de 12 cachets : 12 francs.

Echantillons et Littérature :

Laboratoires BARDET

Fondés en 1860.

76, rue de Sèvres — PARIS (VII^e).

CACHETS PACHAUT

(Cachets de santé).

Propriétés thérapeutiques. — Laxatifs, chola-
gogues, ne provoquant ni coliques ni selles diarrhé-
ques.

Composition :

Alpha :

| | |
|---------------------------|------|
| Extrait de cascara..... | 0.25 |
| Agar-agar..... | 0.20 |
| Bicarbonate de soude..... | 0.15 |

Gamma :

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Extrait de cascara..... | 0.25 |
| Agar-Agar..... | 0.20 |
| Bicarbonate de soude..... | 0.15 |
| Belladone | un centigramme. |

Mode d'emploi. — De 1 à 4 cachets par jour à
prendre de préférence au début du repas du soir

Prix : 10 francs.

Laboratoires PACHAUT

130, boulevard Haussmann — PARIS

Téléph. : Laborde 16-72.

CACHETS « ROCHE » DE THIOCOL

1 cachet « Roche » de Thiocol = 0,50 cgr. Thiocol « Roche ».

1 gr. Thiocol « Roche » = 0,52 cgr. galaccol cristallisé.

Doses et mode d'emploi. — 1 à 4 par jour et plus.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique pulmonaire, Phagocytogène, Eupéptique et Orexique.

Indications thérapeutiques. — Toutes les affections broncho-pulmonaires, Rhumes, Bronchites, Grippe, Tuberculose, Coqueluche, Rachitisme, Dyspepsies, Entérites, etc.

Avis très important. — Pour éviter toute substitution inactive ou même toxique, bien spécifier toujours :

CACHETS « ROCHE » de Thiocol.

Enregistré au Laboratoire national de contrôle des médicaments sous le n° 504-48.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et C^{ie}
10, rue Crillon — PARIS (IV^e).

CACHETS SPÉVIN

Cure rationnelle d'amaigrissement.

Ni Iode — Ni thyroïdine.

Indications. — Obésités simples, Obésités avec hypertension, avec manifestations dites « arthritiques » (Migraines, Asthme, Urticaire, Rhumatisme, Goutte).

Propriétés thérapeutiques. — Antisepsie intestinale. Assure le bon fonctionnement des voies digestives et des reins, maintient la force et l'activité.

Composition. — Chlorure de magnésium, Charbon végétal pulv., Cascara sagrada, Lactose, Quassia amara, Ergostérine irradiée (Vitamine D).

Présentation. — Suivant la proportion des poudres, les cachets Spévin se font sous plusieurs formes.

Cachets Spévin n° 5, formule normale.

Cachets Spévin n° 1, plus forts que n° 5.

Cachets Spévin n° 10, diurétiques.

Cachets Spévin n° 4, contenant en plus un purgatif (jalap).

Mode d'emploi. — Suivant indication médicale. Généralement 3 cachets par jour, au moins au début de la cure.

Prix : 27 francs.

Laboratoires des produits L. CHAUVIN

3, rue de Vouillé — PARIS (XV^e).

Tél. : Vaugirard 21-10.

CACHETS VAN-SOL

Formule :

| | |
|------------------------------|------|
| Poudre de colchique..... | 0,03 |
| Acide acétylsalicylique..... | 0,50 |
| Acide phénylcinchoninique.. | 0,25 |

Forme. — Boîte de 20 cachets.

Propriétés thérapeutiques. — Toutes les formes de rhumatismes et névralgies de toute origine.

Mode d'emploi. — De 2 à 4 cachets par jour, pris de préférence au moment des repas, autant que possible à intervalles réguliers en laissant un intervalle de 3 heures entre chaque cachet.

Ne pas en donner aux enfants.

Prix : 15 francs la boîte.

Laboratoire P. et R. PLAGNOL

18, rue du Maréchal-Foch — VERSAILLES
(S.-et-O.).

CACODYLE GONNON

Au Cacodylate de soude pur corrigé par le procédé Hélier.

Présentation et composition :

Sirop : Cacodylate de soude (2 cgr. par cuill. à soupe) associé à un sirop iodophosphaté tannique spécial (Sirop de Lovel).

Vin : 2 cgr. de Cacodylate de soude et 20 cgr. de phosphoglycérate de chaux, soude et potasse.

Granules : 2 cgr. de Cacodylate de soude.

Ampoules : 5 et 10 cgr. par cc.

Gouttes : 1 cgr. par V gouttes.

Propriétés thérapeutiques. — Toujours bien toléré, permet d'administrer l'arsenic à haute dose et pendant longtemps, sans craindre les inconvénients des composés minéraux de l'arsenic. Excitant de la nutrition et modérateur nervin.

Indications. — Affections pulmonaires, anémie profonde, chlorose, scrofule, impaludisme, psoriasis, et tout état cachectique.

Posologie :

Sirop : 3 à 6 cuill. à soupe par jour.

Vin : 3 à 6 cuill. à soupe par jour.

Granules : 3 à 6 par jour.

Gouttes : V à XV gouttes par jour.

Ampoules : 1 par jour.

Sirop et vin : 12 francs.

Granules, Gouttes et ampoules : 7 fr. 50.

Produits GONNON

14, rue Victor-Hugo — LYON.

CACODYLINE JAMMES

Médication cacodylique intensive indolore.

Enfants : Cacodyline A. 10 cgr. Cacodylate de soude (1 cc.). Cacodyline B : 20 cgr. Cacodylate de soude (2 cc.).

Adultes : Cacodyline C, 30 cgr. (3 cc.). Cacodyline D : 50 cgr. (3 cc.). Cacodyline E : 1 gr. (3 cc.). *Magnésio-Cacodyline*. Cacodylate de soude : 30 cgr. Chlorure de magnésium : 20 cgr. (3 cc.).

Une injection intramusculaire ou intraveineuse par jour.

Indications. — Anémies, Asthénie, Tuberculose, Prétuberculose, Syphilis.

Prix public : 20 francs.

Laboratoires JAMMES

86, rue Michel-Ange — PARIS (XVI^e).

CADIOR

Composition. — Complexe organo-métallique dépourvu de soufre, dans lequel l'iode, catalysé par le cadmium, ajoute sa puissante action antibacillaire à celle de l'or. Tolérance parfaite assurée par la présence de strontium et de calcium.

Présentation. — Ampoules de 5 cc. (boîte de 6) pour injections intraveineuses ou intramusculaires.

Indications. — Tuberculose sous toutes ses formes, Septicémies ; complications broncho-pulmonaires des maladies infectieuses ; rhumatismes chroniques ; mycoses ; convalescences trainantes, amaigrissements de causes indéterminées.

Mode d'emploi. — Une ou deux injections intraveineuses ou deux injections intramusculaires par semaine. Série de 25 à 30 injections.

(Pour technique détaillée du traitement, consulter littérature spéciale.)

Prix : 35 francs la boîte.

Etablissements T. LECLERC
D^r P. LEMELAND, Pharmacien
 10, rue Vignon — PARIS (IX^e).

CAFÉDRINE

A la caféine iodurée et au chlorhydrate d'éphédrine.

Formes. — Elixir et dragées.

Propriétés thérapeutiques. — Antiasthmatic, Tonicardiaque, Diurétique.

Indications. — *Asthme essentiel ou réflexe, Emphysème, Oppressions, Rhume des foies, Rhinites, Bronchites aiguës ou chroniques, Insuffisances cardiaques, Néphrites chroniques avec mal de Bright, Rétentions chlorurée et uréique.*

Mode d'emploi. — *Elixir* : 2 à 4 cuillerées à café par jour.

Dragées : 2 à 4 dragées par jour.

Prix : 16 francs.

Laboratoires SAUBA
MONTREUIL (Seine).

CALCIBRONAT « SANDOZ »

Bromogalactogluconate de Calcium.

Combinaison bromo-calcique nouvelle associant en un seul médicament les effets sédatifs du Brome et du Calcium à dose efficace. — Médicament injectable. Agissant aussi bien sur le système nerveux central que sur le système nerveux organo-végétatif. N'a pas les effets secondaires du Brome et des Bromures. Bien toléré par les centres nerveux, n'amène pas de bromisme, pas de troubles gastriques ou intestinaux, pas d'éruptions cutanées, pas d'action dépressive.

Indications. — Toutes les indications de la médication Bromée et Bromurée sans bromisme.

Formes et Posologie :

Comprimés effervescents dosés à 0,45 de Brome : 1 à 4 par jour.

Granulé dosé à 0,45 de Brome par cuillerée à soupe : 1 à 4 cuillerées à soupe par jour.

Ces doses peuvent être augmentées et au maximum doublées dans des cas particuliers.

Ampoules de 5 et de 10 cc. : 1 à 2 par jour (injections lentes par voie endoveineuse ou intramusculaire).

Le tube de 10 comprimés eff. : 10 francs.

La boîte de 100 gr. granulé : 10 francs.

La boîte de 5 amp. de 10 cc. : 25 francs.

Produits SANDOZ

20, rue Vernier — PARIS (XVII^e).

CALCIGÉNOL

Phosphate tricalcique colloïdal
(avec mouvements browniens).

Doses quotidiennes :

Adultes : 2 cuillerées à potage.

Adolescents : 2 cuillerées à dessert.

Enfants : 2 cuillerées à café.

Prix : 15 francs le flacon.

CALCIGÉNOL IRRADIÉ

Phosphate tricalcique colloïdal
(avec mouvements browniens)
et ergostérine irradiée.

(450 unités physiologiques par cuillerée à potage).

Doses quotidiennes :

Adultes : 2 cuillerées à potage.

Adolescents : 2 cuillerées à dessert.

Enfants : 2 cuillerées à café.

Prix : 18 francs le flacon.

90, boulevard Saint-Denis

COURBEVOIE-PARIS (Seine).

CALCILINE

Forme. — Comprimés, granulé.

Trois formules : Calciline pure, Adrénalinée,
Méthylarsinée.

Indications. — Anémie, lymphatisme, tuberculose, maladies des os, croissance, convalescence, grossesse, carie dentaire.

Doses. — 2 comprimés ou une mesure (granulé) dans un peu d'eau avant les deux principaux repas, 20 jours par mois pendant 3 mois.

Prix : Calciline, 12 fr. ; Calciline adrénalinée, 14 fr. ; Calciline Méthyl., 13 fr.

Laboratoires Gastro-Entérologiques

ODINOT

21, rue Violet — PARIS (XV^e).

Tél. : Ségur 69-13.

CALCIONAL

Ion Calcium Stabilisé.

Deux formes :

Comprimés sans goût. — Ampoules indolores.

1 comprimé = 25 centigr. de CaCl^2 naissant libéré au contact de l'eau et des sécrétions digestives.

1 ampoule = 1 milligramme de calcium ionisé, injectable par la voie sous-cutanée.

Propriétés thérapeutiques. — Celles du chlorure de calcium sans aucun de ses inconvénients.

Indications. — A titre préventif et curatif (hémorragies et états hémorragipares, albuminuries, réactions sériques tardives, spasmophilies, tétanies, décalcifications, asthénies).

Doses :

Comprimés : Nourrissons : 1 à 2 par jour. — Enfants : 2 à 4 par jour. — Adultes : 5 à 8 par jour.

A faire dissoudre dans l'eau sucrée.

Ampoules : Enfants (2 à 10 ans), 1 tous les 2 jours. — Adultes, 1 tous les jours.

Prix : 15 francs.

Laboratoires L. LEMATTE et G. BOINOT

52, rue La Bruyère — PARIS (IX^e).

Adresse télégr. : Chevrematte 90 — PARIS.

CALCI-STÉNINE

Solution titrée de Chlorure de Calcium

LXXX gouttes = 1 gramme des sels suivants :

| | |
|------------------------------|------|
| Chlorure de Calcium. | 0,94 |
| Chlorure de Magnésium | 0,06 |

Indications. — *Reconstituant* : Croissance, Convalescence, Prétuberculose, Grossesse, Allaitement.

Hémostatique : Curatif de toutes les hémorragies et préventif des hémorragies post-opératoires.

Diurétique : Néphrites, Albuminuries.

Antianaphylactique : Accidents sériques, Urticaire.

(La CALCI-STENINE, étant à la fois reconstituante et antianaphylactique, est indiquée dans la convalescence de la diphtérie).

Posologie :

Enfants : Reconstituant : V gouttes par année ; Hémostatique : XV gouttes par année ; Antianaphylactique : IV gouttes par année.

Adultes : Reconstituant : XL gouttes 2 fois par jour ; Hémostatique : LXXX gouttes 3 à 4 fois par jour ; Diurétique : LXXX gouttes 5 à 10 fois par jour ; Antianaphylactique : XXX gouttes 3 fois par jour.

Laboratoire MAIRE, pharmacien

171, rue de Belleville — PARIS

CALCIUM FRANCALCION

Calcithérapie.

Composition. — Acétylglycocolate de calcium.

Présentation :

- 1° En ampoules de 5 cc. à 10 p. 100 pour injections intra-veineuses.
- 2° En ampoules de 5 cc. à 10 p. 100 pour injections intra-musculaires.
- 3° En solution à 20 p. 100 (sans odeur, ni saveur).

Deux fois par jour, avant chacun des deux principaux repas, dans un peu d'eau sucrée.

Indications cliniques :

- a. *Indication recalcifiente* : Rachitisme, Retard de consolidation des fractures. Carie dentaire. Tuberculose pulmonaire, ganglionnaire ou chirurgicale. Grossesse.
- b. *Indication anti-hémorragique* : Hémoptysies, Hématémèses, Hématuries, Hémorragies obstétricales. Troubles hémogéniques (purpuras, etc.).
- c. *Indication de résorption* : Pleurésies, Ascites, Œdèmes des néphrétiques, Diarrhées des tuberculeux.
- d. *Indication anti-choc* : Etats de sensibilisation ou d'anaphylaxie spontanés (urticaire, prurit, asthme, etc.). Etats de sensibilisation thérapeutique consécutifs aux diverses chimiothérapies (arsenic, bismuth, or).
- e. *Indication spasmo-sédative* : Asthénie, Tétanie, Spasmophilie, Eclampsie obstétricale. Etats spasmodiques viscéraux. Maladie de Basedow. Troubles du système nerveux.
- f. *Indication anti-rhumatismale* : Polyarthrites chroniques.

Posologie :

- 1° En Ampoules de 5 cc. à 10 p. 100 (boîtes de 2 et 10 ampoules) pour injections intra-veineuses ou intra-musculaires :

a. Injections intra-veineuses :

Adultes : 1 ampoule de 5 cc. tous les 2 jours.

Enfants : 1 ampoule de 5 cc. tous les 3 jours.

Prendre la précaution d'injecter très lentement.

b. Injections intra-musculaires :

Peuvent être faites sur le même rythme.

- 2° En solution : deux fois par jour, avant chacun des deux principaux repas ; dans un peu d'eau sucrée :

| | Enfants : au-dessous de 12 ans. | Adultes : |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------|
| Indication recalcifiente..... | II gouttes par année d'âge. | XL gouttes. |
| — anti-hémorragique ... | VIII gouttes par année d'âge. | CXX — |
| — anti-choc | XX à LXXV gouttes. | CXX — |
| — spasmo-sédative | L à C gouttes. | CLX — |
| — anti-rhumatismale.... | | CLX — |

Ce tableau de posologie est donné à titre indicatif et d'après nos essais cliniques, le médecin traitant étant seul qualifié pour la prescription des doses qui peuvent varier suivant les malades.

Laboratoire du MYORAL

R. GOUIN, Pharmacien, 20, rue des Écoles — PARIS (V^e).

« CALCIUM-SANDOZ »

Composition et propriétés. — Gluconate de chaux, sel soluble, assimilable. Teneur en chaux (CaO) 12,6 p. 100, soit 9 p. 100 de Ca élément. Assure toutes les propriétés physiologiques de l'ion Calcium. Injectable par la voie intramusculaire et la voie endoveineuse, sans inconvénients.

Formes. — Ampoules à 10 et à 20 p. 100 de gluconate de chaux ; Poudre granulée (sans sucre) ; Comprimés effervescents ; Tablettes chocolatées.

NOUVELLE FORME THÉRAPEUTIQUE :

« CALCIUM-SANDOZ » SIROP.

Posologie :

Adultes : 1 ampoule de 5 ou de 10 cc. tous les jours ou tous les 2 à 3 jours ou bien, par jour, 3 cuillerées à café de poudre granulée ou 3 fois 2 tablettes chocolatées ou 2 fois un comprimé effervescent ou 2 à 3 fois une cuillerée à soupe de sirop.

Enfants : 1 ampoule de 2 ou de 5 cc. tous les jours ou tous les 2 à 3 jours ou bien, par jour, 2 à 3 cuillerées de poudre granulée ou 3 fois une demi à une tablette chocolatée ou 2 fois 1/3 à 1 comprimé effervescent, ou 2 à 3 fois 1 à 2 cuillerées à café de sirop.

Prix :

Ampoules 10 cc., la boîte de 5 : 25 fr. — *Comprimés effervescents* : 10 fr.

Sirop G. M. : 18 fr. — *Poudre granulée* : 17 fr.

Tablettes chocolatées : 10 francs.

Produits SANDOZ, 20, rue Vernier — PARIS (XVI^e).

CALCIVITAM

Composition. — Chlorure de calcium cristallisé dissous dans des jus de fruits naturels (1 gr. par cuillerée à soupe).

Propriétés thérapeutiques. — Toutes celles du chlorure de Calcium qui sont suractivées par les jus de fruits. Tonicardiaque, reconstituant, anti-hémorragique, stimulant de l'appétit, déchloration, adjuvant précieux dans l'accouchement.

Indications. — Hypocalcémie, chlorurémie, prévention d'hémorragie.

Mode d'emploi. — Se recommande par son goût agréable qui le fait accepter facilement par les malades et aussi par les enfants.

De 1 à 4 cuillerées à soupe par jour suivant les cas

Prix : 16 francs.

Laboratoire du CALCIVITAM

ARCACHON.

CALCOLÉOL

à base d'huile de foie de morue *concentrée et solidifiée*, contrôlée biologiquement sur sa teneur en vitamines A et D, de vitamine B et de sels de calcium et de fer.

Propriétés thérapeutiques. — Avitaminoses, assimilation défectueuse du calcium.

Indications. — Rachitisme, Troubles de croissance. Spasmophilie, Maladies infectieuses et contagieuses, Gastro-entérites, Déminéralisation (tuberculose, grossesse, allaitement).

Forme. — En dragées inaltérables, sans odeur, forme la plus pratique de prise de l'huile de foie de morue et en granulés. (Dragées et granulés glutinisés ne se dissolvant que dans l'intestin.)

Dose et mode d'emploi. — *Adultes* : 4 dragées ou 2 cuillères à café de granulés avant ou pendant chacun des trois principaux repas, à avaler.

Enfants : Moitié de ces doses.

Prix au public : *Dragées et Granulés* : 15 francs

Autorisé par les *Assurances Sociales*.

Laboratoire des Produits SCIENTIA

D^r E. PERRAUDIN, Pharmacien de 1^{re} classe
21, rue Chaptal — PARIS (IX^e).

CALCOMAGNÉSIE

Comprimés à croquer sans addition de liquide. Médication antidyspeptique, neutralisant stomacal.

Indications. — Gastralgie avec douleurs et brûlures. Spasmes douloureux de la région stomacale. Fermentations et acidités gastriques. Aérophagie et dilatations gazeuses. Troubles digestifs d'origine nerveuse ou émotive.

Emploi et doses. — Croquer 3 ou 4 comprimés au moment des crises douloureuses, sans addition d'aucun liquide.

La **Calcomagnésie** ne renferme aucun produit toxique et peut être ordonnée aux enfants.

Prix : 14 francs.

Echantillon grandeur normale sur demande:

Laboratoire d'Hygiène et de Thérapeutique appliquées

47, rue Bokanowski — ASNIÈRES (Seine).

CALCOZYMASE

Cure de désensibilisation

Composition. — Association de ferments digestifs : pancréatine, maltine, lab-ferment, avec un sel de calcium.

Mode d'action. — Chez les insuffisants digestifs et hépatiques, la Calcozymase réalise dans l'estomac une digestion artificielle et complète l'action de la Prézymase (Voir *Prézymase*).

Indications. — Tous les accidents dus à une sensibilisation quelconque : urticaire, asthme, arthropathies d'origine anaphylactique, accidents de la goutte, du rhumastisme, etc...

Mode d'emploi. — Deux à trois dragées au milieu de chaque repas.

Laboratoires **LEBOIME**

3, rue Fernand-Widal — PARIS (XIII^e).

CALMABY

Composition. — Cachets de Calomel suractivé par trituration prolongée avec une poudre neutre ; S. N. Bismuth et Magnésie. (Boîte de 30 cachets).

Propriétés thérapeutiques. — Active la fonction hépatique, combat la cholémie : Migraine, Inappétence, Algies, Neurasthénie, Arthritisme ; Indiqué dans le Rachitisme tardif, les Infections intestinales, les Ulcérations stomacales. Peut servir, entre les séries de piqûres, comme cure d'entretien. Augmente la tolérance mercurielle ou iodée et renforce l'action du Sirop de Gibert.

Mode d'emploi. — Un cachet le matin à jeun et parfois le soir au coucher, 15 à 20 jours par mois. Comme désinfectant intestinal, 3 à 5 cachets par jour pendant quelques jours.

Prix : 18 fr. 50

Laboratoire du **DELTA**

84, rue de Rochechouart — PARIS (IX^e).

Tél. : Trudaine 45-18.

CALMAG-NA

Forme. — Poudre impalpable, légèrement aromatisée.

Composition. — Sous-gallate et sous-carbonate de Bismuth, carbonate de Magnésium, Bicarbonate de soude, carbonate de Calcium, Kaolin colloïdal.

Action thérapeutique. — Neutralisation de l'hyperacidité et sédation des troubles gastriques. Action prompte et prolongée, sans formation d'acidité secondaire. Ne constipe pas. Aucune toxicité.

Indications. — Hyperchlorhydrie, dyspepsies, gastralgies, pyrosis, flatulence, etc...

Mode d'emploi. — 1 cuillerée à café délayée dans un verre d'eau. Si nécessaire, renouveler la dose toutes les 2 ou 4 heures.

La boîte : 17 fr. 50.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 150-4.

Prière d'adresser toutes demandes de renseignements et d'échantillons aux :

Laboratoires SUBSTANTIA
F. Guillemoteau, pharmacien
 13, rue Pagès — SURESNES (Seine).

CALMANT MEUNIER

Elixir calmant, spécifique de la douleur.

Composition. — 10 cc. contiennent :

| | |
|------------------|--------|
| Codéine | 0,003 |
| Stovalne | 0,005 |
| Caféine | 0,08 |
| Salipyrine | 0,10 |
| Pyramidon | * 0,30 |
| Liqueur | 10 cc. |

Propriétés. — Calmant de la douleur, agréable à prendre, très actif bien toléré par l'estomac, rapidement assimilé, soulage en quelques minutes.

Indications. — Céphalées, Migraines, Odontalgies, Névralgies, Rhumatismes, Torticolis, Lumbago, Goutte, Sciatique, Dysménorrhée, Zona, Cystite, Fièvre, Grippe.

Posologie :

Enfants : une demi à une cuillerée à café dans de l'eau.

Adolescents : Une à deux cuillerées à café.

Adultes : 2 à 3 cuillerées à café.

A prendre en cas de souffrance et renouveler au besoin 2 à 3 fois en 24 heures.

Présentation soignée en flacon de 120 cc. au prix de 7 fr. 75.

Laboratoires MEUNIER, Pharmacien
 Lauréat 1^{er} prix de la Faculté de Montpellier
 MONTMARSAULT (Allier).

CALMOCARDINE LAGOUTTE

Composition et forme. — Comprimés dragéifiés à base de :

| | |
|---------------------------|-------|
| Sulfate de quinine..... | 0,05 |
| Gardénal..... | 0,05 |
| Sulfate de spartéine..... | 0,01 |
| Bromure de camphre..... | 0,025 |
| Extr. de cratœgeus..... | 0,015 |
| Extr. de passiflora..... | 0,015 |
| Extr. de valériane..... | 0,015 |

Actions thérapeutiques. — Sédatifs des fibres musculaires et du système nerveux.

Spécifique des palpitations.

Indications. — Palpitations de cœur de toutes origines, Eréthysme cardiaque, Arythmie extrasystolique, Douleurs de l'angine de poitrine, Anxiétés cardiaques des névrosés et des surmenés.

Mode d'emploi. — Une dragée tous les 1/4 d'heure jusqu'à quatre, puis toutes les heures jusqu'à huit par jour.

Prix de la boîte de 50 comprimés : 20 francs.

Laboratoire LAGOUTTE

85, cours Albert Thomas. — LYON (III^e).

CALMOSUPPOS SÉDATIFS

Un seul dosage (adultes).

Extrait Belladone, Jusquiame, Piscidia à 0 mm. 025, Analgésine 0,50.

Pour un suppositoire.

Hémorroïdès, Prostatites, Règles douloureuses, Coliques hépatiques, néphrétiques, Suite d'accouchement, etc. 2 à 3 par 24 heures.

La boîte de 6 : 10 francs.

CALMOSUPPOS ANTITHERMIQUES

| 3 dosages | Bébés | | |
|----------------------------|-------------|----------|----------|
| | jusq. 5 ans | Enfants | Adultes |
| Bromhydrate de quinine ... | 0 gr. 035 | 0 gr. 07 | 0 gr. 10 |
| Sulfate de quinine | 0 gr. 065 | 0 gr. 13 | 0 gr. 20 |
| Pyramidon | 0 gr. 05 | 0 gr. 10 | 0 gr. 20 |
| Phénacétine | 0 gr. 05 | 0 gr. 10 | 0 gr. 20 |
| Caféine..... | 0 gr. 005 | 0 gr. 02 | 0 gr. 05 |

Pour un suppositoire.

Tous les états fébriles, un matin et soir.

La boîte de 6 : 8 francs, 9 fr. 50, 11 francs.

Enregistrés au Lab. d'Cont. des Médicaments sous les N^{os} 100, 1, 2, 3, 4.

Échant. : Laboratoires des CALMOSUPPOS
LA MOTHE-SAINT-HERAY (Deux-Sèvres).

CALSÉDINE

Composition. — Produit à base de Ca, Mg et Phosphore.

Ne renferme aucune substance toxique : ni barbituriques, ni alcaloïdes. Pas de Bromures.

Action. — Hypnotique ou sédative suivant les doses et le mode d'emploi.

Elle calme, en ne faisant intervenir que les ions minéraux de l'organisme. Elle fait dormir en utilisant un mécanisme naturel du sommeil.

Doses. — **Sédation nerveuse** : 1 à 2 comprimés 2 ou 3 fois par jour aux repas.

Somnifère : 4 comprimés à la fois (1 comprimé par 17 kg. de poids du sujet) 20 minutes environ avant l'heure désirée du sommeil, dilués dans un peu d'eau, ou de liquide légèrement alcoolisé, bière, eau rouge, etc.

Si cette dose n'est pas suffisante l'augmenter ou, s'il y a réveil avant la fin de la nuit, renouveler la même dose.

Indications. — Tous les états d'irritabilité nerveuse toutes les insomnies dites nerveuses ; surmenage cérébral, génital ; excitations émotives, inquiétudes, angoisses ; excitation due au thé, café, tabac, alcool, etc. ;

Spasmes avec prédominance de l'élément névropathique.

Entéronévrose spasmodique, coelialgies ; Pollakiuries où prédominent facteurs nerveux ou réflexes.

Dans les prurits d'origine nerveuse, les bouffées congestives de la ménopause ; dans les poussées hypertensives de l'hypertonie artérielle ; dans certains spasmes rythmiques du sommeil.

D'une façon passagère, la **Calsédine** diminue la fréquence du pouls et abaisse les deux tensions maxima et minima.

Prix : 15 francs le tube de 50 comprimés.

Laboratoire GERDA,

163, boulevard de la Croix-Rousse — LYON.

CAMPHOCALYPTOL

注射 Injectable

Présentation. — Deux formules : boîtes de 12 ampoules ; boîtes de 6 ampoules.

Camphocalyptol avec Gaïacol ; Camphocalyptol sans Gaïacol (*Prière de spécifier*).

Composition. — *Chaque ampoule contient* : C. avec Gaïacol : Gaïacol, Goménol, Eucalyptol à à 0,10 ; Camphre 0,20 ; Acide phénique 0,01. Excipient huileux Q. S. pour 2 cc.

C. sans Gaïacol : même formule sans gaïacol.

Propriétés et avantages. — Antiseptique. Agit contre la fièvre. S'élimine par les poumons en les désinfectant. Facilite le jeu respiratoire.

Injections indolores et bien tolérées.

Indications. — Maladies infectieuses, Grippe et complications, Bronchites aiguës, chroniques, Dilatation des bronches, Pneumonie, Tuberculose pulmonaire.

Posologie. — 1 à 2 ampoules par jour ou tous les 2 jours.

Prix : Boîte de 12 ampoules : 18 francs
boîte de 6 ampoules : 12 francs.

Laboratoires ECHEMAN

26, rue des Moines — PARIS (XVII^e).

L. N. C. : 314-38 et 39.

CAMPHODAUSSSE

(Camphre soluble dans l'eau.)

(**Camphosulfonate de soude.**)

Ampoules de 1, 2, 5 et 10 cc. titrées à 10 % de camphre en solution aqueuse. Même posologie que l'huile camphrée. Action plus rapide grâce à sa facile résorption. Injection bien tolérée et ne provoquant pas les réactions locales dues au véhicule huileux.

Indications. — Stimulant cardiaque dans l'*adynamie* et au cours des *maladies infectieuses*. Son emploi est particulièrement recommandé dans les cas de *collapsus cardiaque imminent*, où il est nécessaire d'agir vite.

Formes : a) Camphodausse.

b) Camphodausse spartéiné.

Mode d'emploi. — 1 à 5 cc., une ou plusieurs fois par jour, par voie *hypodermique*, *intramusculaire*, ou *intraveineuse*.

Prix : 12 ampoules de 1 cc. 16 francs.

Laboratoires DAUSSE

4, rue Aubriot — PARIS (IV^e).

CAMPHO-SPARTÉINE DUBOIS

Solution d'acide Campho-Sulfonique et de Spartéine.

I. Ampoules de 2 cc. et Gouttes.

Trois formules.

1° *Simple.* — Chaque ampoule et XX gouttes de solution correspondent à 4 centigr. de spartéine et à 6 centigr. de camphre.

2° *Caféinée.* — Composition simple additionnée de 5 centigr. de caféine par ampoule et par XX gouttes de solution.

Cette formule est spécialement indiquée contre les dyspnées et, à titre préventif ou curatif, dans les accidents opératoires.

3° *Strychnée.* — Composition simple additionnée de 1/2 milligr. de sulfate de strychnine par ampoule et XX gouttes de solution.

Cette formule convient aux malades nerveux déprimés.

Indications. — Toutes les indications du camphre, de la spartéine, de la caféine et de la strychnine comme traitement d'urgence des défaillances et collapsus cardiaques, des palpitations, des insuffisances cardiaques, des asthénies cardio-vasculaires, des états infectieux, des dyspnées d'origine cardiaque et respiratoire, comme diurétique dans tous les cas de déséquilibre du système nerveux vaguesympathique et enfin comme préventif des accidents cardio-vasculaires des malaises lipothymiques, des anesthésies opératoires.

Mode d'emploi et Posologie. — Les ampoules de **Campho-Spartéine Dubois** s'administrent par voie sous-cutanée ou intra-musculaire. Ces injections sont indolores grâce à l'analgésie produite par la spartéine et leur action est immédiate et prolongée.

Les doses sont de 1 à 4 ampoules par 24 heures.

Gouttes : XX à LX gouttes par 24 heures en deux ou trois fois au début des repas ou au moment des malaises lipothymiques ou syncopaux.

II. Comprimés.

Posologie. — Chaque comprimé contient 10 centigr. de Campho-Sulfonate de Spartéine.

Mode d'emploi. — La dose habituelle est de 2 à 5 comprimés par 24 heures au début des repas ou au moment des malaises. *Avaler les comprimés sans les sucer ni les croquer.*

Prix : 15 francs.

LABORATOIRES DUBOIS

R. Dubois, Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.

16, Boulevard Péreire — PARIS (XVII°).

CAMPHOSTYL LACROIX

Composition. — Nouveau dérivé du camphre soluble dans l'eau.

Avantages. — 1° Absorption immédiate. 2° Injection indolore ne produisant ni nodosité ni réaction. 3° Injection parfaitement indolore grâce à son pH = 7.

Indications. — Adynamie, pneumonie, broncho-pneumonie, collapsus.

Formes pharmaceutiques. — 1° *Camphostyl simple*.

A. *Ampoules* — 1° Boîtes de 6 et 12 ampoules à 0 gr. 10 : 2° boîtes de 6 et 12 ampoules à 0 gr. 20 : 3° boîtes de 6 ampoules à 0 gr. 50. Pour le corps médical, en boîtes de 25, 50 et 100 ampoules.

B. *Gouttes*. — XX à CXX gouttes par jour.

2° *Camphostyl Spartéiné*. — A. *Ampoules*. Boîtes de 6 et 12 ampoules à 0. 20 Camphostyl et 0. 05 de Spartéine.

B. *Gouttes spartéinées* XX à LXXX gouttes par jour.

Echantillon sur demande.

Peut être prescrit aux Assurances sociales.

Camphostyl simple :

| | | |
|------------------|------------------|----------------|
| Ampoules de 1 cc | Prix : 13 fr. 50 | la boîte de 12 |
| — de 2 cc. | — 16 fr. | — 12 |
| — de 5 cc. | — 16 fr. | — 6 |
| Gouttes..... | — 13 fr. 50 | |

Camphostyl Spartéiné :

| | | |
|---------------|---------------|---------------|
| Ampoules..... | Prix : 10 fr. | la boîte de 6 |
| — | — 17 fr. 50 | — de 12 |
| Gouttes..... | — 14 fr. 50 | |

Laboratoires LACROIX

V. MEROBIAN et fils, Successeurs.

37, rue Pajol — Paris (XVIII^e)

CAMPYRO-SALYL FRAISSE

Composition :

| | |
|----------------------------|----------|
| Salicylate de Benzyle..... | 0 gr. 50 |
| Camphre | 0 gr. 10 |
| Huile d'olive pure..... | 5 cc |

Indications :

Lumbago. — Sciatique. — Névrites aiguës ou chroniques.

Forme :

En ampoules de 5 cent. cubes.

5 à 6 ampoules suffisent pour guérir une sciatique rebelle.

Prix de la boîte de 6 ampoules : 20 francs.

Laboratoires FRAISSE

8, rue Jasmin — PARIS.

CAMPHYDRYL ROBIN

Dérivé camphré en solution aqueuse, solution à 5 p. 100.

Ampoules de 1, 2, 5 cc. — Tubes de 50 comprimés.

Dose et mode d'emploi. — Injections sous toutes formes : 1 cc. pour les enfants ; 2 cc. dans les cas ordinaires des adultes ; 5 cc. dans les cas importants et même 10 cc. dans les shocks traumatiques ou opératoires.

Propriétés thérapeutiques. — Les mêmes que celles des huiles camphrées et de l'alcool camphré, excitant énergique du cœur et des centres nerveux et respiratoires, analgésique et antiseptique tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, dans les démangeaisons, prurits, brûlures, angines, etc.

Indications. — Troubles cardio-vasculaires, états de shock, crises respiratoires, maladies infectieuses, antiseptie des plaies, antiseptie et analgésie des prurits, acnés, démangeaisons.

L'action est plus rapide et plus intense que celle du camphre. L'injection est indolore et n'amène pas de réaction locale.

Prix : Ampoules 1 cc. : 14 fr. 50. — Comprimés : 16 fr. 50.

Laboratoires ROBIN

13, rue de Poissy — PARIS.

CAMPHYDRYL STRYCHNO SPARTÉINÉ ROBIN

Dérivé camphré en solution aqueuse, avec adjonction de strychnine et de spartéine.

Ampoules de 2 et 5 cc.

Dose et mode d'emploi. — *Adultes* : 1 ou 2 ampoules de 2 cc. par jour ; suites opératoires et cas graves, 1 à 2 ampoules de 5 cc. par jour, à intervalles éloignés.

Propriétés thérapeutiques. — Excitant énergique du cœur ; insuffisance des forces musculaires par déficience d'activité bulbo-médullaire ; toni-cardiaque ; mêmes effets que la digitale mais sans accumulation dans l'organisme ; soluble, stérile ; absolument indolore.

Ampoules 2 cc. La boîte de 10 ampoules : 18 fr. 50.

5 cc. La boîte de 10 ampoules : 28 fr. 50.

5 cc. La boîte de 3 ampoules : 12 francs.

Laboratoires ROBIN

13, rue de Poissy, Paris (V°).

CANOL

Composition :

Poudres végétales, sans aucune addition de corps d'origine chimique.

| | |
|-------------------------|-------|
| Albumine végétale | 4,9 |
| Sucre réducteur | 1,4 |
| Aphloia | 0,05 |
| Chimaphila | 2,85 |
| Pectases | 0,797 |
| Lawsotanine | 0,003 |

Absolument inoffensif, aucune contre-indication.

La Lawsotanine noircit les urines au début du traitement, ne s'accumule pas, peut être employée indéfiniment sans danger.

Indications :

Médication rationnelle des infections des voies urinaires et de l'albuminurie.

Albuminurie gravidique.

Néphrite.

Pyélo-néphrite.

Lithiase rénale.

Cystite.

Hématuries.

Diabète.

Forme pharmaceutique :

Boîte de 30 cachets de 0,50 environ.

Posologie :

Dose moyenne. *Adultes* : 4 à 6 cachets par jour.

Enfants : 1 à 3 cachets par jour, de préférence avant les repas.

Prix de la boîte de 30 cachets : 13 fr. 50.

Echantillon sur demande.

Laboratoire du CANOL

39, rue de l'Arbalète — PARIS (V^e).

Tél. : Gobelins 41-34.

J. GAUDIN, Pharmacien.

CANTÉINE BOUTEILLE

Forme. — Elixir.

Composition :

| | |
|---|--------------|
| Cratœgus | XXV gouttes. |
| Passiflore..... | 0 gr. 50 |
| Hamamélis..... | XXX gouttes. |
| Salix Alba | 0 gr. 025 |
| Excipient : Q. s. par cuillerée à café. | |

Indications. — Eréthisme cardiaque, Troubles circulatoires et troubles nerveux consécutifs, Ménopause, Neurasthénie, Mélancolie, Déprimés, Varices, Hémorroïdes.

Mode d'emploi. — 2 à 4 cuillerées à café par jour avant les repas.

Prix : 15 fr. 50.

Laboratoire E. BOUTEILLE

23, rue des Moines — PARIS (XVII^e).

Tél. : Marcadet 04-02.

CAPARLEM

La thérapeutique protectrice du foie.
Préventive et curative des affections hépatopancréatico-biliaires.

I. Sa formule. — *Huile de Haarlem d'origine*; pure et vraie, Hétéropolyvalente, à base de distillat du *Juniperus Oxycedrus*, spécifique hépato-vésiculaire, fluidifiant de la bile et bilio-secréteur. Le plus fidèle et le plus doux cholérétique et cholécystokinétique.

II. — Ses Indications thérapeutiques fondamentales. — *a. Foie.* — Cholécystites chroniques lithiasiques et non lithiasiques, douloureuses ou non, Calculs de transit et calculs sédentaires, Angiocholites et Angiocholécystites, Séquelles de Cholécystectomies, Asthme hépatique et Bile noire, Foie grippal, Amibiases et Lambliosés vésiculaires. Colibacillocholies.

b. Reins. — Lithiases rénales et toutes variétés de Pyélo-néphrites, Uricémie, Goutte, Gravelle, Colibacilluries, Rein atone.

III. — Sa posologie habituelle. — *Cure d'entretien* : une à deux capsules au milieu des deux principaux repas. Doubler la dose dans les cas aigus.

IV. Ses avantages. — Titrage rigoureux, Efficacité officiellement reconnue, Pureté extrême des composants, Efficacité thérapeutique cliniquement expérimentée.

La seule huile de Haarlem sans mauvais goût ni renvois désagréables après l'ingestion. — Prix de vente modique.

Prix : 15 francs.

**Laboratoires de Produits Synthétiques
Purs (L. L. P. S. P.)**

A. DESMOIRES, Directeur,
A ETAIN (Meuse). — Tél. : 74.

CAPSULES BRUEL

A l'Ether Amyl Valérianique.

Sous la forme originale (1881) des capsules Bruel, l'Ether Amyl Valérianique est un médicament antispasmodique puissant dont l'emploi est formel toutes les fois qu'on voudra prescrire un antispasmodique puissant et sans danger. Dépourvu de toute toxicité, il permet, aux doses thérapeutiques, de calmer sans morphine les spasmes les plus rebelles aux médicaments, depuis l'angoisse des aortiques et des nerveux, jusqu'au spasme douleur des coliques hépatiques et néphrétiques. C'est un précieux hypnagogue.

Doses. — 3 à 15 capsules par jour.

Le flacon : 10 francs.

Brochures et échantillons :

G. BRUEL, Pharmacien

36, rue de Paris — COLOMBES (Seine).

CAPSULES DARTOIS

Composées de créosote de hêtre véritable, titrée en Gaïacol, à la dose de 0,05 cgr. dissoute dans 0,20 cgr. d'huile de foie de morue garantie d'origine.

Dose. — Commencer par une ou deux capsules pour arriver progressivement à la dose moyenne et généralement suffisante de 3 à 4 à chaque repas, ou matin et soir avec une tasse de lait ou de tisane.

Propriétés. — Elles se dissolvent lentement dans l'intestin, répandent le produit actif sur une grande surface, divisent la créosote à l'infini et multiplient son action antiseptique sans jamais amener de troubles digestifs.

Indications. — Toux, Catarrhes, Bronchites chroniques, Tuberculose, etc.

Prix : 12 francs.

Laboratoire FREYSSINGE

6, rue Abel — PARIS (XII^e).

CAPSULES ET SIROP PRÉGA

Calmant de la toux et du spasme des bronches.

1° Calme l'irritation et tarit le **catarrhe des muqueuses bronchiques**, grâce à un ensemble d'agents à efficacité connue et éprouvée (codéine, tolu, aconit, benzoate de soude).

2° Combat en outre un autre symptôme pénible, jusque-là négligé, à savoir : le **spasme des muscles lisses de l'arbre bronchique**, par l'adjonction nouvelle d'un dérivé phényl-méthyl-lique, qui calme ces fibres aussi puissamment que la **papavérine**, sans en avoir la toxicité.

Posologie :

Sirop : 3 à 4 cuill. à soupe par jour ; 10 ans, 5 à 6 cuill. à café ; 5 ans, 2 à 3 cuill. à café.

Capsules : 3 à 4 par jour ; 10 ans : 1 à 2.

Prix : 14 francs.

Laboratoires DEHAUSSY

66, rue Nationale — LILLE.

CAPSULES GRISES CABANÈS

pour frictions mercurielles.

N° 1. *Premier âge, nourrissons.*

Mercure métallique..... 0 gr. 03

Lanoline-axonge..... 1 gr.

Par capsule. — La boîte : 15 francs.

N° 2. *Enfants.*

Mercure métallique..... 0 gr. 15

Lanoline-axonge..... 2 gr. 50

Par capsule. — La boîte : 16 francs.

N° 3. *Adultes.*

Mercure métallique..... 0 gr. 75

Lanoline-axonge..... 4 gr.

Par capsule. — La boîte : 18 francs.

La quantité du véhicule Lanoline-axonge est proportionnellement plus forte dans les capsules destinées aux nourrissons et aux enfants, afin d'éviter, dans toute la mesure du possible, les réactions cutanées.

Laboratoire OBERLIN

J. TINARDON, Pharmacien de 1^{re} classe

de la Faculté de Pharmacie de Paris,

17, rue Cadet — PARIS.

CAPSULES HAARLEM BARDET

(Capsules Bardet)

Huile de Haarlem VRAIE, PURE, d'ORIGINE.

Composition. — Chaque capsule contient 10 gouttes d'Huile de Haarlem vraie, garantie importée de la *seule* maison fabriquant la véritable huile.

Propriétés thérapeutiques. — Antisep-tique et décongestif des voies hépato-biliaires et rénales. Cholagogue puissant, fluidifiant la sécrétion biliaire.

Principales indications thérapeu-tiques. — Lithiase biliaire, Ictère, Coliques hépatiques, Angiocholites, Cholécystites, Asthme hépatique.

Lithiase rénale, Coliques néphrétiques, Pyélonéphrites, Goutte, Arthritisme.

Posologie. — Affections aiguës : 2 à 4 capsules par jour. Affections chroniques et cures d'entretien : 1 à 2 capsules par jour.

A absorber au cours des repas.

Laboratoire National de Contrôle : N° 518-3.

Échantillons et Littérature :

Laboratoires BARDET

fondés en 1860

76, rue de Sèvres — PARIS (VII^e).

CAPSULES JORET ET HOMOLLE

Emménagogue.

Forme. — Capsules de 0 gr. 20, spécialement étudiées pour être rapidement absorbées par l'organisme.

Composition. — Apiol pur et bien défini, préparé et purifié par le procédé des docteurs Joret et Homolle qui découvrirent et isolèrent ce corps.

Indications. — Aménorrhée, Dysménorrhée, Ménorrhagie. Innocuité absolue en cas de grossesse.

Posologie. — Une capsule matin et soir pendant toute la durée de la menstruation.

Prix : 13 fr. 50

Pharmacie SEQUIN

165, rue St-Honoré — PARIS.

CAPSULES KUCHNER AU MÉCAPTOL

Affections bronchiques et pulmonales.

Composition. — Héléanine suractivée par association avec Gaïacol crist., Eucalyptol crist., Codéine et Chl. Thébaïque.

Action thérapeutique. — S'opposent au développement du Bacille de Koch, calment la toux, modifient et tarissent l'expectoration, préviennent les hémoptysies, propriétés fébrifuges et antidyspnéiques très prononcées.

Indications. — Bronchites simples et chroniques, Tuberculose, Emphysème, Angine, Laryngite. Toutes affections des voies respiratoires.

Posologie. — 6 capsules par jour en trois fois.

Prix de vente : 12 francs.

Laboratoire HINGLAIS

EPERNAY (Marne).

CAPSULES NOGUÈS

Codéine 0,002, Aconit (ext.) 0,001, Belladone (extr.) 0,003, Lobélie (ext.) 0,002, Grindelia (ext.) 0,005, Terpène 0,012, Eucalyptol 0,02, Thiocol (Sulfogalactate de potasse) 0,04, par capsule.

Dose et mode d'emploi. — 4 à 6 par jour, 2 à chaque repas.

Propriétés thérapeutiques. — Calmant de la toux, antiseptique des bronches ; fluidifie les sécrétions bronchiques.

Indications. — Toux opiniâtres, bronchites chroniques, laryngites, asthme, catarrhe, etc.

Prix, le flacon : 11 fr.

Laboratoires H. NOGUÈS

7, rue Galvani — PARIS.

CARB (Granulé).

Charbon activé et catalytique de **pouvoir absorbant élevé, titré.**

Titre : 1 gr. de charbon actif adsorbe 0 gr. 35 de Cristal-violet.

Indications thérapeutiques. — Médication absorbante et antitoxique. Aérophagie, Hyperchlorhydrie. Infections intestinales. Syndrome entéro-rénal toxique et infectieux. *Intoxications, Entérites.*

Posologie.

Adultes : 2 à 4 cuillerées à potage par jour.

Enfants : 1 à 4 cuillerées à café.

Dose massive dans les intoxications aiguës.

Le flacon : 15 francs.

Laboratoire MARCEAU

7, avenue Marceau — PARIS (XVI^e).

A. GRIGAUT et A. BOUTROUX, Pharmaciens
Chefs de Laboratoire à la Faculté de Médecine.

CARBAGOL MARINIER

Composition :

Charbon animal, Charbon végétal, Charbon activé (par procédé spécial évitant complètement toute impureté chimique : chlorure de zinc, arsenic, etc.). Argent colloïdal.

Formes :

GRANULÉ friable légèrement aromatisé.
CACHETS (exempts de sucre).

Indications :

Tous les troubles gastro-intestinaux. Entérococolites banales ou muco-membraneuses et leurs conséquences. Toutes diarrhées. Irritations et infections intestinales. Coli-Bacillose. Syndrome entéro-rénal. Intoxications alimentaires. Auto-intoxications.

Posologie :

Granulé : 1 à 2 cuillerées à café à chaque repas avec un peu d'eau ou de tisane.

Enfants : 1/3 à 1/2 dose.

Cachets : 1 cachet = 1 cuillerée à café de granulé.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des médicaments sous les Nos 48-2 et 48-3, le « CARBAGOL » peut être légalement prescrit aux Assurés Sociaux.

Laboratoires G. MARINIER

52, rue de Flandre — PARIS.

CARBALCALOÏDES

Alcaloïdes (ou principes actifs) adsorbés par un charbon polyvalent (Carbosanis) qui leur sert de véhicule et ne les relâche que dans l'intestin.

Les principaux sont :

La Carbatropine. — Carbosanis atropiné (*Constipation spasmodique*). 15 francs.

Le Carbarséno. — C + ac. oxyaminophénylarsénique (*Contre parasites intestinaux*). 18 francs.

La Carbémétine. — C. + chlorhydrate d'émétine (*Dysenterie amibienne*). 24 francs.

Le Carbalga. — C + iode (*Antiseptique intestinal*).

La Carbésérine. — C. + sulfate d'ésérine (*Atonie colique*). 18 francs.

La Carbocarpine. — C. + chlorhydrate de pilocarpine (*Constipation atonique*). 18 francs.

Laboratoires MONTAGU

49, boulevard de Port-Royal — PARIS.

CARBARGYRE

Charbon activé et Argent associés en un complexe colloïdal.

Propriétés. — Pouvoir absorbant et catalytique élevés et titrés.

Antiseptique intestinal puissant. Aucune toxicité.

Indications thérapeutiques. — *Colibacilurie, Syndrome entéro-rénal. Infections intestinales.* Intoxications. Fermentations. Colites. Diarrhées.

Deux formules

Cachets (*Carbargyre simple*) : 1 cachet contient :

Argent colloïdal..... 0 gr. 02

Charbon actif *titré*..... 0 gr. 48

Posologie. — Dose moyenne : de 2 à 5 cachets par jour, avant les repas.

Granulé (*Carbargyre composé*) : une cuillerée à entremets contient :

Argent colloïdal..... 0 gr. 02

Peroxyde de Magnésium.. 0 gr. 04

Héxaméthylène-tétramine 0 gr. 08

Charbon actif *titré*..... 1 gr.

Posologie. — Dose moyenne :

Adultes : de 2 à 4 cuillerées à entremets par jour, avant les repas.

Enfants : de 2 à 3 cuillerées à café par jour avant les repas.

Cachets (La boîte de 30 cachets) : 16 francs.

Granulé (Le flacon de 170 gr.) : 16 francs.

Laboratoire MARCEAU

7, avenue Marceau — PARIS (XVI^e).

A. GRIGAUT et A. BOUTROUX,
pharmaciens.

Chefs de Laboratoire à la Faculté de Médecine

CARBATROPINE

Charbon organique (Carbosanis) atropiné.

Composition. — 1/2 milligr. de sulfate d'atropine pour 10 gr. de carbosanis, soit 1/4 de milligr. d'atropine par cuillerée à café.

Indications. — La Carbatropine est utilisée avec succès dans les spasmes du côlon et agit efficacement pour combattre la constipation qu'ils provoquent. L'atropine n'est relâchée par le charbon que là où le bol intestinal est retenu, c'est-à-dire au niveau même du spasme. Le spasme disparaît et la constipation cesse.

Formes. — Granulé dosé à 5 milligr. par 100 gr., soit 1/4 de milligr. par 5 gr. (cuillerée à café).
Poudre et cachets.

Doses. — 1 à 3 cuillerées à café par jour.

Dosage spécial pour enfants :
1/10 de milligr. par cuillerée à café.
Prix : 15 francs.

Laboratoire MONTAGU

49, boulevard de Port-Royal — PARIS.

CARBOBEL

Granulés au goût agréable.

Deux formules. — Boîte rouge : simple. Boîte bleue : benzonaphtolé.

Composition. — Charbon animal chimiquement pur — hexaméthylène tétramine pur — citrate de magnésie, avec ou sans benzonaphtol.

Indications. — Gastrites, aigreurs, inflammation des voies intestinales, biliaires et urinaires.

Doses. — 1 à 2 cuillerées à café après les repas, à prendre comme dessert. (Si possible ne pas mélanger à du liquide).

Laboratoires du CARBOBEL

Dépositaires généraux pour la Belgique, le Congo Belge et le Grand-Duché :

PECEBE

12, rue du Téléphone — BRUXELLES

CARBOCITROL

Composition. — A base de citrate trisodique chimiquement pur.

Indications. — Gastrite aiguë et chronique. Dilatation de l'estomac. Dyspepsie flatulente. Congestion du foie. Paresse gastrique de toute origine.

Aucune contre-indication.

Mode d'emploi. — 2 à 4 paquets ou 2 ou 4 comprimés par jour.

Prix. Paquets : 14 francs. Comprimés effervescents : 16 francs.

Laboratoires O. VISCONTI

64, boulevard Barbès — PARIS (XVIII^e).

Téléphone : Nord 30-21.

CARBO-COMBROSMOL

Médication végétale des infections gastro-intestinales et biliaires.

Composition. — Combretum, Buchu, Saponaire, Charbon activé.

Forme. — Granulé fondant, aromatisé.

Propriétés. — Par le *Buchu*, attaque l'élément infectieux hépatobiliaire ; par la *Saponaire* neutralise et élimine les toxines ; par le *Combretum* sollicite du foie un effort sécrétoire qui aide à l'élimination des éléments infectieux et toxiques ; par le *Charbon activé* adsorbe les bactéries et les toxines intestinales.

Indications. — Hépatites, ictères infectieux, angiocholites, cholécystites, colibacillose. Fermentations gastro-intestinales, auto-intoxication, états diarrhéiques, aérophagie.

Posologie. — 1 à 2 cuillerées à café, après les repas.

Prix : 14 francs.

Laboratoires STELVIA

Georges BLAQUE,

Docteur en Pharmacie. Licencié ès Sciences,

59, rue Boissière — PARIS (XVI^e).

Tél. : Kléber 88-70.

CARBOFIXINE LONGUET

Antiseptique intestinal-antidiarrhéique.

Granulé à base de lactate d'alumine et de charbon activé.

Fixe les toxines par le charbon activé (acti-carbone) et l'alumine gélatineuse.

Arrête les diarrhées et fermentations par l'acide lactique naissant.

Intoxication intestinale et ses conséquences, Diarrhées.

Granulé à avaler sans croquer ni faire dissoudre. 1 à 2 cuillerées à café après chaque repas.

Le flacon : 12 francs.

Laboratoires LONGUET

34, rue Sedaine — PARIS.

CARBOIODURE FRAUDIN

Composition. — Iodure de potassium chimiquement pur, fixé sur du charbon activé, utilisé comme véhicule.

Granulé friable, d'un goût agréable, contenant 0 gr. 25 d'iodure de potassium, par cuiller à café.

Propriétés. — L'iodure de potassium fixé sur le charbon est seulement libéré en milieu alcalin (intestin). *La libération est intégrale, mais lente, ne causant ni intolérance stomacale, ni iodisme.*

Indications. — Toutes celles de l'iodure de potassium : artériosclérose, arthritisme, affections cardio-vasculaires, asthme, etc.

Laboratoire des CHARBONS FRAUDIN

4, avenue Desfoux — BILLANCOURT (Seine).

Téléphone Molitor 02-62.

CARBOLACTYL SIMPLE

Cure de désintoxication intestinale
hépatique et rénale.

Composition. — Ferments lactiques sélectionnés, adsorbés par du charbon activé, extrait pancréatique, algues à mucilage.

Indications. — Auto-intoxications gastro-intestinales. Entérites, Diarrhées, Troubles de la nutrition, Troubles fonctionnels du foie, Dermatoses.

Formes. — 1° Boîte de 30 cachets ;
2° Poudre avec cuiller-mesure.
(N'existe pas sous forme de comprimés.)

Doses. — Adultes : 3 à 4 cachets ou 6 à 8 mesures *pro die*. — Enfants : 2 à 6 mesures *pro die*.

Prix : 15 francs.

CARBOLACTYL BILIÉ

Composition. — Identique à celle du Carbolactyl simple avec addition de Bile purifiée et dépigmentée.

Indications. — Entérite muco-membraneuse d'origine hépatique, Constipation essentielle, Insuffisances hépatiques et biliaires, Angio-Cholite et Cholécystite, Cholémie, Hépatisme et Cyrrhoses, Diabète par Dyshépatie, Artériosclérose par intoxication.

Forme. — Boîte de 30 cachets.
(Ni comprimés, ni poudre biliée.)

Doses. — 2 à 3 cachets *pro die*, à la fin des repas.

Prix : 16 francs.

Echantillons et littérature sur demande :
19, rue de Fleurus — PARIS (VI^e).

CARBOLIN MIDY

Graine de lin (sélectionnée et triée) enrobée d'un **mucilage gommeux** et d'un **charbon végétal** suractivé *Acti-Carbone* (maximum de puissance absorbante et de pureté).

Mode d'emploi. — 4 cuillerées à café par jour, aux repas ou à distance des repas suivant le cas, dans une cuillerée de miel.

Propriétés thérapeutiques :

- 1° Action mécanique de massage de la graine de lin.
- 2° Action émolliente du mucilage gommeux.
- 3° Action absorbante, désinfectante et antitoxique du charbon.

Indications. — La Coprostase et toutes ses conséquences. Toutes les affections gastro-intestinales depuis la constipation chronique jusqu'aux colites aiguës. Aucune contre-indication.

Carbolin composé. Même formule + **Bourdaine** 0 gr. 25 par cuillerée à café (privée de ses éléments irritants).

Prix : 13 francs.

Laboratoires MIDY

67, avenue de Wagram — PARIS (XVII°).

CARBOMUCIL

(Normacol + Charbon).

Préparation associant le pouvoir adsorbant d'un charbon activé aux propriétés émollientes et évacuantes du Normacol, mucilage parfait.

Forme. — Granulé dragéifié en grains très menus.

Avantages. — Assure l'action du charbon tout le long du tractus digestif, les grains de CARBOMUCIL ne libérant la poussière de charbon que peu à peu, au cours de leur gonflement très progressif.

Permet en particulier l'action du charbon dans les côlons et le rectum, en s'opposant par le noyau mucilagineux à la dessiccation du contenu de ces organes (le charbon n'agit qu'en milieu humide).

Indications. — Tous états digestifs avec fermentations anormales. Aérophagie.

Emploi. — Par cuillerée à café, à la fin ou en dehors des repas. Mettre le granulé sec dans la bouche et l'avaler au moyen d'une gorgée de liquide.

Prix : 13 francs.

Laboratoire NORGAN

PIERRE ALEXANDRE, Pharmacien

41, rue de Rome — PARIS (VIII°).

Tél. : Laborde 08-00.

CARBONATE DE BISMUTH

La forme la plus pratique, la plus agréable, la plus efficace d'administration du Bismuth est certainement la *Tablette Perroud*. A sa pureté, sa division, son adhérence, elle joint l'agrément : le goût n'est pas offusqué, les réflexes fâcheux évités. Par un procédé spécial de petites quantités de sucre et de cacao diastasé favorisent l'adhérence.

Composition. — 50 gr. de corps crépissant par tablette de 10 bâtons contenant chacun 5 gr.

Doses. — Plus fortes elles seront, plus rapides les résultats. — *Minimum* : dans l'*Hyperchlorhydrie* 2 bâtons avant chaque repas ; dans l'*Ulcère*, 4 bâtons le matin à jeun ; dans les *Colites*, 1 à 4 bâtons par jour. — Contre les *Oxyures*, médicament puissant (le prospectus indique les doses suivant l'âge). — Dans toutes les gastropathies : *Gastrite*, *gastralgie*, *hypersécrétion* : dans les *fermentations* intestinales, à petites doses, seule ou associée, la *Tablette Perroud* rendra toujours de réels services.

Laboratoire PERROUD

3, rue Sébastien-Gryphe — LYON
(anciennement, 7, rue des Archers)

CARBONATE DE CHAUX LANCOSME

Présentation. — Boîte métal renfermant du Carbonate de chaux *précipité à froid*, de très faible densité, et de saveur très agréable.

Propriétés thérapeutiques. — Neutralisant de l'acidité gastro-intestinale, anti-acide et absorbant.

Indications. — Entéro-colite acide, diarrhée de fermentations, diarrhée saisonnière et des pays chauds, troubles digestifs des gros mangeurs, fétidité des selles, déviations du péristaltisme intestinal, hyperkinésie gastrique, régurgitations, pyrosis.

Posologie et mode d'emploi. — *Sauf prescription spéciale du médecin* : Mettre 2 à 3 cuillerées à café dans un verre d'eau ou une tasse de tisane, attendre 7 à 8 minutes en agitant de temps en temps et absorber une heure avant les repas ou au moment des crises douloureuses.

Le CARBONATE DE CHAUX LANCOSME est d'une innocuité absolue, il n'y a aucun inconvénient à doubler les doses ci-dessus indiquées.

Prix : 8 francs.

LANCOSME

71, avenue Victor-Emmanuel-III — PARIS (VIII^e).

CARBONÉSIE

Composition. — Charbon activé, charbon animal, charbon végétal, peroxyde de magnésium, carbonate de chaux, magnésie calcinée légère.

Indications. — Gastro-entérites, entérocrites, intoxications et auto-intoxications, fermentations gastro-intestinales, etc...

Posologie. — Un ou deux cachets après chaque repas. Cure de 15 jours.

Boîte de 30 cachets : 15 francs.

Echantillons gratuits :

Laboratoires G. BEYTOUT

12, boulevard Saint-Martin — PARIS (X^e).

Tél. : Nord 76-85.

CARBOPHOS

Médication carbo-calcique.

Aucun toxique : ni belladone, ni opium.

Neutralisation des toxines intestinales et des acides de fermentation.

Recalcification du terrain tuberculeux.

Forme. — Cachets.

Composition. — Charbon végétal, charbon animal purifié, bromure de calcium, phosphate de chaux, carbonate de chaux.

Indications. — Colites chroniques avec fermentations acides et selles molles, diarrhée des tuberculeux, aérophagie, hyperchlorhydrie.

Doses. — 3 cachets par jour au début des repas.

La boîte (30 cachets) : 15 francs.

Laboratoires H. NOE

SAINT-AMAND-LES-EAUX (Nord).

CARBOS

Composition. — Le premier **charbon animal** obtenu chimiquement pur, sans Sulfures ni Cyanures.

Forme. — *Comprimés* de 1 gramme. *Granulé* à 60 p. 100, soit 3 grammes de charbon par cuillerée à café.

Indications. — Dyspepsies gastro-intestinales avec flatulences, Fermentations, Putréfactions, Infections intestinales aiguës et chroniques, Empoisonnements, Gastro-entérites des enfants, Diarrhées infantiles, etc.

Posologie. — *Comprimés*, 3 à 5 avant ou après les repas. *Granulé*, 1 à 3 cuillerées à café avant ou après les repas.

Prix : 15 francs.

Laboratoires E. MILLET
RAMBOUILLET (Seine-et-Oise).

CARBOSANIS

CHARBON ORGANIQUE A POUVOIR D'ADSORPTION CONSTANT

Propriétés. — Pouvoir adsorbant considérable, puissant antitoxique dans toutes les infections de l'estomac et de l'intestin ; agit également comme pansement gastro-intestinal beaucoup plus sûr que le bismuth et le kaolin.

Indications. — Empoisonnements, Fermentations gastro-intestinales, Hyperchlorhydrie, Ulcus, Entérocolites, Diarrhées intenses.

Formes. — Granulé, poudre et cachets.

Prix : 15 francs.

Laboratoire MONTAGU
49, boulevard de Port-Royal — PARIS.

CARBOTRIGON

Synonyme Biotrignon Hépatique

Composition :

Charbon végétal *activé*.

Extrait mou de fenu-grec **désodorisé**.
présentés en granulé friable.

Propriétés :

Allie le pouvoir antiseptique adsorbant et antitoxique du Charbon activé aux propriétés **stimulantes, nutritives, apéritives** du fenu-grec.

Mode d'emploi :

Adultes : 3 cuillerées à café par jour, avant les repas.

Laboratoires Jacques LORTHIOIR

22, rue Perceval — PARIS.

CARDIALGINE DUBOIS

Composition. — Une dragée contient :

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Bromure de Spartéine | 3 centigrammes. |
| Extrait de Strophantus gratus.... | 1 milligramme. |
| — d'Aubépine..... | 10 centigrammes. |
| — de Belladone titré..... | 5 milligrammes. |
| Chlorhydrate de Papavérine | 1 centigramme. |

Action. — Cardiotonique, régulateur des rythmes du cœur, antispasmodique et sédatif, continue et remplace l'action de la digitale sans crainte d'effets accumulatifs.

Indications. — Troubles fonctionnels du cœur et des vaisseaux, insuffisance cardiaque, spasmes vasculaires de l'hypertension, arythmies, tachycardies, éréthisme neuro-cardiaque, atonies graves des infections, etc.

Posologie :

Adultes : 3 à 4 dragées par 24 heures.

Enfants : 3 à 6 ans : 1 dragée par jour ; 6 à 12 ans : 2 dragées par jour ; 12 à 16 ans : 3 dragées par jour.

Prix : 15 francs.

LABORATOIRES DUBOIS

R. Dubois, Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.

16, Boulevard Péreire — PARIS (XVII^e).

CARDIBAINE

Ouabaïne cristallisée chimiquement pure.

Principe actif du *Strophantus gratus*.

Présentation et posologie. — 1° *Voie buccale*.

Solution glycéro-alcoolique à 2 p. 1000 (25 gouttes = 1 mgr. d'ouabaïne).

Petites doses : 25 gouttes par jour en une fois.

Doses moyennes : 50 à 75 gouttes par jour en 2 ou 3 fois. Doses fortes : 100 gouttes par jour en 4 fois.

2° *Voie intraveineuse*. — Ampoules titrées telles que 1 cc. = 1/4 mgr. ouabaïne ; 1/4 mgr. p. injec.

Indications. — Insuffisances cardiaques avec importante dilatation ventriculaire et rythme régulier. Dans toutes les autres variétés d'insuffisance cardiaque, voir **Digibaïne**.

Echantillons et littérature :

Laboratoires DEGLAUDE

15, bd Pasteur — PARIS XV^e. Tél. : Suffren 79 59.

Belgique : *Agent général* : **L. Prunières**

19, rue Louis-Hap — BRUXELLES.

CARDION VINCARDI

Toni-cardiaque d'entretien.

Principes actifs. — Complexes stabilisés, extraits du crataegus, du convallaria, du passiflora, de l'adonis vernalis, du cimicifuga racemosa.

Forme. — Comprimés lenticulaires glutinés.

Indications. — Tonicardiaque d'entretien associé à des antispasmodiques, Insuffisance cardiaque des hypertendus.

Doses. — 3 à 5 comprimés par 24 heures, de préférence entre les repas.

Littérature et échantillons sur demande.

Laboratoire VINCARDI

Ph. VIGUIER, pharmacien

14, avenue G.-Clemenceau — NICE (A.-M.

R. C. Nice 9046.

CARDIOSTHÉNINE

Médicament du Cœur et des Vaisseaux.

Définition :

La Cardiossthénine, à base d'extrait de strophantus, de sulfate de spartéine, d'extrait de cratægus oxyacantha et d'extrait de valériane, constitue un toni-cardiaque antispasmodique par action vasculaire dilatatrice qui soutient le cœur et diminue les résistances.

Indications thérapeutiques :

Douleurs précordiales, Dyspnée d'effort, Palpitations, Tachycardie, Angine de poitrine, Goutte exophtalmique, Arythmie, Myocardites, Endocardites, Hypertrophie du cœur, Dilatation des cavités du cœur, Hypertension artérielle, Cardio-artériosclérose, Urémie.

Posologie :

De 4 à 6 capsules par 24 heures, ou davantage suivant prescription du médecin traitant.

Prix : 10 fr. 75.

Laboratoire de Pharmacologie Générale

Dr Ph. CHAPELLE, 8, rue Vivienne — PARIS.

CARDIO-STREPTINE

Vaccin polyvalent pour la Prémunition de la maladie rhumatismale et de ses complications cardiaques.

Corps microbiens + lysats + anatoxine.

Posologie. — 1 injection sous-cutanée tous les 6 à 8 jours aux doses progressives de
1/4 de cent. cube

1/2 cmc. — 1 cmc. — 1 cmc 1/2.

Prix. Les 4 ampoules : 40 francs.

Littérature et échantillons aux

Produits Biologiques CARRION

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré —
PARIS

Tél. : Anjou 36-45 (2 lignes).

CARDITONE

Propriétés thérapeutiques. — Cardio-pathies valvulaires compensées ; Myocardites, Péricardites, Insuffisance cardiaque, Hyposystolie, Asystolie, Hypotension essentielle.

Composition :

| | |
|---|-----------|
| Extrait de Strophantus..... | 0 gr. 001 |
| Sulfate de Spartéine..... | 0 gr. 02 |
| Extrait de Muguet..... | 0 gr. 05 |
| Excipient Q. S. pour 1 comprimé de..... | 0 gr. 35 |

Mode d'emploi. — 2 à 5 comprimés par jour suivant prescription médicale.

Prix de vente au public : 15 francs.

Laboratoires LOBICA

46, avenue des Ternes — PARIS (XVII^e).

CARNINE LEFRANÇO

Suc de viande de bœuf crue, concentré à froid, dans le vide, en solution sucro-glycérinée.

Indications. — Reconstituant énergétique, prescrit dans : *Anémie, Anorexie, Convalescences, Tuberculose, Affaiblissements, etc.*

Dose et mode d'emploi. — Une à quatre cuillerées à soupe par jour, pure ou additionnée d'une boisson froide.

Laboratoires de la Carnine Lefranco

32, avenue de Metz

ROMAINVILLE — (Seine).

CAROTTASE

Composition. — Poudre de carottes fraîches stabilisées à froid. 1gr. de carottase = 4 gr. de carotte fraîche. Aliment végétal renfermant des sels minéraux naturels complètement assimilables, des substances albuminoïdes, des hydrates de carbone, de la cellulose à l'état de poudre très ténue et des vitamines A B C.

Forme. — Poudre.

Indications. — Favorise le développement des enfants et des nourrissons, excite l'appétit, active la croissance, stimule les fonctions de la nutrition, et régularise les fonctions intestinales.

Doses. — Après 2 mois, 1 pincée dans chaque biberon (0 gr. 50). — Après 3 mois, 1/2 cuillerée à café. — Après 6 mois, 1 cuillerée à café. — Après 8 mois, de 2 à 4 cuillerées à café.

Pour conserver à la Carottase toute son efficacité *ne jamais faire cuire*, la délayer avec du lait bouilli et refroidi, puis l'ajouter au biberon, bouillies ou panades déjà préparés.

Pour la poudre de légumes frais (Carottes, tomates, épinards), voir également VEGUVA.

Prix : 15 francs.

Société anonyme des Etablissements WANDER
151 bis, route de Joinville. — CHAMPIGNY-s/r-MARNE

CASALDYL

Granulé dont le principe actif est la Caséine formolée. Cette préparation est douée, grâce à la présence du formol, d'un pouvoir antiseptique considérable : elle possède également des propriétés absorbantes et désodorisantes, dues à l'action de la Caséine.

Indications thérapeutiques. — Entéro-colites aiguës ou chroniques, syndromes diarrhéiques de toute origine, même chez les tuberculeux, colibacillose, typhoïde et paratyphoïde. Fermentations secondaires, Météorisme, Etat saburral, Fétidité des matières, Troubles intestinaux chez les nourrissons. Oxyurase.

Posologie. — *Adultes* : 3 à 4 cuillerées à café par jour dans un peu d'eau avant ou entre les repas.

Enfants : 1/2 cuillerée à café 2 à 3 fois par jour.

Nourrissons : 1/4 de cuillerée à café avant trois des tétées de la journée.

Prix du flacon : 9 francs.

Laboratoires du Docteur ROUSSEL
89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI°).

CASCARA EPARVIER

« Pilules EPARVIER »

Forme. — Pilules dosées à 0,10 d'extrait de Cascara pur, *sans aucun drastique.*

Action. — Laxatif doux, *ne donnant pas de coliques.*

Indications. — Constipation de différentes origines et notamment d'origine hépatique.

Laxatif de choix pendant la grossesse et l'allaitement.

Posologie. — 2 pilules le soir, *même si l'on a été à la selle dans la journée.*

Efficacité sûre. Accoutumance nulle.

Prix au public : 6 fr. 50.

Laboratoires EPARVIER

26, Grande-Rue Saint-Clair — LYON.

CASCARA MIDY

A base de Cascara Sagrada naturel, complet et épuré, mais non dénaturé par des manipulations chimiques.

Pilules dosées à :

1° 0 gr. 10 d'extrait hydro-alcoolique codex de Cascara Sagrada contenant les dérivés oxyméthyl-anthraquinoniques, à l'exclusion des résines drastiques et de l'huile essentielle.

2° 0 gr. 20 de poudre sélectionnée de *Rhamnus purshianus*.

Doses et mode d'emploi. — 1, 2 ou 3 pilules le soir au dîner. Après 15 jours, espacer les doses.

Propriétés thérapeutiques. — Constipation habituelle et ses troubles, peut être prescrit aux femmes enceintes et aux nourrices.

Prix : 8 francs.

Laboratoires MIDY

67, avenue de Wagram — PARIS (XVII^e).

CASCARINE LEPRINCE

Indications thérapeutiques. — Constipation habituelle, Affections du foie, Constipation dans la grossesse, l'allaitement, etc. Cholagogue, puis Copragogue de tout premier ordre. (Spécifique des *causes* et des conséquences de la *constipation*.)

Véritable traitement et non pas purgatif banal, employé couramment depuis 50 ans.

Doses et mode d'emploi. — Pilules à 0,10 : 1 ou 2 pilules le soir au début du repas.

Prix de vente au public : 8 fr. 75.

Laboratoires du Dr M. LEPRINCE
62, rue de la Tour — PARIS (XVI^e).

CASÉONE FABRE

Diastases actives et pures de la digestion
du lait
et Ferments lactiques sélectionnés.

**Assure la complète digestibilité
du lait.**

Le flacon : 20 francs.

Laboratoires FABRE
33, rue de la Haie-Coq.
AUBERVILLIERS
Tél. : Botzaris 62-40.

CASTANOL

Sédatif spécifique de la Coqueluche et des toux quinteuses rebelles.

Composition. — Extrait de châtaignier du Limousin, de Drosera, d'Anémone.

Aucun produit chimique,
Aucun produit du Tableau B.
Délicieux au goût.

Posologie :

Enfants : au-dessous d'un an : quatre 1/2 cuillerées à café par jour.

| | | | |
|---|-----------------|-------------------------------|---------------|
| — | de 1 à 2 ans : | 3 cuillerées à café par jour, | |
| — | de 2 à 4 ans : | 4 | — à café — |
| — | de 4 à 8 ans : | 4 | — à dessert — |
| — | de 8 à 12 ans : | 3 | — à soupe — |

Adultes : 4 cuillerées à soupe, pris entre les repas, pur ou dans un liquide quelconque.

Prix : 15 francs.

Pierre LACHAISE, Docteur en Pharmacie
9, place Municipale — TULLE (Corrèze).

CATALGINE

Composition. — La CATALGINE est une association de l'anhydride de l'acide phénylquinoléine carbonique avec l'acide acétylsalicylique.

Présentation. — La CATALGINE est présentée en tubes de 20 comprimés dosés à 0 gr. 50 (contenant 0 gr. 25 de chaque constituant).

Indications. — Par ses propriétés anti-thermiques, anti-septiques et éliminatoires de l'acide urique, la CATALGINE constitue un médicament précieux dans la grippe, un sédatif des manifestations douloureuses : névralgies, sciatiques, migraine, rhumatisme, un spécifique du rhumatisme chronique déformant, et du rhumatisme gouteux.

Posologie. — Suivant les indications du médecin : de 2 à 8 comprimés par jour, demi-heure avant les repas ou 2 heures après.

Ces comprimés, sans saveur, jetés dans demi-verre d'eau ordinaire, ou d'eau de Vichy de préférence, se délitent rapidement ; ils sont absorbés par entraînement.

Prix de vente au public : 10 francs.

Société générale d'Applications thérapeutiques.
THERAPLIX

R. MOREUX, Pharmacien, Ancien Interne des Hôpitaux.
98, rue de Sèvres — PARIS (VII^e).

CATALYL Mg.

Soluté de Chlorure de Magnésium cristallisé pur.

Exempt d'Oxychlorure.

Activité intense — Toxicité nulle — Stabilité.

Seule préparation magnésienne de goût vraiment agréable.

Suppression sur nos conditionnements de toute allusion au cancer.

Indications. — Cholagogue puissant, Asthénies, Surmenage, Hépatisme, Paludisme, Constipation, Sénilité prématurée, Dermatoses, Prostatites, Dysfonctionnement des glandes à sécrétion interne, Diabète, *adjuvant puissant des traitements opothérapiques.*

Mode d'emploi. — De une à deux cuillerées à café le matin à jeun dans 1/2 verre d'eau ou de lait tiède, sucrés ou non. Dose variable.

Une cuillerée à café correspond à 0 gr. 50 de Mg Cl², anhydre, 0 gr. 10 de chlorure de calcium.

Prix : 16 francs.

Laboratoire du Magsalyl

A. ROUX, Pharmacien

10, rue de la Mairie — IVRY-SUR-SEINE.

CATAPLASME DU D^r LELIÈVRE

Antiseptique instantané, émollient, résolutif.

Approuvé par l'Académie de Médecine de Paris.

Avantages et indications. — Il est *instantané et économique*. Plus de manipulations compliquées, plus de linges.

Il est *antiseptique et résolutif*. — Abscesses, furoncles, anthrax, panaris.

Il est *anesthésiant*. — Contusions, entorses, brûlures, engelures, eczéma, zona.

Il est *antiphlogistique et émollient*. — Ecchymoses, épanchements, hydarthrose.

Il est *décongestif*. — Laryngites aiguës, faux croup et toutes inflammations.

Il est *inaltérable et remplace tous les pansements humides*.

Mode d'emploi. — Soumettre le cataplasme ou un morceau de cataplasme à une faible quantité d'eau tiède ou chaude jusqu'à parfait gonflement, l'appliquer sur la partie malade et recouvrir d'imperméable.

Comme *véhicule*, ce Cataplasme accepte et retient facilement les substances médicamenteuses les plus variées : laudanum, arnica, etc.

On obtient un *Cataplasme sinapisé* en le saupoudrant de farine de moutarde au moment de l'application.

Prix : la pochette de 1 catap : 2 francs. — 5 catap : 8 francs

E. BOULLE, pharmacien de 1^{re} classe.

Ex-Interne des hôpitaux. — Lauréat de la Faculté de Paris

12, avenue de la Grande-Armée — PARIS (XVII^e).

CATEMÉNYL

Composition. — Le *Cateményl* est à base : d'*Hamamélis virginica*, décongestif, vaso-constricteur veineux, hémostatique, sédatif ; de *marron d'Inde*, qui fluidifie le sang et calme spécialement la douleur hémorroïdale ; de *Piscidia eryrina*, sédatif utérin ; de *Viburnum prunifolium*, tonique nerveux, astringent, antiabortif ; d'*Hydrastis canadensis*, vaso-constricteur abdominal, par action élective sur les splanchniques.

Propriétés et indications. — Toutes les affections du système veineux : Varices, Hémorroïdes, Etats variqueux, Eczéma variqueux, Phlébites infectieuses et variqueuses, Hyposphixie des extrémités.

Deux formes. — Gouttes et pilules.

Mode d'emploi. — XV à XX gouttes ou 2 à 4 pilules. avant chacun des deux principaux repas dans un peu d'eau. Cesser pendant les règles.

Littérature et échantillon sur demande.

Enregistré au Laboratoire National de contrôle sous le numéro 489-I.

Prix : 15 francs.

Laboratoire du docteur LALAURIE
CUXAC-D'AUDE (Aude).

Dépôt général : Office commercial pharmaceutique,
1, rue du Temple — PARIS (III^e), et ses succursales.

CAUSYTH

Composition. — Nouveau produit chimique défini, dérivé du pyrazol, répondant à la formule $C^{22}H^{24}H^4O^5S$.

Forme. — Comprimés dosés à 0 gr. 50.

Propriétés thérapeutiques. — A la fois stimulant et analgésique, il provoque une rapide régénération globulaire et son action se manifeste dans tout l'organisme. Il ne provoque aucuns troubles, même employé à doses élevées. Il est sans action nuisible sur les reins.

Indications principales. — Rhumatismes, Arthrites, Goutte, Polynévrites, Dysménorrhées, Infections généralisées : Grippe, Fièvre typhoïde, Rougeole, etc.

Doses. — 3 à 9 comprimés par jour dans les cas graves ; 2 à 4 comprimés dans les cas bénins.

Laboratoires BOISSY

15, rue Belgrand — PARIS (XX^e).

C. B. K.

Chimiothérapie rationnelle de la Tuberculose.

Composition. — Le C. B. K. (Contre Bacille de Koch) est une association injectable qui réunit dans sa formule des cholestérols de cuivre, de cérium et de molybdène activés par l'irradiation et l'effluve, et un éther cinnamique de la cholestérine.

Propriétés. — Le C. B. K. agit :

Sur le développement des corps microbiens (action antivégétative du cuivre).

Sur le bacille lui-même (oxydation des nucléotoxines par le molybdène et le cérium).

Sur le terrain (puissance de résistance conférée par le cinnamate de cholestéryle).

Présentation. — Ampoules pour injections intramusculaires de 5 cc. Les injections sont indolores, et ne déterminent aucun accident d'intolérance locale ou générale.

Posologie. — Séries de 24 injections séparées par un mois de repos. Une injection tous les jours ou tous les deux jours pour la première série ; tous les deux jours pour les suivantes.

Indications. — Tous les états pré-tuberculeux et tuberculeux, quelle qu'en soit la nature. Il n'existe pratiquement aucune contre-indication.

Résultats. — Le C. B. K. a été utilisé dans les services spécialisés de Paris, de Berck etc., il améliore très rapidement l'état général (diminution de la fièvre, augmentation du poids et de l'appétit dès la première série) et favorise la cicatrisation des lésions.

Prix :

La boîte de 8 ampoules 22 fr.

La triple boîte 60 fr.

Échantillons et littérature :

Laboratoires SFÉAT

15, rue Catulienne — SAINT-DENIS (Seine).

CELLONA

Bandes Plâtrées

Forme. — Plâtre adhérent à la tarlatane, d'où présentation du plâtre en nappe. Bandes de 2 et 4 mètres de long sur 10-12-15-20-25 et 30 centimètres de large. (Largeur de 40 et 50 centimètres sur demande spéciale).

Avantages :

- 1° — *Transport des bandes* : Encombrement réduit, légèreté.
- 2° — *Confection du plâtre* : Propreté; à l'immersion la bande est totalement imprégnée d'eau en 3 à 5 secondes; rapidité de par la quantité de plâtre apportée par la bande.
- 3° — *Masse constituée* : Plâtre à prise rapide d'excellente qualité, permettant un modelage parfait et accusant une résistance à la rupture et au choc, à la flexion, double de celle obtenue avec un plâtre courant, d'où :

légèreté des appareils constitués,
poids et encombrement réduits de moitié.

En fin, aspect extérieur lisse et brillant.

Mode d'emploi. — Immerger verticalement la bande, pendant 4 secondes environ, dans l'eau, sans addition saline. Exprimer légèrement et envelopper circulairement ou longitudinalement, en liant la masse à chaque apport de plâtre. Pour parfaire le moulage, on peut, avant la prise du plâtre, envelopper la masse d'une tarlatane apprêtée et lisser une ultime fois à la main en apportant sur la masse un peu de plâtre. A cette fin, exprimer à fond une bande immergée et essorée.

Indications. — Tous les cas médicaux chirurgicaux nécessitant l'immobilisation.

S'emploie pour la confection des attelles et des négatifs orthopédiques etc...

Laboratoires FISCH et Cie, 4, rue d'Illzach — MULHOUSE
Agence à PARIS : 104, Frg Poissonnière (X^e) — Tél. Lamartine 92-52

CELLU-SON

Son de blé dur PUR, sans aucune substance médicamenteuse, laxative ou irritante. D'après la méthode de M. le professeur Flessinger.

Propriétés thérapeutiques. — Toutes les constipations, mais plus spécialement celles provoquées par : Insuffisance hépatique, Dystonie gastrique et Ptose intestinale, Colites muco-membraneuses, Grossesse, Suites opératoires, Colibacillose. — Dermatoses d'origine intestinale.

Présentation : Biscottes et poudre.

Posologie. — 2 à 3 biscottes ou 1 à 2 cuillerées à soupe par jour au début du traitement, puis réduire progressivement pour cesser au bout de 3 à 4 mois.

Enfants : 1/2 dose.

Prix au public :

13 fr. la boîte (24 biscottes ou 350 gr. de poudre).

Laboratoire P. AUBRY

62, rue Erlanger — PARIS (XVI^e). Jasmin 33-44.

Belgique et Congo :

Laboratoires Belges du Quinby

Romain Deschiens — 74, avenue Louis-Bertrand
BRUXELLES

CÉRÉALES BÉBÉ FAVRICHON

Farine de croissance des enfants constipés.

Composition. — Froment, 55 ; Seigle, 35 ; Sucre, 15.

Nous garantissons qu'il n'y entre pas trace de drogue.

Indications. — Tous les cas de constipation infantile à partir de 6 mois. Les donner en remplacement de toute autre bouillie, car les Céréales-Bébé sont une farine de croissance de premier ordre, riche en éléments nutritifs, en sels minéraux et vitamines.

Emploi. — 1, 2 ou 3 bouillies par jour. Les doses suivant l'âge et mode de préparations sont portées sur une notice incluse dans chaque boîte.

Littérature et échantillon sur demande :

Produits Diététiques FAVRICHON

Pharmacien-chimiste

SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY (Loire).

CÉRÉALES GRANULÉES FAVRICHON

Aliment des constipés.

Composition. — Froment et seigle, 100 p. 100. Pas de trace de drogues.

Forme. — Granulé à saveur de grillé.

Indications. — Tous cas d'atonie intestinale (sauf cas d'obstruction : tumeur, corps étranger).

Emploi. — 2 ou 3 cuillerées à soupe dans un déjeuner, potage, ou plat quelconque, très chaud.

Produits Diététiques FAVRICHON

Pharmacien-Chimiste

SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY (Loire).

CÉRÉBRINE FOURNIER

Liquueur agréable, de composition définie, spécifique par excellence des migraines, névralgies rebelles, règles douloureuses.

Cérébrine simple. — Pour tous les cas en général de migraines et névralgies.

Cérébrine bromée. — Migraines, névralgies tenaces, agit efficacement contre les coliques menstruelles et les tranchées utérines.

Cérébrine bromo-iodée. — Névralgies rebelles à tous traitements antérieurs, névralgies faciales, sciaticues.

Cérébrine iodée. — Névralgies rhumatismales.

Cérébrine quiniée. — Courbature, grippe infectieuse.

Dose. — Une cuillerée à soupe dans un peu d'eau une heure avant le repas ou deux heures après. Renouveler au besoin la dose jusqu'à 3 cuillerées par 24 heures.

Prix : 12 fr., toutes variétés.

A. FOURNIER et C^{ie}, Pharmaciens

147, boulevard Montparnasse — PARIS (VI^e).

Tél. : Danton 50-57.

CÉRÉBROÏL LEISYN

Formuler : 1 ou plusieurs tubes comprimés de **CÉRÉBROÏL LEISYN**

Mode d'emploi. — 1 ou 2 comprimés à avaler avec une gorgée de liquide quelconque au milieu des repas, soit 3 à 6 comprimés par jour. Les comprimés peuvent être fractionnés en 2 ou 4 parties pour les doses enfantines.

Indications. — Surmenage intellectuel et surmenage général, insuffisances cérébrales, dépressions nerveuses, perte de mémoire, de volonté, Apathie, Irrésolution, Tics, Aphasie, Asthénie et Asthénie génitale, Méningo-encéphalite, grandes Neurasthénies.

Action. — Augmente la faculté d'attention volontaire, l'intensité de la pensée, l'énergie morale, la puissance de travail et la résistance physique. Facilite les études et le travail intellectuel. Spécifique réel de la fatigue, du surmenage et des neurasthénies.

Composition. — Sels solubles non oxydés de phosphore directement assimilables, Yagéine, Yagénine, Sels de terres rares. Préparation vitalisée et activée par procédé électrique EVOO.

Supprimer autres médications contenant strychnine et arsenic.

Aucune toxicité ni contre-indication.

Communication à l'Académie de Médecine.

Les Laboratoires LEISYN

1 bis, rue Molitor — PARIS (XVI^e).

Téléphone : Auteuil 14-73. — C. C. postaux : PARIS 1075-98.

Adresse télégraphique : LABOLEISYN-PARIS.

CÉRÉBRO-LIPASE

Comprimés.

Médication reconstituante opothérapique.

Composition. — Cerveau total de taureau fraîchement abattu, substances blanche et grise. Jusquiame. Méthylarsinate disodique.

En comprimés kératinisés et glutinisés solubles au contact de la sécrétion pancréatique et duodénale.

Indications. — Etats pré tuberculeux, Anémies, Asthénies, Grossesse, Dépression cérébrale, Surmenage, Convalescence, Déficiences sexuelles.

Action. — Stimulant général de l'organisme et de ses fonctions : circulation, nutrition, respiration. Excitant de l'assimilation et de l'hématopoïèse. Accroissement de résistance et d'euphorie.

Posologie. — *Adultes* : 2 comprimés par jour, 10 jours par mois ; durée moyenne du traitement : 3 mois.

Enfants : (à partir de 10 ans seulement), 1 comprimé tous les deux jours.

Prix : 30 francs.

Echantillons et littérature :

Laboratoires H. YVRARD
17, rue Soufflot — PARIS.
Tél. : Odéon 56-67.

CÉRÉBROSTHÉNINE DALIN

Eléments actifs. — Vanadium, Phosphore, Strychnine, Nucléines, Manganèse en combinaison stable et définie.

Indications. — Toutes les maladies déficitaires ou par carence organique, les Asthénies, Anémie, Lymphatisme, Neurasthénie, Maladies consomptives et anergisantes, Grippe, Convalescence, Tuberculose.

Posologie. — 1^o *Cachets* : 1 cachet de Cérébrosthénine avant chacun des 2 principaux repas.

2^o *Dragées* : 2 dragées le matin, à midi et le soir, avant les repas. De 12 à 18 ans : 1 dragée seulement avant les trois repas.

3^o *Gouttes* : XX gouttes avant les deux principaux repas. De 12 à 18 ans : 1 goutte par année d'âge avant les 2 principaux repas.

Echantillons sur demande :

O. DALIN, pharmacien de 1^{re} classe
49, quai Saint-Vincent. — LYON.

CERÉOSSINE DEHAUSSY

(Simple).

Reconstituant physiologique.

Minéralisateur complet.

Os frais : Os longs de l'animal en période de croissance, traités avec leur moelle rouge (facteur antirachitique et de croissance, contrôlé biologiquement sur le rat blanc carencé. *Vitamines D naturelles*).

Phytophosphine : Élément phospho-organique extrait des graines de céréales.

Sels minéraux : Silice, Manganèse, Fer (hémoglobine).

Extrait parathyroïdien : Fixateur des sels minéraux.

Aucune contre-indication : Ni Adrénaline, ni Surrénale.

Indications :

tats pré-tuberculeux et tuberculose, Affections osseuses, Troubles de croissance, Grossesse, Lactation, Convalescence, Surmenage.

Posologie :

Cachets : Adultes, 2 cachets. Enfants, 1 cachet.

Comprimés : Adultes, 2. Enfants, 1.

Granulé fondant : Nourrissons : 1 cuillerée à café. Enfants : 2 cuillerées à café. Adultes : 4 cuillerées à café.

Poudre : Nourrissons : 1/2 cuill. à café. Enfants : 1 cuill. à café. Adultes : 2 cuill. à café.

Prix : 15 francs la boîte de 40 cachets.

Granulé et Poudre : 15 francs.

Laboratoires DEHAUSSY

66, rue Nationale — LILLE.

CÉRÉOSSINE IRRADIÉE

Ergostérine activée aux ultra-violets.

(Triple contrôle: chimique, spectrophotométrique, biologique; 1.200 unités anti-rachitiques par cachet.)

Associée au complexe organo-minéral « Céréossine ».

Indications.

Rachitisme, Pré-Rachitisme, Croissance, Déminéralisation accentuée chez la femme enceinte et la nourrice.

Posologie.

La même que celle de la Céréossine simple.

Cachets.

Adultes : 2 cachets.

Enfants : 1 cachet.

Prix : 22 francs.

Granulé fondant.

Nourrissons : 1 cuillerée à café.

Enfants : 2 —

Adultes : 4 —

Prix : 20 francs.

CÉRÉOSSINE MÉTHYLARSINÉE

par cachet : 0,020 de méthylarsinate de soude.

Posologie. — *Adultes* : 2 cachets.

Enfants : 1 cachet.

Prix : 15 francs.

CÉRÉOSSINE GAÏACOLÉE

Posologie. — *Adultes* : 2 cachets.

Prix : 15 francs.

Laboratoires DEHAUSSY

66, rue Nationale — LILLE.

CÉTHOCAL

Cérium, Thorium, Calcium.

Formules du Dr LEMAY, pour l'emploi thérapeutique des Sels de Terres Rares.

POUDRE ET PÂTE CETHOCAL

Inodore, Inodore et sans Corps Gras.
DERMATOSES, ECZEMAS, LUPUS, etc...

Hygiène des Bébés et de la peau.

Application Matin et Soir.

GOUTTES CETHOCAL

Traitement interne des Dermatoses.

XV à XX gouttes au début des principaux repas.

AMPOULES CETHOCAL

Désensibilisation, Asthmes, Emphysème,
Intradermoréaction et Protéinothérapie de
la Syphilis.

OVULES CETHOCAL

Traitement des Métrites.

Inodore et incolore. Un tous les soirs.

Formes et prix :

Poudre : La boîte poudreuse, 10 francs.

Pâte : Le tube 10 francs.

Gouttes : Le flacon compte-gouttes, 15 francs.

Ampoules : 25 francs. — *Ovules* : 18 francs.

Laboratoire FREYSSINGE

6, rue Abel — PARIS (XII^e).

CÉTRAROSE GIGON

Composition. — Solution d'acide protocétrarique $C^{30}H^{22}O^{12}$ à 0,016 milligr. par cm. c.

Forme. — Gouttes.

Indications thérapeutiques. — Médicament à électivité musculaire, Analgésique gastrique, Spécifique contre les vomissements, Vomissements de la grossesse. Etats nauséux, Douleurs gastriques, Troubles digestifs, Indigestions.

Mode d'emploi et doses. — XV à XX gouttes en une fois dans un peu d'eau sucrée. Jusqu'à CC gouttes par 24 heures.

Laboratoires des Produits du Dr GIGON

A. FABRE, pharmacien

25, boulevard Beaumarchais — PARIS (IV^e).

CHARBON FRAUDIN

Composition. — Association de charbons de peuplier et de saule sélectionnés, doués d'une grande porosité.

Forme pharmaceutique :

1^o Granulés sphériques aromatisés à la menthe, ou à l'anis.

Avec naphtol B : Charbon naphtolé.

Sans naphtol B : Charbon simple.

2^o Comprimés sans sucre à 0 gr. 75.

Propriétés. — Pouvoir absorbant et adsorbant considérable, grâce à la texture particulière des bois légers employés.

Indications thérapeutiques. — Aérophagie, Dyspepsies flatulentes, Gastro-entérites, Intoxications de toute nature.

Doses. — 3 à 6 cuillerées à café par jour, à la fin des repas.

Prix : Charbon Fraudin naphtolé... 10 fr.

Laboratoires des CHARBONS FRAUDIN

4, av. Desfeux — BILLANCOURT (Seine).

Téléph. : Molitor 02-62.

CHARBON TISSOT

(Grains anisés de)

3 formes :

Anisés simples. — Anisés naphtolés. — Anisés magnésiens.

Forme. — Charbon de peuplier aggloméré au gluten mucogène, aromatisé à l'anis, très légèrement additionné de benzo-naphtol, simple ou magnésien.

Le mode d'agglomération en gros grains glutinisés en fait la meilleure forme d'administration du charbon de peuplier en même temps que la plus agréable. *Divisent et expulsent mieux que les laxatifs.*

Indications. — Dyspepsie, Gastralgie, Flatulence, Digestions difficiles, Nausées, Hoquet, Renvois, Embarras et Fermentations intestinales. *Pour l'Estomac net et l'Intestin net.*

Dose. — 1 cuillerée à café, soit après chaque repas, ou le soir en se couchant, ce qui suffit habituellement.

Nota. — Avaler comme des graines de lin avec une gorgée d'eau si possible. La forme des grains supprime le spasme intestinal. Ne contient ni atropine, ni belladone.

Peut être donné à tous les âges et dans tous les états.

Anisé simple : 8 fr. 50. — Anisé naphtolé : 8 fr. 50.

Anisé magnésien : 10 francs.

Laboratoire du Docteur TISSOT

34, boulevard de Clichy — PARIS.

CHELOÏDINE

Pommade résolutive et calmante à base de Thiosinamine, salicylate de soude et stovaine.

Dépourvue de toute toxicité.

Indications thérapeutiques. — Traitement du rhumatisme chronique, des cicatrices vicieuses et douloureuses, des scléroses.

Mode d'emploi. — Deux fois par jour, appliquer, gros comme une noisette, sur la surface malade et faire suivre d'un massage léger.

Prix : 15 francs.

Laboratoires DORANTOWICZ

17 bis, avenue Parmentier — PARIS (XI^e)

Tél. : Roquette 14-12.

CHENANTHOL

(Vers intestinaux.)

Ascaris, Ankylostome, Anguillule, Oxyures, Trichocéphale, etc.

Seule présentation officinale, définitive et parfaite, inoffensive et sûre, de l'essence pure américaine de Chenopode, suivant les prescriptions de la *Fondation Rockefeller*.

Posologie et mode d'emploi. — Capsules dosées en volume et non en gouttes (1/4 de cent. cube par capsule). On donne une capsule par 3 années d'âge : maximum : 6 capsules en 3 doses, heure par heure. Purge saline : 1 heure 1/2 après la dernière.

Régime. — Pas de régime préparatoire. *Diète de rigueur* pendant le traitement jusqu'à effet complet de la purge.

Renouveler le traitement au bout de 10 jours si on juge à propos, comme cure radicale.

Prix de vente : 15 francs.

Laboratoire L. HINGLAIS
EPERNAY (Marne).

CHÉRALYS (Comprimés)

Composition. — Nickel catalytique Dufayard. Peroxyde de manganèse colloïdal. Cobalt catalytique.

Carbonate de calcium léger. Silicate d'alumine et de magnésie. (En comprimés agréables à croquer.)

Propriétés. — Basées sur les principes scientifiques les plus modernes. Activateurs des ferments digestifs normaux. Neutralisants. Antifermentescibles.

Indications. — Maladies de l'estomac, du foie, des intestins, Diabète.

2 comprimés après les repas et 2 autres ou plus 3 à 4 heures après.

Prix : 10 francs.

Laboratoires DUFAYARD
12, rue des Saints-Pères — PARIS (VII^e).

CHLOCCI

(Le chlore occit les cocci.)

Antiseptique, non toxique, à base de chlore naissant.

Composition. — Poudre ou comprimés de paratoluène sulfochloramine sodique (0,25).

Indications. — Petite et grande chirurgie, Pansements humides, lavages. Gynécologie, Urologie.

Doses. — 5 comprimés par litre d'eau pour lavages, injections. 10 comprimés par litre d'eau pour lavage de plaies, pansements humides, goutte à goutte.

Aucune toxicité. — Aucune causticité.

Prix : 4 fr. 75

Laboratoire ADAM

Docteur en pharmacie

GRANVILLE (Manche).

CHLOMAG

Composition. — Chlorure de Magnésium. Bromure de Magnésium. Peroxyde de Magnésium.

Indications. — Tonique du système nerveux faisant disparaître la fatigue nerveuse. Action remarquable sur la peau ; guérison de l'Acné, amélioration des Psoriasis et des Prurits. Véritable préventif des Néoplasmes et des Tumeurs. Résultats efficaces dans le Rhumatisme chronique et dans les manifestations de l'Arthritisme.

Posologie. — 2 comprimés par jour, les prendre le matin à jeun avant le premier déjeuner dans un demi-verre d'eau.

Pour obtenir un résultat rapide dans la lutte contre l'Arthritisme et le Rhumatisme, il est nécessaire de renouveler la dose avant le repas du soir.

En flacon de 45 comprimés.

L. N. C. 428-2.

Laboratoire du Docteur VERMERSCH

71, rue Saint-Jacques — PARIS (V^e).

CHLORAL BROMURÉ **du Dr DUBOIS**

Sédatif nervin préféré aux uréides et opiacés, dissimulant la saveur du chloral, n'irritant pas l'estomac.

Liquide sucré représentant 0 gr. 40 chloral et 0 gr. 60 bromure par cuillerée à soupe.

1 à 6 cuillerées à soupe ou à café, selon l'âge, dans les 24 heures. — Flacon et demi-flacon.

Insomnie, Dysménorrhée, Névralgies, Névroses, Psychoses, Malaises des hypertendus, Tous troubles essentiels ou symptomatiques du système nerveux.

DURIEZ

20, place des Vosges — PARIS.

CHLORALOSANE

α **CHLORALOSE** chimiquement pure.

(Exempte de Chloralose.)

Propriétés. — Hypnotique de choix, non toxique, sans intolérance ni accumulation, ni accoutumance.

Indications. — Insomnies nerveuses, de fatigue, de surmenage. Hypnotique des cardiaques, des dyspeptiques, des neurasthéniques.

Préparation et suites des anesthésies. Cure de l'alcoolisme et de la morphinomanie.

Présentation. — Flacons de 20 comprimés à 0 gr. 15.

Prix : 12 francs.

Posologie. — 1 à 3 comprimés 1/2 heure avant le coucher, d'avantage si besoin.

Établissements KUHLMANN
Produits RAL. Spécialités.

145, boulevard Haussmann — PARIS (VIII^e).

CHLORAMINE FREYSSINGE

Sodium-paratoluène-sulfo-chloramine

Forme. — Pilules à enrobage de gluten recouvert d'un enduit inattaquable par le suc gastrique.

Composition. — Chloramine T 0 gr. 05.
Charbon de peuplier pulvérisé 0 gr. 10.

Indications thérapeutiques. — Dysenteries, Entérites, Paratyphoïdes, Porteurs de germes, Colibacillose, Dermatoses, etc. D'une innocuité absolue, elles permettent *réellement* de réaliser la désinfection intestinale (Fétidité des selles, etc.).

Posologie. — 2 à 8 pilules par jour au commencement des principaux repas.

Prix : 12 francs.

Laboratoire FREYSSINGE

6, rue Abel — PARIS.

CHLORÉTHYLE BENGUÉ

Chloréthyle Bengué. — Anesthésie locale, névralgies.

Flacons en métal et en verre. Fermeture à clapet très pratique.

Anestile Bengué. — Mélange de chlorure d'éthyle et de méthyle volatil à 2°.

Anesthésie locale, névralgies.

Narcotile Bengué. — Chlorure d'éthyle pur pour anesthésie générale.

Flacon de 50 gr. gradué à gros jet, fermeture à clapet. — Tubes scellés 3, 5, 10 cc. pour anesthésie générale.

Chlorure de méthyle pur. — Bidons de 250, 500 grammes et 1 kilo.

Docteur BENGUÉ

Pharmacien,

16, rue Ballu — PARIS (IX°).

CHLORHYDROL « FOUCHÉ »

Composition. — Association chlorhydro-peptique ; acide chlorhydrique naissant sous forme de chlorhydrate de bétaine cristallisé, ionisable par simple solution dans l'eau et pepsine du Codex.

Chaque comprimé correspond à :

| | |
|---------------------------|-----------|
| Acide chlorhydrique | 0,05 cgr. |
| Pepsine | 0,05 cgr. |

Action thérapeutique et indications. — Hypochlorhydrie, Hypopepsie, et les troubles Gastro-intestinaux qui en découlent : Pesanteurs, Insuffisance motrice de l'estomac, Dyspepsies duodénales et duodéno-pancréatiques, Diarrhées aiguës et chroniques, Nutrition retardée des anémiques et convalescents.

Posologie. — 3 à 4 comprimés par 24 heures (dose moyenne) et davantage selon les cas.

Laboratoire R.-P. FOUCHÉ

2, boulevard Pershing — PARIS

CHLORICAL

Forme. — Solution aromatisée au suc de fruits.

Composition. — Solution titrée de façon que 78 gouttes (1/2 cuillerée à café) correspondent à 1 gr. de chlorure de calcium cristallisé chimiquement pur, stabilisé.

Propriétés thérapeutiques. — Hémostatique. Déchlorurant. Récalcifiant.

Indications. — Traitement préventif des hémorragies post-opératoire. Epistaxis. Hémoptysies. Hématémèse. Toutes Hémorragies (pulmonaires, capillaires, cérébrales, etc...). Métrorragies. Œdèmes. Néphrites. Pleurésies. Albuminuries. Tuberculoses. Grossesses. Allaitement. Croissance. Caries dentaires. Accidents sériques.

Mode d'emploi. — Aux repas, dans un peu d'eau sucrée.

Enfants au-dessous de 12 ans : 5 gouttes par année d'âge.

Adultes : de 60 gouttes à 2 cuillerées à café et demie.

Suspendre la médication pendant huit jours après traitement de 3 semaines.

Prix : 16 francs.

Laboratoires SAUBA
MONTREUIL-PARIS

CHLORIDIA

Pepsine. — Chlorhydro — Cocaïnée — Chloroformique.

Indications. — Dyspepsie, gastralgie, crampes, renvois, vertige stomacal, dilatation de l'estomac et, en général, toutes les maladies de l'estomac se reliant à une insuffisance de sécrétion du suc gastrique.

Propriétés thérapeutiques. — Le Chloridia restitue au suc gastrique tout son pouvoir digestif par l'effet de la pepsine et de l'acide chlorhydrique, oppose aux fermentations putrides l'action antiseptique de son eau chloroformée, et fait disparaître les sensations douloureuses grâce à la présence d'une légère quantité de chlorhydrate de cocaïne.

Forme et dose. — Le Chloridia est un liquide limpide de saveur sucrée et agréable, que l'on prend à la dose d'une cuillerée à café dans un quart de verre d'eau au commencement de chaque repas.

Les personnes qui n'obtiennent pas un soulagement rapide peuvent doubler la dose ou diminuer la quantité d'eau.

Prix : 16 francs.

Laboratoires des **PRODUITS DANNEC'H**

BRUN ET MARTINEAU

64, rue des Tournelles — PARIS (III^e).

R. du C. Seine 218-670.

CHLORMAGNÉSIUM FISCH

Composition. — Petits comprimés de chlorure de Magnésium pur anhydre, à 0,20 grammes absorbables soit en les avalant entiers, soit en les dissolvant dans un demi-verre d'eau.

Indications. — Action cholagogue, régulatrice et antiputride des selles ; action dépurative sur les humeurs ; neurotonique, préventif du cancer. Dermatozose, verrues, etc...

Mode d'emploi. — Deux comprimés par jour, aux trois principaux repas. Augmenter cette dose de 1 à 3 comprimés par jour, ou réduire à 3 comprimés par jour suivant indications médicales.

Prix : 9 francs.

Laboratoires **FISCH et Cie**

4, rue d'Illzach — MULHOUSE

Agence à PARIS :

104, faubourg Poissonnière (X^e).

Tél. : Lamartine 92-52.

CHLOROBYL**Composition :**

| | |
|--------------------|------|
| Tochlorine | 0,05 |
| Bile purifiée..... | 0,10 |
| Charbon..... | 0,10 |

Pour un comprimé.

Forme. — En comprimés de 0 gr. 25.

Propriétés thérapeutiques. — Désinfection intestinale.

Indications. — Entérites, Dysenterie, Affections cutanées.

Mode d'emploi. — 2 à 6 comprimés par jour avant les repas.

Prix de vente au public : 14 francs.

Laboratoires LOBICA

46, avenue des Ternes — PARIS (XVII^e).

CHLORO-CALCION

Forme : Solution.

Composition :

Solution titrée de *Chlorure de calcium* cristallisé, chimiquement pur, stabilisé.

LXXX gouttes (ou 1/2 cuiller à café) = 1 gr. Ca Cl^2 .

Indications :

Recalcifiant : Croissance, Tuberculose, Entérites, Carie dentaire, Spasmophilie, Accidents sériques, Grossesse, Allaitement.

Hémostatique : Toutes hémorragies ; et comme *préventif* des hémorragies post-opératoires.

Diurétique déchlorurant : Albuminuries, Néphrites, Pleurésies, Ascite.

Mode d'emploi et Doses :

Dans de l'eau sucrée, avant les repas.

Chez les enfants au-dessous de 10 ans :

IV gouttes par année comme *recalcifiant* ;

XX gouttes par année comme *hémostatique* ;

X à C gouttes comme *anti-albuminurique* ;

L à CC gouttes contre les *accidents sériques* ;

3 à 6 fois LXXX gouttes dans la *spasmophilie*.

Chez les adultes :

XL gouttes 2 fois par jour comme *recalcifiant* ;

LXXX gouttes 4 fois par jour comme *hémostatique* ;

L à CL gouttes par jour comme *anti-albuminurique* ;

3 à 10 cuillers à café comme *diurétique* ;

LXXX gouttes 4 fois par jour comme *anti-sérique*.

Prix : 16 francs.

Laboratoires MICHELS

9, rue Castex — PARIS.

Tél. : Archives 45-12.

CHLORO-MAGNÉSION

Composition. — Solution titrée et stabilisée de Chlorure de magnésium pur sec, et de Chlorure de calcium pur cristallisé.

XXX gouttes = 1 gr. 20 $MgCl^2$ + 0 gr. 50 $CaCl^2$.

Indications. — Asthénie, Régulation de la sécrétion biliaire, Instabilité intestinale (notamment enfants et nourrissons), Désensibilisation, Urologie, Dermatologie (Verrues, Papillômes, Cancer), Tremblements.

Emplol. — Dix jours sur quinze :

Adultes : XV gouttes avant chacun des 2 principaux repas ou XXX gouttes le matin à jeun.

Enfants : 3 fois V gouttes.

Nourrissons : 3 fois III gouttes.

Intoxoations alimentaires. — XC gouttes en une fois pendant 2 ou 3 jours.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 27-1.

Prix : 12 fr. 50.

Laboratoires DESCOURAUX

52, boulevard du Temple — PARIS

DESCOURAUX et Fils, Pharmaciens.

Docteur en Pharmacie.

CHLOROPHYLLE

DU DOCTEUR DAVID-GALATZ

Chlorophylle sodico-magnésienne cristallisée
Solution concentrée à 10 % en ampoules de 5 cc.

Propriétés Biologiques :

Cyto-régulateur. — *Cyto-freinateur.*

Actino-catalyseur.

Sensibilise les néoplasmes aux effets des rayons X.

Indications :

TOUS LES CANCERS

Cancers inopérables. — Cancers radio-résistants.

Cancers récidivants après traitement chirurgical
ou radiothérapique.

Toxémie asthénisante du cancer. Cachexie cancéreuse.

Lupus. Ulcères (adjuvant des U. V.).

Mode d'emploi :

Une ampoule chaque jour par voie intra-veineuse
(sans choc ni réaction) pendant 12 à 15 jours.

Pour les cancers superficiels ou accessibles, injecter
1 à 2 ampoules intra-tumorales avant radiothérapie.

Compléter la cure par l'administration quotidienne
de 3 fois XX gouttes de PHYLLA (Voir page 1210).

Société d'Applications Pharmacodynamiques

5 et 7, rue Claude-Decaen, PARIS (XII^e).

CHLORUMAGÈNE

Formule du **D^r Martin du Theil.**

Forme. — Poudre.

Composition. — Hydroxyde de magnésium pur
Codex de densité constante sans odeur ni saveur.

Propriétés. — Au contact du suc gastrique *formation de chlorure de magnésium pur à l'état naissant à l'exclusion de tout autre sel halogène* (fluorure bromure, iodure); de ce fait aucune contre-indication.

Régulateur de l'intestin convenant à tous les âges.

Indications. — Toutes les indications du chlorure de magnésium. Déficience de la cellule nerveuse. Troubles du sympathique. Hypertension artérielle. Constipation habituelle, entérites, etc.

Doses habituelles. — Une cuillerée à café délayée dans un peu d'eau ou de lait.

Prix : 16 fr. 50.

Laboratoires LACOMBE et Cie

42, rue du Mont-Cenis — PARIS (XVIII^e).

CHLORURE D'AMMONIUM BRÉANT

Comprimés.

Composition. — Chlorure d'ammonium pur, comprimés à 0,25 et glutinisés.

Indications. — Acidifiant urinaire énergétique. Adjuvant de la vaccinothérapie anticolibacillaire.

Posologie. — Avaler sans croquer 4 à 5 comprimés à chacun des repas.

Prix du flacon : 15 francs.

**LABORATOIRES D'ANALYSES
BRÉANT**

11, rue de Clichy — PARIS

Tél. : Trinité 23-84.

CHOLAGOL

Insuffisance Hépatointestinale.

Présentation. — Granulé (Cholagogue antiseptique et antitoxique).

Formule :

| | |
|--------------------------|--------|
| Calomel..... | 0,01 |
| Peptone de Witte | 5,50 |
| Sulfate de magnésie..... | 25 gr. |

Indications. — Toutes les fois qu'à un titre quelconque il faudra drainer foie et tube digestif, produire une sécrétion et excrétion biliaire plus active, une oxonération intestinale plus complète.

Ictères, Sub-ictères, Angiocholites, Cholémie.

Lithiase hépatointestino-rénale. Constipation.

Migraines, Amaigrissements, Vertiges.

Posologie. — Une cuillerée à soupe, demi-heure avant le petit déjeuner dans un demi-verre d'eau chaude. Rester couché sur le côté droit pendant ce temps.

Prix : 17 francs.

Laboratoires REBOUL

PONT-SAINT-MAXENCE (Oise).

CHOLÉCYSTINE

Pilules kératinisées de sulfate de magnésie.

*Réalisation en thérapeutique journalière
de l'épreuve de Meltzer-Lyon.*

Forme. — Pilules kératinisées de sulfate de magnésie dosées à 0,30 cgr. *La variété peptonée renferme en plus 0,05 cgr. de peptone.*

Indications. — Cholécystites aiguës et chroniques, ictères, migraines, entéro-colites muco-membraneuses.

Doses. — 6 à 10 pilules par jour, en une fois, le matin à jeun, ou en plusieurs fois, trois quarts d'heure avant les repas.

Prix : 12 francs.

VINCENT, pharmacien

14, avenue Mac-Mahon — PARIS.

CHOLEFLUINE

Forme. — Granulé soluble, agréable au goût.

Composition :

| | | |
|--|---------|----|
| Sulfate de magnésie..... | 28 gr. | » |
| 3 Peptones (Viande, Poisson, dite de Witte)..... | 9 gr. | » |
| Hyposulfite de soude..... | 4 gr. | » |
| Extrait de Boldo..... | 2 gr. | 50 |
| Sucre parfumé. Q. S. pour | 100 gr. | » |

Indications. — Congestion du foie et de la vésicule biliaire, Lithiasse biliaire, Ictère, Insuffisance hépatique et ses conséquences, Intoxications alimentaires, Dermatoses récidivantes, Migraines, Urticaires, Troubles digestifs variés.

Contre-indication (temporaire). — Cholécyститes aiguës.

Posologie. — 1 à 3 cuillerées à café le matin à jeun dans un demi-verre d'eau tiède. Se coucher ensuite 10 minutes sur le côté droit.

Particularités :

Polyvalence peptonique sélectionnée au maximum :

- 1° Peptone de viande.
- 2° Peptone dite de Witte.
- 3° Peptone de Poisson.

Activité cholagogue renforcée par extrait de Boldo, Action antifloculente et anti-anaphylactique par Hyposulfite de soude.

Prix : 18 francs.

Laboratoires LECONTE

7, rue des Petits-Carreaux — PARIS (II^e).

Tél. : Louvre 53-16.

CHOLÉINE CAMUS

Extrait inaltérable de fiel de bœuf,
capsules dosées à 0 gr. 20.

Dose et mode d'emploi. — 4 à 6 capsules par jour, 2 ou 3 à la fin de chaque repas.

Propriétés. — Opothérapie biliaire.

Indications. — Lithiase Biliaire, Coliques Hépatiques, Ictère, Cholémie, Constipation, Entéro-Colites, Dyspepsie, Auto-Intoxication.

Prix : 13 fr. 50.

Laboratoires DARRASSE

Rue Saint-Maurice
NANTERRE (Seine).

CHOLÉINE LACTIQUE

Opothérapie biliaire et ferments lactiques

Dose et mode d'emploi. — 4 à 6 capsules par jour, dosées à 0 gr. 20, à la fin des repas.

Indications. — Congestion du foie, lithiase, cholécystite, acholie, ictères, hépatites, cirrhoses, cholémie, phénomènes gastro-intestinaux, constipation, colite muco-membraneuse, arthritisme.

Prix : 13 fr. 50.

Laboratoires DARRASSE

Rue Saint-Maurice
NANTERRE (Seine).

CHOLELYSE

Médicament spécifique et préventif de la Colique Hépatique et de la Lithiase Biliaire, à base d'Acide oléique pur, d'après les études du D^r ARTAULT DE VEVEY.

Mode d'emploi. — La CHOLELYSE en capsules dosées à 0,50 d'Acide oléique, se prend à jeun, pendant 10 jours par mois par mesure préventive dans les cas de coliques mensuelles, ou en cas de crises, 2 à 3 capsules d'un coup, dose qu'on peut renouveler un peu plus tard.

Prix : 15 francs.

Préparé par

L. CARBOU, Pharmacien

8, rue Jean du Bellay — PARIS (IV^e).

CHOLÉO-COMBRETOL BOLDINISÉ

Composition. — Extrait de Combretum. Extraits biliaires boldine et boldo.

Propriétés. — Opothérapie et Phytothérapie associées : Cholagogue, Diurétique, Eupeptique, Antitoxique, Laxatif.

Indications. — Insuffisances hépatique et biliaire, Cirrhoses, Ictères, Cholécystites, Cholémie, Constipation, Entéro-Colite muco-membraneuse. Fièvre bilieuse hématurique et toutes intoxications.

Dose. — Prescrire 1 à 2 pilules après chacun des deux grands repas.

Prix : le flacon, 10 francs.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 339-3.

Laboratoires CAILLAUD

37, rue de la Fédération — PARIS (XV^e).

Téléphone : Suffren 12-63.

CHOLÉOKINASE

Extrait spécial de fiel de bœuf et de kinase.

Dragées ovoïdes kératinisées dosées

à : Bile en pâte : 0,20 ; Secrétine : 0,003.

Doses et mode d'emploi. — 4 à 6 ovoïdes par jour en 3 doses égales : à la fin du déjeuner, à la fin du dîner, le soir, en se couchant. Ces doses peuvent même être doublées au début du traitement.

Propriétés thérapeutiques. — Active les sécrétions biliaire et pancréatique, améliore la digestion duodénale.

Indications. — *Entérocolite muco-membraneuse*, angiocholite, cholémie familiale.

Prix : 15 francs.

Laboratoires DURET et REMY
et du Dr Pierre ROLLAND
ASNIÈRES (Seine).

CHOLÉO-LACTOL DAGUIN

Formule du Dr L.-G. MARY

Forme. — Comprimés à enrobage de Kératine soluble dans l'intestin seulement.

Composition. — Boldine 1/2 milligr., incorporée avec :

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Extraits biliaires dépigmentés..... | } à à 0,10 |
| Pancréatine extractive..... | |
| Ferments lactiques purs..... | |

par comprimé.

Dose. — Adultes : 4 à 6 par jour, aux repas.
Enfants : 1/2 dose. Avaler sans croquer.

Indications. — Infections intestinales et auto-intoxications. Toutes affections hépatiques, Diarrhées estivales, Troubles de la peau.

Prix : 14 francs.

Echantillons sur demande aux
Etablissements DAGUIN
à SAINT-MAUR (Seine).

CHOLÉOLAX COLAS

Association des trois Cholagogues vrais.

Forme. — Granulés friables, aromatisés à la vanille, agréables au goût.

Composition. — Huile d'olive vierge, Sulfate de magnésie desséché, Peptone de viande.

Propriétés thérapeutiques. — Draine la vésicule biliaire, Décongestionne le foie, Combat la constipation et les fermentations, sans irriter l'intestin.

Indications. — Infection et stase vésiculaires, Cholécytites aiguës et chroniques, Atonie de la vésicule, Hépatisme, Congestions actives et passives du foie, Constipation chronique et ses complications.

Posologie. — 2 à 3 cuillerées à café le matin à jeun purs ou dans un peu d'eau. *Enfants* : 1/2 doses.

Prix : 16 francs.

Laboratoires Robert COLAS

133, rue Lecourbe — PARIS.

Tél. : Vaugirard 48-10.

CHOLÉOPEPTINE

Le plus actif des Cholagogues.

Présentation. — Granulé soluble.

Composition. — Salicylate de soude, Peptone, Sulfate de Magnésie, Urotropine et Charbon activé.

Propriétés. — Augmente de plus de 50 p. 100 la sécrétion biliaire, facilite la dissolution des calculs vésiculaires.

Indications. — Lithiase biliaire, Congestion hépatique, Rétention, Ictère, Herpès, Migraines rebelles, Urticaires, Nausées, Asthénie d'origine hépatique. Utilisé avec succès dans le Zona.

Aucune contre-indication. Pas d'intolérance.

Posologie :

Adultes : 2 cuillerées à café le matin à jeun dans 1/2 verre d'eau ; 10 jours par mois.

Dans le Zona, faire prendre en plus une cuillerée à café après les repas de midi et du soir.

Enfants : De 1/2 à 1 cuillerée à café, le matin à jeun.

Prix : 16 fr. 50.

Laboratoires MARCEL LOGEAI

24, rue des Plantes et 1, rue Bénard — PARIS (XIV^e). Tél. : Suffren 03-38

CHOLÉPAN LONGUET

Synergie pancréatique, hépatique, biliaire et duodénale.

Diabète, atonie intestinale, insuffisance hépato-pancréatique.

Comprimés glutinisés et dragéifiés d'extraits de pancréas, foie, duodénum et bile.

2 à 4 comprimés au milieu de chaque repas.

Le flacon : 13 francs.

Laboratoires LONGUET

34, rue Sedaine — PARIS

CHOLÉRÈNE (comprimés)

Médication cholagogue.

Drainage des voies biliaires

Solubilisation du Cholestérol de la bile.

Formule. — 1 comprimé *glutinisé* contient :

| | |
|--|------|
| Extrait de boldo | 0,01 |
| Extrait de Romarin..... | 0,02 |
| Extrait d'Artichaut | 0,02 |
| Bile dépigmentée et décholestérinée..... | 0,05 |
| Oléate de soude | 0,20 |

Indications thérapeutiques. — Insuffisance hépatique. Ictère catarrhal. Etats congestifs du foie. Coliques hépatiques. *Lithiase biliaire.*

Posologie. — De 4 à 6 comprimés par jour avant les repas.

La boîte de 45 comprimés : 16 francs.

Laboratoire MARCEAU

7, avenue Marceau — PARIS (XVI^e).

A. GRIGAUT et A. BOUTROUX, pharmaciens
Chefs de Laboratoire à la Faculté de Médecine.

CHOLERGINE

Médication Antitoxique, Colloïdes et Lipoïdes.

Principes définis du foie et de la bile de taureau dissous dans l'huile végétale.

Soc. de Thérapeutique (1911-1912). — Académie de Médecine (1911). — Soc. Inter. de la Tuberculose (1911). — Académie des Sciences (1912). — Soc. de Biologie (1911). — Congrès de l'Ass. Fr. p^r l'Av. des Sciences (1911). — Soc. de Pathologie Comparée (1913-1914), etc...

Deux formules : cholergine simple, cholergine camphrée.

Forme. — Ampoules injectables de 2 cc.

Posologie et mode d'emploi. — Une injection tous les 2 jours, chaque série comprenant 20 à 30 injections avec arrêt de quelques jours entre chaque dizaine.

Injection intramusculaire profonde, aux points d'élection. Injecter lentement.

Propriétés. — Antitoxique, antibacillaire et dynamogénique. — Tuberculose, Insuffisance hépatique, Convalescence des maladies infectieuses.

Préparation sans similaires employée journellement dans les hôpitaux.

Prix. La boîte de 10 ampoules : 20 francs.

Admis aux Assurances Sociales.

Laboratoires A. DANIEL-BRUNET

62, boulevard Jean-Jaurès — BOULOGNE-SUR-SEINE

Tél. : Auteuil 11-86. (Paris-Ouest.)

CHOPHYTOL-ROSA

Cristallisé INJECTABLE.

La médication héroïque (préventive et curative) de la Rétention Azotée, de la Polysclérose et de l'Oligurie, à base du principe cristallisé de Cynara (carduacées) isolé par G. EDGARD- ROSA en juillet 1933.

Forme et Composition. — *Ampoules injectables* de 5 cc., contenant, chacune 0 gr. 10 de principe actif.

Boîte de 6 et 12 ampoules permettant de réaliser un traitement de 6, 12, 18, 24 injections successives suivant le cas.

Indications. — Azotémie « d'alarme », Constante d'Ambard élevée
Dysfonction uréogénique médicale ou chirurgicale, Albuminurie, etc.

2° Surcharge cholestérinique des tissus, Athérome, Polysclérose et Hypertension (artérielles, oculaires, etc.) etc..

3° Oliguries diverses : Néphritiques aigus et chroniques, Brightiques, Cardio-rénaux, Grippés, Hépatiques, Pneumoniques, Rhumatisants, Arthritiques, Œdémateux, Intoxiqués et tous états infectieux, etc.

4° Toutes les affections en général qui touchent directement ou indirectement l'arbre hépato-rénal. (*complément de la cure hydrominérale*)—

Posologie et mode d'emploi. — Traitement de 12 injections en moyenne (intraveineuses intramusculaires, ou hypodermiques, ordre décroissant de rapidité d'action), à raison d'une piqûre tous les jours ou tous les deux jours. Cure intercalaire *per os* de dragées de CHOPHYTOL ou de CYNUROL.

N. B. — Les premières injections s'accompagnent souvent d'une légère élévation du taux de l'urée sanguine, correspondant à la décharge azotée. En même temps la diurèse augmente progressivement ainsi que le taux de l'urée urinaire ; ce qui amène rapidement la chute de la Constante Uréosecrétoire, chute de plus de 10 points, parfois. De même pour la cholestérine, le taux peut s'en élever dans le sang par une véritable mobilisation de ce corps qui est éliminé par la suite. Ces deux particularités ne sont en aucune façon une contre-indication à la continuation de la Cure, au contraire. Lorsque la rétention tissulaire est faible et que le taux de l'urée et de la cholestérine du sérum est élevé, le Chophytol en assure l'élimination ; la décharge azotée et cholestérinique est alors plus tardive.

Injections indolores et bien tolérées surtout par voie intraveineuse ou intramusculaire profonde. Légère sensibilité par voie hypodermique.

S'abstenir dans les cas de lésions rénales bacillaires, spécifiques ou cancéreuses, dans l'hyperazotémie franche progressive en période terminale et dans les cas d'obstructions lithiasiques.

Références scientifiques. — *Nouvelles Thérapeutiques*, — *Gazette des hôpitaux*, — *Société de Thérapeut* — *Echos de la Médecine* — *Courrier médical*, — *Siècle médical*, — *Société médicale des Hôpitaux* ; — *Presse médicale* ; — *Vichy médical* ; — etc., etc.

ROSA 1, place. Porte-Champerret — PARIS (XVII^e).

Tél. : Carnot 67-75.

• CHOPHYTOL-ROSA

(Dragées.)

Cholérétique, Tonique du Foie et Puissant Diurétique.
à base d'extrait de feuilles d'artichaut (Cynara Scolymus).

Communications à plusieurs Sociétés médicales.

Forme. — Dragées inaltérables et très assimilables.

Composition. — Chaque dragée contient uniquement 0 gr. 20 d'extrait sec de suc épuré de feuilles d'artichaut s. l. f. G. Edgard-Rosa.

Indications. — Toutes insuffisances hépatiques et biliaires et leurs nombreuses conséquences :

- a. *Troubles de l'excrétion biliaire* : Ictère, Cholécystite, Lithiase, Cholémie, Coliques hépatiques, etc.
- b. *Troubles d'origine hépatique* : Cirrhose, Urticaire, Maladies de la peau, Maladies de la nutrition, Urémie, Hypertension, Vertiges, Polysclérose, Oligurie, etc.
- c. *Troubles lésant toujours le Foie* : Grippe, Fièvres infectieuses, Maladies des pays chauds, etc.
- d. Et tous les cas où il faut réaliser une action cholérétique, tonique, hépatique ou diurétique (complément de la cure hydro-minérale).

Posologie. — De 6 à 12 dragées par jour, aux repas. Cure de 10 à 20 jours par mois. Peut s'administrer chez les enfants (1/4 ou 1/2 dose).

Prix : 16 francs le flacon de 60 dragées.

Laboratoire ROSA

1, place Porte-Champerret — PARIS (XVII^e).

CHRYSEMINE

(Pyréthrines Carteret).

Propriétés thérapeutiques. — Vermicide et anthelminthique, sans aucune toxicité ou contre-indication.

Indications. — Employée dans tous les cas de parasites bien définis (oxyures, ascaris, ténias, trichocéphales, lamblias, amibes, etc.), elle est également indiquée dans le traitement d'affections qu'on soupçonne être d'origine parasitaire : diarrhée à cause ignorée, entérites et colites à oxyures, colibacillose et colibacillurie, occlusions intestinales à lombrics, troubles et accidents nerveux dus aux toxines vermineuses.

Formes. — Gouttes (*enfants*). Perles glutinisées (*adultes*).

Administration. — Les perles s'absorbent les unes après les autres dans une gorgée de liquide. Les gouttes se prennent dans de l'eau sucrée ou édulcorée par du sirop de fruits, des confitures, etc.

Posologie. — *Ascaris, Trichocéphales, tous Helminthes, Amibes, Lamblias, tous Protozoaires.* — *Adultes* : 5 perles. *Enfants* : L à CL gouttes suivant l'âge. Ces doses sont à prendre le matin à jeun pendant 5 jours consécutifs. La même cure est à renouveler après un repos de 2 semaines.

Oxyures. — *Adultes* : 5 perles. *Enfants* : L à CL gouttes, suivant l'âge. (XL gouttes par an, augmenter progressivement à raison de X gouttes par année d'âge). A prendre le matin à jeun pendant 5 jours consécutifs. Le soir, au moment des démangeaisons anales, administrer un petit lavement (200 cc.) d'eau bouillie presque froide dans laquelle seront comptées C gouttes de Chrysémine. Le traitement est à renouveler plusieurs fois à 8 jours d'intervalle.

Ténias. — *Adultes* : 12 perles. *Enfants* : CC à CCC gouttes, à prendre le matin à jeun pendant 2 jours consécutifs. Supprimer le repas du soir le jour qui précède la cure et réduire le régime alimentaire les 2 jours suivants. Administrer une purgation légère (huileuse ou saline) le dernier jour. 2 heures après la dernière dose.

Remarque importante. — Les doses mentionnées peuvent être largement dépassées sans inconvénient, si le résultat de la première cure n'a pas été suffisant.

Prix de vente au public : *Perles* : 20 fr. *Gouttes PM* : 12 fr. *GM* : 20 fr.

Laboratoires CARTERET

15, rue d'Argenteuil — PARIS (1^{er}).

CIBALGINE

Analgésique calmant.

Diallylmalonylurée-diméthylaminophényl
diméthyl-pyrazolone.

Calmant du système nerveux. Analgésique et sédatif, sans opium, sans aucune substance du tableau B. Atténue ou fait disparaître toute sensation douloureuse.

Indications. — Toutes les algies : Migraine, Névralgies, Courbature, Torticolis, Sciaticques, Douleurs dentaires, Angines, Otites, Mastoïdites, Sinusites, etc. Très efficace aussi dans les douleurs dysménorrhéiques.

Comprimés — Gouttes — Ampoules

Doses. — 1 à 4 comprimés par 24 heures. — XX à LX gouttes par 24 heures. — 1 à 2 ampoules par 24 heures.

Le flacon de 15 comprimés : 9 francs.

Le flacon (gouttes) : 13 francs.

La boîte de 5 ampoules : 13 francs.

La boîte de 20 ampoules : 40 francs.

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND

109-113, boulevard de la Part-Dieu — LYON.

CIMARSENYL

Nouveau complexe organo-arsenical à noyau cinnamique. Teneur en As : 24 p. 100. Le plus actif et le moins toxique des arsenicaux. Traitement mixte spécialement étudié et de conception entièrement nouvelle. Granules pour la voie buccale et ampoules pour injections intramusculaires.

Indications. — Tuberculose pulmonaire, osseuse, ganglionnaire, etc. Prétuberculose, Anémie profonde, Asthénie, Adénopathies trachéo-bronchiques, Convalescences, Etats pré- et post-opératoires. Toutes cicatrisations et Dermatoses rebelles.

Posologie.

Adultes : 4 granules par jour et 1 injection de 1 à 2 cc. tous les 2 jours.

De 3 à 5 ans : 1 granule par jour et 1 injection de 1/4 cc. tous les 2 jours.

De 5 à 8 ans : 2 granules par jour et 1 injection de 1/2 cc. tous les 2 jours.

De 8 à 12 ans : 3 granules par jour et 1 injection de 1/2 cc. tous les 2 jours.

Les granules se prennent au milieu du repas.

Les injections se font dans la région fessière.

Prix :

Boîte de 60 granules..... 14 fr.

Boîte de 12 ampoules 1 cc..... 20 fr.

Echantillons, références médicales et tous renseignements :

Laboratoires du CIMARSENYL

68, avenue de Normandie — COLOMBES (Seine).

CIMATRYL

Composition. — Saccharose, Jaborandi, Prêle, Acide borique, Borate de soude.

Propriétés. — Action remarquable sur les plaies atones, grâce au pouvoir osmotique considérable du saccharose qui provoque une diapédèse favorable à la réparation des tissus ; celle-ci est aidée par la silice, le Jaborandi favorisant lui-même leur action grâce à son pouvoir vaso-dilatateur périphérique.

Indications. — Affections aiguës et chroniques des fosses nasales, polypes récidivants, rhinites atrophiques, etc.

Formes. — Poudre impalpable en prises, 5 à 6 fois par jour.

Prix : 12 fr. 50.

Laboratoire du **CIMATRYL**

M. LE BONZEC

4, place Royale — NANTES.

CINALOSE

Présentation. — Boîte de 10 ampoules injectables de 3 cc.

Composition. — Chaque ampoule contient :

| | |
|---|-----------|
| Cinnamate de Benzyle..... | 0 gr. 03 |
| Lécithine..... | 0 gr. 10 |
| Cholestérine..... | 0 gr. 04 |
| Lipoïdes spléniques..... | 0 gr. 007 |
| Lipoïdes hépatiques..... | 0 gr. 007 |
| Camphre..... | 0 gr. 09 |
| Huile d'olive stérilisée lavée à l'alcool.. | 3 cc. |

Propriétés thérapeutiques. — Modificateur du terrain, augmentation du processus de défense antibacillaire de l'organisme. Immunisation et vaccination artificielles para-spécifiques vis-à-vis du bacille de Koch.

Indications. — Tuberculose pulmonaire et osseuse, Adénopathies, Convalescences des Affections anergisantes, Lupus. Affections pulmonaires : Broncho-pneumonies, Bronchite chronique, Asthme, Emphyseme, Pleurésies, Péritonites Lacillaires.

Posologie. — *Adultes* : 1 à 3 ampoules par jour en injections intramusculaires indolores. — *Enfants* : 1 par jour.

Prix : 22 francs.

Laboratoires du Docteur **LAVERNIER**

32, rue de l'Ouest — PARIS.

Tél. : Ségur 08-13.

CINEYL

Médicament de défense antibacillaire,
Affections pulmonaires chroniques,
Bronchites récidivantes, Toux, Grippe.

Présentation. — Comprimés.

Posologie. — 3 à 6 comprimés par jour.

Prix : 12 francs.

Laboratoires GRYSA

7, rue Saint-André — LE MANS.

CINNOZYL

Composition. — Solution huileuse de :

| | |
|----------------------------|--------|
| Cinnamate de benzyle | 0. 05 |
| Cholestérine | 0. 10 |
| Camphre | 0. 125 |
| Huile d'olives pure | 5. cc. |

Pour une ampoule.

Propriétés. — Par les actions biochimiques de la cholestérine, du camphre, du cinnamate de benzyle, augmente la cholestérolémie et la résistance à l'infection tuberculeuse.

Indications. — *Tuberculose pulmonaire* dans toutes ses formes cliniques. Adjuvant précieux à la cure de pneumothorax artificiel. *Tuberculoses extra-pulmonaires* : Adénites tuberculeuses, tuberculoses osseuses, génito-urinaires, péritonéales, cutaneo-muqueuses. *Fistules tuberculeuses*. *Retartuberculose*, cure préventive chez les prédisposés. Enfants lymphatiques, scrofuleux, malade asthénisés, affaiblis, anémisés, en état d'anergie. *Convalescence* des maladies infectieuses et infections graves.

Posologie. — Injections sous-cutanées ou intramusculaires indolores sans aucune réaction.

Adultes : 5 à 10 cc. par jour, cures de 20 à 25 injections. Repos de 10 à 15 jours, puis reprise du traitement.

Enfants : Jusqu'à 4 ans : 1 à 2 cc. chaque jour, en augmentant progressivement les doses.

De 4 à 12 ans : Dose moitié moindre que celle de l'adulte.

Au-dessus de 15 ans : Mêmes doses, même technique que pour l'adulte.

Laboratoires CLIN, COMAR et Cie

20, rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS

CIPROMAROL

Composition. — Cupressus semperv. Equisetum Arvense. Capsella Bursæ Pastoris. Æsculus Hippocastanum. Hamamelis V.

Indications. — Toutes affections caractérisées par une dilatation temporaire ou permanente des veines.

Mode d'emploi. — L à LXXV gouttes et plus par jour, ou 2 à 3 mesures. La mesure en aluminium jointe au flacon contient XXV gouttes.

Prix : 11 fr. 95.

LANDRIN et C^{ie}

12, rue de la République
PUTEAUX (Seine).

CITRALIN

Granulé entièrement soluble.

Composition :

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Citrate de soude trisodique.. | 21 gr. 40 |
| Sulfate de magnésie..... | 18 gr. 60 |
| Boldine | 0 gr. 004 |
| Excipient..... Q. S. pour | 100 gr. |

Propriétés thérapeutiques. — Antivisqueux, anticoagulant, cholagogue laxatif, excitant de la sécrétion hépatique.

Indications. — Gastralgie, Dyspepsie, Insuffisance hépatique, Etats lithiasiques, Diathèse arthritique, Goutte, Diabète, Régulateur vasculaire, Etats pléthoriques, Pneumonie.

Forme et mode d'emploi. — Granulé : 1 à 3 cuillerées à café dans un demi-verre d'eau le matin à jeun ou 1 cuillerée à café avant chacun des trois repas.

Prix : 14 francs.

Laboratoire de l'IODARSENIC GUIRAUD

10, impasse Milord — PARIS (XVIII^e).

CITROCARBINE

Antisepsie digestive.

Composition. — Granulé fondant de goût agréable, répandant à la formule :

Citrate acide de soude.. 10 Charbon animal.. 90

Action. — Eupeptique, cholagogue par le citrate de soude, fixateur, antifermentescible par le charbon.

Avantages. — Stabilité du citrate acide non détruit dans l'estomac comme le citrate alcalin. Hyperactivité du charbon animal plus fin que le charbon végétal. Action constipante du charbon corrigée par le citrate.

Indications. — Dyspepsies, Aérophagie, Insuffisance et infections biliaires, Entérites aiguës et chroniques, Diarrhées, Fermentations intestinales, Auto-intoxication, Artério-sclérose.

Mode d'emploi. — 1 à 2 cuillerées à café à la fin des repas, à croquer ou à délayer dans un peu d'eau.

Se fait aussi en comprimés.

Prix : 15 francs.

Laboratoires WARIN

4, Chaussée de la Muette — PARIS (XVI^e).

CITROFLUYL

Citrate monosodique pur.

Forme. — Granulés à saveur agréable.

Une cuillerée à café contient 0 gr. 50 de citrate monosodique-comprimés pour diabétiques à 0 gr. 50 de citrate monosodique pur.

Dose. — Par jour, 2 à 6 cuillerées ou comprimés dissous, avant ou entre les repas, selon l'avis du médecin et l'effet désiré.

Indications. — Hypertension artérielle, Insuffisance hépatique, Rhumatismes, Goutte, Dyspepsies, Gastrites, Vomissements, Congestions pulmonaires.

Prix : 15 francs.

Laboratoires G. WARIN

4, Chaussée de la Muette — PARIS (XVI^e).

CITROLARGOL

Argent sol et Citrate de Soude.

Action. — L'argent stérilise la muqueuse détergée par le Citrate de soude.

Indications. — Toutes les affections du Rhino-pharynx, Rhinites, Sinusites, Laryngites, Grippe, Coryza.

Mode d'emploi. — IV à V gouttes dans chaque narine matin et soir. Badigeonnage. Pulvérisation

Prix : 12 francs.

BESINS et C^{ie}, Pharmaciens.

5, rue Bourg-l'Abbé — PARIS (III^e).

CITROPAÏNE DU Dr FONTAL

Composition :

Phosphocitrate manganoso-sodique associé à un ferment végétal (ext. de caribéa papaya).

Propriétés :

Eupeptique, Cholagogue, anti-acide, décongestive, régulatrice des fonctions digestives et circulatoires.

Indications :

Dyspepsies, hyperchlorhydrie, gastro-entérites, vomissements, mauvaises circulations, congestions veineuses, maladies d'estomac, foie, intestin.

Forme et Posologie :

| | | |
|--|---|--------|
| Granulé : de 3 à 6 cuillerées à café par jour. | } | 14 fr. |
| Comprimés : de 6 à 9 par jour. | | |
| Cachets : de 2 à 3 par jour. | | |

Enfants 1/2 ou 1/4 des doses.

Laboratoires JIOEM

304, rue Saint-Jacques — PARIS (V^e).

CITROPHOS

Granulé. — 2 formes : simple et belladonné. Une cuillerée à café contient 1 gramme de Citrate trisodique pur associé aux : Phosphate disodique, Sel de Seignette et Lactose.

Le CITROPHOS belladonné contient en plus V gouttes de teinture de belladone titrée.

Indications. — *Simple* : Hypertension, Viscosité sanguine, Insuffisance hépatique, Dyspepsies, Gastrites, Vomissements, *Belladonné* : Hyperchlorhydrie, Constipation spasmodique,

Doses. — 1 à 4 cuillerées à café par jour dans une tasse à thé d'eau tiède.

Le flacon (simple ou belladonné) : 15 fr.

Laboratoires H. NOE

SAINT-AMAND-LES-EAUX (Nord).

CITROSODINE LONGUET

Réalise la médication citratée sous 2 formes :

Comprimés à 0 gr. 25.

Granulé à 1 gr. de citrate par cuillerée à café.

Vomissements des nourissons (1 comprimé par biberon), et des femmes enceintes (4 à 6 comprimés 3 ou 4 fois par jour).

Hypérazidité gastrique et dyspepsie : 3 ou 4 comprimés ou 1 cuillerée à café de granulé 2 ou 3 fois par jour.

Hypercoagulabilité sanguine : Etats pléthoriques. Stases veineuses. Phlébites. Thromboses, Pneumonies. 4 à 8 comprimés ou 1 à 2 cuillerées à café, granulé 4 à 8 fois par jour suivant indications.

Le flacon de comprimés : 13 francs.

Le flacon de granulé : 14 francs.

Laboratoires LONGUET

34, rue Sedaine — PARIS (XI^e).

CLEAROL

Pour bains d'œil.

Composition. — Hydrolat d'Hamamélis boro-salicylé adréphédriné (sans caustique).

Propriétés. — Antiseptique, Calmant, Décongestionnant et tonique des conjonctives et des paupières.

Indications. — 1° *Toutes inflammations et infections oculaires externes, Conjonctivites, Blépharites, Dacryocystites, Orgelets, Kératites, etc.*

2° *Tous états inflammatoires professionnels* (cinéastes et personnes exposées à des radiations lumineuses intenses ou prolongées).

3° *Hygiène oculaire, Prophylaxie des poches palpébrales, Conservation de la blancheur de la sclérotique, de l'éclat et de la pureté du regard.*

Mode d'emploi. — Étendre le *Clearol* d'un ou deux volumes d'eau chaude. En remplir l'ocillère qui accompagne chaque flacon et y baigner l'œil pendant quelques minutes.

Les bains d'œil au *Clearol* calment, décongestionnent et soulagent toujours.

Formuler : *Clearol*, un flacon.

Prix : 9 francs et 15 francs.

ROGER, pharmacien

194, rue de Rivoli — PARIS

CLISÉMINE LONGUET

Médication citratée injectable.

Indications. — **HÉMORRAGIES.**

Cancers (M. Renaud).

Tuberculose, Hémoptysies.

Gynécologie.

Interventions chirurgicales (Neuhof et Hirschfeld).

Ampoules de 20 cc. de solution stabilisée renfermant 30 p. 100 de citrate de soude et 10 p. 100 de chlorure de magnésium.

Dose et mode d'emploi. — Injection intraveineuse de 15 à 30 cc. (20 cc. en moyenne), selon le poids du sujet.

Enfants : Injection intraveineuse de 10 cc.

La boîte de 2 ampoules de 20 cc. : 20 fr.

Laboratoires LONGUET

34, rue Sedaine — PARIS (XI^e).

CLONAZONE DAUFRESNE

Antiseptique organique chloré
non toxique.

(Méthode de Carrel.)

Composition. — Chloramine sodique du toluène en poudre cristalline ou comprimés dosés à 0 gr. 25.

Indications. — Gynécologie et obstétrique, urologie, angines, petite et grande chirurgie.

Posologie. — *Usages médicaux* : 1 à 5 comprimés par litre d'eau pour gargarismes, lavages de gorge et du nez, irrigations vaginales.

Usages chirurgicaux : 5 à 10 comprimés par litre d'eau, pour pansements humides, tamponnements, irrigation des plaies suivant la technique de Carrel.

La solution à 10 comprimés est d'un emploi et d'une action identiques à ceux de la solution de Dakin.

Stérilisation instantanée de l'eau sans ébullition : 1 comprimé par litre.

Avantages. — Action antiseptique puissante et rapide, sans phénomènes d'irritation.

Deux formes :

Comprimés : tubes de 20 à 60 comprimés à 0 gr. 25.

Poudre : tubes de 20 gr. avec cuiller-mesure correspondant à 0 gr. 25 comme les comprimés.

Prix : 3 fr. 80 et 10 fr.

Conditionnements vrac pour cliniques et hôpitaux.

Echantillons médicaux sur demande :

**LABORATOIRE DES ANTISEPTIQUES
CHLORÉS**

42 rue Thiers — LE HAVRE.

CLUPEYL

Reconstituant général sans équivalent ni similaire

Forme. — Comprimés dragéifiés faciles à avaler.

Composition. — Poudre intégrale de laitances de harengs, fraîches, desséchées dans le vide et à froid.

Propriétés thérapeutiques. — Par sa richesse en phosphore organique (acide nucléinique, lécithine, cérébrine), le Clupeyl est un reconstituant général de tout premier ordre et un excellent stimulant du système nerveux, sur lequel il agit sans le surexciter. C'est l'aliment phosphoré par excellence.

Indications. — Anorexie, Amaigrissement, Surmenage physique et intellectuel, Neurasthénie, Asthénie post-grippale, Tuberculose, Rachitisme et toutes adynamies et débilités.

Posologie. — *Adultes* : 6 à 8 comprimés par jour.

Enfants : à partir de 7 ans, 3 à 4. A prendre aux repas. Avaler sans croquer ni sucer.

Prix : 16 francs.

Lab^{re} du CLUPEYL — Pharmacie PANIER
MALO-LES-BAINS (Nord).

COAGULÈNE CIBA

Hémostatique physiologique.

(Extrait de plaquettes sanguines.)

Permet de juguler les hémorragies, même inaccessibles, en provoquant une accélération de la coagulation du sang total. Chez les hémophiles et dans les diathèses hémorragipares, il corrige la crase sanguine et restitue la faculté de coagulation en cas de traumatisme ou d'intervention chirurgicale.

Indications. — Hémophilie, diathèses hémorragipares, Métrorragies, Hémoptysies, Purpura, etc. et toutes interventions sanglantes.

Voie buccale : 100 à 200 cc. de solution à 2 1/2 p. 100 prise par cuillerée à soupe.

Le flacon de 5 gr. poudre : 25 francs.

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND

109-113, boulevard de la Part-Dieu — LYON.

COALTAR SAPONINÉ LE BEUF

Forme. — Emulsion de Coaltar.

Propriétés. — Antiseptique, Cicatrisant, Désinfectant.

Indications. — Hygiène de la bouche, pansement des brûlures, furoncles, anthrax, plaies, traitement de la leucorrhée.

Dose. — *Leucorrhée* : 1 cuillère à soupe par litre d'eau.

Pansement : Parties égales eau et Coaltar Saponiné

Prix : 8 francs.

Laboratoires LE PÉRDRIEL

11, rue Milton — PARIS (IX^e).

COALT-DERMA

Composition. — Goudroliné, stovaine, oxyde de zinc, excipient.

Indications. — Traitement de l'Eczéma. Toutes les indications du goudron et de la goudroliné.

Avantages. — Seule pommade à la goudroliné dont elle conserve l'efficacité. Soulage immédiatement les démangeaisons.

Mode d'emploi. — Appliquer par onctions. Ne jamais utiliser l'eau pour l'enlever, mais une huile végétale. En règle générale, éviter le contact de l'eau.

Présentation et prix. — Pot et tube : 8 fr. 50.

Laboratoires RAIMBALDI

30, boulevard Raimbaldi — NICE

COCAÏNE MIDY

(Chloroborates.)

Chaque pastille contient :

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Stovaïne | 0 gr. 001 |
| Chlorhydrate de cocaïne | 0 gr. 001 |
| Biborate de soude..... | 0 gr. 025 |
| Chlorate de potasse..... | 0 gr. 075 |

Doses et mode d'emploi. — Laisser fondre dans la bouche 10 à 12 pastilles par jour, 4 à 8 aux enfants selon l'âge.

Propriétés thérapeutiques. — Anesthésique local, antiseptique modificateur.

Indications. — Affections de la bouche, gorge, larynx : Pharyngites, Laryngites aiguës et chroniques, Granulations, Angines, Amygdalites, Toux nerveuses, Picotements et Chatouillements de la gorge (avocats, chanteurs, orateurs, prédicateurs, professeurs).

Prix : 10 francs.

Laboratoires MIDY

67, avenue de Wagram — PARIS (XVII^e).

CODÉPHRYL

Traitement des affections des voies respiratoires.

A base de : Terpène, Bromhydrate de codéine, Baume du Pérou, Chlorure d'ammonium, Emétine, Chlorhydrate d'Ephédrine, Seigle ergoté.

Propriétés. — Fluidifiant et expectorant par la Terpène, le Benzoate de soude, l'Emétine, l'Ergot du seigle. Calmant par le Bromhydrate de codéine. Antiseptique par le Baume du Pérou et le Chlorure d'ammonium.

Vagotonique par le Chlorhydrate d'Ephédrine.

Indications. — Toux, Bronchites, Asthme et toutes affections des voies respiratoires.

Posologie :

Toux, bronchites sèches : 2 à 6 comprimés par jour.

Toux avec expectorations : 4 à 8 comprimés par jour.

Echantillon sur demande.

Le tube de 30 dragées : 15 francs.

Laboratoire de L'ÉDISTOL

H. DUFOUR, pharmacien de 1^{re} classe

Ancien interne des hôpitaux de Paris

40, rue des Carmes — ORLEANS (Loiret).

CODÉRAX

Composition. — Chaque comprimé renferme :
Codéine, 2 centigr. Terpène et Sucs résineux pulvérisés de Styrax Benzoin, aa 0,10.

Forme. — Comprimés pouvant être absorbés par les diabétiques; conservation indéfinie.

Indications. — Sédatif des toux les plus rebelles : toux d'irritation, spasmodiques, quinteuses, nerveuses, toux des fumeurs, laryngites, trachéites, bronchites.

Insomnies : 2 comprimés au coucher.

Maladies d'estomac : 1 comprimé après le repas contre la gastralgie.

Mode d'emploi. — Avaler sans sucer ni croquer.

Dose. — 6 comprimés par 24 heures au maximum.

Prix : 11 francs.

Laboratoire COIRIER

69, avenue du Maine — PARIS (XIV^e).

CODOBROMYL

Forme. — Comprimés dragéifiés.

Composition. — Chaque comprimé contient :

Codéine, 0,01 ; *Bromoforme*, 1 goutte ; *Thiocol*, 0,10 ;
Caféine, 0,03 ; *Benzoate de soude*, 0,08 ; *Terpène*,
0,08 ; *Sunoxol*, 0,01 ; *Extraits d'aconit*, 0,005 ;
de *Grindélia*, 0,005 ; d'*Ail*, 0,02 ; de *Sauge*, 0,005.

Propriétés thérapeutiques. — Sédatif des toux spasmodiques et rebelles. Antiseptique de l'appareil pulmonaire. Sans irritation gastrique.

Indications. — *Bronchites aiguës et chroniques*, Gripes, Trachéites, Toux sèches et rebelles, Toux des tuberculeux, Toutes affections de l'appareil respiratoire.

Mode d'emploi. — Avaler les comprimés à l'aide d'un peu d'eau, de tisane ou de lait, de préférence avant les repas.

Adultes : 5 comprimés par 24 heures.

Enfants au-dessus de 10 ans : 2 à 3 comprimés.

Prix : 10 fr. 50.

Laboratoires SAUBA

MONTREUIL (Seine).

CODOCOL

Calmant de la Toux

Composition. — Association de Thiophenolate de Codéine, Cinnamate de soude, Soufre assimilable, sous forme de comprimés.

Action thérapeutique. — Antiseptise l'appareil pulmonaire. Fluidifie la sécrétion bronchique. Facilite l'expectoration. Diminue l'excitabilité du centre tussigène. Active la défense de l'organisme.

Avantages. — Médication à la fois causale et symptomatique, forme comprimés pratique, suppression du goût désagréable du Gaïacol.

Indications. — Trachéites, Bronchites aiguës et chroniques, grippe, prétuberculose et tuberculose, et toutes les affections de l'appareil respiratoire.

Mode d'emploi. — 4 à 8 comprimés par jour.

Laboratoires COUSSINET

20, rue des Martyrs — PARIS (IX^e).

CODOFORME

Composition. — Comprimés enrobés constitués par une nouvelle combinaison bromoformique solide associée à la codéine ; se dissolvent dans l'intestin seulement où ils libèrent sans fatigue pour l'estomac une quantité rigoureusement constante de bromoforme pur.

Chaque comprimé représente : Codéine, 1 cgr. ; bromoforme, IV gouttes ; teinture d'aconit et belladone, ââ V gouttes ; terpine et benzoate de soude comme excipient.

Indications. — Spécifique des toux sèches (spasmodiques, laryngo-trachéales, post-grippales, névropathes). Sédatif remarquable de la toux des tuberculeux, assurant calme et repos sans irritation gastrique ou inappétence.

Posologie. — 5 comprimés p. j. ; 6 à 8 d. toux rebelles. Grands enf. (à partir de 5 ans) 2 à 3 compr. par 24 heures. Avaler sans sucer ni croquer.

L'étui (4 à 5 jours de traitement) Prix : 11 fr. 90.

Laboratoires BOTTU

115, rue Notre-Dame-des-Champs — PARIS (VI^e).

COLARSENOL

Collutoire inaltérable au Novarséno-benzol.

Indications :

Angines de Vincent, rouges, pultacées, lacunaires, à streptocoques, herpétiques, pseudo-membraneuses.

Diphthéries ; adjuvant du traitement par le sérum, désinfection du rhino-pharynx chez les porteurs de germes.

Pyorrhée alvéolo-dentaire, stomatites et gingivites.

Mode d'emploi. — En applications sur les amygdales ou les gencives. En gargarismes.

Prix : 15 francs.

Echantillons et littérature :

Laboratoires René CARLIER
SAINT-FLORENTIN (Yonne).

COLCHI-SAL

(Colchicine-Ess. de Wintergreen.)

Chaque capsule contient :

1/4 de mgr. colchicine pure dissoute dans 0 gr. 20 salicylate de Méthyle naturel (Ess. de Wintergreen) obtenu par fermentation et distillation et équivalent à 0 gr. 25, salicylate de Soude.

Dose. — 4 à 16 capsules par jour par prises fractionnées.

Propriétés thérapeutiques de l'Ess. de Wintergreen.

1° Augmente l'élimination de l'acide urique et des autres éléments solides de l'urine ; 2° Calme la douleur ; 3° Liquefie et augmente la sécrétion biliaire ; 4° Légèrement diurétique ; 5° Diaphorétique ; 6° Diminue la fièvre ; 7° Combat la congestion et facilite la résolution des inflammations (G. Sée) ; 8° Action antiseptique sur le sang.

Propriétés thérapeutiques de la Colchicine.

1° Diminue la production d'acide urique ; 2° Augmente rapidement l'élimination de tous les produits brûlés et pousse à l'oxydation ; 3° Soulage la douleur ; 4° Augmente la sécrétion biliaire ; 5° Légèrement diurétique ; 6° Diaphorétique ; 7° Purgatif.

Prix : 20 francs.

Laboratoires MIDY

67, avenue de Wagram — PARIS (XVII°).

COLISEL

Composition. — Charbon animal et végétal ; chlorure de magnésium ; carbonate de chaux ; poudre titrée de Belladone.

Présentation. — Poudre, Granulé.

Propriétés. — Traitement actif des affections de l'intestin. Par son pouvoir absorbant et neutralisant supprime les fermentations et l'action nocive des toxines.

Indications. — Sédatif antispasmodique de choix, entérites et surtout entérocolites aiguës ou chroniques, associées ou non à d'autres maladies du tube digestif (gastro-entérite, appendicite chronique, cholécystites) ou à des affections des voies urinaires (syndrome entérorénal, pyélonéphrites à colibacilles).

Posologie. — 1 cuillerée à café matin, midi et soir après les repas dans un peu d'eau.

Prix : 14 francs.

Laboratoires J. LAROZE

54, rue de Paris — CHARENTON.

COLITIQUE

Vaccin curatif anti-colibacillaire

Adopté par les Hôpitaux de Paris
et par le Ministère des Colonies.

Indications. — Toutes les manifestations du syndrome provoqué par le colibacille.

Double action par son émulsion microbienne et par son principe lysant.

Formes : Buccale, *la plus active*. Une ampoule le matin à jeun dans un peu de liquide non sucré. — Injectable (10 ampoules de 1 cc.). — Filtrat, pour applications locales (6 ampoules de 3 cc.).

Prix : 10 ampoules 25 fr. ; 5 ampoules 13 francs.

Pour cliniques et hôpitaux : boîte de 50 ampoules.

Laboratoires du Dr P. ASTIER

41, 42, 43 à 47, rue du Docteur-Blanche — PARIS.

COLI-VACLYDUN

Lysats vaccins du Docteur Duchon.

2 formes : Injectable, buvable.

Composition. — Lysat de Colibacilles (souches variées).

Indications. — Pyélonéphrites, Colibacilloses.

Posologie. — *Coli injectable* (ampoules de 1 cc.)

1^{re} injection : 3/4 de cc. Les suivantes : 1 cc. tous les jours, puis tous les deux jours. *Coli voie buccale* (non injectable) ampoules de 3 cc. 1^{er} jour : 1/2 ampoule dans un demi-verre d'eau sucrée ; 2^e jour : 3/4 d'ampoule ; ensuite une ampoule par jour pendant huit à dix jours.

Présentation. — 1° Coli-Vaclydun injectable en boîtes de 6 ampoules de un centicube. 2° Coli-Vaclydun buvable. — En boîtes de 10 ampoules de 3 centicubes.

Prix : 25 francs.

Laboratoire Pharmaceutique CORBIÈRE

27, rue Desrenaudes — PARIS (XVII^e).

Tél. : Carnot 78-11.

COLLOÏDINE LALEUF

Dragées.

Composition :

Extrait total pluriglandulaire associé à l'*Iodalbumine*.

Propriétés et indications thérapeutiques :

Remédie à la viciation fonctionnelle des glandes endocrines et, grâce à la présence de l'*Iodalbumine*, favorise la combustion intra-organique.

Toutes les affections dûes à une carence endocrinienne, et principalement l'obésité, sont justifiables du traitement à la *Colloïdine*.

Doses et Mode d'emploi :

De 2 à 4 dragées par jour suivant le cas, à prendre de préférence au début des repas. Les avaler en même temps qu'une gorgée d'eau.

Etui de 100 dragées : 24 francs.

Laboratoires LALEUF

51, rue Nicolo — PARIS (XVI^e).

COLLOÏDOGÉNINE du Docteur BAYLE

Opothérapie splénique intégrale.

Nature. — Extrait total de rate.

Formes. — 1° Colloïdogénine injectable (ampoules de 5 cc.). La boîte de 6 : 20 francs.

2° Colloïdogénine sirop. Le flacon : 20 francs.

3° Colloïdogénine (flacons-ampoules pour voie buccale). La boîte de 6 : 20 francs.

Indications. — *Tuberculose* (toutes localisations et formes), où elle a fait ses preuves.

Anémies, où elle est supérieure à la méthode de Whipple.

Convalescences, grossesses pénibles, amaigrissement, rachitisme, neurasthénie, déminéralisation, déficiences organiques.

Action. — Augmentation rapide des hématies (50 p. 100) et des leucocytes.

Relèvement du taux de l'hémoglobine (25 à 115 p. 100).

Progression rapide des forces et du poids.

Cicatrisation des lésions (visible à la radio), disparition des bacilles de Koch.

Emploi et doses. — Séries de 12 injections (intramusculaires dans la fesse ou sous-cutanées abdominales) en 22 jours. Après chaque série 8 jours de repos. Pendant les 22 jours de chaque série le sirop de colloïdogénine est donné en même temps (4 cuillerées à soupe par jour aux repas). Dans les anémies et les convalescences le sirop suffit.

Doses chez l'enfant. — Au-dessus de 5 ans injecter 5 cc. Au-dessous de 5 ans injecter 1 cc. par année d'âge.

Colloïdogénine sirop : 2 cuillerées à café par jour jusqu'à 3 ans, 4 jusqu'à 5 ans, 1 à 2 cuill. à soupe jusqu'à 7 ans, 2 à 3 jusqu'à 10 ans, ensuite 3 à 4.

Laboratoires OHAIX

8 et 10 rue Alphonse Bertillon (ancienne rue de l'Orne)
PARIS (XV^e)

COLLOÏL LEISYN

Adoucissant, calmant immédiat du Pyrosis, cicatrisant des ulcérations de la muqueuse stomacale. Régulateur de la sécrétion chlorhydrique, ramenant constamment à son taux normal la valeur de l'HCl, du suc gastrique.

Formuler : 1 tube comprimés **Colloïl Leisyn**.

Dans les cas assez graves, ajouter 1 boîte poudre **Colloïl Leisyn**.

Mode d'emploi :

Comprimés. Croquer 1 à 3 comprimés, en former une bouillie avec la salive, après les repas ainsi qu'au moment où la brûlure va se faire sentir, de façon à éviter qu'elle se produise et ravive l'ulcération.

Poudre. — 1 cuillerée à soupe bien pleine dans un litre d'eau pour préparer le liquide adoucissant dont on prendra un verre tiède à 11 heures du matin, à 5 heures de l'après-midi et au moment des crises violentes.

Indications : Hyperchlorhydrie, Ulcus géant, Ulcère rond, Ulcérations disséminées de la muqueuse stomacale, Cancer de l'estomac (voir *Aneo Leisyn*), Pyrosis, digestions lentes ou trop rapides, Gastro-succorrhées, Stase alimentaire, Affections gastriques nerveuses, Stricture spasmodique du pylore.

Action. — Panse et adoucit les ulcérations et les cicatrise doucement. Calme immédiatement les douleurs. Toxicité nulle.

Composition. — Ferments digestibles, Fluor, Magnésium, Liane de Condor, Saturants à proportionabilité rigoureuse de l'HCl. Exempt de Pepsine et d'alcaloïdes.

Aucune contre-indication. Innocuité absolue.

Les Laboratoires LEISYN,

1 bis, rue Molitor — PARIS (16^e).

Téléphones : Auteuil 14-73 — C. C. Postaux PARIS 1075-98.

Adresse télégraphique : Laboleisyn — PARIS.

COLLO-IODE DUBOIS

GOUTTES

Composition. — Solution titrée d'*Iodhydrates d'acides aminés* à 5 % d'iode pur.

Action. — Suractive le tissu lymphoïde (*Lortat*), stimule les glandes endocrines (*Henno*) et exalte les moyens de défense de l'organisme. La présence d'*amines* lui confère une *activité spéciale* dans certaines diathèses.

Indications. — Toutes les indications de l'iode, des iodures et leurs diverses préparations. Son champ d'activité est très étendu et s'exerce tout particulièrement dans la carence de la nutrition et des fonctions glandulaires, l'artério-sclérose et les affections du cœur, l'obésité, l'asthme, la goutte et les rhumatismes, la syphilis, l'hyperthyroïdie, la tuberculose pulmonaire à évolution lente et les bacillooses diverses (osseuses, ganglionnaires, etc.), les mycoses, les états infectieux, etc.

Mode d'emploi. — *Adultes*: de XX à C gouttes par jour suivant les cas. Il peut se prendre avant, pendant ou après les repas, mélangé à un liquide quelconque.

Enfants: de V à L gouttes par jour.

Il n'est pas désagréable à prendre et sa tolérance est parfaite même à hautes doses prolongées. Sa dissociation se fait dans l'intestin et il ne donne pas d'*iodisme*.

Prix : 15 francs.

DRAGÉES

Composition. — Chaque dragée représente 2 centigr. d'*Iode* combinés à 1 centigr. de *Caféine* et à 10 centigr. de *Théobromine* pure. Dragées à noyaux facilement dissociables et assimilables.

Indications. — Asthme, emphyseme, artério-sclérose, affections du cœur et des vaisseaux, troubles de l'hypertension, troubles vasculaires, de la ménopause, maladies infectieuses et intoxications, hydropysies, etc.

Action. — Cardio-tonique et vaso-dilatateur efficaces. Diurétique puissant et fidèle.

Mode d'emploi. — Sauf avis du médecin, la dose est de 1 à 5 dragées par jour chez les adultes, mais il reste seul juge de la médication chez les enfants et les hypertendus artériels.

Ces dragées peuvent être à volonté avalées entières, divisées en plusieurs morceaux ou même dissoutes dans un peu d'eau ou de vin, après les avoir écrasées grossièrement pour en faciliter la désagrégation.

Leur conservation est assurée par un enrobage spécial, mais nous recommandons néanmoins de tenir le flacon à l'abri de l'humidité.

Prix : 15 francs.

LABORATOIRES DUBOIS

R. Dubois, Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.
16, Boulevard Péreire — PARIS (XVII^e).

COLLUNOVAR

Collutoire au Novarsénobenzol.

Indications. — Médication préventive et curative de toutes les angines. Angine de Vincent. Affections amygdaliennes. Pyorrhée alvéolo-dentaire, Stomatites, Gingivites.

Formule :

| | |
|-------------------------|-------|
| Novarsénobenzol | 1 gr. |
| Citrate sodique | 5 gr. |
| Niéraline 1/1 000 | 0,50 |

Pour 100 cc.

Posologie. — En badigeonnage léger sur les amygdales ou sur les gencives.

En gargarisme à la dose d'une 1/2 cuillerée à café par verre d'eau tiède.

Prix : 15 francs.

Laboratoires DEXO

23, rue Danton — PARIS-LEVALLOIS

COLLUTOIRE V. E. DOUMER

Formule :

Bleu de méthylène V. E.

Doumer

1 gr.

Résorcine

0 gr. 20

Glycérine.....

30 gr.

Eau distillée

70 gr.

Indications. — Angines diverses, ulcérations bucco-pharyngées des angines, stomatites, abcès des amygdales, etc...

Laboratoires BOMEL

ANNONAY (Ardèche) — France.

COLLYRES CHIBRET

« Optima »
(Chibrocollyres)

En ampoules compte-gouttes, contenant 10 cc. de liquide, pouvant se maintenir aseptique, ne modifiant pas la tension oculaire ni l'accommodation.

Chibroargyrol, Chibrocollargol, Chibrococaïne, Chibroprotargol, Chibroargent (Azotate), Chibrobleu (spécial), Chibroatropine, Chibroatropine et Cocaïne, Chibrohomatropine, Chibronovocaïne, Chibropilocarpine, Chibropilocarpine-Adrénaline, Chibrocuivre, Chibrozinc, Chibrozinc et Novocaïne, Chibroésérine, Chibroésérine et Adrénaline, Chibrofluorescéine, Chibroborate de Soude et Adrénaline, Chibroiodure de Potassium et Chlorure de Calcium, Chibrocyanure de Mercure. Chibromercurobrome.

Renseignements thérapeutiques sur tous nos produits et échantillons, sur demande, à MM. les docteurs à Laboratoires Chibret, 5, rue St-Herem, Clermont-Ferrand (P.-de-D.), France.

(Voir à *Pommades* la liste des Produits Chibret.)

Laboratoires CHIBRET

5, rue St-Herem — CLERMONT-FERRAND
(Puy-de-Dôme) (France).
Marque déposée „ OPTIMA ”.

COLPOPHILE

(Paquets de poudre soluble).

Formule :

Cérasine, Saponine, Acide Orthoxybenzoïque, Tétraborate de Soude, Sulfate d'alumine et de Potasse, Bicarbonate de soude, Parfum, Q. S. pour 1 paquet.

Posologie :

- 1° 1 paquet pour 2 litres d'eau bouillie tiède ;
- 2° Gynécologie, Leucorrhée, Vulvite, Prurit : 2 à 3 paquets pour 2 litres d'eau ;
- 3° Obstétrique, 2 à 3 paquets pour 2 litres d'eau ;
- 4° Hygiène masculine ou Dermatologie : 1 paquet pour 1/2 ou 1 litre d'eau en compresses ou lotions.

Prix :

La boîte de 30 paquets : 18 francs.

RICHER, docteur en Pharmacie

45, faubourg Saint-Denis, 1, rue d'Enghien
PARIS.

COMITIOL

Formules. — Faible. Normale. Forte.

Chaque comprimé contient : Tartrate-borico-potassique, 0 gr. 50 + Phényl-éthyl-Malonylurée (Synonyme : Gardénal Luminal).

0 gr. 01 par comprimé, formule faible.

0 gr. 02 par comprimé, formule normale.

0 gr. 03 par comprimé, formule forte.

Indications. — EPILEPSIE, Convulsions, Parkinson, Chorée, Angor Pectoris, Angoisses.

Avantages. — Activité aussi grande que celle des hautes doses de Phényl-Ethyl-Malonylurée, sans leurs inconvénients.

Doses. — *Adultes* : 6 comprimés par jour, quelle que soit la formule employée.

Enfants : 1/3 de comprimé par année d'âge et par jour. Sous peine d'accident, ne jamais interrompre brusquement le traitement par le COMITIOL.

| Prix. | Formule faible. | Formule normale. | Formule forte. |
|--------------------|-----------------|------------------|----------------|
| Boîte de 10 jours. | 12 fr. | 16 fr. | 18 fr. |
| — 30 — | 30 — | 40 — | 50 — |

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments
sous les n^{os} 309-1, 309-2, 309-3, 309-4.

Pharmacie GRORICHARD

12, place de la Révolution — BESANÇON.

COMPOSÉ GMET

Tonique aux effets précoces et durables.

Composition. — Kola - coca - quinquina, sans addition d'alcool ni de caféine ni de strychnine.

Propriétés. — Tonique général et nerveux. Effets *immédiats* mais *durables*.

Indications. — Anémie, Neurasthénie, convalescences, suites de couches, d'opérations, fatigue, surmenage, pré tuberculose, Asthénies.

Posologie. — 1 cuillerée à café dans un peu d'eau froide avant les repas, une ou deux fois par jour. (En cas de tachycardie, ajouter une cuillerée à café de Crataegus Gmet (répulateur cardiaque).

Prix : le flacon pour 1 mois, 18 francs.

Laboratoire GMET

27, faubourg Montmartre — PARIS (IX^e).

COMPRESSIF BESLIER

Appareil perfectionné pour le maintien et la guérison de la **Hernie ombilicale** chez les enfants.

Le **Compressif Beslier** est un appareil sans caoutchouc confectionné en sparadrap Beslier très adhésif et non irritant pour l'épiderme délicat des enfants.

Le **Compressif Beslier**, très pratique parce que très simple, est d'une application très facile. Il ne se déplace pas sous l'influence des mouvements du corps et maintient continuellement la hernie refoulée.

Le **Compressif Beslier** supprime tous les inconvénients des bandages en caoutchouc.

N° 1. Bébés, la boîte de 2 : 12 francs.

N° 2. Enfants, la boîte de 2 : 15 francs.

M. COQUELU, Pharmacien-Fabricant
DIGOIN. (S. et L.)

COMPRIMÉS D'ALIBOUR

Composition. — Association de sulfate de zinc et sulfate de cuivre.

Indications. — Traitement des plaies, des inflammations des yeux, des fleurs blanches, impétigo, ecthyma.

Action. — Antiseptique d'usage courant prophylactique, hygiénique, anti-catarrhal.

Dose. — Deux comprimés dans 2 litres d'eau bouillie chaude pour injection vaginale, lotion pour les yeux et les muqueuses. Quatre comprimés par litre d'eau pour traiter les plaies superficielles infectées, l'impétigo, l'ecthyma.

Prix : 10 francs la boîte de 36 comprimés.

Laboratoires DURET et RÉMY
et du Docteur Pierre ROLLAND
ASNIÈRES (Seine)

COMPRIMÉS DE PROTO-GAMBIER

Principe actif. — Protochlorure de mercure léger et dissociable ; le même que celui du Gambéol, du Ganderma et du Salvatyl.

Propriétés. — 1^o Antiseptique, désinfectant et désintoxicant des voies gastro-intestinales ; laxatif et purgatif.

2^o Cholérétique et cholagogue.

3^o Vermifuge, diurétique et diaphorétique.

Indications. — Embarras gastriques, infections et fermentations gastro-intestinales, gastro-entérite infantile, grippe intestinale, dysenterie, fièvres typhoïdes et paratyphoïdes, coli-bacilliose, constipation.

Hypersécréteur et hyperexcréteur biliaire.

Ictères, cholécystites, angiocholites, hépatites, cirrheses, etc.

Cholémie familiale et toutes affections hépato-biliaires.

Dosages. — Comprimés à un mgr, à un cgr., à cinq cgr.

Chaque comprimé porte sur l'une de ses faces, son dosage ; et sur l'autre une rainure en croix permettant de le diviser en 4 parties égales.

Présentation. — Ils sont délivrés en boîtes de 3 tubes : 2 en verre, un en aluminium contenant chacun 15 comprimés. Prix. Tous dosages. La boîte : 12 francs.

Le tube en aluminium permet le transport facile des comprimés pour toute personne vaquant à ses occupations en dehors de chez elle.

Doses moyennes et mode d'emploi. — Sous réserve des indications particulières du médecin traitant, les *Comprimés de Proto-Gambier* s'emploient habituellement aux doses suivantes :

1^o 1 mgr. à 4 mgr. par jour, chez les enfants de moins d'un an (soit 1 à 4 comprimés, dosés à 1 milligramme), suivant l'âge.

2^o 1/2 cgr. à 2 cgr., par jour, chez les enfants d'un à 4 ans (soit 1/2 à 2 comprimés, dosés à un cgr.), suivant l'âge.



3^o 2 cgr. à 5 cgr., par jour, chez les enfants de 4 à 7 ans (soit 2 à 5 comprimés, dosés à 1 cgr.), suivant l'âge.

4^o 5 cgr. à 20 cgr. au-dessus de cet âge (soit 1 à 4 comprimés, dosés à 5 cgr.).

Diminuer les doses de moitié si la médication doit être poursuivie plus d'une semaine sans interruption.

Prendre, chaque comprimé (ou fragment de comprimé) dans une cuillerée à café, ou avec une gorgée d'eau alcaline (Eau de Vals, Eau de Vichy, ou, plus simplement, eau ordinaire additionnée d'une pincée de Bicarbonate de Soude).

Laboratoires du GAMBÉOL

J. GAUTIER,  , pharmacien de 1^{re} Classe.

42, rue Emile-Deschanel — COURBEVOIE (Seine)

Fournisseur des Ministères de la Santé Publique, de la Guerre
de la Marine, et des Colonies.

Tél. : Défense 17-67.

COMPRIMÉS « GALAC »

Ferment lactique titrant 50 % de culture pure de Bacille bulgare.

Antiseptique gastro-intestinal.

Traitement spécifique et inoffensif des Gastro-Entérites infantiles, Infections Gastro-intestinales, Dermatoses.

Chaque flacon de 60 comprimés porte UNE ÉTIQUETTE PRÉCISANT LA DATE DE FABRICATION, GARANTISSANT AINSI LA DURÉE D'ACTIVITÉ RÉELLE ET INCONTESTABLE DU MÉDICAMENT.

Adultes : 2 à 3 comprimés; Enfants : 1 à 2 comprimés. Trois fois par jour, délayés dans un peu d'eau bouillie, avant les repas.

Prix du flacon de 60 comprimés : 10 fr.

Laboratoires LAMBERT

Place du Châtelet — ORLÉANS

COMPRIMÉS GUILLAUMIN

à l'oxycyanure d'hydrargyre.

Composition. — Comprimés d'oxycyanure d'hydrargyre dosés à 0 gr. 50 et 0 gr. 25.

Propriétés. — Ces comprimés sont très solubles dans l'eau avec laquelle ils donnent une solution très limpide, d'un pouvoir antiseptique élevé, très bien tolérée par les mains et les muqueuses et n'attaquant pas les instruments nickelés.

Indications. — S'emploient avec succès en gynécologie et en obstétrique, dans les maladies des voies génito-urinaires (métrite, flueurs blanches, vaginite, urétrite, blennorrhagie), dans le pansement des plaies, enfin comme antiseptique en général.

Mode d'emploi. — Faire dissoudre un comprimé dans un ou deux litres d'eau. La dissolution s'effectue en quelques secondes si on a soin d'écraser le comprimé dans l'eau.

Prix : 9 francs.

Laboratoires ANDRÉ GUILLAUMIN

13, rue du Cherche-Midi — PARIS.

COMPRIMÉS KLÉOS

Indications. — Maladies nerveuses infantiles (épilepsie, convulsions, douleurs de dentition, terreurs nocturnes).

Forme. — Comprimés solubles.

Comprimés Kléos aux polybromures n° 1.

Comprimés Kléos à la Phényléthylmalonylurée, n° 2.

Comprimés Kléos aux tartrates borico-potassiques et sodiques n° 3.

Posologie. — 1 comprimé par jour et par année d'âge dissous dans un liquide quelconque.

Avantages. — Dosage rigoureux, produits purs et stables.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle sous les N° 963-1, 2 et 3.

Prix : 12 fr. 50.

Littérature et échantillons

Laboratoires GUÉRET

2, rue des Cordeliers

MEUNG-SUR-LOIRE (Loiret).

COMPRIMÉS NICAN

A base de **Dionnie** (0 gr. 01) et **Benzoate de soude** (0 gr. 25), Extraits Serpolet et Coquelicot (du sirop de Desessartz) Extraits Aunée et Marrube.

Sédatif de toutes les toux, fluidifiant et expectorant. Complément dans certains cas du traitement par les « GOUTTES NICAN ».

Indiqués non seulement dans toutes les **TRACHÉITES** et **BRONCHITES BANALES**, mais encore au cours des dernières périodes de **RHUMES** ordinaires, quand le rhume « **TRAINE** » et contre **L'HABITUDE DE TOUSSER**. Permet le traitement ambulatoire du malade.

Réservés aux adultes et adolescents.

2 à 4 comprimés par jour dans les formes aiguës : Grippe Bronchites, Trachéites.

1 à 2 comprimés par jour ou le soir au coucher, dans les formes chroniques: Catarrhes — Séquelles de Rhumes — Toux émétisantes.

Voir page **Gouttes Nican**, à base de Codéine et Bromoforme.

Laboratoires CANTIN

PALAISEAU (Seine-et-Oise).

COMPRIMÉS PANTOLAXINE

du Docteur BOVEIL.

Traitement de la Constipation.

Ainsi que leur nom l'indique, ces comprimés renferment tous les principes actifs de tous les laxatifs reconnus les plus efficaces et doivent, par conséquent, agir dans tous les cas de constipation.

Composition. — Bourdaine, Cuscuté, Chardon-Marie, Cascara, Rhubarbe, Aloïne, Evonymine, Belladone, Extraits biliaires, Extraits de glandes intestinales.

Indications. — Constipation et ses conséquences (vertige, tension artérielle, éruptions, démangeaisons, haleine fétide, etc.).

Doses et mode d'emploi. — 1 à 2 comprimés pris au repas du soir, tous les jours, ou deux à trois fois par semaine suivant les besoins. Demi-dose pour les enfants.

Echantillon et Littérature sur demande.

Prix : 6 francs la boîte de 30 comprimés.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 346-4.

Marc PARIS, Pharmacien de 1^{re} classe
1, rue Lassalle — LYON (La Boucle) (IV^e).

COMPRIMÉS « ROCHE » DE THIICOL

1 comprimé « Roche » de Thiocol = 0,50 cgr.
Thiocol « Roche ».

1 gr. Thiocol « Roche » = 0,52 cgr. gaïacol cristallisé.

Doses et mode d'emploi. — 1 à 4 par jour et plus.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique pulmonaire, Phagocytogène, Eupeptique et Orexique.

Indications thérapeutiques. — Toutes les affections broncho-pulmonaires, Rhumes, Bronchites, Grippe, Tuberculose, Coqueluche, Rachitisme, Dyspepsie, Entérites, etc.

Avis très important. — Pour éviter toute substitution inactive ou même toxique, bien spécifier toujours :

Comprimés « Roche » de Thiocol.

Enregistré au Laboratoire national de contrôle des médicaments sous le n° 504-49.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et C^{ie}
10, rue Grillon — PARIS (IV^e).

COMPRIMÉS VAGINAUX LEISYN

Remplacent les ovules et n'en présentent pas les inconvénients. Ne coulent pas. Ne tachent pas.

Action. — Provoquent les sécrétions favorables, aseptisent les moindres replis du vagin, remplacent avec avantage la glycérine et la gélatine, puissamment décongestionnants, microbicides puissants, anti-blennorrhagiques, anti-syphilitiques, anti-leucorrhéiques, adoucissants.

Emploi. — Introduire dans le vagin un comprimé. Observer si possible la position couchée ou se garnir d'une serviette périodique.

Composition. — Sous-Gallate de Bismuth, Bucchu, Kawa-Kawa, Quinoléine, Salicylate, Thymolate.

Indications. — Vaginites, Vulvites, Métrites, Salpingites, Leucorrhée, Blennorrhagies et tous états microbiens des organes féminins.

Les Laboratoires LEISYN

1 bis, rue Molitor — PARIS (XVI^e).

Adr. télégr. : Laboleisyn Paris.

Tél. : Auteuil 14-73.

Compte Chèques Postaux Paris 1075-98.

COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT

Effervescents

Au sel Vichy-État.

Médication Alcaline pratique et économique.

Mode de présentation. — Les « Comprimés Vichy-Etat » présentés sous forme de pastilles effervescentes permettent de préparer, par simple dissolution, au moment du besoin, de l'eau alcaline gazeuse artificielle.

Indications. — L'usage des « Comprimés Vichy-Etat » est indiqué dans les affections de l'estomac, du foie, des reins, etc.

Posologie. — 3 à 4 Comprimés Vichy-Etat pour un verre d'eau, 12 à 15 pour un litre.

Georges PRUNIER et C^{ie}

4, rue de la Coutellerie — PARIS
et Pharmacies.

COPREX

Laxatif, doux, efficacité inépuisable, sollicite sans brutalité les fonctions intestinales et hépatobiliaires, garanti exempt de phénolphthaléine et de tous produits synthétiques.

Composition :

- 1° Son de grains d'orge.
- 2° Sulfate de magnésie (à cette dose, il agit en provoquant un léger flux de bile).
- 3° Chlorure de magnésium (principe rééducateur des eaux de Châtel-Guyon).
- 4° Extrait spécial de Cascara.

Dose. — 1 ou 2 dragées, 1/2 heure de préférence avant l'un des repas. Augmenter ou diminuer la dose suivant l'effet produit.

Prix de vente au public : la boîte, 8 fr. 50.

Laboratoire du COPREX

39, rue de Clichy — PARIS (IX^e).

CORAMINE CIBA

Toni-cardiaque stimulant.

Diéthylamide de l'acide pyridine-b-carbonique. Soluble dans l'eau, pouvant être administrée par voie buccale, sous-cutanée ou intraveineuse, la Coramine se substitue toujours à l'huile camphrée et parfois aux autres toniques du cœur avec de grands avantages. Pas de contre-indications. Aucune toxicité. Grande marge thérapeutique, possibilité de traitements prolongés.

Indications. — Collapsus cardiaque, syncope, états lipothymiques. Faiblesse du cœur au cours des maladies aiguës, des infections, des intoxications, de la période post-opératoire. Hyposystolie des vieillards, etc.

Gouttes. — Ampoules.

Doses. — XXV à C gouttes par 24 heures ou 1 à 12 cc. par voie sous-cutanée ou intraveineuse.

Le flacon (gouttes) : 12 francs.

La boîte de 5 ampoules de 1 cc. : 12 francs.

La boîte de 20 ampoules de 1 cc. : 36 —

La boîte de 5 ampoules de 3 cc. : 20 —

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND

109 à 113, boulevard de la Part-Dieu — LYON.

est un animal qui se nourrit de
l'écume du ruisseau, et qui se baigne

175

Indications : - Constitution simple, forte, et

forme : - Grande, et robuste

La forme est simple, et robuste

176

Même en petites quantités, et en petites

quantités, et en petites quantités

moins sans inconvénient, et sans

pour aggraver la situation

La forme est simple, et robuste

Le même, mais dans un vase simple, et

et en petites quantités, et en petites

Même en petites quantités, et en petites

botan

CORÉÏNE

Mucilage rigoureusement pur, sans l'adjonction d'aucune substance laxative.

Produit exclusivement végétal.

(Procédé Taillandier.)

La Coréïne n'est pas de l'agar-agar.

La Coréïne n'est pas extraite de l'agar-agar.

C'est du mucilage pur, indigestible.

Propriété unique. — Absorbe et retient 50 fois son poids d'eau.

Indications. — Constipation simple, Colite muqueuse, Colite muco-membraneuse.

La **Coréïne** constitue un traitement remarquable, souvent le seul, de la constipation et de certaines formes diarrhéiques.

Formes. — Granulé et paillettes.

Prix : *Granulés*, 18 francs. — *Paillettes*, 16 francs.

La Coréïne est admise par l'Assistance publique et aux Assurance Sociales.

Pour absorber la Coréïne :

Mettre la Coréïne en paillettes à sec dans la bouche ou la mélanger avec de l'eau, constituent des moyens sans inconvénient thérapeutique, mais peu agréables.

La Coréïne en paillettes est très facile à absorber, à la condition de tenir compte des indications suivantes :

Le matin, mettez dans un bol la quantité de Coréïne en paillettes prescrite, et versez dessus du lait... ou café au lait... chaud, dans la **proportion de 3 cuillerées à soupe pour 2 cuillerées à café de paillettes.**

Mélanger vivement et absorber **tout de suite comme un potage.**

Aux repas de midi ou du soir, mélangez la paillette avec quelques cuillerées de potage, de purée de légumes ou de compote.

La dose peut être augmentée ou diminuée suivant l'effet obtenu. La régularisation des fonctions intestinales étant obtenue, continuer l'usage de la Coréine à la dose de 1 à 2 cuillerées à café au petit déjeuner du matin.

Les enfants prennent très aisément la paillette de Coréine, mélangée avec quelques cuillerées de bouillie (phosphatine, farines lactées...) ou mélangée avec un peu de lait, de potage, de purée ou de compote.

Quant aux nourrissons et aux bébés, une pincée de paillettes dans une cuillerée à café de lait chaud.

Le **Granulé de Coréine** se prend comme tous les granulés ; mettre directement dans la bouche par cuillerée à café la dose prescrite et avaler un peu de liquide après chaque prise.

La seule chose à éviter, c'est de laisser séjourner le granulé dans l'eau.

Bibliographie. — Pathologie gastro-intestinale, A. Mathieu et J.-C. Roux, etc.

L'ouvrage du Dr O. Taillandier, *Le Mucilage pur en Thérapeutique*, — publié en avril 1930, — est en vente au prix de 12 fr. à la librairie Maloine, 27, rue de l'Ecole-de-Médecine, et à la librairie Le François, 91, boulevard Saint-Germain.

Il est adressé gracieusement aux médecins, sur simple demande aux :

Laboratoires A. DANIEL-BRUNET

62, bd Jean-Jaurès — BOULOGNE-SUR-SEINE

Tél. : Auteuil 11-86. — Paris-Ouest.

CORIZOL

Composition et forme. — Ephédrine naturelle, Cocaïne (dose légale), Résorcine, Antipyrine, Solution aqueuse, flacons de 24 cc. (Laboratoire National de Contrôle des Médicaments n° 668-1).

Propriétés. — Emploi en oto-rhino-laryngologie, vaso-constricteur non irritant et non huileux, sédatif, antiseptique, antinévralgique.

Avantages. — Décongestionnement durable de la muqueuse nasale. Facilite la respiration et éclaircit la voix. Emploi très facile au moyen du bouchon compte-gouttes à bout arrondi.

Indications. — Spécifique des affections de la gorge et du nez. Préventif des affections des voies respiratoires. Rhume de cerveau, rhume des foins, coryza spasmodique, rhinites congestives, sinusites, asthme.

Mode d'emploi. — En instillations dans chaque narine, trois fois par jour, à titre préventif et curatif, au moyen du bouchon compte-gouttes spécial à bout arrondi.

Prescription. — Un flacon Corizol.

Prix : 12 fr. 75.

Laboratoires RENAULT

24, place des Vosges — PARIS (III^e).

Tél. Turbigo 64-26.

CORTIODE

Régulateur des fonctions cardio-vasculaires.

Composition. — Association d'iodaseptine (43 p. 100 d'iode) et d'iodure de sodium (84, 6p. 100 d'iode) réalisant une dose d'iode élevée, sans risques d'intolérance.

Propriétés thérapeutiques. — Fait baisser la tension artérielle, tonifie le cœur dont elle régularise et intensifie les contractions. Modifie rapidement le pouls bref et tardif.

Indications. — Angine de poitrine, Hypertension, Cardiosclérose, Ozène, Emphysème, Micoses. Toutes les indications de la thérapeutique iodée intensive.

Préparation. — Posologie :

Ampoules de 5 cc (0 gr. 250 d'Iodaseptine, 0 gr. 221 d'Iodure de sodium). 1 à 2 ampoules par 24 heures, en injection intraveineuse ; exceptionnellement intramusculaire. Jamais d'intolérance.

Solution. — XX gouttes = 0,050 d'Iodaseptine et 0,0443 d'Iodure de Sodium.

Dose. — XXX à L gouttes 2 fois par jour au début du repas. Série de 12 jours par mois.

Prix : La boîte de 10 ampoules 5cc, 26 francs.

Le flacon, 18 francs.

Laboratoires CORTIAL

7, rue de l'Armorique — PARIS

CORYPHÉDRINE

Association d'acide acétylsalicylique (0 gr. 50) et de Sanédrine (0 gr. 015) (Voir p. 1341) pour un comprimé.

Indications. — Affections saisonnières des voies respiratoires supérieures.

Coryza aigu. Rhume des foins. Trachéo-bronchite grippale ou non.

Présentation. — Tubes de 20 comprimés.

Posologie et mode d'emploi :

1 à 4 comprimés par jour par doses régulièrement espacées ; faire déliter les comprimés dans 1/2 verre d'eau.

Société Parisienne d'Expansion Chimique
« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

CRATAEGUS GMET

Très agréable au goût.

Composition. — Extrait *total* de la fleur du *crataegus oxyacantha* ; sans alcool ni sucre. Correspond à 2 gr. de plante fraîche par cuillerée à café.

Propriétés. — Régulateur du sympathique. Cardio-tonique.

Indications. — Tachycardie, Arythmie, Eréthisme cardiaque, Plexalgies, Cardialgies, Prurit, Insomnie, Angoisse, Gastralgie, et tous les troubles nerveux d'origine réflexe. Puberté, Ménopause, Grossesse.

Posologie. — Une cuillerée à dessert un peu avant l'heure du coucher, dans un peu d'eau ou de lait. (La dose peut être doublée.)

Le flacon 135 cc. Prix : 18 francs.

Laboratoire GMET

27, faubourg Montmartre — PARIS (IX^e).

CRAYONS ANTIFISSURE DOMERGUE

Principes actifs. — Acide aniline para-sulfonique. Masse spéciale.

Propriétés. — Antiseptique. Cicatrisant.

Indications. — Fissures anales : « pas d'insuccès ». Hémorroïdes ulcérées. Hémorroïdes.

Emploi. — Un crayon à demeure jusqu'à guérison.

Nota. — L'application du premier et quelquefois du deuxième est un peu douloureuse.

La boîte de 10 crayons : 20 francs.

Laboratoires DOMERGUE
AGEN (Lot-et-Garonne).

CREAGENOL

Médication reconstituante et tonique.

Composition. — Inositophosphate de chaux et de magnésie. Acétylamino-oxyphénylarsinate de chaux et hypophosphite de manganèse, en granulé sucré.

Indications. — Convalescences et états anémiques. Troubles de croissance. Rachitisme. Asthénie. Dépression nerveuse et surmenage. Tuberculose.

Mode d'emploi :

Adultes : une à deux mesures, 2 fois par jour au repas, pur ou délayé dans 1/2 verre d'eau.

Enfants : 1/2 mesure, 2 fois par jour.

Granulé très actif et d'un goût très agréable.

Prix : 16 fr.

Laboratoires CORBIÈRE

27, rue Desrenaudes — PARIS (XVII^e).

Téléphone : Carnot 78-11.

CREDONE DEHAUSSY

Méthyl-acétyl-phényl-diméthyl-oxamyl-hydrazide.

Nouvel analgésique neutre soluble.

Communication à l'Acad. des Sciences du 12 nov. 1929.

Communication à l'Acad. des Sciences du 23 déc. 1929.

Communication à l'Acad. des Sciences du 6 janv. 1930.

Communication à la Soc. chimique de France du 24 janvier 1930.

Indications :

Algies : Migraine, Névralgies dentaires, Névralgies périphériques, Douleurs des tuberculeux, Algies cataméniales, Douleurs rhumatoïdes, Douleurs fulgurantes, etc., etc.

Ets infectieux : Gripes, Rhumatisme articulaire aigu, Angines.

Nervosisme : Insomnie, Agitation, Anxiété.

Posologie :

Adultes : 2 à 4 cachets par jour.

Enfants : 1 à 2 cachets par jour.

De préférence avec une infusion ou un verre d'eau.

Boîte, 12 cachets : 9 francs.

Laboratoires DEHAUSSY

66, rue Nationale — LILLE.

CRÈME RÉSOLUTIVE du D^r RAP

Composition. — Produit onctueux sans corps gras, à base de principes à action fortement vasoconstrictive et analgésique :

(Hamamelis, Noix vomique, Arnica, etc.)

Propriétés. — Calme la Phlébalgie, décongestionne, facilite la résorption des œdèmes.

Indications. — Varices, phlébites, hémorroïdes, insuffisances veineuses. Stase post-traumatique, entorses, fractures.

Mode d'emploi. — En massages matin et soir. S'il existe une contre-indication au massage, employer « l'Extrait Rap » en lotion ou en pulvérisation.

Prix : 11 fr. et 15 fr.

Laboratoire du D^r R. CAVAILLÈS

29, rue Singer — PARIS (XVI^e).

CRÉOFORMINE

Spécifique de la toux et de l'expectoration.

Composition. — Tannocréosoforme, 0,20. Phosphate de gaïacol, 0,05. Bromoforme, III gouttes. Codéine, 0,01.

Forme. — Comprimés glutinisés, digérés seulement dans l'intestin.

Indications. — Grippe, Toux catarrhales, nerveuses et spasmodiques, Coqueluche, Tuberculose, Bronchites aiguës et chroniques, Rhumes, Ectasie bronchique, Entérite tuberculeuse.

Mode d'emploi. — De 4 à 8 comprimés par jour. *Enfants* : 1/2 doses.

Avaler sans croquer.

Le traitement le plus actif et le plus économique (30 comprimés par boîte)

Prix : 12 francs.

Laboratoire de la CRÉOFORMINE

18, rue de Jouvence — DIJON (Côte-d'Or).

CRÉOSAL DUBOIS

Sirop, Comprimés, Solution.

Composition :

Le CRÉOSAL réunit dans sa composition le *Gaïacol*, l'*Acide Phosphorique* et le *Calcium* que la Thérapeutique a toujours associés.

Propriétés et indications thérapeutiques:

Recalcifiant puissant, antibacillaire, accélérateur de la nutrition. Employé avec succès dans : la Tuberculose pulmonaire, osseuse ou cutanée, les Bronchites aiguës ou chroniques, les Toux rebelles, le Lymphatisme, la Scrofule, le Rachitisme, etc., etc.

Sirop : 12 fr. le flacon.

Comprimés : 10 fr. l'étui de 50.

Solution : 12 fr. 50 le flacon.



Laboratoires LALEUF

51, rue Nicolo — PARIS (XVI^e)

CRÉOSITOIRES

Nouvelle méthode d'Imprégnation créosotée.

Actifs. — Indolores. — Non caustiques.

Composition :

| <i>Pour Adultes :</i> | <i>Infantiles :</i> |
|--------------------------|--------------------------|
| Créosote pure. 0 gr. 50 | Créosote pure. 0 gr. 125 |
| Extr. d'opium. 0 gr. 015 | |

Indications. — Tuberculoses pulmonaires. Curatif de la Coqueluche et de toutes les affections pulmonaires aiguës. Carminatif chez les opérés, Prophylaxie des accidents pulmonaires anesthésiques et des complications pulmonaires grippales ou rubéoliques.

Posologie. — 1 à 2 par jour.

Prix : *Pour Adultes :* 15 fr. — *Infantiles :* 12 fr.

Echantillons et littérature :

Laboratoire JOLLY

1, rue Christine — PARIS (VI^e).

Tél. Danton 49-39. — L. N. C. M. 40-5 et 6.

CRÉOSOFORME LAMBIOTTE FRÈRES

Méthylène-Créosote. Combinaison d'aldéhyde formique (4 p. 100) et de créosote (95 p. 100). Inodore, non toxique, puissamment antiseptique. Supérieur à l'iodoforme dans tous ses emplois.

Propriétés thérapeutiques. — Au contact des cellules vivantes, il se décompose graduellement en créosote et aldéhyde formique à l'état naissant qui déterminent l'asepsie complète des plaies et leur rapide cicatrisation.

Indications. — Plaies, Ulcères, Brûlures, Engelures, Fistules, Tuberculoses chirurgicales, Dermites, Gynécologie, Hémorroïdes et toutes autres affections anales, etc.

Mode d'emploi. — Existe sous quatre formes :

- 1° *Créosoforme-Poudre*, pour saupoudrage des plaies.
- 2° *Créosoforme-Onguent*, présenté en tubes d'étain.
- 3° *Créosoforme-Ovules*, pour pansements gynécologiques.
- 4° *Créosoforme-Suppositoires*, 1 ou 2 par jour.

Prix : 1° 17 fr. — 2° 17 fr. — 3° 17 fr. — 4° 17 fr.

Littérature et Echantillons :

Produits LAMBIOTTE FRÈRES

20, rue Dumont-d'Urville — PARIS (XVI^e).

124, avenue Rogier — BRUXELLES.

CREO-SUPPO-CAMPHRE

Traitement des affections bronchiques.

Formule :

| | | |
|------------------|------------------------|----------------------------|
| <i>Adultes</i> : | Créosote..... | 10 gouttes. |
| | Camphre..... | 0 gr. 05 |
| | Véhicule spécial | Q. S. pour 1 suppositoire. |
| <i>Enfants</i> : | Créosote..... | 2 gouttes. |
| | Camphre..... | 0 gr. 01 |
| | Véhicule spécial | Q. S. pour 1 suppositoire. |

Indications. — Dans les affections respiratoires, toutes les Hyper-sécrétions bronchiques, et toutes les fois qu'il s'agira de tarir un élément catarrhal en soutenant le cœur trop souvent fatigué par une toux incessante.

Préventif des complications pulmonaires, anté et post-opératoires.

Bronchites aiguës en fin d'évolution, Bronchites chroniques, Asthme, Emphysème pulmonaire.

Antisepsie respiratoire, si utile après toute infection, Grippe, Pneumonie, Broncho-pneumonie.

Dans la pré-tuberculose et la tuberculose non évolutive.

Prix :

Adultes : 16 francs. — Enfants : 14 francs.

Laboratoires REBOUL

PONT-SAINT-MAXENCE (Oise).

CRESENTYL

Le CRESENTYL est un benzo-méta-Crésol chimiquement pur, présenté en comprimés titrés à 0 gr. 50 de produit actif.

Ce produit a été étudié et mis au point dans le laboratoire et le service du Dr. Louis Fournier à l'hôpital Cochin. *Puissant anthelminitique, il a le grand avantage d'être dépourvu de toute toxicité.*

Spécifique des némathelminthes, ascaris, trichocéphales oxyures, etc., le CRESENTYL a aussi une action remarquablement rapide dans les amibiases et autres protozooses intestinales (*Lambli*a, *Balan*tidium, etc.) Excellent antiseptique intestinal, empêchant le développement des microbes de putréfaction (anaérobies), le CRESENTYL sera employé avec succès dans tous les cas nécessitant une désinfection de l'intestin.

MODE D'EMPLOI. — Désinfection intestinale :

4 à 6 comprimés par jour, par fraction de 2 ou 3 comprimés avant les repas, pendant 10 jours.

Vermifuge : *Adultes*, 8 à 10 comprimés le matin à jeun, par fraction de 4 à 5 à la fois à 1/4 d'heure d'intervalle, pendant 5 jours. Faire ainsi 4-5 cures de **Crésenty**l à 5 jours d'intervalle.

Enfants, 4 à 6 comprimés le matin à jeun, par fraction de 2-3 à la fois à 1/4 d'heure d'intervalle, pendant 5 jours.

Faire ainsi 4-5 cures de **Crésenty**l à 5 jours d'intervalle.

Le tube de 20 comprimés. Prix au public : 12 francs.

Laboratoire des ANTIGENINES

Dépôt et Bureaux : 1, place Lucien-Herr
PARIS (V^e).

(Anciennement, 43, rue Tournefort.)


Tél. : Gobelins 26-21.

Laboratoire : 11, rue Michelet — PARIS (VI^e).

CRÉSOPIRINE

des Professeurs G. CARRIÈRE & E. GÉRARD

Acide Acétyl Crésotinique Ortho



Produit synthétique défini et pur.

Indications. — Traitement du rhumatisme aigu et chronique et de la douleur sous toutes ses formes.

Posologie. — *Douleurs rhumatismales, névralgies* : Prendre de 1 à 4 comprimés ou cachets dans la journée.

Insomnie : Le soir en se couchant, prendre 1 ou 2 comprimés ou cachets dans une tasse d'infusion de tilleul.

Rhumatisme articulaire aigu, fébrile : Se conformer à l'avis du médecin, qui, selon les cas, peut prescrire d'emblée 4 à 8 grammes par jour.

Grippe : 2 à 4 comprimés ou cachets par jour.

La boîte de 30 cachets ou comprimés à 0 gr. 50 : 14 francs. Prix public.

La boîte de 30 cachets à 1 gramme, ou 30 comprimés à 1 gramme : 18 fr. Prix public.

Flacon vrac de 500 grammes : 125 francs net à MM. les Pharmaciens.

Flacon vrac de 50 grammes de poudre de Crésopirine : 17 fr. net le flacon à MM. les Pharmaciens.

Laboratoires "STÉNÉ"

2, place des Vosges — PARIS (IV^e).

CRÉSOTANOL

Traitement externe de la douleur.

Composition. — Crésotinate de Butyle et Crésotinate de Propyle à parties égales.

Indications. — Toutes les formes de rhumatisme aigu et chronique, sciatique, zona, névralgies de toutes sortes, douleurs musculaires, lumbago, torticollis.

Prix. — La boîte ou flacon : 10 francs.

Présentation. — Le CRESOTANOL est présenté sous forme de gouttes pour usage externe.

Mode d'emploi. — Employer exclusivement à l'extérieur. On verse X à XX gouttes de CRESOTANOL pour une surface de la grandeur de la paume de la main, on étale avec le doigt, on recouvre de suite avec un imperméable, soit taffetas gommé ou une feuille de gutta-percha et on recouvre d'une couche de ouate qu'on fixe avec une bande. Renouveler le traitement 2 ou 3 fois par jour.

Laboratoires STENE

2, place des Vosges — PARIS.

CRINEX

Gouttes. — Dragées. — Ampoules.

Composition. — Extrait ovarien total standardisé. Contient toutes les hormones ovariennes.

Gouttes : Solution alcoolique. V gouttes (50 par cc.)
= 3 unités physiologiques souris.

Dragées : 1 dragée = V gouttes.

Ampoules : injectables, indolores. 20 unités souris en solution aqueuse isotonique.

Indications. — Tous les cas d'insuffisance ou de suppression de la fonction ovarienne. Troubles de la puberté, menstruation, ménopause, castration. Obésité.

Avantages. — Actif par voie buccale à faibles doses.

Provient exclusivement d'ovaires frais d'animaux jeunes.

Garanti exempt de folliculine extraite d'urine ou de placenta.

Posologie. — Prescrire CRINEX pendant les 20 jours qui suivent les règles ; par exception (oligoménorrhées, dysménorrhées) dans les 10 jours qui précèdent.

Gouttes : dose moyenne optima : 15 à 30 gouttes par jour.

Faire absorber en 2 ou 3 prises, *loin des repas*, dans un demi-verre d'eau.

Suivant le résultat obtenu, maintenir la dose initiale, l'augmenter progressivement jusqu'à 45, 60 ou 90 gouttes, ou la ramener à 5 ou 10 gouttes.

Dragées : dose moyenne 3 à 6 par jour (à croquer).

Ampoules : Injecter 1 ampoule tous les 1, 2 ou 3 jours, suivant les cas.

Prix : le flacon de 400 gouttes environ (12 à 25 jours) :
18 francs.

Le double flacon, 800 gouttes environ : 30 francs.

La boîte de 80 dragées : 18 francs.

La boîte de 6 ampoules : 20 francs.

Laboratoires CRINEX-UVÉ

18, rue Saint-Amand — PARIS (XV^e).

CRINHEMOL

Médication endocrino-médicamenteuse : dont les but et action sont : renforcement dynamogénique, effets sthéniques, stimulation hémato-poiétique.

Composition. — *Eléments endocrinien-médicamenteux* : Extraits hépatique, splénique, orchitique.

Eléments médicamenteux : chlorure de manganèse, chlorure de magnésium, acide phosphorique, peptonate de fer, méthylarsinate de soude.

Présentation. — Ampoules buvables, *agréable au goût*, pas de saveur désagréable, propre aux produits biologiques.

Forme. — *Crinhemol adultes. Crinhemol enfants. Crinhemol T.* (pour tuberculeux sans fer, ni arsenic).

Posologie. — *Crinhemol adultes* : 1 ampoule au petit déjeuner, 1 ampoule au repas de midi.

Crinhemol T (pour tuberculeux sans fer, ni arsenic) : 1 ampoule au petit déjeuner, 1 ampoule au repas de midi.

Crinhemol enfants (adolescents) : 1 ampoule au petit déjeuner, 1 ampoule au repas de midi.

Enfants : 1 ampoule au petit déjeuner.

Le *Crinhemol* doit toujours être dilué dans 1/4 de verre d'eau.

Prix. — *Adultes et T* : boîte de 20 ampoules : 30 francs ; boîte de 10 ampoules : 18 francs.

Enfants : boîte de 20 ampoules : 26 francs ; boîte de 10 ampoules : 14 francs.

Laboratoires DEMASLES
VIENNE (Isère).

CRINOCARDINE LALEUF

Ampoules buvables.

Comprimés dragéifiés.

Extraits concentrés spéciaux de Myocarde,
Pancréas, Foie, Rein, Muscle strié.

Crinocardine simple.

- digitalique.
- strophantique.
- digitalo-strophantique.
- scillitique.
- apocynique.
- spartéinée.

Indications thérapeutiques :

Troubles cardio-vasculaires de toute origine,
Insuffisances cardiaques, Oppressions, Œdèmes,
Spasmes, Angines de poitrine, etc.
Tous états de déficience organique complexe : Anémies, Surmenage, Convalescences,
Dépressions physiques et nerveuses, etc. Insuffisances hépatiques.

Doses et mode d'emploi :

1 ampoule (ou 5 comprimés) le matin, à jeun, dans un peu d'eau, pendant 10 jours consécutifs. Si nécessaire, une seconde ampoule (ou 5 comprimés) au cours de la journée.

Prix :

Boîte de 10 ampoules de 12 cc. : 30 francs.

Etui de 60 comprimés : 20 francs.

Laboratoires LALEUF

51, rue Nicolo — PARIS (XVI^e).

CRINO-SÉRUM

Opothérapie infantile pluriglandulaire.
Sirop régulateur de l'enfance.

Indications. — Asthénie, troubles et arrêt du développement, maigreur, obésité, instabilité, arriération, troubles convulsifs, dermatoses, toutes maladies aiguës ou chroniques quand la résistance du malade est déficiente.

Doses :

De 0 à 1 an : 1 cuillerée à café par jour.
 De 1 à 3 ans : 2 cuillerées à café par jour.
 De 3 à 6 ans : 3 cuillerées à café par jour.
 De 6 à 15 ans : 2 cuillerées à dessert par jour.

Prix : 16 francs.

Laboratoire MOURÉ

18, rue Favart — PARIS.

Dépôt Général O. C. P. 71, rue du Temple
 et ses Succursales.

CRINO-STHÉNYL

Complexe endocrinien des glandes dites
« de l'énergie ».

(Surrénale ; hypophyse ; orchitine ; foie ;
 parathyroïde, thyroïde).

Comprimés : étuis de 45.

Posologie. — 2 à 4 comprimés par jour.

Ampoules pour injections hypodermiques. Boîtes de 6 ampoules.

Posologie. — 1 injection par jour.

Pour les enfants :

Sirop : 1 cuillerée à café (correspondant à un comprimé). Dose suivant âge.

Indications. — Chez les enfants retardataires, inattentifs, etc... ; chez les adultes : asthénies diverses, surmenage.

Prix : 18 francs.

Laboratoires FOURNIER Frères

7, rue Biscornet — PARIS.

CRISALBINE

(Thiosulfate double d'or et de sodium.)

Teneur en or : 37 p. 100.

Indications :

Tuberculose pulmonaire.

Adénopathies tuberculeuses, Lupus, Arthrites infectieuses.

Présentations : ampoules contenant 0 gr. 02, 0 gr. 05, 0 gr. 10, 0 gr. 15, 0 gr. 20, 0 gr. 25, 0 gr. 35, 0 gr. 50 de poudre cristalline ; une ampoule d'eau bi-distillée est jointe à chaque dose.

Posologie et mode d'emploi. — Injections intraveineuses d'une solution à 5 p. 100 préparée extemporanément, en débutant par 0 gr. 05 ou 0 gr. 10. Augmenter progressivement, selon la tolérance du malade.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

CRUSSOL

Adjuvant complet de CROISSANCE

Composition. — Hormones du lobe antérieur de l'Hypophyse. Complément et excitant de la sécrétion normale des glandes endocrines les plus nécessaires au développement.

Les 4 vitamines (unités actives).

Les sels minéraux de croissance.

L'extrait de Boldo (insuffisance hépatique des enfants)

Présentation :

Trois préparations suivant l'âge de l'enfant.

1° Crussol Bébé :

En neige fondante pour les nourrissons.

Préparation vitaminée avec sels minéraux et papaïne destinée aux nourrissons et jusqu'à 2 ans.

Prescrire. — Mettre dans la bouche du bébé ou faire dissoudre dans quelques gouttes d'eau et donner au bébé avant chaque tétée ou biberon, une dizaine de petits granulés neige fondante. Augmenter suivant le nombre de mois, la dose à utiliser dans les 24 heures allant d'une demi à 2 cuillerées à café.

La boîte : 18 francs.

2° Crussol granulé :

Pour les enfants de 2 ans à 5 ou 6 ans en boîte de 20 sachets dosés.

Prescrire. — Un sachet d'une dose avant chacun des 2 principaux repas.

Traitement à suivre pendant 20 jours de suite par mois, puis repos de 10 jours et reprendre le traitement (quelques mois).

La boîte : 20 francs.

3° Crussol. Ampoules buvables :

Pour les enfants au-dessus de 5 ou 6 ans et pendant toute la période de CROISSANCE et de FORMATION

En boîte de 12 ampoules buvables.

La boîte contient : 6 ampoules de vitamines A et D (liposolubles) et 6 ampoules contenant les vitamines B et C et le complément de la préparation.

Prescrire. — Avant le repas de midi, une petite ampoule et avant le repas du soir une grande ampoule à prendre dans 1/4 de verre d'eau sucrée.

Traitement à suivre pendant une semaine sur deux, en général, sauf plus grande continuité suivant avis médical.

La boîte : 22 francs.

Laboratoire MONIN

49, rue de Maubeuge — PARIS (IX^e).

Echantillons sur demande.

CRYOGÉNINE LUMIÈRE

Antipyrétique, Analgésique.

Produit toujours les mêmes effets aux mêmes doses.

L'usage de la Cryogénine peut être prolongé sans danger.

Constitution. — Semi-carbazide de formule : $C^7H^3Az^3O$, en comprimés et cachets de 0 gr. 25 et 0 gr. 50. Toxicité très faible. Les animaux en expérience supportent impunément des doses considérables : plus de 2 gr. par kilog. d'animal.

Propriétés. — La CRYOGÉNINE LUMIÈRE ne ferme pas le rein, ne détermine pas de sueurs profuses, ni de tendance au collapsus. Elle ne provoque pas de vertiges, ni de troubles nerveux ou digestifs. La CRYOGÉNINE LUMIÈRE représente le médicament antipyrétique et analgésique type.

Aucune contre-indication. Aucune action nocive, son usage peut être prolongé sans danger.

Indications. — Grippe, fièvre au cours des maladies graves (fièvre des tuberculeux), fièvre typhoïde (permet d'éviter les bains froids), maux de tête, douleurs rhumatismales des membres, goutte, courbature, douleurs erratiques chez les tuberculeux, migraines, etc.

Chez les enfants, la CRYOGÉNINE LUMIÈRE est employée de préférence dans toutes les pyrexies, du fait de son absolue innocuité.

Doses. — Chez l'enfant : de 0 gr. 25 à 1 gr. 50 par jour. Chez l'adulte : de 0 gr. 50 à 3 gr. par jour et davantage au cas de besoin.

Prix : *cachets*, la boîte à 0,50 : 10 francs ; à 0,25 : 6 fr. 50.

Comprimés, la boîte à 0,50 : 7 francs ; à 0,25 : 5 fr. 50.

LABORATOIRES LUMIÈRE

45, rue Villon — LYON.

CRYPTARGOL LUMIÈRE

Antiseptique argentique, stable, atoxique.

Constitution. — (Argentothio-glycérine, sulfonate de sodium) 35 p. 100 d'argent métallique.

Propriétés. — Pouvoir antiseptique égal à celui du nitrate d'argent sans toxicité, ni causticité. Ne tache pas, ne précipite pas les albuminoïdes. Jamais d'argyrisme. Aucune réaction ni sensation douloureuse.

Indications. — Usage interne : embarras gastrique fébrile, états infectieux du tube digestif, diarrhées, typhoïde, para-typhoïde, diarrhées imputables aux bacilles de Shiga ou au colibacille, dysenterie amibienne, entérite, entéro-colite, dyspepsies gastro-intestinales avec coprostase, fermentations intestinales, etc.

Chez l'adulte, le CRYPTARGOL LUMIÈRE est administré par la bouche, en pilules dosées à 10 centigr. (4 à 6 pilules par jour au repas). Chez l'enfant, le CRYPTARGOL LUMIÈRE est administré sous forme de granulé à la dose d'une ou quatre cuillerées à café, selon l'âge de l'enfant sans aucun danger.

Usage externe — Antisepsie générale.

DERMATOLOGIE, UROLOGIE, GYNÉCOLOGIE, OPHTHALMOLOGIE.

Formuler : Usage interne : Etais de pilules de CRYPTARGOL LUMIÈRE. — Flacon granulé de CRYPTARGOL LUMIÈRE.

Usage externe : Flacon de solution-mère de CRYPTARGOL LUMIÈRE, titré à 1 gr. pour 10 cc. en flacon de 30 cc. et de 120 cc.

Gynécologie : Boîte d'ovules de CRYPTARGOL LUMIÈRE.

Ophtalmologie : Ampoules collyre dosées à 1 p. 100 ou à 5 p. 100. de CRYPTARGOL LUMIÈRE.

Prix :

Usage interne : *pilules* : 20 francs ; *granulés* : 25 francs. — Usage externe : *sol. mère* de 30 cc. : 25 francs. — Gynécologie : *ovules* : 25 francs. — Ophtalmologie : *ampoules* à 1/100 ou 5/100 : 9 et 12 francs

LABORATOIRES LUMIÈRE : 45, rue Villon — LYON.

CRYPTHERMOL DEHAUSSY

Médication anti-syphilitique dissimulée.

Préparation à base de mercure permettant le traitement masqué ou ambulatoire de la syphilis et de l'hérodo-syphilis sans troubles gastro-intestinaux, même en cas d'intolérance hydrargyrique (Sirop et granulés de goût agréable, pilules glutinisées).

Dosage

Sirop : par cuillerée à soupe.

| | |
|--------------------------|----------|
| Iodure de potassium..... | 1 gr. |
| Biiodure de mercure..... | 0 gr. 01 |

Pilules : par pilule.

| | |
|--------------------------|-----------|
| Iodure de potassium..... | 0 gr. 20 |
| Biiodure de mercure..... | 0 gr. 002 |

Granulé fondant : par cuillerée à café.

| | |
|--------------------------|------------|
| Iodure de potassium..... | 0 gr. 005 |
| Biiodure de mercure..... | 0 gr. 0005 |

Posologie :

Adultes : *Sirop* : 2 cuillerées à soupe par jour. — *Pilules* : 5 à 10 par jour.

Enfants : *Granulé* : 1 an : 1 ou 2 cuillerées à café par jour.

5 ans : 3 à 5 cuillerées à café par jour.

10 ans : 5 à 10 cuillerées à café par jour.

Sirop. Prix : 18 francs.

Pilules. Prix : 22 francs.

Granulés, Prix : 15 francs.

Laboratoire DEHAUSSY

66, rue Nationale. — LILLE

CRYPTHIOL

Composition. — Nouveau composé organique soufré, dérivé de la série aromatique, ni toxique, ni irritant.

Forme. — Capsulines glutinisées.

Action. — *a.* Par le pouvoir catalytique du soufre non oxydé, le CRYPTHIOL active la désintégration des albuminoïdes jusqu'à leur terme final: l'urée, et accélère l'oxydation des déchets nuisibles de l'organisme.

b. Par son action élective sur la cellule hépatique, le CRYPTHIOL constitue un puissant cholagogue et stimule les fonctions uropoïétique et glycémique du foie.

Indications. — Insuffisance hépatique, États congestifs du foie, Lithiases biliaire et rénale, Goutte, Obésité, Rhumatisme chronique, et en général toutes les affections provenant d'une carence soufrée de l'organisme ou d'un métabolisme défectueux.

Posologie. — 2 à 4 capsulines par jour, un peu avant les repas.

Prix : l'étui de 30 capsulines, 15 francs.

Laboratoires RENARD

35, rue de Paris — CLICHY (Seine).

Tél. : Péreire 14-08.

CRYSIODAL

Complexe organo-métallique à base d'or et d'iode, associé au cadmium.

Indications. — Pré-tuberculose et tuberculose.

Présentation. — Deux sortes de solutions réparties en ampoules de 5 cc. :

1° Pour injections intraveineuses (7 gr. d'iode et 0 gr. 0545 d'or pour 100 cc.) ;

2° Pour injections intramusculaires (3 gr. 50 d'iode et 0 gr. 027 d'or pour 100 cc.).

Doses et mode d'emploi. — Deux séries au moins de 25 ou 30 injections, à raison de deux injections par semaine, avec repos de 1 ou 2 mois entre les séries.

Prix : intraveineux, 30 fr. la boîte de 6 amp. ; intramusculaire, 25 fr. la boîte de 6 amp.

H. VILLETTE, Pharmacien

5, rue Paul-Barruel, PARIS. — Tél. : Vaug. 11-23.

CUPREMONE « F »

Médication Hormonique (folliculine) associée au complexe végétal CUPREMONE

Composition. — Extraits Anémone, Cupressus, Cratœgus, Condurango, Hamamélis, Marrons d'Inde, Noix vomique, Sèneçon, Viburnum.

Folliculine cristallisée rigoureusement titrée : 2.500 unités physiologiques par 100 cc. de préparation. Deux gouttes de *Cupremone F* correspondent à une unité physiologique de Folliculine.

Propriétés thérapeutiques. — Traitement de choix des désordres génitaux et des troubles de la circulation sanguine.

Activité par voie buccale.

Forme et mode d'emploi. — Prendre XL à LXXX gouttes par jour loin des principaux repas (au moins une demi-heure avant) dans un peu d'eau sucrée, 10 jours après les règles et 20 jours par mois.

Prix : 20 francs.

Laboratoires R. GOUIN

20, rue des Ecoles — PARIS (V^e).

CUPREMONE SIMPLE

Composition. — Extraits fluides préparés dans le vide et d'action toujours égale et constante (Anémone, Cupressus, Cratœgus, Condurango, Hamamélis, Marrons d'Inde, Noix vomique, Sénéçon, Viburnum).

Propriétés thérapeutiques. — Traitement des troubles de la circulation sanguine.

Indications. — Régulateur et stimulant circulatoire. Inflammations et dilatations veineuses : Varices, Hémorroïdes, Phlébites, Ulcères variqueux. Dépresseur et sédatif vasculaire : disparition des réactions douloureuses dues aux phénomènes congestifs. Sédatif utérin.

Forme et mode d'emploi. — XX à XXX gouttes avant les deux principaux repas dans un peu d'eau sucrée. Hémorroïdes : L gouttes.

Prix : 15 francs.

Laboratoires R. GOUIN

20, rue des Ecoles — PARIS (V^e).

CURATINE BRUNET

Analgésique.

Spécifique de l'élément douleur.

Composition. — Association rationnelle de : Phénacétine, Théine, Analgésine bicarbonatée.

Indications. — Grippe, Migraines, Névralgies diverses, Rhumatismes, Règles douloureuses, Algies dentaires, etc.

Posologie. — 1 à 4 cachets par jour, de préférence loin des repas, pris à sec ou mieux dans un verre d'eau ou de tisane ; n'a pas de goût désagréable.

Se vend en boîtes de 1 cachet et boîtes de 6 cachets.

Prix réglementé de la boîte :

1 cachet : 1 franc. — 6 cachets : 5 fr. 50.

Enregistrée au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N^o 32-1.

Laboratoire

de la CURATINE BRUNET

23, rue des Ecouffes — PARIS (IV^e).

CURIODE

Composition. — Combinaison organique d'iode et d'un dérivé protéique d'origine animale.

Avantages. — Entièrement assimilable, plus efficace que les iodures alcalins et jamais aucun phénomène d'intolérance ou d'iodisme. — Elimination régulière.

Propriétés. — Le *Curiode* est :

- a) *Vaso-Dilatateur* (Artériosclérose, Hypertension, etc.).
- b) *Stimulateur des organes lymphoïdes et des Séreuses* (Adénopathies, Gourme, Végétations adénoïdes, Goitre, Arthropathie).
- c) *Donne de la fluidité au sang et aux sécrétions* (Asthme; Emphysème, Toux spasmodique, Coqueluche).
- d) *Indispensable au traitement de la Syphilis.*

Indications :

- 1° *Affections cardio-vasculaires* : Artériosclérose, Hypertension, Angine de poitrine, Péricardite.
- 2° *Affections respiratoires* : Asthme, Emphysème, Toux spasmodiques, Coqueluche, Laryngite chronique, Bronchites anciennes.
- 3° *Affections des organes lymphoïdes* : Adénopathies de la scrofule et de la Tuberculose. Gourme. Végétations adénoïdes. Goitre, Arthropathies, Hydarthroses.
- 4° *Syphilis et toutes ses complications.*

Posologie. — XX gouttes correspondent à : 1 gramme de KI ou à 4 centigr. d'iode métalloïdique. Doses moyennes : XX à XL gouttes par jour, à prendre en deux fois (aux repas).

Remarque. — Quand les doses atteignent LX gouttes, il est préférable de commencer par X gouttes à chaque repas (XX gouttes par jour) et d'augmenter d'une goutte par repas tous les jours jusqu'à XXX gouttes par repas. Repos une semaine par mois.

Peut être prescrit aux Assurés sociaux.

CURIODE ARSÉNIÉ

Composition. — Combinaison organique d'iode, d'arsenic et d'un dérivé protéique d'origine animale.

Indications. — Les mêmes que celles du *Curiode* et de l'arsenic. Recommandé chez les enfants et les adultes atteints d'*affections pré-tuberculeuses* et d'adénopathies simples ou trachéo-bronchiques.

Posologie. — XX gouttes correspondant à : 1 gramme d'iodure de potassium : 5 milligr. d'acide arsénieux ; 5 centigr. de méthylarsinate de soude (arrhénal), 2 cuill. à soupe de sirop iodotannique.

Doses moyennes. — *Adultes*, XX à L gouttes par jour. *Enfants* : II à III gouttes par année d'âge.

Mode d'emploi. — A prendre en 2 fois pendant les repas. Commencer par des doses faibles et augmenter tous les jours d'une goutte par repas. Repos une semaine par mois.

TOLERANCE ET INNOCUITÉ ABSOLUES

Prix : 12 francs.

Echantillon gratuit à MM. les Docteurs
Peut être prescrit aux Assurés sociaux.

Laboratoires DORANTOWICZ

17 bis, avenue Parmentier — PARIS.

CUROGÈNE

Elixir antidouleur (forme liquide, seule rationnelle), à base de camphorate de pyramidon et de pyramidon.

Indications. — Sédation de la douleur : Migraines, Névralgies, Rages de dents, Rhumatismes, Sciaticques, Dysménorrhée, Grippe, etc.

Doses et modes d'emploi. — *Adultes* : 2 cuillerées à café; par jour : 2 à 8 cuillerées à café.

Enfants au-dessus de 5 ans : 1 cuillerée à café.

Prix au public : 14 francs.

Le flacon d'essai : 3 francs.

Laboratoire du Curogène

Docteur J. GALIMARD, *

145, rue Yves-le-Coz — VERSAILLES.

CURORAISIN

Extrait de raisin frais concentré à froid, garanti pur, vitaminé, rafraîchissant, énergétique.

Mode d'emploi. — Le CURORAISIN se boit additionné d'eau fraîche naturelle ou gazeuse (1 à 2 cuillerées à soupe par verre d'eau selon le goût).

Boisson de régime. — Environ 1/3 du flacon par litre d'eau.

Reconstituant. Régulateur de l'intestin. — 1 à 3 cuillerées à soupe à chaque repas.

Rafraîchissant, Cholagogue, Diurétique. — 1 à 2 cuillerées à soupe le matin à jeun.

Pour les *enfants*, la moitié des quantités ci-dessus peut suffire.

Prix imposé : 14 fr. 50.

A. DELOUCHE, Pharmacien

32, rue Marius-Aufan — LEVALLOIS-PERRET (Seine).

Téléphone : Wagram 85-15.

Dépositaire général :

Office Commercial Pharmaceutique Paris.

CUROXYURE

Traitement efficace des oxyures.

Forme. — Pommade en tube muni d'une canule en os.

Composition. — Acide thymique, naphthaline; savon médicinal; extraits d'absinthe et de tanaïsie.

S'applique aussi bien aux enfants qu'aux grandes personnes, *sans aucun danger*.

Prix : 4 francs.

Laboratoires B. E. A.

Ch. BEHA, Pharmacien de 1^{re} classe
BELFORT.

CUSCUTINE FOULON

Indications. — Laxatif doux, très actif. Stimule les sécrétions intestinales et décongestionne le foie.

La Cuscutine peut être prise pendant la grossesse, l'allaitement, les périodes menstruelles, etc...

Composition. — La CUSCUTINE est composée d'extraits végétaux : Cuscuta, Séné, Aloïne, etc.

Posologie. — Une à 2 pilules au repas du soir.

L'étui de 50 pilules : 5 francs.

Echantillons gratuits.

FOULON et C^{ie}, Pharmaciens

20, faubourg Poissonnière. — PARIS (X^e).

CYANHERMINE

pour traitements antisyphilitiques
à base de Cyanure de mercure.

Ampoules pour injections intraveineuses.

Composition :

| | |
|---|---------------|
| Cyanure de mercure (chimiquement pur) | 0 gr. 01 cgr. |
| Sérum isotonique | 2 cc. |

Propriétés :

La Cyanhermine, étant une solution à 1/200 en sérum isotonique, réalise le maximum de tolérance.

Mode d'emploi :

Voie intraveineuse et posologie habituelle du Cyanure de mercure.

La boîte de 12 ampoules : 10 francs.

Laboratoire National de Contrôle n° 339-5.

Laboratoires CAILLAUD

37, rue de la Fédération — PARIS (XV^e).

Tél. : Suffren 12-63.

CYNUROL-ROSA

Antiurique, antiseptique et diurétique.

« Dragée la boue urique. »

« Sauvegarde l'appareil urinaire. »

« Il assure la véritable cure de diurèse et d'élimination urique et abaisse le taux de l'urée, de l'acide urique, et de la cholestérine chez les rénaux et les arthritiques, dont il améliore la tension. »

Forme. — Dragées inaltérables et très assimilables.

Composition. — *Extrait de feuilles d'artichaut* (Cynara Scolymus). Uva-Ursi, Urotropine et Salicylate double de Phényle-Pipérazine.

Indications. — a. *Maladies diathésiques* : Rhumatisme, Arthritisme, Urémie, Uricémie, Polysclérose, Lithiase biliaire et urinaire, etc.
b. *Affections vésico-rénales* : Cystite, Urétrite, Pyurie, Colibacillurie, Oxalurie, Prostatite, Oligurie, etc.

c. *Maladies infectieuses* (parallèlement au traitement spécifique) : Grippe, Angine, Fièvres diverses, etc.

d. Et toutes les fois où il faut réaliser une action antiurique, antiseptique ou diurétique. (complément de la cure hydrominérale).

Posologie. — De 6 à 12 dragées par jour, aux repas. Cure de 10 à 20 jours par mois. Peut s'administrer chez les enfants (1/4 ou 1/2 dose)

Prix : 16 francs le flacon de 60 dragées.

Laboratoires ROSA,

1, place Porte-Champerret — PARIS (XVII^e)

CYPROVEINOL

Millefeuille-Ficaire-Cupressus
sans Hamamélis ni Marrons d'Inde.

Indications. — **Congestions prostatiques, Congestions veineuses ;** Varices, Hémorroïdes, Phlébites, Ulcères variqueux, Troubles de la Puberté et de la Ménopause.

Mode d'emploi. — XXX gouttes 2 fois par jour dans un quart de verre d'eau sucrée au milieu des principaux repas.

Prix : 15 francs.

Laboratoire DEPRUNEAUX
18, rue de Beaune — PARIS (VII^e).

CYTOBIASE

Extrait opothérapique de foies frais de Morue.

(Vitamines A et D.)

Formes :

- 1^o Gouttes : Cytobiase simple. Cytobiase composé (addition de 5/1 000 d'arrhénal.)
- 2^o Granulé : association à l'extrait de foies de morue, de poudre d'os, glycérophosphates de Ca et Mg.

Action :

Fixe la chaux par son cholestérol. Stimule les défenses organiques.

Indications :

Anémies, avitaminoses, adénopathies, croissances, rachitisme, inappétence.

Posologie :

Gouttes. Enfants :

Jusqu'à 5 ans : II gouttes par année d'âge.

De 5 à 15 ans : XV à XXV gouttes.

Gouttes. Adultes :

XXX à XL gouttes.

A prendre respectivement 2 fois par jour avant les repas dans un peu de vin, bière, eau, bouillon.

Granulé. Enfants :

Jusqu'à 5 ans : 2 cuillerées à café par jour.

De 5 à 15 ans : 4 cuillerées à café par jour.

Granulé. Adultes :

2 cuillerées à soupe par jour.

Prix : Gouttes : 12 francs.

Granulé : 15 francs.

Laboratoires MARTIN

24, rue de Charenton — PARIS.

CYTO-CHOLINE

Composition :

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Chlorhydrate de Choline pur..... | 2 centigr. |
| Sérum chloruré isotonisant..... | 2 centicub. |

Indications. — L'injection de **Cyto-Choline** peut être associée aux divers traitements chimiothérapiques et collapsothérapiques de la tuberculose.

Elle est indiquée chaque fois qu'une lésion tuberculeuse est en cause, que la localisation soit pulmonaire ou extra-pulmonaire, que l'évolution soit aiguë ou chronique.

Mode d'emploi. — La **Cyto-Choline** s'emploie en injections sous-cutanées, pratiquées avec les précautions aseptiques habituelles, au niveau de la cuisse, tous les deux jours.

Comme il s'agit d'une médication ayant pour but de modifier le terrain, elle doit être poursuivie pendant plusieurs mois, sans interruption.

Résultats. — Associée à la cure hygiéno-diététique, la **Cyto-Choline** favorise le développement du processus de sclérose cicatricielle chez les tuberculeux pulmonaires, et détermine chez ces malades une amélioration des symptômes fonctionnels.

Dans les tuberculoses extra-pulmonaires, les résultats de ce traitement ne sont pas moins remarquables.

Boîte de 12 ampoules : 20 francs.

Laboratoires pharmaceutiques CORBIÈRE

27, rue Desrenaudes, 27 — PARIS (XVII^e).

Téléphone Carnot 78-II.

CYTOMAGNÉSIUM OLIVIÉRO

Halogènes du Magnésium dans leur milieu originel
L'Eau de Mer (ampoules buvables).

Indications. — Dépression nerveuse, Anémie cérébrale, Affections des Voies biliaires, Prostatites (Mictions difficiles), Entérites, Action sur les épithéliums d'où ses indications dans la prophylaxie du Cancer, Prurits, Dermatoses.

Particularité. — Médication facile à prendre ; amertume masquée. De toutes les préparations magnésiennes, c'est la mieux indiquée étant donnée sa tolérance parfaite.

Dose. — 1 ampoule par jour dans 1/2 verre d'eau, à prendre avant un repas. Chaque ampoule contient 1 gr. d'Halogène.

Prix : 18 francs.

Laboratoire de Biothérapie OLIVIÉRO

BOULOGNE-SUR-SEINE (Paris-Ouest).

Tél. : Molitor 27-06.

CYTO-MANGANOL CORBIÈRE

Médication mangano-calcique arseniée.

Le CYTO-MANGANOL constitue la médication hypodermique la plus active dans les cas d'asthénie, les états de dénutrition, la convalescence des maladies infectieuses et les troubles endocriniens.

Indications. — Déminéralisation en général et en particulier : décalcification ; dénutrition ; asthénies ; surmenage ; amaigrissement adénopathies ; lymphatisme, tuberculose.

Mode d'emploi. — En injection intramusculaire au niveau de la région fessière supérieure, en plein muscle.

Dose. — Une ampoule de 5 centicubes tous les jours ou tous les deux jours pour les adultes ; une ampoule de 2 centicubes pour les enfants.

Présentation :

Cyto-manganol pour adultes.

Boîte de 12 ampoules de 5 cc.

Prix : 22 fr.

Cyto-manganol infantile.

Boîte de 12 ampoules de 2 cc.

Prix : 16 fr.

Laboratoires pharmaceutiques CORBIÈRE

27, rue Desrenaudes. — PARIS (XVII^e).

Téléphone : Carnot 78-11.

CYTOPAN

Forme. — Vin composé de goût agréable.

Composition. — Acide phosphorique, teinture de noix vomique.

Cytopan F : Même composition que le Cytopan avec extrait fluide de fénugrec désodorisé.

Indications. — Toute décalcification, pré-tuberculose, faiblesse générale, asthénie de toute nature, surmenage physique et intellectuel.

Cytopan F : Amaigrissement.

Doses. — 1 cuillère à soupe avant les repas

Prix : 15 francs.

Laboratoire LAROZE

54, rue de Paris — CHARENTON (Seine).

CYTOPHÉDRINE

Médication préventive et curative de l'asthme.

Composition :

| | |
|-----------------------------|------|
| Ephédrine naturelle | 0,02 |
| Iodhydrate de codéine | 0,01 |
| Belladone..... | 0,03 |

En comprimés enrobés.

Indications. — Asthme bronchique, emphysème pulmonaire, dyspnée.

Mode d'emploi. — 2 à 5 comprimés par 24 heures en prises espacées, suivant la tolérance du malade.

Présentation. — En boîte métallique.

Prix : 16 francs.

Pour la médecine infantile et les traitements de longue durée :

CYTOPHEDRETTES

contenant 5 mgr. d'Ephédrine par dragée.

(Voir *Sérum antiasthmaticque* de Heckel, page 1386.)

Laboratoires pharmaceutiques CORBIÈRE

27, rue Desrenaudes — PARIS

Tél. : Carnot 78-11.

CYTO-SÉRUM CORBIÈRE

Composition :

| | |
|--|-------------------------|
| <i>Cacodylate de soude chimiquement pur.</i> | <i>Trente centigr.</i> |
| <i>Sulfate de strychnine</i> | <i>Un milligramme.</i> |
| <i>Sérum isotonisant chloruré</i> | <i>Cinq centicubes.</i> |

Mode d'emploi. — Une injection sous-cutanée ou intramusculaire tous les jours ou tous les deux jours.

Action. — Multiplie les globules rouges, stimule l'activité cellulaire et accroît la résistance de l'organisme.

Indications. — Lymphatisme, Anémies, Tuberculose. Neurasthénie. Asthénie post-grippale, Convalescences.

Présentation. — Cyto-Sérum pour adultes, 12 ampoules de 5 centicubes.

Prix : 20 francs.

Cyto-Sérum infantile, 12 ampoules de 2 centicubes.

Prix : 14 francs.

Laboratoires pharmaceutiques CORBIÈRE

27, rue Desrenaudes — PARIS (XVII^e).

Tél. : Carnot 78-11.

CYTO-SIROP

Propriétés thérapeutiques. — Adjuvant rationnel de la croissance

Indications :

- A. *Générales* : Toutes les périodes de croissance de l'enfant sain.
B. *Particulières* : Débilité congénitale et retards de croissance. Paresse intellectuelle et inertie cérébrale. Incontinence nocturne des urines
Troubles liés à la diathèse lymphatique.

Avantages :

- 1° *Composition judicieuse* : Nucléinate de Soude, Glycérophosphate de Soude, Alcoolat de cacao, extrait fluide de Kola.
2° *Aucune contre-indication.*
3° Goût très agréable.

Posologie. — Avant ou après les repas:

De 2 à 5 ans : 1 à 2 cuillerées à café.

De 6 à 9 ans : 1 à 2 cuillerées à dessert.

De 10 à 15 ans : 1 à 2 cuillerées à soupe.

Prix : 16 francs.

Laboratoire des SPÉCIALITÉS CABASSON

A. GROS-CAVALIER, Pharmacien.

183, rue de Rome — MARSEILLE.

DÉCHOLESTROL

Cure de décholestérinisation.

Composition. — Association alcalino-formique + SO^4Mg .

Propriétés :

1° Stimule et draine le foie.

2° Aide à la résorption des scléroses.

Mode d'action. — Le *Décholestrol* abaisse le taux de la cholestérine, dans le sang et dans les tissus. Dissout la Cholestérine précipitée. Facilite la résorption des scléroses. Excite la fonction hépatique. Draine les voies biliaires.

Indications. — 1° *Toutes les manifestations de l'hépatisme.* Cholémie familiale, Lithiase biliaire, Cholécystites, Insuffisance hépatique, et toutes ses conséquences (migraine, urticaire, prurit, eczéma, dyspepsie hépatique).

2° *Toutes les manifestations de l'Arthritisme.* Hypertension artérielle, Diabète, Obésité, Goutte, Aortite, Angine de poitrine, Artério-sclérose et ses troubles : bourdonnements d'oreille, surdité et troubles oculaires des scléreux, temporale sinueuse, *xanthome*, *xanthélasma des paupières*, *arc sénile*, *cataracte*, Dystrophie des Goutteux, et de certains rhumatisants chroniques.

Pas de contre-indication.

Posologie et mode d'emploi. — Chaque mois, pendant 12 jours, prendre matin et soir avant les repas, un paquet de *Décholestrol*, dans un demi-verre d'eau ordinaire, ou minérale, tiédie de préférence.

Présentation et prix. — La boîte de 24 paquets : 16 francs.

Littérature et échantillon sur demande :

Laboratoire du DÉCHOLESTROL

M. et P. LEDENT, Pharmaciens,
MONTREUIL-SUR-MER.

DECORPA

Mucilage spécial contre la faim.

Mucilage pur, sans adjonction médicamenteuse, gonflant en milieu acide, indigestible, inassimilable, infermentescible ; « faux repas », remplissant l'estomac (après gonflement), illusionnant le tube digestif, assurant ses fonctions mécanique, sécrétoire et éliminatoire ; ne nourrissant pas.

Action. — Supprime la sensation de faim. — Maintient l'équilibre du tube digestif. — Evite la constipation des hypoalimentés. — Ne nourrit pas, mais rend tolérables les régimes de restriction alimentaire, même le jeûne complet.

Indications. — Adjuvant indispensable de toutes les cures de régime avec restriction alimentaire prescrites chez : *Obèses, Hypertendus, Pléthoriques, Urémiques, Uricémiques, Artério-Scléreux, Boulimiques, etc.*

Doses. — 2 à 3 cuillerées à café, 1 heure avant le repas (pour que le sujet se mette à table sans appétit), ou quand la faim se fait sentir.

Prix : 18 francs.

Laboratoires NORGAN

Pierre ALEXANDRE, Pharmacien

41, rue de Rome — PARIS (VIII^e). Tél. : Lab. 08-00.

DELBIASE

Comprimés de sels halogénés de magnésium

Stimulant biologique général

par hyperminéralisation magnésienne.

Méthode cytophylactique du professeur Pierre Delbet.

Indications thérapeutiques particulières. — Asthénie et fatigue générale. Surmenage, Convalescence des maladies infectieuses. Dépression de certains malades devant être opérés. — Entérite chronique (désodorisation des selles), Constipation habituelle, Cholécystites, Angiocholites et toutes infections des voies biliaires. — Tremblements séniles ou autres : Maladie de Parkinson, Sclérose en plaques, Contractures et Crampes. — Troubles cardiaques par hypervagotonie. — Affections de la peau, Prurits, Eczéma chronique, Psoriasis, Acné Verrues. — Adénome prostatique. — Lésions du type précancéreux et prophylaxie du cancer.

Mode d'emploi et doses. — De 2 à 4 comprimés par jour, selon qu'il s'agit d'obtenir une simple action stimulante, ou que l'on désire, au contraire, lutter énergiquement contre un état pathologique déjà institué, surtout s'il revêt un caractère un peu menaçant. Faire dissoudre les comprimés dans un demi-verre d'eau, à prendre immédiatement avant le petit déjeuner.

La boîte de 48 comprimés. Prix : 15 francs.

— 96 —

26 —

Laboratoire de PHARMACOLOGIE GENERALE

D^r Ph. Chapelle, 8, rue Vivienne — PARIS.

DELCAÏNE ROQUES

Chlorhydrate de pseudococaïne drolte

Cocaïne aneuphorique par double isomérisation stéréo-chimique.

Trois fois plus active, trois fois moins toxique que la cocaïne officinale. N'est pas un stupéfiant, **ne figure pas au tableau « B »**.

Emplol. — Anesthésie locale, régionale, rachidienne. Anesthésie par instillations, badigeonnages.

Forme. — Solutions à 0,5 %, 1 %, 2 % en ampoules de 1, 2, 5 et 10 cc. pour anesthésie locale, régionale. Dispositif pour préparation extemporanée pour injection rachidienne.

Ampoules de Delcaïne crist. pour rachidelcaïnisation.

Flacons de 15 cc. et 50 cc. à 5 % et 10 % et

Bonain à la Delcaïne pour anesthésie par contact. Delcaïne en poudre, flacon de 2 gr.

Etablissements ROQUES

36, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie
PARIS (IV^e).

DEMALGON

Composition. — Un comprimé — 0 gr. 18 de Bromodiéthylacétylurée et 0 gr. 27 de Diméthylaminophényldiméthylpyrazolone.

Actions. — Synergie anti-algique à action rapide, sans accumulation ni accoutumance, ne déterminant aucune somnolence, anti-pyrétique.

Indications. — Toutes algies, céphalées, migraines, névralgies, sciatiques, pulpites et toutes algies dentaires, dysménorrhée, douleurs tabétiques, maladies infectieuses fébriles.

Posologie. — Analgésique : 1 à 2 comprimés à renouveler si nécessaire.

Fébrifuge : 1 à 2 comprimés 3 fois par jour.

Un quart de dose pour les enfants.

Présentation et prix. — Tubes de 10 comprimés : 13 fr. 50.

Laboratoire R.-L. MATHIVAT

66, rue de la Pompe — PARIS (XVI^e).

Tél. : Trocadéro 32-91.

DENISOLINE

Lotion colloïdale au Soufre électro-négatif.

Propriétés thérapeutiques. — Décongestionne les tissus sanguins sous-épidermiques ; apporte au derme le soufre déficitaire et rend la peau souple, ferme et saine.

Indications. — Acné sous toutes ses formes. Etats séborrhéiques, Pityriasis.

Mode d'emploi. — Une application le soir à l'aide d'un tampon d'ouate hydrophile. Laisser sécher.

Laboratoires BRISSON

Dr DEDET ET Cie, Pharmaciens.

Anciens Internes des Hôpitaux de Paris.
157, rue Championnet — PARIS (XVIII^e).

DÉPURATIF-ROB LECHAUX

Aux sucS végétaux concentrés et KI.
Publicité uniquement médicale. Le Rob Lechaux est prescrit par le médecin.

Indications. — *Cure de désintoxication générale.* Printemps et automne.

Action. — Immédiate. Augmentation de toutes les sécrétions des glandes externes et internes. Abaissement de la tension sanguine. Désintoxication.

Dose. — Une cuillerée à soupe le matin à jeun pendant 2 mois. Une autre cuillerée à soupe le soir si nécessaire.

Le flacon : 14 fr.

Dépôt général :

49, rue de Maubeuge — PARIS (IX^e).
Echantillons sur demande.

DÉPURIODE

du D^r Roger Weber.

Dépuratif diurétique, ioduré, sans sucre ni alcool.

Une cuillerée à soupe contient
0 gr. 25 d'iodure de potassium.

Formule. — Extraits de bardane stabilisée, de fumeterre, de patience, de salsepareille, de pensée sauvage, de guaco, de stigmates de maïs, de noyer stabilisé : à à 2 gr. Réglisse : 5 gr. Iodure de potassium 16 gr. 70. Pour 1.000 cmc.

Indications. — Furunculose, clous, anthrax, orgelets, éruptions, boutons, rougeurs, eczémas, impétigo, gourme, dartres, herpès, aphtes, scorbut, acné, psoriasis, urticaire, démangeaisons, dermatoses.

Arthritisme, uricémie, rhumatisme chronique, goutte, douleurs, névralgies, lumbago, sciatique, obésité.

Artériosclérose, athérome, hypertension, étourdissement, vertiges, mouches volantes, bourdonnements, céphalée, troubles cérébraux, pouls fort et tendu, signe de la temporale, crampes musculaires, refroidissement et engourdissement des extrémités, sensation de doigt mort, congestion, couperose, âge critique, scléroses, myocardite chronique, aortite, asthme cardiaque, angine de poitrine, bronchite chronique, emphysème, asthme, cirrhoses, ictère spécifique, néphrite interstielle, albuminurie spécifique, oligurie, myélites, tabès, névrites, paralysies, infections et intoxications, spécificité, bacillose, lymphatisme, scrofule, adénites, mycoses, actinomycose, alcoolisme, tabagisme, saturnisme, grippe, goître, abcès, suppurations, etc.

Mode d'emploi et posologie. — 20 jours par mois au milieu de chacun des deux principaux repas, dans un demi-verre d'eau.

Adultes (dose moyenne) : 1 cuillerée à soupe. Contre artériosclérose et hypertension : 1 cuillerée à dessert.

Enfants : au-dessus de 5 ans (dose moyenne) : 1 cuillerée à café.

Prix du flacon : 18 francs.

Laboratoire Angellin

61, rue de Seine — PARIS (VI^e).

Téléphone : Danton 92-73.

DERMACIDE PORCHER

L'abus des lavages et des savonnages alcalins détruit l'acidité normale de la surface de la peau. — pH, moyen 4 — Celle-ci protège l'épiderme contre l'infection des microbes usuels, qui s'accommodent mal ou ne tolèrent pas un milieu d'une telle acidité.

En outre, on a remarqué que les acides diminuent les démangeaisons, tandis que les alcalins les exacerbent (Darier).

DERMACIDE se substitue aux savons, dont l'alcalinité est constante, dans tous les cas où cette alcalinité est contre-indiquée.

Caractéristiques. — 1° Il contient à l'état libre : acide acétique, 0,60 : Tartrique, 1,10 ; Salicylique, 0,25 ; Benzoïque, 0,20 p. 100.

2° Il s'emploie et nettoie comme le savon, et mousse malgré l'acidité.

Indications. — **Epidermomycoses en général** : Epidermophyties, Pityriasis versicolore, ainsi qu'Eczématides et Intertrigos. — **Affections kéroïques** : Séborrhée grasse, Acnés. — **Prurits**, Pyodermes, Psoriasis. — Affections gynécologiques.

Mode d'emploi :

Dermacide liquide remplace les savons liquides. *Comme agent de nettoyage* : verser sur l'épiderme sec une petite quantité de Dermacide liquide, frotter jusqu'à mousse, ensuite, mouiller légèrement et ajouter une nouvelle quantité de Dermacide. *Comme shampoing* : 2 cuillerées à bouche dans la valeur d'un verre d'eau. *En gynécologie* : injections à la dose d'une à trois cuillerées à bouche dans un litre d'eau.

Dermacide pain remplace le pain de savon (Voir prospectus pour usage).

Dermacide pâte, crème de toilette, sans corps gras, sèche assez rapidement, ne tache pas et s'enlève à l'eau. *D'action plus profonde que les autres formes*, on l'emploie en onctions d'une durée de cinq à dix minutes, 2 à 3 fois par jour, enlever chaque fois à l'eau. Sur les lésions peu sensibles porter progressivement la durée à une demi-heure et même toute la nuit.

Traitement. — *Supprimer complètement le savon*, le remplacer comme agent de nettoyage par dermacide liquide ou pain.

Traiter les lésions irritées, d'abord par dermacide liquide ou pain, la mousse restera en contact quelques minutes, rincer ensuite à l'eau (la sensation de picotement, que déterminent parfois les premières applications, disparaît rapidement). Après quelques jours, commencer les applications de pâte.

Chez les séborrhéiques, dans les mycoses, continuer durablement l'usage du **dermacide** comme agent de nettoyage.

Dermacide pain. Boîte de 1 pain : 6 fr. 25 ; 3 pains : 18 francs.

Dermacide pâte. Tube étain : 13 fr. 50.

Dermacide liquide. Flacon : 15 fr. litre : 32 francs

Laboratoires PORCHER

35, rue des Blancs-Manteaux — PARIS (IV^e).

DERMODULCIS LAGOUTTE

Composition et forme. — Pâte neutre en tube aseptique à base de : oxyde de zinc, amidon, huile de noyaux, lanoline et vaseline pure : à p. e.

Actions thérapeutiques. — Isolante, adoucissante, astringente, siccative. S'étend facilement et s'enlève aisément.

Indications. — Erythèmes, Eczémas aigus ou chroniques, Dermites aiguës de natures diverses. Radio-dermites, Prurigo, Impétigo, Herpès, Séborrhée, Dartres, Ulcères des jambes, Crevasses, Pansements chirurgicaux, Fistules, Anus artificiel.

Mode d'emploi. — En onction matin et soir.

Prix du tube de 60 gr. : 10 francs.

Son efficacité est heureusement complétée par la DERMODULCIS (Poudre) adhérente, infermentescible, adoucissante.

Prix de la boîte : 6 francs.

Laboratoire LAGOUTTE

85, cours Albert Thomas. — LYON (III^e).

DERMOFAGINE

Crème pommade, légèrement parfumée, en tube.

(Extr. de hêtre.)

Propriétés. — Antiparasitaire, Antiseptique, Antiprurigineuse cicatrisante.

Indications. — Toutes les Dermatoses, principalement les Dermatoses sèches, Pityriasis du visage (dartres) ; du cuir chevelu (pellicules).

Eczémas secs, chroniques, hyperkératosiques.

Eczémas séborrhéiques (séborrhée concrète des vieillards verrues plates séniles).

Impétigo, Herpès : Tricophyties (herpès circinné).

Toutes affections croûteuses et pelliculaires du cuir chevelu.

Erythèmes, crevasses, Hémorroïdes.

Irritations de la peau, rougeurs, engelures, par rasoir, fards, intempéries.

La *Dermofagine* est une excellente crème de toilette.

Prix au public : 12 francs.

Donner en même temps à l'intérieur un dépuratif (chologogue et diurétique), le **Raiforyl** (granulé) à la dose de 4 ou 5 cuillerées à café par jour.

Prix au public : 12 francs.

Laboratoires de la DERMOFAGINE

15, pl. Godefroy-de-Bouillon — BOULOGNE-SUR-MER (Pas-de-Calais).

DERMO-PLASTOL DUMESNIL

(Plastols Dumesnil.)

Forme avec le *Zébo-Plastol* et le *Crémo-Plastol* le groupe des Plastols Dumesnil, pâtes poreuses composées, très homogènes et destinées à être appliquées sur la peau, à la manière des pommades, dans toutes les dermatoses dont le type est l'eczéma sous toutes ses formes.

Propriétés. — Le Dermo-Plastol est la préparation qui convient au plus grand nombre de cas ; il calme immédiatement les démangeaisons et assure la réparation intégrale des tissus malades.

Indications. — Les *Plastols* peuvent être appliqués sur toutes les parties du corps ou des membres ; eczémas de la vulve ou du rectum, psoriasis, parakératoses psoriasiformes de Brocq, eczémas séborrhéiques de Unna, prurits avec lichénification et eczématisation, pityriasis, impétigo, prurigo, etc.

Enregistrés au Laboratoire national de Contrôle sous les nos 1-1, 1-2 et 1-8.

Prix : 20 francs, le 1/2 pot 12 francs.

Laboratoires DUMESNIL
10, rue du Plâtre — PARIS.

DERMORADOL

Complexe à radioactivité stabilisée.

Composition. — Pommade à base de **Bromure de Radium** associé aux meilleurs topiques usuels (soufre, camphre, Pix betulina, oxyde de Zn).

Propriétés. — Action particulière du Radium sur les réactions inflammatoires locales.

Accentuation des propriétés de chacun des topiques, par radioactivité induite.

Le **DERMORADOL** calme l'irritation et la douleur dès la première application. Cicatrise rapidement toutes les dermatoses.

Indications. — Acné, brûlures, eczémas, érythèmes, furoncles, herpès, impétigo, prurits, plaies atones, psoriasis, ulcères variqueux.

Prix : le tube, 18 francs.

Publicité. — Exclusivement médicale.

Établissements LABORADIUM
33, rue Saint-Jacques — PARIS.

DERMO-RHINHISTOL

TOPIQUE MIXTE GRAS

OPOTHÉRAPIQUE ET CHIMIOTHÉRAPIQUE

à base de poudre d'embryon total

RÉGÉNÉRATEUR CELLULAIRE DES TISSUS
de la
PEAU DE TOUTES RÉGIONS ANATOMIQUES
et de la
MUQUEUSE DU RHINO-PHARYNX

— PRÉSENTATION —

PRÉSENTÉ SOUS FORME DE POMMADE STABLE

— COMPOSITION —

| | |
|-------------------------------|----------|
| Poudre d'embryon total..... | 2 gr. |
| Calomel..... | 4 gr. |
| Camphre des Laurinées..... | 1 gr. 50 |
| Goménol..... | 1 gr. |
| Essence de pin sylvestre..... | 1 gr. |
| Eucalyptol..... | 0 gr. 30 |
| Menthol..... | 0 gr. 20 |
| pour 100 gr. | |

Essence aromatique..... q. s.

Excipient : vaseline et lanoline pures, neutres et stérilisées.
N. B.— La préparation opothérapique de poudre d'embryon total employée est faite à partir de fœtus frais provenant d'animaux récemment abattus, rigoureusement sélectionnés et contrôlés. Chaque fœtus ou embryon est desséché dans le vide et à froid avant d'être pulvérisé. La poudre d'embryon total ainsi obtenue est garantie pure et sans odeur. Sa conservation est indéfinie.

— INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES —

DERMATOLOGIE — TRAUMATOLOGIE

(Toutes les dermatoses) (Toutes plaies et brûlures)

OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE

Rhinites — Pharyngites — Otites

Coryza — Rhume de cerveau — Ozène

Antisepsie nasale indirecte par stimulation des tissus
et

Antisepsie nasale directe microbicide par action chimique
prophylactiques
contre certaines infections
(grippe, diphtérie, tuberculose, etc...)

CONVIENT A TOUS LES AGES

AUCUNE CONTRE-INDICATION

— MODE D'EMPLOI —

Pansements divers — Onctions — Aspirations nasales
(Applications renouvelées plusieurs fois par jour.)

— PRIX DE VENTE IMPOSÉ —

Le tube de 40 gr. (Modèle unique) : 16 fr.

LABORATOIRES DU DOCTEUR L. DELALBRE

PRODUITS PHARMACEUTIQUES SPÉCIALISÉS

Opothérapie - Colloïdothérapie micellaire - Phytothérapie

DÉPOT GÉNÉRAL

2, R. CLAUDE MATRAT - ISSY-LES-MOULINEAUX (Seine)

Fabrication Française.

Téléph. : MICHELET 24-11,

G. R. LANG, Pharmacien de 1^{re} classe

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

DERMOSPLÉNINE

Extrait désalbuminé aqueux de rate.

Communication à la Société Médicale des Hôpitaux (Paris, 5 décembre 1930).

Eczémas secs et suintants, aigus et chroniques.

Prurits — Urticaires — Œdème de Quincke.

Ampoules de 2 centicubes correspondant à 25 gr. de rate fraîche de veau.

Mode d'emploi. — *Injection intramusculaire.* —

Commencer le traitement par l'injection de 2 ou 3 ampoules à la fois ; une injection tous les 2 jours ; dès que le prurit est nettement atténué et que les lésions cutanées commencent à s'effacer, l'on peut réduire la dose à une ampoule, également tous les 2 jours.

Références cliniques : Lipospléninine du D^r Groc, 14, rue des Minimes, Paris (III^e).

Vente :

J. OLIVE, pharmacien

14, rue des Minimes — PARIS (III^e).

Tél. : Archives 03-94.

DÉSENSIBILYSINE

Traitement de l'asthme et de l'emphysème (méthode du D^r Paul Cantonnet).

Traitement principal d'attaque :

1^o Soluté de polypeptone iodée et de chlorure de calcium jaborandique injectable.

La boîte d'ampoules : 40 francs.

Traitements adjuvants et de maintien :

Pulvérisations huileuses (aérol, trachéol).

Aérol : Le flacon avec pulvérisateur : 60 francs.

Le flacon de rechange : 25 francs.

Trachéol : Le flacon : 20 francs.

2^o Pilules de Pilo-chlorine.

Pilo-chlorine : Le flacon : 25 francs.

Traitement forme bronchitique :

Stock-vaccin bronchitique Beauvy-Cantonnet.

La boîte : 40 francs.

Laboratoires BÉLIERES

19, rue Drouot — PARIS (IX^e).

DÉTENSYL

Hypotenseur végétopolyhormonique.

Composition. — Gui, Hépatine, Pancréine, Pulmine.

Dose. — 3 ou 4 dragées par jour (de préférence avant les repas) amènent un abaissement rapide et durable de la tension artérielle. — Les symptômes alarmants sont immédiatement amendés.

Indications. — Hypertension artérielle, troubles de la ménopause, menaces d'hémorragie cérébrale chez les pléthoriques, troubles oculaires et auditifs provoqués par l'hypertension.

Prix : Le tube de 36 dragées, 16 fr.

Laboratoire du DETENSYL

8, avenue Walkanaer — NICE

DEXTROSOL

«d» Glucose raffiné : $C_6H_{12}O_6$, H_2O .

Présentation. — Poudre blanche sucrée, soluble.

Indication. — Diététique de premier ordre dans tous les cas où un redressement rapide est nécessaire sans taxer l'appareil digestif. — Correctif immédiat de l'hypoglycémie et des troubles qui s'y rattachent, spasme, épuisement, etc. — Pneumonie, Myocardite. — Préventif des troubles dus à la narcose, convalescence, surmenage. — Alimentation des enfants.

Mode d'emploi. — Le Dextrosol peut se prendre sous forme d'eau sucrée, ou servir à sucrer des boissons telles que le thé, le café, les citronades, etc...

On peut en absorber quotidiennement des doses importantes sans inconvénient.

Pour les nourrissons, une cuillerée à café 6-10 gr. par biberon de 100 gr.

Prix : 6 francs la boîte de 250 gr.

3 fr. 50 la boîte de 125 gr.

Société des PRODUITS DU MAIS

29, rue de Berri — PARIS.

DIABÉTIFUGE

Spécialité synthétique antidiabétique à base de bioxyde de manganèse, de bicarbonate de soude, de chlorhydro-méthylarsinate de lithine, d'antipyrine, de nitrate d'urane et de santonine.

Médication complémentaire de l'Insuline.

Doses. — Un cachet, le matin et l'après-midi, avec un demi-verre d'eau minérale, Pougues de préférence. Continuer pendant 10 jours : diminuer, s'il y a lieu, après analyse du sucre ; cesser au bout de 20 jours. Repos de 20 jours et reprendre.

Prix au public : 25 francs.

Autorisé par les *Assurances Sociales*.

Laboratoire des Produits SCIENTIA

Dr E. PERRAUDIN, pharmacien
21, rue Chaptal — PARIS. (IX^e).

DIABÉTOSAN

Comprimés

Principes actifs obtenus par dialyse de germes d'une espèce sélectivement cultivée d'orge, dont la germination est conduite dans des conditions de temps et de température rigoureusement déterminées, sans aucune autre association chimique ou organique (*C. R. Académie des Sciences*).

Propriétés thérapeutiques. — Action hypoglycémisante constante et prolongée. Diminution parallèle des taux de sucre sanguin et urinaire.

Indications. — Diabète moyens et légers, Hyperglycémie, Polydipsie, Polyurie, Meilleure utilisation des substances hydrocarbonées. Adjuvant du traitement entre les cures d'insuline.

Posologie. — 8 à 12 comprimés par jour en trois fois au cours des repas.

Enfants : demi-doses.

Prix : 15 francs.

Établissements SOUDAN

48, rue d'Alésia — PARIS (XIV^e).

DIADERMINE

Excipient pour pommade. Crème de toilette.

Définition. — La Diadermine est un savon mou à la glycérine, sans odeur, inaltérable, absolument neutre, soluble dans l'eau et les sérums et pénétrant très rapidement l'épiderme.

Indications. — Remplace la vaseline, l'axonge et la lanoline dans la préparation des pommades médicamenteuses, *éteint le mercure. Touchers*, ne graisse pas et n'abîme pas les gants.

Massages, Soins de la peau. Brûlures, Engelures, Gerçures du sein. Prévient et guérit l'érythème fessier du nouveau-né.

Prix de vente au public : Pot : 6 fr. 40 ; Tube : 4 fr. 75

DIADERMINE U. V.

A base de crème Diadermine et de sels de quinine. Empêche la photo-sensibilisation de la peau par les rayons ultra-violets.

Indications. — *Prévient et guérit les coups de soleil* (supprime la douleur en quelques minutes. Fait disparaître l'érythème en 24 heures).

Protection de la peau au cours des traitements par rayons ultra-violets ou rayons X (empêche la radiodermite).

Mode d'emploi. — *Préventivement.* Enduire la partie à protéger d'une légère couche de Diadermine U. V.

Curativement. — Mettre sur l'érythème une couche épaisse de Diadermine U. V. Panser sous gaze stérilisée.

Prix de vente au public : Grand tube : 20 francs ;
Tube moyen : 8 francs.

DIADERMINE B. B.

Poudre minérale hygiénique stérilisée à 125° (complément de la crème Diadermine pour les soins de la peau).

Présentation. — En boîtes poudreuses hermétiques (en aluminium).

Indications. — Toilette des nouveau-nés : prévient et guérit l'érythème fessier. *Adultes* : toutes irritations de la peau, intertrigo, dermatoses. *Feu du rasoir.*

Prix de vente au public : la boîte 7 francs.

Conditions spéciales au Corps Médical.

Remise 40 p. 100.

Echantillons sur demande à

BONETTI Frères

60, rue Etienne-Dolet — MALAKOFF (Seine).

DIAGNOTHORINE

Solution colloïdale à 25 p. 100 d'Oxyde de Thorium pour l'exploration radiologique du tube digestif.

Indications. — L'étude des contours des segments du tube digestif est obtenue par l'emploi de la GELOBARINE (voir p. 752). La DIAGNOTHORINE révèle les *plis de la muqueuse* dans tous leurs détails.

Présentation. — Flacons de 60 cc.

Posologie et mode d'emploi. — Pour un examen : en général 2 cuillerées à soupe, à faire ingérer par petites gorgées au moment de l'examen, le malade n'ayant rien absorbé dans les 8 heures précédentes.

La Diagnothorine peut également s'administrer par voie rectale pour l'examen des plis de la muqueuse du gros intestin.

Société Parisienne d'Expansion Chimique
« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

DIALACETINE CIBA

Sédatif — analgésique.

Diallylmalonylurée et éther allylique du paracétaminophénol. Action sédatrice, analgésique et antipyrétique permettant d'instituer une thérapeutique efficace et sûre dans l'ensemble des cas où l'irritabilité nerveuse compte parmi les symptômes dominants.

Indications. — Agitation et délire au cours des maladies aiguës. Epilepsie, Hystérie, Névroses diverses, Angine de poitrine, Névralgies, Lumbago, Insomnie des tuberculeux.

Doses. — Dose sédatrice : 1 à 3 comprimés par 24 heures, par 1/2 ou 1 comprimé, avec intervalle de 2 à 5 heures. Dose hypnotique et analgésique : 1/2 à 2 comprimés au maximum.

Le tube de 15 comprimés : 13 francs.

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND
109-113, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.

DIAL CIBA

Hypnotique antinerveux.

Diallylmalonylurée. Hypnotique actif et rapidement éliminé, d'où réveil normal, non suivi d'hébétude. Procure un sommeil calme et réparateur et, à dose modérée, n'a jamais d'action nocive, même par son usage prolongé.

Indications. — Insomnie nerveuse en général et chez les agités, les émotifs, les surmenés. Etats démentiels.

Comprimés, Gouttes et Ampoules (Dial soluble).

Doses. — 1 ou 2 comprimés (au coucher pour les insomnies du soir; au réveil pour celles du cours de la nuit). XXX à LX gouttes. 1 ou 2 ampoules.

Le tube de 12 comprimés 8 francs.

Le flacon Dial Soluble..... 11 —

La boîte de 5 ampoules Dial soluble. 10 —

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND
109-113, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.

DIALINE

Définition :

Dialine = Cire + Huile + Eau.

La Dialine est un cerat semi-fluide, inaltérable, neutre et non parfumé, présenté en un tube.

Indications :

Fluide, grâce à la forte proportion d'huile, la Dialine remplace l'eau et le savon irritants dans la toilette quotidienne des peaux délicates.

Protective, grâce à la cire.

Décongestive, grâce à l'eau, la Dialine est particulièrement indiquée pour la nuit, le massage, les soins de la peau et, en général, pour l'hygiène cutanée des peaux délicates.

Le tube de 100 gr. environ : 18 francs.

Etablissements C. I. P.

128, rue Vieille-du-Temple — PARIS (III^e).

DIALYL

Dissolvant urique.

Médicament-type de l'arthritique et du rhumatisant.

Indications. — Diathèse urique, Rhumatismes, Goutte, Sciatique, Névralgies, Migraines, Lumbago, Gravelle, Calculs, Coliques néphrétiques et hépatiques, Dermatoses, Surmenage physique ou intellectuel.

Forme. — Granulé effervescent.

Posologie. — Deux cuillerées à café par jour, chaque cuillerée dans un peu d'eau, entre les principaux repas. — Dans les crises aiguës, 4 à 6 cuillerées à café par jour.

Prix au public : 12 fr. le flacon.

Laboratoire ALPHONSE BRUNOT

16, rue de Boulainvilliers — PARIS.

Téléphone : Auteuil 20-21.

DIASCLÉROL

du Docteur GUERSANT

Composition. — Association Sédobenzyl ($C^6 H^5 CH^2 SO^3 K$) (antispasmodique, hypotenseur), hydrate de pipérazine, salicylate de lithine et hexaméthylènetétramine pur (Dose faible) en milieu citraté.

Indications. — Diathèse urique, Hypertension, Artério-sclérose, Arthritisme, Goutte, Gravelle. Rhumatismes, Coliques hépatiques et néphrétiques, Obésité.

Dose et mode d'emploi. — Granulé effervescent, 2 à 6 cuil. à café par jour, dans un peu d'eau, vingt minutes avant les repas.

Le **DIASCLÉROL** n'étant pas toxique, son emploi peut être prolongé.

Prix : 15 francs (Sans impôt).

LABORATOIRE du DIASCLÉROL

D. DONNAT, pharmacien

26, rue Norvins — PARIS (XVIII^e).

Téléph. : Marcadet 78-36.

DIASES

Composition. — Farines fraîches diastasées de céréales et de légumineuses renfermant toutes leurs vitamines.

Propriétés. — Elles réduisent au minimum le volume alimentaire à absorber. Grâce à une pré-digestion s'opérant pendant la cuisson, elles permettent l'obtention de bouillies très concentrées possédant une agréable fluidité.

Sans aucun surmenage des organes digestifs, elles assurent une suralimentation rationnelle.

Indications. — Nourrissons (particulièrement au moment difficile du sevrage), Enfants, Malades, Convalescents, Vieillards. Tous les malades à régime : Cardiaques brightiques, Rhumatisants, Dyspeptiques, Tuberculeux, Cachectiques.

Mode d'emploi. — Délayer parfaitement et à froid 3 cuillerées à soupe (soit 50 grammes environ) de Diase dans environ 10 à 15 cuillerées à soupe d'eau, de lait, de bouillon de légumes ou de viande. Chauffer à *feu très doux*, en remuant; la préparation s'épaissit d'abord, puis s'éclaircit. Elle est prête alors à recevoir tous les condiments (sel, beurre, épices) qu'on désire lui ajouter.

Nomenclature.

DIASE CACAO : Déjeuners et goûters pour adultes et enfants. La boîte de 1/3 de kilo : 8 fr. ; de 1 kilo : 22 fr.

DIASE CÉRÉALE sans sucre : Bouillies très fluides pour bébés au biberon, enfants et adultes délicats. La boîte de 1/3 de kilo : 7 fr. 50 ; de 1 kilo : 20 fr.

DIASE CÉRÉALE sucrée : Diase complète aromatisée, recommandée pour les enfants en bas âge. La boîte de 1/3 de kilo : 7 fr. 50 ; de 1 kilo : 20 fr.

DIASE LÉGUMINEUSE : Potages excellents instantanés. La boîte de 1/3 de kilo : 7 fr. 50 ; de 1 kilo : 20 fr.

Laboratoires PROGIL

77, rue de Miromesnil — PARIS (VIII^e).

DIASTOGÈNE DEHAUSSY

Reconstituant intensif.

Composition.

Arsines, stimulant de la nutrition.

Nucléine manganésifère, catalyseur nutritif, excitant des centres hématopoïétiques.

Kola fraîche stabilisée, toni-cardiaque, éliminateur des toxines et des déchets de la nutrition.

Indications.

Chaque fois qu'il faut stimuler un organisme affaibli, une nutrition ralentie.

Formes.

Diastogène Elixir (légèrement alcoolisé).

Adultes : 2 verres à liqueur par jour, pur ou dans un peu d'eau.

Diastogène granulé. — *Adultes* : 4 à 5 cuillerées à café ; 10 ans, 2 ; 5 ans, 1.

Diastogène comprimés. — Le Reconstituant des Diabétiques : 6 par jour.

DIASTOGÈNE F

Poudre de **Fenugrec**, associée au complexe Diastogène. Le **Fenugrec**, en un comprimé glutinisé (tolérance parfaite), est incorporé au milieu du cachet.

Indications.

Amaigrissement, asthénies, convalescences.
2 à 3 cachets par jour.

Prix : 16 francs.

Laboratoires DEHAUSSY

66, rue Nationale — LILLE.

DIASTO-PEPSINE RICHEPIN

Pilules et Elixir (très agréable).

Contiennent toutes les vitamines
et hormone des glandes fraîches.

L'activité des ferments digestifs : *Pepsine*, *Pancréatine* et *Diastase* dépend de la façon dont ils ont été recueillis et préparés. Aussitôt isolés par les procédés décrits ailleurs à basse température, ils sont incorporés aux excipients spéciaux, pilule ou élixir (très agréable). Leur puissance active est ainsi bien supérieure aux agents habituels du commerce.

La digestion stomacale et intestinale est donc complète : *viandes, graisse, légumes, féculents*, etc. L'assimilation est totale : c'est le repos du *foie*, du *pancréas* et de tous les organes digestifs souvent déficients, surtout avec l'âge et la fatigue.

Doses. — 2 ou 3 pilules après les repas ou 1 verre à liqueur d'éllixir. Pour les enfants, faire fondre 1 pilule dans du lait ou 1 cuillerée à café d'éllixir dans de l'eau sucrée.

Prix :

Élixir : 15 francs. — *Pilules* : 12 francs.

Laboratoire du Docteur TISSOT

34, boulevard de Clichy — PARIS.

DICALIODE

Complexe colloïdal d'iode.

Médicament de choix pour l'administration de doses massives d'*iode libre*.

Composition et forme. — Suspension aqueuse titrant 4 p. 100 d'iode total dont 3 p. 100 d'*iode libre, métallique*, en petits grains.

Avantages. — Beaucoup plus rapidement qu'avec la teinture d'iode, on peut arriver à des doses importantes d'*iode libre* (0,50 à 1 gr. par jour). On institue pour cela une posologie par progression arithmétique.

Mode d'emploi. — Prescrire toujours le dicaliode en cc. (une mesure graduée accompagne chaque flacon) et *dans du lait froid* (de préférence avant les repas).

Indications. — *Dicaliode à petites doses* : 1 à 2 cc. par jour. Goitre. *Enfants* : perte d'appétit, ganglions, grosses amygdales, rachitisme.

Dicaliode à doses moyennes : 2 à 5 cc. par jour. Affections du cœur et des vaisseaux : **Hypertension** ; de l'appareil respiratoire (bronchite chronique, asthme, emphyseme, coqueluche, tuberculose). *Affections de la peau* : eczéma, psoriasis.

Dicaliode à hautes doses : 10 à 30 cc. par jour. Tuberculoses localisées, adénites, ostéites, iritis, rhumatisme chronique, mycoses, septicémies, syphilis tertiaire.

Prix : 17 fr. 50.

Laboratoires MAYOLY-SPINDLER

1, place Victor-Hugo — PARIS (XVI^e).

A Bruxelles : **LE MARINEL**, pharmacien

4, avenue Orban Van Volxem,

DICODÉINE LAFRAN

Indications. — Toux rebelles et toutes affections broncho-pulmonaires. Efficacité rapide.

Composition. — Codéinéméthylcodéine : 0,13 ; Aconit : 0,01 ; Belladone : 0,02 ; Terpène : 0,055 ; Benzoate soude : 0,08 ; Glycyrrhizine et Excipient : Q. S. p. 1 comprimé dragéifié.

Posologie. — Doses pour 24 heures :

Adultes : de 5 à 6 dragées.

Enfants : de 10 à 15 ans : 4 dragées ; 5 à 10 ans : 2 à 3 dragées. A prendre entre les repas avec un peu d'eau ou une tisane.

On peut également les sucer.

Littérature et échantillons aux Docteurs seulement.

Prix : 12 francs.

Laboratoires LAFRAN

8, rue de Prague — PARIS (XII^e).

DIDIAL CIBA

Hypnotique — Analgésique.

Diallylmalonylurée et diallylmalonylurate d'éthylmorphine, chaque comprimé étant formé de 0 gr. 075 de Dial pur, plus 0 gr. 025 de diallylmalonylurate. Pouvoir narcotique plus prononcé que le Dial, et action nettement analgésique, d'où indication lorsque l'insomnie est sous la dépendance de la douleur ou de l'anxiété.

Indications. — Toutes les insomnies relevant de la douleur ou de l'anxiété : algies, traumatismes, tabes, cancer, Agitation maniaque, excitation psychique. — Calmant pré et post-anesthésique.

Doses. — 1 à 3 comprimés par jour, à prendre le soir dans les cas d'insomnie due à la douleur ; par doses réfractées, aux repas dans les autres cas.

Le tube de 12 comprimés : 14 francs.

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND

109 à 113, Boulevard de la Part-Dieu — LYON

DIEMENAL

Indications. — Paludisme chronique, Paludisme, Fièvre bilieuse hémoglobininurique.

Composition. — Fer, Manganèse colloïdaux, obtenus par électrolyse.

Forme. — Ampoules isotoniques de 10 cc. en boîtes de 6 ampoules.

Mode d'emploi. — Dans le Paludisme et la fièvre Bilieuse hémoglobininurique :

Injection hypodermique ou intraveineuse d'une ampoule de 10 cc. toutes les 12 heures environ.

Dans le Paludisme chronique : Commencer le traitement par : 12 injections à raison de une par jour ;

Le continuer par : 6 injections à raison de une tous les 2 jours ;

Le terminer par : 6 injections à raison de une tous les 4 jours.

En se conformant à la posologie ci-dessus, on peut être assuré de voir les accès disparaître complètement chez le paludéen chronique, devenu le plus souvent insensible à l'action de la quinine.

Prix de la boîte de 6 ampoules : 16 fr. 50 (en France).

Laboratoire J. DEPRUNEAUX

18, rue de Beaune — PARIS (VII^e).

DIENOL

Indications. — Broncho-pneumonie, Rougeole, Coqueluche, infections septicémiques. Toutes septicémies (grippe, pneumonie, broncho-pneumonie) et tous états toxi-infectieux médicaux et chirurgicaux.

Composition. — Métaux colloïdaux, FeMn, obtenus par électrolyse.

Forme. — 1^o Ampoules isotoniques de 10 cc., en boîtes de 6 ampoules pour injections. — 2^o Tubes-doses isotoniques, de 40 cc., en boîtes de 3 tubes, pour emploi par voie rectale.

Mode d'emploi. — Une ampoule toutes les 12 heures, en injection hypodermique (indolente) ou intraveineuse. Pour la voie rectale : 3 tubes-doses par jour, généralement suffisants pour un traitement.

Quand on ne veut pas employer le DIENOL en injection hypodermique, surtout chez les enfants, on peut opérer par voie rectale.

Dans ce cas, on se servira des tubes-doses spéciaux à grande capacité, qui donneront des effets encore plus rapides et aussi puissants.

Prix de la boîte de 6 ampoules : 14 francs.

Prix de la boîte de 3 tubes-doses : 15 francs.

J. DEPRUNEAUX

Pharmacien de 1^{re} classe

18, rue de Beaune — PARIS (VII^e).

DIGALÈNE " ROCHE "

**Digitale Injectable
étalonée physiologiquement.**

Glucosides totaux de la feuille de Digitale pourpre
titrée d'après les prescriptions du Comité d'Hy-
giène de la Société des Nations.

Posologie et modes d'emploi :

Ampoules, Solution, Comprimés.

1 ampoule de 1 cc. = 75 unités-grenouille =
0 gr. 05 de feuille de Digitale titrée (standard de
la S. D. N.).

1 cc. de Solution = 150 unités-grenouille = 0 gr. 10
de feuille de Digitale titrée.

1 Comprimé = 75 unités-grenouille = 0 gr. 05 de
feuille de Digitale titrée.

Doses faibles ou d'entretien cardiotonique :

Adultes : XX gouttes. *Enfants* : I à V gouttes.

Doses moyennes ou sédatives :

Adultes : XX à XL gouttes ; 1 à 2 comprimés ou
1 à 2 ampoules (voie intramusculaire). *Enfants* :
V à X ou XV gouttes.

Doses fortes ou antiasystoliques :

Adultes : LX à CLXXX gouttes ; 3 à 6 ampoules
(Voie intramusculaire ou endoveineuse). *Enfants* :
V à XX gouttes et même 1 à 2 ampoules (cas déses-
pérés).

Propriétés thérapeutiques. — Action très rapide,
tolérance parfaite, pas d'accumulation.

Indications thérapeutiques. — Chaque fois que
le cœur faiblit.

Enregistré au Laboratoire national de contrôle des
médicaments sous les n^{os} 504-9 (ampoules), 504-11
(solution); 504-10 (comprimés).

Produits

F. HOFFMANN-LA ROCHE et C^{ie}

10, rue Crillon — PARIS (IV^e).

DIGASTRINE

(Cachets)

Composition. — Benzoate de naphthol, Charbon spécial, Pepsine, Poudre de belladone stabilisée.

Mode d'action. — Sédatif, absorbant, antiseptique intestinal; stimulant de la sécrétion gastrique, antispasmodique.

Indications. — Aérophagie, dyspepsies, embarras gastrique, fermentations intestinales, entérocolite, crampes de l'estomac, spasmes du cardia, de l'estomac, du pylore. Entérospasmes, constipation spasmodique.

Mode d'emploi. — 1 à 2 cachets à la fin de chaque repas.

Prix : 15 francs.

Laboratoire de la **DIGASTRINE**

M. DELORME, pharmacien

11, rue Saint-Agricol — AVIGNON (Vaucluse).

DIGESTIF HARVEY

Composition :

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Benzonaphthol | 50 centigr. |
| Carbonate de chaux..... | 25 — |
| Salicylate de bismuth | 25 — |
| Hydrate de magnésie..... | 50 — |
| Pepsine extractive | 10 — |
| Maltine..... | 05 — |
| Sucre anisé | 6 grammes. |

Propriétés thérapeutiques. — Régulateur de l'acidité gastrique et des fonctions digestives.

Formes. — Granulé d'un goût agréable, pouvant être croqué.

Indications. — Dyspepsies, Gastralgies, Gastrites, hyperchlorhydrie, fermentations acides, Entérites.

Posologie. — Une cuillerée à café dans un quart de verre d'eau, après chaque repas. Avant d'absorber le granulé, le laisser pendant vingt minutes en contact avec l'eau.

Prix au public : 10 francs la boîte.

Laboratoire **MALMANCHE**

Pharmacien. Docteur ès sciences,
101, avenue Paul-Doumer.

RUEIL-MALMAISON (Seine-et-Oise).

DIGESTONIC

Composition. Citrate de soude, Phosphate de Bismuth, Fluorure d'Ammonium, Macération hydro-glycérique de sedum telephum et de gonolobus condurango.

Forme. — Elixir.

Propriétés thérapeutiques. — Action sédative s'exerçant sur les terminaisons nerveuses de la muqueuse gastrique. Calme le spasme, Action anti-émétique. Pouvoir antiseptique s'opposant aux fermentations. Supprime la constipation.

Indications. — Dyspepsies hypersthéniques, hyperchlorhydrie, spasme du pylore, irritations gastriques douloureuses, motrices et sécrétoires, vomissements du début de l'ulcus, fermentations gastriques par stase, constipation.

Doses et mode d'emploi. — 1 à 2 cuillerées à soupe dans un peu d'eau ou de tisane. Répéter la dose jusqu'à cessation de la douleur. Adjonction d'un régime le cas échéant.

Prix : 17 fr. le flacon de 250 cc. environ.

Autorisé par les *Assurances Sociales*.

Laboratoire des Produits SCIENTA.

21, rue Chaptal — PARIS (IX°).

DIGIBAÏNE

Complexe tonicardiaque.
Association digitaline-ouabaïne.

Présentation et posologie. — 1° *Voie buccale.* Solution glycéro-alcoolique titrée de telle sorte que XV gouttes = 1/10 millig. : Digitaline crist. pure + 2/10 millig. ouabaïne crist. pure.

Doses faibles (cures prolongées d'entretien) : X à XV gouttes par jour.

Doses moyennes : XXX gouttes par jour en 2 fois (pendant 6 à 7 jours).

Doses fortes : XL à L gouttes par jour en 3 fois (pendant 4 ou 5 jours).

2° *Voie intraveineuse* (méthode exceptionnelle). Ampoules titrées à XV gouttes de solution par cc. (1 cc. par injection et par jour pendant 6 à 7 jours.)

Indications. — En général toutes celles des préparations digitaliques. Action plus sûre, plus rapide et plus durable. Tolérance parfaite. Agit là où tous les autres tonicardiaques ont échoué.

Remarques importantes. — La Digibaïne est la première association digitaline-ouabaïne préconisée en thérapeutique cardiaque (C. R. Soc. méd. hôpitaux de Paris ; 26 janvier 1923).

La Digibaïne est préparée *uniquement* par les Laboratoires Deglaude.

Laboratoires DEGLAUDE

Médicaments cardiaques spécialisés.

(Cardibaïne,

Spasmosédine, Théoxanthine, etc.)

15, boulevard Pasteur — PARIS (XV°).

Tél. : Suffren 79-59.

Belgique : *Agent général* : L. Prunières,
19, rue Louis-Hap — BRUXELLES.

DIGIFOLINE CIBA

Préparation digitalique totale contenant l'ensemble des glucosides cardioactifs de la feuille de digitale.

Stable, d'action constante, toujours bien tolérée rigoureusement dosée.

Indications. — Celles de la digitaline et de la digitale, par voie buccale, hypodermique et intraveineuse. Plus spécialement lorsque le foie est gros (ampoules) et lorsqu'il y a lieu de stimuler la diurèse.

Posologie. — Celle de la poudre de feuille de digitale, à laquelle elle correspond poids pour poids.

Formes pharmaceutiques. — Comprimés de 10 cgr. = 10 cgr. poudre de feuilles. — Ampoules de 1 cm³. = 10 cgr. poudre de feuille.

Le tube de 25 comprimés : 14 francs.

La boîte de 5 ampoules : 15 —

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND

109. à 113, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.

DIGI LANATINE

Gouttes. — Ampoules.

Composition. — Glucosides du *digitalis lanata*, digitale cultivée très supérieure à la digitaline purpurea ou digitale sauvage, cette dernière renfermant des quantités de glucosides extrêmement variables suivant l'endroit où elle a été récoltée, alors que le *digitalis lanata* est de composition constante.

Avantages. — Constitue une sorte de « Totum Digitalique » renfermant les trois types d'aglucones isomères permettant de prévoir un parallélisme synergique dans leur action pharmacodynamique (*Archives de Pharmacie*, septembre 1933). Soluble dans l'eau, ce Totum digitalique diminue considérablement les phénomènes d'accumulation en facilitant l'élimination.

Indications. — Insuffisances cardiaques aiguës, subaiguës et chroniques.

Posologie:

5 à 50 gouttes par 24 heures.

50 gouttes : 1 mgr. de digitaline.

Cardiotonique : 3 à 4 gouttes par 24 heures.

Sédatif : 5 à 10 gouttes par 24 heures.

Prix :

Ampoules intraveineuses à 1/10^e de mgr. 18 fr. 75.

Ampoules intramusculaires à 1/10^e de mgr. 18 fr. 75.

Laboratoires PETIT-MIALHE

8, rue Favart — PARIS

DIGILANIDE « SANDOZ »

Principe glucosidique cristallisé, isolé à l'état pur du *Digitalis lanata*. Complexe naturel, organisé, des glucosides *initiaux* de la digitale. — Possède les propriétés et les avantages d'une macération qui serait parfaitement préparée et comme cristallisée.

Indications. — Toutes les insuffisances cardiaques.

Posologie. — 1 mgr. = 400 unités gr. = 3 unités ch.

Voie gastrique : Digilanide gouttes. Un tube de verre gradué allant de 1/4 de cc. à 1 cc. sert au dosage exact des gouttes.

1 cc. de solution de Digilanide = 40 gouttes = 0 mgr. 5 de Digilanide.

Doses fortes. — 3 fois par jour 3/4 de cc. à 2 fois par jour 1 cc. plus une fois 3/4 de cc. s'il est besoin. Cela fait au total 2 cc. 3/4 par jour, à administrer pendant 2 à 3 jours. On renouvelle cette dose, s'il y a lieu, tous les 8 ou 15 jours, ou 21 jours.

Doses moyennes. — 1/2 cc. ou XX gouttes 3 fois par jour, pendant 2 à 3 jours. A renouveler tous les 8, 15 ou 21 jours. Cures régulières, préventives.

Doses faibles et prolongées, 1 à 3 fois 1/4 de cc. ou X gouttes par jour. Dites doses d'entretien cardiotonique.

Voie veineuse : Ampoules de 4 cc. (2 dixièmes de mgr. par cc.).

Dose. — 3 à 4 cc. pour une injection par jour, et pendant 2 à 3 jours. A renouveler, s'il y a lieu, au bout de 5 à 8 jours, ou bien à remplacer par le Digilanide sous forme de gouttes.

Prix : Le flacon de 10 cc. de solution (voie gastrique) : 12 francs.

La boîte de 6 ampoules de 4 cc. : 18 francs.

Produits SANDOZ — 20, rue Vernier — PARIS (XVII^e).

DIGIMIALBAÏNE

Composition :

Cent gouttes contiennent :

1/3 de mmgr. de digitaline Mialhe ;

2/3 de mmgr. d'ouabaïne Mialhe.

Posologie :

Cardiotonique. — X à XV gouttes par 24 heures.

Sédatif. — XXX gouttes, 2 fois par 24 heures pendant 7 jours.

Antisystolique. — XL à L gouttes, 2 fois par 24 heures, pendant 5 jours.

Prix : 18 fr. 75.

Laboratoire du D^r MIALHE

8, rue Favart — PARIS.

DIGISTABILINE

Gouttes.

Alcoolature stabilisée de digitale.

Ne peut être pris que sur prescription et sous contrôle médical.

Indications. — Déficiences du myocarde, Arythmie complète, Hyposystolie et asystolie, Asthénie des pyrexies infectieuses générales et pulmonaires

Composition. — La *Digistabiline* « gouttes » renferme, non altéré, le complexe glucosidique de la digitale fraîche.

Mode d'emploi. — La préparation, logée en compte gouttes, peut être facilement dosée. — 7 gouttes de *Digistabiline* correspondent à 1/10 de gr. de feuilles de digitale fraîches, ou 1/10 de milligr. de digitaline.

Pharmacie Centrale de Belgique

12, rue du Téléphone — BRUXELLES.

DIGITALINE CRISTALLISÉE MIALHE-PETIT

La plus fidèle
de toutes les préparations de digitale

Titrage chimique rigoureux.

1 cc. = 50 gouttes = 0,001 digitaline cristallisée.

Effets thérapeutiques toujours identiques à eux-mêmes.

Effets physiologiques constants et contrôlés.
(Employée dans les hôpitaux depuis 1889).

Dose. — Cardiotonique : III à IV gouttes par jour. — Sédatif : V à X gouttes. — Anti-asystolique jusqu'à L gouttes dans les 24 heures.

Prix : 18 fr. 75.

Laboratoire du Docteur MIALHE

8, rue Favart — PARIS.

DIGITALINE INVAR

Produit soumis au **contrôle physiologique** le plus rigoureux ; donne les plus sûres garanties de *pureté chimique* et d'*activité constante*.

Action. — Toni-cardiaque, régularise et stimule les contractions cardiaques, diurétique cardio-vasculaire.

Indications. — Insuffisance aortique, rétrécissement mitral, affections pulmonaires, œdème, hydropisie.

Formes. — Granules roses au 1/10^e de milligr. flacons de 50. Solution au 1/1000^e, flacons de 10 et 5 cc.

| | | |
|-------------------------|----------------|--------|
| Le demi-flacon | au public..... | 11 fr. |
| L'étui de 50 granules.. | — | 11 fr. |

Pharmacie Centrale de France

7, rue de Jouy — PARIS (IV^e).

DIGITALINE NATIVELLE

Prix Orfila, 1872. Prix Desportes, 1904.
Décernés par l'Académie de Médecine de Paris.

La Digitaline Nativelle ralentit, renforce, régularise le cœur, provoque la diurèse, réduit les œdèmes.

Formes. — *Granules* au 1/10 de mgr. *Solution* au 1/1 000. *Ampoules* au 1/4 de mgr. pour injections intramusculaires. *Ampoules* au 1/5 de mgr. pour injections intraveineuses.

Indications. — Insuffisances cardiaques, Cardiopathies valvulaires, Endocardite, Myocardite, Myocardie, Péricardite, Arythmies, Tachycardies, Asthénie anté-et post-opératoire. États infectieux (pour soutenir le cœur).

Doses :

Per os : Dose faible (d'entretien) : 1/2 mgr. en 5 jours.

Dose moyenne (de soutien) : 1 mgr. en 5 jours.

Dose forte (d'attaque) : 1 mgr. 1/2 à 3 mgr. en 10 jours (jusqu'à saturation).

Injectons : 1 cc. d'une ampoule matin et soir le premier jour, puis : 1 cc. d'une ampoule par jour les 4 jours suivants.

Ampoules. Prix : 16 francs.

Granules. Prix : 12 francs.

Solution. Prix : 16 francs.

LABORATOIRE NATIVELLE

27, rue de la Procession — PARIS-15.

DIIODOTYROSINE « ROCHE »

Médicament biochimique synthétique
de la maladie de Basedow.

Médicament stable possédant toutes les propriétés essentielles et directement utiles de l'iode inorganique (solution de Lugol) et n'offrant aucun risque d'iodisme.

Indications thérapeutiques. — Tous les états hyperthyroïdiens ; tous les symptômes basedowiens.

Posologie. — 1 à 3 comprimés dosés à 0 gr. 10 par jour.

Enregistré au Laboratoire national de contrôle des médicaments sous le n° 504-59.

**Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE
ET Cie**

10, rue Crillon — PARIS (IV^e).

DINITRA

DYN

Nitrophénine pure.

Comprimés dosés à 0 gr. 025

Animateur des combustions cellulaires.

Plus actif que les extraits thyroïdiens,
moins toxique que la thyroxine,
permet des traitements prolongés.

DINITRA active l'oxydation des réserves,
élève le métabolisme basal, sans action
secondaire sur aucun organe.

OBÉSITÉ

*Hypothermies, Hyposphyxies,
Hypothyroïdies, Hypométabolismes.*

Ralentissements de la nutrition.

Posologie. — Commencer par 2 ou 3 comprimés le premier jour, et augmenter d'un comprimé chaque jour, sans dépasser un comprimé par 10 kgs. de poids corporel.

Dose maxima. — 10 comprimés par jour.
Diminuer ces doses chez les diabétiques, les albuminuriques, et en cas d'apparition de sueurs abondantes ou de fièvre.

Traitements de 8 à 10 semaines
suivis de 15 jours de repos.

La boîte de 60 comprimés : 16 francs.

La boîte-hôpital (300 comprimés) : 60 francs.

Remboursables par les Caisses d'Assurances Sociales.
(N° 734-4).

Société d'Applications pharmacodynamiques.

5 et 7, rue Claude Decaen — PARIS (XII^e).

Tél. : Diderot 37-93.

DIORADIN

Combinaison radio-active. — Médication antibacillaire.

Composition. — Sels d'iode, camphre mentholé, terpènes et Bromure de Radium.

Présentation. — Ampoules de 1 cc., 12 ampoules.

Propriétés. — Bactéricide, exaltant la phagocytose.

Indications. — Tuberculose. Tous états infectieux.

Mode d'emploi et doses. — En injections intramusculaires ou sous-cutanées, région supérieure du bras et de préférence dans la région musculaire des fesses. On injectera aux adultes une ampoule de 1 cc. et aux enfants au-dessous de 10 ans 1/2 ampoule de 1/2 cc. 30 injections quotidiennes consécutives ; continuer jusqu'à la 40^e, avec une injection tous les 2 jours. On peut recommencer une seconde série après un intervalle de 15 jours à 3 semaines.

La boîte de 12 ampoules : 22 francs.

Laboratoires CAILLAUD

37, rue de la Fédération — PARIS (XV^e).

Téléphone : Suffren 12-63.

Laboratoire national de Contrôle n° 339-4.

DIOSÉINE PRUNIER

Comprimés Fluo-Nitrités renfermant les Glycérophosphate et Formiate Sodiques associés à la Caféine.

Mode de présentation. — Présentée sous forme de pastilles comprimées pesant chacune 0 gr. 25.

Mode d'action. — La « Dioséine Prunier » diminue la tension artérielle et régularise la circulation du sang.

Indications. — Artériosclérose, Dilatations veineuses, Menstruations difficiles, Troubles de la ménopause.

Posologie. — 2 à 4 comprimés par jour, à prendre en deux fois, matin et soir, en les accompagnant d'une gorgée de liquide.

Dépositaires généraux :

CHASSAING, LE COQ et C^{ie}

(Anc. Maison Chassaing-Prunier)

1, quai Aulagnier — ASNIÈRES (Seine).

DISMINE FAVROT

Capsules glutinisées — Granulé.

Composition. — Capsules renfermant la totalité des principes actifs, glucosides et alcaloïdes retirés par un procédé spécial du BUCHU (*Barosma crenata*) à 0,05 de Salicylate de Phényle.

Propriétés et indications thérapeutiques. — *Antiseptique, urinaire, décongestif, sédatif, diurétique.*

Indiquée dans toutes les affections pyogènes et douloureuses de l'appareil urinaire : Urétrites, Prostatites, Cystites, Pyélites, Pyélo-néphrites, Coliques néphrétiques.

La Dismine Favrot n'irrite ni l'intestin, ni les reins et ne cause pas d'éruption.

MODE D'EMPLOI

Forme capsule. — Prescrite à la dose de 6 à 9 capsules par jour prises dans une gorgée d'eau à raison de 3 au lever, 3 au déjeuner et 3 au coucher.

Forme granulé. — De préférence avant les repas, prendre 3 à 4 cuillerées à café par jour, et absorber ensuite un peu d'eau.

La Dismine Favrot a été expérimentée avec succès dans les hôpitaux.

Prix : 17 francs.

Littérature et échantillons :

Laboratoires Docteur H. FERRÉ

Docteur en médecine

Pharmacien de 1^{re} classe

Membre de la Société de Médecine de Paris
6, rue Dombasle — PARIS (XV^e).

DISONYL (Ex-Nidyl)

Composition :

Extrait pancréatique désinsuliné, Phényl-éthyl-malonyl-urée, Trinitrine.

Indications :

- 1^o Troubles fonctionnels cardiovasculaires (Tachycardies, Extra-systoles, Algies cardiothoraciques, petits Spasmes artériels).
- 2^o Dystonies neuro - végétatives (Anxiétés, Insomnies nerveuses, Vertiges).

Forme. — Boîte de 60 dragées.

Posologie. — 2 à 6 dragées par jour, à prendre un quart d'heure avant les repas.

Prix de la boîte : 16 francs.

Laboratoires du Dr ROUSSEL

97, rue de Vaugirard — PARIS (VI^e).

DIURÈNE

(Extrait total d'Adonis Vernalis.)

Formes. — Liquide. Pilules.

Propriétés thérapeutiques. — Tonique cardiaque et diurétique. Adjuvant inoffensif de la digitale, agit rapidement sans accumulation et sans augmenter la tension artérielle.

Contient tous les principes actifs de l'Adonis.

Indications. — Indiqué dans tous les cas d'Arythmie, d'Asystolie, d'Œdème, dans toutes les Affections du foie, Néphrites, Artério-Sclérose.

Posologie. — 2 à 6 cuill. à café ou 4 à 12 pilules par 24 heures.

Prix de vente au public :

Liquide : 15 francs ; pilules : 12 francs.

Laboratoires CARTERET

15, rue d'Argenteuil — PARIS.

DIURÉPHÉDRINE

Elixir.

Chl. Ephédrine naturelle..... 2 cgr.
Iodure de Sodium et Caféine. 30 cgr.
Teinture Adonis Vernalis.... X gouttes.

Par cuillerée à café.

Action. — Antispasmodique, Bronchodilatateur, Bronchosécréteur, Toni-cardiaque, Diurétique.

Indications. — Traitement de fond. Asthme bronchique, Emphysème, Asthme intriqué, Oppression, Bronchites chroniques, Catarrhe, Etats dyspnéiques, Etats allergiques, Suites de grippe, Insuffisance cardiaque, Urémie, Gazès.

Posologie. — Trois cuillerées à café par jour, matinée, après-midi, soir.

Voir également : **Garéphédrine**, page 740 et : **Ephédrasmlne**, page 657.

Echantillons et littérature sur demande :

Prix : 18 francs.

Laboratoires THORAL

LE MONT-DORE (Puy-de-Dôme).

DIURÉTIQUE GMET

Composition. — Extrait *total*, liquide et sans alcool de la pulpe d'oignon cru.

Propriétés. — Diurétique puissant et jamais contre-indiqué.

Indications. — Oliguries diverses : Pneumoniques, cardio-rénaux, brightiques, gripés, etc. Ascites et tous épanchements séreux. Rhumatismes.

Posologie. — 1 à 4 cuillerées à soupe par jour dans un peu de liquide. Ces doses en général suffisantes peuvent être augmentées dans les grandes oliguries.

Le grand flacon. Prix : 18 francs.

Laboratoire GMET

27, faubourg Montmartre — PARIS (IX^e).

DIUROBROMINE

Composition :

Théobromine pure isotonisée.

Forme :

Cachets de 0^{gr},50.

Indications :

Toutes affections où l'on doit assurer la diurèse.

Prix : 14 francs.

Laboratoires

L. BOIZE et G. ALLIOT

9, avenue Jean-Jaurès — LYON

DIUROCALCINE GROS

Association Calcium-Théobromine.

Indications. — Diurétique cardio-rénal.

Propriétés. — Pouvoir diurétique exalté.
Tonique et régulateur cardiaque. Innocuité
et tolérance parfaites.

Posologie. — 3 à 5 comprimés par jour.

Prix : 10 fr. les 24 comprimés à 0 gr. 50.

DIUROCALCINE IODURÉE

Indications. — Sclérose rénale et tous troubles physiologiques survenant après la quarantaine.

Dose. — 3 à 5 comprimés par 24 heures.

Par comprimé : Iodure de Potassium, 0 gr. 10
associé à 0 gr. 50 de DIUROCALCINE.

Prix : 12 fr. 50.

Laboratoire GROS

13, place Delille — CLERMONT-FERRAND.

DIUROCARDINE

Composition. — Digitale titrée et stabilisée totale, Scille décathartiquée, Théobromine isotonisée, Buchu.

Propriétés. — Diurétique puissant et sûr. Affections cardiaques et rénales.

Forme. — *Cachets* : chaque cachet correspond à 1/20 de milligr. de *Digitaline cristallisée*.

Indications. — Insuffisances cardiaques, Cardiopathies, Tachycardie, Arythmie, Myocardite, Œdèmes, Albuminurie, Ascite, Urémie.

Doses. — Cas aigus : 2 à 5 cachets par 24 heures.

Dose cardiotonique. — 2 cachets par jour pendant 10 jours, interrompre 5 jours et reprendre.

Dose cardiotonique d'entretien. — 1 cachet tous les 2 jours, pendant 10 jours, cesser 10 jours et reprendre.

Prix : 17 francs.

Laboratoires L. BOIZE et G. ALLIOT

9, avenue Jean-Jaurès — LYON.

DIUROCYSTINE

Composition. — Benzo-camphorate de Lithine, Terpene, Castoreum.

Forme. — *Cachets*.

Indications. — Antisepsie des voies urinaires, Cystites aiguës ou chroniques, Urétrites, Catarrhe vésical, draine vessie et canal en fin de blennorragie. Aucune contre-indication.

Doses. — 2 à 6 cachets par jour selon les cas.

Prix : 17 francs.

Laboratoires L. BOIZE et G. ALLIOT

9, avenue Jean-Jaurès — LYON

DMELCOS

Stock-vaccin anti-chancrelleux.

Emulsion de bacilles de Ducrey, injectable exclusivement par la voie veineuse.

Indications. — **Chancre mou et ses complications : Bubon, Phagédénisme. Diagnostic de l'affection par cuti-réaction, Paralyse générale (pyrétothérapie).**

Présentation et mode d'emploi. — Série de 6 ampoules à doses croissantes.

Une injection intraveineuse tous les trois ou quatre jours.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

DOLOMA

Professeurs Dubard et Voisenet, de Dijon.

Composition. — Carbone-Fluophosphate-Magnésien-Mangano-Calcique.

Formes. — Poudre, granulé et comprimés.

Propriétés. — Antidyspeptique. Spécifique des états hyperacides, reconstituant puissant des réserves minérales.

Indications. — Dyspepsies. Entérites chroniques. Tous états déminéralisants et leurs conséquences : *Cancer et Tuberculose.*

Cure antidyspeptique. — Entre et loin des repas. *Doloma*, 2 à 3 sachets de poudre, ou 2 à 3 cuillerées à café de granulé, ou 6 à 10 comprimés.

Cures reminéralisantes, simple ou intensive. — Voir fiche *Œnophos*.

DOLOMA INJECTABLE

Composition. — Citrophosphite Magnésien. Mangano-calcique. Ampoules de 2 cc. et de 5 cc. sans toxiques. Injections hypodermiques indolores.

Propriétés. — Névrosthénique idéal. Agent le plus actif de reconstitution des réserves minérales : Ph. Mg. Ca., de la cellule nerveuse.

Indications. — Epuisement du système nerveux, déminéralisation phospho-terreuse. Prétuberculose, Cancer, Prophylaxie de la récurrence post-opératoire. 1 à 2 ampoules de 2 cc. ou 1 ampoule de 5 cc. par jour, par période de 10 jours.

Prix.

| | |
|--|-------|
| La boîte de poudre <i>Doloma</i> | 14. » |
| — granulé <i>Doloma</i> | 15. » |
| — 10 ampoules <i>Doloma</i> | 15. » |
| — 100 comprimés <i>Doloma</i> .. | 16. » |

Communications : à l'Académie de médecine, avril 1918 ; à la Société française pour l'étude du cancer juin 1919 — décembre 1920 ; Concours médical, mars 1920 ; Journal des Praticiens, mai 1920, etc., etc.

Littérature et échantillons sur demande à

Laboratoire général d'Études Biologiques

S. A., 29, place Bossuet — DIJON.

DOLOPHOS

Composition. — Anhydroinositophosphate de Chaux et de Magnésie, Chlorure de Magnésium, Carbonate de Manganèse, Carbonate de Magnésie.

Mode d'action et avantages. — Le *Dolophos* constitue un médicament d'ionisation magnésienne renforcée, de conservation parfaite, se présentant sous forme de *granulé sucré agréable au goût*.

Indications thérapeutiques. — Affections gastro-intestinales et hépatiques, déminéralisation et asthénie, *arthritisme*, tumeurs bénignes et malignes, prophylaxie du cancer, *médication post-opératoire du cancer*. Affections de la peau.

Mode d'emploi. — Adultes : 3 à 5 cuillerées à café par jour ; enfants : 1 à 3 cuillerées par jour.

Prix : 12 fr. 50

Laboratoires du DOLOPHOS

59, 61, rue de Saint-Quentin — CAUDRY (Nord).

DOLYSINE

Goutte. — Rhumatismes. — Névralgies.

1° *Cachets.* — Acide phénylcinchoninique, 0 gr. 50. Puissant dissolvant de l'acide urique.

Doses. — De 1 à 4 grammes par 24 heures, puis doses décroissantes. Pas d'accoutumance. A prendre aux repas ou en même temps qu'une boisson alcaline (eau de Vichy).

La boîte de 12 : 9 fr.

2° *Topique.* — Chloral, Chloroforme, Menthol, Ether amylsalicylique en solution étherée aromatisée.

Badigeonnages suivis d'enveloppements.

Le flacon : 9 fr.

3° *Pommade.* — Même formule que ci-dessus avec excipient gras pour onctions douces et applications.

Le tube : 9 fr.

M. ROCHEREAU, Pharmacien
ex-interne des Hôpitaux de Paris
SALBRIS (Loir-et-Cher).

DONAGOL

Chlorure de zinc électrolytique.

Antiseptique, désodorisant, astringent, hémostatique, topique et cicatrisant de la muqueuse vaginale.

Prescrire en injections les comprimés ou la Solution diluée pour :

Affections gynécologiques :

Leucorrhée, Métrite du Col avec ou sans ulcération, Vaginite, Vulvite, Ulcérations néoplasiques du col, Infections gonococciques, Secrétions fétides, Ecoulements muco-purulents, Soins pré ou post-partum, etc...

Hygiène intime journalière.

Utiliser la solution pure d'emploi médical pour :

Attouchements vaginaux, Ulcérations du col

(ne pas laisser de pansement à demeure).

Comprimés (dosés à 0,50 de Zn Cl^2) : 1 comprimé par litre d'injection chaude.

Solution (dosée à 45 p. 100 de Zn Cl^2) : verser le contenu du flacon dans 1 litre d'eau. Ce litre provisionnel sera employé à la dose d'une cuillerée à soupe par litre d'injection chaude.

Prix (comprimés ou solution) : 12 fr. 50.

Laboratoire du DONAGOL

à PERONNE (Somme).

DO.SA.NO.SAL

DOuce amère, **SA**ponaire, **NO**yer, **SAL**separeille.

Formule du Dr MARTIN DU THEIL

Forme. — Granulé soluble.

Composition. — Ce granulé contient par cuillerée à café : Extraits de douce amère, 0 gr. 09696 ; de saponaire, 0 gr. 04848 ; de noyer, 0 gr. 07272 ; de salsepareille, 0 gr. 19292.

Dosage constant, titrage toujours identique.

Propriétés. — Diaphorétique, diurétique.

Indications. — Tous états congestifs et troubles circulatoires : Hypertension, Ménopause, Varices, suites de Phlébite.

Doses habituelles. — 1 cuillerée à café 2 fois par jour en se levant et en se couchant dans eau ou tisane.

Cures de 2 mois environ à prolonger suivant le cas.

Prix : 19 francs.

Laboratoires LACOMBE et Cie

42, rue du Mont-Cenis — PARIS (XVIII^e).

DOSURINE (TROUSSES)

LES EXAMENS D'URINES ET LE DOSAGE DES ÉLÉMENTS ANORMAUX (Sucre-Albumine)

sont grandement facilités par l'emploi des

« Trousse Dosurine »

qui assurent à ces examens la plus grande précision scientifique, permettent de les faire en quelques minutes.

Ces Trousse, sous la forme d'un petit livre facilement transportable, se présentent sous 3 modèles :

- 1° **Trousse Index** « *La Dosurine* » qui permet de déceler la présence de l'Albumine ou du Sucre.
- 2° **Trousse A** « *La Dosurine* » destinée à doser l'Albumine contenue dans l'urine.
- 3° **Trousse D** « *La Dosurine* » destinée à doser la quantité de Sucre (Glucose).

Prix de chaque Trousse : 25 fr. (franco par poste : 26 fr. 50).

Ampoules de renouvellement :

La boîte de 10 : 10 fr. (par poste, 11 fr. 30).

La boîte de 20 : 18 fr. (par poste, 19 fr. 50).

Remise de 25 % à MM. les Docteurs.

Envoi franco notice sur demande.

LA DOSURINE, 16, rue Charlemagne — PARIS.

Chèques postaux n° 1352.39 Paris.

DRAGÉCALCION

Dragées de Chlorure de calcium crist. chimiquement pur, dosées à 0 gr. 25 par dragée.
4 dragées = 1 gr. de Chlorure de Calcium.

Avantages. — 1° Efficacité accrue par absorption *progressive*. 2° Agréables à prendre, elles évitent le goût écœurant des solutions et des gouttes. 3° Tolérance parfaite de l'estomac.

Indications. — Toutes les indications du Chlorure de Calcium.

Posologie et mode d'emploi. — Comme *re-calcifiant, antispasmodique, antianaphylactique*, contre les engelures, on préfère les *doses faibles* : 2 dragées au début de chaque repas avec une gorgée d'eau (6 par jour) pendant 20 jours par mois, à continuer longtemps.

Comme *hémostatique, antialbuminurique, dé-chlorurant, antisérique*, on préfère les *doses fortes* : 20 dragées par jour pendant 5 jours avec repos de 10 jours.

Non toxique, son emploi peut être continué avec avantage pendant des mois.

Prix : 16 francs la boîte.

DRAGÉCALCION GRANULÉ

Granulé de Chlorure de calcium crist. chimiquement pur, dosé à 0,25 par cuillerée à café. 2 cuill. à entremets 1 = gr. de chlorure de calcium.

Indications. — Pour les petits *enfants* et pour tous ceux qui ne peuvent avaler les dragées. Toutes les indications du Chlorure de calcium.

Posologie et mode d'emploi. — Comme ci-dessus : une cuill. à café = 1 dragée.

Prix : 16 francs la boîte.

Pharmacie DUC

24, avenue Mac-Mahon — PARIS (XVII^e).

Tél. : Etoile 11-96.

DRAGÉES BENGUÉ AU MENTHOL

Composition. — Mentho-cocaïne et borate de soude ou menthol-borate de soude (sans cocaïne).

Indications. — Affections de la gorge, pharyngites, laryngites, angines, faiblesse de la voix, antiseptie de la bouche.

Mode d'emploi. — 8 à 10 dragées par jour. Laisser fondre dans la bouche.

Prix : 4 fr. 50

Docteur BENGUÉ

Pharmacien

16, rue Ballu — PARIS (IX^e).

DRAGÉES DU D^r GELINEAU

Flacons de 100 et de 50 dragées.

Composition. — Bromure de potassium associé à l'arsenic et à la Picrotoxine.

Indications thérapeutiques. — Epilepsie, Affections nerveuses.

Posologie. — Par dragée :

| | |
|-------------------|--------------|
| Kbr..... | 1 gr. |
| Arsenic | 1 milligr. |
| Picrotoxine | 1/2 milligr. |

De 2 à 6 dragées par jour au milieu des repas.
(Doses supplémentaires en cas de besoin.)
Littérature et échantillons sur demande.

Prix au public : Le flacon de 100 dragées :
20 francs.

Laboratoire J. MOUSNIER-DELERME

9, bd Carnot — BOURG-LA-REINE (Seine).

DRAGÉES FERRO-ERGOTÉES MANNET

Composition :

| | |
|-----------------------|------------|
| Ergot de Seigle | 5 centigr. |
| Fer | 10 — |

Par dragée.

Indications. — Anémie, Leucorrhée, Règles irrégulières, Métrorragies consécutives à l'Avortement, à l'Accouchement et à la Ménopause. Ménorragies de la puberté. Incontinence d'urine.

Posologie. — 4 à 8 dragées par jour avant les repas.

Prix : 14 fr. 50.

Laboratoire MANNET
LOUDUN (Vienne)

DRAGÉES HECQUET

(Sesqui-Bromure de Fer).

Propriétés. — Associent les qualités anti-spasmodiques du brome et l'action hématopoiétique du fer sous la forme d'un sel très assimilable ne produisant jamais de troubles digestifs ou intestinaux. Le seul ferrugineux qui réponde à cette indication.

Calmer sans affaiblir,
Reconstituer sans exciter.

Indications. — Chloro-Anémie, Nervosisme.

Dose. — 4 à 6 dragées par jour.

(Se fait également sous forme de « Sirop ».)

Prix : 12 fr. 50.

Laboratoire MONTAGU

49, boulevard de Port-Royal — PARIS.

DRAGÉES LEBRUN TONI-CARDIAQUES

Composition.

| | | |
|----------------------|------|------------------|
| Strophantus | 0,01 | pour une dragée. |
| Spartéine..... | 0,01 | — — |
| Caféine..... | 0,06 | — — |
| Ext. de Scille | 0,04 | — — |

Propriétés thérapeutiques. — Cardiotonique, sédatif de la dyspnée cardiaque. Régulatrices et renforçatrices, elles tonifient le myocarde et activent la diurèse.

Indications. — Insuffisance cardiaque, Asystolie, Maladies mitrales, Œdèmes cardiaques, Myocardites.

Posologie. — 6 dragées par jour, en 2 prises, soit au début, soit entre les repas.

Le flacon de 50 dragées : 12 francs.

Laboratoire LEBRUN

155, boulevard de Magenta — PARIS (IX^e).

Téléphone : Trudaine 50-34.

DRAGÉES LUMEVAL

Sédatives, antispasmodiques.

Composition. — Pilules glutinisées renfermant :

| | | |
|--|-----------------|------------|
| Extrait stab. de Valériane..... | | } 0 gr. 03 |
| — — | Passiflore..... | |
| — — | Crataegus | |
| Butylethylmalonylurée (Syn. Soneryl) ... | | |

Indications. — Troubles d'origine nerveuse, Insomnies, Agitation, Anxiété, Syndromes Neurasthéniques en général, Palpitations et Troubles cardiaques spasmodiques.

Posologie. — Jusqu'à 7 dragées par jour ; dose moyenne, 2 à 4 par jour. Pas d'accumulation ni d'accoutumance.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N^o 27-2.

Prix : 15 francs l'étui de 42 pilules.

Laboratoires DESCOURAUX

52, boulevard du Temple — PARIS.

Descouraux et Fils, Pharmaciens.

Docteur en Pharmacie.

DRAGÉES NÉVROSTHÉNIQUES « YSE »

à base de Phosphure de Zinc (2 milligr. par dragée), Nux vomica-Kola-Guarana.

Indications et propriétés thérapeutiques.

— Spécifique de la Neurasthénie, *du surmenage intellectuel, des dépressions physique, cérébrale* et des états adynamiques et asthéniques.

Mode d'emploi (sauf avis du médecin). — Six dragées par jour : deux avant chacun des trois principaux repas.

Les dragées névrosthéniques « Yse » *se font sans sucre* pour les diabétiques. *Formule B.*

60 dragées par flacon. Prix : 13 fr.

Laboratoire « YSE »

H. Chatelut, pharmacien

65, rue Louis-Blanc — PARIS (X^e).

DRAINOL

Agent de drainage des voies biliaires.

Stimulant des fonctions hépatiques.

Forme. — Granulé fondant, soluble, aromatisé, de saveur très agréable.

Composition :

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Peptones de viande | 2 gr. 500 |
| Peptones de poisson | 0 gr. 500 |
| Peptones d'œuf | 0 gr. 166 |
| Sulfate de magnésie P. C..... | 16 gr. |
| Chlorure de magnésium | 0 gr. 333 |
| Extrait total de jaborandi... | 0 gr. 333 |
| Extrait sec d'artichaut | 0 gr. 830 |
| Lactosérum | 30 gr. |

Pour 100 gr. de saccharure.

Indications :

- Tous les états pathologiques du foie et des voies biliaires.* Insuffisance hépatique, Cholémie, Congestion du foie, Cirrhoses, Ictères. Lithiase biliaire, Cholécystite chronique, Angiocolites.
- Troubles dyspeptiques d'origine hépatique.* Somnolences post-prandiales, Dyspepsies secondaires, Vertiges et nausées, Inappétence, Constipation.
- Etats anaphylactiques d'origine alimentaire.* Prurit et urticaire. Œdème de Quincke, Migraine, Rhume des foins, Asthme, Dermatoses.

Particularités. — Le plus actif et le plus doux des médicaments de drainage biliaire, parce que sans action drastique sur l'intestin. Par son *Jaborandi* évite toute réaction violente. Par son *Lactosérum* agit à la fois sur l'évacuation biliaire et sur la diurèse.

Posologie :

Adultes : Le matin à jeun, une demi-heure avant toute alimentation, deux cuillerées à café dans un demi-verre d'eau tiède. Cette dose peut être portée suivant indication médicale jusqu'à 4 et 6 cuillerées à café.

Prix : 18 fr.

Laboratoire de la LACTOTHÉRAPIE

12, square Delambre — PARIS (XIV^e).

DRYCO

Lait sec. — Activé par les rayons ultra-violet.

Analyse approximative :

| | |
|------------------------|------------|
| Matières grasses..... | 12 p. 100. |
| Sucre de lait..... | 46 — |
| Matières azotées | 32 — |
| Sels | 7 — |
| Eau | 3 — |

Indications. — Lait rigoureusement pur, partiellement écrémé.

Pour nourrissons : digestibilité et assimilation parfaites, supprime vomissements et troubles intestinaux.

Pour adultes : régime de suralimentation, affections du foie et de l'estomac.

Doses. — Dilution normale : une cuillerée à soupe arasée de poudre non tassée dans 50 centilitres d'eau bouillie chaude.

A modifier suivant l'âge du nourrisson et selon les prescriptions médicales.

Sucre comme pour le lait ordinaire.

Préparer sans cuisson.

Prix : 14 et 56 francs.

Société Française du Lait Sec DRYCO

5, rue Saint-Roch — Paris (1^{er}). — Opéra 59-09 et Opéra 54-58.

DYNOSTHENE

Comprimés.

La cure magnésienne rationnellement conduite par adjonction d'un complexe polyminéralisé équilibré et assimilable.

Indications. — Tous les états de carence magnésienne.

1^o Syndromes neuro-dépressifs (Psychasthénie ; surmenage intellectuel, débilité génitale).

2^o Convalescence des maladies infectieuses asthéniantes (grippe, fièvre typhoïde, etc.).

3^o Atonie digestive ; constipation atonique.

4^o Prophylaxie du cancer : prévention des récidives post-opératoires.

Composition. — Complexe *phospho-magnésien* polyminéralisé.
(Chl. de Magn. Magnésie calcinée, Glycéroph. de Magnésie, Glycéroph. de Ca., Phosphore organique, Nucléinate de fer et Manganèse.

Forme et Posologie. — 1 boîte de 45 comprimés.

2 à 5 comprimés par jour avant ou pendant les repas, de préférence le matin et à midi.

Traitement. — Ininterrompu pendant quelques semaines (aucun inconvénient à être continué pendant plusieurs mois).

Aucune contre-indication.

Prix : 17 francs.

Laboratoire des SPÉCIALITÉS CABASSON

A. GROS-CAVALIER, Pharmacien.

183, rue de Rome — MARSEILLE.

DYSPEPTINE HEPP

Suc Gastrique physiologique pur,
extrait de porc vivant.

Procédé du Dr HEPP

Ancien Interne en Chirurgie des Hôpitaux de Paris.

Indications. — Hypopepsie. Dilatation, Gastrites chroniques, Dyspepsie nerveuse, Anorexie des tuberculeux et convalescents, Diarrhées, Entérites tropicales, Gastro-entérites et Dyspepsies des nourrissons.

Doses. — *Adultes* : 1 à 2 cuillerées à soupe un peu avant ou pendant le repas.

Enfants : 1/2 cuillerée à café avant chaque tétée ou prise d'aliments.

Adresser toutes demandes :

Laboratoire

de Physiologie du PUITTS d'ANGLE

Le Puits d'Angle — LE CHESNAY (S.-et-O.).

Représentant pour la Belgique :

M. MICHAUD

23, rue Plantin — BRUXELLES.

DYSTHÈNE

Médication tonique et régulatrice, complexe phosphorique et magnésien.

Indications. — Syndromes d'hypotonie, Dépressions, Asthénie, Fatigue, Faiblesse générale, Diminution de l'activité physique et cérébrale, Inaptitude au travail.

1^o Forme gouttes :

Emploi et doses. — *Adultes* : XL gouttes au total par jour, en deux fois, aux repas, dans un peu d'eau.

Vieillards : XXX gouttes au total par jour.

Enfants : de 7 à 12 ans : VIII gouttes par jour.

— — 12 à 16 ans : XII — —

— — 16 à 18 ans : XX — —

Prix : 18 francs.

2^o Forme élixir :

Emploi et doses. — *Adultes* : 1 cuillerée à soupe à chacun des repas de midi et du soir.

Vieillards : 1 cuillerée à dessert.

Enfants : de 16 à 18 ans : 1 cuillerée à café. Au-dessous de cet âge, prendre uniquement le DYSTHÈNE-GOUTTES.

L'élixir peut être absorbé pur ou partie égale d'eau.

Prix : 16 francs.

Laboratoire d'Hygiène et Thérapeutique appliquée
47, rue Bokanowski — ASNIERES (Seine).

ECZÉDA

Ichtyosalicylé.

Pommade polyréductrice, doit à son excipient spécialement étudié :

Son grand pouvoir absorbant.

Ses qualités d'épidermisation.

Ses propriétés antitoxiques.

Indications. — *Dermatoses suintantes* et prurigineuses : Eczémas sous ses différentes formes ; Érythèmes, Prurits, Brûlures, Engelures, Eczéma et Érythème fessier des nourrissons.

Prix : 9 francs.

Laboratoires PORCHER

35, rue des Blancs-Manteaux
PARIS (IV^e).

ECZÉMACRÈME BOISSY

Propriétés. — Crème neutre, non grasse, ne renfermant aucun principe médicamenteux irritant. Soluble à l'eau. Elle assouplit et tonifie la peau qui l'absorbe totalement ; elle active l'épidermisation et calme tous prurits.

Indications. — Toutes dermatoses, Eczémas aigus ou chroniques, Crevasses, Gerçures et, en particulier, gerçures et crevasses du mamelon, Erythèmes des nourrissons, Démangeaisons et Prurits de toutes natures, Brûlures.

Mode d'emploi. — Appliquer une couche légère d'Eczémacrème BOISSY sur la lésion et faire une légère onction avec le doigt ou un tampon de coton, pour bien faire pénétrer dans la peau.

Prix : 10 francs.

Spécimen à MM. les Docteurs, sur demande.

Laboratoires BOISSY

15, rue Belgrand — PARIS (XX^e).

ECZOSEC PORCHER

Pâte adhésive sans corps gras. Sèche rapidement.
Ne tache pas. S'enlève à l'eau.

Pansement souple et adhésif ne nécessitant l'emploi d'aucune bande. Permet la perspiration et protège la peau contre l'action du soleil, vent, reflet de la neige.

Mode d'emploi. — Etendre en couche mince, mais homogène, laisser sécher. Renouveler chaque jour, après avoir enlevé la couche précédente, en appliquant pendant 10 à 20 secondes un tampon d'ouate imbibé d'eau.

Indications. — *Dermatoses sèches* : Eczémas, Prurits, Erythèmes. Erythèmes et Eczémas des nourrissons.

Eczosec spéciaux. — Ichtyolé, Benzoïque, sulfo-camprhé.

Prix : 14 francs.

Laboratoires PORCHER

35, rue des Blancs-Manteaux — PARIS (IV^e).

EDISTOL

Composition. — Acide borique, tartrique, citrique : menthol, huile de Pinus sylv., gaiacol, terpinéol, pinéol, cinéol, Styrax benz.

Indications. — Toutes affections et antiseptie des muqueuses rhino-bucco-pharyngo-laryngées.

Mode d'emploi. — *Gargarismes* et bains de gorge : 1 cuillerée à café par verre d'eau bouillie chaude.

Fumigations ; 1 à 2 cuillerées à café par verre d'eau bouillante.

Vaporisations ; 1 cuillerée à café dans le verre d'eau d'un pulvérisateur à vapeur.

Bain nasal ; 1/2 cuillerée à café dans un verre d'eau bouillie tiède, au moyen de la pipette nasale.

Echantillon sur demande.

Prix : G. M., 13 fr. ; P. M., 8 fr. 75
(exempt d'impôt).

Laboratoire de l'EDISTOL

H. DUFOUR, Pharmacien de 1^{re} classe,
Anc. interne des hôp. de Paris,
40, rue des Carmes — ORLEANS (Loiret).

EFRYL

Sirop à base d'Éphédrine et de Drosera.

Action. — Sédation constante de la toux, de la dyspnée. Diminution rapide de la congestion des organes respiratoires.

Action particulière de l'Ephédrine sur le système nerveux sympathique (ramifications des bronches) : suppression du spasme bronchique, excitation du centre respiratoire, diminution du travail du cœur par une élévation légère de la pression sanguine.

Indications. — Toux en général. Rhumes. Trachéites. Laryngites. Bronchites aiguës et chroniques. Localisations pulmonaires de la grippe. Emphysème. Asthme. Rhume des foins. Coqueluche.

Mode d'emploi. — *Adultes* : 2 à 4 cuillerées à bouche par jour.

Enfants : 1 à 4 cuillerées à café par jour, suivant l'âge (seconde enfance).

A prendre 1/2 heure avant les repas, ou 2 heures après.

De préférence, éviter de donner le Sirop EFRYL immédiatement avant le coucher.

Prix de vente au public : 12 francs.

Société générale d'Applications thérapeutiques

THERAPLIX (J.-C. Roux)

R. MOREUX, *Pharmacien*

Ancien interne des Hôpitaux,

98, rue de Sèvres — PARIS (VII^e).

EKTAL

Formes. — Granulé et comprimé.

Formule. — Peptone viande, chlorure de magnésium, sulfate de magnésium, fluorure de magnésium, tartrate de potasse et de soude.

Indications. — Congestions du foie et de la vésicule, cholécystite chronique, syndrome entéro-hépatique.

Posologie. — 1 cuillerée à soupe de granulé ou 5 comprimés le matin à jeun.

Prix : 15 francs.

Laboratoire SEGUIN

7, rue Saint-Isaure — PARIS (XVII^e).

EKTOGAN-BOCQUILLON

A base d'un peroxyde de zinc spécialement préparé, dont la partie active a pour formule $2 (\text{Zn}^{\text{II}} \text{C}^{12} \text{O}^{25} \text{H}^{22})$, l'Ektogan-Bocquillon dégage d'une façon lente et continue de l'Oxygène à l'état naissant dès qu'on le met en contact avec les tissus ou les sécrétions organiques (sang, pus, transpiration, etc...).

Indications. — Chirurgie, Obstétrique, Gynécologie. Oto-Rhino-Laryngologie, Dermatologie.

Formes. — **EKTOGAN-POUDRE** pour désinfection, désodorisation avec action desséchante de toute plaie,

Prix : le flacon poudreux : 15 francs.

EKTOGAN-POMMADE pour désinfection, cicatrisation et traitement des dermatoses et brûlures.

Prix : le tube de 40 grammes : 13 fr. 50.

Pansements à l'**EKTOGAN** (gazes, méchettes, plura-bande, ekto-plaste, ovules, pâte occlusive pour ulcères variqueux).

Laboratoire des PEROXYDES MÉDICINAUX

12-18, rue Lamartine — PARIS.

EKTOPHANOL

Sel de Lithium de l'acide phénylquinoléine carbonique.

Indications. — Rhumatismes musculaires ou articulaires, aigus ou chroniques, goutte, sciatique, lumbago, etc.

Mode d'emploi. — 4 cachets par jour (2 avant chaque repas) pendant 4 jours.

Présentation. — Boîte de 32 cachets dosés à 0 gr. 20.

Prix : 16 francs.

Boîte de 16 cachets dosés à 0 gr. 20.

Prix : 8 fr. 50.

Laboratoires de Biochimie médicale.

CH. DESGREZ, Docteur en Pharmacie.

19-21, rue Van-Loos — PARIS (XVI^e).

Tél. : Auteuil 26-62, 04-30.

ELASTOPLASTE

Forme essentielle. — Bandes de 1 et 2 m. $1/2$ de long et de 3 à 30 centimètres de large.

Composition. — Sparadrap adhésif, élastique, résultant de l'association d'une bande élastique (genre crêpe), et d'une masse adhésive au ZnO.

Formule A : Entièrement enduite (occlusive).

Formule B : Partiellement enduite (perméable à l'air).

Formule C : ajourée.

Formule S : Bandes enduites sur la moitié de leur largeur.

Indications

Contention des plaies. Pansements aux articulations (toutes largeurs).

Extensions continues (formule A ou B : 2 m $1/2$ × 6 et 8 cm).

Traitements des ulcères variqueux (formule A : 2 m $1/2$ × 8 cm).

Redressement des pieds bots (formule A ou B : 2 m $1/2$ × 3 cm).

Luxations, entorses, bandages de soutien, etc...

Autres présentations :

Elastodoigts : noir ou chair.

Elastoplaies : existe en 4 × 4 cm. — 6 × 4 cm — 6 × 6 cm, etc...

Elastovaccin : Protecteur après vaccination.

Elasto-yeux : S'adapte à la forme de la tête.

Elastocapsil : Emplâtre élastique au capsicum.

Elastofuron : Emplâtre au Vigo. élastique et poreux.

Prix : 6 francs à 65 francs.

Laboratoires FISCH et Cie

4, rue d'Illzach, MULHOUSE

Agence : 104, Frg Poissonnière — PARIS (X^e)

Tél. : Larmatine 92-52

ÉLATINE BOUIN

Provient du traitement du Goudron de Sapin de Norvège

Liquide limpide et de conservation indéfinie.

Dose et mode d'emploi. — Se prend mélangée à du lait chaud ou tisane pectorale ou diurétique, à la dose de 2 cuil. à soupe par tasse, plusieurs fois par jour. 1 à 2 cuil. à café pour les enfants.

A titre préventif. — En temps d'épidémie, et chez les sujets prédisposés aux inflammations trachéo-bronchiques, l'*Elatine* peut être prise additionnée à la boisson habituelle au repas, à raison d'une cuil. à dessert par verre de liquide.

Indications thérapeutiques. — Affections des bronches, (toux rebelles, catarrhes, emphysème, asthme) ; de la vessie et des reins (cystites, pyélites, gravelle).

Prix : le flacon 10 francs.

L. N. C. n° 474-3.

Laboratoire FAGARD

44, rue d'Aguesseau — BOULOGNE-SUR-SEINE.

ELBON CIBA

Antipyrétique dans les affections respiratoires.
(Cinnamoyl-p-oxyphénylurée.)

Antithermique doux, d'action durable, pour le traitement des pyrexies tuberculeuses et des catarrhes infectieux des voies respiratoires. Met en liberté de l'acide benzoïque, réalisant ainsi la benzoïlisation continue de l'arbre broncho-pulmonaire. Non diaphorétique.

Indications. — Tuberculose pulmonaire fébrile. Catarrhes pulmonaires et toutes affections bronchiques fébriles.

Doses. — 2 à 4 comprimés par jour. Commencer par la dose forte pour l'abaisser ensuite progressivement à mesure que la courbe thermique descend.

Le tube de 20 comprimés : 18 francs.

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND

109-113, boulevard de la Part-Dieu — LYON.

ELECTRARGOL

Composition. — Argent colloïdal électrique à petits grains, isotonique et stabilisé, titrant 0, 40 0/00

Propriétés. — Antimicrobien, leucocytogénétique, sans toxicité. Anti-infectieux polyvalent local et général.

Indications. — Septicémies, Pneumopathies graves, pleurésies, méningites aiguës, maladies générales, infectieuses, suppurations et infections en chirurgie générale, urologie, gynécologie et obstétrique, ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie.

Forme et mode d'emploi.

1° *Ampoules* : de 1, 2, 5, 10, 25 cc., pour injections intramusculaires ou intraveineuses.

Doses variables suivant la gravité des cas : de 5 à 50 cc. et plus par jour.

2° *Ampoules compte-gouttes stérilisées* de 25 cc., pour instillations nasales et oculaires.

3° *Flacons stérilisés* de 50, 100, 250 cc., pour pansements, lavages, injections locales.

4° *Pommade* : Tubes de 30 grammes.

5° *Ovules* : Boîtes de 6 ovules.

Laboratoires CLIN. — COMAR et Cie.

20, rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS.

ELECTROCUPROL

Oxyde de cuivre colloïdal électrique à petits grains, isotonique et injectable, titrant 0,20 de cuivre pour 1.000.

Propriétés. — Celles des colloïdes électriques, avec une électivité marquée contre le *cancer* et la tuberculose.

Indications. — Cancer (sarcomes, néoplasmes cutanés, néoplasmes du tube digestif).

Tuberculoses cutanées.

Infections bucco-dentaires.

En instillations dans le trachome.

Posologie. — Injections intramusculaires et intraveineuses : 5 à 10 cc. 1 ou 2 fois par semaine et plus.

Formes. — Ampoules de 5 cc. Boîtes de 6 ampoules.
Collyres : ampoules compte-gouttes de 10 cc.

Laboratoires CLIN. — COMAR et Cie.

20, rue des Fossés Saint-Jacques — PARIS.

ELECTROSÉLÉNIUM

Sélénium colloïdal électrique, titrant 0,20 p. 1000 non toxique.

Indications. — *Néoplasmes.* Action élective sur les néoplasmes avant intervention et après intervention. Retarde et évite les récidives.

Associé aux traitements physiques, il en renforce les résultats.

Posologie. — Injections intramusculaires et intraveineuses, à doses progressives : 2 cc. puis 5 cc. si bien supporté, tous les 2 ou 3 jours. Séries de 15 à 20 injections.

Formes. — Ampoules de 5 cc. Boîtes de 3 ampoules,

Laboratoires CLIN. — COMAR et Cie.

20, rue des Fossés Saint-Jacques — PARIS

ELGINE JULIEN

Comprimés.

Composition :

| | |
|--|------------|
| Collargol argent colloïdal | 0,05 cent. |
| Benzoate de soude | 0,40 — |
| Urotropine française | 0,20 — |
| En comprimés se dissociant rapidement. | |

Indications. — Maladies infectieuses aiguës, Intoxications, Voies urinaires (urétrites, cystites, pyélites, prostatites), Diathèse urique (rhumatismes, goutte, lithiase).

Posologie. — *Adultes* : 3 à 6 comprimés par jour.
Enfants : 1/2 dose. Avaler avec une infusion ou dissoudre dans de l'eau.

Prix : 12 fr. 50. — Boîte gratuite sur demande.

Louis JULIEN

Docteur en Pharmacie de la Faculté de Paris
105, rue de Rennes — PARIS (VI^e).

ELIXIR BONJEAN

Composition. — Ether et plantes aromatiques.

Mode d'action. — Tonique puissant des voies digestives.

Indications. — Troubles de la digestion par hypofonction, gastropathies d'origine nerveuse, diarrhée de l'adulte et des enfants, choléra infantile, grippe intestinale.

Mode d'emploi. — Un verre à liqueur après les repas ou au moment des douleurs.
Renouveler une demi-heure après.

Enfants : Demi-dose.

Prix :

Le flacon : 16 fr. Le demi-flacon : 8 fr. 50.

Docteurs FAURE et DUSSUEL

Pharmaciens de 1^{re} classe

AIX-LES-BAINS

ÉLIXIR DÉRET

Composition. — Solution vineuse d'iodure double de tanin et de mercure (0 gr. 0275 d'iode et 0 gr. 005 de Hg par cuillerée à soupe).

Propriétés. — Absence d'accidents d'hydrargyrisme grâce à la présence du tanin ; innocuité sur les voies digestives (jamais de diarrhées).

Indications. — Antisypilitique doux, convenant aux personnes qui ne peuvent supporter un traitement mercuriel ou arsenical interne. Particulièrement recommandé chez les enfants.

Traitement d'entretien de la syphilis et de l'hérédo-syphilis par voie buccale chez les enfants, les adolescents, les femmes enceintes.

A ses propriétés d'agent thérapeutique mercuriel, l'Elixir Déret ajoute celle d'être un *tonique* actif.

Posologie :

Adultes : 1 à 2 cuillerées à soupe par jour.

Enfants : 1 à 2 cuillerées à café, suivant l'âge.

A prendre en deux fois, dans un verre à liqueur gradué, pour éviter la réaction qui se produirait sur le métal de la cuiller, doses pouvant être doublées en cas de besoin.

Forme. — Flacons de 300 cc.

Permet le traitement d'entretien dissimulé.

Laboratoires CLIN. — COMAR et Cie.

20, rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS.

ÉLIXIR DUCRO

Ecorces d'oranges amères. Hypophosphite : 10 cgr. par 15 gr. d'élixir.

Tonique *antianorexique* très agréable : asthénie, convalescences, états consomptifs, sénilité, grossesse : 1 cuil. à soupe ou 1 verre à liq., selon l'âge, étendu d'un peu d'eau, avant ou entre les repas.

Eupeptique, euphorisant : mêmes doses, pur, après les repas.

Action *d'épargne* : pneumonie, maladies infectieuses adynamiques : 1 cuil. à café ou à soupe, selon l'âge, chaque 2 heures.

DURIEZ.

20, place des Vosges — PARIS.

ELIXIR DU D^r MIALHE

Préparation. — Suc gastrique complet.
— Un procédé particulier lui conserve toute son activité plusieurs années.
(*Journal de Pharmacie et de Chimie.*)

Indications thérapeutiques. — Dans tous les cas où le suc gastrique fait défaut : Dyspepsies ; douleurs nerveuses ; digestions lentes et difficiles ; vomissements incoercibles de la grossesse.

Mode d'emploi. — Une cuillerée à bouche immédiatement après le repas ; demi-dose pour les enfants.

Prix : 18 fr. 75.

Laboratoire du D^r MIALHE
8, rue Favart — PARIS.

ELIXIR EUPEPTIQUE TISY

Composition. — Pancréatine, diastase et pepsine additionnées de sécrétine et d'entérokinase.

Avantages. — Digère les corps gras, amylacés et protéiques.

Contient à l'état de pureté tous les ferments de l'estomac et de l'intestin. De goût très agréable. Se conserve pendant de longues années.

Indications thérapeutiques. — Embarras gastriques, dyspepsie, gastro-entéralgie, douleurs et dilatations d'estomac, manque d'appétit, digestions difficiles, diarrhée, athrepsie, vomissements.

Posologie. — Un à deux verres à liqueur au début, ou à la fin de chaque repas.

Prix : 18 francs.

Laboratoires VAUDIN et GUILLAUMIN
Docteurs en Pharmacie
12, rue Charles-V — PARIS.

ÉLIXIR FERRO-ERGOTÉ MANNET

Composition :

Ergot de Seigle 5 centigr.

Fer 10 centigr.

Par cuillerée à café.

Indications. — Anémie, Leucorrhée, Règles irrégulières, Métrorragies consécutives à l'Avortement, à l'Accouchement et et à la Ménopause, Ménorragies de la puberté. Incontinence d'urine.

Posologie. — 4 à 8 cuillerées à café par jour avant les repas.

Prix : 15 francs.

Laboratoires MANNET
LOUDUN (Vienne).

ÉLIXIR GODFRIN

Formule. — Teinture de simarouba, 7 gr. 50 ; Teinture de grenadier, 7 gr. 50 ; Elixir parégorique, 12 gr. ; Sirop de cachou, 40 gr. pour 125 cc.

Propriétés thérapeutiques. — Anti-dysentérique, astringent, sédatif.

Indications. — Diarrhées de toute nature, Entérites et entéro-colites, Dysentéries amibienne et bacillaire.

Mode d'emploi. — *Cas aigus.* — Prendre toutes les 2 heures : *Adultes* : 1 cuillerée à soupe. — *Enfants de plus de 10 ans* : 1 cuillerée à dessert. — *Enfants de 6 à 10 ans* : 1 cuillerée à café. Ne pas donner au-dessous de 6 ans.

Cas chroniques. — *Adultes* : 1 à 2 cuillerées à soupe par jour, loin des repas.

Prix : 8 francs.

H. PERIGNON, Pharmacien de 1^{re} classe.

Ex-interne des Hôpitaux de Paris.

6, rue de Paris — JOINVILLE-LE-PONT

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle des
Médicaments sous le n° 117-1.

ELIXIR GREZ

Chlorhydropepsique.

Spécialement préparé pour combattre l'*insuffisance gastrique* dans toutes les formes de l'*Hypochlorhydrie*.

A base de chlorhydropepsine unie aux amers digestifs. Son action doit être recherchée dans tous les cas où les fonctions sécrétrices de l'estomac sont déficientes, depuis la simple dyspepsie due à une mastication insuffisante ou trop rapide (mauvaise dentition, repas précipités, etc.) jusqu'aux plus graves troubles sécrétoires.

Joignant l'utile à l'agréable.

Il est employé dans le monde entier et universellement apprécié par le corps médical. Le nombre des Docteurs qui emploient l'Elixir Grez *chlorhydropepsique* pour leur usage personnel augmente de jour en jour. C'est pour nous la meilleure preuve de la qualité de notre produit et de son efficacité.

Posologie. — Un verre à liqueur après chaque repas.
Prix : 18 francs.

Dépôt général :

Laboratoire de l'ELIXIR GREZ
49, rue de Maubeuge — PARIS (IX^e).

ÉLIXIR HYMEL

Traitement mercuriel d'entretien dissimulé.

Titrage. — Par cuillerée à soupe : 0,007 Bi-iodure de mercure. — 0,075 Iodure de potassium.

Originalité. — Excipient spécial à base de Miel, lui procurant un *goût très agréable*, et une parfaite *tolérance* pour l'estomac.

Présentation dissimulée. — Aucune indication de maladie, ni de nature de médicament.

Posologie. — *Adultes* : 2 cuillerées à soupe au début ou au milieu des repas.

Enfants de 9 à 14 ans : 2 cuillerées à dessert par jour.

— de 5 à 8 — 2 à 3 cuillerées à café par jour.

— de 2 à 4 — 1 à 2 — — —

A prescrire. — Par périodes de 20 jours, intercalées de préférence entre deux périodes de 20 jours de suppositoires Hymel.

Indications. — Traitement d'entretien de la Syphilis, Imprégnation mercurielle (entre les séries de piqûres). Hérédo-syphilis. Dermatoses.

Prix : 16 francs.

Laboratoires A. DUTEIL
90, avenue de Saint-Ouen, PARIS.

ELIXIR IODÉPURATIF PÉPIN

Médication mercurielle active préparée sous une forme à la fois tonique et agréable permettant de remédier en grande partie aux effets débilissants de la médication mercurielle.

Composition. — Bi-iodure de mercure solubilisé par l'iodure de sodium, Teinture de cacao, Teinture de vanille.

Indications. — Traitement d'usure. Traitement de l'hérédosyphilis chez les enfants et les adolescents. Le traitement par excellence pour la femme enceinte.

Médication infantile. — Sirop iodépuratif PÉPIN, parfumé aux sucres de fruits (mêmes caractéristiques).

Mode d'emploi :

Adultes : Une cuiller à soupe, soit 1 cgr. de bi-iodure.

Adolescents : Une cuiller à entremets, soit 1/2 cgr. de bi-iodure.

Enfants : Une cuiller à café, soit 1/4 cgr. de bi-iodure.

Administration. — Toujours au début du repas (condition la plus favorable à une tolérance parfaite).

Prix : 18 francs.

Nota. — Le conditionnement de ce produit ne porte aucune indication concernant sa composition ou son emploi thérapeutique.

Pharmacie ROGÉ-CAVAILLÈS.

M. LACHARTRE, Docteur en Pharmacie, Successeur,
116, boulevard Haussmann — PARIS (VIII^e).

ELIXIR SPARK

Composition. — Extrait fluide composé d'espèces amères stomachiques et digestives. Au complexe végétal obtenu par des lixiviations successives il est ajouté une quantité de glycérine et d'alcool strictement suffisante pour assurer une stabilité et une conservation parfaites ; le produit final, d'une amertume aromatique, possède une saveur agréable et franchement apéritive.

Propriétés thérapeutiques. — *Affections du foie :* gastro-hépatite, insuffisance biliaire, congestion du foie, lithiase biliaire.

Affections de l'estomac : dyspepsies, stases gastriques, dilatations stomacales ; atonie des voies digestives

Affections de l'intestin : entérites, ballonnement abdominal ; constipation et ses conséquences.

Pas de contre-indications.

Doses. — Une cuillerée à café, dans un peu d'eau pure ou sucrée, avant ou après les deux principaux repas.

Prix : 12 francs.

ÉCHANTILLONS et LITTÉRATURE :

LABORATOIRES DU D^r NARODETZKI

19, boulevard Bonne-Nouvelle — PARIS.

ELIXIR SPES DU Dr GUIRAUD

Ex-pharmacien des Hôpitaux de Bordeaux.

Composition de l'Elixir. — Iodure double d'Arsenic et de Mercure. Préparation moins alcoolique qu'un vin et posologiquement assimilable au **Sirop de Gibert**.

Une cuillerée à soupe contient exactement :

| | | | | |
|---------|-------|---------------------|-------|--------------|
| I..... | 0,008 | } correspondant à { | 0,01 | Biiodure Hg. |
| Hg..... | 0,006 | | 0,005 | Iodure As. |
| As..... | 0,001 | | | |

Très agréable à prendre.

Indications. — *Syphilis et Héredo-syphilis*. Bien toléré, son emploi n'occasionne ni hydrargyrisme, ni stomatite, ni érythème, ni diarrhée.

Doses : { *Nourrissons* : 1 demi-cuillerée à café par jour.
De 1 à 3 ans : 2 demi-cuillerées à café par jour.
De 3 à 7 ans : 2 cuillerées à café par jour.
De 7 à 15 ans : 2 cuillerées à dessert par jour.
De 15 à 20 ans : 3 cuillerées à dessert par jour.
Adultes : 2 à 4 cuillerées à potage par jour.

A prendre au moment des repas, pur ou dans un peu d'eau. Se servir du **verre gradué** qui accompagne chaque flacon.

Observation importante. — Présenté comme tonique et modificateur, l'**Elixir Spes** ne contient aucune indication permettant de soupçonner la présence du Mercure. Susceptible de rendre les plus grands services en Gynécologie, Ophtalmologie, Oto-Rhino-Laryngologie.

Prix : 18 francs.

Laboratoire SPES GUIRAUD

10, impasse Milord — PARIS (XVIII^e) — Tél. Marcadet 37-98.

ELIXIR THIOGAÏACOLÉ ARQUEVAUX

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 439-1, en vue de la possibilité de prescription aux Assurés Sociaux.

Composition. — Thiogaïacol crist. pur, 0,15 ; Extrait Thébaïque, 0,0025 ; Codéine, 0,01 ; Bromoforme, solut. offic., 0,20 ; Teint. Rac. Aconitet Teint. Belladone titre int., àà XI gouttes = 0,20 ; Benz. Sodique et Drosera, àà 0,25 ; E. d. Laur.-Cerise t. int., 1 gr. ; véhicule : Elixir de Polygala au Garus, Q. S. pour 15 cc.

Forme. — Liquide.

Indications. — Antiseptique eupnéique cicatrisant des voies respiratoires. Enrouement. Bronchite et Toux chroniques. Tuberculose, Asthme. Catarrhes.

Posologie. — Adultes : selon les cas, 3 à 5 cuillerées à dessert ou à soupe par jour, entre les repas, pures, suivies d'une tasse de tisane très chaude.

Prix du flacon de 210 cc. : 15 francs sans impôt.

Laboratoires ARQUEVAUX 
 Pharmacien à Etampes (S.-et-O.).

ELKIN (Dragées) ELKIN (Granules)

Digestives — Cholagogues — Laxatives.
(Sans aucun drastique.)

Composition :

Adultes.

| | | |
|------------------|---|--------------|
| Bile..... | } | ââ 0 gr. 05. |
| Soufre | | |
| Pancréatine..... | | |

Par pilule dragéifiée.

Enfants.

| | | |
|------------------|---|--------------|
| Bile..... | } | ââ 0 gr. 01. |
| Soufre | | |
| Pancréatine..... | | |

Par granule.

Indications thérapeutiques :

Digestions incomplètes. Somnolence. Ballonnement. **Douleurs post-prandiales.** Pesanteurs après les repas. Insuffisance hépato-biliaire. Insuffisance pancréatique. Dermatoses hémoclasiques. Rougeurs de la face. Urticaire. Eczéma. Acné juvénile.

Présentation :

Deux formes pharmaceutiques :

Pour les adultes : forme Dragées.

Une ou deux pendant ou après les deux principaux repas (avalé sans croquer).

Pour les enfants : forme Granules.

Deux à quatre par repas (à prendre dans un dessert, compote, confiture, etc.).

Remarque. — Par procédé spécial de fabrication, les Dragées et Granules Elkin sont inaltérables à l'air et solubles dans l'estomac.

Prix : 15 francs.

Laboratoires DEPRUNEAUX

18, rue de Beaune — PARIS (VII^e).

EMERSON'S BROMO-SELTZER

(The Emerson drug Company, Baltimore).

Indications :

Céphalalgies, Névralgies, Action rapide.

Composition :

Citrate de soude, Acétanilide, Bromure de Sodium, Caféine.

Posologie :

Une cuillerée à café dans un verre d'eau, et boire de préférence quand le liquide est en effervescence.

Prix : 10 fr., 20 fr. et 40 fr.

Littérature et échantillons aux Docteurs en exercice, sur demande adressée au Dépôt général :

PHARMACIE ANGLAISE DES CHAMPS-ÉLYSÉES

62, avenue des Champs-Élysées
PARIS (VIII^e)

Téléph. : Élysées 22-52.

EMGÉ LUMIERE

Prophylaxie et traitement de tout trouble lié à l'instabilité humorale. Régulation des fonctions entéro-hépatiques.

Constitution. — Thiosulfate magnésien (S^2O^3Mg).

Propriétés. — L'EGMELUMIERE, en injections intraveineuses, rééquilibre le tonus neuro-végétatif, est un antianaphylactique puissant (pousser les injections avec lenteur pour éviter que les phénomènes de réponse vago-sympathiques n'atteignent une intensité désagréable (rubéfaction de la face, impression de chaleur viscérale).

L'EMGE LUMIERE en *injections sous-cutanées ou intra-musculaires*, est un antianaphylactique curateur et préventif des états de choc d'origine indéterminée, digestive ou médicamenteuse (dermatoses, névroses, troubles fonctionnels de la contraction et du rythme cardiaque, troubles vaso-moteurs).

L'EMGE LUMIERE sous forme de comprimés permet l'imprégnation soufrée, la reminéralisation magnésienne, stimule les fonctions intestinales, pancréatiques, hépatiques.

Doses :

Ampoules : 1 injection intraveineuse ou intramusculaire chaque jour ou tous les 2, 3 ou 4 jours.

Comprimés : 2 à 4 par jour (à prendre au milieu des repas).

Formuler. — Boîte de comprimés d'EMGE LUMIERE : 15 francs.
Boîte d'ampoules d'EMGE LUMIERE (3 ampoules) : 16 francs.
(10 cc. de Solution d'Emgé à 10 p. 100).

Laboratoires LUMIERE 45, rue Villon, à LYON.

EMPLATRES ROGÉ-CAVAILLÈS

Caoutchoutés, Adhésifs (formule de l'hôpital St-Louis).

Oxyde de zinc : Eczémas torpides, Lichénisation.

De Vidal : Furoncles, Impétigo, Folliculites.

Huile de cade : Psoriasis, Dermatoses squameuses.

Le tube : 10 francs.

Colopastre. — Bandes adhésives à l'Oxyde de zinc pour pansements : toutes dimensions.

Gaze anadhère. — Gaze grasse stérilisée, non adhérente aux plaies.

La boîte de 25 compresses : 18 fr. 50.

Laboratoire du D^r R. CAVAILLÈS
29, rue Singer — PARIS (XVI^e).

Détail : Ph^{ie} 116, boulevard Haussmann,
et toutes pharmacies.

ENDO-OVARINA

Extrait ovarien total.

Composition. — Extrait d'ovaire total, en pleine activité.

Propriétés thérapeutiques. — L'ENDO-OVARINA remplace la sécrétion interne de l'ovaire.

Indications. — Tous les cas d'insuffisance ou de suppression de la fonction ovarienne, troubles de la puberté, de la menstruation, de la ménopause, syndrome adiposo-génital.

Posologie. — Suivant les indications : en gouttes, XX à XXX par jour ; en comprimés : 4 à 8 par jour ; en injections : 1 ampoule par jour.

Avantages. — L'ENDO-OVARINA provient exclusivement d'ovaires frais, provenant d'animaux jeunes. Elle est très concentrée.

L'emploi du produit est très économique étant donné que le prix d'un flacon de 60 cc. revient à 22 francs

Laboratoires du Dr Ch. DENSMORE

25, rue Dagorno — PARIS (XII^e).

ENDOPANCERINE

Insuline Française présentée sous forme liquide par injections hypodermiques.

Endopancrine : tube de 5 cc. Chaque cc. titré à 20 unités cliniques.
Endopancrine 40 : tube de 5 cc. Chaque cc. titré à 40 unités cliniques.
Endopancrine 5 : boîte de 12 ampoules de 1 cc. titré à 5 unités cliniques.
Endopancrine 10 : boîte de 12 ampoules de 1 cc. titré à 10 unités cliniques.
Endopancrine 20 : boîte de 12 ampoules de 1 cc. titré à 20 unités cliniques.
Endopancrine huileuse : tube de 3 cc. un cc. = 100 unités cliniques.

Indications : Diabète et ses complications — Acidoses — Vomissements incoercibles de la grossesse — Dénutrition chez l'adulte et chez l'enfant — Troubles trophiques des nourrissons — Insuffisances hépatiques — Artérielles oblitérantes — Troubles Parkinsoniens — Ménorrhagies d'origine ovarienne — Ulcérations chroniques — Furunculose chronique.

Dose du début dans le diabète : 20 unités cliniques. La conduite du traitement ultérieur sera dictée par les dosages du sucre dans les urines ou éventuellement dans le sang.

Endopancrine : 15 francs. — Endopancrine 40 : 28 francs.

Endopancrine 5 : 12 francs. — Endopancrine 10 : 21 francs.

Endopancrine 20 : 34 francs. — Endopancrine huileuse : 60 francs.

Demandez nos notices :

« La thérapeutique du diabète par l'Insuline. »

« Les applications de l'Insuline en dehors du diabète. »

Pour recevoir, à titre d'échantillon gracieux, le modèle de vente, en faire la demande en indiquant exactement le dosage que l'on désire utiliser.

Laboratoire de l'Endopancrine

48, rue de la Procession — PARIS (15^e).

Téléphone : Ségur 26-87 et 76-82.

ENDOTHYMUSINE

Extrait de thymus injectable délipéïdé
et désalbuminé.

L'Endothymusine sera dorénavant dénommée :

PERGLANDÈNE THYMIQUE

Indications. — Retard de croissance de l'enfant, arrêt de croissance du nourrisson, achondroplasie, ectopies testiculaires, troubles des règles chez la jeune fille, syndromes d'obésité dystrophiques de la période prépubère.

Forme et composition. — Boîte de 6 ampoules de 1 centimètre cube.
Chaque centimètre cube = 1 gr. de thymus frais. Prix : 18 francs.
— — — = 3 gr. de thymus frais. — : 24 francs.
— — — = 5 gr. de thymus frais. — : 30 francs.
— — — = 10 gr. de thymus frais. — : 45 francs.

Conduite du traitement. — Série de 12 injections à raison de 3 par semaine. *Adultes* : commencer par 5 gr., faire 10 gr. si nécessaire. *Enfants* : commencer par 1 gr., faire 3 gr. si nécessaire. Intervalle d'un mois entre les deux séries pendant lequel il est bon de donner deux cachets par jour de « HOLOTHYMUSINE » à 0 gr. 50. Pour les enfants indociles qui ne supportent pas les piqûres, remplacer celles-ci par 2 cachets de « HOLOTHYMUSINE » à 0 gr. 50 de poudre de thymus avant les principaux repas.

Laboratoires de l'ENDOPANCRINE

48, rue de la Procession — PARIS (XV^e).

Tél. : Ségur 26-87.

ENDOXIDINE

**Traitement de l'obésité
par l'opothérapie embryonnaire.**

Composition. — Extrait embryonnaire séché dans le vide et pulvérisé. Ne contient pas de thyroïde.

Forme. — Comprimés.

Propriétés thérapeutiques. — Stimule les combustions organiques et provoque l'utilisation des réserves adipeuses. Détermine une diminution progressive du poids sans provoquer le moindre trouble. Constitue le traitement de choix pour les malades ne supportant pas les préparations thyroïdiennes.

Posologie :

4 comprimés par jour pendant la première semaine.
6 comprimés par jour pendant la deuxième semaine.
8 comprimés par jour pendant la troisième semaine.
10 comprimés par jour pendant la quatrième semaine.

Ne pas dépasser la dose de 10 comprimés par jour.

A prendre avant les repas : la moitié de la dose au repas de midi et la moitié au repas du soir.

Laboratoire du D^r Ch. DENSMORE

25, rue Dagorno — PARIS (XII^e). Tél. : Dorian 56-71.

ENERGINE IODÉE DE BERCK

Bardane — Iode — Noyer — Arsenic.

Forme. — Sirop agréable.

Posologie. — *Enfants* : 1 cuillerée à dessert deux fois par jour.

Adultes : 1 cuillerée à soupe deux fois par jour.

Indications. — Croissance, lymphatisme, scrofule, ganglions.

ÉNERGINE PHOSPHORÉE DE BERCK

Complexe opo-minéral nucléine.

Forme. — Granulée.

Posologie. — *Enfants* : 1 cuillerée à dessert deux fois par jour.

Adultes : 1 cuillerée à soupe deux fois par jour.

Indications. — Convalescence, prétuberculose, faiblesse osseuse, asthénie, etc...

Prix : 15 francs.

Laboratoire du Professeur PANCIER
G. RUIN, docteur en pharmacie,
21, rue Saint-Leu — AMIENS (Somme).

ÉNÉSOL

Composition. — Salicylarsinate de mercure (38, 46 0/0 de Hg. métal et 14,4 0/0 de As sous forme dissimulée).

Propriétés. — 70 fois moins toxique que le biiodure. Ne donne pas de phénomènes de stomatite. Indolence de l'injection. Activité spéciale accrue du fait de l'arsenic. L'élément arsenical, d'autre part, agit comme antitoxique à l'égard du mercure que l'on peut administrer à doses plus fortes sans accidents.

Indications. — Syphilis dans toutes ses manifestations, surtout cures d'entretien. Syphilis tertiaires et Syphilis anciennes. Psoriasis.

Posologie. — Doses moyennes : 2cc. correspondant à 0 gr. 06 d'Enésol par jour.

Doses massives ou de saturation : Injections intramusculaires de 4 à 6 cc. (soit 12 à 18 centigr. d'Enésol), tous les 2 ou 3 jours. Injections intraveineuses de 2 à 10 cc. (soit 6 à 30 centigr. d'Enésol), selon le sujet, l'urgence et la gravité, tous les 2 ou 3 jours.

Formes. — Ampoules de 2 cc. et de 5 cc. d'une solution dosée à 0 gr. 03 par cc.

Collyres d'Enésol à 0 gr. 30 d'Enésol par 10 cc. : Affusions ou instillations oculaires de quelques gouttes d'Enésol plusieurs fois par jour (Complications oculaires de la syphilis).

Laboratoires CLIN, COMAR et Cie
20, rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS

ENIODE LEFEBVRE

Composition. — Iode en combinaison stable avec une albumine d'origine animale.

Forme. — Comprimés kératinisés contenant chacun 1 centigramme d'iode en combinaison organique.

Propriétés thérapeutiques. — L'*Eniode* possède toutes les propriétés de l'Iode, sans les inconvénients de l'iodisme.

Doses et mode d'emploi. — *Enfants* : 1 à 2 comprimés par jour.

Adultes : 2 à 8 comprimés par jour, avant les repas.

Prix : 14 francs.

Pharmacie GRIGNON

2, rue Duphot — PARIS.

ENTERIODE

Comprimés combinés d'IODE et d'hydrocarbures de Carbone donnant naissance dans l'intestin seulement à de l'IODE NAISSANT.

Propriétés thérapeutiques. — Puissant désinfectant intestinal.

Facile à absorber, ne provoquant ni irritations ni iodisme. Spécifique de toutes les entérites et plus particulièrement des entérites infantiles.

Posologie.

Nourrissons : 3 fois par jour 1 comprimé écrasé dans un peu d'eau, de bouillon de légumes ou de lait.

Enfants : 3 fois par jour 2 comprimés à la fin des repas.

Adultes : 3 fois par jour 3 comprimés à la fin des repas.

Cures de 3 semaines à 1 mois, renouvelées aussi souvent qu'il est nécessaire.

Prix : 15 francs.

Laboratoires de l'Entériode

39, rue de Clichy — PARIS.

Tél. : Trinité 65-16.

ENTÉRO-ANTIGÈNES

du prof. DANYSZ, de l'Institut Pasteur.

Indications. — *Maladies des voies digestives* : Pharyngites chroniques, dyspepsies de sensibilisation, Constipations chroniques, diarrhées, intoxications alimentaires, colites, entérocrites, dysenteries microbiennes (Shiga, Fleixner, etc.). Appendicite chronique et tous les troubles fonctionnels de l'intestin.

Asthme, Rhume des foins, Emphysème, Dyspnée provoquée par certaines odeurs, certaines substances alimentaires, les changements de température, etc.

Migraines, Neurasthénies.

Affections du foie : Insuffisances hépatiques. Cholécystites aiguës ou chroniques non lithiasiques.

Maladies de la peau : Eczémas, Eczéma variqueux, Urticaires, Prurits généralisés ou localisés (anal, vaginal, etc.), Maladie de Quincke, Psoriasis, Prurigo de Hébra, Furonculose, Acné juvénile, Folliculites, Sclérodermie, etc.

Rhumatismes chroniques. Troubles de la ménopause.

Colibacillose, Cystites à colibacille.

Et dans tous les cas de *Dysharmonie endocrinienne*, soit par excès, soit par insuffisance.

Deux formes. — 1° Ampoules à injecter ; 2° Ampoules à boire.

Boîtes de 10 ampoules. Littérature et échantillons sur demande.

Prix : 30 francs.

Lab. DUCATTE, 31, rue des Francs-Bourgeois — PARIS (IV°).

ENTEROBYL DEHAUSSY

Médication entéro-hépatique rationnelle.

Composition :

Cholérétiques : Chlorure de Magnésium, Sulfate de Magnésie, Polypeptones (Drainage biliaire).

Antiseptiques : Hexaméthylènetétramine, Charbon animal pur (Désinfection intestinale et biliaire).

Indications. — Lithiase biliaire, Cholécystites chroniques, Congestion hépatique, Cirrhoses (alcool, paludisme), Ictère, Cholémie familiale.

Troubles digestifs et troubles divers d'origine hépato-biliaire : Constipation, Diarrhées, Migraines, Vertiges, Urticaire, Prurit.

Posologie et Formes. — Cachets. Granulé.

Drainage biliaire : 1 à 4 cuillerées à café, 1 à 4 cachets, le matin à jeun avec un demi-verre d'eau chaude ou une infusion. Rester étendu sur le côté droit un quart d'heure.

Tâter la sensibilité du malade en commençant par des doses faibles.

Cure d'entretien : 1 à 2 cuillerées à café, 1 ou 2 cachets, vingt minutes avant les repas.

Prix : 15 francs.

Laboratoires DEHAUSSY

66, rue Nationale — LILLE.

ENTÉROFAGOS

Bactériophages intestinaux polyvalents.

Composition. — Bouillon filtrat de bactériophages actifs contre les microbes que l'on trouve dans les infections intestinales.

Dose. — Ampoules à ingérer, 2 par jour, dans un peu d'eau bicarbonatée de préférence.

1 ampoule par jour pour les *enfants*.

Les bactériophages se distinguent par la rapidité de leur action et leur innocuité absolue.

Pas de réaction thermique, pas de choc.

Indications. — Entérites, colites, dysenteries bacillaires, typhoïdes, paratyphoïdes, diarrhées de type varié, constipation, fermentations intestinales, colibacilloses diverses, syndrome entéro-rénal d'Heitz-Boyer.

Remplace avantageusement les ferments lactiques.

Prix : la boîte de 10 ampoules : 18 francs.

la boîte de 5 ampoules : 10 francs.

Laboratoire de Biologie Médicale

7, Avenue des Sources — NICE.

ENTÉROFORMINE

Composition. — Charbon animal et végétal en poudre ultra-fine, Urotropine, Bétol.

Présentation. — En boîtes de 20 cachets.

Indications. — Tous les troubles gastro-intestinaux, affections biliaires, infections urinaires. Particulièrement actif dans la Colibacillose, l'aérophagie et l'antisepsie générale des voies gastro-intestinales et urinaires.

Particularités. — La seule spécialité permettant de prescrire ensemble l'Urotropine et le Bétol, l'Urotropine étant isolée de ce dernier sous forme d'un comprimé soluble.

De plus, il y a lieu de remarquer que :

- 1° Le charbon, présenté en poudre ultra-fine, conserve toutes ses propriétés filtrantes et absorbantes, alors que dans les préparations granulées, le charbon, associé à son excipient, perd une grande partie de son pouvoir absorbant.
- 2° Le Bétol (salicylate de naphtol B) ne se dédoublant que dans l'intestin sous l'influence du suc pancréatique, y donne naissance au naphtol B et à l'acide salicylique qui, se formant dans tout le tube, en assurent la désinfection complète.

Action thérapeutique. — Dix fois plus intense que les associations ordinaires : Benzonaphtol et charbon.

Contre-indication. — Aucune.

Posologie :

Adultes : 1 cachet à la fin des principaux repas.
Dans les cas d'intoxication : jusqu'à 8 cachets par jour.

Enfants : Au-dessus de 6 ans seulement : 1 à 2 cachets.

Prix : 14 francs la boîte de 20 cachets.

Laboratoires THIERRY

141, rue de Paris — ANGOULÊME (Charente).

ENTÉROHÉPATINE

Rééducateur opo-physiologique de l'Intestin.

Composition. — Ext. fl. intestinal, Extr. fl. pancréatique, Extr. fl. hépatique, Extrait salicaire, Teinture Belladone, Acide lactique.

Indications. — Toutes formes d'Entérites, Diarrhées, Dysenteries indigènes ou exotiques. Atonie intestinale.

Mode d'emploi et présentation :

Flacon pour *adultes* : 3 cuillerées-mesure par jour.

Flacon pour *enfants* (compte-gouttes) : II gouttes par année d'âge, 3 fois par jour.

ENTÉROHÉPATINE SB.

Même formule, moins la Teinture de Belladone.

Mêmes indications, mêmes doses.

Le flacon : 15 francs.

Laboratoires Henri FOUCHER

77, boulevard de Grenelle — PARIS (XV^e).

ENTÉROMUCINE

**Régulateur naturel et protecteur idéal
de l'Intestin.**

Constitution. — L'ENTÉROMUCINE ROBERT et CARRIERE est une mucine pure, neutre et stérile obtenue à partir des muqueuses intestinales, et adaptée à la thérapeutique de la constipation et des entéro-colites.

Action physiologique. — 1° ENTÉROMUCINE = REGULATEUR NATUREL : c'est le laxatif idéal.

Le seul lubrifiant réellement physiologique, car à l'état normal c'est le mucus qui permet l'hydratation et le cheminement des fèces.

2° ENTÉROMUCINE = PROTECTEUR IDÉAL : protecteur mécanique et protecteur chimique par suite de son adaptation à fixer les ions acides ou alcalins pouvant nuire au bon fonctionnement de l'intestin ou irriter la muqueuse.

Avantages. — L'ENTÉROMUCINE est :

- 1° SUPÉRIEURE aux LAXATIFS DRASTIQUES ou salins très irritants.
- 2° SUPÉRIEURE aux MUCILAGES VÉGÉTAUX qui se digèrent et augmentent les fermentations.
- 3° SUPÉRIEURE aux POUDRES INERTES et à l'HUILE DE PARAFFINE qui gênent considérablement l'assimilation et provoquent à la longue des irritations graves.
- 4° SUPÉRIEURE aux celluloses indigestibles (son) qui râclent l'intestin, d'où des désastres chez les colitiques.

L'ENTÉROMUCINE est particulièrement remarquable par la *DOUCEUR* de son action.

Indications. — CONSTIPATION simple, à tous les âges, Constipation des colitiques. COLITES diverses, : Entérites, Entérocolites.

Posologie. — 2 à 3 cuillerées à café à chacun des 2 principaux repas. Le granulé est mis sur la langue, croqué et avalé avec un peu de liquide.

Prix :

Granulé petit modèle : 18 francs. — Granulé grand modèle : 60 francs.

Laboratoires ROBERT et CARRIERE

37, rue de Bourgogne — PARIS.

ENTÉRO-PANSEMENT

du Docteur ZIZINE

Forme. — Granulé aromatisé et fondant.

Composition.

Charbon polyvalent activé,
Sous-nitrate de Bismuth,
Antivirus intestinaux.

Propriétés thérapeutiques. — Protège, désinfecte et désensibilise la muqueuse intestinale. Modifie les sécrétions sans gêner le transit.

Indications. — Diarrhées de l'adulte et de l'enfant, Infections et intoxications intestinales ; leurs conséquences. Dermatoses d'origine intestinale, Colites infectieuses et parasitaires. Entérites des pays chauds. Entérocolites. Colibacilloses, localisations hépato-vésiculaires et rénales. Fermentations intestinales ; ballonnement abdominal.

Posologie :

Adultes : de 1 à 2 cuillerées à soupe par jour, à jeun ou aux repas ; à croquer ou délayer dans un peu d'eau.

Enfants : de 1 à 2 cuillerées à café, suivant l'âge.

Laboratoires du Dr ZIZINE

Docteur en Médecine, Docteur en Pharmacie,
Ex-Interne en Pharmacie, Lauréat des Hôpitaux,
Lauréat des Facultés de Médecine de Paris et Bordeaux.

24 et 26, rue de Fécamp — PARIS (XII^e).

Tél. : Diderot 28-96.

ENTÉROVACCIN LUMIÈRE

Vaccin antitypho-colique polyvalent
Vaccination antityphique par voie gastro-intestinale.

Constitution. — Masse pilulaire constituée par des corps bacillaires (éberth-coli-bacille, paratyphique A et B.) rigoureusement stérilisée et enrobée dans une enveloppe kératinisée qui leur permet d'arriver jusqu'à l'intestin sans subir aucune désintégration des produits immunisants.

Propriétés :

Préventives : La durée de l'immunité est variable selon les individus, efficacité de même ordre que celle des vaccins s'administrant par voie sous-cutanée.

Pas de contre-indication, pas de réaction.

Curatives : Etats typhiques, paratyphiques et colibacillaires en cours d'évolution.

Doses. — Pour adultes, 4 pilules par jour pendant 7 jours consécutifs ; 2 le matin et 2 le soir, aussi loin que possible des repas.
Pour enfants, demi-dose, soit 2 pilules par jour pendant 7 jours consécutifs, aussi loin que possible des repas.

Formuler : Une boîte de 28 pilules d'Enterovaccin Lumière.

Les personnes soumises à la vaccination par l'Enterovaccin n'ont rien à changer à leurs occupations habituelles ni à leur régime normal.

Prix : 18 francs.

LABORATOIRES LUMIÈRE

45, rue Villon — LYON.

ENTÉRO-VACLYDUN

Lysat vaccin du Docteur DUCHON

Composition. — Entérocoques, Colibacilles, Staphylocoques et Streptocoques, Lysat-vaccin intestinal à employer par voie *buccale*.

Indications. — Infections intestinales communes, Entérites, Colites, Diarrhées estivales, Diarrhées infantiles, Syndrome enterorénal, états appendiculaires, auto-intoxications intestinales, etc.

Posologie. — *Adultes :* 1 ampoule par jour dans 1/2 verre d'eau sucrée le matin à jeun.

Enfants : 1 ampoule dans 1/2 verre d'eau sucrée à prendre en 3 fois dans la journée.

Nourrissons : 1 ampoule dans 1/2 verre d'eau sucrée à prendre par cuillerée 1/2 heure avant les tétées.

Prix : 25 francs.

Laboratoires pharmaceutiques CORBIERE

27, rue Desrenaudes — PARIS.

Tél. : Carnot 78-11.

ENTÉROXIN

Composition. — Vaccin buccal polyvalent (cultures atténuées de B. Coli, entérocoque, staphylocoque et corps microbiens en suspension).

Présentation. — Ampoules de 10 cc., en boîtes de 8 ampoules.

Mode d'emploi. — 1 à 2 ampoules dans 1/2 verre d'eau froide sucrée, 3/4 d'heure avant petit déjeuner, pendant 10 à 20 jours par mois.

Aucune contre-indication.

Prix : 25 francs.

Littérature et échantillons :

Établissements T. LECLERC

10, rue Vignon — PARIS

ENTÉRYL

Composition :

| | | | |
|--------------------------|------|-------------------------------|-------|
| Agar-Agar | 0,10 | Extrait d'artichaut (feuilles | |
| Oxyde de magnésium | 0,05 | fraîches)..... | 0,10 |
| Soufre floclé..... | 0,05 | Extrait de romarin..... | 0,033 |
| Extrait biliaire | 0,05 | — de combretum R.. | 0,012 |
| | | Evonymine | 0,005 |

Pour une dragée.

Propriétés. — Laxatif doux, cholagogue, désinfectant des voies biliaires et intestinales. Médication cytophyllactique réalisant l'imprégnation magnésienne.

Indications. — Constipation aigüe ou chronique, affections hépatobiliaires, intoxications intestinales.

Posologie et mode d'emploi. — a. Laxatif, stimulant hépatique, désinfectant intestinal : 1 à 2 cachets par jour le soir ou aux repas.

b. Rééducation intestinale, constipation opiniâtre : pendant la première décade : 3 cachets par jour avant les repas, pendant la 2^e décade : un cachet matin et soir, pendant la 3^e : un seul cachet le soir au coucher.

Un mois de repos. Recommencer le mois suivant.

Remarque : L'action du médicament n'est pas immédiate, l'effet ne se produit qu'au bout de quelques jours.

Présentation et prix :

Les 30 cachets : 15 francs.

Les 60 dragées : 20 francs (1 cachet équivaut à 2 dragées).

Laboratoires FALQUE — BESANÇON.

ENZYPAN

Dragées réunissant la totalité des Enzymes digestifs : Pepsine, Diastase, Trypsine, Lipase et Bile associées.

Médication digestive polyvalente pour tous les troubles par insuffisance d'un ou plusieurs ferments.

Bonne solution d'un problème ancien demeuré jusqu'alors sans solutions satisfaisantes.

Pas de cloison de gluten ou de kératine entre les ferments destinés à l'estomac et les ferments destinés à l'intestin. Trop souvent kératine comme gluten, ou se laissent attaquer par le suc gastrique ou traversent l'intestin sans libérer leur contenu.

Dans les dragées d'Enzypan la protection des enzymes intestinaux, pendant leur séjour dans l'estomac, est assurée, particule par particule pour ainsi dire, par l'enduit où elles baignent, et qui s'est révélé aussi bien inviolable par le suc gastrique que détruit par le suc intestinal, dès leur arrivée dans le duodénum.

Doses. — 2 ou 3 dragées au début ou pendant les repas. En cas d'hypochlorhydrie, certaine ou probable, prescrire conjointement :

Acide chlorhydrique officinal : X à XX gouttes pendant ou à la fin des repas.

Prix : 16 francs.

Laboratoire NORGAN

Pierre ALEXANDRE, Pharmacien

41, rue de Rome — PARIS (VIII^e). Tél. Laborde 08-00.

ÉPHÉDERMINE BÉRAL

Présentation. — Crème pâte sans graisse à l'Éphédrine naturelle.

Mode d'emploi. — En application comme une pâte et autant que de besoin.

Indications. — Toutes affections cutanées prurigineuses. Eczémas suintants. Dermatoses allergiques, etc.

Prescrire : ÉPHÉDERMINE BÉRAL. Un tube.

Prix : 12 francs.

Laboratoires de L'ÉPHÉDRINE BÉRAL

194, rue de Rivoli — PARIS

ÉPHÉDRAFÉINE BÉRAL

Deux formes : comprimés et ampoules.

3 centigrammes d'Ephédrine naturelle et 5 centigrammes de Caféine par comprimé ou par centicube.

Propriétés. — Toutes les propriétés de l'Ephédrine et des Ephédroïdes, mais avec, en plus, l'action diurétique et toni-cardiaque de la Caféine, d'où suppression des palpitations, de toute action déprimante sur le myocarde, et des troubles de la miction.

Les comprimés d'ÉPHÉDRAFÉINE sont particulièrement indiqués :

Chez les sujets hypocardiotoniques enclins aux palpitations, et chez les sensibilisés vésico-rénaux.

Mêmes **Posologie et Mode d'Emploi** que les Ephédroïdes (Voir Ephédroïdes Béral).

Les ampoules d'ÉPHÉDRAFÉINE, pour injections sous-cutanées ou veineuses sont particulièrement indiquées, avant les interventions et les rachianesthésies pour éviter les chocs et crises hypotensives.

Prescrire :

Comprimés d'ÉPHÉDRAFÉINE, une boîte : 14 francs.

Ampoules d'ÉPHÉDRAFÉINE, une boîte : 14 francs.

Laboratoire de l'ÉPHÉDRINE BÉRAL

194, rue de Rivoli — PARIS.

ÉPHÉDRAMPOULES BÉRAL

Ampoules à 3 cgr. d'Ephédrine naturelle par centicube.

Pour injections sous-cutanées, intramusculaires ou intra-veineuses :
1 à 4 centicubes par jour.

Pour pulvérisations nasales, instillations vésicales et autres applications externes de l'Ephédrine.

Prescrire : ÉPHÉDRAMPOULES BÉRAL, une boîte : 10 francs.

Laboratoires BÉRAL

194, rue de Rivoli — PARIS.

EPHÉDRASMINÉ

Pulvérisations nasales.

Solution aqueuse glycerinée.

Sulfate éphédrine naturelle..... 2 p. 100
Adrénaline physiologique 1 p. 10 000

Action. — Décongestion prolongée de la muqueuse nasale.

Indications. — Obstruction nasale, Asthme Rhume des foins, Rhinite, Sinusites, Coryza, Coryza spasmodique, Catarrhe, Laryngites, Affections congestives du rhino-pharynx.

Mode d'emploi. — Pulvérisations, tamponnements ou instillations.

Voir également : **Garéphédrine**, page 740 et : **Diuréphédrine**, page 609.

Echantillons et littérature sur demande.

Prix : 12 francs.

Laboratoires THORAL

LE MONT-DORE (Puy-de-Dôme).

ÉPHÉDRINE HOUDÉ

(Éphédrine naturelle)

Propriétés. — Sympathicotrope. Excitant du centre respiratoire bulbaire. Relâche les fibres de la musculature bronchique. Hypertenseur par vaso-constriction périphérique. A petites doses, ralentit et soutient le cœur. Mydriatique.

Avantages. — Non modifiée par les sucs gastro-intestinaux, comme l'adrénaline, ce qui permet de l'employer *per os*.

Indications :

- a. *Essentielles* : Asthme sous toutes ses formes.
- b. *Secondaires* : Rhume des foins. Dysménorrhée. Réactions sériques.

Présentation. — Granules à 1 cgr.

Posologie et mode d'emploi. — 2 à 3 granules le plus près possible du début de la crise.

Répéter cette dose 25 minutes après, si pas d'amélioration nette.

Si encore pas d'amélioration, inutile de persister.

Traitement de fond : même dose, le matin au réveil et le soir vers 4 heures.

Laboratoires HOUDÉ

9, rue Dieu — PARIS.

ÉPHÉDRISOL BÉRAL

Hydrolat d'Ephédra à 3 et 5 p. 100 d'Éphédrine naturelle, sans adjonction d'anal-gésiques.

Pour pulvérisations nasales, préventives et curatives des crises d'asthme, du Rhume des foins et contre les coryzas, rhinites, sinusites, céphalées et surdités catarrhales, etc...

(Éphédriseur BÉRAL, pulvérisateur de poche : 20 francs).

Prescrire ÉPHÉDRISOL BÉRAL, un flacon : 15 francs.

Laboratoires BÉRAL

194, rue de Rivoli — PARIS.

EPHÉDROCAMPHRE

Solution d'Ephédrine naturelle associée au camphre et à l'Acétone chloroforme.

Avantages. — L'Ephédrocamphre possède une triple action décongestionnante, antiseptique, sans irritation et anesthésique.

Indications. — L'Ephédrocamphre est indiqué dans toutes les affections du nez : le Coryza, le Catarrhe nasopharyngien, le Rhume des foins, la Sinusite et enfin l'Asthme.

Présentations. — *Solution aqueuse* isotonique, contenant 3 p. 100 d'Ephédrine, 1 p. 1000 de Camphre et 1 p. 100 d'Acétone chloroforme.

Capsules nasales, contenant une solution huileuse à 1 p. 100 d'Ephédrine, de camphre et d'Acétone chloroforme.

Mode d'emploi. — L'Ephédrocamphre en solution s'emploie en pulvérisation ou en instillation 1 à 5 fois par jour.

En capsules, l'Ephédrocamphre s'emploie en instillation dans les deux narines, 2 à 3 fois par jour.

PRIX : Solution 12 fr. — Capsules 15 fr.

Peut être prescrit aux assurances sociales.

Michel DELALANDE

16, rue Henri-Regnault — COURBEVOIE (Seine).

ÉPHÉDROCURE

Pommade nasale.

Formule. — Chlorhydrate d'éphédrine : 1 gr. ; Chlorhydrate d'amyléine : 0,20 ; Soufre précipité : 0,25 ; Métadioxypénol : 0,30 ; Camphre : 0,40 ; Sulfo-ichtyolate d'am., 0,25 ; Baume du Pérou : 1,50 ; Huile essentielle de melaleuca viridiflora : 1 gr. ; Excipient non mentholé, Q. S. pour 100 gr.

Indications. — Rhume de cerveau, rhume des foins, coryza, rhinite, ozène, sinusite, affections des voies respiratoires.

Présentation. — Tube avec embout spécial à injection nasale.

Enfants et adultes : Introduire 2 à 4 fois par jour gros comme un pois de la pommade dans chaque narine.

Prix au public : 10 francs.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 888-6.

Solution huileuse :

Formule. — Ephédrine base : 0,50 ; Paraforme : 0,40 ; Huile essentielle de melaleuca viridiflora : 2,60 ; Myrtol : 0,30 ; Huile essentielle de lavande vraie : 0,55 ; Métadioxypénol : 0,12 ; Huile d'olive médicinale neutre et stérilisée, Q. S. pour 100 gr.

Indications. — Rhume de cerveau, rhume des foins, coryza, sinusite, céphalée, ozène, prophylaxie de l'asthme et de l'emphysème (en pulvérisations ou en instillations).

Présentation. — Flacon de 30 cc. (à compte-gouttes nasal intérieur),

Enfants et adultes : III à VI gouttes dans chaque narine 3 à 4 fois par jour, En pulvérisations nasales 2 à 3 fois par jour.

Prix au public : 15 francs.

Enregistré au Laboratoire National de contrôle des Médicaments sous le n° 888-5.

Comprimés :

Forme A. — 0,015 éphédrine et 0,01 de phényléthylmalonylurée, par comprimé.

Forme B. — 0,025 d'éphédrine et 0,01 de phényléthylmalonylurée par comprimé.

Indications. — Asthme, Rhume des foins, Rhinites, toux spasmodiques, Bronchites chroniques, Etat d'hypotension.

Prix : Forme A, 13 francs. Forme B, 15 francs.

Enregistré au Laboratoire National de contrôle des médicaments sous le n° 888-7

(publicité exclusivement médicale.)

Laboratoires DE RIVE

82-84, rue de Belleville — PARIS (XX^e).

ÉPHÉDROÏDES BÉRAL

Comprimés à 3 centigrammes d'Ephédrine naturelle.

Indications. — Toutes celles de l'Ephédrine naturelle

Posologie et mode d'emploi. — Débuter par un Ephédroïde pris dès les premiers symptômes avant-coureurs de l'accès d'asthme ou dans les 2 heures précédant cet accès. Renouveler la dose si l'effet est insuffisant. La dose utile une fois établie (elle est souvent de 2 Ephédroïdes), donner cette dose en une fois lors des accès ultérieurs.

En période de crise, prendre préventivement un Ephédroïde le matin.

Chez les hypocardiotoniques et les sujets enclins aux palpitations, remplacer les Ephédroïdes par les comprimés d'Ephédraféine qui évitent les palpitations.

En cas d'insomnie ou d'agitation, remplacer les Ephédroïdes par les comprimés d'Ephétropine qui contiennent les correctifs appropriés.

Prescrire : Ephédroïdes Béral, un flacon : 12 francs.

Laboratoire de l'ÉPHÉDRINE BÉRAL

194, rue de Rivoli — PARIS

ÉPHÉDROLÉNOL

Composition :

| | | |
|----------------------|----|---------|
| Ephédrine base..... | 1 | p. 100. |
| Ess. Eucalyptus..... | 1 | — |
| Ess. Anis..... | 1 | — |
| Ess. Géranium..... | 1 | — |
| Ess. Pin..... | 1 | — |
| Camphre..... | 2 | — |
| Huile Olive..... | 93 | — |

Exactement neutralisée et stérilisée.

Propriétés thérapeutiques. — Aseptise et décongestionne la muqueuse nasale.

Indications. — Coryza, Rhume des foins, Rhinites atrophiques ou hypertrophiques, Ozène, Sinusites, Pharyngite, Végétations adénoïdes et en général toutes les altérations aiguës ou chroniques de la muqueuse nasale.

Asthme : Action rapide et sûre dans toutes les gênes respiratoires nasales.

Augmente la résonance de la voix chez les chanteurs.

Formes et mode d'emploi.

- 1) flacon pour instillation ou pulvérisation.
 - 2) capsules gélatineuses pour instillations nasales.
- Enregistré au Laboratoire de Contrôle des Médicaments.

Prix : 15 francs.

ÉPHÉDROLÉNOL DÉDOUBLÉ

Composition :

| | |
|----------------------|--------------|
| Ephédrine base | 0,50 p. 100. |
| Ess. Eucalyptus..... | 0,50 — |
| Ess. Anis | 0,50 — |
| Ess. Géranium | 0,50 — |
| Ess. Pin | 0,50 — |
| Camphre | 1 — |
| Huile d'Olive..... | 96,50 — |

Exactement neutralisée et stérilisée.

Indications. — Toutes celles de l'ÉPHÉDROLÉNOL en médecine infantile. Injections intratrachéales (2 à 4 cc.) dans tous les états trachéaux ou trachéo-bronchiques. Troubles de la voix, Asthme.

Formes et mode d'emploi.

- 1) Flacon pour instillations, pulvérisations, injections intratrachéales.
 - 2) Ampoules de 5 cc. pour injections intratrachéales.
 - 3) Capsules gélatineuses pour instillations nasales.
- Enregistré au Laboratoire de Contrôle des Médicaments.

Prix : 15 francs.

ÉPHÉDROLÉNOL POMMADE

Se fait à 1 % avec mêmes composants et excipient gras neutralisé.

Prix : 9 francs.

Inscrit au Laboratoire de Contrôle des Médicaments.

Laboratoire de l'ÉPHÉDROLÉNOL

24, boulevard Jean-Jaurès
BOULOGNE-SUR-SEINE

ÉPHÉDROMEL BÉRAL

Sirop mellité contenant un demi-centigramme seulement d'Éphédrine naturelle par cuillerée à café.

Indications. — Application de l'éphédrinothérapie à la médecine infantile, notamment contre l'Asthme infantile, la Trachéite spasmodique, la Coqueluche et l'Énurésie.

Posologie. — 2 à 8 cuillerées à café par jour, suivant l'âge.

Prescrire : ÉPHÉDROMEL,

Un flacon : 14 francs.

Laboratoire BÉRAL

194, rue de Rivoli — PARIS

ÉPHÉDRO-RHINOL

Pommade à l'Ephédrine végétale lévogyre.

Composition. — Ephédrine végétale chl., Novocaïne, Linalol du Bois de Rose, Excipient aromatisé.

Indications. — Coryza et Coryza spasmodique, Rhinites congestives, Sinusites, Rhumes des foins, Céphalée d'origine nasale.

Mode d'emploi. — 3 fois par jour ou plus, gros comme un pois dans chaque narine.

Prix : 11 francs.

Laboratoire des VASO-RHINOL

20 bis, rue Gravelotte — TOULOUSE.

ÉPHÉIODINE BÉRAL

Elixir de Lobélie à 3 centigr. d'Ephédrine et 25 centigr. NaI par cuillerée à café.

La meilleure de toutes les préparations éphédriniques dans les Périodes intercalaires de l'Asthme et contre les Bouffées asthmatiformes des Catarrheux bronchiques et des Emphysémateux.

Dilate les bronches, facilite l'expectoration, soulage toujours. Pas d'iodisme.

Posologie et mode d'emploi. — Une cuillerée à café le matin et au début des accès.

Prescrire : ÉPHÉIODINE,

Un flacon : 16 francs.

Laboratoire de l'ÉPHÉDRINE BÉRAL

194, rue de Rivoli — PARIS

ÉPHÉTROPINE BÉRAL

Comprimés contenant chacun 3 centigr. d'Ephédrine associée à hyosciamine, caféine et acide barbiturique.

Contiennent tous les correctifs électifs des effets secondaires de l'Ephédrine.

Sont particulièrement indiqués contre l'asthme rebelle avec agitation ou insomnie.

Constituent la préparation de choix pour l'administration de l'Ephédrine le soir, en prévision d'accès nocturnes.

Posologie et mode d'emploi. — Comme les Ephédroïdes (Voir Éphédroïdes Béral).

Prescrire : Comprimés d'ÉPHÉTROPINE, une boîte.

Prix : 16 francs.

Laboratoire de l'ÉPHÉDRINE BÉRAL

194, rue de Rivoli — PARIS

EPICRAL

Solution Iodo-arséno-mercurielle (lactate) citratée.

Antisymphilitique et tonique très actif, de goût très agréable, bien toléré, présenté sans indication de sa nature mercurielle.

Composition. — Arséniate de soude 0 gr. 001, Iode en combinaisons iodotanniques 0 gr. 002, Iodure Potassium 0 gr. 010, Lactate mercurique 0 gr. 006, Citrate de soude 0 gr. 150, Extraits fl. de Salsepareille, Fumeterre, Douce-amère, Chicorée, Ec. Orange amère àà... 0 gr. 150, pour une cuillerée à soupe.

Originalité. — Emploi du lactate mercurique (sel de mercure bien toléré, surtout par les enfants) associé à l'arsenic et à l'iode en présence de citrate de soude et d'extraits de plantes dépuratives, ce qui donne un produit très actif, à action à la fois spécifique et tonique, ayant aussi de bons effets sur la circulation.

Indications. — Toutes les manifestations de l'Hérédo-syphilis à tous les âges, prophylaxie pendant la grossesse, traitement d'entretien. Se recommande en Pédiatrie. (troubles de croissance, cauchemars et frayeurs nocturnes dans la première enfance, troubles nerveux, de la vision et de la circulation, eczéma rebelles, dermatoses, états d'anémie, etc...)

Posologie habituelle :

Enfants : 1 à 4 cuillerées à café par jour, suivant l'âge.

Adolescents : 2 cuillerées à dessert à 2 cuillerées à soupe par jour.

Adultes : 2 à 4 cuillerées à soupe par jour.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle
des Médicaments sous le N° 699-2

Prix : 15 fr. 75.

Laboratoires G. LAMBERT ✕, Docteur en Pharmacie

6, rue de Longchamp, 6 — VICHY (Allier)

ÉQUISÉTOL

Médication végétale des déficiences fonctionnelles du foie.

Composition. — Prêle, Romarin, Artichaut, Eucalyptus, Polypode, Saponaire.

Forme. — Granulé fondant, aromatique, agréable.

Propriétés. — Stimulant rationnel de la fonction hépatique, ne provoquant jamais de réaction douloureuse vésiculaire.

Indications. — *Insuffisance hépatique*, congestion chronique du foie, cholémie familiale, états gastro-hépatiques, cholélithiase.

Posologie. — 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, avant les repas.

Prix : 15 francs.

Laboratoires STELVIA

Georges BLAQUE,

Docteur en Pharmacie, Licencié ès Sciences.

59, rue Boissière — PARIS (XVI^e).

Tél. : Kléber 88-70.

ERANOL

Iode en milieu aqueux colloïdal.

L'*Eranol* ne saurait être comparé aux composés iodo-organiques, aux peptones iodées, à l'albumine iodée, à la caséine iodée, à l'huile iodée, ni aux iodures alcalins, tous produits dans lesquels l'iode se trouve à l'état de combinaison stable, difficilement dissociable. C'est un iode non combiné, en milieu aqueux, à l'état colloïdal (mouvements browniens), non caustique ni toxique même aux doses thérapeutiques élevées.

Propriétés. — Grâce à l'état particulier sous lequel se présente cet iode, l'*Eranol*, de beaucoup plus actif que l'iode métalloïdique dans ses indications habituelles, possède une action catalytique très nette, due à ses ions, qui augmente, par excitation, le pouvoir thérapeutique de l'iode. Son hyperactivité, sa teneur en iode (10 p. 1 000), sa parfaite tolérance et sa forme aqueuse en font la préparation d'iode la plus maniable, la plus active et la moins toxique.

Indications. — Lymphatisme, Hypertension, Rhumatismes, Prétuberculose, Tuberculoses torpides, mycoses, etc.

Forme. — Flacon, avec compte-gouttes.

Mode d'emploi et Posologie. — Au moment des repas ou entre les repas, dans une boisson quelconque : eau, vin, bière, etc.

Adultes : XX à L gouttes et plus, deux fois par jour. *Enfants* : V gouttes par année d'âge et par jour, en deux fois.

Prix au public : 13 fr. 75.

Laboratoire de L'ERANOL

45, rue de l'Echiquier — PARIS.

ERCERHINOL

Constitution. — Ampoule nasale à l'Argent Colloïdal électrique R et C avec tétine-olive souple et mobile (ampoule de rechange).

Avantages. — Bactéricide puissant, Traitement *pratique*, rapide et propre.

Indications. — Grippe, infections broncho-pulmonaires, Catarrhe nasopharyngien, Coryza, Sinusite, etc.

Mode d'emploi. — Verser quelques gouttes dans chaque narine 2 à 3 fois par jour, la tête inclinée en arrière.

Prix : Erцерhinol complet (ampoule 25 cc. avec tétine-olive) : 14 francs.

Ampoule rechange : 10 francs.

Laboratoires ROBERT ET CARRIÈRE
37, rue de Bourgogne — PARIS.

ERGEPATINE

Médication hépatique de drainage et de désintoxication des voies digestives.

Formule :

| | | | |
|-----------------------------------|----------|-------------------------------|----------|
| Peptone de viande purifiée | 3 gr. 75 | Extrait mou d'Artichaut | 0 gr. 50 |
| Peptone de poisson.... | 2 gr. 25 | Salicylate de soude ... | 3 gr. |
| Peptone d'œuf..... | 1 gr. 50 | Charbon animal décoloré | 4 gr. |
| Sulfate de magnésie desséché..... | 25 gr. | Podophyllotoxine..... | 0 gr. 05 |
| Extrait mou de Genièvre..... | 0 gr. 50 | Sucre parfumé au citron | |
| Extrait mou de Boldo | 0 gr. 50 | Q. S. p..... | 100 gr. |

Granulé soluble. Prix : 16 francs.

Particularités. — Association des 3 peptones au Sulfate de magnésie, au Salicylate de Soude, et aux extraits végétaux (boldo, artichaut, genièvre); antiseptique (charbon) et laxatif.

Emploi. — 1 à 2 cuillerées à café le matin et à midi.

Indications. — Maladies du Foie et des voies biliaires. Intoxications. Anaphylaxie. Maladies de la peau. Urticaire. Migraines. Constipation par insuffisance biliaire.

Laboratoires du PLASMOCALCIUM
(Chlorure de Calcium assimilable.)

J. C. ARNAULT

SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE (Oise).
O. C. P. Toutes Drogueries et Pharmacies.

ERGOCOLINE

Stimulant et régulateur de l'intestin.

| | |
|---------------------------|------------|
| Enterokinase..... | 0 gr. 005 |
| Extraits biliaires..... | 0 gr. 05 |
| Ferments lactiques | 0 gr. 02 |
| Phénolphtaléine..... | 0 gr. 05 |
| Poudre de belladone | 0 gr. 005 |
| Poudre de jusquiame..... | 0 gr. 0075 |
| Evonymine..... | 0 gr. 01 |
| Extrait d'hamamélis | 0 gr. 05 |
| Poudre de jaborandi | 0 gr. 02 |

Pour 1 comprimé.

Particularités. — Laxatif, non douloureux, sans toxicité, ni accoutumance.

Contient de l'hamamélis (décongestif pelvi-rectal) et du jaborandi (excito-sécréteur de l'intestin).

Emploi. — 1 à 2 comprimés le soir au repas.

Indications. — Constipation (chez la femme en particulier). Stase intestinale. Intoxications d'origine intestinale. Hépatisme.

Laboratoires de la BIOPAUSINE
(Spécifique circulatoire tonique.)

P. TAVERNIER

32, rue de l'Ouest — PARIS.

O. C. P. Toutes Drogueries et Pharmacies.

ERGORONE

Solution huileuse de vitamine D antirachitique
titrée à 6.000 unités internationales par cent. cube,
soit 200 unités pour une goutte.

Indications. — Rachitisme, Spasmophilie, Ostéomalacie, Déminéralisation dans la grossesse.
Pendant la lactation, comme prophylactique contre le rachitisme de l'enfant. Croissances déficientes.

Présentation et posologie. — Flacons de 15 cc.

Nourrissons : III à IV gouttes par 24 heures.

Enfants : VI à X gouttes par 24 heures.

Adultes : X à XX gouttes par 24 heures.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon. — PARIS (VIII^e).

ERGOSTOL VIOLET

Granulé. Reconstituant général à base d'Ergostérine irradiée et de Nucléinate de Manganèse.

Indications. — Asthénie, Chlorose, Lymphatisme, Convalescence.

Formule :

| | |
|----------------------------|-------|
| Ergostérine irradiée | 0,002 |
| Nucléinate de manganèse .. | 0,30 |
| Glycérophosphate chaux .. | 2 gr. |
| Arrhénal | 0,20 |
| Caféine..... | 0,20 |

Prix : 18 fr. 50.

Laboratoires REBOUL
PONTE-SAINT-MAXENCE
 (Oise).

ERGOTINE LAMANTE

Traitement des hémorragies

Forme. — Gouttes et ampoules pour injections hypodermiques.

Composition. — Solution stabilisée et inaltérable de tous les alcaloïdes de l'ergot de seigle, obtenue par le procédé de fabrication spéciale de Lamante.

Indications. — Hémorragies de toute nature. Hémorragies utérines. Accouchements, Fausses-couches, Fibromes, Accidents de la Ménopause, Hémorroïdes, Crachements de sang, Saignements de nez, Leucorrhée, Troubles de la Puberté, Incontinence d'urine chez les enfants. Contre l'Asthme bronchique et la Toux quinteuse, en injections hypodermiques.

Doses et mode d'emploi. — XXX à XL gouttes par 24 heures chez les adultes en deux fois dans un peu d'eau sucrée. XXX gouttes à la fois, 3 à 4 fois dans les 24 heures dans les très fortes hémorragies.

Enfants : 1/3 des doses ci-dessus.

Ampoules. — En injections hypodermiques : 1 ampoule comme préventif d'hémorragie après l'accouchement, ou dans les hémorragies légères. Deux ampoules consécutives dans les hémorragies abondantes. A répéter au besoin 2 à 3 fois dans les 24 heures.

Echantillon et littérature sur demande.

Le flacon gouttes : 12 fr. — La boîte 6 ampoules : 12 fr.

Enregistrés au Laboratoire National de contrôle des médicaments sous les nos 346-5 et 346-6.

Marc PARIS, pharmacien de 1^{re} classe.
 1, rue Lassalle — LYON (La Boucle) (IV^e).

ÉRYTHÈMA

Médication rationnelle des épidermes lésés.

Composition. — Pommade à base de Calcium, Magnésium et Extrait d'Aunée.

Indications. — Toutes lésions de l'épiderme, Dermatoses aiguës et chroniques, en particulier : Erythèmes des nourrissons, Crevasses des seins, Eczémas, etc...

Présentation. — Pommade en tube.

Posologie. — Une application matin et soir.

Laboratoires de l'ÉRYTHÈMA

200, Grande Rue — MAISONS-ALFORT
(Seine).

Tél. : Entrepôt 12-94 et 13-97.

ERYTHRA

DYN

Chimiothérapie élective

de la

ROUGEOLE

Amidopyrine lactique pure à pH = 3,2.

Solution titrée : 1 goutte = 1 cgr.

Antithermique puissant, bien toléré par les enfants, *même à dose élevée*, sans action secondaire sur le rein.

Indications :

Rougeole.

Traitement abortif aux stades du début ;
Médication de fond à la période d'état ;
Thérapeutique préventive des complications.

Fièvres éruptives, saisonnières, septiques.
Grippe, névralgies, migraines, lumbagos, zona.

Posologie :

Rougeole. — Posologie élective :

| | |
|--|---------------------------|
| <i>Enfants</i> : IV gouttes par année d'âge. | } Toutes les 4 heures. |
| <i>Adultes</i> : L à LXXX gouttes. | |

Pyrexies et Algies. — Posologie antithermique et analgésique :

| | |
|--|---------------------------|
| <i>Enfants</i> : I à II gouttes par année d'âge. | } Toutes les 6 heures. |
| <i>Adultes</i> : XXX à LX gouttes. | |

Le flacon compte-gouttes : 18 francs.

Remboursable par les Caisses d'Assurances Sociales.
(N° 734-1).

Société d'Applications pharmacodynamiques.

5 et 7, rue Claude-Decaen — PARIS (XII^e).

Tél. : Diderot 37-93.

ESCULÉOL

Composition. — Alcoolé concentré de Marron d'Inde frais, stabilisé.

Indications et propriétés. — Action vaso-constrictive sur le système veineux périphérique et en particulier dans les cas d'hémorroïdes, varices, varicocèles, phlébites, stase veineuse, etc.

Supérieur aux préparations médicinales parce que concentré, stable et d'action constante.

Mode d'emploi. — **Hémorroïdes :** Administrer 2 fois par j. dans l'intervalle des repas XV gouttes d'Esculéol dans un peu d'eau. Dans les cas rebelles, graduer la dose suivant l'intensité des douleurs, en augmentant de V gouttes par jour. **Varices, varicocèles, etc.** Toutes les fois que la médication devra être continuée pendant un certain temps administrer XV gouttes 2 fois p. j. dans l'intervalle des repas, 20 jours par mois.

Prix : 14 francs.

Peut être prescrit aux assurances sociales.

MICHEL DELALANDE

16, rue Henri-Regnault — COURBEVOIE (Seine).

ESSOFORME

Essoforme simple. — Essences végétales antiseptiques *non caustiques*, solubilisées dans l'huile d'amandes douces.

Flacon de 45 gr. avec compte-gouttes... 9 fr.

Boîte de rhino-capsules 10 fr.

Essoforme éphédriné. — Essoforme simple additionné de 1 p. 100 d'éphédrine.

Flacon de 20 gr. avec compte-gouttes... 18 fr.

Boîte de rhino-capsules 12 fr.

Indications. — Rhinorrhées, rhinites, sinusites. La forme éphédrinée sera réservée aux cas aigus ainsi qu'au traitement de l'*asthme* et du *rhume des foins*.

Mode d'emploi. — En gouttes ou en pulvérisations nasales.

Echantillons sur demande :

Laboratoires GUY SIMON

44, rue d'Inkermann — LILLE (Nord).

ETHYL-PNEUMINE " LERSAM "

Spécifique des affections pulmonaires aiguës.

Composition. — Solution d'alcool-éthylique pur à 33 p. 100 en milieu glucosé isotonique.

Forme pharmaceutique. — Ampoules de 10 cc.

Indications thérapeutiques. — *Traitement efficace de toutes les pneumopathies les plus graves : pneumonies, broncho-pneumonies, congestions pulmonaires, bronchites, abcès du poumon, gangrène pulmonaire.*

Maladies infectieuses et complications pulmonaires : septicémies, fièvres puerpérales, coqueluche, grippe, etc
Traitement des intoxications barbituriques.

Doses. — *Cas graves :* 20 à 40 cc. par voie intra-veineuse ou intra-musculaire, répétées tous les jours.

Cas moyens ou légers : 10 cc. par voie intra-musculaire ou sous-cutanée tous les jours ou tous les deux jours.

Prix. — La boîte de 6 ampoules : 20 fr. Admis aux A. S.

Echantillons, Littérature :

Laboratoires LERSAM

92, Boulevard Murat — PARIS (XVI^e).

EUCALYPTINE LE BRUN

(Antiseptique pulmonaire)

Composition. — Eucalyptol 0,12 cgr. ; Gaïacol, 0,05 cgr. ; Acide phénique, 0,02 cgr. ; Camphre, 0,05 cgr. ; pour une ampoule de 1 cc., le tout dans une décoction huileuse de plantes balsamiques calmantes, spécialement étudiée et rendant *l'injection absolument indolore.*

Formes. — Amp. de 1, 2 et 5 cc. gaïacolées ou non gaïacolées. — Caps. glutinisées. — Sirop.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique pulmonaire. Anti-oxydant. Antithermique. Sédatif de la toux. Diminue et facilite l'expectoration.

Indications. — Toutes les affections aiguës des voies respiratoires : Grippe, Pneumonie, Broncho-pneumonie, Tuberculose, Gangrène pulmonaire, Maladies infectieuses, Coqueluche.

Posologie et mode d'emploi. — Sous la forme capsules : 6 par jour, 2 à chaque repas. En injections intra-musculaires. Adultes : 1 à 5 cc. par jour. Enfants de 5 à 12 ans : 1 à 2 de cc. ; 2 mois à 5 ans, 1/2 à 1 cc. Le flacon de 42 capsules : 11 francs. La boîte d'amp. : 18 francs.

Sirop : *adultes* 4 cuillérées à soupe par jour : *enfants* par cuillées à café ou à dessert suivant l'âge. Prix du flacon : 14 francs.

Dans le traitement de la Coqueluche, émulsionner le contenu d'une ampoule dans 1/2 verre de lait et donner chaque jour en lavement à conserver.

Laboratoire LEBRUN

155, boulevard de Magenta — PARIS (IX^e).
Téléphone : Trudaine 50-34.

EUCHOL MORELLET

Propriétés. — Tonique hépatique cellulaire, Cholérétique, Décongestionnant des voies biliaires, Action douce nécessaire dans les cas de crise, Abaisse le taux de la cholestérine et de l'urée dans le sang, Diurétique puissant.

Remarque. — L'EUCHOL ne contient que de l'artichaut. Il est le *premier* et il a été le *seul jusqu'à fin 1933* à ne contenir que de l'artichaut.

Posologie. — 4 à 6 comprimés à avaler par jour par dose de 2 comprimés au moment des repas.

Durée moyenne du traitement : 3 semaines.

Indications. — *Ictère catarrhal*, Cholécystite et angiocholite, toute insuffisance hépatique, Cholémié familiale. — *Cirrhose*, Lithiase biliaire et rénale. — *Coliques*, Congestions, Migraines, *Constipation*, Intoxications, *Urticair*e, d'origine hépatique. — *Arthritisme*, Cholestérinémie, Etats uricémiques, hypertension.

Prix au public : 16 francs.

Enregistré sous le N° 336-1 au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments (remboursable aux Assurances Sociales).

Laboratoire MORELLET

**J. MORELLET, Pharmacien 1^{re} classe
de la Faculté de Paris.**

Ex-Interne des Hôpitaux de Paris,
BAGNOLES-DE-L'ORNE (Orne).

EUFOSFYL

Composition. — 1° *Ampoules à 1 cc.* à base de : Méthars. de soude, Phosphonucléate, Magn. Cacod. Glycéro-Phosphate, Caféine (Méthars. de Strychn. 1/2 milligramme). Phosph. de manganèse (ampoules avec et sans Strychnine). Indolores.

2° *Cachets*, à base de Splénine, Méthylarsin. sodique, Phosphonucléate de Chaux, Dragées, Glycéro-phosph. calcique, Phosphate tricalcique, Phosph. magnésium. Phosph. de manganèse.

3° *Dragées*, même composition que cachets.

Deux Dragées égalent un cachet.

Indications. — Reminéralisateur nerveux et tonique, surmenage, neurasthénie, asthénie, régénérateur des centres nerveux, impuissance, débilité sénile, hypotension artérielle et ses conséquences, stimulant des glandes endocrines.

Posologie. — *Ampoules* : 1 injection sous-cutanée par jour, pendant 24 jours.

Cachets : 1 à 4 cachets par jour aux deux principaux repas. Cesser pendant 8 jours et recommencer une nouvelle cure.

Prix : 18 francs.

Laboratoires des Produits Vely

132, avenue Victor-Hugo PARIS. — Tél. : Passy 87-85.

EUGALINE

Hygiène intime de la femme.

Propriétés thérapeutiques. — Comprimés antiseptiques et décongestifs.

Formule. — Sulfate de zinc, Acide salicylique, Naphthalate de soude, Trioxyméthylène, Oxycyanure de Mercure, Fluorure de Sodium, Acide benzoïque, Tanin à l'alcool, Chlorure de sodium, Acide citrique, Acide tartrique, Carbonate acide de Sodium, q. s. p. un comprimé de 3 gr., Essence de Géranium rosat, q. s. p. parfumer, Colorant rouge, q. s.

Doses et mode d'emploi. — *Comprimés* : 2 comprimés par 2 litres d'eau bouillie chaude pour injections vaginales.

Enregistré au Laboratoire National
du Contrôle des Médicaments sous le n° 882-3.

Prix : 18 francs.

Laboratoire COUSIN

Rue Albert-1^{er} — BEAUMONT-SUR-OISE.

EUGASTROL

Charbon animal.

Purifié à l'alcool exempt de cyanure.

Propriétés thérapeutiques. — Traitement spécifique des maladies de l'estomac, de l'intestin et du foie.

Indications. — Combat avec une efficacité certaine toutes les maladies de l'appareil digestif, Gastrites, Dyspepsies, Gastro-entérites, Cholécystite pure ou associée, Colite muco-membraneuse, Migraines d'origine gastrique, Ulcères digestifs.

Formule. — Charbon animal pur lavé à l'alcool exempt de toute trace de cyanure, carbonate de chaux pur léger, hydrocarbonate de magnésium, sucre de lait, acide acétylsalicylique, mélangé, étuvé, tamisé, suivant procédé spécial.

Dose et mode d'emploi. — *En poudre* : 1 à 2 cuillerées à café après chacun des principaux repas.

En cachets : Un à la fin des repas.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des médicaments sous le n° 655-3.

Prix :

Poudre : 21 francs. — *Cachets* : 18 francs.

Laboratoires BOUTROY

8, rue de Passy — PARIS.

EUGLYMA

Forme. — Solution titrée de chlorure de magnésium pur, de goût agréable.

Composition. — XXXV gouttes renferment 0 gr. 60 de chlorure de magnésium pur.

Indications. — Asthénies, Dépressions neuromusculaires, Dermatoses, Lésions du type précancéreux, Prophylaxie du cancer, Affections dues au mauvais fonctionnement des voies digestives, biliaires et rénales.

Particularités. — Mauvais goût du chlorure de magnésium absolument masqué.

Posologie. — XXXV gouttes midi et soir, avant le repas dans un demi-verre d'eau.

Echantillons sur demande.

Prix : 16 francs.

Laboratoires LECONTE

7, rue des Petits-Carreaux — PARIS (II^e).

Tél. : Louvre 53-16.

EUGYNOL GRANDVAL

Composition :

Association d'extraits d'Hydrastis-Hamamélis-Viburnum Gossypium.

Propriétés thérapeutiques. — Il favorise la formation chez les jeunes filles, évite les palpitations et provoque l'élimination des toxines.

Vaso-constricteur par excellence ; il régularise la circulation du sang, décongestionne les organes, et apporte toujours un soulagement à la souffrance produite par la moindre affection des organes de la femme.

L'Eugynol permet d'enrayer la formation des Varices ; soit au moment de la grossesse, soit au retour d'âge. Il rétablit la régularité des règles. Son usage à dose modérée finit par supprimer les douleurs qui accompagnent ou qui précèdent si souvent ce moment désagréable.

Indications thérapeutiques. — Complications du retour d'âge, telles que Varices, Hémorroïdes, Hémorragies, Flux sanguins de toute nature, Eruptions diverses, etc.

Dose. — XV à XX gouttes avant chaque repas. On peut aller jusqu'à XXX gouttes.

Le flacon : 10 fr. (toutes pharmacies).

LABORATOIRES GRANDVAL

12, 14, rue Féry — REIMS.

EUMICTINE

Indications thérapeutiques :

Antigonococcique, diurétique, antiseptique, etc.

Affections des voies urinaires :

Blennorrhagie, Urétrite, Cystite, Pyélite, Catarrhe, Prostatisme, etc.

Traitement complet, sans aucun retentissement sur les organes, estomac en particulier.

Doses et mode d'emploi :

Capsules enrobées au gluten pur, contenant chacune 0,20 Santalol, 0,05 Salol et 0,05 Hexaméthylène-Tétramine : 8 à 12 par jour aux repas, ce qui constitue un traitement complet des affections urogénitales et prostatiques.

Prix de vente au public : 20 francs.

Laboratoires du Dr M. LEPRINCE

62, rue de la Tour — PARIS (XVI^e)

EUONYMINE PAUL THIBAUT

Pilules d'Evonymine purifiée, procédé Paul Thibault, licencié ès sciences physiques, ancien Président de la Société de Pharmacie de Paris, Evonymine associée à l'extrait stabilisé de boldo. Le plus actif cholérétique et cholagogue d'origine strictement végétale. Stimulant par excellence de la cellule hépatique.

Indications. — Affections du foie, Insuffisance biliaire, Cirrhoses, Ictères, Lithiase biliaire, Cholécystites, Céphalée, Migraines et Constipation chronique d'origine hépato-biliaire.

Posologie. — Pilules dosées à 0,06 d'Evonymine et à 0,06 d'extrait de boldo. 1 à 3 pilules par jour, soit au dîner, soit au coucher.

Prix : 9 francs.

Établissements SOUDAN

48, rue d'Alésia — PARIS (XIV^e).

Nota. — Afin d'éviter les mécomptes donnés par de nombreuses evonymines du commerce, prescrire toujours : *Pilules d'Evonymine Paul Thibault*.

Enregistré au Laboratoire National n° 218-2.

EUPAVÉRYL PACHAUT

Chlorhydrate de Papavérine
chimiquement pur.

Indications. — Spasmes viscéraux, Asthme, Coqueluche, Déséquilibres vago-sympathiques.

Présentations :

Gouttes : X gouttes = 1 centigramme.

Ampoules : 1 cc. = 5 centigrammes.

Granules : 1 granule = 2 centigrammes.

Posologie :

Adultes : de 0 gr. 05 à 0 gr. 25 en doses fractionnées.

Enfants : 1 centigramme par année d'âge en doses fractionnées.

Ampoules. Prix : 15 francs.

Gouttes. Granules. Prix : 20 francs.

Laboratoires PACHAUT

130, boulevard Haussmann — PARIS

Tél. : Laborde 16-72.

EUPEPTIQUE MONAVON

Composition. — Liqueur exactement dosée et renfermant par cuillerée à soupe :

| | |
|--------------------|----------|
| Pepsine pure | 0 gr. 12 |
| Diastase..... | 0 gr. 15 |

Propriétés thérapeutiques. — Digère les viandes et les féculents.

Avantages. — Il supplée à l'insuffisance et à l'inactivité des liquides digestifs, et par là améliore la digestion, augmente l'absorption et l'assimilation et lutte efficacement contre l'amaigrissement.

Indications. — Digestions lentes et difficiles ; dyspepsies, gastralgies, crampes d'estomac, certaines formes de migraine, et tous les états de faiblesse que ces maladies produisent, tels que : amaigrissement, consommation, anémie, etc.

Posologie. — Un à deux verres à liqueur pour les adultes, après chaque repas, pur ou mélangé d'eau.

Prix : 18 francs.

Produits GONNON

J. et C. GONNON, Pharmaciens

14, rue Victor-Hugo — LYON.

EUPHON

Sirop et Pastilles contre l'enrouement.

Composition et forme. — Sirop à base d'extraits de plantes et de Produits organiques : codeïne 0,02 + Teinture rac. aconit, 0 gr. 20 ; formiate sodique, 5 + sirop d'erysimum et d'aunée 100.

Propriétés thérapeutiques. — Tonique par excellence des cordes vocales (tant chez l'adulte que chez l'enfant), calme complètement les picotements de la gorge qui accompagnent souvent un rhume ou une bronchite. Son emploi s'associe à tous les sirops pectoraux sans aucune contre-indication.

Indications thérapeutiques et posologie. — Entretien de la voix : 3 cuill. à café par jour. — Enrouements, toux laryngées : 3 cuill. à dessert par jour. — Aphonie, trachéite, laryngite (simple ou chronique), 3 cuill. à potage par jour. — Chez les enfants, ne pas dépasser 3 cuill. à café par jour.

Prix : Sirop : 13 fr. 50. — Prix : Pastilles : 5 fr. 90.

Laboratoires MAYOLY-SPINDLER

1, place Victor-Hugo — PARIS (XVI°).

A Bruxelles : LE MARINEL, Pharmacien.

4, avenue Orban Van Volxem.

EUPHORYL

(Cachets — Dragées — Intraveineux.)

Méthode de désensibilisation polyvalente. Traitement des dermatoses prurigineuses et affections anaphylactiques.

Formule. — Hyposulfite de soude et chlorure de calcium en combinaison bromurée silicatée.

Indications. — a) *Dermatoses prurigineuses* : Eczémas secs et suintants, Prurits, érythrodermies, dermites médicamenteuses et professionnelles. Psoriasis, toxidermatoses. **Accidents de l'Aurothérapie.**

b) *Manifestations anaphylactiques* : Urticaire, migraines, œdème de Quincke, maladies sériques.

Posologie. — *Cas moyens* : 3 cachets ou 6 dragées par 24 heures.

Casaigus : Une injection intraveineuse bi-hebdomadaire, avec prise de 2 cachets ou 4 dragées, les jours intercalaires.

Nota. — Il est recommandé de pratiquer simultanément l'injection intraveineuse d'Euphoryl et une autohémothérapie de 10 cc.

Prix : Cachets : 18 francs. — Dragées : 15 francs.

Intraveineux : 30 fr., 18 fr.

EUPHORYL-INFANTILE

(Granulés soluble.)

Traitement des troubles digestifs de l'enfance et de leurs complications cutanées. Anaphylaxie alimentaire.

Formule. — Hyposulfites alcalins, Citrate de sodium, Lactate de magnésium, en combinaison bromurée silicatée.

Présentation. — Granulé soluble de goût agréable facilement accepté par les enfants les plus jeunes.

Indications. — L'EUPHORYL-INFANTILE est particulièrement indiqué dans trois groupes d'affections infantiles.

1° *Dermatoses prurigineuses.* — Eczémas secs ou suintants, eczémas dysidrosiformes, eczémas séborrhéiques, séborrhée, dermites médicamenteuses, érythrodermies, toxi-dermatoses, **strophulus**.

Prurits, herpès, trycophyties, pityriasis.

2° *Troubles digestifs.* — Anorexies, Vomissements. Etat saburral des voies digestives, Intoxications alimentaires, Constipation des nourrissons, Petite insuffisance hépatique.

3° *Anaphylaxies.* — Urticaires, Migraines, Œdèmes de Quincke, Accidents sériques.

Posologie et mode d'administration. — L'EUPHORYL-INFANTILE doit être prescrit à la dose de 1 cuillerée à café par année d'âge.

Il peut être croqué ou dissous dans une petite quantité d'eau ou de lait. Chez les nourrissons, il se dissout aisément dans les biberons.

Prix : 18 francs.

LABORATOIRES « ANA »

18, avenue Daumesnil — PARIS (XII^e).

Tél. : Dorian 52-12,

EUPHYSOL

Indications. — Etats neuro-arthritiques — Déséquilibre humoral et vago-sympathique — Asthme — Emphysème — Dyspnée pulmonaire et bronchique — Troubles des réflexes — Troubles de la nutrition — Médication anti-choc — Lithiase biliaire et rénale — Troubles circulatoires — Hypertension — Manifestations du retour d'âge.

Présentation. — Forme cachets.

Mode d'emploi : *Traitement de début :* Deux cachets à la fin des deux repas de midi et du soir pendant dix jours consécutifs. — Se reposer dix jours et reprendre (Pendant deux mois).

Traitement d'entretien : Deux cachets à la fin du repas du soir, vingt jours par mois. — Repos dix jours, et reprendre, aussi longtemps qu'il sera nécessaire.

La boîte de 40 cachets : 20 francs.

Laboratoire de l'EUPHYSOL

22 bis, avenue de St-Cloud — VERSAILLES (S-et-O).

Tél. : 291 Versailles.

EUPHYTOSE

Traitement phytothérapique des états anxieux et des Dystonies du sympathique.

Forme. — Solution.

Composition. — Une cuillerée à café contient :

| | |
|--|-------------|
| Cratægus oxyacantha..... | 31 centigr. |
| Extrait fluide passiflora incarnata | 50 — |
| Alcoolature Ballota marrubium | |
| nigrum | 98 — |
| Extrait fluide de Paullinia sorbilis | 16 — |
| Extrait mou de Valeriana officinalis | 12 — |

Posologie. — De 1 à 3 cuillerées à café en 24 heures dans un peu d'eau sucrée ou dans une infusion chaude.

Indications. — Angoisse et états anxieux, Insomnie anxieuse, Eréthisme cardio-vasculaire, Palpitations, Tachycardie, Angoisse précordiale, Vertiges, Spasmes viscéraux, Douleurs angineuses, Angoisse de la ménopause.

Propriétés thérapeutiques. — L'**Euphytose** est antispasmodique par la Ballotte. Elle est tonique cardiaque par le Cratægus oxyacantha. Par la passiflore, elle est sédative de tous les troubles nerveux ayant leur point de départ dans le sympathique. Elle modère l'excitabilité réflexe par la Valériane. Enfin, elle doit au Paullinia sorbilis (Guarana) une action tonique puissante, mais non excitante, action régulatrice qui produit cette euphorie spéciale, si appréciée après la phase d'angoisse qu'elle remplace.

L'**Euphytose**, d'autre part, n'entraîne aucune accoutumance ; ne s'accumulant pas, son usage peut être prolongé, et même alors elle n'arrive jamais à troubler le fonctionnement rénal ou à modifier l'équilibre de la tension artérielle. Enfin, elle est parfaitement tolérée par les voies digestives.

Pour toutes ces raisons, l'**Euphytose** représente le médicament parfait de la crise d'angoisse.

Prix de vente au public : 15 francs.

Laboratoire MADYL

14, rue de Miromesnil — PARIS.

Téléphone : Anjou 16-55.

EUPNINE VERNADE

à l'Iodure de Caféine stable.

Doses et mode d'emploi. — Une cuillerée à café matin et soir, au commencement des repas, mélangée dans 2 cuill. à potage d'eau, de lait ou de bière.

Propriétés thérapeutiques. — Diurétique, toni-cardiaque et respiratoire.

Indications. — Asthme, Emphysème, Oppressions, Bronchite chronique, maladies du Cœur et des Vaisseaux, Artério-sclérose, Hydropisies, Angine de poitrine, Intoxications, Urémie, suites de la Grippe.

Prix : 16 fr. 50.

Laboratoires DARRASSE

Rue Saint-Maurice NANTERRE (Seine).

EUPNOGÉNOL

Forme. — Élixir.

Indications. — Asthme, Emphysème, Bronchites chroniques. Oppressions et toutes affections des voies respiratoires.

Doses. — 2 à 4 cuillerées à café par 24 heures pour les adultes et suivant avis du médecin pour les enfants.

Prix du flacon : 16 fr.

Échantillon envoyé sur demande.

Préparé par le laboratoire de
l'Eupnogénol.

F. VELLAY

Pharmacien de 1^{re} classe.

116, Avenue Berthelot
VIENNE (Isère).

EUPNOL (Poudre et Pastilles)

Asepsie des muqueuses des premières voies respiratoires (nez et gorge).

Composition. — Menthol, terpinol, eucalyptol, essence de pin sylvestre, acide benzoïque.

Propriétés. — Décongestionnant, désinfectant non caustique, non toxique des fosses nasales, du pharynx et de la trachée.

Indications. — Oto-rhino-laryngologie, rhinites, sinusites, pharyngites, laryngites, trachéites.

Mode d'emploi. — a. Poudre : 1 cuillerée à café dans un bol d'eau bouillante en inhalations, lavages et gargarismes.

b. Pastilles : Sucrer 8 à 10 par jour.

Prix : Poudre, le flacon : 15 fr. ;

Pastilles : 5 fr. 50 la boîte.

L. N. C. 314-33 et 34.

Laboratoire ECHEMAN

26, rue des Moines — PARIS (XVII^e).

EUSKINE

1^o *Crème EUSKINE* (Crème au Stéarate neutre).
Dermatoses irritables. Constitue une crème excellente d'entretien pour les peaux grasses. Remplace avantageusement la vaseline dans ses applications.

2^o *Baume EUSKINE faible* (Pommade à l'Ichtyol et goudroline).

Dermatoses subaiguës, eczéma subaigu, eczématides, eczéma variqueux, eczéma anal et vulvaire, eczéma artificiel des mains.

3^o *Baume EUSKINE fort* (Pommade au camphre, soufre, goudroline et ichtyol).

Dermatoses sèches, torpides, non inflammatoires.
Eczéma chronique plus ou moins lichénifié.

Tubes de 10 fr.

Laboratoire RICHER

Docteur en pharmacie

45, Faubourg Saint-Denis — 1, rue d'Enghien
PARIS.

EUSOMNINE BÉLIÈRES

(Diéthylmalonylurée ammonio-bromée).

Forme. — Comprimés.

Propriétés thérapeutiques. — Hypnotique, sédatif, antialgique.

Indications. — Insomnies nerveuses, Névroses, Neurasthénie, Hystérie, Dyspnée, Névralgies, Démorphinisation, Dyspepsie nerveuse.

Mode d'emploi et dose. — *Comme sédatif* : Un comprimé pour les adultes. Un demi-comprimé pour les femmes. Deux fois par jour.

Comme hypnotique : Une heure avant de se coucher : Pour les adultes, 2 comprimés. Pour les femmes, 1 comprimé 1/2. Ces comprimés doivent être pris le soir dans une tasse de tisane chaude, camomille, tilleul, oranger, thé léger.

Chez les enfants atteints de Coqueluche et de Crises nerveuses, on peut très utilement donner 1/6 ou 1/4 de comprimé.

L'étui : 6 francs.

Laboratoires BELIERES

19, rue Drouot — PARIS (IX').

EUTENSYL GRÉMY

Traitement de l'hypertension artérielle.

Formule. — Principes actifs totaux purifiés et stabilisés des organes suivants pris à l'état frais.

| | |
|------------------------|----------|
| Corps thyroïde | 0 gr. 02 |
| Muscle cardiaque | 0 gr. 50 |
| Parenchyme rénal | 0 gr. 50 |
| Iodotyrosine..... | 0 gr. 05 |
| Scille..... | 0 gr. 06 |
| Scammonée | 0 gr. 04 |

pour une pilule.

Doses et mode d'emploi. — Deux à quatre pilules par jour à prendre une demi-heure ou une heure avant les repas.

Indications. — Artériosclérose au début, hypertension artérielle, obésité avec hypertension, athéromateux, néphrite chronique hypertensive, cardiopathies avec hypertension.

L'Eutensyl provoque une hypotension mesurable au sphygmomanomètre, et il compense cette hypotension en excitant le rein, en favorisant les évacuations intestinales, en rassurant le cœur.

Le médecin peut associer à l'Eutensyl la digitale.

Prix : 20 francs.

14, rue de Clichy — PARIS (IX^e).

ÉVINE

Poudre soluble Evine.

Antiseptique, parfumée, alcaline, détersive, décongestionnante, sédative, cicatrisante, non caustique. Ne tache pas.

Indications. — Hygiène intime et journalière de la femme. Gynécologie, Obstétrique, Dermatologie, suivant doses.

Posologie. — 1° Hygiène féminine ; 1 paquet pour 2 litres d'eau bouillie tiède, en injections et lotions ; 2° Gynécologie, Leucorrhée, Vulvite, Prurit : 2 à 3 paquets pour 2 litres eau bouillie (injections, lotions, compresses), précieux adjuvant aux pansements médicaux ; 3° Obstétrique (même posologie qu'en gynécologie) ; 4° Hygiène masculine : 1 paquet pour 1 litre d'eau bouillie en bains et lotions ; 5° Dermatologie : 1 paquet pour 1/2 litre d'eau bouillie tiède (bains, lotions, compresses).

Ovules Evine.

Puissamment antiseptiques et non irritants, cicatrisants, décongestionnants, désodorisants, fondent à 36°5. Ne tachent pas.

Indications. — Toutes affections Gynécologiques.

Posologie. — Un ovule le soir au coucher. Au préalable, prendre une injection avec une solution de Poudre Evine dans de l'eau bouillie tiède. Renouveler cette injection le matin au lever.

Prix : Poudre : 14 francs. — Ovules : 16 francs.

Laboratoires ÉVINE

16, rue Barbette — PARIS (III^e). Tél. : Turbigo 90-47.

EOBILINE

Dragées plates Inaltérables.

Association d'extraits végétaux (feuilles d'artichaut, boldo, combretum, evonymus) et de poudre de foie et sels biliaires.

Propriétés. — Cholagogue, tonique du foie, rééducateur des fonctions entérohépatiques, diurétique, antitoxique, laxatif.

Indications. — Toutes insuffisances hépatiques et leurs conséquences : cholécystite, ictères, cirrhose, lithiase biliaire, constipation, urticaire, troubles hépatiques consécutifs à certaines maladies infectieuses.

Dose et mode d'emploi. — Trois fois par jour, une à deux dragées au début ou la fin des repas.

Autorisé par les Assurances Sociales.

Prix : 15 francs.

Laboratoires LAFFORT, Pharmacien

Licencié ès sciences, Ingénieur E. C. B.

JOUE-LES-TOURS (I.-et-L.).

ÉVOLAXINE

(Le Laxatif de la Femme.)

Traitement physiologique de la constipation habituelle de la femme.

Pas d'accoutumance. Pas de coliques.

Par ses lipoides ovariens stabilise et régularise la sécrétion endocrinienne en général, la sécrétion intestinale en particulier.

Par son mucilage lubrifie les parois intestinales.

Par son rhamnus frangula excite le péristaltisme.

Par sa duodénase augmente les sécrétions biliaire, pancréatique et intestinale.

Par ses sels biliaires désinfecte le tube digestif.

Indications. — Constipation habituelle de la femme, Entéro-colite chronique, Dermatose, Acné, Furunculose, Auto-intoxication intestinale.

Doses. — 1 à 3 comprimés le soir en se couchant (action rapide), 1 comprimé par jour pendant 30 jours (cure de régularisation intestinale).

Prix au public : 12 francs.

Laboratoires du Dr LAURENT-GERARD

Docteur ès sciences,

Ancien-Chef de Laboratoire

à la Faculté de Médecine de Paris,

40, rue de Bellechasse — PARIS. Tél.: Littré 97-95.

EVONYL

Composition. — Extraits biliaires, de glandes intestinales, Evonymine, Fucus, agar-agar, ferments lactiques, podophyllin, phénolphtaléine, etc., en milieu ergostérique irradié suivant notre méthode de vivification des végétaux donnant à la synergie médicamenteuse un coefficient supérieur pour sa valeur thérapeutique.

Propriétés. — Laxatif doux, absolument certain. Cholagogue de premier ordre. Un seul produit pour toutes les affections du foie et de l'intestin.

Indications. — Constipation aiguë ou chronique. Insuffisance hépatique, cholécystites, lithiases biliaires, hypertension.

Forme. — Tablettes dragéifiées.

Posologie. — Une à deux tablettes le soir au repas (à avaler sans mâcher).

Prix au public : 15 francs pour un mois.

Laboratoires FLUXINE

J. BONTHOUX, Pharmacien

VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (Rhône).

EXHEPA

Extrait de foie en poudre.

Indications. — Anémie pernicieuse et autres genres d'anémie grave, Tuberculose, Convalescences.

Forme. — Tubes contenant l'équivalent de 100 grammes de foie frais.

Boîtes de 5, 10, 20 et 100 tubes.

Mode d'emploi. — Délayer la poudre dans un liquide froid ou mieux tiède, mais jamais bouillant.

Posologie. — De 1 à 4 tubes par jour suivant les cas.

L'EXHEPA est présenté sous deux formes : l'une « goût naturel », l'autre « goût de bouillon ».

Valentin AAGE MOLLER

149, rue du Palais-Gallien — BORDEAUX

Dépositaire pour la France : **Jean DEDIEU**

39, rue Fondaudège — BORDEAUX

EXOBOL

Guérison de la Constipation.

Nouvelle émulsion à 50 p. 100 d'huile de paraffine. Goût très agréable.

Indications. — Constipation simple. Constipation compliquée de colite, Constipation consécutive à un obstacle mécanique adjuvant d'un traitement chirurgical.

Forme. — Emulsion.

Posologie :

Adultes : 1 cuillerée à soupe par jour *au milieu du repas*; parfois 2.

Enfants : La moitié ou le $\frac{1}{3}$ de ces doses.

Grand flacon : 20 francs. — Moyen : 12 francs.

Petit : 7 francs.

Etablissements MOUNEYRAT

12, rue du Chemin-Vert

VILLENEUVE-LA-GARENNE, près Saint-Denis (Seine).

EXONEROL

Propriétés thérapeutiques. — Désintoxication de l'organisme, traitement de la constipation.

Indications. — Stase intestinale chronique, constipation atonique et spasmodique, désintoxication à la suite de maladies infectieuses.

Formule. — Magnésie calcinée légère Codex, Magnésie lourde anglaise, Hydrate de magnésie Peroxyde de magnésium, chacun des produits étuvés séparément mélangés, finement pulvérisés et tamisés, suivant procédé spécial.

Dose et mode d'emploi. — 1 à 2 cuillerées à café le soir au coucher.

Enregistré au Laboratoire National de contrôle des médicaments sous le N° 655-4.

Prix : 19 francs.

Laboratoires BOUTROY

8, rue de Passy — PARIS.

EXTRAIT DE MALT FRANÇAIS DÉJARDIN

Bière de santé extrêmement concentrée additionnée de glycérophosphates.

Indications. — Les nourrices défaillantes, les dyspeptiques, les anémiques et les chlorotiques.

Aliment des faibles, des délicats, des épuisés.
Remède des arthritiques, scrofuleux et lymphatiques.

Posologie. — *Pour les adultes* : Pur, un verre à bordeaux un quart d'heure avant les repas et mélangé comme boisson, en mangeant, dans la proportion de 1 pour 3, à une eau naturelle très légèrement alcaline.

Pour les enfants : Le quart ou la moitié de ces doses.

Prix : 3 fr. 30, verre compris.

Établissements DÉJARDIN

10, rue Parent-de-Rosan — PARIS (XVI^e).

EXTRAIT HAMYD

Composition. — Mélange en proportions définies de Hamamelis Gmet, Hydrastis Gmet, Condurango Gmet.

Propriétés. — Vaso-constricteur. Décongestif pelvien et vasculaire, Sédatif gastrique.

Indications. — Tous les troubles de la circulation veineuse. Tous les états congestifs du petit bassin (fibromes, métrites, prostatites, hémorroïdes, varicocèle, etc.). Troubles de la puberté et de la ménopause, Gastralgies réflexes.

Posologie. — 1 cuillerée à café dans un peu d'eau 1 ou 2 fois par jour.

Prix : 20 francs.

Laboratoire GMET

27, faubourg Montmartre — PARIS (IX^e).

FA-NER-VAL

Facit-nervum-validum.

Formule du D^r Martin du Theil.

Forme. — Granulé.

Composition. — Ce granulé contient par cuillère à café : Arrhénal, 0,025 ; teinture de noix vomique, 0,10 ; glycérophosphate de soude, 0,333 ; extrait hyd. alcool. de quinquina jaune, 0,0666 ; extrait aq. de quinquina rouge, 0,0666.

Indications. — Toutes les dépressions du système nerveux et les troubles du grand sympathique.

Doses habituelles. — 1 cuillère à café, 2 fois par jour avant les repas. Cures de 4 semaines séparées par un intervalle de 8 jours.

Prix : 19 francs.

Laboratoires LACOMBE et Cie

42, rue du Mont-Cenis — PARIS (XVIII^e).

FANGO FISCH ET C^{ie}

Forme. — Boue volcanique radioactive en poudre.

Mode d'emploi. — Application sous forme de cataplasme de 44° à 54°.

Indications. — Affections chroniques douloureuses, musculaires, tendineuses, nerveuses, articulaires, gynécologiques, uro-génitales et des organes internes.

Contre-indications. — Fièvre et insuffisance fonctionnelle circulatoire.

Prix : Paquet de 1 kg. 500 : 12 fr. 50.

— de 4 kg. 500 : 33 fr.

Pour hôpitaux : Prix sur demande, par 100, 1 000 kilos et par wagon.

Laboratoires FISCH et C^{ie}

4, rue d'Illzach — MULHOUSE

Agence à Paris : 104, faubourg Poissonnière.

Tél. : Lamartine 92-52.

FARINES DE RÉGIME BLOCH

Pures, Variées, Riches en Phosphates, Blutées au minimum.

Farines de Céréales :

Crème de Riz, d'Orge, d'Avoine, de Blé vert.

Farines de Légumes :

Farine de Pois, de Lentilles, de Haricots.

Farines de Fruits :

Farine de Châtaignes. Farine de Bananes.

Semoules : de Blé, de Riz, d'Avoine.

Flocons : d'Avoine, d'orge.

Rapidoats : Petits flocons d'Avoine. Cuisson cinq minutes.

Blokao : Déjeuner de suralimentation à base de Farine de Bananes et Hydrates de Carbone aromatisés au cacao.

Riz — Tapiocas — Féculs — Arrow-Root

Indications thérapeutiques. — Alimentation des enfants, régime des Dyspeptiques et Entéritiques, Constipés, Nerveux, Anémiés et Surmenés.

Laboratoire des Etabl. AUG. BLOCH et FILS.

à TOMBLAINE, près NANCY (Meurthe-et-Moselle).

Maison fondée en 1811.

Hors Concours, Membre du Jury :

Strasbourg 1930-1932-1933. — Nancy 1932-1933.

FARINE DE SOJA "SOYOLK"

ALIMENT-MÉDICAMENT contenant tous les principes de la fève de soja. SAVEUR AGREABLE, INALTÉRABLE.

Composition : PROTÉINES VÉGÉTALES, 43 p. 100 ; MATIÈRES GRASSES, 20 p. 100 ; HYDRATES DE CARBONE solubles, 13 p. 100.

ABSENCE D'AMIDON, LECITHINE, VITAMINES A. B. D.

1 gr. = 3 calories 58.

Indications. — Enfants : **Dyspepsie** du lait de vache et des farineux.

Intolérance pour le lait (voir Végé lact), **Eczéma infantile**, **Diabète**.

États colitiques de l'enfant et de l'adulte (acidifie urines et feces). **Colibacillurie**.

Mode d'emploi. — Incorporer de 5 à 10 p. 100 de SOYOLK aux BOUILLIES, POTAGES, etc. (une notice détaillée des applications culinaires est jointe à chaque boîte). Le Soyolk entre dans la préparation du Végé lact.

La boîte de 350 gr. : 6 fr. 50.

Pharmacie MARCEAU

7, avenue Marceau — PARIS (XVI^e).

Dépôt général OCP.

FECULYSE HEUDEBERT

Composition. — Diastases de céréales en suspension dans une albumine alimentaire neutralisante.

Indication. — 1° Apporter dans l'estomac les diastases des céréales qui ont sur les amidons les mêmes pouvoirs digestifs que la salive.

2° Diminuer l'acidité gastrique en excès, non par des médicaments alcalins, mais par des albumines alimentaires utiles (caséine du lait). Active la digestion normale des personnes qui mangent vite : flatulence, gaz, aérogastrie, hyperchlorhydrie.

Mode d'emploi. — Délayer 1 ou 2 cuillerées à soupe de FECULYSE dans la valeur d'une tasse à café d'eau chaude, *mais non bouillante*.

A prendre après les repas comme une tasse de café ou entre les repas au moment de toute sensation de mauvaise digestion.

Prix : 10 francs.

Produits de régime HEUDEBERT

85, rue Saint-Germain — NANTERRE (Seine).
2 et 4 chemin Feuillat — LYON (Rhône).

FÉLAMINE « SANDOZ »

Association de l'acide cholique cristallisé pur et de l'hexaméthylène tétramine.

Forme. — Comprimés dragéifiés à 0 gr. 30.

Propriétés thérapeutiques. — Cholagogue, désinfectant des voies biliaires, dissolvant de la cholestérine.

Indications. — Cholélithiase et cholécystites, ictères, constipation par hypochole, insuffisances hépatiques.

Posologie. — Après les repas, avaler les dragées sans les mâcher.

1° Cas sub-aigus : 2 à 6 comprimés ; 2° Cas chroniques : 3 à 4 comprimés par jour.

Traitement : 15 jours par mois et pendant plusieurs mois de suite (cholélithiase).

Prix : du flacon de 50 dragées : 20 francs.

PRODUITS SANDOZ

20, rue Vernier — PARIS (XVII^e)

FÉMINADÈNE

Synergie d'extraits des glandes génitales, magnésium (oxyde de), phénylethylmalonylurée.

Indications : *Nervosité féminine*, dans toutes ses manifestations, à toutes les périodes de la vie génitale.

Anxiété, émotivité, dépression, subagitation, insomnies, palpitations.

Troubles à la puberté, à la ménopause, après castration, après couches.

Époques difficiles, irrégulières, douloureuses. Malaises des femmes célibataires, veuves, stériles.

Doses : 4 dragées par jour, en moyenne.

Laboratoires du FÉMINADÈNE

120, rue Lecourbe — PARIS (XV^e).

FENUCALCIUM

Forme. — Cachets.

Formule. — Hémoglobine, Phytosphosphine, Protoxalate de fer, Carbonate de Manganèse, Poudre de Colombo, Poudre de Quassia, Poudre de Prêle, Lactate de chaux, Poudre de Rhubarbe, Magnésie hydratée, Fluorure de calcium, Poudre de noix vomique, Poudre de gentiane, Phosphate tricalcique, Arrhénal, 0,015, Poudre de Fénugrec.

Indications. — Anémie, Amaigrissement, Phosphaturie, Grossesse, Allaitement, Convalescences, Manque d'appétit, Tuberculose, Etats pré-tuberculeux.

Posologie. — Un cachet au début des trois repas. Enregistré au Laboratoire du Contrôle des Médicaments sous le n° 884-4.

Prix : 20 francs.

Laboratoire HOCQUETTE

191, Faubourg Saint-Antoine — PARIS (XI^e).

Tél. : Diderot 04-71.

FENUCINE

| | |
|--|------------------|
| Fenugrec traité spécialement et sans odeur | 0,90 par cachet. |
| Céréalophosphates de Ca et Mg | 0,15 — |
| Poudre d'os frais total | 0,15 — |
| Nucléinate de Manganèse | 0,02 — |

Propriétés. — Stimulation de l'appétit. Action puissante sur le métabolisme. Fonction hématopoïétique. Recalcification.

Indications. — Anémies, Asthénies, Perte de poids, Diabète, Grossesse, Lactation.

Aucun produit toxique, aucun extrait glandulaire. Donc aucune contre-indication.

Présentation. — Boîte de 30 cachets.

Posologie. — 3 cachets par jour au milieu des repas. Dose pouvant être doublée.

Prix des 30 cachets : 15 fr.

Laboratoires LAMBERT

Place du Châtelet — ORLÉANS

FENUGRÈNE

Poudre de Fenugrec déshuillée et désodorisée. Contenant tous ses principes actifs : phosphates organiques, lécithine, calcium, fer et manganèse organiques.

Propriétés. — Stimulant puissant de l'appétit, Agent d'augmentation de poids, Producteur d'énergie et de forces.

Indications. — Tous les cas d'amaigrissement, Maigreur habituelle, Amaigrissement au cours ou à la suite de maladies aiguës ou chroniques, Amaigrissement chez les nerveux, Stimulant de la nutrition et de la lactation chez les femmes enceintes et les nourrices. Donne des couleurs, de l'embonpoint et des forces aux enfants débiles.

Mode d'emploi. — Le Fenugrène se présente sous forme de cachets, de dragées, de granulé et d'elixir.

Dose journalière moyenne : 4 cachets ou dragées pour les adultes. Elixir : 2 à 3 cuillerées à soupe pour adultes. Deux à quatre cuillerées à café de granulé pour les enfants.

Prix : 100 Cachets, 35 frs. ; 36 Cachets, 14 fr. ; Elixir, 22 frs. ; Dragées, 15 francs ; Granulés, 17 francs.

Laboratoires de la LIPOSEPTINE

2, place des Vosges — PARIS.

FENUROBUR

Puissant agent de l'augmentation du poids.
Excito-moteur et reconstituant.

Formule :

| | |
|---------------------------|-------|
| Fenugrec désodorisé | 0,90 |
| Poudre de rate | 0,015 |
| Poudre de Surrénale..... | 0,002 |
| Oxyde de Magnésium..... | 0,083 |
| Pour 1 cachet n° 50 | |

Mode d'emploi. — 3 à 6 cachets par jour
au milieu des repas.

Amaigrissement, Convalescences, Asthénies.

Prix : 18 francs.

Echantillon et Littérature :

Laboratoire ABARNOU

72, avenue Thiers — LE MANS.

FER INTRAVEINEUX FRAISSE

Composition :

| | |
|---------------------------|-------|
| Cac. de fer..... | 0,01 |
| Formiate de cuivre | 0,001 |
| Cac. de soude | 0,02 |
| Solution isotonique | 5 cc. |

Indications. — Solution Ferro-arséno-
cuprique injectable dans la veine, sans
crainte de choc hémoclasique.

Injecter le contenu d'une ampoule
tous les 2 jours.

Ampoules de 5 cent. cubes.

Boîte de 6 ampoules : 16 fr.

Laboratoires FRAISSE

8, rue Jasmin, PARIS (XVI^e).

FER LARCADE

Composition. — Combinaison d'hydrate ferrique et d'acide organique, associée au manganèse, qui renforce son action par l'apport d'oxygène et aux principes toni-aromatiques des oranges amères qui en masquent la saveur styptique.

Forme. — Liqueur d'un goût agréable et d'une très faible teneur en alcool.

Action. — Favorise la formation des hématies, augmente leur richesse en hémoglobine.

Indications. — Spécifique de tous les états anémiques, des cachexies chroniques.

Mode d'emploi. — Un verre à liqueur (2 cuillerées à soupe) au commencement des deux repas.

Prix : la bouteille, 22 fr.
(traitement d'une quinzaine).

La demi-bouteille : 13 fr.

Concessionnaires pour la France et les Colonies :

Établissements GOY

23, rue Beautreillis — PARIS (IV^e)

FERMENT PUR DE RAISIN du Prof. Jacquemin.

(Exposition Pasteur, Strasbourg 1923.
Hors Concours, Membre du Jury.)

Immunisation et Désintoxication Générale de l'organisme.

Source de *Diastases* et de *Vitamines*.

Indications physiologiques. — Dépuratif et anti-staphylococcique. Affections gastro-intestinales. Stimulant de la Nutrition et de la Croissance. Régénérateur dermique et épidermique.

Thérapeutique. — Furonculose, Maladies de peau, Dyspepsie, Entérite, Diabète, Gripes, Rhumatismes, Insuffisances endocriniennes et nutrition.

Posologie. — 1 flacon pour une cure de 3 semaines à prendre 1/2 heure avant les repas.

Prix : 30 francs.

Littérature et échantillons à :

INSTITUT JACQUEMIN

à MALZEVILLE-NANCY (Meurthe-et-Moselle).

FERMENTS LACTIQUES FABRE

en cultures pures.

**Traitement des infections intestinales
aiguës et chroniques
et de toutes leurs conséquences.**

Cas aigus : 2 à 3 flacons par jour.

Cas subaigus : 1 flacon par jour.

Désinfection intestinale : 1 flacon 3 jours par semaine.

Prix :

La boîte de 7 flacons : 35 francs.

La boîte de 3 flacons : 15 francs.

Laboratoires FABRE

33, rue de la Haie-Coq

AUBERVILLIERS (Seine).

Tél. : Botzaris 62-40.

FER-OVARINE VITALIS

(Pilules)

Contre anémie et insuffisance ovarienne

Composition. — Pilules composées, à base d'extrait d'ovaire, de fer et de manganèse.

Indications. — Anémie, Puberté, Ménopause, Asthénie nerveuse, Obésité, Dysménorrhée.

Deux pilules avant les 2 principaux repas, 20 jours par mois.

Prix : 14 fr. 50 la boîte.

FERANDRINE VITALIS

(Dragées) 2 à 5 par jour.

Composition. — P. orchitique, fer, manganèse, hypophyse.

Indications. — Infantilisme, troubles de la puberté, Fatigue de l'adolescence, Paresse intellectuelle, Impuissance en général, etc...

Chez la femme : Carence sexuelle, Troubles complexes des femmes privées de maternité, ménopause.

La Férandrine chez la femme est une médication de remplacement.

Prix : 16 francs la boîte.

Echantillons et notices documentaires

Laboratoires BEAULIEU

38, boulevard de Charonne — PARIS

FERROCODILE ET FERRICODILE

Cacodylate Ferreux — Cacodylate Ferrique.

Indications thérapeutiques. — Spécifiques de l'Anémie et de la Chlorose, Malaria, Anémie palustre, etc. Tous les avantages des sels ferreux et ceux de l'arsenic organique. Le Cacodylate Ferrique est le seul sel de fer agissant très bien en injections hypodermiques, qui, faites intramusculaires, ne sont pas douloureuses.

Préparations réellement supérieures dans les infections des pays chauds.

Doses et mode d'emploi. — *Ferrocodile* : Pilules à 0,025 : 4 par jour aux repas.

Ferricodile : Ampoules à 0,05. Une injection par jour pendant huit jours ; repos un temps égal, reprise en alternant jusqu'à guérison.

Prix de vente au public : Pilules, 11 fr. 25 ;
Ampoules, 12 fr. 50.

Laboratoires du D^r M. LEPRINCE

62, rue de la Tour — PARIS (XVI^e).

FERROPHYTINE CIBA

Phosphate organique et Fer colloïdal.

Sel ferrique neutre de l'acide inosito-phosphorique, contenant 7,50 p. 100 de fer et 6 p. 100 de phosphore, ces deux éléments sous forme très assimilable. — Stimulant de l'hématopoïèse et excitant des fonctions cellulaires. — Médicament type des états anémiques et chloro-anémiques accompagnés de dénutrition.

Parfaite tolérance.

Indications. — Anémie, Chlorose, Lymphatisme, Scrofuleuse, Croissance défectueuse.

Doses. — *Adultes* : 3 cachets ou 3 cuillerées à café de granulé. — *Enfants* : 1/2 à 2 cuillerées à café de granulé.

La boîte de 30 cachets : 14 francs.

Le flacon de granulé : 16 francs.

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND

109-113, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.

FERROXYLINE

Hémostatique à base de Ferripyrine.

Formes :

- 1° Gaze imprégnée stérilisée à 120°, pliage accordéon, en boîtes de fer scellées.
- 2° Ouate imprégnée non stérilisée.

Indications :

GAZE : Tamponnements de toute nature, soit en chirurgie obstétricale, soit en O. R. L., soit en gynécologie.

OUATE : Petites plaies hémorragiques, épistaxis. Hémostase rapide dans tous les cas.

Prix : Gaze : 8 francs. — Ouate : 6 fr. 50.

Laboratoires EPARVIER

26, Grande Rue Saint-Clair — LYON.

FERYDAL

Composition. — Fer colloïdal assimilable.

Deux formes. — *Enfants, Adultes.*

Indications :

Enfants : Anémie du nourrisson et de la seconde enfance, Anorexie, Nervosisme, Insomnie, Convalescences.

Adultes : Anémies, Paludisme, Hémorragies, Grossesse, Traitement ferrique pré-natal, Convalescences, Dépressions nerveuses.

Doses :

Enfants. — A donner aux tétées ou aux repas : de 6 mois à 18 mois : 2 à 3 cuillerées à café ; de 18 mois à 3 ans : 3 à 4 cuillerées à café. A partir de 3 ans : 2 cuillerées à dessert.

Adultes. — Adolescents : 2 cuillerées à dessert ; Adultes : 2 cuillerées à soupe.

Le FERYDAL se prend pur, ou dans un peu d'eau gazeuse (eau de Seltz, limonade) au début des repas.

Enfants : Prix : 16 francs.

Adultes : Prix : 18 francs.

Laboratoire L. ROY

29, avenue Charras — CLERMONT-FERRAND

FIXASE

Reminéralisateur effectif.

Présentation. — Poudre insoluble agréable à boire dans l'eau.

Composition. — Chaux, Magnésie, Phosphate, Fluor, Silice *sous forme utilisable*.

Posologie. — *Adultes et enfants* : 1 cuillerée à café après les 2 repas. *Très jeunes enfants et bébés* : 1/2 ou 1/4 de cuillerée à café. *Avant le sevrage* : 1/4 de cuillerée à café dans un peu d'eau bouillie tiède.

Indications. — **Enfants, Adolescents,** Bacillaires, Prédisposés, Syphilitiques, Surmenés, Phosphaturiques, Affaiblis, Femmes enceintes, Nourrices.

Prix : 12 francs.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 342-1.

FIXASE IRRADIÉE

(**Fixase + Ergostérine irradiée.**)

Titree physiologiquement à 400 unités antirachitiques par *Cachet* ou cuillerée à café de *Poudre*.

Poudre : Même posologie que la FIXASE.

Cachets : *Adultes et Adolescents* : 3 par jour.

Enfants : 1 à 2 par jour.

Prix :

Poudre : 18 francs.

Cachets : 20 francs.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous les n°s 342-3 et 4.

Laboratoire PARET

22, rue Guibal — MARSEILLE.

FLAVUROL

Dibromoxymercuri fluorescéine

Antiseptique puissant.

Pommade à 1 %. — Intertrigo, Impétigo, Ecthyma, Eczémas infectés Staphylococcies cutanées, Sycosis, Balanites, Ulcérations de toute nature.

Solution à 2 %. — Désinfection pré-opératoire. Abscesses, furoncles, anthrax, ulcérations de toute nature, plaies opératoires suppurantes, phlegmons, fistules, otorrhées aiguës et chroniques, suppurations auriculaires, etc...

Solution à 1 %. — Traitement des uréthrites, cystites, pyélonéphrites, vaginites, métrites, antiseptie obstétricale, Ophtalmologie.

Crayons, bougies et ovules à 1 %. — Traitement des métrites et des vaginites.

Bougies à 1 %. — Traitement des uréthrites aiguës et chroniques, des rétrécissements de l'urèthre, des prostatites.

| | | |
|-----------------------------------|-------------|----------|
| Letube de pommade à % | Prix public | 9 fr. 50 |
| Le flacon solution 1% | — | 18 fr. » |
| Le flacon solution 2 % | — | 10 fr. » |
| La boîte de 6 crayons 1 % | — | 18 fr. » |
| La boîte de 6 bougies 1% | — | 18 fr. » |
| La boîte de 6 ovules 1 % | — | 20 fr. » |
| Le flacon poudre de 2 grammes.... | — | 7 fr. 50 |

Laboratoires STÈNÉ

2, place des Vosges — PARIS (IV^e).

FLETASE

Succédané de l'Huile de Foie de Morue particulièrement riche en Vitamine A. Huile de Foie de Flétan raffinée, présentée sous forme de capsules gélatinées d'une conservation parfaite.

Indications. — *Enfants à partir de 5 ans* : Croissance retardée ou insuffisante. Troubles digestifs, anorexie, états ganglionnaires, infections chroniques du rhino-pharynx et des bronches. *Adultes* : Convalescences, Grossesse, Anémie.

Présentation et Posologie — Etui de 25 capsules gélatinées renfermant chacune 10.000 unités internationales de Vitamine A.

Enfants à partir de 5 ans : 1 capsule tous les 2 jours ou tous les jours.

Adultes : 1 à 2 capsules par jour.

Société Parisienne d'Expansion Chimique.

SPECIA

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône.

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

FLORHÉPATINE

Calmant et antispasmodique, puissant diurétique, sans toxique, à base d'extraits végétaux.

Composition. — Ether amylvalérianique, Boldo, Artichaut, Arénaria, Uva-Ursi Buchu, Corydalis, Fabiana Genièvre, Menthe dans solution alcalinée glycinée.

Indications. — Etats d'anxiété (fausse angine de poitrine, tachycardie), Règles douloureuses, Gastralgies. Coliques hépatiques et néphrétiques, Affections du foie en général (Insuffisance hépatique, ictères du foie, paludisme, etc.).

Mode d'emploi. — *Crises légères* : 1 à 4 verres à madère par 24 heures ; se prend pure ou additionnée d'eau simple ou minérale avant ou après les repas.

Crises aiguës : Il est indispensable de prendre 1 verre à madère tous les quarts d'heure jusqu'à cessation des douleurs.

Enfants : 1/2 dose.

Flacon de 500 cc. Prix : 16 fr. 75.

Laboratoire RICHER

Docteur en Pharmacie

45 Faubourg Saint-Denis, — 1, rue d'Enghien — PARIS

FLUDIOSE **à l'Iodure de Manganèse.**

Composition. — Iode, Tanin, Lactophosphate de chaux, Fer, Iodure de manganèse, Méthylarsinate de soude, Vanille et Cacao.

Forme pharmaceutique. — Sirop de goût très agréable, Infermentescible, ne constipe pas.

Indications. — Lymphatisme, Rachitisme, Pré-tuberculose, Scrofulose, Mal de Pott, Cyphose, Lordose, Scoliose, Chétivité, Troubles de la croissance, Paresse, Glandes, Ganglions, Impétigo, Engelures

Mode d'emploi et doses. — En plus des autres éléments constitutifs, chaque cuillerée à café contient : 1 cgr. 25 d'Iodure de Manganèse pur et 2 mmgr. 5 de Méthylarsinate de soude.

Enfants de 1 à 3 ans : 2 cuillerées à café par jour.

3 à 6 ans : 2 cuillerées à dessert par jour.

6 à 12 ans : 2 cuillerées à potage par jour.

12 à 16 ans : 3 cuillerées à potage par jour.

Se prend pure ou dans un peu d'eau avant ou pendant les repas.

La *Fludiose* est le plus puissant succédané de l'huile de Foie de Morue.

Par son Iodure de Manganèse, la Fludiose dépasse toutes les préparations iodotanniques.

Prescrire. — *Fludiose* : 1 flacon.

Prix, le flacon : 15 francs

**Laboratoire de MÉDECINE
EXPÉRIMENTALE**

1 et 3, rue de Malherbe — BEAUVAIS (Ois.).

Téléph. : 4-84.

Echantillons et littératures à la disposition
de MM. les Docteurs.

FLUERASE**Dragées.****Composition :**

Hamamelis, Hydrastis, Marron d'Inde,
Viburnum, Millefeuille, Berberis,
Bourse à Pasteur.

Indications :

Toutes les affections du système veineux, Varices, Hémorroïdes, Age critique.

Forme :

Dragées, avaler sans croquer 2 à 4 dragées par jour.

Laboratoire FOUCHERE
RIVE-DE-GIER (Loire).

FLUOBYL

Granulé

Fluidifiant et excitant de la sécrétion biliaire.

Le *Fluobyl*, dépourvu de toute action irritante sur l'épithélium intestinal, provoque une chasse biliaire importante sans effet drastique fâcheux.

Granulé de goût agréable à base de *Lacto-sérum*, *Citrate de magnésie*, *Peptone de fibrine sèche*, le *Fluobyl* réalise le « drainage » des voies biliaires en stimulant le flux de la bile. Il favorise la migration du bol fécal, en rendant ainsi à l'intestin son excitant normal.

Il exerce également une action excito-sécrétoire sur le parenchyme rénal, provoquant la diurèse et l'accroissement de la sécrétion des sels et de l'urée.

Indications.

Maladies du Foie : Ictères, Cholécystites, Coliques hépatiques.

Dyspepsies réflexes : Nausées, vertiges, constipation d'origine hépatique.

Maladies rénales.

Posologie. — 1 à 4 cuillerées à café dans un demi-verre d'eau tiède le matin à jeun ; se coucher 10 minutes sur le côté droit ; attendre une demi-heure avant de prendre le petit déjeuner.

Le traitement doit être suivi environ deux semaines par mois.

Prix : 16 francs.

Laboratoires LICARDY

38, boulevard Bourdon — NEUILLY-PARIS.

Téléph. : Maillot 17-75.

FLUOCHOLINE

Granulé soluble.

Spécifique des maladies du foie.

Formule. — Phosphate de soude, Sulfate de magnésie. Peptone pure, Chlorure de magnésium. Hexaméthylènetétramine.

Posologie. — 1 à 3 cuillerées à café le matin à jeun dans un demi-verre d'eau.

Enregistré au Laboratoire du Contrôle des Médicaments sous le n° 884-3.

Prix : 18 francs.

Pharmacie BLOUIN

50, rue de Turenne — Paris.

FLUODYLE

Forme : Ampoules.

Chaque ampoule renferme :

| | |
|---------------------------------|--------|
| Fluorure de sodium | 0,001 |
| Hypophosphite de manganèse..... | 0,001 |
| Cacodylate de soude..... | 0,15 |
| Sulfate de strychnine..... | 0,002 |
| Sérum physiologique..... | 2 cmc. |

Mode d'emploi. — Pendant 10 jours consécutifs, faire une injection sous-cutanée. Repos de 10 jours. Puis recommencer une nouvelle série de piqûres. La boîte de 10 ampoules : 12 fr.

Forme : Granulé.

Contient tous les minéraux indispensables à l'organisme. Chaux, Phosphore, Fer, Manganèse, Fluor, Silicium, Zinc, Soufre et Magnésie.

Doses. — 1 ou 2 cuillerées à café, 3 fois par jour.

Indications. — Déminéralisation, Convalescence, Affections pulmonaires, Anémie, Surmenage.

La Boîte : 12 fr. plus impôt 0.75

Établissements SABATIER

A. EMPTOZ, Pharmacien.

10, rue Pierre-Ducreux — PARIS (XVI^e).

FLUOGANESE

(Cachets).

Régénérateur globulaire, Reconstituant du stock minéral.

Composition :

| | |
|--------------------------------|------|
| Fluorure de calcium..... | 0,01 |
| Formiate de chaux..... | 0,20 |
| Glycérophosphate de chaux..... | 0,40 |
| Nucléinate de manganèse..... | 0,01 |
| Protoxalate de fer..... | 0,05 |

Indications. — Faiblesses, Etats adynamiques et asthéniques consécutifs à certaines maladies infectieuses, Troubles de la croissance, Grossesse et allaitement.

Posologie. — 2 à 3 cachets par jour.

Prix : 16 francs.

Laboratoire de Thérapeutique normale

Ch. LAVIRE, Pharmacien de 1^{re} classe

46, rue de Rome — MARSEILLE (B.-du-R.).

FLUOKOL

Granulé entièrement soluble, aromatisé à la menthe

Association de cinq peptones (viande, poisson, œuf, lait et blé) et d'hyposulfite et sulfate de magnésie.

Propriétés. — Cholagogue, antianaphylactique complet et cytophylactique.

Indications. — Toutes affections du foie (cholécystite, lithiase biliaire, etc.), Troubles digestifs d'origine hépatique, Anaphylaxie (hyposulfite de magnésie et 5 peptones différentes), Urticaires, Prurits, Migraines, Constipation. Toutes intoxications.

Doses et mode d'emploi. — Comme cholagogue : 1 à 3 cuillerées à café de granulé dans un peu d'eau le matin à jeun.

Comme désensibilisant : une demi-cuillerée à café de granulé dans un peu d'eau, une demi-heure avant les repas.

Enfants : moitié de ces doses.

Autorisé par les Assurances Sociales.

Prix : 17 francs.

Laboratoires LAFFORT, Pharmacien,

Licencié ès sciences, Ingénieur E. C. B.

JOUE-LES-TOURS (Indre-et-Loire).

FLUOSALYL BEAUGOURDON

Formule. — Solution de fluorures alcalins préparée en partant de l'acide fluorhydrique, soumise à l'action de dérivés aromatiques dans des conditions spéciales.

Propriétés. — Détruit le tartre dentaire. Antiseptique buccal de premier ordre, ne coagulant pas l'albumine et ne détruisant pas les cellules vivantes.

Usages. — Dans toutes les affections de la bouche et particulièrement dans la *pyorrhée alvéolo-dentaire* à tous les degrés. Dans les gingivites mercurielles ou bismuthiques les accidents ont un arrêt si rapide que le traitement peut être repris et continué deux ou trois jours après que le FLUOSALYL aura été employé.

Emploi. — A la dose d'une cuillerée à café dans un demi-verre d'eau tiède en bains de bouche de cinq minutes.

Dans les cas aigus et en cas d'abcès les séances de bains de bouche devront être répétées 4 à 5 fois par jour.

Employé pour les pulvérisations suivant la méthode Joyeux.

Pour le détartrage mécanique on emploie FLUOSALYL'S PASTE, et brosse à dents FLUOSALYL.

Prix : Liquide : 16 francs. — Pâte : 7 fr. 50.

Laboratoires BEAUGOURDON, pharmacien,
43, avenue Kléber — PARIS (XVI^e).

FLUVEINOSE MAUCHANT

(Gouttes.)

Régulateur circulatoire.

Principes actifs. — Sulfate double de benzyle et de sodium, chlorure de magnésium. Extraits fluides : Yohimbehe, marron d'Inde, hamamélis, séneçon, armoise.

Indications. — Troubles propres de la ménopause, aménorrhée, dysménorrhée, métrorragies, hémorroïdes, hypertension artérielle, tendance aux néoplasies, affaiblissement provoqué par l'âge.

Dose. — XXV gouttes 3 fois par jour.

Prix : 12 francs.

Laboratoire MAUCHANT
à GENNEVILLIERS (Seine).

FLUXINE (gouttes)

XX gouttes =

0,01 centigr. d'intrait de marron d'Inde Dausse.

IV gouttes d'alcoolat concentré d'anémone.

IV gouttes de teinture de noix vomique.

en combinaison inaltérable, radio-activée par les rayons ultra-violet.

Propriétés. — Vasoconstricteur énergique. Tonique de la paroi vasculaire, stimulant ovarien, sédatif utérin.

Indications. — Stases sanguines, inflammations de l'utérus et du bassin, inflammations veineuses : métrorragies, dysménorrhée, aménorrhée, hémorragies du retour d'âge, règles douloureuses, varices, hémorroïdes, phlébite, ulcères variqueux, etc.

Mode d'emploi. — X gouttes à la fois dans un peu d'eau sucrée ou non, dose à renouveler 2 à 3 fois par jour avant les repas.

Prix au public : 15 francs pour 1 mois.

Laboratoires FLUXINE

J. BONTHOUX, pharmacien de 1^{re} classe

VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (Rhône).

FOKIENYL

Capsules de Fokienol (0 gr. 10).

Le Fokienol. — Alcool sesquiterpénique $C_{15}H_{26}O$ est retiré de l'huile essentielle du *Fokienia Hodgensii*.

Nouveau balsamique, diurétique, antiseptique et modificateur des sécrétions, non toxique, il est indiqué dans le traitement des affections de l'arbre génito-urinaire.

Balsamique très efficace, parfaitement toléré, sans contre-indications.

Références. — 1. Communication à l'Académie des Sciences, le 26 décembre 1931 par M. le professeur P. Sabatier, doyen de la Faculté de Toulouse.

2. Thèse par M. le Dr Pham-Ba-Vien, interne des hôpitaux, sous la présidence de M. le professeur Carnot, membre de l'Académie de Médecine.

Indications. — Blennorrhagie, Pyélo-néphrites, Cystites, Congestion rénale, Rétention urinaire.

Doses. — 2 à 4 capsules par jour avant les repas ou au début.

Le FOKIENYL permet des prescriptions peu onéreuses. (La boîte, 18 fr. 50, pour traitement de 12 à 24 jours.)

Laboratoire :

94, rue Pasteur. — FONTENAY-SOUS-BOIS (Seine).

FOLLESTRINE GRÉMY

Hormone folliculaire physiologiquement titrée.

- 1° En *Granules*, pour traitement par *voie buccale*.
- 2° En *Ampoules*, pour traitement par *voie sous-cutanée*.

Indications thérapeutiques :

- 1° *Chez la jeune fille :*

Aménorrhées de la formation, hypoménorrhées, dysménorrhées. Contribue à rendre normal l'établissement de la puberté par son action dans toutes les manifestations de l'insuffisance ovarienne de la puberté. Contribue à la disparition des phénomènes d'ordre extra-génital de l'insuffisance ovarienne : troubles nerveux, dermatoses, obésité de la puberté, symptômes ostéo-musculaires douloureux, etc...

- 2° *Chez la femme adulte et dans la ménopause.*
Disparition des troubles vaso-moteurs.
Rend les règles douloureuses, indolores et régulières.
Disparition des troubles cataméniaux cutanés.
Combat efficacement l'empatement.
Diabète ovarien. Hypoplasies utérines.

Posologie

Pendant la quinzaine qui précède les règles, une injection tous les 2 jours, ou 4 à 10 granules par jour en plusieurs fois et à distance des repas.
Continuer le traitement par l'ingestion d'ocréine (Voir **OCRÉINE**).

Prix :

Ampoules : 30 francs. — Granules : 20 francs.

Laboratoires G. GRÉMY

14, rue de Clichy — PARIS.

FOLLICORMONE BUCCALE

HINGLAIS

Première préparation d'hormone ovarienne active
par voie buccale.

Activité buccale contrôlée
(Acad. Méd., 27 Janvier 1931.)
(Soc. belge de gyn., Février 1931.)

Composition. — Solution huileuse, concentrée,
d'hormone folliculaire en capsules de gélatine.

Mode d'emploi. — *Trois doses par jour à intervalles de 4 heures au minimum, pendant les repas de préférence.*

Traitement type d'attaque.

40 capsules à doses croissantes :

| | | | |
|------------------------|---|----------------------|---------------|
| Matin, midi et soir | { | pendant 3 jours | : 1 + 1 + 1 ; |
| | | les 2 jours suivants | : 2 + 2 + 2 ; |
| | | les 2 jours suivants | : 3 + 3 + 3. |

Cures d'entretien. — 15 à 20 capsules par mois :
1 capsule matin, midi et soir : pendant 5 à 7 jours.

Date du traitement. — *Quand les règles existent :*
les capsules seront toujours absorbées dans les
dix jours précédant la date présumée des règles.

Dans tous les autres cas (castration, aménorrhées) :
la cure sera régulière et mensuelle (première semaine du mois par exemple).

Dysménorrhées : Commencer 1 ou 2 jours avant le
début présumé des règles et poursuivre jusqu'à
cessation des troubles (6 à 9 capsules peuvent
suffire).

Cas spéciaux de stérilité, sclérodermie, diabète
ovarien, épilepsie menstruelle, etc...

La boîte de 40 capsules pour une cure de
1, 2 ou 3 mois : 40 francs.

Produits HINGLAIS

30, rue de Miromesnil — PARIS.

Tél. : Anjou 37-14.

FOLLICULINE CHOAY

Nature. — Extrait purifié retiré du liquide folliculaire ovarien et considéré comme l'« hormone sexuelle femelle ».

Indications. — Hypoplasie utérine, Infantilisme génital, Insuffisance ovarienne, Aménorrhée, Troubles de la ménopause naturelle ou opératoire.

Formes pharmaceutiques. — Ampoules de 1 et 2 cc. d'une solution huileuse neutre et stérilisée, titrée à 250 unités-internationales par cc.

Posologie. — 3 à 12 injections intramusculaires, suivant le cas, de 2 jours en 2 jours.

Prix. — 6 ampoules de 1 cc. à 250 u. i. : 25 francs.
6 ampoules de 2 cc. à 500 u. i. : 40 francs.

Laboratoire CHOAY

48, avenue Théophile-Gautier — PARIS (XVI^e).
Tél. Auteuil 44-09 et 44-10.

FOLLICULINE CRINEX

(Voir : CRINEX)

Extrait ovarien total désalbuminé, dosé
en Folliculine.

Autres produits opothérapiques des

Laboratoires CRINEX-UVÉ :

OREX (extrait testiculaire),

SISTEX

(extrait mammaire et corps jaune).

FOLLICULINE CRISTALLISÉE

du Docteur ROUSSEL

Voir

GYNOESTRYL

et **BENZO-GYNOESTRYL.**

FOLLI-LOBINE

du D^r Frayssé.

Deux formes : Pilules, Ampoules injectables ((Voir aussi *Opothérapie associée du D^r Frayssé*).

Folliculine ovarienne associée aux Hormones du Lobe antérieur de l'Hypophyse (Prolan A et B). Le lobe antérieur renforce l'action de la folliculine.

Pilules. — Glutinisées, actives par voie buccale, non détruites par l'action des sucs digestifs qui décomposent la folliculine.

1 pilule = 10 unités-rats.

Doses : 2 à 5 par jour, espacées dans la journée.

Ampoules. — 20 unités-rat par ampoule : 10 U-R. Folliculine. 10 U-R. Lobe antérieur.

Doses : 1 ampoule par jour pendant 6 jours, 10 jours avant les règles.

Indications. — Déficiences ovariennes en général, Troubles menstruels, Puberté et Ménopause.

Le flacon de 50 pilules de 250 unités : 20 francs.

Le flacon de 100 pilules de 500 unités : 30 francs.

La boîte de 6 ampoules de 2 cc. : 37 francs.

Laboratoires du D^r FRAYSSE et C^{ie}
21, rue de Neuilly — NANTERRE (Seine).

Tél. : Nanterre 12-88.

FONDANT DE SOUFRE DAUSSE

Composition. — Collobiase de soufre : 15 mgr. par cuillerée à café.

Présentation. — Fondant blanc d'une saveur sucrée et très légèrement sulfurée.

Propriétés et indications thérapeutiques. — Modificateur de la nutrition sulfurée ; Arthralgies, formes légères du rhumatisme, névralgies, arthritisme, affections cutanées, laryngites, trachéo-bronchites.

Posologie. — 1 à 3 cuillerées à café par jour, ou plus, suivant l'intensité des symptômes.

Prix : 14 francs.

Laboratoires DAUSSE

4, rue Aubriot — PARIS (IV^e).

FORCIVAL

Aliment nutritif et fortifiant.

Composition. — Concentration des meilleurs aliments naturels : farines de céréales et de légumineuses maltées, sucre, cacao. Aucun médicament surajouté.

Forme. — Farine d'un goût très agréable.

Mode d'emploi. — Bouillie délicieuse à l'eau ou au lait.

Propriétés. — Aliment léger et substantiel, reconstituant, reminéralisateur, d'une grande digestibilité.

Indications. — Suralimentation chez les enfants, les adultes et les vieillards.

La boîte de 250 gr. : 6 fr.

La boîte de 1 kg. : 20 fr.

Laboratoires du FORCIVAL

6, rue Bridaine — PARIS.

FORIOD

Tétralodophénolphtaléinate de Sodium.

Matière colorante, opaque aux rayons X, s'éliminant par les voies biliaires.

Indications. — **Cholécystographie, Examen radiologique de la région vésiculo-duodénale.**

Posologie et mode d'emploi. — Employer l'une des méthodes suivantes :

- 1° *Voie buccale* : Méthode des doses fractionnées (dite de Sandström) le premier soir prendre 1 flacon de Foriod Poudre composée ; le lendemain 1 flacon de Foriod P. C. en deux prises (la 1^{re} moitié le matin, la 2^e le soir). Examen radiologique le lendemain matin.
- 2° *Voie intraveineuse* : Solution aqueuse à préparer extemporanément avec le contenu d'une ampoule de poudre cristallisée (2 gr. 40) et 50 à 60 cc. d'eau distillée stérile. Examen de la 8^e à la 24^e heure après l'injection.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône,
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

FORMOCARBINE

Composition :

Association de Charbon Animal pur, ultradivisé, absolument privé de Cyanogène, à la Formine (Hexaméthylènetétramine cristallisée).

Forme pharmaceutique :

Granulé friable, aromatisé, agréable au goût, avec ou sans addition de Benzonaphtol :

Formocarbine simple.

Formocarbine naphtolée.

Les granulés de Formocarbine ne sont pas durs à la dent, fondent très bien dans la bouche, se désagrègent instantanément dans l'eau.

Propriétés :

Antiseptique interne de choix. Pouvoir absorbant et adsorbant considérable.

Indications thérapeutiques :

Injectons gastro-intestinales. — Dyspepsie, Fermentations, Entérites, Flatulences, Putréfactions intestinales, Stase intestinale, Auto-intoxication, Maladies infectieuses, Colibacillose.

Injectons biliaires. — Désinfecte par la *Formine* la Vésicule et les canaux, en même temps que son *Charbon animal* absorbe les bactéries intestinales montant au foie par la veine-porte en ses diverses origines.

Angiocholites, Angiocholécystites, Lithiase biliaire, Tuberculose des voies biliaires, Hépatisme.

Injectons urinaires. — Toutes les infections urinaires, rénales, vésicales, cystite, Pyélonéphrites, Urétrites, Prostatites.

Posologie :

1 à 2 cuillerées à café après les repas, à croquer ou à délayer dans un peu d'eau. Par demi-cuillerées à café chez les enfants.

Prescrire :

Formocarbine simple ou Formocarbine naphtolée :
1 flacon.

Il est à remarquer que la *Forme Naphtolée* ne provoque jamais de constipation.

Prix, le flacon : 12 francs.

Laboratoire de MÉDECINE EXPÉRIMENTALE

1 et 3, rue Malherbe — BEAUVAIS (Oise). Tél. : 4.84

Echantillons et littérature à la disposition de
MM. les Docteurs.

FORMOCARBOS

Composition. — Charbon animal chimiquement pur (Carbos). Urotropine. Peptones de poisson d'œuf, de viande, de lait et sulfate de magnésie,

Forme. — Granulé rond anisé.

Indications. — Troubles digestifs d'origine hépatique. Congestion du foie. Insuffisance hépatique. Cholécystite. Colibacillose. Migraines. Prurit. Rougeur de la face. Somnolence. Fermentations et en général **toutes les manifestations anaphylactiques.**

Posologie. — *Adultes* : 1 à 3 cuillerées à café.
Enfants : 1/2 ou 1 cuillerée à café suivant l'âge.
Avant (de préférence) ou après chaque repas.

Prix : 15 francs.

Laboratoires E. MILLET

RAMBOUILLET (Seine-et-Oise).

FORMOCHOLINE

Drainage des voies biliaires.

Propriétés. — Cholagogue, renforçateur du pouvoir antitoxique du foie, évite l'encombrement de la vésicule biliaire et des canaux excréteurs.

Indications. — Cholécystites, angiocholites, affections hépatiques des pays chauds, maladies de la nutrition, goutte, diabète, obésité, tous syndrômes gastriques réflexes et dermatoses sous la dépendance d'un dysfonctionnement hépato-vésiculaire.

Posologie et mode d'emploi. — 1 à 2 cuillerées à café le matin dans un quart de verre d'eau légèrement tiédie.

Présentation et prix. — Granulés. Prix : 16 francs.

Laboratoires du Dr ADLER

36, rue des Francs-Bourgeois — PARIS.

FORMOCITRINE

Composition. — Hexaméthylène-tétramine à l'état pur et citrate acide de soude.

Forme. — Granulé effervescent soluble extemporanément.

Propriétés. — Antiseptique interne à réaction acide, indispensable à la transformation en formol de l'hexaméthylène-tétramine.

Eupeptique, Cholagogue.

Antivisqueux et anti-agglutinant (ion citrique); prévient les coagulations et les concrétions pathologiques.

Antispasmodique vasculaire (citrate), par action sur le système nerveux sympathique.

Indications. — *Reins et Voies urinaires* (Urétrites, Cystites, Pyélonéphrites, Lithiases).

Foie et Voies biliaires (Insuffisance, Ictères, Cholécystites, Lithiases).

Sang et Vaisseaux (Hyperviscosité, Artérites, Phlébites, Hyposphysie).

Maladies infectieuses (Broncho-pneumonie, Fièvre typhoïde).

Accidents post-opératoires (Thromboses, Embolies).

Doses. — 1 cuill. à café de granulé contient 0 gr. 25 d'hexaméthylène-tétramine et 1 gr. 50 de citrate de soude.

2 à 4 cuill. à café en solution étendue.

4 à 6 cuill. à café et plus dans les maladies des vaisseaux.

Prix : 18 francs.

Laboratoires du D^r BAREY

37, avenue Jules-Coutant — IVRY-SUR-SEINE.

FORMULE JACQUEMAIRE N° 60.

(Voir à Verrulyse).

Composition. — Celle de la VERRULYSE avec addition de silicate de soude, augmentant son action dans les cas de verrues rebelles. Utile également chez les adultes après la quarantaine.

Forme. — Cachets contenant une poudre légèrement comprimée.

Propriétés. — Reminéralisateur calco-magnésien, anti-verruqueux interne, modificateur des sécrétions.

Indications. — Toutes les verrues, certaines altérations épidermiques, crasse des vieillards, végétations, papillomes, toute prolifération cellulaire anormale.

Posologie. — 2 à 6 cachets par jour.

Remarques. — Se prescrit indifféremment avec la VERRULYSE celle-ci étant, par son nom, plus spécialement réservée aux porteurs de verrues.

La formule JACQUEMAIRE n° 60 a l'avantage de pouvoir être prescrite comme une formule magistrale. Elle ne comporte sur la boîte aucune indication et garde ainsi le secret du diagnostic. Nécessaire pour toutes les affections autres que les verrues, demandant une réminéralisation calco-magnésienne, en particulier dans les affections pré-cancéreuses. Précieuse dans les traitements prolongés; agit dans ce cas comme euphorique.

La boîte pour 40 jours : 16 francs.

J. BONTHOUX, Pharmacien.

Laboratoires FLUXINE,
VILLEFRANCHE (Rhône).

FORNOSE

La plus fondante des pommades nasales.
Novocaïne, Adrénaline, Baume du Pérou,
Ichtyol, Huile de vaseline et Lanovase-
line geraniée, Désodorisante, Non irri-
tante.

Tous états congestifs du nez et de la gorge.
Soins préopératoires et post-opératoires.
Antisepsie respiratoire, Ozène.

Etaler soigneusement à l'intérieur de chaque
narine gros comme un pois de pommade
matin et soir.

Toutes Pharmacies, le tube : 6 fr.

Echantillons :

Laboratoire CHAVIALLE

70, Grande-Rue — SÈVRES (S.-et-O.).

Enreg. au Lab. nat. de Contrôle des Médi-
caments, n° 155-3.

FORTOSSAN CIBA

Préparation Phosphatée pour enfants.

Sel sodique neutre de l'acide inosito-diphosphorique,
principe phospho-organique de la Phytine.

Médicament spécialement préparé pour la
pratique infantile. Très assimilable et
parfaitement toléré.

Indications. — Retard du développement
et de la dentition, scrofule et tuberculose
infantile. Convalescence des maladies infec-
tieuses, etc.

Doses. — Poudre s'administrant avec le lait
du biberon ou les bouillies, à la dose de
1 à 3 cuillerées à café par jour, suivant
l'âge.

La boîte : 8 fr. 50.

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND
109-113, Boulevard de la Part-Dieu — LYON

FORTOSSAN IRRADIÉ CIBA

Préparation phosphatée et Vitaminée.

Même composition que le Fortossan ordinaire mais avec adjonction d'ergostérine irradiée,

Dosage : 400 à 2000 unités physiologiques prodie.

Le Fortossan irradié est soumis à un contrôle chimique et biologique lui assurant une activité constante. L'ergostérine irradiée s'y trouve sous une forme absolument inoffensive et, unie à l'élément phosphoré végétal, elle donne son maximum d'action thérapeutique. Jamais d'anorexie.

Indications. — Rachitisme, Ostéomalacie, Tuberculose, Prétuberculose, Etats de dépression liés à une insuffisante assimilation de la chaux et du phosphore, Fractures, etc.

Doses. — Chez l'enfant : 1 à 3 cuillerées à café par jour ; chez l'adulte : 1 à 2 cuillerées à soupe par jour.

La boîte : 12 francs.

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND

109-113, Boulevard de la Part-Dieu — LYON

FORXOL

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments, sous le N° 363-1.

Forme. — Elixir.

Composition. — Acide glycérophosphorique, Nucléates de Manganèse, de Fe et de Ca., Méthylarsinate de soude.

Propriétés pharmacodynamiques. — Reconstituant complet pour tout organisme, Dynamogénique. Stimulant hématogène, Antidéperditeur, Régulateur des échanges cellulaires.

Indications. — Etats de dépression. — Faiblesse générale. — Troubles de croissance et de formation. — Neurasthénie. — Anémie. — Débilité sénile. — Convalescences.

Mode d'emploi. — Une à deux cuillerées à café, suivant l'âge, au milieu des deux principaux repas, dans un peu d'eau, de vin ou liquide quelconque autre que le lait.

Le flacon : 14 francs. (En France)

Laboratoires A. BAILLY

15, rue de Rome — PARIS (VIII^e)

FOSFOMAGNYL DU D^r CHURCHILL

**Cytophylaxie leucogène. Association de
phosphore et de chlorure de
magnésium.**

Forme. — Comprimés.

Composition :

| | |
|--------------------------------|----------|
| Chlorure de Magnésium chimi- | |
| quement pur..... | 0 gr. 30 |
| Hypophosphite de Magnésie..... | 0 gr. 10 |
| Hypophosphite de Chaux..... | 0 gr. 05 |
| Hypophosphite de Manganèse... | 0 gr. 02 |

Posologie. — 4 comprimés par jour. Deux avant le petit déjeuner du matin et un autre avant chacun des deux autres repas.

Si le comprimé est trop gros pour être avalé en entier, le partager en deux. Pour en faciliter l'absorption, il est préférable de l'écraser et de le mélanger avec un peu de café, de potage, ou tout autre liquide, ou mieux encore, dans une cuillerée de confitures ou de miel.

Indications. — Asthénie, Régulateur des fonctions hépatiques, Préventif de l'artério-sclérose, Anémies, Faiblesse générale, Stimulant de l'activité cellulaire.

Produit français.

**Laboratoire des Produits du
D^r CHURCHILL**

12, rue Castiglione — PARIS (1^{er}).

FOSFOXYL CARRON

PHOSPHORE COLLOIDAL

Colloïde chimiquement défini par Carron, Bourcet et Chevalier. CR. Société thérapeutique, 11 novembre 1925.

A l'état de terpénol hypophosphite de sodium.

Formes. — Fosfoxyl *sirop* : sirop opalin anisé, goût agréable.

Fosfoxyl *pilules* : petits grains couleur de jade, très faciles à avaler.

Fosfoxyl *liqueur* : liquide opalin glycéринé menthé spécialement destiné aux diabétiques.

Dosage. — 10 cc. de formes liquides (soit une cuillerée à dessert) ou 4 pilules contiennent 0 gr. 10 de colloïde chimique exprimé en terpénol hypophosphite sodique et équivalent à 13 milligrammes de phosphore blanc.

Propriétés thérapeutiques. — Spécifique de la dépression nerveuse et mentale, stimulant des glandes endocrines et tonique du système nerveux central. Modificateur de la nutrition et de l'assimilation. Apéritif. Créateur d'énergie physique et mentale. Fixateur de l'ion calcium.

Indications. — Maladies du système nerveux, maladies de la nutrition. Dépressions nerveuses et mentales. Impuissance, Surmenage, Neurasthénie, Psychasthénies, Convalescence, Anémie, Tuberculose, Diabète, Rachitisme, Arthritisme, Rhumatisme, Fatigues cérébrales ou physiques exagérées, Périodes d'entraînement, de préparation à des examens ou concours.

Contre-indication. — Etat congestif aigu.

Mode d'emploi. — Dose moyenne : une cuillerée à dessert (10 cmc.) de liqueur ou sirop, étendue d'eau ou d'un liquide froid quelconque, ou 4 pilules, avant les deux principaux repas. Si le malade est très excité ou dans le cas d'insomnie nerveuse, commencer par une cuillerée à café ou 2 pilules.

Dans le cas de dépression accentuée, doubler la **dose** moyenne.

Prescrire :

Sirop de FOSFOXYL CARRON (14 fr.)

ou **Pilules de FOSFOXYL CARRON** (12 fr.)

ou **FOSFOXYL LIQUEUR** (13 fr.)

afin d'éviter les substitutions

Laboratoires du FOSFOXYL

69, rue de Saint-Cloud — CLAMART (Seine).

CARRON, Pharmacien de 1^{re} classe,
ancien Pharmacien-Chimiste de la Marine.

FOSYLS CARRON

Terpénolhypophosphites minéraux.

Reminéralisateurs chimiques physiologiques
assimilables directement.

Modificateurs de la Nutrition
et de la Composition chimique des Tissus.

Tous ces nouveaux corps — création des Laboratoires CARRON — possèdent les propriétés dynamiques et trophiques du phosphore sur le système nerveux et sur la nutrition générale, mais chacun d'eux, en raison de la base qu'il contient, présente en outre une électricité d'action particulière qui conditionne sa prescription dans les diverses affections. Ils ne sont ni toxiques ni irritants et ont été reconnus parfaitement assimilables.

Les corps de cette série actuellement à la disposition du Corps médical sont :

Les Terpénolhypophosphites de Calcium, de Magnésium, de Manganèse et de Cuivre. Tous sont présentés sous forme de comprimés lenticulaires dosés à cinq centigrammes (1).

| Dénomination. | Titre. | Mode d'emploi. |
|---|--------------------------|------------------------------|
| CALCOFOSYL (C ¹⁰ H ¹⁶ PO ³) 2 Ca | 13,19 % de Phosphore. | 4 à 8 comprimés par jour. |
| Terpénolhypophosphite de Calcium. | 8,51 % de Calcium | (Sirop pour enfants.) |
| MAGNÉSOFOSYL (C ¹⁰ H ¹⁶ PO ³) 2 Mg | 13,65 % de Phosphore. | 4 à 8 comprimés par jour. |
| Terpénolhypophosphite de Magnésium. | 5,28 % de Magnésium. | |
| MANGANOFOSYL (C ¹⁰ H ¹⁶ PO ³) 2 Mn | 12,57 % de Phosphore. | 4 à 6 comprimés par jour. |
| Terpénolhypophosphite de Manganèse. | 11,34 % de Manganèse. | |
| CUPROFOSYL (C ¹⁰ H ¹⁶ PO ³) 2 Cu | 12,57 % de Phosphore. | 2 à 4 comprimés par jour. |
| Terpénolhypophosphite de Cuivre. | 12,77 % de Cuivre. | |

Prix de l'unité : 12 francs.

Littérature et échantillons sur demande aux

Laboratoires CARRON

Rue de Saint-Cloud — CLAMART (Seine).

(1) N. B. — Les Terpénolhypophosphites de Fer, de Lithium, d'Uran, de Plomb et de Quinine ont été également obtenus dans les Laboratoires CARRON.

FRANCALCION

Calcithérapie.

Composition. — Acétylglycocolate de calcium.

Présentation :

- 1° En ampoules de 5 cc. à 10 p. 100 pour injections intra-veineuses.
 2° En ampoules de 5 cc. à 10 p. 100 pour injections intra-musculaires.
 3° En solution à 20 p. 100 (sans odeur, ni saveur).
 Deux fois par jour, avant chacun des deux principaux repas, dans un peu d'eau sucrée.

Indications cliniques :

- a. *Indication recalcifiente* : Rachitisme, Retard de consolidation des fractures. Carie dentaire. Tuberculose pulmonaire, ganglionnaire ou chirurgicale. Grossesse.
 b. *Indication anti-hémorragique* : Hémoptysie, Hématémèses, Hématuries, Hémorragies obstétricales. Troubles hémogéniques (purpuras, etc.).
 c. *Indication de résorption* : Pleurésies, Ascites, Œdèmes des néphrétiques, Diarrhées des tuberculeux.
 d. *Indication anti-choc* : Etats de sensibilisation ou d'anaphylaxie spontanés (urticaire, prurit, asthme, etc.). Etats de sensibilisation thérapeutique, consécutifs aux diverses chimiothérapies (arsenic, bismuth, or).
 e. *Indication spasmo-sédative* : Asthénie, Tétanie, Spasmophilie, Eclampsie obstétricale. Etats spasmodiques viscéraux. Maladie de Basedow. Troubles du système nerveux.
 f. *Indication anti-rhumatismale* : Polyarthrites chroniques.

Posologie :

- 1° En ampoules de 5 cc. à 10 p. 100 (boîtes de 2 et 10 ampoules) pour injections intra-veineuses ou intra-musculaires :

a. Injections intra-veineuses :

Adultes : 1 ampoule de 5 cc. tous les 2 jours.

Enfants : 1 ampoule de 5 cc. tous les 3 jours.

Prendre la précaution d'injecter très lentement.

b. Injections intra-musculaires :

Peuvent être faites sur le même rythme.

- 2° En solution : deux fois par jour, avant chacun des deux principaux repas ; dans un peu d'eau sucrée :

| | Enfants : au-dessous de 12 ans. | Adultes : |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------|
| Indication recalcifiente..... | II gouttes par année d'âge. | XL gouttes. |
| — anti-hémorragique . | VIII gouttes par année d'âge. | CXX — |
| — anti-choc | XX à LXXV gouttes. | CXX — |
| — spasmo-sédative ... | L à C gouttes. | CLX — |
| — anti-rhumatismale ... | | CLX — |

Ce tableau de posologie est donné à titre indicatif et d'après nos essais cliniques, le médecin traitant étant seul qualifié pour la prescription des doses qui peuvent varier suivant les malades.

Laboratoire du MYORAL

R. GOUIN, Pharmacien, 20, rue des Ecoles — PARIS (V°).

FRANCOPLASTE

Composition. — Sparadrap caoutchouté adhésif à l'oxyde de zinc.

Avantages. — Adhérence parfaite. Ne sèche pas, ne poisse pas. Garantie de conservation minima 2 ans.

Indications. — Fixation des pansements.

Dimensions. — 1 m. sur 1-2-3-4-5-10-18 cm. de larg. — 5 m. sur 1 1/4, 2 1/2 3 3/4, 5, 6 1/4, 7 1/2, 10 cm. de largeur, sur cretonne rose ou blanche ; uni ou perforé, ou sur tissu élastique. Réduction de 50 p. 100 au Corps médical.

A. KRAUS, Pharmacien de 1^{re} classe
Fournisseur des Hôpitaux, du Service de Santé, de la Croix-Rouge.

37, r. Godot-de-Mauroy PARIS
Usine à Courbevoie.

FREINIX

Produit non toxique et ne faisant pas partie du tableau B. Association Chlorh. de Papavérine et Adrénaline en solution isotonique (Ampoules de 1 cc.) pour injections sous-cutanées.

Propriétés physiologiques. — Freine le Pneumogastrique. Excite le Sympathique.

Indications. — Asthme, Emphysème, Rhume des foins. Spasmes viscéraux. Tous les phénomènes liés à l'hypervagotonie.

Mode d'emploi et doses. — Une injection sous-cutanée de 1/2 cc. à 1 cc. suffit à juguler une crise d'asthme en quelques minutes. L'injection peut, sans inconvénient, être renouvelée dans les 24 heures.

Le Freinix peut également être employé en pulvérisations nasales dans le rhume des foins, en particulier.

Prix de vente au public : 15 francs.

Voir PÉROFREINIX forme buccale.

PÉROFREINIX

Produit non toxique. Ne fait pas partie du tableau B. Association chlorhydrate de papavérine et éphédrine, en comprimés délitables à absorber « per os ».

Propriétés physiologiques. — Le PÉROFREINIX, comme le FREINIX, freine le pneumogastrique et excite le sympathique.

Les propriétés de l'Ephédrine sont comparables à celles de l'Adrénaline, mais l'Ephédrine a sur cette dernière un avantage : c'est qu'elle peut être administrée par la bouche sans subir de désintégration digestive comme c'est le cas pour l'Adrénaline qui ne peut être, pour cette raison, utilisée que par voie hypodermique.

Indications. — Asthme, Emphysème, Rhume des foins, Spasmes viscéraux.

Mode d'emploi et doses. — En raison de sa présentation, le PÉROFREINIX permet d'instituer facilement en toutes circonstances, un traitement préventif et curatif.

Doses. — *Adultes* : de 1 à 4 comprimés par jour.

Enfants : (seconde enfance) 1/2 à 1 comprimé, suivant l'âge.

Se conformer aux prescriptions du médecin.

Voir FREINIX forme injectable.

Société générale d'Applications thérapeutiques.
THERAPLIX

R. MOREUX, Pharmacien.

Ancien interne des Hôpitaux,

98, rue de Sèvres — PARIS (VII^e).

FREINOSPASMYL

| | |
|-------------------------------|----------|
| Ephédrine..... | 0 gr. 02 |
| Phénylméthylmalonylurée | 0 gr. 03 |
| Bromhydrate de quinine | 0 gr. 06 |
| Belladone..... | 0 gr. 01 |

Médication élective de tous états spasmodiques,
Régulatrice du système nerveux sympathique.

Indications thérapeutiques. — Asthme, Dyspnées, Eréthisme cardiaque, Hypertension artérielle, Aérophagie, Syndromes solaires, Epilepsie, Migraines, Etats névralgiques, Affections ovariennes et thyroïdiennes. Préparation pré-opératoire.

Doses et mode d'emploi. — 2 à 4 comprimés par 24 heures.

Cure d'attaque : Périodes de 10 jours à 4 comprimés par jour.

Cures d'entretien : 2 ou 3 comprimés deux ou trois fois par semaine.

Prix : 22 francs.

Laboratoires du D^r M. LEPRINCE

62, rue de la Tour — PARIS (XVI^e).

FRÉNASMA

Eupnélique phyto-hormonique.

Composition. — Ephédrine, Dionine, Pulmine, Surrénine, Spartéine, Lobélie.

Forme. — Comprimés dragéifiés rigoureusement dosés.

Indications. — Asthme bronchique, Bronchites chroniques, Dyspnées, Emphysème, Sclérose pulmonaire, Toux spasmodiques, Rhumes des foins, Rhinites spasmodiques, Etats allergiques (urticaire, migraine). Accidents sériques et anaphylactiques.

Posologie. — Sans contre-indications : 3 à 4 comprimés par jour et plus.

Enfants à partir de 5 ans : 1 à 3 comprimés.

Admis par les Assurances sociales sous le n° 703-2.

Prix : 18 francs.

Laboratoires du FRÉNASMA

71, rue Saint-Blaise — PARIS (XX^e).

Téléphone : Roquette, 76-24.

FRUGEOLINES-VICHY

Composition :

| | |
|---|-----------|
| Extrait biliaire dépigmenté | 0 gr. 05 |
| Poudre de glandes intestinales | 0 gr. 05 |
| Sels extraits des eaux du bassin de Vichy..... | 0 gr. 05 |
| Extrait de Cascara | 0 gr. 025 |
| Lactose..... | 0 gr. 075 |

Forme. — Lentilles dragéifiées de 0 gr. 45.

Propriétés thérapeutiques. — Agent régulateur de la sécrétion biliaire et intestinale. Aucune toxicité.

Indications. — Toutes les formes de la constipation ; lithiases biliaires ; coliques hépatiques ; cholémie ; acholie ; ictères, entéro-colites.

Doses et mode d'emploi. — 2 FRUGEOLINES-VICHY avant déjeuner et 2 autres avant dîner. Cette dose peut être augmentée ou diminuée suivant le tempérament de chacun, mais ne doit pas excéder la dose de 6 FRUGEOLINES-VICHY par jour.

Pour les enfants de 12 ans et plus : la moitié des doses ci-dessus.

Prix de vente au public : 11 fr. 20.

Laboratoire des FRUCTINES-VICHY

1 et 3, rue Lafloque — VICHY (Allier)

FUCOGLYCINE DU D^r GRESSY

Forme. — Sirop.

Composition. — Principes iodo-phosphorés naturels et hydrocarbonés du fucus.

Indication. — Scrofule, Lymphatisme, Tuberculose, etc.

Posologie. — Mêmes doses que l'huile de foie de morue.

Prix : 12 francs.

Laboratoires LE PERDRIEL

11, rue Milton — PARIS (IX^e).

FUCOSINE

Traitement efficace de la Constipation habituelle.

Composition. — Agar-agar, extrait de rhamnées.

Propriétés. — Mucilagineux, émollient, cholagogue ; véritable aliment du constipé ; innocuité absolue.

Formes et Posologie :

Paillettes. 1 à 3 cuillerées à café.

Poudres.. 1 à 3 mesures.

Cachets .. 1 à 3 cachets.

A chaque repas régulièrement.

Indications. — Constipation habituelle, quelle qu'en soit l'origine.

Prix : 11 francs la boîte.

Laboratoire L. PROTHIÈRE

55, rue Auguste-Comte — LYON.

FUCUS GMET

Composition. — Extrait total, sans alcool, du fucus vesiculosus. Correspond à 2 gr. de plante fraîche par cuillerée à café.

Propriétés. — Par son iode naturel régularise la sécrétion thyroïdienne et combat l'obésité.

Indications. — Obésité, Scrofule.

Posologie. — De 1 à 8 cuillerées à café par jour, *progressivement* dans eau ou vin blanc sec de préférence.

Prix : 18 francs.

Laboratoire GMET

27, Faub.-Montmartre — PARIS (IX^e).

FUCUSOL

Composition :

A base d'algues marines (*Fucus vesiculosus* et *fucus serratus*).

Indications :

Traitement végétal absolument sans danger de l'obésité et de l'embonpoint selon la méthode de Duchesne-Duparcq.

Mode d'emploi :

4 à 6 pilules par jour.

Prix :

Boîte : 60 pilules : 14 francs.

— 200 — 35 francs.

Laboratoires de la LIPOSEPTINE

2, place des Vosges — PARIS

GADUAMINE

La GADUAMINE est un extrait opothérapique de foies frais de morue renfermant outre les parties hydro-solubles de la glande vivante, la totalité de l'insaponifiable de l'huile. LA GADUAMINE se caractérise plus spécialement par ses *procédés scientifiques* de fabrication qui en font un produit sans goût ni odeur désagréable, et privé de tous produits de décomposition plus ou moins nocifs.

Action : — La GADUAMINE agit :

Par les principes hydro-solubles du foie, comme anti-anémique et antitoxique.

Par les vitamines naturelles A et D, comme stimulant de la croissance et fixateur du calcium.

Principales indications. — *Anémies :* anémies pernicieuses, toxiques, post-hémorragiques, infantile; chlorose. *Etats d'infection chronique :* Adénites, scrofules, lymphatisme, prétuberculose et tuberculose. *Avitaminoses :* Rachitisme, allaitement, suites de couche, croissance.

Mode d'emploi. — *Enfants :* X à XL gouttes. *Adultes :* XL à LX gouttes. A prendre en 2 fois, avant les principaux repas, dans un liquide quelconque (eau sucrée, tisane, bouillon, vin, etc.).

Prix : 13 fr. 50

Laboratoires RENARD

35, rue de Paris — CLICHY (Seine).

GADUASE

Tonique et stimulant général d'action rapide et durable. Succédané classique et agréable (sirop framboisé) de l'huile de foie de morue.

Composition :

Hypophosphites de sodium et de calcium (stabilisés par la glycérine), toniques nervins, antirachitiques et reminéralisateurs, stimulants de la nutrition.

Méthylarsinate disodique (0,015 par cuillerée à soupe), reconstituant des tissus nerveux et sanguins.

Iode (en combinaison tannique parfaitement stable et inaltérable), régulateur du métabolisme et anti-infectieux de premier ordre.

Convient à tous les âges.

La GADUASE active les échanges, réveille les fonctions, prévient et fait cesser rapidement les carences organiques. Ni incompatibilité, ni contre-indication, ni accoutumance.

Indications. — Anémie, Anorexie, Lymphatisme, Asthénie, Déminéralisations, Convalescences et toutes les insuffisances fonctionnelles.

Posologie. — Pure ou dans un peu d'eau, avant ou après les repas.

Nourrissons : 1/2 à 1 cuillerée à café *pro die*.

Enfants : 2 à 3 cuillerées à café.

Adolescents et adultes : 2 à 3 cuillerées à soupe.

Flacon (210 cc. environ) : 9 francs.

Grand flacon (400 cc. environ) : 15 francs.

Laboratoires SERVIER

25, rue Eugène-Vignat — ORLEANS.

GAIACAMPHRE

(Ampoules de 2 cc. et de 5 cc.)

Solution aqueuse de camphre (campho sulfonate) et de Gaïacol (glycéryl gaïacol) correspondant à 0 gr. 10 de camphre et 0,05 de gaïacol par cc.

Indolore, se résorbant rapidement, non toxique.

Indications. — Toutes les affections bronchiques ou pulmonaires aiguës ; toutes les suppurations chroniques pulmonaires. Préventif des complications pulmonaires d'origine médicale ou chirurgicale.

Mode d'emploi — *Adultes* : de 1 à 4 ampoules par jour.

Enfants : 1 ampoule par jour ou tous les 2 jours.

Prix : 20 francs la boîte de 10 ampoules.

Se fait aussi en comprimés.

Adultes : de 3 à 6 comprimés par jour.

Enfants à partir de 10 ans : 1 à 4 comprimés par jour.

Formule des comprimés :

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Dionine | 0,005 |
| Glycéryl gaïacol | 0,10 |
| Camphosulfonate..... | 0,05 |
| Alcoolature de racine d'Aconit..... | III gouttes. |

Prix : 12 francs.

Ces comprimés, enrobés d'une façon spéciale, se dissolvent dans l'intestin seulement.

Laboratoires PLAGNOL

18, rue du Maréchal-Foch — VERSAILLES.

GALABACTÉINE

La Galabactéine est une culture de bactéries lactiques sélectionnées en milieu protéino-lacto-sérique.

Forme. — Présentée en tubes scellés de 10 cc.

Indications. — Toutes infections intestinales et autres intoxications d'origine digestive, métrites, vaginites, pansement des plaies.

Mode d'emploi. — 1° Prendre le contenu de 2 tubes, le matin, à jeun, dans une tasse d'eau sucrée ;

2° *Enfants* jusqu'à 3 ans : 1 tube dans de l'eau sucrée par la bouche ou en petit lavement ;

3° En pansement lorsqu'il s'agit d'une infection externe.

Prix de vente : 12 francs.

Laboratoires LUCINIA

154 bis, rue de Breteuil — MARSEILLE.

GALACTOGIL

Extrait titré maltosé phosphaté de Galéga.
Granulé à base d'extrait de malt, extrait de galéga stabilisé, phosphate tricalcique, cumin, fenouil, etc.

Indications :

Allaitement. — Insuffisance lactée. — Montée laiteuse tardive. — Reprise de l'allaitement. — Nourrissons déficients.

Mode d'emploi :

Trois fois par jour, une ou deux cuillerées à soupe dans un verre d'eau ou de tisane et persister à donner le sein avec régularité.

La boîte de 250 grammes : 16 fr. 30.

Laboratoires PROGIL

77, rue de Miromesnil — PARIS (VIII^e).

GALFORM LAMBIOTTE FRÈRES

Pastilles à l'Aldéhyde formique.

Propriétés thérapeutiques. — Réalisent l'asepsie du rhino-pharynx sous une forme commode, agréable et inoffensive ; au fur et à mesure qu'elles se dissolvent dans la bouche, leur principe formolé se dégage à l'état naissant, communiquant à la salive ses actives propriétés germicides.

Indications. — 1^o Prophylaxie des maladies infectieuses ; 2^o Remède curatif des angines, amygdalites, stomatites, rhino-pharyngites, laryngites ; 3^o Hygiène de la voix.

Mode d'emploi. — 1 pastille 4 à 5 fois par jour et, au besoin, toutes les heures ou 1/2 heures. La laisser fondre lentement dans la bouche.

Prix : 6 francs.

Littérature et Echantillons :

Produits LAMBIOTTE FRÈRES

20, rue Dumont-d'Urville — PARIS (XVI^e).
124, avenue Rogier — BRUXELLES.

GAMBÉOL

Adopté par le Ministère de la Santé Publique.

Principe actif. — Protochlorure de mercure léger et dissociable (Proto-Gambier).

Mode d'action. — Agit en se dissociant en mercure métal et oxyde de mercure à l'état colloïdal sans formation de sublimé.

Indications. — Syphilis acquise et héréditaire de l'adulte et de l'enfant à toutes les périodes.

Formes et posologie :

1° Cachets à 1 cgr., 2 ou 3 ch. jour.

Prix : 20 francs.

2° Cartouches de pommade pour frictions à 50 %

Prix : 20 francs.

Adultes : 1 chaque jour.

Enfants : Fractions suivant l'âge.

3° Suppositoires adultes à 10 cgr., 1 ch. jour. Prix : 18 francs.

Suppositoires enfants à 5 cgr., 1 ch. jour. Prix : 16 fr. 80.

Laboratoire du Gambéol

42, rue Emile-Deschanel

COURBEVOIE (Seine).

Tél. : Défense 17-67.

GAMÉTOXYL

Nouvel antimalarique particulièrement puissant.

Le Gamétoxyl associe au chlorhydrate de quinine un composé synthétique : la dihydroquinamine qui agit sur les formes sexuées de l'hématozoaire alors que la quinine a sur elles une action pratiquement nulle (Comm. à la Soc. de Méd. Tropicale du 26 janvier 1933 et du 20 octobre 1933 ; thèse de Th. Maarek ; Comm. à la Soc. de Path. Exotique du 14 février 1934, etc.).

Deux formes :

Toutes deux parfaitement tolérées par l'organisme.

Comprimés (dosés à 0,30 de produit actif) pour le traitement préventif : 1 comprimé par jour — et le traitement des formes chroniques et des petits accès : 2 à 6 comprimés par jour.

Ampoules injectables pour le traitement des formes plus sévères — 1 à 3 injections intramusculaires par jour.

Le Gamétoxyl peut s'employer même dans la bilieuse hémoglobinurique.

Présentation et prix :

Le flacon de 20 comprimés à 0 gr. 30 : 25 fr.

La boîte de 8 ampoules de 5 cc. : 25 francs.

Échantillons et littérature :

Laboratoires SFÉAT

15, rue Catulienne — SAINT-DENIS
(Seine).

GANDERMA

Pommade renfermant les principes actifs de l'eau d'Alibour associés au principe actif du Gambéol et à

nc.

Formule:

| | |
|---|-----------|
| Protochlorure de mercure léger et dissociable | 5 gr. |
| Sulfate de cuivre..... | 0 gr. 50 |
| Sulfate de zinc | 1 gr. |
| Oxyde de zinc..... | 18 gr. |
| Excipient (Lanoline et Vaseline).... | 75 gr. 50 |

Indications. — Toutes affections et infections cutanées d'origine inflammatoire ou microbienne. Acnes, Dartres, Ectyimas, Eczémas, Erythèmes polymorphes, Furoncles, Herpès, Impétigos, Intertrigos, Pityriasis, Prurits, Psoriasis, Pyodermites et toutes infections.

Présentation. — En tubes étain imprimés de 3 gr. environ.

Prix : Le tube : 12 francs au public.

Laboratoire du GAMBÉOL

42, rue Emile-Deschanel — COURBEVOIE (Seine).

Téléphone : Défense 17-67

GARDÉNAL

Phényl-éthyl-malonylurée.

Hypnotique et sédatif du système nerveux.

Indications :

ÉPILEPSIE,

Chorée, Convulsions, États anxieux, etc.

Antispasmodique, à petites doses répétées.

Présentation :

Comprimés à 0 gr. 10 (tubes de 20).

— à 0 gr. 05 (tubes de 30).

— à 0 gr. 01 (tubes de 80).

Doses par 24 heures :

Adultes : 0 gr. 05 à 0 gr. 30.

Enfants : 0 gr. 02 à 0 gr. 10.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

GARÉPHÉDRINE

Comprimés.

(Anciennement GARDÉPHÉDRINE). ⁷

Chl. Ephédrine naturelle..... 3 cgr.

Phényléthylmalonylurée..... 1 cgr.

Action. — Sédatif nerveux, antichoc.

Indications. — Spécifique de la crise, Asthme essentiel, Asthme nerveux, Asthme infantile, Emphysème, Asthme rebelle, Accès avec insomnie, Rhume des foins, Etats dyspnéiques, Etats allergiques, Hypotension.

Posologie. — Un comprimé avant ou au début de la crise.

Répéter après une demi-heure si nécessaire.

De 8 à 14 ans : 1/2 comprimé.

De 2 à 8 ans : 1/4 de comprimé.

Voir également : **Diuréphédrine**, page 609 et :

Ephédrasmine, page 657.

Echantillons et littérature sur demande.

Prix : 14 francs.

Laboratoires THORAL

LE MONT-DORE (Puy-de-Dôme).

GARGARISME DU MONT-DORE DU D^r SALYS

A base de Sulfate neutre de quinoléine.

Indications. — Toutes affections de la bouche et de la gorge.

Propriétés. — Antiseptique buccal très actif, mais non toxique, non caustique, et ne coagulant pas les albumines.

Mode d'emploi. — En gargarisme une cuillerée à café dans 1/2 verre d'eau tiède. Cette dose peut être augmentée sans inconvénient. Il peut s'employer pur en badigeonnage comme collutoire.

Prix : 10 francs.

Laboratoire de la VARILAXINE

SURGÈRES (Charente-Inférieure).

GASTÉOSE

Comprimés effervescents à base de Sulfate de Magnésie, Sulfate de Soude, Citrate de Soude, Azotate de Potasse.

Dyspepsie, Gastralgie, Infections du tube digestif, Insuffisance hépato-rénale, Fermentations, Constipation, Urticaire, Dermatose.

Posologie :

4 à 6 comprimés par jour dans un grand verre d'eau le matin à jeun et aux repas.

Prix : 15 francs.

Dépôt général :

Laboratoires UNIS-SPÈS

14, rue Demarquay — PARIS (X^e).

GASTIASE

Régulateur des fonctions gastriques, intestinales et hépatiques.

A base de sels sodiques et de sels magnésiens desséchés et chimiquement purs. En comprimés effervescents parfumés au citron.

Posologie. — Laisser dissoudre dans un verre d'eau 2 comprimés le matin à jeun et 2 le soir avant le repas.

Prix : 12 francs.

Laboratoires UNIS-SPÈS

14, rue Demarquay — PARIS.

GASTRÉPATINE

Sulfate, citrate, phosphate, bicarbonate de soude,
Sels rigoureusement anhydres.

En faisant dissoudre 2 paquets dans une bouteille
d'Eau d'Evian on réalise la solution de Bourget.

Prescrire un verre à bordeaux le matin à jeun.
La solution est d'absorption facile.

Indications. — Insuffisances glandulaires du tube
digestif ; prescription courante dans la théra-
peutique du foie, de l'estomac, de l'intestin :
hyperchlorhydrie, insuffisance hépatique, dys-
pepsie, entérites, etc. Contribue au traitement
des dermatoses et intoxications intestinales.

Prix : 5 francs.

Dépôt O. C. P., 71, rue du Temple — PARIS.

Laboratoires B. O. L.

M. BERGER

29, faubourg Bourgogne — ORLÉANS.

GASTRHÉMA

Méthode de Castle.

Composition. — Extrait de muqueuse d'antra
pylorique de porc.

Forme. — Ampoules buvables de 5 cc. rigoureuse-
ment dosées, d'une saveur agréable, contenant
toutes les hormones de l'organe frais.

Indications. — Toutes les Anémies, Asthénies,
Anorexies, Hémorragies, Déficiences organiques,
Convalescences.

Sans contre-indications.

Posologie. — 1 à 3 ampoules par jour dans un
liquide froid, avant les repas.

La boîte de 10 ampoules : 20 francs.

Admis par les Assurances sociales sous le n° 703-1.

Laboratoire du GASTRHÉMA

71, rue Saint-Blaise — PARIS (XX^e).

Téléphone : Roquette 76-24.

GASTRICINE DU D^r E. DUHOURCAU

Composition. — Extrait opothérapique, liquide, de muqueuses fraîches, d'estomacs de porcs et de caillottes de veaux.

Renferme tous les éléments naturels du suc gastrique organique, ses ferments lab, pepsine, et toutes les zymases enlevées à la muqueuse gastrique.

Indications. — Affections organiques de l'estomac. Cas de souffrance de l'organe (insuffisance gastrique par excès ou par défaut). Anémie pernicieuse, anémies en général (méthode de Castle).

Mode d'emploi. — A un 1/2 verre d'eau ajouter 1 cuillerée à café de GASTRICINE.

Prendre une gorgée de *temps en temps pendant le repas*.

Doses. — 3 à 6 cuillerées à café par jour.

Prix : 16 francs.

Laboratoires du D^r E. DUHOURCAU

6, rue Louis-Blanc — LA GARENNE (Seine).

Anciennement, 10, rue de Turenne — PARIS (IV^e).

N^o d'inscription au Laboratoire de Contrôle, 146-1.

GASTROCALCINE

**Affections de l'estomac, Dyspepsies,
Hyperchlorhydrie, Pyrosis, Dilatations
de l'Estomac, Ulcères.**

GASTROCALCINE GRANULÉE

1 cuillerée à café contient environ :

| | |
|------------------------------|----------|
| Carbonate de chaux..... | 0 gr. 40 |
| — de magnésie..... | 0 gr. 20 |
| Bicarbonate de soude..... | 0 gr. 20 |
| Sucre anisé, Q. s. pour..... | 5 gr. |

Par cuillerée à café après les repas et au moment des crises.

Flacon de 40 à 50 cuillerées à café.

Prix : 12 fr. 50.

GASTROCALCINE BISMUTHÉE

Par dose moyenne (une mesure).

| | |
|---------------------------|-----------|
| Carbonate de bismuth..... | 2 gr. 50 |
| — de magnésie..... | 0 gr. 30 |
| — de chaux..... | 0 gr. 30 |
| Bicarbonate de soude..... | 0 gr. 25 |
| Kaolin..... | 5 gr. |
| Bromure de sodium..... | 0 gr. 25 |
| Codéine..... | 0 gr. 005 |
| Extrait de jusquiame..... | 0 gr. 02 |
| Sucre..... | 6 gr. |

Essence d'anis Q. s. p. aromatiser.

Une mesure ou 1/2 mesure selon les cas ou les besoins. 1, 2 ou 3 fois par jour au maximum après les repas ou au moment des douleurs, délayée dans 1/3 ou 1/2 verre d'eau environ.

Prix : 20 fr.

Laboratoire OBERLIN

J. TINARDON, Pharmacien de 1^{re} classe

de la Faculté de Pharmacie de Paris

17, rue Cadet — PARIS

GASTROCAOL

Pansement gastrique.

Composition. — Parties égales de Silicate hydraté pur d'Alumine et de Silicate hydraté pur de Magnésie, lavés, étuvés, stérilisés-porphyrisés.

Forme. — Poudre insoluble, en sachets de 20 grammes.

Propriétés thérapeutiques. — Réalisant le plus parfait des pansements gastriques, *peut et doit* remplacer dans cet usage les Sels de Bismuth :

Mêmes indications — Plus efficace.

Mêmes doses — Jamais toxique.

Même mode d'emploi — 6 fois moins coûteux.

Indications. — Pansement gastrique. — Hyperchlorhydrie. — Ulcères de l'estomac et du Duodénum. — Spasmes du Pylore. — Aérophagie. — Dyspepsies douloureuses. — Hémorragies du Tube digestif. — Diarrhées aiguës. — Diarrhée des tuberculeux — Dysenteries bacillaires et amibiennes. — Etats cholériformes.

Doses. — 1^o Moyennes : 20 gr. par jour (un sachet) en une ou trois fois.

2^o D'entretien : 10 grammes par jour en une ou trois fois.

3^o Exceptionnelles : 100, 150, 200 grammes par jour dans les états cholériformes.

Mode d'emploi. — En suspension dans de l'eau pure, sucrée ou non, soit le matin à jeun en une fois, soit en 3 fois, avant chacun des repas principaux.

Prix. — 12 fr. pour un minimum de traitement de 12 jours.

Laboratoire de la Sulfolène ROZET
BENDERITTER ET C^{ie}, à VENDOME
(Loir-et-Cher).

GASTROCARBONE

Charbon végétal activé.

Charbon animal,

Charbon minéral (graphite)

Carbonate de chaux, Magnésie Hydratée

Deux formes : *Pastilles* : sucer 3 ou 4 pastilles par jour. *Granulé* : croquer 3 ou 4 cuillers à café de granulé par jour.

Régularise les fonctions intestinales sans provoquer la constipation.

Pyrosis, Spasmes, Aérophagie, Diarrhées, Infections intestinales.

Prix : 14 francs.

Labor^{re} du GASTROCARBONE
SAINT-LOUIS (Bouches-du-Rhône).

GASTROCLEAN

Maladies de l'Estomac, du Foie, des Intestins.

Préconisé par tous les spécialistes de l'estomac, des intestins et du foie.

Gastroclean est le remède spécifique et souverain des Dyspepsies, des Affections gastro-intestinales, de la congestion hépatique et des infections biliaires et auto-intoxications.

Gastroclean neutralise l'hyperacidité gastrique, calme les douleurs stomacales et régularise la digestion.

Dose et mode d'emploi.

(Sans autre indication du Médecin.)

Une à deux cuillerées à café le matin à jeun dans un demi-verre d'eau de Châtel-Guyon.

Dépôt principal :

Laboratoires ADLER

36, rue des Francs-Bourgeois — PARIS (III^e).

En vente chez tous les Droguistes et Pharmaciens.

GASTROLUËS

Nouveau dérivé de l'acide para-amino-phényl-arsinique possédant une activité spirillicide optima et permettant d'obtenir, par voie digestive, les résultats thérapeutiques des injections d'arsénobenzènes.

A utiliser également dans le traitement des dysenteries, diarrhées, etc.

Posologie. — *Syphilis.* — 4 comprimés par jour pendant les 4 premiers jours de la semaine et, ce, pendant 8 semaines.

Dysenteries et diarrhées aiguës, mêmes doses, mais seulement pendant 2 semaines.

Dysenteries et diarrhées chroniques, 2 comprimés par jour pendant les 4 premiers jours de la semaine et, ce, pendant 6 semaines.

Nota. — 1° Tâter la susceptibilité du malade en mettant 2 à 4 jours à atteindre la dose conseillée ;

2° En thérapeutique infantile prescrire de la même manière les comprimés correspondant à l'âge ou mieux donner le nombre de comprimés nécessaire pour que la dose quotidienne soit en moyenne de 0,015 par kg.

Présentation et prix :

| | | | | |
|--------|--------------|------------|--------------------------|--------|
| Flacon | 30 comprimés | Gastroluës | adultes à 0,25..... | 20 fr. |
| — | 40 | — | enfants à 0,10 | 12 fr. |
| — | 100 | — | nourrissons à 0,02 | 10 fr. |

Littérature et échantillons :

Laboratoires SFÉAT

15, rue Catulienne — SAINT-DENIS (Seine).

GASTRONALDINE

Estomac, Fole, Intestin.

Forme. — Paquets.

Formule. — Hépatine, Rénine, Gastérine, Belladone, Kaolin, Carbonate de Magnésie, Carbonate de Chaux, Carbonate acide de Sodium.

Produits opothérapiques en milieu alcalin bien dosé.

Indications. — Aérophagie, Hyperchlorhydrie, Hypersécrétion gastrique, Pyrosis, Brûlures d'estomac, Troubles gastriques d'origine alimentaire ou nerveuse, Ulcération de l'estomac et du duodénum, Insuffisance motrice de l'estomac, Maux de tête, Insomnie, Congestion du foie et des reins.

Mode d'emploi. — Suivant avis du docteur, 2 à 4 paquets par jour au milieu, à la fin ou entre les repas.

Prix : 15 francs la boîte de 28 paquets.

La demi-boîte 9 fr. 50

Laboratoires M. A. ROUX (M. A. R.)

M. A. ROUX, Pharmacien

58, rue de Maubeuge — PARIS (IX^e).

GASTROPANSEMENT

du Dr ZIZINE

Pansement polyvalent à base de charbon activé, réalisant la protection intégrale de la muqueuse gastrique.

Forme. — Paquets.

Composition. — Charbon polyvalent activé, très adhésif et d'un grand pouvoir d'adsorption, Kaolin purifié, Carbonate de bismuth, Carbonate de magnésie.

Propriétés thérapeutiques. — Traitement des ulcères gastriques et des gastropathies douloureuses.

Indications. — Hyperchlorhydrie.
Gastrites.
Spasmes du pylore.
Atonie gastrique.
Dyspepsies réflexes.
Ulcères.

Posologie. — Prendre le matin à jeûn, et au besoin le soir, le contenu d'un paquet délayé dans un peu d'eau.

Prix : 18 francs.

Laboratoires du Docteur ZIZINE

Docteur en Médecine — Docteur en Pharmacie, Ex-interne en pharmacie — Lauréat des Hôpitaux, Lauréat des Facultés de Médecine de Paris et Bordeaux.

24-26, rue de Fécamp — PARIS (XII^e).

Tél. : Diderot 28-96.

GASTRO-SODINE

Forme : Granulé.

Trois formules :

GASTRO-SODINE normale ;
GASTRO-SODINE S, sulfatée ;
GASTRO-SODINE B, bromurée.

Indications. — Gastro-entérites simples, Gastro-entéro-hépatites, Gastro-entérites neuro-arthritiques.

Doses. — Une cuiller à café le matin dans un verre d'eau de préférence chaude.

Prix : 10 fr. 75.

**Laboratoires Gastro-entérologiques
ODINOT**

21, rue Violet — PARIS (XV^e).

Tél. : Ségur 69-13.

GASTROZYMASE

Composition. — Ferments gastriques naturels (opothérapie du suc gastrique de porc),

Action thérapeutique. — En plus du simple pouvoir de substitution, utilisable uniquement en cas d'hypopepsie ou d'apepsie, le système de ferments gastriques (zymases) rassemblés dans la GASTROZYMASE a la propriété : de stimuler les fonctions gastriques déficientes, et, ce qui est le plus généralement intéressant, de régulariser et d'harmoniser ces fonctions digestives, défendant ainsi l'intestin contre l'envahissement des germes ou toxines pathogènes.

Forme. — Comprimés effervescents.

Indications. — Tous les troubles gastriques (qu'ils proviennent d'hypo ou d'hyperchlorhydrie, d'hypo ou d'hyperpepsie).

Posologie. — *Comme médicament de substitution* : 2 à 3 comprimés dissous dans l'eau, au milieu du repas.

Comme stimulant gastrique : 1 à 2 comprimés dissous dans l'eau, 1 heure avant chaque repas.

Comme régulateur gastrique : 3 à 4 comprimés dissous dans l'eau au cours de chaque repas.

Prix : la boîte de 45 comprimés, 18 francs.

Laboratoires BOUTY
3, rue de Dunkerque — PARIS.
Tél. : Nord 32-52 (2 lignes).

GATERCODÉINE DOMERGUE

Principes actifs. — Gaïacol, Terpinol, Codéine.

Propriétés. — Antiseptique des Bronches. S'éliminant surtout par les voies respiratoires.

Présentation. — Capsules (boîte de 40).

Indications. — Enrouement, Pharyngites, Laryngites, Toux Catarrhes. Spécifique de la Coqueluche.

Mode d'emploi. — 2 à 6 capsules par jour 2 par 2. Enfants : 2 à 4.

Prix : 12 francs.

Laboratoires DOMERGUE
AGEN (Lot-et-Garonne).

GATRAN

Composition. — Le GATRAN désigne soit un *Savon* liquide médicamenteux, soit un *Baume* soluble dans l'eau, à base de Goudron de Norvège et de Ricinoléate de soude.

Le Savon Cadique et le Baume Cadique contiennent en plus de l'Huile de Cade.

Indications. — Pityriasis simplex ; Eczéma séborrhéique, Séborrhée, Calvitie séborrhéique.

Desquamations pelliculaires, Psoriasis, Acné, Séborrhée huileuse de la poitrine et du dos.

Mode d'emploi. — En principe, applications chaque soir sur le cuir chevelu de *Baume*, le matin, lavage au *Savon*.

Le savonnage quotidien au GATRAN est recommandé, à titre préventif, contre toutes les affections séborrhéiques.

Présentation. — *Baume* : flacon de 90 cc.

Savon : flacon de 500 cc.

Prix de vente :

Le flacon de Baume GATRAN : 15 francs.

Le flacon de Savon GATRAN : 25 francs.

Laboratoires L. LECOQ et F. FERRAND
14, rue Gravel — LEVALLOIS-PERRET

Dépôt :

Pharmacie Générale LECOQ et FERRAND
54, Chaussée-d'Antin — PARIS.

GAUROL

**Nouveau sel phosphoré, calcique et magnésien
entièrement assimilable.**

Présentation. — 3 formes : ampoules injectables de 1 cc. — Comprimés. — Granulé.

Propriétés thérapeutiques. — Tonique général de l'organisme. — Reminéralisateur. — Recalcifiant.

Indications thérapeutiques. — Asthénie, Anémie, Convalescence, Croissance, Tuberculose, Grossesse, Allaitement, Affections dentaires, Rachitisme, Troubles de l'ossification, Lymphatisme, Consolidation des fractures.

Mode d'emploi. — 1 ampoule injectable par jour, 1 à 3 comprimés par jour ; 1 à 3 cuillerées à café de granulé par jour.

Prix :

Ampoules : 16 francs. — Comprimés : 14 francs. — Granulés : 15 francs.

GAUROL INTRAVEINEUX

Présentation. — Ampoules de 5 cc.

Propriétés thérapeutiques. — Hémostatique puissant, Recalcifiant, Reminéralisant.

N'est pas caustique comme le Chlorure de Calcium.

Indications thérapeutiques.

En Médecine :

Hémorragies et Anémies qui en résultent.

Épanchements des séreuses.

Tuberculose pulmonaire (Traitement symptomatique de l'asthénie, de l'anorexie, de l'amaigrissement).

En Chirurgie :

Hémorragies : à titre curatif et à titre préventif.

Consolidation des fractures.

Tuberculoses osseuses ou articulaires.

Mode d'emploi. — Injecter 10 cc. en cas d'urgence.

Prix : 30 francs.

Laboratoires PÉPIN et LEBOUCC

COURBEVOIE (Seine).

Tél. : Défense 09-71.

GÉLICURINE

Composition. — Teintures balsamiques additionnées de 3 p. 100 de camphre droit et de 1 p. 100 d'acide acétique, tenant en suspension 6 p. 100 de chlorure de plomb amorphe.

Indications. — Décongestionne et raffermi les tissus tuméfiés, calme les cuissons des engelures.

Non caustique. S'emploie sur les engelures même ulcérées, et cicatrise les crevasses.

Soulage et entrave les éruptions anaphylactiques.

Emplol. — Appliquer 2 à 3 fois par jour la Gélicurine avec le pinceau contenu dans le flacon, sur la partie congestionnée par l'engelure. Laisser sécher sans frotter; aider l'évaporation en soufflant sur la peau. N'appliquer aucun pansement.

Le flacon : 6 francs.

Laboratoire M. AUDIBERT

Docteur en pharmacie

BAYONNE (B.-P.).

GÉLOBARINE

Sulfate de baryum crémeux.

Préparation dénuée de toute action irritante ou toxique, très opaque, de bonne conservation.

Exploration radiologique du tube digestif.

Mode d'emploi :

Le contenu d'un flacon (200 gr.) constitue la dose habituelle pour un repas ou un lavement opaque. La Gélobarine peut s'employer pure ou incorporée à un excipient (chocolat par exemple).

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPÉCIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

GÉLOGASTRINE LICARDY

Granulé ou tablettes.

A base de Gélose, Gélatine et Kaolin purifié.

Réalisation pratique de la thérapeutique par le pansement gastrique à l'exclusion de tous narcotiques, alcalins ou astringents.

Posologie. — *Traitement des douleurs de l'estomac :* 1/2 cuillerée à soupe de *granulé*, ou 2 *tablettes*, au moment des crises douloureuses et à n'importe quelle heure de la journée.

Traitement de l'Hyperchlorhydrie et de l'Ulère gastrique : 1/2 cuillerée à soupe de *granulé*, ou 2 *tablettes*, le matin à jeun, le soir avant de se coucher et 1/2 heure avant chacun des principaux repas.

Prix : 15 francs.

Laboratoires LICARDY

38, boulevard Bourdon — NEUILLY-PARIS.

Téléphone : Maillot 17-75.

GÉLOR

Lubrifiant et régulateur de l'intestin.

Composition. — Emulsion solidifiée d'une finesse microscopique et de stabilité parfaite, de 60 p. 100 d'*huile de paraffine* chimiquement pure et de haute viscosité dans de l'*agar-agar* et du *suc d'oranges douces*.

Propriétés. — Gélor cumule les avantages de l'*huile de paraffine* et du *mucilage* sans en avoir les inconvénients ; suintements, saveur huileuse, digestion pénible.

Indications. — Traitement de la constipation sous toutes ses formes.

Son goût très agréable, sans aucune saveur huileuse, permet au malade d'absorber l'*huile de paraffine* sans s'en douter.

Posologie. — Doses quotidiennes à prendre aux repas :

Bébés : 1/2 cuillerée à café.

Enfants : 1 à 2 cuillerées à café selon l'âge.

Adultes : 2 à 6 cuillerées à café.

Prix en France : 13 fr. 50.

Laboratoires A. CESBRON

63, rue de la Faisanderie — PARIS (XVI^e).

GELOTANIN CHOAY

Nature. — Tannate de gélatine.

Poudre blanche, inodore, insipide, insoluble dans l'estomac, dissociable, dans l'intestin, en ses éléments antidiarrhéiques : tanin et gélatine.

Indications. — Toutes diarrhées non infectieuses. Aucune contre-indication.

Formes pharmaceutiques et posologie :

1^o Pour *nourrissons et jeunes enfants* : Paquets de 25 cgr. : 1/2 à 3 paquets par jour en suspension dans du lait ou tout autre liquide tiède, mais non pas chaud.

2^o Pour *adultes* : Cachets dosés à 50 cgr., 4 à 8 par jour.

Prix : 8 fr. la boîte de 20 paquets.
10 fr. la boîte de 24 cachets.

Laboratoire CHOAY

48, avenue Théophile-Gautier — PARIS (XVI^e).

Tél. : Auteuil 44-09 et 44-10.

GÉNACIDE

Composition. — Granulé acigène contenant pour 100 gr. :

Phosphate bi-ammonique... 12 gr. 75 %

Chlorure ammonique..... 5 gr. %

Ac. phosphorique officinal.. 1 gr. 35 %

Cinq grammes représentent comme coefficient d'acidité en $\frac{N}{10}$ 150 cc.

Indications. — Alcalose (détectée par le *Papier Réactif Génacide* donnant le pH.)
Colibacillose, Asthénie.

Forme. — Granulé.

Dose. — 1 à 3 cuillerées à café par jour.

Prix : 15 francs.

Laboratoire MONTAGU

49, boulevard de Port-Royal — PARIS.

GENATROPINE

Polonovski et Nitzberg.

Indications. — Dyspepsie hyperacide. Douleurs intestinales. Sueurs des tuberculeux. Entérite muco-membraneuse.

Formes. — Gouttes : XX gouttes = 1 mgr.
Granules au 1/2 milligr. Ampoules à 2 milligr.

Mode d'emploi. — XX à XXX gouttes deux fois par jour ou quatre à dix granules par jour. Dose injectable de deux à six milligrammes.

Le flacon ou la boîte : 16 francs.

Laboratoire AMIDO

A. BEAUGONIN, Pharmacien

4, place des Vosges — PARIS (IV^e).

GÉNÉCARMINE

Association de Gardénal-génésérine. Formine Charbon.

Formule. — 1 cuiller à café de granulé contient :
Gardénal 0 gr. 02, Salicylate Génésérine 0 gr. 001,
Charbon animal 0 gr. 50 Charbon végétal 1 gr.,
Formine 0 gr. 30.

Présentation. — Granulé fondant de goût agréable.

Indications. — Entéro-colites, atonie gastro-intestinale, constipation chronique par atonie, troubles digestifs sympathicotoniques et leurs conséquences.

Mode d'emploi. — 2 à 3 cuillerées à café par jour avant les repas.

Prix : Flacon modèle courant. 16 francs.

Flacon Cure : 40 francs.

Laboratoire R. THIRODE.

Pharmacien de 1^{re} classe

de la Faculté de Nancy.

Ex-Préparateur et Lauréat de Chimie,
33, Grande-Rue — BESANÇON

GENESERINE

Polonovski et Nitzberg
Salicylate de Génésérine.

Formes. — Granules et dragées au 1/2 milligr. Gouttes (Solution au millième). Ampoules à 2 milligrammes.

Indications. — Traitement du syndrome solaire et en particulier des dyspepsies hypochlorhydriques nerveuses. Excitant des sécrétions et de la motilité du tube digestif. Spécifique des troubles sympathiques.

Mode d'emploi. — La dose moyenne est de quatre à six dragées ou granules par jour. Si l'on prescrit les gouttes, on en donnera XX avant chaque repas, LX par jour. Les injections sous-cutanées sont surtout indiquées dans les cas de crises douloureuses intenses, contre l'angoisse et l'insomnie persistante des dyspeptiques.

Injecter une ampoule tous les jours pendant les cinq premiers jours, puis une ampoule tous les deux jours. Le flacon ou la boîte. Prix au public : 16 francs.

LABORATOIRE AMIDO

A. BEAUGONIN, Pharmacien

4, place des Vosges — PARIS (IV^e).

GENHYOSCYAMINE

Polonovski et Nitzberg.

Indications. — Etats spasmodiques en pathologie digestive. Chorée. Tremblement mercuriel et de causes diverses. Delirium tremens. Sueurs des tuberculeux.

Formes. — *Gouttes* : XX gouttes = 1 milligr. *Granules* au 1/2 milligr. *Ampoules* à 2 milligr.

Mode d'emploi. — XX à XXX gouttes deux fois par jour. Quatre à six granules par jour, ou injecter une ampoule par jour.

Prix au public : le flacon ou la boîte,
16 francs.

Laboratoire AMIDO

A. BEAUGONIN, Pharmacien

4, place des Vosges — PARIS (IV^e).

GÉNISTÉNAL

Ethylphénylbarbiturate neutre de spartéine.

Propriétés. — Neurosédatif et hypnogène « équilibrant » du système nerveux autonome antispasmodique et vasodilatateur.

Indications. — Le Génistéнал possède les indications thérapeutiques de l'éthylphénylmalonylurée, auxquelles viennent s'ajouter les indications propres de la spartéine, comme modificateur du système nerveux végétatif.

Épilepsie, chorée, convulsions de l'enfance, etc..., et de certaines névroses et maladies mentales s'accompagnant ou non d'anxiété, délires, hallucinations, etc...

Traitement des déséquilibres neuro-végétatifs se traduisant par insomnie, migraine, crises douloureuses et spasmodiques gastro-intestinales, asthme, ainsi que des troubles intestinaux post-opératoires.

Posologie. — 1 à 6 dragées par jour et plus, par prises fractionnées. Dose moyenne : 3 à 4 dragées par jour.

En Médecine infantile, suivant âge et indications : 1/2 à 4 dragées par jour.

Son emploi peut être prolongé sans inconvénient, mais exclusivement sous la surveillance du médecin.

Forme. — *Dragées* dosées à 0 gr. 05 d'éthylphénylmalonylurée et 0 gr. 015 de spartéine base.

De faible toxicité, la marge thérapeutique du Génistéнал est considérable.

Laboratoires CLIN, COMAR et Cie

20, rue des Fossés Saint-Jacques — PARIS

GÉNOMORPHINE

Polonovski et Nitzberg.

Formes. — Comprimés dosés à 2 centigrammes. Ampoules à 4 et à 10 centigrammes.

Indications

La douleur : Coliques hépatiques, coliques néphrétiques, douleur des cancéreux, crise gastrique du tabès, douleurs de l'ulcère et de l'entéro-colite, angine de poitrine, fractures, douleurs post-opératoires, migraines, névralgies. Dyspnée, asthme, anxiété, angoisse, agitations, délire, insomnies, cure de démorphinisation.

Mode d'emploi. — 4 centigrammes de Génomorphine correspondent à 1 centigramme de morphine.

Comprimés : 2 à 4 par jour.

Ampoules : 1 à 2 par jour.

Prix : La boîte de 7 ampoules de 4 centigrammes, 25 fr.

Le flacon de 15 comprimés de 2 centigrammes, 25 fr.

La boîte de 12 ampoules de 10 centigrammes pour cure de démorphinisation, 90 fr.

Laboratoire des Produits Amido

A. BEUGONIN, Pharmacien

4, place des Vosges — PARIS (IV°).

GENOSCOPOLAMINE

Polonovski et Nitzberg.

Indications.

ETATS PARKINSONIENS, Paralyse agitante, Syndromes post-encéphalitiques, Anesthésie chirurgicale.

Formes. — Gouttes : XX gouttes = 1 milligr.

Granules au 1/2 milligr.

Ampoules dosées à 3 milligr. et à 1 milligr.

Mode d'emploi. — XX à XXX gouttes 2 fois par jour. Quatre à 10 granules par jour. Anesthésie chirurgicale : 4 granules la veille de l'opération. Trois quarts d'heure avant l'opération, 1 ampoule de Génoscopolamine à trois mmgr. suivie de l'injection de 1 cgr. 1/2 de morphine.

Prix au public : Le flacon : 20 fr.

La boîte d'ampoules : 30 fr.

Laboratoire AMIDO

A. BEAUGONIN, Pharmacien

4, place des Vosges — PARIS (IV^e)

Ampoules. Granules. Gouttes.

GENOSTHÉNIQUES

Cacodylate de Genostrychnine et de Gènesérine
Polonovski et Nitzberg.

Indications. — Asthénies, Dépression nerveuse, Neurasthénie, Psychasthénie, Surmenage intellectuel, Asthénie intellectuelle et physique des vieillards, Convalescence des maladies graves, Asthénie cardiovasculaire des infections, Asthénie de la croissance, de la grossesse, de la lactation, des anémies.

Formes. — Ampoules de 2 cc. Granules. Gouttes.

Mode d'emploi. — XX à XXX gouttes ou 2 ou 3 granules aux trois principaux repas.

Ampoules. — Injecter une ampoule tous les jours pendant dix jours.

Prix au public : 18 francs.

Laboratoire AMIDO

A. BEAUGONIN, Pharmacien

4, place des Vosges.

PARIS (IV^e).

GENOSTRYCHNINE

Polonovski et Nitzberg.

Indications. — Système nerveux, Paralysies diphtériques, Paralysies bulbaires, Cœur et circulation, Alcoolisme, Asthénie, Neurasthénie, Affections oculaires.

Formes. — *Gouttes* : XXX gouttes = 5 milligr. *Granules* à 0 gr. 002. *Ampoules* à 0,01.

Mode d'emploi. — XX à XXX gouttes deux fois par jour. Quatre à dix granules par jour.

Dose injectable : une ampoule par jour.

Le flacon ou la boîte : 14 fr.

Laboratoire AMIDO

A. BEAUGONIN, Pharmacien

4, place des Vosges — PARIS (IV^e).

GÉO-BARYUM

Sulfate de Baryte précipité pour examens radiologiques.

Pâte. — Émulsion. — Poudre.

Le **GÉO-BARYUM POUDRE** est d'une conservation indéfinie sans risques d'altération, il donne une émulsion homogène et stable et d'une opacité parfaite.

| | | Prix médical. |
|------------------|---|---------------|
| Poudre. | Boîte de | |
| | 150 gr. | 5 fr. 50 |
| — | — de 200 gr. | 6 francs |
| — | — de 400 gr. | 10 — |
| — | — de 1 000 gr. | 19 — |
| Pâte. | Flacon de | |
| | 200 gr. | 5 francs |
| — | — de 400 gr. | 7 — |
| — | — de 1.000 gr. | 15 — |
| — | Pot de grès de 2 kg. 500 à 5 kilos..... | 14 — |
| Émulsion. | Flacon de | |
| | 400 gr..... | 9 francs |
| — | — 1.000 gr..... | 20 — |
| — | — 2 kg. 500. Le kilo | 18 — |

Établissements GEO GIGNOUX

Usine à Savigny-sur-Orge (Seine-et-Oise).

GÉRANINE

(Vermicide universel).

Composition. — Diméthylcyclooctodiénoï, essence de *melaleuca viridiflora*.

Action thérapeutique. — Agit sur tous les parasites intestinaux (*tænia*, oxyures, tricocéphales, *ascaris*, protozaires, etc.).

Avantages. — Médicament non toxique, sans aucun danger, n'incommodant pas le malade.

Présentation. — Capsules gélatineuses : 16 par boîte.

Mode d'emploi :

Contre le tænia : deux fois 8 capsules à 1/2 heure d'intervalle.

Contre les oxyures : 2 capsules à chaque repas pendant 4 jours. Recommencer huit jours plus tard.

Prix : 15 francs.

E. BOULLÉ, Pharmacien de 1^{re} classe

Ex-Interne des Hôpitaux

Lauréat de la Faculté de Paris

12, avenue de la Grande-Armée — PARIS (XVII^e).

GERMOSE

Gouttes à base de Fluoroforme stabilisé dans des extraits végétaux. Non toxique. Goût agréable.

Indications. — Employée contre la coqueluche dont elle arrête très rapidement l'évolution et évite les complications si graves.

Calme rapidement la Toux (sans en excepter la Toux sèche émétisante des tuberculeux), la Toux spasmodique, quinteuse, les crises d'asthme, les Toux opiniâtres.

Hâte la guérison des affections des voies respiratoires : Bronchites, Trachéo-bronchites, Pneumonie, Broncho-pneumonie, Grippe pulmonaires, etc, etc.

Propriétés. — Microbicide, antiseptique des voies respiratoires, puissant antispasmodique, sédatif, Combat efficacement l'infection.

Agit sur le symptôme Toux et sur l'affection qui le provoque. N'est pas toxique et n'a aucune action nuisible sur les fonctions digestives, propriétés précieuses qui permettent de prescrire directement la *Germose* aux nourrissons atteints de bronchites, de coqueluche, etc., etc., dans un peu de lait ou simplement dans de l'eau sucrée ou non.

Forme. — Gouttes concentrées : 1 gr. (46 gouttes) contient 1/10 de centimètre cube de fluoroforme stabilisé.

Doses habituelles dans les 24 heures. — Jusqu'à 1 an, 4 fois X gouttes; de 1 à 3 ans, 4 et 6 fois XV gouttes; de 3 à 12 ans, 4 et 6 fois XXX gouttes; au-dessus, 4 et 6 fois XL gouttes. A prendre dans une ou deux cuillerées d'eau ordinaire ou sucrée ou un peu de tisane.

Nota. — Le médecin peut prescrire, sans inconvénient, la *Germose* à des doses plus élevées; il doit même le faire si les résultats ne lui paraissent pas suffisamment rapides.

Dans tous les cas, les doses doivent être prises aussi régulièrement que possible, toutes les deux ou trois heures, par exemple, sans tenir compte des accès de toux ou des quintes.

Aucune contre-indication.

Prix : 11 francs.

Laboratoires **LEBEAULT**
BESINS et C^{ie} pharmaciens.

5 rue Bourg-l'Abbé — PARIS (III^e).

GÉROL-TESTART

Opothérapie et Chimiothérapie associées.

Forme. — Gouttes.

Composition. — Sels minéraux (iode assimilable, manganèse, magnésium, arsénal, phosphore, calcium), extraits opothérapiques (ovarine, orchitine, thyroïdine).

Propriétés thérapeutiques. — Régulateur du métabolisme.

Indications. — Toutes déficiences et convalescences, opothérapie complémentaire de la puberté.

Posologie :

Enfants ou Adolescents : 2 à 3 gouttes par jour et par année d'âge.

Adultes : 50 à 75 gouttes par jour.

(Aux repas, dans une boisson quelconque, le lait excepté.)

N. B. — Le GEROL est le seul produit associant, sous la forme gouttes, sels minéraux à extraits opothérapiques. Il ne contient pas de sucre.

Prix : 20 francs.

Laboratoires du Docteur TESTART
Lauréat de la Faculté de Médecine de Paris,
CHALAIS (Charente).

GLANDEX PHOSCALCIQUE

Forme. — Granulé.

Formule. — Ergostérine irradié, Parathyroïdine, Thymusine, Splénine, Hépatine, Surrénine, Gluconate de Chaux, Poudre d'os frais, Moelle osseuse, Acide anhydroxyméthylène diphosphorique (sel phospho-organique).

Indications. — Surmenage, Faiblesse générale, Neurasthénie, Déminéralisation, Prétuberculose, Carence calcique.

Mode d'emploi. — 2 à 4 cuillerées à café par jour.

Enfants : 2 cuillerées à café.

Prix : 20 francs.

Autres GLANDEX :

Glandex Orchitique, Ovarien, Pluriglandulaire, Thyroïdien, Entéroglandex.

Laboratoires M. A. ROUX
58, rue de Maubeuge — PARIS.

GLANDIMBINE LAFRAN

Indications. — Impuissance génitale précoce ou sénile. Dépression morale ou physique.

Composition. — Yohimbine, 0,005 ; Cérébrine, 0,10 ; Orchitine, 0 15 pour un comprimé dragéifié.

Posologie. — (Pour adultes seulement).
Un comprimé le matin, un à midi, un le soir au repas et un au coucher, si nécessaire.
Avaler avec un peu d'eau ou autre liquide.

Littérature et échantillons aux docteurs seulement.

Prix : 30 francs.

Laboratoires LAFRAN

8, rue de Prague — PARIS (XII^e).

GLANDOCALCYL

Recalcifiant. — Réminéralisateur.

Composition. — Surrénales, fluorure et formiate calciques, carbonate et phosphoglycérate de chaux et de manganèse, di-phosphate tricalcique et poudre d'os frais.

Indications. — Débilité, surmenage, convalescence, grossesse, allaitement, rachitisme, troubles de la croissance, carie dentaire, fractures, maladies des os, lymphatisme, adénites, hérédité et pré tuberculose.

Formes. — Pour *adultes* : cachets ; pour *enfants* : granulé.

Doses. — 2 ou 3 cachets par jour aux repas. 1 ou 2 cuillerées à café deux fois par jour suivant l'âge de l'enfant. Faire dissoudre dans un peu d'eau ou mieux le croquer comme un bonbon.

Prix : *Cachets*, 12 fr. ; *Granulé*, 15 fr.

Laboratoire Moderne

d'Opothérapie et Biologie médicale
40, rue Claire-Pauilhac — TOULOUSE.

GLESOL

Médication Antistaphylococcique.

Description. — Capsules glutinisées contenant :

| | |
|---------------------------|----------|
| Etain colloïdal | 0 gr. 03 |
| Levurine Extractive | 0 gr. 12 |
| Soufre colloïdal | 0 gr. 03 |
| Ferments lactiques..... | 0 gr. 06 |

En flacon de 50 capsules.

Action thérapeutique. — L'*étain colloïdal* est un puissant antistaphylococcique, très bien toléré; la *levurine extractive* agit comme anti-infectieux polyvalent et augmente notablement la leucocytose; le *soufre colloïdal* modifie les réactions cutanées et renforce l'action de l'étain; enfin les *ferments lactiques* transforment le milieu intestinal et s'opposent aux fermentations putrides.

Indications. — Le GLE SOL, groupant dans sa formule les meilleurs anti-staphylococciques connus, trouve son emploi dans le traitement des furoncles, anthrax, abcès, phlegmons, acné, folliculites, annexites, et en un mot dans toutes les affections dues au staphylocoque.

La dose est de 4 à 10 capsules par jour pour les adultes, selon la gravité des cas à traiter. Pour les enfants, doses proportionnelles suivant l'âge.

Prix: 25 francs.

Laboratoires COUTURIEUX

18, avenue Hoche — PARIS.

GLOBEXINE

Les Analbumines

Conception nouvelle de l'opothérapie hématique spécifique. Extrait aqueux total du globule sanguin privé de ses albumines, directement et complètement assimilable. Jamais d'anaphylaxie.

Propriétés thérapeutiques. — Régénération globulaire intensive.

Indications. — Anémies, croissance, grossesse, états infectieux, hémorragies de toute nature. Convalescences.

Forme. — Ampoules buvables 10 cc.

Dose moyenne :

Doses et mode d'emploi. — 1 à 3 ampoules par jour. — *Enfants* : 1/2 dose.

Prix de la boîte de 10 ampoules de 10 cc. : 16 fr.

Autorisé par les Assurances Sociales.

Laboratoire des Produits SCIENTIA

Dr E. PERRAUDIN, Pharmacien

21, rue Chaptal — PARIS.

GLOBULES FUMOUBE

Iodure de Potassium.

Globules à enrobage de gluten, insoluble dans l'estomac, et à excipient résineux, graduellement soluble dans l'intestin, supprimant les phénomènes d'intolérance de l'estomac et de l'organisme.

Doses. — Les *Globules Fumouze* à l'iodure de potassium sont préparés sous deux formes :

Globules Fumouze KI, à 0 gr. 25 par globule.

Globules Fumouze KI, à 0 gr. 10 par globule.

Indications. — Les *Globules Fumouze* iodure de potassium sont prescrits dans toutes les maladies où l'emploi de l'iodure est indiqué.

Prix : 21 fr. 20

Établissements FUMOUBE

78, faubourg Saint-Denis — PARIS.

GLOBULES ROMON

Forme. — Globules glutinisés.

Composition. — Extraits orchitique, prostatique et de moelle épinière joints à la strychnine, à l'Yohimbine et au phosphore de zinc pur.

Indications. — Traitement le plus rationnel de l'impuissance.

Dose. — 4 à 6 globules par jour.

Observation. — La même formule existe également en ampoules : *Ampoules Romon*.

Dose. — Une injection tous les 2 jours.

La boîte de 10 ampoules : 40 fr.

Le flacon de 40 globules : 25 fr.

Laboratoires ROMON

6, rue Bridaine — PARIS.

GLOTTYL

Composition. — Association d'Erysimum, Euphorbia pilulifera, Coca, Drosera, faibles doses de Belladone et d'Aconit.

Formes pharmaceutiques. — Gouttes et Dragées.

Propriétés thérapeutiques. — Décongestionne la muqueuse laryngo-trachéo-bronchique, fluidifie et favorise les sécrétions. Eclaircit la voix, arrête la toux, calme la dyspnée.

Indications. — Laryngites aiguës et chroniques, Trachéites, Bronchites, Coqueluches, Toux coqueluchoïdes, Toux spasmodiques et réflexes.

Posologie. — *Gouttes : Jeunes enfants :*
X gouttes par année d'âge et par jour (en plusieurs prises).

Enfants : XX à XXX gouttes, chaque fois, 4 à 6 fois par jour.

Adultes : XL à LX gouttes, chaque fois, 4 à 6 fois par jour, dans un peu d'eau ou de tisane.

Dragées : Enfants : 3 à 6 dragées par jour.

Adultes : 6 à 12 dragées par jour.

Prix : 12 francs.

Laboratoires DENIS

85 bis, rue du Ranelagh

PARIS (XVI^e). — Tél. : Auteuil 13-89.

LES GLOXINES

Protéinothérapie spécifique des cancers.

Méthode du Docteur Rubens-Duval.

Formes. — Ampoules buvables de 1 cc.

Composition. — Protéines spécifiques extraites de tissus néoplasiques par la méthode et sous le contrôle scientifique du Docteur Rubens-Duval, et diluées en solution physiologique au taux de 10-²¹.

Propriétés. — Elles renforcent les réactions de l'organisme contre le cancer, dans la mesure où ces réactions, tant locales que générales, existent et peuvent être développées.

Les tumeurs peuvent régresser et même exceptionnellement disparaître ; le plus souvent, leur évolution est ralentie et leur malignité diminuée.

Les Gloxines peuvent être associées :

Aux traitements chirurgicaux : Diminution des risques de récurrence et de métastase ;

Aux traitements radiothérapiques (radium, rayons X) : Augmentation de la radiosensibilité des cellules cancéreuses. Achèvement de leur destruction.

Posologie. — En moyenne 2 ampoules par jour, à 12 heures d'intervalle, l'une le matin à jeun, l'autre $\frac{1}{2}$ heure avant le repas du soir.

Durée du traitement. — Il peut être prolongé sans interruption pendant des années. Il est utile tant qu'il existe des lésions cancéreuses manifestes ou une suspicion de foyers cancéreux latents.

Choix des Gloxines. — Les **Gloxines** étant spécifiques de la variété des tissus dont elles proviennent, il convient d'employer les **Gloxines** provenant d'une tumeur semblable à celle qui doit être traitée ou, à défaut, d'une tumeur de type voisin.

Remarque importante :

A défaut de **Gloxines** de type correspondant à la tumeur à traiter, une ou plusieurs **Gloxines** peuvent être utilement employées.

Ainsi pour les tumeurs :

du foie : prescrire les **Gloxines** N° 16.

de l'œsophage : prescrire les **Gloxines** N°s 1 et 2 (alternées).

du pancréas : prescrire les **Gloxines** N°s 3 et 16 (alternées).

du poumon : prescrire les **Gloxines** N°s 1 et 11 (alternées).

Les boîtes ne portent aucune indication susceptible de révéler au malade la nature de son affection.

Les formules sont conventionnelles.

Les médecins, sur leurs ordonnances, ne devront donc désigner les **Gloxines** qu'ils désirent utiliser que par leur numéro d'ordre ou par leur lettre de reconnaissance,

Exemples :

Pour le traitement d'un épithélioma du sein, type ordinaire, prescrire sur l'ordonnance : **Gloxines** N° 9.

Pour le traitement d'un épithélioma de la vessie : **Gloxines** N° 15.

Pour le traitement d'un sarcome du sein : **Gloxines** K. etc...

Cette indication sera suffisante pour que le pharmacien puisse délivrer, sans erreur possible, le produit correspondant.

LISTE DES GLOXINES

en vente dans les pharmacies.

(O. C. P. Dépositaire général).

- N° 1. Epithéliomas épidermoïdes (bouche, langue, lèvres et orifices naturels).
- N° 2. Estomac (cancers épithéliaux).
- N° 3. Gros intestin, Rectum (épithélioma cylindrique).
- N° 4. Ovaire (épithélioma wolffien).
- N° 5. Ovaire (épithélioma germinatif).
- N° 6. Peau (épithéliomas spinocellulaires ou épidermoïdes cornés).
- N° 7. Peau (épithélioma basocellulaire).
- N° 8. Prostate (adénomes et épithéliomas).
- N° 9. Sein (épithélioma type ordinaire).
- N° 10. Thyroïde (épithélioma).
- N° 11. Utérus-col (épithéliomas à cellules cylindriques et basocellulaires).
- N° 12. Utérus-col (épithéliomas spinocellulaires ou épidermoïdes).
- N° 13. Utérus-corps (épithéliomas à cellules cylindriques).
- N° 14. Chondrosarcome.
- N° 15. Vessie (épithélioma).
- N° 16. Vésicule biliaire (épithélioma).
- N° 17. Rein (épithélioma à cellules claires).
- N° 18. Lymphocytome.
- N° 19. Sarcomes (à petites cellules et à cellules polymorphes).
- N° 20. Testicule (séminome).
 - A. Leiomyome malin.
 - B. Parotide (tumeur mixte).
 - D. Ovaire (séminome).
 - E. Ovaire (sarcome provenant des cellules à lutéine).
 - G. Fibrosarcome.
 - H. Maladie de Hodgkin.
 - K. Sein (sarcome).
 - L. Sein (épithélioma à grosses cellules).
 - M. Sein (épithélioma à cellules cylindriques).
 - N. Testicule (épithélioma wolffien).
 - O. Naevome achromique.
 - P. Naevome mélanique.

Prix en France de la boîte de 20 ampoules buvables : 24 francs.

LABORATOIRE DES GLOXINES

6 bis, rue Campagne Première — PARIS (XIV^e).

Tél. : Odéon 93-94.

Agent et dépositaire général pour la Belgique :

G. A. COCHARD

5-7, rue Charles Parenté — BRUXELLES.

GLUCOLACTOL

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments, sous les N^{os} 363-21-22 et 23.

Formes. — Solution. — Ovules. — Topique.

Composition. — Acide lactique, glucose, Extrait de matricaire, Extrait de sauge.

Propriétés pharmacodynamiques. — Restitue à la cavité vaginale ses moyens naturels de défense : Acide lactique et Glycogène.

Indications. — Hygiène des muqueuses, Toilette quotidienne, Leucorrhées (Métrite, Vaginite, Salpingite).

Mode d'emploi :

Solution : 3 cuill. à café pour 1 litre d'eau (injection).

Ovules : 1 par jour.

Topique : Pour pansements gynécologiques.

Solution (le flacon)..... 10 fr. (en France).

Ovules (la boîte)..... 10 fr. —

Topique (le flacon)..... 10 fr. —

Laboratoires A. BAILLY

15, rue de Rome — PARIS (VIII^e).

GLYCÉROPHOSPHATE

DALLOZ

Granulé dosé à 0,50 de Glycérophosphate de chaux, chimiquement pur, par cuillerée à café.

Indications. — Reconstituant minéralisateur. Tonique nervin. — Médicament des enfants ; des mères pendant la période de l'allaitement ; des déprimés.

Dose. — 1 ou 2 cuillerées à café par jour, à croquer ou à dissoudre dans un peu d'eau.

Le flacon : 12 fr. 50.

Laboratoire DALLOZ

13, boulevard de la Chapelle — PARIS (X^e).

GLYCÉROPHOSPHATE ROBIN

Comprimés effervescents dosés à 0,15 centigr. par unité.

Granulé dosé à 0,30 centigr. par cuillerée-mesure.

Ampoules injections dosées à 0,20 centigr. par ampoule de 2 cc.

Doses et mode d'emploi. — 2 cuillerées de Granulé ou 4 comprimés : 2 fois par jour dans un peu d'eau ; ampoules, 2 cc. 3 fois par semaine.

Propriétés thérapeutiques. — Reminéralisateur physiologique. Ne fatigue pas l'estomac. Son emploi continu ne présente aucun inconvénient.

Indications. — Dans tous les cas de déminéralisation phosphorée et d'asthénie nerveuse.

Prix :

Comprimés : 14 francs. — *Granulés* : 13 fr. 50.

Ampoules : 15 francs.

Laboratoires ROBIN

13, rue de Poissy — PARIS.

GLYCOCARPINE

Éléments actifs. — Nitrate de pilocarpine (2 mmgr. par pilule) ou par X gouttes, associé à de faibles doses d'hamamélis et cimicifuga, et à 0,02 de caféine.

A. — Médication vaso-dilatatrice.

Céphalées et vertiges des artérioscléreux, Hypertension artérielle et ses conséquences, Troubles congestifs de la ménopause et de la puberté. Maladie de Raynaud, Claudication intermittente par spasme artériel, Angor par spasme des coronaires, Glaucome, Mouches volantes, Bourdonnements d'origine circulatoire (seulement).

B. — Troubles vago-sympathiques.

Insuffisance du vague, Freinage du sympathique, Asthme, Coqueluche, Basedow fruste, Pelade.

Mode d'emploi. — *Adultes* : 2 pilules ou XX gouttes au début des trois repas.

Echantillons sur demande :

C. DALIN, pharmacien de 1^{re} classe.

49, quai Saint-Vincent. — LYON.

GLYCO-LACTIMASE

Description. — Association symbiotique de bacille lactique Bulgare et de bacille glycobacter, en comprimés de 0 gr. 50, 40 comprimés par flacon.

Action thérapeutique. — Le bacille glycobacter transforme les matières amylacées en sucres et fournit par conséquent un milieu de culture éminemment favorable au bacille lactique, dont l'activité se trouve ainsi considérablement renforcée.

Indications. — 4 à 8 comprimés par jour, dans les intoxications intestinales, diarrhées, entérites, affections du foie.

Prix : 30 francs.

Laboratoires Ch. COUTURIEUX

18, avenue Hoche — PARIS.

GLYCO-M.

Composition. — Benzoate, Salicylate, Bicarbonate et Borate de soude, formant avec le Thymol une solution du Thymolate de soude (dose à 4 p. 100). Glycérine à 30° C. P. 17 p. 100. Menthol 0,04 p. 100. Essence de Gaultheria. Pinus et Eucalyptol, 0,06 p. 100.

Propriétés particulières. — Antiseptique, analgésique, alcalin et exosmotique, non toxique, non irritant, et non caustique. Par ses qualités désodorisantes, est d'une valeur incontestable dans l'ozène et la fétidité buccale.

Indications. — Dans le traitement des affections et infections de toutes les muqueuses. **Pharyngite, angine et laryngite** : 1 partie pour 2 d'eau chaude, en gargarismes ou pulvérisations. **Catarrhe, coryza, rhumes, fièvre des foins et végétations adénoïdes** : Une partie pour 3 d'eau chaude en lavages nasals au moyen de la pipette Kanar. **Gynécologie** : injections à 5 p. 100. Le soir en tampons saturés de GLYCO-M. pure à garder toute la nuit.

Gencives spongieuses et maladies buccales. — En bains de bouche prolongés, pure, en brassant toutes les parties de la bouche (pendant un quart d'heure). Au coucher, en tampon saturé, inséré entre les lèvres et la gencive, et à conserver toute la nuit.

A efficacité égale, l'antiseptique alcalin l'emporte sur l'antiseptique acide :

Par ses propriétés qui lui sont toutes particulières, la « GLYCO-M. » attire à travers les tissus les sécrétions congestionnées et enflammées, active la circulation du sang, et rétablit rapidement un état normal. Par sa réaction alcaline, elle s'harmonise avec les tissus traités, de sorte qu'elle n'irrite pas.

LA GLYCO-M. est un antiseptique alcalin non toxique et non irritant, Sa formule, basée sur la composition saline du sang, est approuvée par le Corps Médical et c'est lui seul qui a appris au public sa valeur dans le traitement de toutes les muqueuses.

Se vend dans toutes les Pharmacies :

En flacons de 100 grammes : 6 francs, modèle de poche.

En flacons de 200 grammes : 10 francs, modèle stilli-goutte.

En flacons de 500 grammes : 20 francs, demi-litre.

En bocaux de 3 litres : 90 francs, modèle familial.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des médicaments sous le N° 333-2.

**Laboratoire GLYCO-M., 3, avenue Lovvendal,
PARIS (VII^e).**

GLYCO-THYMOLINE

Selon la formule de KRESS et OWEN C^o.

Traitement des affections de toutes les muqueuses.

Composition :

| | | |
|--|--------|--------|
| Biborate de soude. | 2,010 | p. 100 |
| Thymol | 0.037 | — |
| Menthol..... | 0,037 | — |
| Acide benzoïque..... | 1,689 | — |
| Bicarbonate de soude.... | 2,346 | — |
| Cajeputol | 0,075 | — |
| Acide orthoxybenzoïque. | 0.074 | — |
| Huile de pin..... | 0,037 | — |
| Huile de bouleau..... | 0,030 | — |
| Glycérine, Colorant, Al- cool, Eau distillée..... | 93,665 | — |

Avantages. — La Glyco-Thymoline est une solution dont la formule a été scientifiquement étudiée et dont l'alcalinité et la composition saline ont été mises en harmonie avec l'alcalinité même du sang et des sécrétions muqueuses, ce qui lui permet de n'apporter aucun trouble dans l'équilibre humoral et de n'altérer en rien la vitalité des tissus.

Action thérapeutique. — Par son alcalinité et son pouvoir exosmotique la Glyco-Thymoline provoque un appel des sécrétions muqueuses et vide les culs-de-sac glandulaires de leur contenu vicié, rétablissant ainsi le fonctionnement physiologique des glandes congestionnées. Elle est dépourvue de toute toxicité, ne coagule pas les albumines, et ne produit aucune action irritante.

Indications. — *Voies digestives:* Catarrhe gastrique et intestinal; Fermentations,

Flatulence, Embarras gastrique, Maladies infectieuses, Entérite, Parasites intestinaux, Dysenterie.

Cavité buccale : Stomatite, Aphtes, Gingivite, Pyorrhée alvéolaire, Fluxion dentaire.

Pharynx et gorge : Angines, Pharyngite, Laryngite, Affections des voies respiratoires.

Voies nasales : Coryza aigu ou chronique, Rhinite, Rhume des Foins, Végétations adénoïdes, Sinusite.

Yeux : Conjonctivite, Blépharite ciliaire, Kératite, Granulations des paupières, Trachome, Ectropion.

Maladies de la peau : Erysipèle, Furonculose, Anthrax, Acné, Eczéma, Zona, Ulcères variqueux, Brûlures.

Rectum et région anale : Prurit anal et eczéma local, Hémorroïdes, Prostatite.

Gynécologie et Obstétrique : Pertes blanches, Vaginite, Ulcérations du col, Métrites, Salpingites, Suites de couches.

Plaies de toute nature.

Mode d'emploi. — a) Usage externe : à utiliser pure ou diluée dans 1 à 10 parties d'eau.

b) Usage interne : 1 cuillerée à café dans 1/4 de verre d'eau.

Prix :

| | |
|-------------------------------|-----------|
| 100 cc. | 6 francs. |
| 250 cc. | 12 — |
| 500 cc. | 20 — |
| Modèle Hôpital (3 litres).... | 90 — |

Remise spéciale au corps Médical.

Etablissements WEBER

A. GUILLAUME, Pharmacien

5 bis, rue des Haudriettes — PARIS (III^e).

GLYCTONE PHOSPHATÉE CHARRIÈRE

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 439-3, en vue de la possibilité de prescription aux Assurés sociaux.

Zomo-Chimiothérapie.

Nous réclamons près du Corps Médical le bénéfice de la priorité de l'idée et de la première application thérapeutique de la Zomochimiothérapie, ayant été les créateurs de cette association médicamenteuse et de sa mise commerciale à la disposition du médecin.

Forme. — Liquide.

Composition :

| | |
|-----------------------------|------------|
| Arséniate de soude | 5 centigr. |
| Glycérophosphate de soude. | 5 grammes. |
| Sulfate de strychnine | 8 milligr. |

Ferments musculaires, Corps Immunisants, Albuminoïdes spécifiques et Vitamines des muscles frais, Matériaux salins vitalisés phosphatiques, Hémoglobine du Plasma de bœuf additionné de sucres de cerise et de framboise, Saccharose, 500 cc.

Dose. — Après les repas :

Enfants : 1 à 6 cuillerées à café ou à dessert par jour suivant âge.

Adultes : 1 à 6 cuillerées à soupe pure ou non, de préférence dans de l'eau froide gazeuse ou du lait froid.

Indications :

Anémie, Chlorose, Convalescence, Post-opérations, Grossesse et Allaitement, Epuisement musculaire, Surmenage, Rachitisme, Tuberculose, Misère physiologique et Déchéances physiques carenciales. Post-hémorragies.

Contre-indications :

Albuminurie, Diabète et Artério-sclérose.

Prix :

Le flacon de 500 cc. : 35 fr.
Le 1/2 flacon de 250 cc. : 20 fr.
Sans impôt.

Laboratoires L. ARQUEVAUX ☞,
Pharmacien à ETAMPES (S.-et-O.).

GLYKOLAÏNE ROBIN

Association de la kola
aux glycérophosphates.

Granulé.

Dose et mode d'emploi :

1 à 2 cuillerées à café par repas.

Indications :

Stimulant du système nerveux, Surmenage, Névralgies, Neurasthénie.

Prix : 14 fr. 50.

Laboratoires ROBIN

13, rue de Poissy
PARIS.

GMET**(Extraits Gmet.)**

Extraits végétaux liquides concentrés sans alcool, ni sucre, ni éther, par le procédé spécial Gimbert qui permet d'obtenir une *extraction complète sans altérer la plante.*

Correspondent tous à 2 gr. de plante fraîche par cuillerée à café.

Se prescrivent tous : de 1 à 3 cuillerées à café par jour dans un peu d'eau, après ou entre les repas ou un peu avant.

Le Diurétique Gmet est prescrit par cuillerées à soupe.

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Boldo, v. page 414. | Kola. |
| Composé, v. page 531. | Piscidia. |
| Crataegus, v. p. 543. | Quinquina, v. p. 1289. |
| Frêne. | Sauge. |
| Fucus. | Ulmaire. |
| Gui, v. page 800. | Valériane, v. p. 1617. |
| Hamamelis, v. p. 808. | Viburnum. |
| Hydrastis. | Diurétique, v. p. 609. |
| Jugland. | Extrait Hamyd, v. page 691. |

Littérature sur chaque produit et échantillons sur demande adressée au :

Laboratoire GMET

27, faubourg Montmartre — PARIS (IX^e).

Tél. : Provence 43-10.

GOBILLETES HYPNOS

Lutte contre le bruit.

Mode d'action. — Obstruent le conduit auditif et permettent l'isolement des bruits extérieurs : sifflet et passage des trains, roulement et avertissement des automobiles, bruit des hôtels, passage des autobus, tramways, etc... Préviennent les effets funestes de notre vie trépidante et assourdissante sur le système nerveux.

Indications. — Assurent le repos des malades sans hypnotiques, suppriment tout bruit ; permettent de dormir malgré les vibrations sonores les plus intenses.

Indispensables aux nageurs, artilleurs, aviateurs, à tous ceux qui vivent au milieu du vacarme et sont exposés à la surdité.

Prix : 10 francs.

Laboratoires HYPNOS

CHABEUIL (Drôme).

Téléph. 14.

GOMENOL

Nom et marque déposés.

Essence provenant d'une variété sélectionnée de *Mélaleuca Viridiflora*.

GOMENOLEO et produits au GOMENOL

Propriétés. — Antiseptique, analgésique, anticatarrhal, désodorisant, hautement diffusible. Toxicité et causticité nulles.

Action thérapeutique et usages. — A l'intérieur, balsamique et anticatarrhal, convient spécialement aux affections chroniques des voies respiratoires (bronchites, tuberculose, etc.) et des voies urinaires (cystites, urétrites, etc.).

En injections intramusculaires (imprégnation gomenolée) dans toutes infections locales ou généralisées (septicémie, etc.).

A l'extérieur en inhalations et pulvérisations : coryzas, laryngites, bronchites, etc.

Pansements chirurgicaux : brûlures, plaies septiques, ulcères.

Multiples indications, nombreuses formes correspondant aux diverses applications :

Rhino-pharynx. — Gomenol-Rhino, Gomenoléo-Nasal Gomenoforme.

Gorge. — Gomenol-Pâtes, Gomenol-Sirop, Gomenoléo 10 p. 100 en injections trachéales.

Bronches, Poumons. — Gomenol-Capsules, Gomenoléo en injections intrapleurales (5 p. 100), intra-bronchiques (20 p. 100) et intra-musculaires (20 p. 100).

Intestin. — Gomenol-Glutinules, Gomenoléo 10 p. 100 et 20 p. 100 en lavements profonds, Gomenol-Rectal.

Rein, vessie. — Gomenol-Glutinules, Gomenoléo 10 p. 100 ou 20 p. 100 en instillations.

Plaies, brûlures. — Gomenol-Onguent, Gomenoléo 20 p. 100 ou 33 p. 100 en pansements ; eau Gomenolée pour lavages.

Gynécologie. — Eau Gomenolée, Gomenovules, Gomenoléos (pansements), Gomenol pur (attouchements).

Grande chirurgie. — Gomenol pur (champ opératoire), Gomenoléos (Imprégnation Gomenolée).

Présentations populaires :

Gomenoléo, petit flacon : 4 francs.

Gomenoléo, boîte 3 ampoules 5 cc. : 7 fr. 50.

Gomenoléo-Nasal, le tube : 4 francs.

Vaseline Gomenolée Prevet, le tube : 2 fr. 50.

Laboratoire du GOMENOL

François PREVET, Pharmacien.

48, rue des Petites-Ecuries — PARIS (X^e).

GONACRINE

Chlorure de 3-6 di-amino-10 méthyl-acridinium (sel neutre).

Antiseptique puissant très diffusible, peu toxique, non irritant. Action élective à l'égard du Gonocoque.

Indications. — Affections gonococciques et leurs complications, Septicémies, Fièvre ondulante (M. Melitensis).

Présentations : boîtes de 10 ampoules à 2 0/0
— 3 — 2 0/0
— 6 — 0,5 0/0

Posologie et mode d'emploi. — Lavages de l'urètre : solutions extemporanées de 1/8.000 à 1/1.000. Injections intraveineuses : ampoules de solution à 0,50 p. 100 et à 2 p. 100.

Pastilles de Gonacrine (boîtes de 40 pastilles) dosées à 0 gr. 003 par pastille destinées au traitement des stomatites, gingivites, amygdalites. Prévention des infections à porte d'entrée bucco-pharyngée.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

GONAGONE

**Vaccin antitoxique et antimicrobien, adopté
par les hôpitaux de Paris et de l'armée.**

Stock vaccin polymicrobien renfermant :

Corps microbiens + Lysat microbien + *Anatoxine*.

Indications. — *Toutes les infections génito-urinaires de l'homme et de la femme.*

Posologie. — Une injection sous-cutanée tous les 3 ou 4 jours, de 1/4 de cc. à 2 cc. progressivement.

Ovules au Gonagone pour pansements vaginaux (Modèle spécial pour enfants).

Prix : 6 ampoules, 40 francs; 6 ovules, 20 fr.

Produits Biologiques CARRION

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré — PARIS.

Tél. : Anjou 36-45. (2 lignes).

GONO-VACLYDUN ET GONARTHRI VACLYDUN

Lysats vaccins du Docteur Duchon.

Adoptés par les Hôpitaux de Paris.

GONO-VACLYDUN

Composition. — Gonocoques, Entérocoques, Colibacilles, Streptocoques et Saphylocoques.

Indications. — Urétrites, Complications de la blennorrhagie : Epididymite, Prostatite, etc.

Posologie. — En injections sous-cutanées, 3/4 de centicube le 1^{er} jour, ensuite injections quotidiennes de 1 centicube jusqu'à 12 injections, puis 1 cc. tous les 2 jours.

Présentation. — En boîte de 6 ampoules de 1 centicube.

GONARTHRI-VACLYDUN

Lysat de gonocoques.

Lysat vaccin riche en antigène, exclusivement destiné au traitement de toutes les formes du rhumatisme spécifiquement déterminé.

Prix : 25 francs.

Laboratoire Pharmaceutique CORBIERE

27, rue Desrenaudes — PARIS (XXII^e).

Tél. : Carnot 78-11.

GOSIERINE DALLOZ

Formule p. 100 :

| | |
|----------------------|------|
| Cocaïne..... | 0,05 |
| Menthol | 0,40 |
| Borate de soude..... | 4,00 |

Forme.

Dragées.

Propriétés. — Analgésiques, antiseptiques et antispasmodiques.

Action. — Antisepsie de la bouche et des voies respiratoires, soulagement immédiat et guérison des aphtes, gingivites, amygdalites, laryngites, angines, etc...

Doses. — 6 à 8 dragées par jour, pour les adultes.

La boîte : 6 fr. 25.

Laboratoire DALLOZ

13, boulevard de la Chapelle — PARIS.

GOUTTES BRONCHOPHILES ANDRÉ

Composition :

| | |
|-------------------|-----------|
| Codéïne | 0 cgr. 50 |
| Bromoforme | 3 cgr. 10 |
| Chloroforme | 2 cgr. |
| Gaiacol..... | 2 cgr. 60 |
| Eucalyptol..... | 1 cgr. |
| Terpinol | 5 cgr. 20 |

Pour une capsule.

Indications. — Toutes affections pulmonaires, toux, bronchites aiguës et chroniques, emphyseme, asthme, gripes.

Posologie. — 2 à 6 capsules par jour.

Prix : 11 francs.

Enregistré au Laboratoire National des Médicaments 556-6.

Laboratoires BADEL

58-60, rue des Moulins — VALENCE (Drôme).

GOUTTES DAYNOC

(Fébrifuge antiseptique).

Composition. — Cent grammes contiennent :

| | |
|--|----------|
| Oxyde de méthylène | 1 gr. |
| Huile essentielle d'ail naturelle..... | 0 gr. 05 |
| Para-Isopropylmétacrésol..... | 0 gr. 10 |

Indications. — Utilisé pour l'usage interne et l'usage externe.

1° *Usage interne.* — Bronchites récentes et chroniques, Tuberculose, Coqueluche, Fièvre paludéenne (Malaria), Troubles gastro-intestinaux.

Les GOUTTES DAYNOC sont précieuses pour le traitement des gazés de guerre.

2° *Usage externe.* — Infections de la bouche et de la gorge, Maladies de la peau, piqûres, morsures.

Doses moyennes. — *Adultes* : XL à L gouttes 3 fois par jour.

Enfants : XV à XX gouttes 3 fois par jour.

Nourrissons : I goutte par mois d'âge 3 fois par jour.

Prix : 21 fr. 20 (Impôt compris).

Laboratoires A. LEJEUNE

142, rue de Picpus — PARIS (XII^e).

GOUTTES DE SERÛ

Extrait total et concentré des galbules
de cupressus sempervirens.

Indications. — Vaso-constricteur et tonique puissant du système veineux. Spécifique *efficace sûr et constant* des varices, ulcères variqueux, périphlébites, *hémorroïdes*, varicocèles et des *troubles de la ménopause*.

Dose moyenne. — XXX gouttes avant chacun des deux principaux repas.

Prix au public : 10 francs.

LETTY

69, rue de Sèvres — PARIS.

GOUTTES ERYL

Composition — Erysimum, Aconit, Napel, Belladone, Euphorbe.

Caractéristiques. — Tolérance absolue, Effets rapides et surtout persistants. Pas d'accoutumance.

Indications. — Toux quinteuse, Coqueluche, Grippe, Adénopathie trachéo-bronchique, *Toux rebelles*.

Mode d'emploi :

Adultes : XL à LX gouttes dans un peu d'eau sucrée 5 à 6 fois par jour.

Enfants : XV à XXV gouttes dans un peu d'eau sucrée 3 à 4 fois par jour.

Prix : 15 francs.

Laboratoires J. BRESSIER

Docteur en Pharmacie

102, rue Vincent — MARSEILLE

Concessionnaires :

Les Laboratoires NOVALIS

OULLINS (Rhône).

GOUTTES « FLUVIA »

Le médicament de l'hypertension.

Composition. — Principes hypotenseurs extraits du *Rhamnus Alaternus* L.

Propriétés. — VEGETALES, ATOXIQUES, les GOUTTES FLUVIA ont une ACTION HYPOTENSIVE DURABLE CONTROLEE PHYSIOLOGIQUEMENT, AMELIORATION CONSIDERABLE DES TROUBLES FONCTIONNELS

Indications. — HYPERTENSION ARTERIELLE SIMPLE OU COMPLIQUEE D'INSUFFISANCE VENTRICULAIRE GAUCHE, D'INSUFFISANCE RENALE.

Dose moyenne. — XXX gouttes dans un peu d'eau avant chaque repas TROIS FOIS PAR JOUR pendant trois semaines.

Prix du flacon : 16 francs.

Pharmacie MARCEAU

7, avenue Marceau — PARIS (XVI^e).

GOUTTES HYPOTENSIVES FRAISSE

Composition. — 25 gouttes renferment :

| | |
|-----------------------|------|
| Extrait de Gui | 0,05 |
| Nitrite de Soude..... | 0,01 |

Indications. — Contre l'artériosclérose et l'hypertension artérielle.

Formes :

1^o *Gouttes* : 20 à 25 gouttes avant chaque repas.

2^o *Ampoules* : 1 ampoule tous les 2 jours dans la partie musculaire.

Prix : 14 francs.

Laboratoires FRAISSE

8, rue Jasmin — PARIS (XVI^e).

GOUTTES LECONTE

Composition. — Orthoformiate d'éthyle, Codéine, Teintures de Grindélia, Polygala, Aconit, Drosera, Belladone, Bryone.

Indications. — Toux spasmodiques, Grippe, Trachéite, Coqueluche.

Posologie :

Adultes : LX gouttes 5 à 6 fois par jour.

6 à 20 ans : XLV à L gouttes 5 fois par jour.

12 à 16 — : XXV à XL — 4 — — —

6 à 12 — : XV à XXV — 4 — — —

2 à 5 — : X à XII — 3 — — —

Echantillons sur demande.

Prix : 16 francs.

Laboratoires LECONTE

7, rue des Petits-Carreaux — PARIS (II^e).

Tél. : Louvre 53-16.

GOUTTES LINOBER

Indications. — Toux nerveuse, Trachéite, Pharyngite, Laryngite, Asthme, Coqueluche, Toux quinteuse des vieillards.

Formule :

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| β dichloroéthane | 0 gr. 02 |
| Propanone. | |
| Teinture de grindelia | } ââ q. s. pour L gouttes. |
| Teinture de drosera. | |
| Essence de Menthe. | q. s. pour aromatiser. |

Posologie :

Administrer 3 fois par 24 heures : à chaque fois :

Enfants : de 1 an à 2 ans, IV gouttes.
 de 2 ans à 3 ans, VI gouttes.
 de 3 ans à 4 ans, VIII gouttes.
 de 4 ans à 7 ans, XV gouttes.
 de 7 ans à 14 ans, XX gouttes.
 Au-dessus de 14 ans, XXX gouttes.
 Adultes, L gouttes.

Il s'agit de doses moyennes qui peuvent être augmentées ou même doublées sans aucun inconvénient, les gouttes Linober ne contenant aucune substance toxique.

Seules contre-indications : Diabète et Acétonurie.

Mode d'emploi. — Les Gouttes Linober doivent être prises de préférence en dehors des repas.

On peut les absorber directement sur 1 ou 2 morceaux de sucre, ou mieux, diluées dans un peu de liquide, sucré ou non (eau, infusions, etc...).

Prix : 12 francs.

Laboratoire OBERLIN,

17, rue Cadet — PARIS

J. TINARDON, Pharmacien de 1^{re} classe
 de la Faculté de Pharmacie de Paris.

GOUTTES LIVONIENNES DE TROUETTE-PERRET

Capsules de goudron de Norvège, de Créosote de Hêtre et de Baume de Tolu.

Indications. — Rhumes, toux, bronchites, catarrhes, tuberculose, maladies des voies respiratoires, antiseptie des voies digestives.

Le meilleur moyen de faire tolérer la créosote. Médicament préventif et curatif.

Doses et mode d'emploi. — 4 à 8 Gouttes Livoniennes de Trouette-Perret par jour *au milieu des repas*.

Bien spécifier : GOUTTES LIVONIENNES de TROUETTE-PERRET, pour éviter les contrefaçons.

Prix au public : 9 fr. 90.

Laboratoires TROUETTE-PERRET

61, avenue Philippe-Auguste,
PARIS (XI^e).

GOUTTES MAGALO

Composition. — Solution de chlorure de magnésium pur à 50 p. 100 super-activé par un sel de manganèse.

Mode d'action. — Médicament d'équilibre minéral, tonique, cholagogue; de goût agréable, bien supporté par l'estomac; la plus économique de toutes les préparations similaires.

Indications. — Affections du foie et de l'estomac, asthénies, verrues, cancer.

Prix : 15 francs.

Etablissements GOY

23, rue Beautreillis — PARIS (IV^e).

GOUTTES MALONE

Composition. — Allylisopropylmalonylurée, dans un solvant hydroglycériné.

Avantages. — Calmant certain et rapide de toutes les toux. Véritable spécifique de la Coqueluche. Non toxique, même pour les nourrissons. Goût agréable.

Indications. — Coqueluche, toutes les toux.

Posologie :

Doses minima :

Nourrissons : avant 6 mois, III gouttes toutes les 3 heures.

De 6 mois à 1 an : III gouttes toutes les 2 heures.

Enfants : de 1 à 2 ans : VI gouttes toutes les 2 heures.

— — 2 à 4 ans : IX — — —

— — 4 à 6 ans : XII — — —

— — 6 à 10 ans : XV — — —

Adultes : XX à XXX gouttes toutes les 2 heures.

Ces doses peuvent être doublées sans inconvénient.

Dans les *bronchites, toux nocturnes*, donner une potion expectorante dans la journée et le soir une seule dose massive de Gouttes Malone (XL à LXXX gouttes, chez les adultes, XV à XL gouttes chez les enfants suivant les résultats obtenus).

Prix : 15 francs.

Laboratoires du MALONE

ANCENIS (Loire-Inférieure).

GOUTTES NARKAY

Composition. — *Ether de Kay, Narcéïne, Bromoforme, Aconit, Belladone, Drosera, Grindélia.*

Indications thérapeutiques. — Véritable spécifique de la *Coqueluche*. Toux spasmodique et quinteuse, Asthme, Grippe, Hoquet persistant.

Mode d'emploi. — *Enfants :* au-dessous de 1 an : IV gouttes 2 fois par jour dans une cuillerée de sirop calmant.

De 1 à 2 ans : IV gouttes 3 fois par jour.

De 2 à 4 ans : V gouttes 4 fois par jour.

De 4 à 6 ans : VIII gouttes 4 fois par jour.

De 6 à 10 ans : X gouttes 4 fois par jour.

Au-dessus de 10 ans : XV gouttes 3 fois par jour.

Adultes et Vieillards : XV gouttes 4 fois par jour.

Prix : 12 francs.

Laboratoires SAUBA

MONTREUIL—PARIS

GOUTTES NICAN

(Sans sucre)

Composition. — *Bromoforme* et *Codéine* purs, *Aconit* *Belladone*, *Drosera*, *Grindélia*, *Benzoate de Soude*, *Eau de Laurier-cerise*.

(IV Gouttes = 1 goutte de *Bromoforme stabilisé*)

Caractéristiques. — Association synergique des principes médicamenteux reconnus les plus efficaces de la toux spasmodique, ramenés par un procédé spécial à un très faible volume et parfaitement dissous. La présentation par gouttes permet la précision du dosage clinique et fractionné à tous les âges, assure la continuité du traitement, et garantit contre les accidents dus à l'insolubilité du bromoforme.

Effet rapide et persistant, souvent surprenant. Tolérance parfaite.

Indications thérapeutiques. — *Toux spasmodique et quinteuse en général* ; *Coqueluche*, *Grippe*, *Toux des Tuberculeux*, *Asthme*, *Toux laryngées*, *Adénopathie trachéo-bronchique*, *Coryza*, *toux rebelles*. *Hoquet persistant*, *Dysménorrhée*, etc.

Mode d'emploi. — A absorber loin des repas dans une tasse de liquide tiède, eau, grog, ou lait (enfants) qu'on agitera en ajoutant les gouttes,

L'emploi, avec une tasse de lait tiède sucré, supprime en majeure partie le goût du bromoforme désagréable à certains malades.

Doses moyennes par jour en 4 fois :

Adultes : CCXL gouttes.

Enfants : XII gouttes par année d'âge.

Calme et repos immédiats, et dans les toux grippales, jugulation souvent en quelques heures.

Dans la COQUELUCHE, doses fractionnées et croissantes.

Médication permettant l'emploi du bromoforme chez les enfants en bas âge.

Doses initiales :

Adultes : CXX gouttes.

Enfants : VIII gouttes par année d'âge.

A prendre en 3-4 fois par jour, après une quinte. Augmenter progressivement pendant les huit premiers jours.

Consulter la posologie détaillée par âge, dans la notice jointe au flacon.

N. B. — En cas de recrudescence des quintes ou de somnolence accentuée, cas excessivement rares, interrompre le traitement pendant 24 heures. Puis continuer la progression ascendante, si nécessaire.

Prix : 16 francs.

Voir page **COMPRIMÉS NICAN** à base de dionine et benzoate de soude.

Échantillons et Littérature :

Laboratoires CANTIN à PALAISEAU (S.-et-O.)

GOUTTES PHOSPHOSTHÉNIQUES DAUSSE

Administration de la strychnine, par voie gastrique, à doses progressives, en association avec l'acide phosphorique officinal.

XX gouttes renferment :

1 milligramme. de sulfate de strychnine ;

III gouttes d'acide phosphorique officinal.

2 cgr. d'extrait de quina ;

2 cgr. d'extrait de Coca.

Indications. — Asthénie, atonie nerveuse, neurasthénie, adynamie des convalescents, dépression nerveuse, surmenage physique et intellectuel.

Posologie. — Débuter par X gouttes à chacun des deux principaux repas et progresser chaque jour de V gouttes. On suspendra le traitement à l'apparition des symptômes de saturation. On peut atteindre progressivement des doses de C et même CC gouttes par repas. *Eviter tout arrêt dans l'administration progressive du médicament.*

Prix : 14 francs.

Laboratoires DAUSSE

4, rue Aubriot — PARIS (IV^e).

GRAINS CÉPHALGIFUGES

AU JASMIN DE VIRGINIE

CURATIFS DES
NÉVRALGIES REBELLES

par
médication synergique organo-végétale

— COMPOSITION —

| | |
|--|----------|
| Poudre de racines de Gelsémium sempervirens..... | 0 gr. 05 |
| Poudre de racines d'Aconit napel..... | 0 gr. 01 |
| Poudre d'écorce de racines de Piscidia erythrina.... | 0 gr. 05 |
| Extrait mou de Quinquina jaune..... | 0 gr. 05 |
| Cholestérine pure..... | 0 gr. 01 |
| Poudre de Foie..... | 0 gr. 03 |
| Poudre de Rate..... | 0 gr. 02 |
| Extrait mou de Colombo..... | 0 gr. 01 |
| Extrait mou de Gentiane..... | 0 gr. 01 |
| Extrait mou de Quassia amara..... | 0 gr. 01 |

pour 1 pilule.

Enrobage soluble dans l'eau et le suc gastrique.

N. B. — Le Gelsémium sempervirens ou Jasmin de Virginie, arbuste grimpant à fleurs jaunes, surtout employé en Amérique contre les névralgies, est la base des « Grains Céphalgifuges ».

— INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES —

MAL DE TÊTE

(céphalalgies céphalée, migraine)

TOUTES NÉVRALGIES FACIALES

— Névralgies dentaires —

TOUTES AUTRES NÉVRALGIES

(intercostales, sciatiques, utéro-ovariennes)

NERVOSISME

RHUMATISME

RARES CONTRE-INDICATIONS

— MODE D'EMPLOI ET DOSES —

Les grains se prennent 1/2 heure avant les repas

DOSES MOYENNES POUR 24 HEURES

ADULTES : 1 grain 1/2 heure avant chacun des 3 repas (matin, midi et soir).

ADOLESCENTS : 1 grain 1/2 heure avant chacun des 2 principaux repas.

ENFANTS (au-dessus de 7 ans) : 1 grain 1/2 heure avant le repas du soir.

tous les jours pendant 2 à 3 semaines consécutives

Pour la durée du traitement, se conformer aux indications du Médecin.

— PRIX DE VENTE IMPOSÉ —

LE FLACON DE 60 GRAINS (Modèle unique) : 18 fr.

LABORATOIRES DU DOCTEUR L. DELALBRE

PRODUITS PHARMACEUTIQUES SPÉCIALISÉS

Opothérapie - Colloïdothérapie micellaire - Phytothérapie

DÉPOT GÉNÉRAL

2, R. CLAUDE MATRAT - 188Y-LES-MOULINEAUX (Seine)

Fabrication Française.

Téléph. : MICHELET 24-11.

G. R. LANG, Pharmacien de 1^{re} classe,

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

GRAINS D'ÉPHÉDRINE BÉRAL

Grains dosés à 1 cgr. d'Ephédrine naturelle par grain.

Les mieux appropriés à l'éphédrinothérapie fractionnée, notamment chez les intolérants et pour la prophylaxie des chocs thérapeutiques (injections arsenicales, sériques ou autres).

Posologie et mode d'emploi. — De 2 à 10 grains par jour : 1 grain toutes les 3 ou 4 heures, le jour et le lendemain de l'injection choquante.

Prescrire : GRAINS D'ÉPHÉDRINE BÉRAL, un flacon : Prix : 14 francs.

Laboratoires BÉRAL

194, rue de Rivoli — PARIS.

GRAINS DE VALS

Composition végétale et opothérapique.

Podophyllin 0,01.

Cascara et Bourdaine (extrait) ââ 0,025,

Belladone (extrait), 0,01

Bile 0,02 Erepsine 0,01, Entérokinase 0,01.

Dose et mode d'emploi. — 1 à 2 grains au repas du soir.

Propriétés thérapeutiques. — Laxatif régulateur de l'intestin ne donnant pas de coliques, pas d'accoutumance.

Indications. — Constipation, embarras gastrique ; les grains de Vals décongestionnent le foie et la vésicule biliaire.

Pas de contre-indications.

Prix, le flacon de 30 grains : 4 fr. 50.

Laboratoire H. NOGUÈS

7, rue Galvani — PARIS (XVII^e).

LES GRANIONS

Diastases métalliques de synthèse

Procédé E. FOUARD, D^r ès sciences.

Propriétés essentiellement nouvelles.

1^o Conservation indéfinie sans altération de l'état colloïdal et des propriétés thérapeutiques.

2^o Suppression de la réaction du choc.

Communications

Académie des sciences, 7 février 1927

Congrès de Lyon (avancement des sciences), 1926.

| Granions | | | La boîte |
|-----------------------------------|--|---|----------------------------|
| As | Tuberculoses, dermatoses, anémie, dénutrition, etc. | Ampoules de 2 cmc. voie buccale, inject. intramusculaires et intraveineuses. | 18 fr. |
| Argent simple et double | Infections générales locales. | Ampoules de 2 cmc. injections intramusculaires et intraveineuses. | 20 fr. |
| Cuivre | Cancer, angiocholites, cholécystites. | Ampoules de 2 cmc. voie buccale. | 18 fr. |
| Bismuth | Syphilis. | Ampoules de 2 cmc. injections intramusculaires et intraveineuses. | 20 fr. |
| Mercure | Syphilis. | id. | 18 fr. |
| Iode | Hypertension, rhumatismes, syphilis, tuberculose, etc. | En ampoules de 2 cmc. pour infections, en solution pour voie buccale. | 18 fr. 14 fr. |
| Soufre | Sciaticque, rhumatismes. | En flacon : voie buccale. | 25 fr. |
| Or simple et double | Tuberculose, infections générales, locales. | Ampoules de 2 cmc. injections intramusculaires et intraveineuses. | 25 fr. |
| Osmium, Magnésium, Uranium | Cancer | Ampoules de 2 cmc. injections intraveineuses, intramusculaires, voie buccale. | 25 fr. 18 fr. 25 fr. |

Littérature et échantillons sur demande :

Laboratoires FOUARD

61, rue G.-Lauriau — MONTREUIL (Seine)

F. GAUTIER, pharmacien.

Téléphone : Avron 01-42

GRANOXYL

Reconstituant bio-énergétique polyvalent.

Composition. — Iode, Tanin, Glycéro de manganèse et de chaux, Phosphore végétal, Arséniate de Strychnine.

Indications. — Troubles de croissance. Fatigue de l'adolescence. Décalcification. Anémie. Convalescence.

Deux Présentations :

Adultes : *Granoxyl Elixir*, 1 verre à liqueur avant chaque repas.

Enfants : *Granoxyl Granulé*, 1 cuillerée à café avant chaque repas.

Prix : 16 francs.

Docteur MARTINET

16, rue du Petit-Musc — PARIS.

GRANULÉ CABASSON

Reconstituant biologique rationnel.

Propriétés thérapeutiques. — Apporte aux organismes jeunes les principaux éléments constitutifs du squelette, du muscle et du plasma sanguin sous la forme la plus assimilable, et la plus agréable à croquer. Complète cette action minéralisatrice par des éléments stomachiques qui excitent l'appétit et favorisent l'assimilation.

Indications :

- 1° Croissance.
- 2° Maladies osseuses.
- 3° Grossesse et allaitement.
- 4° Surmenage physique et intellectuel ; convalescences.
- 5° Anorexies.

Composition. — Aucun élément toxique. *Aucune contre-indication.* (Magnésium, Calcium, Sodium, Potassium, Manganèse, Fer, Phosphore, Traces d'Iode).

Posologie. — Granulé à croquer.

Adultes : 2 cuillerées à café 1/4 d'heure avant chacun des 2 principaux repas, ou même au milieu des repas.

Enfants et vieillards : 1 cuillerée à café.

Prix : 15 francs.

Laboratoire des SPÉCIALITÉS CABASSON

A. GROS-CAVALIER, Pharmacien

183, rue de Rome — MARSEILLE.

GRANULÉ EDGÈS

Laxatif, désensibilisant.

Composition. — Hydrate de magnésie, lactose, citrate de soude, hyposulfite de magnésium.

Forme. — Granulé fondant, immédiatement soluble, d'un goût très agréable.

Propriétés. — Laxatif par tous ses éléments, désensibilisant par son hyposulfite de magnésium. Régularise à la longue les fonctions intestinales et hépatiques.

Avantages. — Facile et agréable à prendre. Action douce, toujours certaine. Ne provoque jamais de colique, pas plus que de congestion ou d'irritation hépatobiliaire.

Indications. — Constipation, Congestion du foie, Insuffisance biliaire, Manifestations anaphylactiques, Hépatisme.

Posologie. — 2 à 3 cuillerées à café par jour.

Prix : 12 francs.

Laboratoires STELVIA

Georges BLAQUE,

Docteur en pharmacie,

Licencié ès Sciences.

59, rue Boissière — PARIS (XVI^e).

GRANULES CHANTEAUD

(Anciennement Granules dosimétriques.)

Composition :

Granules au milligramme, centigramme, etc. de toute la gamme des produits chimiques, alcaloïdes et glucosides les plus fréquemment employés en thérapeutique.

Présentation :

Flacons de 50 Granules ou boîtes de 10 tubes contenant chacun 20 Granules.

Doses et mode d'emploi :

A définir et à indiquer par le médecin suivant chaque cas particulier.

Prix de vente boîte de 200 granules : 10 fr.

Laboratoires CHANTEAUD

J. LAURIN, Pharmacien.

3 et 5, rue Alexandre-Dumas
SAINT-OUEN (Seine).

GRANULES DES VOSGES

Composition. — Aconit, Drosera, feuilles Belladone, Cte Thébaïque et Dionine.

Indication. — TOUX, Picotements et Mucosités de la Gorge, Rhumes de cerveau, GRIPPE.

Médicament indispensable aux personnes qui, parlant beaucoup, se fatiguent et ont besoin d'un bon tonique des Bronches : Professeurs, Médecins, Avocats, Chanteurs.

Les « Granules des Vosges » sont d'une activité rapide et certaine et, étant d'un petit volume, il est toujours facile d'en avoir sur soi.

Posologie. — 2 granules le matin vers 9 heures, 2 l'après-midi vers 5 heures, 3 le soir en se couchant.

Ne pas en donner aux enfants au-dessous de 6 ans.

Prix : 9 fr. 90.

Laboratoire G. BERNHARD

11, rue Lafayette — PARIS (IX^e).

GRANULES PANTOFORT

du Docteur BOVEIL

Composé formé des plus énergiques stimulants, destiné à favoriser l'assimilation, à combattre la déminéralisation, le surmenage, la déchéance organique du système nerveux, la dépression générale.

Composition. — Nucléinate de Manganèse, Sulfate de Strychnine, Quassine cristallisée, Arséniate de soude.

Indications. — Surmenage physique ou intellectuel, asthénie, épuisement nerveux, lymphatisme, neurasthénie, suite de grippe, convalescence, état pré-tuberculeux.

Doses et mode d'emploi. — *Adultes* : 3 à 6 granules par jour, 1 ou 2 avant chacun des 3 repas. *Enfants* demi-dose.

Echantillon et littérature sur demande.

Prix : 12 fr. la boîte de 60 granules.

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle des médicaments sous le n° 346-3.

Marc PARIS, Pharmacien de 1^{re} classe.

1, rue Lassalle — LYON (La Boucle) (IV^e).

GRAVIDOSTYL

Sérum de jument gravide.

Indications. — Vomissements de la grossesse. Enfants prématurés. Déficiences hormonales.

Forme. — Boîte de 6 flacons-ampoules de 10 cc.

Posologie. — 1 à 2 ampoules par jour en ingestion ou en lavement.

Dans les cas graves : 2 ampoules en injection hypodermique.

Prix : 25 fr. la boîte.

Laboratoires du D^r ROUSSEL

97, rue de Vaugirard — PARIS (VI^e).

GRAVURAL

Composition. — Urotropine, tartrate de pipérazine, formiate, salicylate et benzoate de lithine.

Forme. — Granulé effervescent.

Indications. — 1^o Affections du foie, lithiase, constipation, tous troubles de la nutrition, arthritisme.

2^o Toutes affections du rein, de la vessie, de l'urètre : cystites, pyélonéphrites, lithiase.

3^o Goutte, obésité, rhumatismes, artério-sclérose.

Mode d'emploi. — 2 à 3 cuillerées à café par jour dans 1/2 verre d'eau, 1/2 heure avant ou 2 heures avant ou après les repas.

M. L. DURAND, Pharmacien de l'Institut

28, rue de Seine — PARIS (VI^e).

Echantillons sur demande :

Société d'Expansion Thérapeutique

46, Faubourg du Temple — PARIS (XI^e).

GUÉTHURAL

(Allophanate de Guéthol).

Forme. — Granulé.

Propriétés thérapeutiques. — Puissant modificateur des sécrétions bronchiques, ni caustique, ni irritant. Calme la toux.

Indications thérapeutiques. — Toutes les affections pulmonaires à hypersécrétions. Bronchites, Bronchorrhées, Catarrhes, Grippe, etc.

Mode d'emploi. — 3 à 4 cuillerées à café, prises dans l'intervalle des repas, dans un peu d'eau, ou croquées tout simplement.

Enfants : demi-doses.

Prix : 16 fr. 50.

Laboratoires PÉPIN ET LEBOUcq
COURBEVOIE (Seine). Tél. : Défense 09-71.

GUI BYLA

(Vaso-dilatateur, antiscléreux,
antihémorragique).

Contient l'alcaloïde, les saponines et l'inosite du gui.

Propriétés thérapeutiques. — Hypotenseur par action centrale sur les vaso-dilatateurs. Dépresseur de l'excitabilité exagérée. Toni-cardiaque par action myocardique. Diurétique par action cardio-rénale.

Indications. — Artério-sclérose, hypertension, cardiopathies artérielles, albuminurie, néphrosclérose, éclampsie, hémoptysies, hémorragies, ménorragies, épistaxis, migraines.

Mode d'emploi. — 3 cuillerées à café par jour.

Prix : 16 francs.

Les Établissements BYLA

26, avenue de l'Observatoire — PARIS.

GUI GMET

Liquide sans alcool ni éther.

Composition. — Extrait *total* du viscum album sous forme liquide ; mieux assimilable que les pilules. Correspond à 2 gr. de plante fraîche par cuillerée à café.

Propriétés. — Régulateur cardiaque et artériel, Hypotenseur, Diurétique, Vaso-dilatateur.

Indications. — Hypertensions, Cardiopathies artérielles, Artério-sclérose, Anévrysmes, Hémoptysies, Hémorragies, Eclampsie (dans la grossesse fait baisser l'albuminurie).

Posologie. — 1 à 3 cuillerées à café, 1 ou 2 fois par jour, entre les repas.

Prix : 18 francs

Laboratoire GMET

27, faubourg Montmartre — PARIS (IX^e).

GUIGOZ (Lait en Poudre)

Préparé avec le lait de la Gruyère (Suisse) est livré sous trois formes :

Lait complet : Lait demi-écrémé ; Lait complètement écrémé.

Traité par un procédé tout à fait spécial, dans le vide, à une température de 50°, **conserve indiscutablement toutes ses vitamines** et dispense de l'adjonction de jus de fruits. C'est un lait vivant. Par sa coagulation légère, facilement fragmentable, par son extrême digestibilité, il se rapproche du lait maternel.

Indications. — *Pour nourrissons.* — Diététique idéale des bébés privés, partiellement ou totalement du lait maternel. Athrepsie, dyspepsies, diarrhées, coliques, gastro-entérites, hypotrophies, réalimentation, vomissements.

Pour les adultes : Intolérances lactées. — Affection du foie et de l'estomac. Alimentation post-opératoire. Suralimentation.

Doses. — Une partie (en poids) de Lait GUIGOZ pour 6 parties d'eau tiède bouillie. Ne pas ajouter de sucre.

Soupe de babeurre GUIGOZ en poudre. Voir : Babeurre GUIGOZ, page 348.

Littérature et échantillons

LE LAIT GUIGOZ

19, rue Jean-Jacques-Rousseau — PARIS (1^{er}).

Tél. : Gutenberg 73-00.

GUIMELINDE

(Gouttes hypotensives.)

Composition. — Extraits fluides de gui, d'aubépine, d'hamamélis et de marrons d'Inde associés au nitrite de soude.

Propriétés. — Hypotenseur, par action centrale sur les vaso-dilatateurs, action due au gui, à l'aubépine et au nitrite de soude rendu stable par un procédé spécial.

Indications. — Artériosclérose, Hypertension artérielle, Etats congestifs, Vertiges, Bourdonnements, Troubles de la circulation du sang. Toutes affections du système veineux, Phlébites, Varices, Hémorroïdes.

Posologie. — XX gouttes, 2 fois par jour, dans un peu d'eau, avant le repas. Ces XX gouttes contiennent 1 cgr. de nitrite de soude et correspondent à 0 gr. 10 de plantes sèches.

Laboratoire de la GUIMELINDE

A. VERGER, Pharmacien
ANCENIS (Loire-Inférieure).

GUIPSINE

Principes utiles du Gui.

Indications thérapeutiques. — Véritable régulateur du travail du cœur et de la circulation générale, non vaso-constricteur.

Médication hypotensive. — Hypertension, Artério-sclérose, Hémoptysie, Goutte, Troubles de la Ménopause (Spécifique). Néphro-sclérose, Prostatisme.

Doses et mode d'emploi. — Pilules à 0,05 : 4 à 10 par jour entre les repas.

Ampoules à 0,05 : 1 ou 2 injections par jour (réservées aux cas d'urgence).

Prix de vente au public : 18 fr.

Laboratoires du D^r M. LEPRINCE

62, rue de la Tour — PARIS (XVI^e)

GUILOSE

Hypotenseur végétal aux principes actifs du *Viscum album*.

Forme et dosage. — Pilules dosées à 0 gr. 05.

Posologie. — 4 à 8 pilules par jour entre les repas.

Indications. — Artériosclérose, hémoptysie, goutte, troubles de la ménopause, néphrosclérose.

Prix. — L'étui de 60 pilules : 10 francs

Echantillons et vente en gros :

H. PERRIN-BRUNO

4, rue Désirée — LYON

J. MURARD, Pharmacien.

GUTTOLÉOL

Huile antiseptique à 2 p. 100, à base d'eucalyptol et de citron.

S'emploie facilement chez l'enfant, en raison de l'huile de citron, qui lui confère, outre ses propriétés antiseptiques, une odeur agréable.

Indications. — Rhinites, Adénoïdites, Coryzas, Grippe, Otites, Rhinopharyngites, Sinusites, Laryngites, Trachéites.

S'emploie en injections intratrachéales.

| | |
|----------------------------|---------------|
| Nourrissons : II gouttes | } dans chaque |
| Enfants : III à IV gouttes | |
| Adultes : V à VI gouttes | |
| | narine 3 fois |
| | par jour. |

Pulvérisations.

Laboratoires MAIRE, pharmacien,
171, rue de Belleville. — PARIS.

GYNARSOL

Poudre antiseptique spécialement créée pour l'hygiène intime de la femme et le traitement des affections génitales.

Composition :

| | |
|--|----------|
| Sel sodique de l'acide acétyl metaamino paraoxyphényl arsé- nique..... | 0 gr. 01 |
| Nitrate de Potasse | 0 gr. 01 |
| Chlorate de Potasse | 0 gr. 10 |
| Chloramine T..... | 0 gr. 05 |
| Bicarbonate de Soude Q. S. ... | 7 gr. |

Indications. — Hygiène journalière de la femme.
Leucorrhée, Vaginite, Métrite, Salpingite.

Mode d'emploi. — Pour injections vaginales, un sachet par litre d'eau.

Pour lavages externes un sachet pour 2 litres d'eau.

La boîte de 30 sachets : 8 fr. 75.

Laboratoire du Docteur MARTINET

16, rue du Petit-Musc — PARIS (IV^e).

GYNÉCO VACLYDUN

Lysat vaccin du Docteur DUCHON

Composition. — Entérocoques, Diplocoques de NEISSER, Colibacilles, Streptocoques et Staphylocoques.

Indications. — Infections communes des organes génito-urinaires, Métrites aiguës, Métrites chroniques, même anciennes, Complications annexielles ou péri-utérines.

Posologie. — En injections sous-cutanées quotidiennes de 1 cc. pour débiter, passer progressivement à la dose de 2 cc. Réduire à 2 cc. tous les 2 jours lorsque l'amélioration clinique sera très franche.

Présentation. — En boîte de 6 ampoules de 2 cc.

Prix : 25 francs.

Laboratoires pharmaceutiques CORBIERE

27, rue Desrenaudes — PARIS

Tél. : Carnot 78-11.

GYNERGÈNE « SANDOZ »

Adopté par les Hôpitaux de Paris.

Composition. — Tartrate de l'Ergotamine cristallisée ($C^{22} H^{26} N^6 O^8$), principal alcaloïde isolé de l'ergot de seigle et principe actif spécifique. Produit pur, exactement dosable.

Formes. — Ampoules : 1 cc. d'une solution à 1/2 pour mille de tartrate d'ergotamine pour injections intramusculaires et sous-cutanées. — Solution à 1 p. 1000, usage interne. — Comprimés dosés à 1 mgr. de tartrate d'ergotamine.

Propriétés thérapeutiques. — Le Gynergène Sandoz est le plus puissant des hémostatiques utérins et le sédatif du sympathique. Effets constants.

Indications. — Toutes hémorragies utérines. Atonie de l'utérus. Cancer et Fibrome. — Les sympathicotomies. Migraines, Basedow, Tachycardies, Atonie gastrique.

Posologie. — 1/4 de cc. à 1 amp. par jour. XV à XXX gouttes ou 1 à 2 comprimés 2 fois par jour.

Prix :

Ampoules de 1 cc., la boîte de 3 : 8 francs.

Solution : 18 francs. — Comprimés : 15 francs.

PRODUITS SANDOZ

20, rue Vernier — PARIS (XVII^e)

GYNOCALCION

Forme M. — Traitement rationnel des troubles de la Ménopause naturelle, chirurgicale ou radiothérapique chez la femme, de la sclérose-utérine.

Forme P. — Traitement des accidents de la Puberté chez la jeune fille.

Propriétés. — Agit sur le tonus du système vago-sympathique par son lactate de calcium et de manganèse ; agit par son phosphore sur l'élément douleur ; supplée à la déficience glandulaire par ses extraits opothérapiques (extrait ovarien et orchitique).

Le *Gynocalcion P* agit en outre par son Hypophyse (lobe antérieur) sur le développement général et le fonctionnement ovarien de la jeune fille.

Doses. — *Gynocalcion M.* — 10 à 12 dragées par jour, huit à dix jours par mois. Dans les formes rebelles, et surtout dans les ménopauses chirurgicales, deux séries par mois séparées par un repos de huit jours.

Gynocalcion P. — 10 à 12 dragées par 24 heures en série de dix jours par mois.

Effet rapide. Tolérance parfaite.

Prix : 22 francs.

Echantillons, Littérature :

LABORATOIRES CORTIAL

7, rue de l'Armorique — PARIS

GYNOESTRYL

Folliculine cristallisée du Dr Roussel.

Chimiquement pure, strictement conforme à l'étalon type constitué pour la fixation de l'unité internationale de l'Hormone oestrogène.

Thérapeutique hormonale de la femme. — Troubles de la menstruation, de la puberté, de la ménopause naturelle et artificielle. Incidents de la grossesse. Favorise la croissance des prématurés.

Voie buccale. — A l'état de DI-HYDRO-FOLLICULINE assimilable à 100 p. 100.

1° Comprimé dosé à 1/40 de mgr. d'hormone cristallisée, soit 250 Unités internationales. Boîtes de 40 comprimés (10.000 U. I.).

2° Solution hydro-alcoolique en flacons de 10 cc. contenant 1 mgr. d'hormone cristallisée, 50 gouttes (1 cc.) correspondent à 1.000 Unités internationales.

Posologie. — 2 à 4 comprimés ou 25 à 50 gouttes par jour. Commencer la cure 6 à 7 jours après la fin ou l'époque présumée des règles et la cesser une semaine avant l'apparition des règles suivantes.

Le GYNOESTRYL doit être administré en 3 ou 4 prises aussi bien au moment des repas que loin de ceux-ci. Le comprimé peut être croqué.

La boîte de 40 comprimés. Le flacon de 10 cc. Prix au public : 18 francs.

Laboratoires du Docteur ROUSSEL

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI^e).

GYNOESTRYL

Folliculine cristallisée du Docteur Roussel

Chimiquement pure, strictement conforme à l'étalon type constitué pour la fixation de l'Unité internationale de l'hormone oestrogène.

Thérapeutique hormonale de la femme. — Troubles de la menstruation, de la puberté, de la ménopause naturelle et artificielle. Incidents de la grossesse.

Voie Intramusculaire. — 1° Solution huileuse de Folliculine cristallisée titrée à 1/10 de mgr. d'hormone soit 1.000 unités internationales par ampoule de 1 cc. — Boîte de 6 ampoules.

2° Solution huileuse de benzoate de Folliculine cristallisée (**Benzo-Gynœstryl**) titrée à 1 mgr. d'hormone, soit 10.000 unités internationales par cc. Boîte de 2 ampoules.

Posologie. — 1° Folliculine cristallisée : Une ampoule (1000 U. I.) tous les deux jours. La cure sera commencée 6 à 7 jours après la fin ou l'époque présumée des règles et cessée une semaine avant l'apparition des règles suivantes s'il s'agit de troubles de la menstruation ou d'incidents survenant au cours de la ménopause naturelle.

Contre les vomissements de la grossesse ou les accidents aigus liés à la carence hormonale totale : une injection par jour.

2° **Benzo-Gynœstryl.** (Benzoate de Folliculine) 10.000 U. I. Une à deux injections par mois.

Prix au public :

La boîte de six ampoules : 20 francs.

Benzo-Gynœstryl. — La boîte de deux ampoules : 40 francs.

Laboratoires du Docteur ROUSSEL

89, rue du Cherche-Midi, — PARIS (6^e).

HAMA-CITRO

Médication vasculaire.

Stases veineuses, Varices, Hémorroïdes,
Phlébites, États congestifs.

3 composants actifs :

Citrate de soude (acide et basique).

Extrait d'Hamamélis.

Intrait de Marron d'Inde.

Granulé soluble et aromatisé agréable au goût. 1 cuillerée à café dans 1/2 verre d'eau 2 fois par jour.

La boîte : 14 francs.

Laboratoire PHYTALIA

47, boulevard Saint-Michel — PARIS

HAMAMÉLINE ROYA

Principe actif aromatique de
l'Hamamelis virginica, en solution aqueuse.

Obtenue directement de la plante, contient en dilution convenable (20 cgr. p. cuil. à soupe) l'Huile Essentielle aromatique, véritable principe actif de la plante, à l'exclusion de l'extractif, inerte au point de vue vasculaire.

Propriétés. — Vaso-constricteur, Tonique des fibres lisses, Sédatif vasculaire, Stimulant circulatoire.

Indications. — Toutes les dilatations, congestions et inflammations veineuses (Varices, varicocèles, hémorroïdes, phlébites aiguës et anciennes). Troubles circulatoires utérins (Ménorragies, Dysménorrhée, Accidents congestifs de la Ménopause).

Dose. — Par cuill. à soupe, 2 à 4 par jour, aux repas ou en dehors des repas.

Prix : 18 francs.

Pierre ALEXANDRE, Pharmacien

41, rue de Rome — PARIS (VIII^e). — Lab. 08-00.

HAMAMÉLIODE

Combinaison stable et définie de l'iode métalloïdique aux principes totaux de l'*Hamamelis Virginica*.

Indications. — Maladies du système vasculaire,

Varices, Phlébite.

Hémorroïdes.

Troubles congestifs de la Ménopause, Artério-sclérose.

Rhumatisme chronique.

1° Gouttes concentrées : de XXX à XL gouttes par 24 heures, et même progressivement jusqu'à C gouttes, suivant les cas.

Prix : 12 fr. 75

2° Élixir (Préparation très agréable au goût). 2 à 3 cuillerées à soupe dans les 24 heures, de préférence à la fin des repas.

Prix : 16 francs.

Laboratoire OBERLIN

J. Tinardon,

Pharmacien de 1^{re} classe
de la Faculté de Pharmacie de Paris,
17, rue Cadet — PARIS.

HAMAMELIS GMET

Composition :

Extrait total, liquide et sans alcool de l'hamamelis virginica, correspondant à 2 gr. de plante fraîche par cuillerée à café.

Propriétés :

L'absence d'alcool conserve à notre préparation toutes les propriétés décongestives de la feuille d'hamamelis, tandis que les préparations alcoolisées ont une activité restreinte. L'Hamamelis Gmet agit sur les fibres lisses de la paroi veineuse qu'il tonifie. (Plus actif que les cachets de poudre et les comprimés, peu actifs et indigestes.)

Indications :

Toutes les dilatations et inflammations veineuses, varices, hémorroïdes, varicocèle, phlébites, conjonctivites, angines congestives, fibromes, prostatites, varicosités du nez et du visage. Accidents de la puberté, de la menstruation et de la ménopause. Vertiges, bourdonnements, bouffées de chaleur après les repas. Varices au cours de la grossesse, etc.

Posologie :

1 cuillerée à café dans un peu d'eau froide avant le repas, une ou deux fois par jour. Hémorragies (fibromes) une cuillerée à soupe trois fois par jour dans une tasse d'eau froide. Lavements. Applications locales. Gargarismes.

Prix : le flacon pour 1 mois, 16 francs.

Laboratoire GMET

27, faubourg Montmartre — PARIS (IX^e).

HAMAMELIS GRANDVAL

Forme et Composition. — Gouttes renfermant sous le plus petit volume l'activité complète de la feuille d'Hamamelis traitée de façon à fournir un produit soluble dans l'eau, possédant l'arome tout spécial de la plante et d'une activité incomparable dans tous les cas de :

Indications. — Varices. — Hémorroïdes. — Ulcères variqueux. — Métrites. — Accidents du retour d'âge. — Hémorragies. — Œdème chronique. — Congestions, etc., etc.

Dose. — XXX à XL gouttes avant chaque repas, 2 ou 3 fois par jour. — Dans les cas aigus, on pourra doubler la dose sans inconvénient, pendant quelques jours.

Le 1/2 flacon : 6 fr. — Le flacon : 11 fr.
(Toutes pharmacies.)

Laboratoires GRANDVAL

12-14, rue Féry — REIMS.

HECTARGYRE

Spécifique de la Syphilis.

Indications. — Syphilis, Paludisme.

Formes. — Ampoules A, Ampoules B, Gouttes, Pilules.

Posologie. — *Adultes* : 15 ampoules pour une cure ou 2 pilules par jour pendant 15 jours, ou XL gouttes par jour pendant les 4 premiers jours ; ensuite LX ou LXXX pendant 15 jours.

Enfants : Moitié doses.

Prix : Gouttes, pilules, ampoules A : 13 francs.
Ampoules B : 15 francs.

Établissements MOUNEYRAT

12, rue du Chemin-Vert
à VILLENEUVE-LA-GARENNE
près Saint-Denis (Seine).

HECTINE

Spécifique de la Syphilis
et succédané du cacodylate de soude.

Indications. — Syphilis, Paludisme, Fièvre des Foins, Tuberculose, Anémie.

Formes. — Ampoules A, Ampoules B, Gouttes, Pilules.

Posologie. — *Adultes* : 15 ampoules pour une cure ou 2 pilules par jour pendant 15 jours, ou LX gouttes par jour les 4 premiers jours, ensuite LXXX gouttes pendant 15 jours.

Enfants : Moitié doses.

Prix : Pilules, gouttes, ampoules A : 13 francs.

Ampoules B : 15 francs.

Établissements MOUNEYRAT

12, rue du Chemin-Vert

à VILLENEUVE-LA-GARENNE

près Saint-Denis (Seine)

HÉMAGÈNE TAILLEUR

Règle les règles et supprime la douleur.

Forme. — Dragées.

Composition. — Methylnonylcétone, Folliculine et principes vaso-dilatateurs.

Propriétés thérapeutiques. — Calmant immédiat des douleurs les plus vives de la dysménorrhée, régulateur du flux sanguin.

Indications et posologie.

1° **DYSMENORRHEE** : 2 dragées dès l'apparition des douleurs ; une demi-heure après : deux autres. Maximum : 8.

2° **AMENORRHEE et MENOPAUSE** : 4 à 6 dragées par jour.

3° **COLIQUES POST-PARTUM** : 2 dragées par heure. Maximum : 10.

Petit flacon de 12 dragées : 8 fr.

Grand flacon de 30 dragées : 15 fr.

Laboratoire SEVENET

10, rue Le Chapelais — PARIS (XVII^e).

HÉMAGÉNINE GIRAUD

Médication iodo-arsenicale
phosphorée-strychnique.

Doses et mode d'emploi. — Doses ascendantes et descendantes indiquées sur chaque flacon.

Propriétés thérapeutiques. — Lymphatisme. Adénopathie, Rachitisme, Anémie. Toutes maladies consomptives. Convalescences.

Tonique puissant, antiscrofuleux.

Prix : 15 francs.

Eugène PETIT

Pharmacien de 1^{re} classe
Ex-interne des Hôpitaux de Paris
ARGENTEUIL (Seine-et-Oise)

HÉMATOÉTHYROIDINE

Composition. — Sang d'animaux éthyroïdés mélangé à parties égales avec de la glycérine chimiquement pure.

Forme. — Liquide. Comprimés dosés à 0,50 et correspondant à une cuillerée à café du produit liquide.

Indications. — Goitre exophtalmique, Hyperthyroïdie, Troubles d'excitation nerveuse, Insomnie, Hémophilie.

Mode d'emploi. — 2 à 6 cuillerées à café par jour avant les repas ou 2 à 6 comprimés au moment des repas.

Le flacon. Prix : 30 francs.

Comprimés. Prix : 18 francs.

Produits biologiques CARRION

L. CUNY, Docteur en Pharmacie.

54, faubourg Saint-Honoré — PARIS (VIII^e).
Tél. : Anjou 36-45 (2 lignes groupées.)

HEMATO-IODINE

États lymphatiques et anémiques,
Adénites chroniques.

La boîte de 36 cachets :
15 francs, prix public.

Le tube de granulés :
15 francs, prix public.

Laboratoires STÉNÉ

2, place des Vosges
PARIS (IV^e).

HÉMOANTITOXINE « SOFOS »

de l'Institut du P^r E. Maragliano

Composition. — Sang de bœuf immunisé contre la tuberculose, contenant 20 p. 100 d'antitoxine Maragliano 25 p. 100
Alcool 14 —
Glycérine 10 —
Eau aromatique 51 —

Indications. — Reconstituant spécifique du sang. Remède contre le rachitisme et la scrofule. Préventif immunisant dans la prébacillose. Traitement spécifique de la tuberculose.

Formes et Posologie. — *Simple* : adultes : une cuillerée à potage quatre fois par jour (avant les repas). *Enfants* : une cuillerée à café quatre fois par jour (avant les repas.)

Triple : mêmes doses (s'emploie dans les périodes fébriles). Se prend pure ou mélangée avec de l'eau alcaline ou avec du sirop.

Prix : 20 francs.

Echantillons et vente en gros : H. PERRIN-BRUNO
4, rue Désirée — LYON.
MURARD, Pharmacien.

HÉMOCALCINE

Composition. — A base d'extrait de foie intégral inaltérable et métaux ferments, associés à la magnésie et au calcium à l'état de glycérophosphates avec 1/2 mmgr. de strychnine; sans arséniaux intolérés, sans vitamines périssables.

Propriétés thérapeutiques. — Donne un pH favorable à la fixation phospho-minérale. N'entraîne pas de constipation.

Indications. — Anémie, Asthénie, Puberté, Dénutrition, Dépressions nerveuses et toxiques.

Formes et mode d'emploi. — Petits cachets friables, instantanément dissociés.

Un cachet (avant le repas) de 8 à 15 ans.

2 à 3 cachets (avant le repas) pour les adultes.

En cas de contre-indication, formuler : HÉMO-CALCINE sans strychnine.

Prix : 15 francs.

Ne contient pas de notice intérieure.

Laboratoires FERCOCQ

Licencié ès sciences
SAINT-MAUR (Seine).

HÉMOCALCIOPECTINE

L'Hémostatique rationnel.

Solution antihémorragique de Pectine
et de Chlorure de Calcium.

Inaltérable. Non toxique. Non anaphylactisante.

Indications thérapeutiques. — Toutes les hémorragies, Epistaxis, Hémoptysies, Hémorragies gastriques et intestinales, rénales, vésicales, utérines, Hémophilie, Hémorragies opératoires et post-opératoires.

Présentation. — Ampoules buvables de 10 cc. Boîtes de 3 et 6 ampoules.

Mode d'emploi. — De 1 à 6 ampoules par 24 heures dans de l'eau sucrée ou un jus de citron.

Boîte de 6 ampoules. Prix : 25 francs ;

Boîte de 3 ampoules. Prix : 15 francs.

Dépôt général :

Pharmacie J. ROBERT

J. BOUDIER, Successeur,

Pharmacien de 1^{re} classe

Ex-préparateur à la Faculté de Médecine

37, rue de Bourgogne — PARIS.

Tél. : Littré 64-53.

HÉMO-CYTO-SÉRUM

CORBIÈRE

Composition. — Soluté de cacodylate de sodium chimiquement pur, fer et strychnine.

Mode d'emploi. — Une injection intramusculaire tous les jours ou tous les deux jours.

Action. — Multiplie les globules rouges, accroît la valeur globulaire.

Indications. — Anémies de toutes origines. Convalescences, Chlorose, Surmenage, Troubles de la croissance et de la puberté.

Présentation. — Hémo-Cyto-Sérum pour adultes, 12 ampoules de 5 centicubes.

Prix : 21 francs.

Hémo-Cyto-Sérum infantile, 12 ampoules de 2 centicubes.

Prix : 15 francs.

Laboratoires Pharmaceutiques

CORBIÈRE

27, rue Desrenaudes — PARIS. Tél. : Carnot 78-11.

HÉMODUCTYL

Pilules ou Solution.

Extraits d'hamamelis, cupressus, marron d'Inde stabilisé, boldo et condurango associés aux extraits de gui et d'aubépine.

Dose moyenne. — 2 pilules, 1 cuillerée à café de solution, matin, midi et soir, avant les repas.

Indications. — Ménopause, Dysménorrhées douloureuses, Varices et Hémorroïdes, Hypertension, Bourdonnements d'oreilles.

Pilules. Prix : 14 francs.

Solution. Prix : 15 francs.

Laboratoires LICARDY

38, boulevard Bourdon — NEUILLY-PARIS

Téléphone : Maillot 17-75.

HEMOFER

(Cachets.)

Reconstituant général.

Formules. — Nucléinate de manganèse, Protoxalate de fer, Surrénine, Phosphure de zinc, Arrhéнал, Hémoglobine, associés aux sels de chaux et aux amers.

Indications. — Anémie, Amaigrissement, Grossesse, Allaitement, États prétuberculeux, Manque d'appétit.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 653-1.

Prix : 20 francs.

Laboratoire LOBRY

6, rue Parrot — PARIS (XII^e).

HÉMOFLUIDOL

(Dragées)

Fluidifie le sang.

Chaque dragée contient :

Silicate de soude..... 0 gr. 05

Citrate de soude 0 gr. 15

Artériosclérose

Hypertension

Troubles circulatoires

Deux dragées matin et soir avant le repas

Prix : 20 francs.

Laboratoire LÉONARDON

Docteur en Pharmacie, Arcachon.

Dépositaire général : O. C. P. Paris.

HÉMOGÉNOL DAUSSE

Sérum hémopoïétique de cheval.

Formes. — *Ampoules d'Hémogénol* contenant 10 cc. de sérum liquide.

Sirop d'Hémogénol à base de sérum hémopoïétique.

Dragées d'Hémogénol contenant chacune 0 gr. 15 de sérum hémopoïétique desséché, enrobé dans le gluten.

Indications. — Tous les états d'*adynamie* et toutes les *cachexies*. Puissant stimulant de l'hémopoïèse, particulièrement indiqué dans le traitement des *anémies*. Hémostatique énergique, recommandé dans les affections hémorragiques et l'*hémophilie*.

Mode d'emploi. — *Ampoules d'Hémogénol.* — 1 à 3 ampoules par jour prises par la bouche dans un peu d'eau sucrée ou en lavements.

Dragées d'Hémogénol. — Avaler, sans croquer, 4 à 6 dragées par jour.

Sirop d'Hémogénol. — *Enfants* : 3 à 6 cuillerées à café par jour. — *Adultes* : 3 cuillerées à soupe par jour.

Prix :

Ampoules : 18 fr. — *Dragées* : 15 fr. — *Sirops* : 15 fr.

Laboratoires DAUSSE

4, rue Aubriot — PARIS (IV^e).

HÉMOGLOBINE DESCHIENS

OPOTHÉRAPIE HÉMATIQUE TOTALE

Médication rationnelle des syndromes anémiques.

Nature. — Le sirop de DESCHIENS à l'Hémoglobine contient :

- 1° Une hémoglobine physiologique, préparée à froid, sans traumatisme histologique, physique ou chimique ;
- 2° Les substances minimales globulaires intactes ;
- 3° Les substances minimales du plasma non altérées.

Ces éléments sont incorporés à un excipient dosé avec soin, sorte de sérum aseptique où leur vitalité persiste.

Action :

- 1° Apport d'hémoglobine (fer globulaire).
- 2° Stimulation des organes hémopoïétiques (Hémocytopoïétines).
- 3° Action tonique par les substances minimales : globulaires et plasmatiques.

Indications :

Anémies.
Chlorose.
Déchéances organiques
Tuberculose.
Convalescences.
Grossesses.
Suites de couches.
Paludisme.

Posologie. — Une cuillerée à potage à la fin des 2 principaux repas.

Doubler dans les cas graves.

Pas de contre-indications.

Prix : 14 fr. 85.

Littérature et échantillons :

DESCHIENS

Docteur en Pharmacie.

9, rue Paul-Baudry — PARIS (VIII^e).

HÉMOLUOL

Phytothérapie toni-veineuse.

Composition. — Eléments activés par synergie, Thlaspi (capsella Bursa Pastoris), Berberis, Hamamélis, Quinquina, Viburnum prunifolium, Anémone pulsatilla.

Extraits de choix, combinés judicieusement sans perte de substances actives, en un élixir agréable à prendre.

Décongestif, tonique, stimulant des vaso-moteurs centraux. Analgésique et sédatif de l'appareil utéro-ovarien.

Indications. — Troubles des fonctions menstruelles. Aménorrhée, dysménorrhée douloureuse, ménopause naturelle et opératoire.

Insuffisances veineuses. Varices, hémorroïdes, Phlébites, etc.

Posologie. — 1 cuillerée à café dans un peu d'eau avant chacun des trois repas, 15 jours par mois.
Prix : 14 francs.

Laboratoires du Docteur H. FERRE

6, rue Dombasle — PARIS (XV^e).

HÉMOPANBILINE

Forme. — Comprimés et Solution.

Définition. — L'*Hémopanbiline*, application de la méthode modifiée de Whipple, est une *Panbiline* (voir *Panbiline*) à laquelle est ajouté l'*Extrait Hépatique* spécial, avec toute son *efficacité hémopoïétique*, mais d'où sont exclus les albuminoïdes et les lipoides, source de mécomptes.

Composition. — *Panbiline* (Opothérapies hépatique et biliaire associées aux Chologogues) *Extrait hémopoïétique de Foie*. Hémoglobine et Citrate de fer ammoniacal.

Indications. — Médication hépatique des *Anémies, Chlorose, Convalescence, Etats de déchéance, Ictère hémolytique*.

Dose. — 2 à 4 cuillerées à café, ou 10 à 20 *Comprimés d'Hémopanbiline* par jour à prendre avant les repas.

Enfants : demi-dose.

Prix au public :

17 francs le flacon d'Hémopanbiline liquide.

17 fr. la boîte de 100 *Comprimés d'Hémopanbiline*.

Laboratoire du Docteur **PLANTIER**

ANNONAY (Ardèche)

HEMOPAUSINE

Composition. — Liqueur à base d'Hydrastis, Viburnum, Hamamélis, Capsicum, Cinéraria, Sels de chaux, Gentiane, Ecorce d'oranges amères.

Action. — Vaso-constriction veineuse, décongestive, hémostatique, circulatoire.

Indications. — Troubles de la ménopause et de la puberté, varices, hémorroïdes, varicocèle, phlébites, règles douloureuses.

Mode d'emploi. — Adultes : 1 à 3 verres à liqueur. Adolescents : 2 à 3 cuillerées à dessert par jour.

Prix : 12 francs.

Laboratoire de l'HÉMOPAUSINE
16, rue du Petit-Musc — PARIS.

HÉMO-PHAGOSTYL

Phagostyl ferrugineux
(pour adultes).

Formule :

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Cacodylate de soude pur..... | 20 centigr. |
| — de magnésie | 10 — |
| Sulfate de strychnine | 2 milligr. |
| Fer colloïdal..... | 2 centigr. |
| Soluté chloruré isotonique | 5 cc. |

Indications :

Chloro-Anémie, Anémies de toute origine, Asthénie, Troubles de la puberté, Douleurs périodiques, Surmenage, Convalescences, Leucémies.

Emploi :

Une injection intramusculaire ou sous-cutanée tous les deux jours au niveau de la cuisse ou de la fesse. Absolument indolore.

Se vend en boîtes de 12 ampoules de 5 cc.

Prix au public : 22 francs.

Laboratoires Biologiques André PÂRIS
4, rue de La Motte-Picquet — PARIS (XV^e).

HÉMOPHILINE PLANCHE

Elixir et Dragées.

Composition. — Elixir, à base de piscidia, hydrastis, Hamamélis, viburnum, persil, séneçon, salsepareille spéciale.

Dragées, mêmes plantes fraîches stabilisées sous forme d'extraits obtenus dans le vide.

Tous deux contiennent en plus le catalyseur général de la femme (détecté par analyse vibratoire), ce qui en augmente l'activité et en décuple l'efficacité.

Indications. — Formation de la jeune fille, de la femme mal réglée, malaises précédant ou accompagnant les époques, régulateur du flux menstruel trop ou pas assez abondant dont il calme les douleurs ; aménorrhée, dysménorrhée, ménorragie, troubles généraux de la ménopause.

Modes d'emploi. — *Elixir* : 3 à 4 cuillerées à soupe par jour dans un peu d'eau.

Dragées : 12 à 16 par jour, pendant la durée des règles.

Prix : 14 fr. 85, impôt compris.

Laboratoire PLANCHE

Membre de l'Académie de Médecine

P. SAUVAGE, successeur

2, rue Volney — PARIS (11^e).

HÉMOPLASE LUMIÈRE

Opothérapie sanguine totale.

Toutes les déchéances organiques quelle qu'en soit l'origine

Constitution. — Extrait protoplasmique de globules sanguins d'animaux réfractaires à la tuberculose contient : Hémoglobine dont l'activité oxydase est maxima, sérum sanguin, lipoides des globules rouges, lipoides et ferments des leucocytes.

Indications. — Toutes anémies

- 1° Toxiques d'origine exogène ou endogène ;
- 2° Infectieuses (convalescences, tuberculose) ;
- 3° Par spoliation sanguine (hémorragies) ;
- 4° Par cachexie néo-plasique.

Doses courantes. — L'Hémoplasme Lumière peut être administrée par voie buccale, sous forme de granulé, de cachets et de dragées.

Granulés..... de 2 à 6 cuil. à café par jour ;

Cachets..... de 4 à 6 par jour.

Dragées..... de 6 à 10 —

Chez les enfants employer de préférence la forme en granulé : 1 à 4 cuillerées à café par jour.

Ampoules. — Pour l'administration par voie intramusculaire :

Adultes : 2 ou 3 ampoules de 10 cc. par semaine ;

Enfants : 2 à 10 cc. deux fois par semaine.

Prix : ampoules : 9 francs. — Granulés : 17 francs.

Cachets : 20 francs. — Dragées : 13 francs.

LABORATOIRES LUMIÈRE

45, rue Villon — LYON.

HÉMOPLASMINE du Docteur Morelli.

Sirop.

Zomothérapie. Opothérapie hématique et méthode de Whipple combinée.

Indications. — Anémies pernicieuses et symptomatiques graves, convalescences, surmenages, tuberculose, hémorragies, chlorose, grossesses et toutes déficiences.

Composition. — Oxyhémoglobine totale, plasma musculaire de bœuf total, sérum hémopoïétique de foie de veau frais, glycérophosphate de soude, glycérine, sirop, essences aromatiques.

Posologie. — 2 à 3 cuillerées à bouche par jour ; *enfants* : par cuillerées à dessert.

Laboratoire VAN LIER

30, rue St-Jacques — NAMUR (Belgique).

HÉMORROÏDINE GOUTTES

Composition. — Hamamelis, hydrastis, intrait de marrons d'Inde.

Propriétés. — Régulateur de l'insuffisance veineuse et de ses conséquences.

Indications. — « L'Hémorroïdine gouttes » est une préparation rationnelle applicable au traitement des hémorroïdes, avant tout, mais dont peuvent bénéficier d'autres manifestations veineuses, à savoir : *varices, varicocèles, ulcères variqueux, œdèmes phlébitiques.*

Mode d'emploi. — Quinze gouttes matin, midi et soir, avant les repas, dans un peu d'eau.

Prix : 12 francs.

Laboratoires KERFYSER

DUNKERQUE.

HÉMORROÏDINE POMMADE

Composition. — Adrénaline, scuroforme, intrait de marrons d'Inde, carbonate de plomb.

Propriétés. — Spécifique par excellence des hémorroïdes externes et internes, fissures, prurit anal, fistules.

Indications. — Arrête les hémorragies, calme les douleurs, décongestionne.

Mode d'emploi. — Pour les hémorroïdes externes : faire une application de la pommade matin et soir et après les garde-robes.

Pour les hémorroïdes internes : adapter la canule au tube. Ce dispositif permet l'application profonde et étendue de la pommade. Après usage, la canule en ébonite sera facilement stérilisée dans l'eau bouillante.

Prix : 10 francs.

Laboratoires KERFYSER
DUNKERQUE.

HÉMORROÏDINE SUPPOSITOIRES

Composition. — Adrénaline-scuroforme-intrait de marron d'Inde stabilisé, carbonate de plomb.

Propriétés thérapeutiques. — Décongestionnants, analgésiques, calmants.

Indications. — Hémorroïdes internes, fissures, prurit anal, fistules.

Mode d'emploi. — Introduire un ou deux suppositoires par jour, soit le matin au lever, soit le soir en se couchant lorsque les hémorroïdes sont douloureuses, congestionnées par la fatigue et la station verticale.

Prix : 15 francs.

Laboratoires KERFYSER
DUNKERQUE.

HÉMOSAMINE (Utéramine)

Composition. — Solution au centième de chlorhydrate de para-oxyphényléthylamine présentée en ampoules de 1 cc., pour injections, et en flacons de 10 cc. pour l'usage interne.

Propriétés. — *Excellent hémostatique, cardio-tonique et bon excitant de l'utérus.* Remplace ergotines et extraits pituitaires aux effets inconstants.

Indications. — *Obstétrique et gynécologie.* Post-partum (hémorragies et atonies utérines), placenta praevia, ménorragies, métrorragies, dysménorrhées, ménopause.

Médecine interne. Hémophilie, hémoptysie, épistaxis, hémorragies intestinales, choc, collapsus, hémorragies en nappes.

Mode d'emploi. — On utilisera pour les injections hypodermiques (avant-bras ou cuisse) ou intramusculaires (muscle fessier), 1 à 3 cc. et jusqu'à 5 cc. selon les cas. Pour l'usage interne 20 à 30 gouttes, trois fois par jour.

Pour l'usage externe : En tampons ou pansements imbibés de solution pure ou diluée au 1/5 avec de l'eau stérilisée ou bouillie.

Laboratoire ZYMA

9, place Félix-Faure — PARIS (XV^e). Tél. Vaug. : 28-83.

HÉMOSTATIQUE COUDERT

Composition. — Tubes scellés de 20 cc. contenant 0 gr.10 d'émulsine en solution stabilisée.

Propriétés. — Puissant hémostatique, coagulant, tonique, sans toxicité, sans action sur la tension artérielle et la viscosité sanguine.

Indications. — Hémorragies de l'appareil digestif, des affections gynécologiques (fibrome, cancer, métrite), des affections urinaires (rein, vessie, prostate), tuberculeuses, lithiasiques ou néoplasiques. Hémoptysies.

Accidents hémorragiques dus à l'hyporésistance globulaire (anémie, affections du foie, purpuras hémorragiques).

Préventif et curatif de toutes les réactions sériques d'origines pathologiques, alimentaires ou médicamenteuses (hémorragie intestinale de la fièvre typhoïde, paludisme, réactions sériques, idiosyncrasies médicamenteuses ou alimentaires, urticaire). Spécifique de l'hémophilie. Hémogénie, hémorragies dues à des altérations de la crase sanguine (période de ménopause, règles abondantes, épistaxis rebelles).

Doit être employé dans toute opération chirurgicale susceptible d'entraîner une grosse perte sanguine (ablation des amygdales, végétations adénoïdes), en obstétrique et en stomatologie, prostatectomie (avulsion dentaire).

Posologie :

Curatif : 1 à 8 ampoules par jour suivant la gravité des cas.

Préventif : 1 ampoule la veille, 1 ou 2 ampoules 1 ou 2 heures avant l'opération.

Pour les hémophiles, faire suivre un traitement de 2 ampoules par jour après l'opération et vérifier les résultats obtenus en faisant un examen du sang (temps de saignement et de coagulation).

Le produit doit être pris dans un liquide froid, pur, ou aromatisé avec du jus d'orange ou de citron.

Présentation et prix :

Boîtes de 3 ampoules de 20 cc. : 20 francs.

Boîtes de 6 ampoules de 20 cc. : 35 francs.

Boîtes de 12 ampoules de 20 cc. : 60 francs.

Laboratoires COUDERT

116, avenue Ledru-Rollin — PARIS.

Tél. : Roquette 43-41.

HÉMOSTATIQUE GOY

Formule :

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Extrait fluide de seigle ergoté | 4 |
| Chlorure de calcium pur | 8 |
| Acide citrique | 0 50 |
| Sirop d'orties grièche | 20 |
| Excipient | 67 50 |

Indications. — Epistaxis, Hématémèse, Hémoptysies, Métrorragies.

Toutes hémorragies (capillaires, cérébrales, pulmonaires, post-opératoires).

Avantage. — La saveur désagréable de l'ergot de seigle et du chlorure de calcium est complètement masquée par l'excipient spécial.

Mode d'emploi. — Deux cuillerées à café toutes les heures.

Prix : 14 francs.

Etablissements GOY

23, rue Beautreillis — PARIS (IV^e).

HÉMOSTÉRINE IRRADIÉE

Traitement des troubles du Métabolisme calcique et des Avitaminoses D.

Composition. — Ergostérine irradiée (dosée à 15 000 unités Standard internationales par centigramme), Hémoglobine, sels de chaux, de fer, de manganèse, de fluor.

Soumise à un triple contrôle : chimique, spectrophotométrique et physiologique, l'HÉMOSTÉRINE IRRADIÉE donne toute garantie au point de vue de l'activité de son irradiation et de sa conservation (pratiquement illimitée). Innocuité absolue.

Propriétés thérapeutiques. — Puissant facteur de reconstitution du taux du calcium et du phosphore sanguin ; recalcaifiant osseux, antirachitique, fortifiant, reconstituant globulaire, antianémique.

Indications. — Rachitisme infantile, ostéomalacie, fractures, tétanie, caries dentaires, retard de la dentition, décalcification (grossesse, allaitement, tuberculose et pré-tuberculose).

Deux formes : granulés. — Ampoules buvables de 5 cc. (boîtes de 8, 16, 32 ampoules).

Posologie et mode d'emploi. — *Enfants* : Au-dessous d'un an : une demi-cuillerée à café, délayée dans du lait ou de l'eau.

De 1 à 3 ans : une cuillerée à café, délayée dans du lait ou de l'eau.

De 3 à 8 ans : deux cuillerées à café, soit en nature, soit délayées.

De 8 à 12 ans : trois cuillerées à café par jour.

Adultes : Deux cuillerées à soupe par jour, de préférence au moment des repas.

Laboratoire de Thérapeutique expérimentale
médico-pharmaceutique.

66 av nue Thiers — BORDEAUX.

HÉMOSTRA " ROCHE "

Thérapeutique biochimique nouvelle des anémies graves par supplémentation de l'organisme en acides aminés hématogènes.

Composition :

Solution isotonique, neutre et stérilisée de Tryptophane et d'Histidine en *ampoules de 5 cc.* (0 gr. 10 tryptophane et 0 gr. 20 histidine) et en *ampoules de 2,5 cc.* (0 gr. 05 tryptophane et 0 gr. 10 histidine).

Propriétés :

Apporte directement à l'organisme, en proportions rationnellement dosées, les principes actifs du foie et réactive immédiatement et d'une façon considérable les processus de l'hématopoïèse.

Avantages :

Ne provoque pas de dégoût chez le malade ; évite l'action destructrice de la flore intestinale et permet de poursuivre le traitement aussi longtemps qu'il est nécessaire.

1 ampoule de 5 cc. équivaut, par ses effets, à plusieurs centaines de grammes de foie de veau.

Indications :

Toutes les anémies graves : bierrmériennes, leucémiques, néoplasiques, etc. Tous les états de déficience organique : Convalescences difficiles, Inappétence, Maladies consomptives, même chez les enfants, les femmes enceintes et les nourrices.

Mode d'emploi et doses :

1 ampoule de 5 cc. ou de 2,5 cc. suivant les cas, tous les jours par voie sous-cutanée ou intramusculaire rigoureusement indolore. Aucune toxicité ; pas de contre-indication. On peut, dès le début, vérifier l'activité de cette préparation par une numération globulaire.

Enregistré au Laboratoire national de contrôle des médicaments sous le n° 504-13.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie

10, rue Crillon — PARIS (IV°).

HÉMOSTYL

Sérum frais, hémopoïétique de cheval.

Action :

1° Hémopoïétique spécifique (prof. Carnot, Acad. des Sciences, 1906) ; 2° Hémostatique ; 3° Hyperleucocytaire général et local.

Formes pharmaceutiques :

1° Boîte de 6 flacons-ampoules de 10 cc. ; 2° Flacon de 300 gr. de sirop de sang hémopoïétique total ; 3° Boîte de six ovules (usage gynécologique).

Indications et Posologie :

Toutes les *Anémies*, quelle qu'en soit la nature. Convalescences, Tuberculose, Paludisme, suites opératoires et obstétric. 1 à 2 flacons-ampoules par jour en ingestion ou lavement ou 2-3 cuillerées à potage de sirop.

Syndromes toxi-hémorragiques, hémophilie.

Hémorragies (hémoptysies, entérorragies, métrorragies, etc...). Plaies saignantes. Cas graves : inject. de 30 cc. de sérum. Autres cas : ingest. ou mieux lavement de 3 flacons-ampoules. Application locale.

Enfants : demi-dose.

Prix : 18 francs.

Laboratoires du Dr ROUSSEL

97, rue de Vaugirard — PARIS (VI^e).

HÉMOTAL

Complexe opo-organo minéral granulé, association synergique de toniques organiques et de produits opothérapiques.

Indications. — Spécifique des maladies de la nutrition. Anémie, neurasthénie, tuberculose, surmenage, débilité générale, croissance.

Posologie. — *Adultes.* — Laisser fondre dans la bouche 2 cuillerées à café de granulé au début des repas.

Enfants : 1 cuillerée par repas.

Prix : 15 francs.

Forme Elixir : 17 francs.

Laboratoires UNIS-SPÈS

14, rue Demarquay — PARIS.

HÉMOVÉINE

Comprimés.

Composition. — 1° Extraits secs de Marron d'Inde, d'Hamamélis, de Viburnum, de Cupressus. 2° Poudres d'organe à sécrétion interne : ovaire, thyroïde, hypophyse, surrénale.

Action. — Pharmaco-dynamique multiple : Vasoconstriction et diminution progressive du calibre de la veine, disparition du spasme vasculaire et de la douleur consécutive, sédation utérine, régulation des règles, réapparition rapide du potentiel d'énergie tout en empêchant l'hypertension.

Fait merveille dans tous les cas de stase veineuse.

Indications. — Maladies veineuses en général : Varices, Ulcères variqueux, Phlébites, Hémorroïdes, Troubles congestifs de la fonction ovarienne : Dysménorrhée, Métrorragie, Troubles de la Ménopause, Troubles de la circulation générale.

Mode d'emploi. — 6 dragées par jour, à raison de 2 avant chacun des trois repas.

Prix : 14 francs.

Laboratoires BRICHARD et fils
BAR-LE-DUC (Meuse).

HEMOVIRIS

Cachets

Composition par cachet.

Noix vomique, Protoxalate de fer, Bioxyde de manganèse Oxyde de magnésium, Cola, Cascara, Bourdaine, Boldo, Pancréatine aa, 0,05. Condurango, Colombo Quinquina rouge, aa 0,10. Glycérophosphate de calcium, 0,25.

Indications. — Surmenage intellectuel et physique, Inappétence, Asthénies, Dépressions morale et physique, Déminéralisation, Phosphaturie, Anémie, Chlorose, Faiblesse de constitution, Rachitisme, Cachexie, Tuberculoses (pulmonaire, osseuse ou ganglionnaire) Impuissance.

Posologie. — 1 à 3 cachets par jour au début des repas.

Prix : 15 francs la boîte de 30 cachets.

Laboratoires de l'ULMACETYL et du SPICANOL
54, rue de Sablonville, 1, rue de l'Ouest
NEUILLY-PARIS

G. DURAND, Pharmacien de 1^{re} classe
Ex-Interne des Hôpitaux de Paris,
Ex-pharmacien de l'Hôpital Maritime de Berck.

HEMOVIRIS

Elixir

Composition centesimale.

Méthylarsinate Na : 0 gr. 125. — Acide nucléinique, Phosphate mono-acide de Na : à 0 gr. 350. — Teint. d'aloès : 0 gr. 020. — Teint. noix vomique : 1 gr. — Teinture de cola : 2 gr. — Alcool éthylique pur à 90° : 12 gr. 50. — Excipient : Q.S. p. 100 cc.

Indications. — Convalescence des opérés, de la grippe et de toutes les maladies infectieuses — Surmenage intellectuel et physique — Inappétence — Asthénies — Dépression morale et physique — Faiblesse de constitution — Rachitisme — Scrofule — Anémie — Cachexie — Tuberculose (pulmonaire, osseuse ou ganglionnaire) — Paludisme — Impuissance.

Posologie :

Adultes : 2 à 3 cuillers à soupe par jour, 5 à 10 minutes avant les repas pur, additionné d'eau ou de vin généreux.

Enfants de 10 à 16 ans : 2 à 3 cuillers à dessert par jour.

Enfants de 5 à 10 ans : 1 à 3 cuillers à café par jour.

Prix : 15 fr. le flacon de 250 cc.

Laboratoire de l'ULMACETYL et du SPICANOL
54, rue de Sablonville, 1, rue de l'Ouest — NEUILLY-PARIS.

G. DURAND, Pharmacien de 1^{re} classe.

Ex-Interne des Hôpitaux de Paris.

Ex-pharmacien de l'Hôpital Maritime de Berck.

HÉMYPNAL CIBA

Analgésique pelvien.

Trichloro-butylalcool-diallylmalonylurate
d'éthyl-morphine.

Analgésique particulièrement propre à atténuer les douleurs de l'accouchement, sans aucun danger ni pour la mère ni pour l'enfant. Utilisable également dans toutes les petites interventions gynécologiques ou urologiques.

Cachets, Suppositoires, Ampoules.

Indications. — Accouchements douloureux (rigidité du col, hypertonie utérine). Curettages. Cystoscopies. Cathétérismes, prostatectomies. Dysménorrhée.

Doses. — Pour un accouchement : 2 à 4 suppositoires, 1 à 3 ampoules. Interventions : 1 à 2 cachets ou suppositoires dans l'heure qui précède : 2 à 1 suppositoires par 24 heures après l'opération. Chez les dysménorrhéiques 1 à 3 suppositoires par jour.

Le tube de 10 cachets..... 20 francs.

La boîte de 4 suppositoires... 20 francs.

La boîte de 4 ampoules..... 20 francs.

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND
109-113, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.

HÉPACRINE

Extrait désalbuminé et dépiloïdé de foie.

Méthode de Whipple.

Deux formes : buvable et injectable.

Indications. — Les anémies graves, les hémorragies, les anémies post-opératoires, les anémies des paludéens, les insuffisances hépatiques.

La forme injectable est appliquée, de préférence, dans les cas d'intolérance gastrique et d'hépto-résistance ou ceux très graves, exigeant une action immédiate.

Posologie :

Adultes : 1 à 3 amp. buvables ou 1 à 2 injectables par jour.

Enfants : 1 à 2 ampoules de 3 cc, par jour, ou une ampoule injectable.

Présentation :

| | | |
|----------|------------------------------|-----------|
| Boîte de | 6 ampoules de 12 cc..... | 19 fr. 50 |
| — | 12 — de 3 cc..... | 12 fr. |
| — | 10 — injectables de 2 cc.... | 25 fr. |

Laboratoires du Docteur DEBAT

60, rue de Monceau — PARIS (VIII^e).

HEPADRAINASE

Médicament réalisant un drainage puissant des voies biliaires.

Composition :

- I. Sulfate de Magnésie pur anhydre.
- II. Peptones d'oeuf, de viande, de poissons.
- III. Cholates de Soude.

Indications. — Toutes affections atoniques des voies biliaires et en particulier :

Cholécystite, Cholécystatonie, Congestion hépatique, Insuffisance hépatique.

Mode d'emploi :

Adultes : le matin à jeun dans 1/2 verre d'eau 1 à 3 cuillerées à café d'Hépadrainase.

Enfants : à partir de 3 ans, 1/4 à 1 cuillerée à café.

Prix : 16 francs.

Laboratoire du Docteur MARTINET

16, rue du Petit Musc — PARIS (IV^e).

HÉPAGYL

Composition. — Extrait de *Foie frais* stabilisé en ampoules buvables de 10 cc. Chaque ampoule correspond à 100 gr. de Foie cru.

Indications :

1^e Anémies graves. Anémies secondaires consécutives au Paludisme, à la Tuberculose et aux maladies infectieuses.

2^e Insuffisances hépatiques.

Présentation. — En boîte de 6 ampoules de 10 cc.

Posologie :

Adultes : 1 à 3 ampoules par jour.

Enfants : 1 ampoule par jour.

A prendre exclusivement par voie buccale dans un peu d'eau froide, avant les repas.

Prix : 18 francs la boîte.

Laboratoires du Docteur ROUSSEL

97, rue de Vaugirard — PARIS (VI^e).

HÉPALOMEL VÉDÉ

Affections hépatiques.

1^e *Comprimés verts* stimulants des fonctions biliaires (Extrait mou *total* d'artichaut, extrait d'iris versicolor, extrait de combrétum, extrait de boldo).

2^e *Comprimés jaunes* complémentaires, antisepsie et action crypto-toxique.

(Palmitate de soude, bile de boeuf dépigmentée et desséchée, calomel).

Les 10 premiers jours : 3 comprimés verts par jour.

Les 5 derniers jours : 2 comprimés jaunes par jour.

Prix de la boîte : 17 fr. 50.

Laboratoires VÉDÉ

2 et 4, place Gambetta — PARIS (XX^e).

HÉPA-PEPTINE

Extrait buvable de foie lysé par de la muqueuse gastrique.

Indications. — Toutes les anémies d'origine digestive : anémies avec hypotonie et hyposécrétion des ptoisés ; anémies avec hypochlorhydrie ; anémies où prédominent les troubles du tractus gastro-intestinal.

Action. — Les troubles gastriques s'amendent rapidement, la formule sanguine est améliorée parallèlement.

Posologie. — 1 à 2 ampoules par jour, dans un peu de liquide, au milieu des repas.

Présentation :

Boîte de 10 ampoules buvables : 18 francs.

Laboratoires du Docteur DEBAT

60, rue de Monceau — PARIS (VIII^e).

HEPAPHOS

Reconstituant général.

Composition et forme. — Granulé fondant à base de : Extrait de Foie, Protoxalate de fer, Phosphore végétal, Vitamines.

Posologie. — *Adultes* : 2 à 4 cuillerées à café par jour.

Enfants : 1 à 3 cuillerées à café par jour suivant âge et indications du médecin.

Indications thérapeutiques. — Anémies légères, Convalescences, Troubles de croissance, Surmenage, Déminéralisation.

Aucune contre-indication.

Prix : 20 francs (traitement d'une semaine).
Si Anémies graves, prescrire HEPATROL.

Laboratoires Albert ROLLAND

4, rue Platon — PARIS (XV^e).

HEPARFER

Comprimés.

Composition :

| | |
|-----------------------------|--------|
| Carbonate ferreux..... | 0,05 |
| Sulfate de cuivre..... | 0,0005 |
| Poudre de foie Pellissier.. | 0,15 |
| Poudre d'estomac Pellissier | 0,10 |

Action. — Anti-anémique par sa poudre de foie Pellissier (méthode de Whipple), son action est renforcée par la poudre d'estomac Pellissier, le carbonate de fer qui exalte le traitement hépatothérapique (Mauret-Greengard) et le sulfate de cuivre à très faible dose qui, par son action catalytique, provoque l'utilisation maxima du sel ferrugineux.

Indications. — Anémie de croissance, Anémie fébrile, Anémie splénique, post-hémorragique et toxique, Anémie infantile et chloro-anémie, Anémie secondaire des cancéreux, des tuberculeux, etc., Anémie des paludéens.

Posologie. — Deux à trois dragées avant chaque repas.

Prix : La boîte, 18 francs.

Littérature et échantillons :

Laboratoire PELLISSIER

33, avenue de Villiers — PARIS (XVII^e).

Tél. : Wagram 14-59.

HÉPARMONE

Adoptée par les Hôpitaux de Paris.
Traitement des Anémies (méthode de Whipple).

Composition. — Hormone hépatique purifiée, présentée :

1° En ampoules *ingérables* de 10 cc. (boîtes de 6 et 12) chaque ampoule correspondant à l'activité de 125 gr. de foie frais de veau.

Pour les *enfants* : ampoules de 2 cc. = 25 gr. de foie frais de veau (boîtes de 12).

2° En ampoules *injectables* de 2 cc. (boîtes de 6), chaque ampoule représentant 60 gr. de foie frais de veau.

Indications thérapeutiques. — L'HEPARMONE est le médicament spécifique de toutes les anémies.

Posologie. — *Adultes* : 1 à 3 ampoules *ingérables* par jour, dans une demi-tasse de bouillon tiède ou d'eau tiède, 1/2 heure avant le repas, ou bien 1 à 2 ampoules *injectables* par jour, en injection intramusculaire.

Enfants : 3 à 5 ampoules *ingérables* par jour, ou bien 1 ampoule *injectable*.

Prix : Ampoules de 10 cc., 60 francs ; 2 cc., 18 francs.
Ampoules injectables, 50 francs.

Les Etablissements BYLA
26, avenue de l'Observatoire — PARIS.

HÉPATERGOL

Ampoules buvables.

Indications thérapeutiques. — Anémies, déficiences organiques, pré-tuberculoses, Rachitisme, Carences.

Formule. — Chaque ampoule correspond à 100 gr. de foie frais et 32 gr. de rate.

Posologie. — Une à deux ampoules par jour dans un peu d'eau.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 882-4.

Prix : 38 francs.

Laboratoire COUSIN
rue Albert-1^{er}
BEAUMONT-SUR-OISE

HÉPATHÉMO

Deschiens.

Méthode de Whipple. Technique de Minot et Murphy.

Traitement des anémies par le foie de veau frais associé au fer globulaire (technique de Minot et Murphy.)

Nature. — L'Hépathémo est constitué : 1° Par un extrait de foie de veau hydrosoluble préparé à froid sans traumatisme et contenant physiologiquement intact les facteurs anti-anémiques du foie. 2° Une proportion rigoureusement déterminée de fer globulaire.

Action. — 1° Action spécifique du principe anti-anémique du foie de veau frais.

2° Action réparatrice par apport de fer globulaire.

Indications. — Anémies symptomatiques. Anémies pernicieuses.

Formes. — Hépathémo ampoules ingérables de 10 cc. correspondant à 125 gr. de foie frais

Hépathémo sirop, 1 cuillerée à soupe correspond à 25 gr. de foie frais.

Posologie :

Adultes. — Ampoules : 1 à 3 ampoules par jour. Sirop : 2 à 8 cuillerées par jour à la fin des repas.

Enfants. — Sirop : 1 à 8 cuillerées à café par jour selon l'âge.

Pas de contre-indications.

Ampoules. La boîte : 27 francs.

Sirop. Le flacon : 25 francs.

DESCHIENS, docteur en Pharmacie

9, rue Paul-Baudry — PARIS (VIII°).

HEPATIC EFA

du Docteur Lecacheux.

Traitement phytothérapique des maladies du foie.

Composition. — Elixir végétal, composé uniquement d'extraits non alcooliques de plantes fraîches.

Indications. — Ictères, Lithiase biliaire, Cholécystites, Cirrhoses, Auto-intoxications, Dermatoses.

Présentation. — Boîte contenant 12 cachets et 12 ampoules buvables de 5 cc.

Mode d'emploi. — Prendre 1 cachet le matin à jeun dans un peu d'eau et un quart d'heure après prendre le contenu d'une ampoule dans 1/4 de verre d'eau.

Prix : 35 francs.

Laboratoire HEPATIC EFA

16, rue du Château — CARENTAN (Manche).

HÉPATINE GAD

Foie desséché à froid de poissons gades et phosphate de chaux.

Formule :

Extrait hépatique de foie de gaduïdés .. 0,50
 Phosphate calcique..... 0,15
 Saccharolé aromatisé, 1 cuillerée à café 5

Indications. — Affections bronchiques et laryngées, Préphymatose, Convalescence.

Granulé d'un goût très agréable, très apprécié par les enfants.

Doses. — 2 cuillerées à café à chacun des principaux repas. Granulé à délayer dans un peu d'eau ou de lait.

Prix : 16 francs.

Laboratoire de Biothérapie OLIVIÉRO

BOULOGNE-SUR-SEINE (Paris-Ouest).

Tél. : Molitor 27-06.

HÉPATODIASÉ

Composition :

Opothérapie gastro-intestinale associée aux ferments. En comprimés dragéifiés à base de diastase, pepsine, duodénum, orchitine, chlorure de magnésium, bromure de calcium et noix vomique.

Indications :

Traitement rationnel de toutes les affections du tube digestif. Dyspepsie nerveuse, entérite muco-membraneuse, aérophagie. Décongestif du foie.

Posologie :

Deux comprimés après chaque repas.

Prix : 15 francs.

Laboratoires UNIS-SPÈS

14 rue, Demarquay — PARIS.

HÉPATO-MANGANOL

Composition :

| | |
|---------------------------|--------|
| Extrait de noyer | 0,10 |
| Extrait de boldo | 0,01 |
| Extrait biliaire | 0,025 |
| Bioxyde de manganèse..... | 0,05 |
| Arséniate de soude..... | 0,0005 |

Propriétés. — Régularise la fonction glycogénique par l'extrait de noyer. Stimule la cellule hépatique et l'excrétion biliaire par le boldo et l'extrait biliaire. Favorise le métabolisme des hydrates de carbone par le bioxyde de manganèse. Tonique général par l'arséniate de soude.

Indications. — Insuffisance hépatique, Ictère, Lithiase, Obésité, Glycosurie hépatique, Hépatisme tropical, Hépatomégalie des gros mangeurs et des buveurs, Constipation par insuffisance biliaire, etc. Régénérateur de la cellule hépatique chez les pré-tuberculeux.

Présentation. — Tube de 75 pilules : 13 francs.

Posologie. — 4 à 12 pilules par jour aux repas.

Laboratoires L. LEGRAND

11, place Louis XII — BLOIS (Loir-et-Cher).

HÉPATOSODINE

Médication alcaline polyvalente associée au benzoate de soude et à l'héxaméthylène tétramine. Syndrome hépato-entéro-rénal

Action. — Sur l'estomac, le foie, le sang, l'intestin.

Indications. — Insuffisance hépatorénale sous toutes ses formes, Angiocholécystites chroniques ou subaiguës, congestion hépatique, lithiase biliaire, ictère, hypotonie gastrique avec retard à l'évacuation, désintoxication pré ou post-opératoire.

Doses. — *Avant une opération* : Une cuillerée à café dans un verre d'eau au réveil, pendant les 8 jours qui précèdent l'intervention.

Troubles gastriques : Une demi-cuillerée à café dans 100 gr. d'eau tiède. à jeun le matin, et le soir à 18 heures.

Troubles hépatiques : Une demi-cuillerée à café dans un verre d'eau le matin à jeun, 10 jours chaque mois.

Constipation : 1 à 3 cuillerées à café dans un verre d'eau au réveil.

Prix · Le flacon : 14 francs.

La boîte triple dose : 32 francs.

Laboratoires DURET et REMY
et du Docteur Pierre ROLLAND réunis
ASNIERES (Seine).

HÉPATOZYL CALDO

Traitement opothérapique
des Fonctions hépatiques.

Composition. — Boldine cristallisée, Hépatine, Extrait Combretum, Fiel de bœuf, Rhamnus purshiana, Rhamnus franguta.

Indications. — Constipation, Entérocolite, Coliques hépatiques, Cirrhose et Précirrhose, Ictère, Affections d'origine coloniale.

Forme. — Pilules à enrobage de gluten.

Dose :

4 à 8 par jour aux principaux repas.

Prix : 12 francs.

**Laboratoire Moderne
d'Opothérapie et Biologie Médicale.**
40, rue Claire-Paulhac — TOULOUSE.

HÉPATROL BUVABLE

Extrait hydrosoluble de foie de veau frais.

Méthode de Whipple.

Sans contre-indication. *Adultes et enfants.*

Indications. — Toutes anémies, asthénies, insuffisances hépatiques.

Formes thérapeutiques. — Ampoules buvables non injectables.

Présentation. — Ampoules de 10 cc. = 125 gr. foie de veau frais.

Boîtes de 6 ampoules : 45 francs.

Coffret 18 ampoules : 120 francs.

Ampoules de 5 cc. — 1 ampoule = 62 gr. 50 de foie de veau frais.

Boîte de 8 ampoules : 30 francs.

Ampoules de 2 cc. — 1 ampoule = 25 gr. de foie de veau frais.

Boîte de 12 ampoules : 25 francs.

(En raison de son activité incomparable l'HEPATROL est le meilleur marché de tous les extraits de foie).

Posologie. — *Anémies graves* : Ampoules de 10 cc. associées ou non à l'HEPATROL injectable.

Anémies moyennes : Ampoules de 5 cc.

Anémies légères de l'adulte, insuffisances hépatiques, toutes anémies de l'enfance : Ampoules de 2 cc.

Mode d'emploi. — 1 à 3 ampoules par jour à prendre dans un liquide quelconque au début des repas.

Laboratoires Albert ROLLAND

4, rue Platon — PARIS (XV^e).

HÉPATROL INJECTABLE

Extrait de foie de veau frais entièrement déprotéiné ayant conservé toutes les hormones hépatiques de l'organe frais.

Indications. — Anémies graves et cas d'intolérance absolue au traitement *per os*. Permet démarrage rapide.

Mode d'emploi. — Par voie intramusculaire injecter chaque jour 1 à 4 cc. jusqu'à démarrage et disparition de l'intolérance, puis associer l'HEPATROL buvable.

Présentation :

Ampoules de 2 cc. — Activité égale à celle de 250 gr. foie de veau *per os*.

Boîte de 12 ampoules : 90 francs.

Boîte de 6 ampoules : 45 francs.

Ampoules de 1 cc. — Activité égale à celle de 125 gr. foie de veau *per os*.

Boîte de 12 ampoules : 50 francs.

Boîte de 6 ampoules : 25 francs.

Voir communications :

Société Médicale Hôpitaux, 19 mai 1930 (Aubertin).

Presse Médicale, 20 septembre 1930 (Achard)

Société Dermatologique, janvier 1931 (Pinard).

Laboratoires Albert ROLLAND

4, rue Platon — PARIS (XV^e).

HERGENOL

Indications. — Coqueluche, Toux spasmodiques et bacillaires, Asthme.

Composition. — Essences naturelles balsamiques et carbures halogènes, antispasmodiques.

Forme. — Produit volatil, usage externe.

Emploi. — Verser XXX gouttes sur un carré de flanelle. A maintenir en permanence à proximité des voies respiratoires.

Doses. — *Bébés et enfants* : renouveler 2 à 3 fois au cours des 24 heures.

Adultes : 3 à 4 fois suivant besoin.

Prix : le flacon stilligoutte : 15 fr.

Laboratoires GROS

13, place Delille — CLERMONT-FERRAND.

HERMOPHÉNYL LUMIÈRE

Antisymphilitique, Cholagogue, Antiseptique externe.

Constitution. — Mercure phénol disulfonate de sodium représente 40 p. 100 de mercure métallique.

Propriétés. — Elimination rapide, sans aucune réaction négative sur le rein. Son hypotoxité permet à chaque injection intra musculaire d'administrer 5 fois plus d'Hg métallique qu'avec le cyanure.

Indication et doses.

1° *Syphilis* : Accidents primaires, secondaires et tertiaires.

a) Par voie sous-cutanée (injections intra-musculaires ou dans le tissu cellulaire). 10 à 20 centigr. par injection. Une injection tous les 2 ou 3 jours.

b) Par voie stomacale : De 20 à 30 centigr. d'HERMOPHÉNYL LUMIÈRE par jour.

Boîte d'ampoules d'HERMOPHÉNYL LUMIÈRE, 10 centigr. par cc. titrée à 5 centigr. Prix : 16 francs.

Flacon de dragées d'HERMOPHÉNYL LUMIÈRE. Prix : 8 francs.

2° *Antisepsie.*

a) *Chirurgie* : Antisepsie des surfaces et des cavités purulentes, lavages des mains et des instruments, solution de 1 à 10 p. 1 000.

b) *Antisepsie des voies génito-urinaires* : Blennorrhagies, injections urétrales, instillations et grands lavages urétraux ou vésicaux, solutions à 1 p. 100 et 1 p. 200. Cystites : Lavages vésicaux à 7 p. 1 000.

Formuler. — Selon les cas :

Boîte de comprimés d'HERMOPHÉNYL LUMIÈRE.

Prix : ampoules : 16 francs. — Comprimés : 11 francs.

Savon, boîte de 1 pain : 8 francs ; 3 pains : 24 francs.

LABORATOIRES LUMIÈRE.

45, rue Villon — LYON.

HESPERIDAUSSE

A base d'alcoolature de fleurs d'oranger, dépourvu de tout composé barbiturique, opiacé ou bromuré.

Activité réelle jointe à une atoxicité absolue. Réveil agréable sans somnolence ni torpeur consécutives. Pas de troubles digestifs. Pas d'accumulation.

Indications. — Insomnie nerveuse, agitation cérébrale des surmenés intellectuels. Insomnie des enfants.

Posologie et mode d'emploi. — 1 cuillerée à café, pure ou dans une tasse d'infusion aromatique, avant le coucher.

Enfants : $\frac{1}{4}$ à $\frac{1}{2}$ cuillerée à café suivant l'âge.

Prix : 15 francs.

Laboratoires DAUSSE

4, rue Aubriot — PARIS (IV^e).

HEXAFEL

Régulateur des fonctions biliaires et digestives. Cachets globulaires : extrait biliaire, magnésie, térébenthine modifiée, hexaméthylènetétramine.

Mode d'action. — Favorise l'assimilation des aliments. Active la digestion intestinale. Régularise la fonction hépatique. Excite le péristaltisme intestinal.

Indications. — Insuffisances biliaires, troubles hépatiques.

Fermentations intestinales, entéro-colites.

Insuffisance ou stase du bol fécal, constipations chroniques.

Prix : 20 francs

Echantillon grandeur normale sur demande.

Laboratoire d'Hygiène et Thérapeutique appliquées

47, rue Bokanowski — ASNIÈRES (Seine).

HÉXORCÈNE

Hexylrésorcine.

Antiseptique urinaire polyvalent, particulièrement efficace contre le colibacille.

Indications. — Infections aiguës et chroniques de l'appareil urinaire : pyélites, pyélonéphrites gravidiques, cystites, urétrites, prostatites, infections secondaires de la tuberculose des voies urinaires.

Présentation. — Boîtes de 100 capsules.

Posologie et mode d'emploi. — Deux capsules dosées à 0 gr. 15, trois fois par jour.

Augmenter progressivement la dose jusqu'à 4 capsules par prise, soit 12 au total.

Poursuivre le traitement au moins 15 jours après l'obtention de la première culture stérile d'urine.

Les capsules doivent être prises à la fin d'un repas.

Société Parisienne d'Expansion chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

HEXOTAL

Antiseptique urinaire et hépato-rénal.

Composition. — Citroléate d'Hexaméthylènetétramine ; Santatol pur et gluten.

Avantages. — Stabilisation de l'eurotropine sous une forme combinée et indécomposable par le chimisme gastrique. Production de composés formolés dans l'appareil urinaire seulement. Pas de troubles concomitants. Jamais d'hématurie. Antisepsie de surface et de profondeur (Santalol). Histogenèse puissante. Action urisolvante. Tolérance indéfinie.

Emploi et doses. — *Cas aigus* : 6-12-15 globules par jour, à doses filées.

Cas chroniques : 6-8-10 globules par jour.

Indications. — Cystites, Prostatites, Gonococcies, Bactériuries, Pyélites, Pyélonéphrites, Colibacilloses, etc. Phosphaturies, Urines ammoniacales, Coliques hépatiques et néphrétiques, Cholécystites, Diathèse urique. — Echantillons. Littérature.

Dépôt — Paris : **Pharmacie P. LOISEAU**
61, boulevard Malesherbes — PARIS.

Prix : 16 francs.

Laboratoires CAMUSET

18, rue Ernest-Rousselle — PARIS

HIPPOSARCINE ROY

Suc musculaire total exprimé à froid.

Provenant du cheval vigoureux et reposé.

Supérieur au suc musculaire des bovidés :

Par sa plus grande richesse en Azote, en Glycogène, en Hémoglobine, en Phosphate et en Fer ;
Par l'absence totale de Bacilles tuberculeux, de Cysticerques du Taenia.

Assimilation parfaite.

Aucun inconvénient digestif.

Son goût agréable le fait accepter avec plaisir par les malades qui en retirent toujours grand profit.

Tuberculoses pulmonaires et chirurgicales. Tout état d'affaiblissement et de consommation. Maladies de l'estomac et des intestins.

Prix :

Le flacon : 20 francs. — Le demi-flacon : 12 francs.

Laboratoire GIVAUDAN

56, Chemin de Combe-Blanche — LYON.

HIRUDINASE

Le premier produit spécialisé à base d'extrait de sangsues.

Indications. — Varices, Phlébites, Hémorroïdes, Acrocyanose, Œdèmes trophiques, Artérites aiguës et chroniques, Troubles de la ménopause, Troubles de la menstruation, Infections, Septicémies.

Formule :

Extrait de sangsues (procédé spécial), Iode-citrate de soude, Extrait d'hypophyse, Hamamélis-hydrastis-marron d'Inde, Extrait hépatique.

Présentation. — Dragées.

Mode d'emploi. — a. 1 dragée au milieu de chacun des 3 principaux repas (Affections vasculaires).

b. 2 dragées au milieu des 2 principaux repas (Dysménorrhées).

c. 4 à 6 dragées par jour (Infections).

Prix : 18 francs.

LABORATOIRES « ANA »

18, avenue Daumesnil — PARIS (XII^e).

Tél. : Dorian 52-12.

HISTOGÉNOL

Puissant reconstituant général.

Indications. — Tuberculose, Bronchites, Lymphatisme, Scrofule, Neurasthénie, etc.

Formes. — Elixir, Granulé, Ampoules, Comprimés, Concentré.

Posologie. — *Adultes* : 1 cuillerée élixir ou une mesure de granulé avant chaque repas ou un comprimé matin et soir ou une ampoule par jour.

Enfants : Moitié doses.

Elixir : Prix : 15 francs.

Granulé. — 15 —

Ampoules. — 15 —

Comprimés : — 11 fr. 50.

Concentré. — 11 fr. 50.

Établissements MOUNEYRAT

12, rue de Chemin-Vert
à VILLENEUVE-LA-GARENNE
près Saint-Denis (Seine).

HOLOS

Opothérapie osseuse.

Nature. — Extrait opothérapique d'os vivants, renfermant périoste, corps osseux, éléments actifs (non gras) de la moelle, retiré à température physiologique d'os de bœufs et de veaux pris directement à l'abattoir sur des animaux encore chauds.

Indications. — Reminéralisation du terrain tuberculeux : Prétuberculose, tuberculoses osseuse et pulmonaire. Rachitisme et tous les troubles de l'ostéogénèse. Phosphaturie, Grossesse, Allaitement, Convalescences Dentition, Fractures et en général dans tous les cas où s'impose une prompte reconstitution du terrain organique par des éléments phosphatés et fluorés réellement assimilables.

Posologie. — Une petite cuiller-mesure, bien pleine (1 gr.) à chaque repas, mêlée aux aliments (aucun goût). Chez les très jeunes enfants, se contenter d'une 1/2 mesure.

Prix : 9 francs.

Littérature — Echantillons.

DESCHIENS, Docteur en Pharmacie,
9, rue Paul-Baudry — PARIS.

HOLOSPLÉNINE

Extrait de rate injectable.

Délipoidé et désalbuminé.

L'Holosplenine sera dorénavant dénommée .

PERGLANDÈNE SPLÉNIQUE

Indications. — Anémies, Amaigrissements, Tuberculose, Eczémas chroniques, Erythodermie arsénobenzolique, Pemphigus, Lichen ruber acuminosus, Pityriasis rubra de Hebra, Prurigo simplex, Urticaires récidivantes, Miléaire, Eczéma rebelle, prurit anal, vulvaire périnéal, Lichen plan, Psoriasis.

Forme et composition. — Boîte de 6 ampoules de 1 cc. Chaque cc. = 15 gr. de rate fraîche. Prix : 22 francs. Tube de 6 cc. Chaque cc = 15 gr. de rate fraîche. Prix : 20 francs.

Avantages. — La présentation en tube permet de prélever la quantité de rate que l'on désire injecter, le reste du tube conservant toutes ses propriétés.

Conduite du traitement. — Série de 12 à 15 injections de 1 cc. sous-cutanées ou intra-musculaires comme suit : 1 injection les 1^{er} et 2^e jours, pas d'injection les 3^e et 4^e jours, ensuite injection tous les 2 jours. L'injection est indolore. Pour les eczémas, ne pas hésiter à injecter les doses fortes : 2 à 3 cc. (c'est-à-dire 30 à 45 gr. de rate) ainsi que dans les dermatoses rebelles.

Laboratoires de L'ENDOPANCRINE

48, rue de la Procession — PARIS (XV^e).

Tél. : Ségur 26-87.

HOLOVARINE

Forme et composition. — Cachets ou dragées dosés à 0 gr. 10 et 0 gr. 20 de poudre d'ovaire intégral. Odeur agréable. Assimilation facile.

Avantages. — Desséchée par un procédé nouveau qui, par sa rapidité, permet à l'organe de conserver toutes ses propriétés. Contient tous les principes actifs de l'ovaire.

Indications. — Toutes les insuffisances ovariennes ; troubles de la puberté, de la ménopause, de la menstruation, de la grossesse, de la sécrétion lactée, stérilité, obésité.

Mode d'emploi. — *Adultes* : 1 à 2 cachets ou dragées à 0 gr. 20 par jour.

Adolescentes : 1 à 2 cachets ou dragées à 0 gr. 10 par jour. Cures successives de 5 à 10 jours.

La boîte de 24 cachets ou dragées à 0 gr. 20, 15 francs. La boîte de 24 cachets ou dragées à 0 gr. 10, 9 fr. 50.

Laboratoire de L'ENDOPANCRINE

48, rue de la Procession — PARIS (XV^e).

Tél. : Ségur 26-87 et 76-82.

HOPOGAN-BOCQUILLON

Composé organo-minéral à base de Peroxyde de Magnésium et de charbon activé, dégageant de l'Oxygène naissant au contact des muqueuses.

Propriétés. — Désinfection et désintoxication du tube digestif avec revivification de l'organisme dans chacune de ses fonctions cellulaires.

Pansement interne de la muqueuse stomacale ou intestinale. Propriétés anti-cancéreuses de l'ion magnésium.

Formes. — **HOPOGAN CACHETS** pour digestions douloureuses, mauvaise haleine, intoxications de toute nature (2 à 4 cachets par jour).

Prix : la boîte de 30 cachets : 15 francs.

HOPOGAN PILULES GLUTINISÉES pour action localisée dans l'intestin : entérite, diarrhées (2 à 6 pilules par jour).

Prix : le flacon de 40 pilules : 12 francs.

HOPOGAN PRISE-BÉBÉ contre les diarrhées vertes des nourrissons (1 à 3 paquets par jour).

Prix : la boîte de 20 paquets : 10 francs.

Laboratoire des PEROXYDES MÉDICINAUX

12-18, rue Lamartine — PARIS.

HORMANTOXONE

Composition. — Extrait contenant intégralement et sous une forme stable le principe antitoxique du Foie, purifié, concentré et titré biologiquement.

Indications. — Insuffisance de la fonction antitoxique. Auto et hétéro-intoxications. Intolérances alimentaires diverses. Asthénie prandiale des hépatiques. Toxi-infections (adjuvant). Anaphylaxie. Dermatoses d'origine hépatique. Oliguries de toute origine (augmentation de la diurèse). Psychoses. Soins pré-opératoires. Vomissements incoercibles de la grossesse. Intolérances et intoxications médicamenteuses.

Posologie. — Cas aigus : 6 à 9 dragées par jour.

Dose d'entretien : 3 à 4 dragées.

A avaler avec un peu d'eau avant chaque repas.

Le flacon de 36 dragées : 18 francs.

Laboratoire ROBERTS et C^{ie}

5, rue de la Paix — PARIS

Tél. : Opéra 48-91.

HORMOBILINE

Laxatif opothérapique.

Médicament héroïque et rationnel de la CONSTIPATION et des affections chroniques du gros intestin.

Composition. — Hormones cœco-appendiculaires et extraits biliaires sélectionnés.

Indications. — Constipation, colopathies, séquelles d'appendicectomie, entéro-colite muco-membraneuse, insuffisances biliaires, ictères, cholémies.

Avantages. — Ne provoque ni dégoût, ni accoutumance, est facilement absorbable et ne présente aucune contre-indication.

Posologie. — *Forme liquide* : 1 à 3 cuillerées à café, diluées dans un peu d'eau naturelle ou gazeuse (Saint-Galmier ou Couzan) avant le repas du soir ou au moment du coucher.

Clystère : 4 cuillerées à café pour un litre d'eau bouillie.

Forme pilulaire : 2 à 4 pilules avant le repas du soir ou au moment du coucher.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des médicaments, sous les n° 586-1 et 586-2.

Prix : 12 francs.

Echantillons et littérature :

Laboratoires DORANTOWICZ

17 bis, avenue Parmentier — PARIS (XI^e).

Tél. : Roquette 14-12.

HORMOCLINE

Chlorhydrate de Choline

Traitement des Etats Tuberculeux

Propriétés thérapeutiques. — Le chlorhydrate de choline est une hormone qui agit sur le métabolisme du cholestérol, excite les surrénales aux propriétés antitoxiques puissantes et opère ainsi une transformation du terrain biologique se manifestant par un relèvement de l'état clinique général.

Indications. — Toutes les formes de la tuberculose à tous les stades d'évolution, aussi bien dans les formes médicales que dans les formes chirurgicales. Amaigrissements, Asthénies, Anorexies rebelles.

Adjuvant précieux des cures hygiéno-diététiques. Abaissement de la température, diminution des signes fonctionnels, engraissement rapide et durable.

Innocuité absolue. Tolérance parfaite, aucune contre-indication.

Mode d'emploi. — Une injection sous-cutanée tous les deux jours. Boîtes de 12 ampoules de 1 cc. dosées à 2 centigr. de chlorhydrate de choline.

Prix : 24 francs.

Laboratoires L. LEMATTE et G. BOINOT

52, rue La Bruyère — PARIS (IX^e).

Adresse télégr. : Chevrematte 90 — PARIS.

HORMOCRINOL « F » et « M » **Une conception nouvelle dans la thérapeutique** **antiobèse.**

L'Hormocrinol, en dehors de ses effets sur l'oxydation des graisses et des mucines, réalise la plus efficace cure de diurèse agissant favorablement sur les troubles du métabolisme de l'eau.

Extraits glandulaires totaux obtenus par dessiccation dans le vide à basse température des organes frais.

Posologie. — Prescrire HORMOCRINOL « F » chez la femme, et HORMOCRINOL « M » chez l'homme.

6 à 8 comprimés par jour à prendre en deux ou trois fois.

Prix au public : 20 francs.

Laboratoires de l'HORMOCRINOL

R. JAMMES DE GOLBERY, Pharmacien-Directeur

17, rue de la Glacière

LA GARENNE-COLOMBES (Seine).

Tél. : Charlebourg 26-56.

HORMOVARINE BYLA

(Folliculine cristallisé).

Adoptée par les Hôpitaux de Paris.

(En ampoules injectables, gouttes, comprimés et ovules.)

Composition. — Folliculine, ou hormone ovarienne spécifique, physiologiquement titrée.

Propriétés thérapeutiques. — L'HORMOVARINE BYLA remplace la sécrétion interne de l'ovaire.

Indications. — L'HORMOVARINE BYLA peut être utilisée dans tous les cas d'*hypo-fonctionnement ovarien* et donne des résultats très favorables dans l'aménorrhée, la dysménorrhée, l'hypoplasie utérine, les troubles de la ménopause, l'ovariectomie, la stérilité, l'obésité, etc., et dans certains cas de diabète ovarien résistant à l'insuline.

Mode d'emploi. — Une ampoule tous les jours en injection lente, intramusculaire ou 15 à 40 gouttes ou 2 à 3 comprimés quotidiens, ou un ovule le soir en se couchant.

L'HORMOVARINE doit se prescrire de préférence par séries de 6 à 10 jours dans la période qui précède immédiatement la date présumée de la prochaine menstruation.

Prix :

Ampoules : 50 francs. — Comprimés : 18 francs. — Ovules : 25 francs. — Gouttes : 18 francs.

Les Établissements BYLA

26, avenue de l'Observatoire — PARIS.

HORMOVITOL

Puissant tonique et reconstituant cellulaire.

Elixir de goût très agréable à base d'extraits androïques totaux, d'extraits cérébro-médullaires et de nucléines.

Indications. — Asthénie, Amaigrissement, Troubles nerveux. Dépression intellectuelle. Neurasthénie. Convalescence médicale ou chirurgicale. Troubles glandulaires. Surmenage. Phosphaturie.

Doses :

Adultes: 1 verre à liqueur après chaque repas.

Enfants : de 5 à 10 ans, 1 cuillerée à café ; de 10 à 15 ans, 1 cuillerée à dessert.

Prix : 18 francs.

Laboratoire du Docteur MARTINET
16, rue du Petit-Musc — PARIS (IV^e).

HORMUCLASES

Extraits d'organes desséchés extemporanément sous vide, mis en cachets sous azote et conservés en tubes scellés également sous le vide.

Le total des opérations, depuis l'abatage de l'animal jusqu'au conditionnement dure moins de 4 heures.

Les Hormuclases sont inaltérables ; elles n'ont pas d'odeur « sui generis ».

Pour les formes associées, présentation en cachets réunis dans le même tube mais distincts pour éviter les réactions intertissulaires.

Présentation. — 4 types de boîtes contenant un seul organe : ovaire (0,10), thyroïde (0,025), hypophyse totale (0,05), surrénale (0,10).

Trois types de boîtes contenant dans le même tube des cachets d'organes différents : ovaire-thyroïde, ovaire-thyroïde-hypophyse, ovaire-thyroïde-hypophyse-surrénale.

Chaque boîte contient 3 tubes de 12 cachets.

Prix : 30 francs.

Laboratoires du D^r ROUSSEL
89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI^e).

Tablettes HOVA

(ou Hovalettes).

Composition. — Chaque tablette renferme *neuf centigrammes* d'extraits dialysés, dont un tiers de **HO**ublon et deux tiers de **VA**lérianes.

Propriétés. — Sédation inoffensive et *progressive* du système nerveux, dispensant de l'emploi du chloral, des bromures et des dérivés barbituriques.

Indications. — *Toutes les affections d'origine nerveuse* : Surexcitation, Insomnie, Neurasthénie, Troubles de la ménopause. Se prescrit également aux enfants dont le sommeil est agité; aux vieillards, pour combattre les battements de cœur et autres manifestations de l'artériosclérose.

Mode d'emploi. — 3 à 4 tablettes, 3 fois par jour, aux deux repas et au moment de se coucher. Demi-dose pour les enfants.

Laboratoire ZYMA

9. place Félix-Faure — PARIS (XV^e).

Téléph. : Vaugirard 28-83.

HUILAXINE

Forme. — Solution (270 cc.).

Composition. — Huile de paraffine distillée et rectifiée.

Indications. — Rééducation de l'intestin.

Traitement physiologique de la constipation et de toutes affections provoquées par la stase intestinale.

Mode d'emploi :

Adultes : 2 fois par jour, 1 cuillerée à soupe.

Enfants : 2 fois par jour, 1 cuillerée à café.

Nourrissons : 1 cuillerée à café par jour, mêlée au lait.

Le flacon de 270 cc. : 12 francs (en France).

Laboratoires A. BAILLY

15. rue de Rome — PARIS (VIII^e).

HUILE CROLAS

de Ricin, chimiquement pure.

Obtenue par des procédés purement mécaniques, sans l'intervention d'aucun produit chimique.

Absolument sans saveur et sans odeur, ne contient cependant que de l'huile de Ricin.

Le purgatif par excellence des enfants et des personnes délicates.

En flacons spéciaux à bouchage hermétique de 15, 30, 45, 60 grammes et flacon provision de 250 grammes.

Le flacon 15 gr. Prix : 1 fr. 80.

— 30 gr. — 2 fr. 35.

— 45 gr. — 2 fr. 80.

— 60 gr. — 3 fr. 30.

— 250 gr. — 10 fr. »

Laboratoire GIVAUDAN

56, chemin de Combe-Blanche — LYON.

HUILE DE FOIE DE MORUE

Médicinale suractivée

Rhône-Poulenc.

2 000 unités internationales Vitamine A,

500 unités internationales Vitamine D,

par centimètre cube.

Flacons de 150 cc.

Indications. — Toutes celles de l'huile de foie de morue ordinaire avec l'avantage d'une posologie réduite, parfaitement supportée.

Facteur précieux du développement de l'organisme.

Aliment d'appoint au cours des convalescences.

Posologie (par 24 heures) :

Première année : XXX gouttes à 1/2 cuillerée à café.

Enfants : A partir d'un an et suivant l'âge : 1/2 à 1 cuillerée à café.

Adolescents et adultes : 1 à 2 cuillerées à café.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

HUILE GALLINA

Lipoïdes des Galli résistants au Bacille de Koch, Morhuate d'Éthyle, Cinnamate de Benzyle.

Formes :

Ampoules de 5 cc. (voie parentérale tissus).

Indications :

Toutes les formes de la tuberculose viscérale.

Prix, 10 ampoules de 5 cc. : 24 francs.

Établissements GALLINA

4, rue Candolle — PARIS (Ve).

HUILE GRISE ERCÉ

Constitution. — Huile grise de formule spéciale, complètement résorbable, sans huiles minérales.

Forme. — Ampoules-seringues auto-injectables.

Avantages. — 1° *Indolore*, neutralité absolue.

2° Assimilation totale. *Résorption* rapide.

3° *Dosage* absolument rigoureux.

Dosages. — 0.05 - 0.08 - 0.10 - 0.12 cgr. de Hg. complètement injecté.

Boîte 10 ampoules seringues (Toute doses)

Prix : 28 francs:

Laboratoires ROBERT et CARRIÈRE

37, rue de Bourgogne — PARIS.

HUILE IODÉE FINIKOFF

CALCIUM INTRAVEINEUX FINIKOFF

Méthode du D^r A. FINIKOFF

pour le traitement des Tuberculoses chirurgicales.

Indications. — Tuberculoses osseuses, articulaires, ganglionnaires, glandulaires, séreuses et cutanées.

Contre-indications. — Tuberculose pulmonaire, tuberculoses viscérales avec dégénérescence amyloïde du foie et du rein, cachexie et septicémie bacillaires, méningites bacillaires.

Formes. — *Huile iodée* à préparer extemporanément : une ampoule d'huile d'arachide, une ampoule d'iode en solution au 1/10 en injections intra-musculaires.

Chlorure de calcium pour injections intraveineuses. Ces injections ne sont à pratiquer que chez les malades robustes ayant une intégrité viscérale totale.

Remplacer ces injections par la Tricalcine injectable ou *per os* chez tous les autres malades.

Doses et mode d'emploi. — Un prospectus indiquant la posologie accompagne chaque boîte. Il est envoyé sur demande au Corps médical.

| | | | | |
|---------------------|------------|----------|---|--------|
| Prix de la boîte de | 6 ampoules | huile. | } | 25 fr. |
| — — | 6 | iode. | | |
| — — | 12 | calcium. | } | 25 fr. |
| — — | 12 | calcium. | | |

Laboratoire des Produits SCIENTIA

D^r E. PERRAUDIN, Pharmacien.

21, rue Chaptal — PARIS.

HUMORO-STABILINE

PRÉPARATION
OPOTHÉRAPIQUE ET PHYTOTHÉRAPIQUE

A BASE DE PEPTONE ET DE VALÉRIANE

STABILISATRICE DES HUMEURS

pour

MÉDICATION ANTI-ANAPHYLACTIQUE

et

TOUS LES TROUBLES DU SYSTÈME NERVEUX

— COMPOSITION —

| PILULES | | GRANULÉ | |
|-------------------------------|----------|--|-------|
| Peptone de viande..... | 0 gr. 20 | Peptone de viande..... | 4 gr. |
| Extrait de Valériane. . . | 0 gr. 10 | Extrait de Valériane..... | 2 gr. |
| Extrait de Muguet..... | 0 gr. 05 | Extrait de Muguet..... | 1 gr. |
| Pour 1 pilule. | | Pour 100 gr. | |
| Excipient spécialement étudié | | Stimulant aromatique.. q. s. | |
| Enrobage soluble dans l'eau | | Excipient : Sucre de 1 ^{er} choix | |

— INDICATIONS THERAPEUTIQUES —

1. - DANS L'ANAPHYLAXIE :
Urticaires - Eczémas - Migraines - Névralgies - Asthme.
2. - DANS LES DYSTONIES ORGANO-VÉGÉTATIVES
Troubles respiratoires, circulatoires, sécrétoires, etc.
3. - DANS LES PERTURBATIONS NERVEUSES :
Neurasthénie - Epilepsie - Hystérie - Convulsions.
4. - DANS LES DÉSORDRES CARDIAQUES.

AUCUNE CONTRE-INDICATION

— MODE D'EMPLOI ET DOSES —

Se prend toujours 1 heure au moins avant chaque repas.

Le granulé se croque ou se donne dans un peu d'eau et de lait.

DOSES MOYENNES POUR 24 HEURES

| PILULES | GRANULÉ |
|---|--|
| ADULTES : 3 pilules à la fois 1 heure avant chacun des deux principaux repas. | ENFANTS : 1 bonne cuillerée à café 1 heure avant chacun des deux principaux repas. |
| ADOLESCENTS : 2 pilules à la fois 1 heure avant chacun des deux principaux repas. tous les jours pendant 2 à 3 mois consécutifs | NOURRISSONS : 1/2 cuillerée à café matin et soir 1 heure avant l'une des tétées normales. |

Pour la durée du traitement, se conformer aux indications
du Médecin.

— PRIX DE VENTE IMPOSÉS —

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Le Flacon de 60 pilules... 18 fr. | La Boîte 100 gr. de granulé. 14 fr. |
| (Modèle unique) | (Modèle unique) |

LABORATOIRES DU DOCTEUR L. DELALBRE

PRODUITS PHARMACEUTIQUES SPÉCIALISÉS

Opothérapie - Colloïdothérapie micellaire - Phytothérapie

DÉPOT GÉNÉRAL

2, R. CLAUDE MATRAT - 188Y-LES-MOULINEAUX (Seine)

Fabrication Française.

Téléph. : MICHELET 24-11.

G. R. LANG, Pharmacien de 1^{re} classe.

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

HYDRALIN

Antiseptique gynécologique.

Composition. — Perborate de soude, Borate de soude, Bicarbonate de soude, Fluorure de sodium, Essences aromatiques.

Propriétés. — Est une source d'oxygène naissant. Donne une solution dialytique alcaline. Exalte le pouvoir défensif des muqueuses. Evite la pullulation des germes pathogènes. Dissout les sécrétions et les mucosités.

Indications. — Leucorrhées, métrites, vaginites. Antiseptique idéal pour les soins intimes et hygiéniques de la femme.

Présentation. — Sachets de poudre agréablement parfumée et immédiatement soluble.

Mode d'emploi. — Prescrire pour une injection chaude, un sachet pour 1 litre d'eau.

La boîte de 30 sachets : 10 francs.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 339-2.

Laboratoires CAILLAUD

37, rue de la Fédération — PARIS (XV°)

Téléphone : Suffren 12-63.

HYDRASTINE HOUDÉ

Propriétés. — Détermine la contraction du muscle utérin. Vaso-constrictrice et hypertensive.

Indications :

a. *Essentielles* : Toutes les métrorragies, spécialement les ménorragies congestives primitives (Siredey). Fibromes saignants. Kystes de l'ovaire, métrites hémorragiques, Hémorragies de la ménopause.

Aucune contre-indication.

b. *Secondaires* : Epistaxis. Hémorragies hémorroïdaires. Hémoptysies.

Présentation. — Granules à 2 mgr.

Posologie et mode d'emploi. — 6 à 15 granules par jour en 2 ou 3 fois avant les repas, 8 à 10 jours avant la date présumée des règles ou dès le début de l'hémorragie. Ces doses peuvent être largement dépassées.

Laboratoires HOUDÉ

9, rue Dieu — PARIS

HYDRASTIS GMET

Composition. — Extrait total liquide et sans alcool de l'hydrastis canadensis.

Propriétés. — Décongestif, hémostatique, laxatif (par son action sur le foie).

Indications. — Hémorragies, Fibromes, Métrorragies, Congestions pelviennes, hémorroïdes, Constipation.

Posologie. — De 1 à 3 cuillerées à café par jour dans un peu d'eau.

La moins onéreuse des préparations d'hydrastis.

Le flacon de 135 cc. : 22 francs.

Laboratoire GMET

27, rue du Faubourg-Montmartre
PARIS (IX^e).

HYDRORRHÉOL

Composition. — Poudre de Dower, Québracho, Extraits organiques.

Propriétés. — Antispasmodique, antiasthmatique, exalte l'action antitoxique du foie, rétablit l'équilibre humoral.

Indications. — Asthme hépatique, Asthme nasal, Hydrorrhée, Rhinite, Rhume des foins.

Posologie. — En cas de crise : 1 cachet d'heure en heure, 4 cachets en moyenne.

En saison et en périodes de crises : 2 cachets par jour pendant 8 jours avec une infusion légère de boldo ou de thé.

Présentation et prix. — Cachets : la boîte 12 fr. 75.

Laboratoire Laryngologique

R. CORDIER

Docteur en Pharmacie,
222, faubourg Saint-Martin
PARIS (X^e).

Tél. : Nord 34-71.

HYDROXYDASE

Anti-toxine naturelle vivante, eau minérale naturelle du Breuil et du Broc (Puy-de-Dôme).

Composition. — *Eau minérale naturelle* chlorurée, bicarbonatée sodique, magnésienne et ferrugineuse ; jusqu'ici *unique en hydro-minéralogie*, donne des réactions oxydasiques.

Mode d'action. — Grâce à ses nombreux colloïdes naturels, elle fixe l'oxygène intérieur et le rétrocede aux toxines et déchets de l'organisme, les brûle, les détruit et les élimine. Augmente le pouvoir d'oxydation du système endocrinien, et supplée aux sécrétions des glandes déficientes.

Indications. — Intoxications endogènes (rhumatismes, goutte, diabète, eczéma, obésité, etc.).

Intoxications exogènes (convalescences difficiles, arthritismes, uricémie, indicanurie, urobilinurie).

Mode d'emploi. — Cure normale : un verre le matin à jeun et un verre une heure avant chaque repas pendant 20 jours (souvent renforcée par des injections sous-cutanées ou intramusculaires).

L'Hydroxydase, embouteillée au griffon sans contact avec l'air, doit être consommée aussitôt débouchée. Elle est livrée en caissettes de 20 petites bouteilles de la contenance d'un verre, et en ampoules de 10 cent. cubes.

Compagnie de l'HYDROXYDASE.

Siège social, 10, rue Blanche — PARIS. — Tél. : Pigalle 83-15 et 83-16

HYGIODINE

Traitement discret et complémentaire anti-syphilitique.

Aucune mention mercurielle ni spécifique sur l'étiquette, le prospectus et l'enveloppe.

Forme. — Elixir à base de vin iodotannique.

Doses. — Un verre à liqueur avant chaque repas contenant :

| | |
|-----------------------------|-------|
| Iode | 0,06 |
| Iodure de potassium..... | 0,06 |
| Bi-iodure de mercure..... | 0,012 |
| Méthylarsinate de soude.... | 0,024 |

Prix : 15 francs le flacon.

Maison du Docteur PILLET.

5, avenue Victoria. — PARIS.

HYOL

(Norwegian Essence).

Composition. — A base de menthol, gaïacol et de plantes aromatiques (Cedrus, Abiès, Epicéa, Pinus, Larix).

Indications. — Asthme, Bronchites, Coryza, Coqueluche, Grippe, Laryngites, Toux spasmodique, etc...

Mode d'emploi. — Inhalations, évaporations à froid, Pulvérisations, Gargarismes.

Le flacon : 16 francs.

Echantillons et littérature :

Laboratoire FORTIN

109, rue de Sèvres
PARIS.

HYOSCYAMINE HOUDÉ

Granules titrés à 1 mmgr. et à 1/4 de mmgr.

Hyoscyamine Houdé. — Produit pur cristallisé, extrait de l'*Hyoscyamus Niger*.

Propriétés thérapeutiques. — Antispasmodique, calmant, hypnotique, d'un emploi très répandu dans le traitement des séquelles de l'encéphalite léthargique où elle donne des résultats surprenants.

Produit stable, d'action certaine et constante.

Doses et mode d'emploi. — 2 à 6 granules *pro die* ; les prendre avant les repas.

Laboratoires HOUDÉ

9, rue Dieu — PARIS.

HYPALÈNE

Composition. — Combinaison de l'acide Cyclopenténylallylbarbiturique avec le Phényl-diméthyl-diméthylamino-pyrazolone.

Action. — Analgésique, Sédatif, Hypnogène.

Indication. — Traitement de l'insomnie douloureuse, algies diverses, angoisse pré-opératoire, et douleurs post-opératoires.

Force pharmaceutique. — Comprimés divisibles permettant de graduer les doses. Ne contenant pas de toxique du Tableau B.

Dose. — Angoisse pré-opératoire, 1 à 2 comprimés d'Hypalène quelques minutes avant l'intervention.

Algies diverses, douleurs post-opératoires : 1 à 4 comprimés dans les 24 heures au moment des douleurs.

Dose hypnogène : 1 à 2 comprimés le soir au moment de se coucher, 1 heure ou 2 après le repas.

Prix : 13 francs.

Laboratoires du Docteur Pierre ROLLAND

15, rue des Champs — ASNIÈRES (Seine).

HYPERSAN

Médication hypotensive-diurétique.

Composition. — Association d'extraits fluides de Gui, cratægus, Stigmates de maïs et Cascara.

Action. — Le gui diminue la tension par action vasomotrice périphérique et action excitante sur la sécrétion rénale (Chevalier, Gaultier). Selon Leclerc, le Cratægus équilibre la pression sanguine en diminuant l'éréthisme vasculaire.

Indication. — L'hypertension sous toutes ses formes.

Doses. — 30 à 50 gouttes, 3 fois par jour.
90 — le soir au coucher.

Pharmacie Centrale de Belgique, S. A.
12, rue du Téléphone — BRUXELLES

HYPOCHOLATE

des professeurs **G. CARRIERE** et **E. GERARD**.
Traitement de l'Hypertension artérielle.

Composition. — En ampoules de 2 cc. contenant 0 gr. 02 de CHOLALATE de SOUDE, chimiquement pur pour 1 cc. En suppositoires à 0 gr. 10. Il est employé avec succès égal en petits lavements dans la capsule rectale de 5 ou 10 cc. à la poire ou à la main, en utilisant le contenu d'une ampoule de 5 cc.

Indications. — Hypertension intermittente, Hypertension par pléthore, Hypertension intermédiaire entre pléthore et sclérose.

Posologie. — Injecter le contenu d'une ampoule profondément sous la peau, tous les jours au début. Puis, lorsqu'un abaissement suffisant a été obtenu, injecter seulement deux fois par semaine et même une seule fois, le contenu d'une ampoule, ce qui parfois suffit pour maintenir l'abaissement de tension obtenu. Puis, au bout d'un temps variable, cesser le traitement, pour le reprendre plus tard s'il y a lieu.

Prix au public : la boîte de 10 ampoules : 30 francs.
 La boîte de 10 suppositoires à 0 gr. 10 : 30 francs.

Produits STENE

2, place des Vosges — PARIS (IV^e).

HYPOPHÉDRINE

Ephédrine végétale française corrigée.

Composition :

| | |
|-------------------------|----------|
| Ephédrine végétale..... | 0 gr. 03 |
| Hypophyse totale..... | 0 gr. 05 |
| Ext. de Lobélie..... | 0 gr. 01 |
| par dragée. | |

Indications. — **Asthme. Rhume des Foins. Bronchites emphysémateuses.** Tous états dyspnéïques.

Avantages. — Ne provoque ni tachycardie, ni troubles urinaires, ni insomnie.

Posologie. — 3 à 4 dragées par 24 heures.
Prix 20 francs.

Laboratoires DEPRUNEAUX
 18, rue de Beaune — PARIS (VII^e).

HYPOSULFÈNE

“ Soufre soluble. ” — “ Aliment₂soufré. ”

Pilules glutinisées à 0 gr. 25 d'Hyposulfite de Na chimiquement pur, stabilisé.

Doses. — 4 à 12 pilules glutinisées par jour au milieu des 3 repas.

Indications. — Dermatoses récidivantes : Eczéma, Strophulus, Prurigo, Prurits, Urticaires, etc. Intolérances alimentaires, Ictère, Acné, Séborrhée, etc. Toutes les indications du soufre.

Action. — Très grande activité réductrice et sulfurante due à la glutinisation qui évite la destruction de l'hyposulfite dans l'estomac et permet son action en nature au contact de l'épithélium intestinal.

La boîte de 60 pilules glutinisées : 15 francs.

Ampoules de 10 cc. pour injections intraveineuses

La boîte de 10 ampoules : 25 francs.

Laboratoires pharmaceutiques L.-G. TORAUDE
22, rue de la Sorbonne — PARIS (V°).

HYPOTAN

Le Régulateur du débit Artériel.

Dérivés de la choline hypotenseurs par voie digestive, associés à une faible dose de chloral et présentés sous la forme de comprimés.

Propriétés thérapeutiques. — L'Hypotan constitue une synergie hypotensive par dilatation artériolaire et sédation des spasmes. Il améliore la circulation périphérique si profitable à l'état clinique des hypertendus. L'Hypotan réalise une véritable prophylaxie des accidents graves de l'hypertension. Il excite en outre les organes à musculature lisse.

Indications. — Thérapeutique d'entretien des hypertendus, Hypertension, Spasmes vasculaires (même sans hypertension rencontrés souvent à la ménopause). Cure complémentaire de l'**Acécoline**, Hypovagotonie.

4 à 6 comprimés par jour avant les repas.

Innocuité absolue. Tolérance parfaite.

Prix : 18 francs.

Laboratoires L. LEMATTE et G. BOINOT

52, rue La Bruyère — PARIS.

Adresse tél. : Chevrematte, 90 — PARIS.

« I. A. M. »

Iodo-méthyl, Arsinat de Manganèse.

Propriétés thérapeutiques. — Composé organique, réalisant sous une forme optimale l'action synergique de :

L'ion iode histotrope, leucopoïétique, lymphagogue.

L'ion arsenic stimulant de la nutrition et agent d'épargne.

L'ion manganèse vecteur d'oxygène, facteur capital d'oxydation cellulaire (*Thèse de Bordeaux 1928*).

Indications. — *Lymphatisme*. Affections ganglionnaires, Anorexies, États anémiques, Bronchites, Asthme, Convalescences.

Posologie. — Gouttes « I. A. M. » (*adultes*) XV à XX gouttes matin et soir.

Sirop « I. A. M. » (*enfants*), 1 cuillerée matin et soir.

Prix : Gouttes, 20 francs. — Sirop, 18 francs.

Elixir, 18 francs.

Littérature et échantillons
Docteur LAVOUÉ — RENNES.

IFRANOL

Dragées, Granulés: Quinine, Arsenic, Fer, Strychnine, Cholagogues.

Ifranol injectable: Quinine, Arsenic, Manganèse, Strychnine.

PALUDISME

1° *Dragées*.

Curatif : 8 à 10 dragées par jour.

Préventif : 2 dragées tous les soirs au dîner.

2° *Granulé*.

Adultes : 1 grande cuillerée-mesure correspondant à 1 dragée.

Enfants : Préventif : 1 petite cuillerée-mesure par année d'âge.

Curatif : 5 fois la dose préventive.

3° *Ifranol injectable*.

Une ampoule est dosée à 0 gr. 40 de quinine.

GRIPPE

Adultes : Période aiguë : 5 dragées ou 5 grandes cuillerées-mesures par jour.

Convalescence : 3 dragées ou 3 grandes cuillerées-mesures par jour, pendant 10 jours.

Enfants : 2, puis (pendant la convalescence) une petite cuillerée-mesure par année d'âge.

Prix : Dragées : 16 fr. — Granulé : 25 fr. — Ampoules : 16 fr.

Littérature et échantillons :

VAILLANT, Pharmacien.

19, rue Jacob — PARIS (VI^e).

ILOGLANDOL « ROCHE »

Solution aqueuse stérilisée des principes actifs des flots de Langerhans.

1 cc. = 15 unités internationales.

Titrage conforme aux décisions prises par la Convention de Genève.

Activité correspondant à l'activité de l'étalon officiel de Londres.

Indications thérapeutiques :

Toutes celles de l'insulinothérapie.

Doses et modes d'emploi.

N. B. — Le médecin traitant est seul juge de la posologie et des modalités d'application de l'ILOGLANDOL « ROCHE », car le traitement insulinién est toujours conditionné par l'état général (poids) du malade et par les examens systématiques répétés de son sang et de ses urines (glycosurie, glycémie, acidose, réserve alcaline du plasma).

Doses d'urgence (Coma diabétique).

Voie endoveineuse : 1/2 à 3 cc. en 1 fois, puis 1/2 à 1 cc. toutes les heures.

Voie intramusculaire : 2 à 4 cc. en 1 fois, puis 1cc. toutes les heures.

En même temps : Sérum glucosé, sérum physiologique et bicarbonate de soude (par voies buccale, rectale, intramusculaire, endoveineuse) et tonocardiaques.

Doses habituelles (Tous autres cas).

Voie intramusculaire (intrafessière) : 2 cc. par jour (un quart d'heure à une demi-heure avant les repas) pendant 21 jours.

En même temps : Chez les diabétiques, régime alimentaire aussi riche en hydrates de carbone, graisses et albuminoïdes, que le permettra l'état du malade.

Iloglandol « Roche »

Boîte de 6 ampoules de 1 cc.

Enregistré au Laboratoire national de contrôle des médicaments sous le n° 504-14.

PRODUITS

F. HOFFMANN-LA ROCHE et C^{ie}.

10, rue Crillon — Paris (IV^e).

IMINASTHME

Médication abortive de la crise d'asthme.

Un seul comprimé d'IMINASTHME pris dès l'apparition des signes avant-coureurs de la crise d'asthme la fait avorter presque à coup sûr.

Composition :

| | |
|--------------------|-------|
| Agaricine | 0,005 |
| Théophylline | 0,10 |
| Papavérine | 0,02 |
| Caféine | 0,10 |

Thérapeutique. — Grâce à la double association Agaricine-Théophylline et Caféine-Papavérine, l'IMINASTHME a une toxicité beaucoup moindre que celle de ses composants, ce qui permet de le laisser aux mains du malade. Il agit rationnellement sur l'équilibre vago-sympathique.

En aucun cas, l'IMINASTHME ne peut être nuisible, ou contrecarrer un traitement général, car :

- 1° Il ne produit aucun effet secondaire ;
- 2° Il ménage la circulation (pas de vaso-constricteurs directs) ;
- 3° Il ne provoque pas d'accoutumance (absence de barbituriques).

Aucun produit similaire n'existe actuellement.

Posologie. — Dès les premiers symptômes faisant craindre à l'asthmatique une crise (toux, expectoration rare et gluante, etc.), prendre un comprimé d'IMINASTHME avec un peu d'eau.

Si le malade prévoit une crise nocturne, il doit prendre un comprimé le soir en se couchant et deux comprimés si les crises se déclarent habituellement à la fin de la nuit.

La boîte de 10 comprimés : 12 francs.

Littérature et échantillons :

Laboratoires SERVIER

ORLEANS. Téléphone : 31-10.

← IMMUNIZOLS

Vaccins

I. Ampoules

10. Furunculose, Ostéomyélite.
11. Entérite, Appendicite.
13. Asthme, Asthme des foin.
15. Eczéma, Psoriasis.
16. Bronchites chroniques.
17. Rhumatismes.
18. Urétrites.
19. Acné.
22. Typhoïde.

II. Bouillon-Vaccins pour pansements.

10. Furunculose et toutes staphylococcies.
24. Streptococcies.
25. Pneumococcies.
26. Colibacilloses.
31. Abscès chauds.
35. Ulcères variqueux.
36. Brûlures infectées.
41. Métrites.
50. Otites, Rhino-Pharyngites.

Prix : 20 francs.

III. Hibévé-Bouillon-Vaccin.

Concentré polyvalent à diluer pour obtenir un demi-litre de bouillon-vaccin normal.

Prix : 50 francs.

IV. Comprimés

Avec pilules adjuvantes de bile.

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 10. Furunculose - Os-téomyélite. | 22. Typhoïde. |
| 11. Entérite-Appendicite. | 31. Abscès, plaies infectées. |
| 13. Asthme, Asthme des foin. | 40. Cystites, Pyélonéphrites. |
| 15. Eczéma, Psoriasis. | 41. Métrites. |
| 18. Urétrites. | 70. Pyorrhée alvéolo-dentaire. |

Prix : 20 francs.

14, rue de Clichy

GRÉMY

Microbiens

Injectables.

- 23. Grippe.
- 24. Streptococcies, infections puerpérales.
- 31. Abscès chauds et froids, plaies suppurées.
- 34. Gangrène.
- 40. Cystites, Pyélonéphrites.
- 41. Métrites, Salpingites.
- 50. Otites, Sinusites, Rhino-Pharyngites.
- 70. Pyorrhée alvéolo-dentaire.

Prix : Amp. 2cc. 6 fr. Amp. 1 cc. 8 fr.

Immuniphages (bactériophages).

- N° 10. Toutes staphylococcies.
- N° 11. Affections intestinales.
- N° 26. Colibacillooses.
- N° 31. Infections pyogènes.

Prix : 25 francs.

Ovules à l'Immunizol n° 41

pour pansements gynécologiques.

Prix : 30 francs.

V. Immuniperos.

(Vaccins liquides pour vaccination buccale simple ou associée au bactériophage).

- 10. Furunculose.
- 11. Infections intestinales.
- 15. Dermatoses.
- 22. Fièvre typhoïde.

Prix : 30 francs et 25 francs.

VI. Immuniderm.

Pommade à l'Antivirus et au Bactériophage.

Prix : 12 fr. 50

— PARIS (IX^e).

R. C. Seine. 229.088 B.

IMMUNOVACCINS du Dr R. LAUTIER

Vaccins microbiens à puissance antigénique maximum.

Avantages. — Atoxiques, hyperactifs, injectables et ingérables, à concentration microbienne très faible permettant d'éviter toute phase négative ou réaction vaccinale.

Immunovaccin antirhumatismal injectable.

Bacille d'Achaline + entérocoques.

5 séries (I, II, III, IV, V) à doses croissantes et 1 dose d'entretien à 50 millions.

Débuter par la série II pour le rhumatisme articulaire aigu.

Débuter par la série I pour le rhumatisme viscéral, subaigu ou chronique.

Indications. — Toutes les formes cliniques de l'infection rhumatismale : Rhumatisme articulaire aigu, subaigu, myoarticulaire chronique, endocardites, myocardite, péricardite, pleurésie rhumatismale, sciatiques, névrites, névralgies rhumatismales, chorée, thyroïdites, arthritisme, dermatoses streptococciques des arthritiques.

Prix de la boîte : 30 francs.

Immunovaccin antirhumatismal pour usage oculistique injectable.

Bacille d'Achalme + entérocoques.

3 séries (I, II, III) à doses croissantes : iritis rhumatismale, choréïdites et uvéites rhumatismales.

Prix de la boîte : 30 francs.

Immunovaccin antirhumatismal à ingérer.

Bacille d'Achalme + entérocoques.

Ampoules de 5 cc. : une ampoule par jour, 20 jours par mois.

Indications. — Rhumatisme articulaire aigu ou chronique ne pouvant être traité par la forme injectable de l'Immunovaccin antirhumatismal, Manifestations douloureuses, gastro-intestinales, hépatiques, rénales des arthritiques, hypertension, insuffisance cardiaque, syndrome angineux liés à l'arthritisme.

Prix de la boîte : 30 francs.

Immunovaccin Bronchopulmonaire ingérable et injectable.

Pneumocoques, Pneumobacilles de Friedländer, Streptocoques, Micrococcus catarrhalis, Staphylocoques.

Ampoules de 5 cc. boire 1 ou 2 ampoules par jour.

Injecter 1/4 de cc. chez l'enfant.

Injecter 1/2 cc. chez l'adulte.

Injection tous les jours ou tous les 2 jours en augmentant la dose. de 1/4 de cc. à chaque injection.

Doses maxima moyennes : 2 cc.

Utilisation mixte buccale et sous-cutanée en cas d'urgence

Indications. — Prophylaxie et traitement : Rhumes, Coryza, Trachéite, Trachéo-bronchite, Bronchites, Pneumonie, Broncho-pneumonie, Congestions pulmonaires actives, Grippe et ses complications, Bronchite chronique, Emphysème, Asthme.

Prix de la boîte : 15 francs.

Immunovaccin antipyorrhéique Siva.

Pneumocoques, Pneumobacilles de Friedlander, Streptocoques, Micrococcus catarrhalis, Staphylocoques. Immunise les gencives par simple contact.

Indications. — Prophylaxie et traitement : Gingivites, Stomatites, Stomatorrhagies, Pyorrhée alvéolo-dentaire.

Prix de la boîte : 15 francs.

Ferments Immunolactiques.

500 millions de Ferments lactiques par cc.
Ampoules de 5 cc. Bactériothérapie lactique active (1 ou 2 ampoules par jour) des fermentations putrides intestinales, colibacillose, diarrhées infantiles et dermatoses.

Prix de la boîte : 15 francs.

Laboratoire des IMMUNOVACCINS

8, avenue des Sources — NICE.

INDHAMÉLINE LEJEUNE PLURIGLANDULAIRE

Médications végétale et opothérapique associé

Composition.

Principes végétaux de l'Indhaméline Lejeune simple associés aux sucs glandulaires de : Hypophyse, ovaire, surrénale et thyroïde.

Indications.

Cette forme de l'Indhaméline Lejeune est plus particulièrement indiquée dans les troubles de la ménopause et de la puberté, dans les métrites, salpingites non suppurées, ovaïtes chroniques, sclérose utérine, etc.

Mode d'emploi.

XX à XXX gouttes dans un peu d'eau avant chaque repas (20 jours par mois).

Prix : 15 francs.

Laboratoires A. LEJEUNE

142, rue de Picpus — PARIS (XII^e).

INDHAMÉLINE LEJEUNE SIMPLE

(Médication exclusivement végétale.)

Composition. — Principes actifs d'Hamamelis, marron d'Inde, condurango viburnum, anémone, sénéçon, piscidia (Alcaloïdes et principes vitaux de la plante fraîche stabilisée).

Propriétés thérapeutiques. — Régulateur de la circulation générale. Décongestif par vaso-constriction périphérique. Analgésique par action sur les terminaisons nerveuses sensibles. Tonivasculaire et sédatif utérin précieux dans la dysménorrhée. Décongestionnant ovarien, régulateur des menstrues.

Indications. — Troubles circulatoires, ménopause, varices, hémorroïdes.

Mode d'emploi. — XX à XXX gouttes dans un peu d'eau avant chaque repas (20 jours par mois).

Prix : 12 francs.

LABORATOIRES A. LEJEUNE
142, rue de Picpus — PARIS (XII^e).

INDOBERBERINE

Comprimés :

Médication polyvalente phyto-opothérapique destinée au traitement chez les individus des 2 sexes des troubles de la circulation veineuse.

Composition. — Chaque comprimé contient :

| | |
|------------------------------------|--------|
| Extrait de glandes génésiques..... | 0,01 |
| Extrait d'ovaires | 0,004 |
| Surrénine..... | 0,004 |
| Thyroïdine | 0,004 |
| Hypophysine..... | 0,0025 |
| Extrait sec de marron d'Inde..... | 0,05 |
| Extrait sec de Berbérís | 0,045 |
| Extrait sec de Viburnum..... | 0,03 |
| Extrait sec de Cupressus | 0,02 |
| Extrait sec d'Hamamélis | 0,03 |

Indications. — Varices, Varicosités, Hémorroïdes, Ulcères variqueux, Cellulite, Troubles de la Ménopause et de la Puberté, Œdème post-phlébitique.

Mode d'emploi. — 4 à 6 comprimés par jour pris 1 heure avant les principaux repas.

3 semaines de traitement ; 1 semaine de repos.

Interrompre de préférence pendant la période menstruelle.

Prix au public : 15 francs.

Laboratoire TAVERNIER
32, rue de l'Ouest — PARIS.

INFANGYL CARLIER

Composition :

| | | |
|--|----|----------|
| Thiocol, antipyrine, tolu | ââ | 0 gr. 02 |
| Benz. de Na, Eau de laurier cerise..... | ââ | 0 gr. 04 |
| Teinture de Droséra..... | | 0 gr. 08 |
| Sirop de Desessartz pour 1 cuillerée à café. | | |

Indications. — Traitement des affections des voies respiratoires des *enfants*, toux, bronchites, trachéo-bronchites, coqueluches, laryngites aiguës et striduleuses.

Propriétés. — Expectorant puissant, Calmant de la toux, Laxatif léger.

Posologie. — 4 cuillerées à café avant 5 ans (nourrissons : demi-dose), 4 cuillerées à dessert après 5 ans.

Prix : 10 francs.

Echantillons et Littérature :

Laboratoires René CARLIER
à SAINT-FLORENTIN (Yonne).

INHALATION-GARGARISME

« VOCALDOP »

Composition. — Perborate et salicylate de soude, eucalyptol, menthol.

La poudre VOCALDOP réunit en une seule prescription médicale, synthétisant la thérapeutique externe naso-pharyngienne :

une *inhalation* et un *gargarisme*.

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| 1 cuillerée à | Inhalation |
| café de + H ² O chaude = | Respiration nasale |
| Poudre | et gargarisme. |
| Vocaldop. | Bain buccal. |

L'*Inhalation-Gargarisme Vocaldop* remplace avantageusement les solutions alcooliques et les teintures (benjoin, eucalyptus, tolu). En effet, les vapeurs éthyliques sont nocives pour la Voix, l'alcool « fixe » les tissus des organes phonateurs. (Thèse de Doctorat 1924.)

Prix : 8 fr. 95.

LABORATOIRE LARYNGOLOGIQUE

222, faubourg Saint-Martin — PARIS (X^e).

INHALATION LANCOSME

Composition. — Essences naturelles à pouvoir antiseptique élevé (girofle, citron, thym, etc.) associées à la créosote de hêtre pure.

Présentation. — Liquide.

Propriétés. — Aseptise la muqueuse de l'arbre trachéobronchique et des alvéoles pulmonaires, diminue les sécrétions et l'expectoration.

Indications. — Coryza. Rhinite. Ozène. Laryngites aiguë et chronique. Trachéite. Bronchite aiguë. Emphysème pulmonaire. Grippe. Tuberculose pulmonaire.

Contre-indications. — Tuberculose aiguë à forme éréthique avec tachycardie et dans les formes congestives et fébriles avec hémoptysies.

Emploi. — Avec un inhalateur : verser la valeur de 2 à 3 compte-gouttes, goutte à goutte, dans l'eau chaude, mais non bouillante ; deux à trois inhalations par jour.

Prix : 12 fr.

LANCOSME

71, avenue Victor-Emmanuel-III — PARIS (VIII^e).

INHALO-BOL

Cornet pour inhalations

(en papier parcheminé),

Simple,

pratique,

bon marché.

Indications thérapeutiques :

Toutes affections bronchiques ou rhinolaryngologiques nécessitant une inhalation.

Prix : 5 fr.

Laboratoire de l'INHALO-BOL

32, rue de l'Ouest — PARIS.

P. TAVERNIER, Docteur en pharmacie.

INHALOL

Médication

des voies aériennes supérieures.

Composition. — Association d'essences volatiles (Isopropylmétacrésolmenthol et Cajeputol) sans alcool.

Action thérapeutique. — Antiseptique, anticongestif, analgésique.

Indications. — Coryzas, rhinites, pharyngites, laryngites, sinusites, trachéites, bronchites.

Mode d'emploi. — IV à V gouttes dans un verre d'eau bouillante en inhalations, ou quelques gouttes sur le mouchoir à titre préventif.

Prix : 12 francs.

Laboratoires BOUVELOT

62, rue d'Antibes — Cannes (A.-M.)

INHALO-SEL

Composition. — Comprimés pour inhalations à base de menthol et d'essences volatiles.

Avantages thérapeutiques. — Peu de menthol, pas d'alcool, donc pas d'irritation.

Indications thérapeutiques. — Laryngites, bronchites, rhino-pharyngites, sinusites.

Mode d'emploi. — 1 ou 2 comprimés dans un demi-bol d'eau bouillante en inhalation.

Prix : 5 fr. 50.

Laboratoire de l'Inhalo-Bol

32, rue de l'Ouest — PARIS.

P. TAVERNIER, docteur en pharmacie.

INHALOXYL

Comprimés pour inhalations. Permet une inhalation complètement exempte d'alcool et pauvre en vapeur d'eau, sans menthol.

Composition. — Les essences ont été choisies en s'inspirant des travaux de Morel et Rochaix sur le pouvoir antiseptique de chacune d'elles vis-à-vis des différentes bactéries pathogènes.

Mode d'emploi. — Dans un demi-bol d'eau tiède, mettre 1 ou 2 comprimés et respirer les gaz qui se dégagent entraînant les vapeurs antiseptiques.

Indications. — Coryza, Laryngites, trachéites, bronchites aiguës et chroniques.

Se fait aussi en huile pour instillations et pulvérisations.

Prix : 9 fr. 75 et 12 francs.

Laboratoires G. WARIN

4, Chaussée de la Muette — PARIS (XVI^e).

“ INNERCLEAN ”

Composition. — Algue de Java, Thé de santé, Herbes aromatiques en plantes coupées menues.

Indications ou Propriétés. — Espèces laxatives aromatiques pour le traitement spécial de la constipation.

Posologie ou mode d'emploi. — Un tiers de cuillerée à café. Augmenter graduellement cette dose si nécessaire.

Pour le prendre, la meilleure façon est de le déposer sur la langue et de l'avaler à l'aide d'un peu d'eau fraîche.

Pour les Enfants et les Bébés, commencer par une très petite quantité, en tenant compte de leur âge.

Prix, en France : 10 fr.

Dépôt général pour la France :

« EVANS DRUG STORE »

J. M. RICARDOU, Docteur en Pharmacie

46, rue Pierre-Charron — PARIS (VIII^e).

INOGYL

Complexe buvable d'extrait placentaire et d'extrait orchitique désalbuminé et délipodé.

Indications. — Tous les troubles liés à une insuffisance ovarienne partielle ou totale : Aménorrhée, Dysménorrhée, Ménopause, Castration.

Action. — Réapparition et régularisation des règles, diminution de la douleur, sédation des troubles ménopausiques secondaires.

Posologie. — 1 à 3 ampoules par jour, selon l'intensité des troubles. A prendre dans un liquide, à jeun ou très loin des repas.

Présentation. — La boîte de 10 ampoules buvables de 5 cc. : 18 francs.

Laboratoires du Docteur DEBAT

60, rue de Monceau — PARIS (VIII^e).

INOLÈNE

Solution concentrée de Coaltar de *saveur agréable*.

Propriétés. — Antiseptique puissant. Décongestionnant, cicatrisant rapide. Innocuité absolue. Réaction alcaline.

Indications. — Gingivites, stomatites, pharyngites, amygdalites, angines, abcès, fistules dentaires, soins post-opératoires Hygiène de la bouche. Soins de la gorge et du nez.

Mode d'emploi :

Lavages : 2 à 3 cuillerées à café par litre d'eau.

Gargarismes : *Bains de bouche* : XX à XXX gouttes dans un verre d'eau chaude.

Badigeonnages : pur ou au demi.

Inhalations.

Dentifrice : X à XX gouttes dans un verre d'eau.

Prix : le flacon, 15 francs.

SPÉCIALITÉS INOLÈNE

Inolène simple : Rhino-Laryngo-Stomatologie. (Voir ci-dessus.)

Inolène vaseline (Nasolène) : Antisepsie des fosses nasales.

Inolène thymolé : Antisepsie générale. (Injections, pansements 2 à 3 cuill. à café par litre d'eau).

Inolène ovules : Gynécologie.

Inolène pommade et Inolène poudre : Dermatologie.

Laboratoires ODILIA

E. LACOMBE, Pharmacien.

42, rue du Mont-Cenis — PARIS (XVIII^e).

INORÉNOL

Extrait désalbuminé et délipoidé de rein.

Deux formes : buvable et injectable.

Indications. — Toutes celles de l'opothérapie rénale : Albuminurie, Urémie, Uricémie, Arthritisme, Rhumatismes, Néphrites aiguës ou chroniques.

Résultats. — Augmentation de la diurèse et de l'élimination des chlorures, de l'acide urique et de l'urée; abaissement de la concentration de l'albumine urinaire.

Posologie. — 1 à 2 ampoules par jour, à jeun ou loin des repas, pendant des cures de 12 jours, alternées avec des périodes de repos de 10 jours.

Présentation :

La boîte de 6 ampoules buvables de 10 cc. : 28 francs.

La boîte de 10 ampoules injectables de 5 cc. : 34 fr.

Laboratoires du Docteur DEBAT

60, rue de Monceau — PARIS (VIII^e).

INORHINYL

Antivirusthérapie des affections rhino-pharyngées. Bouillon antivirus pour instillations nasales de cultures de streptocoques, staphylocoques, microcoques, pneumocoques, etc.

Indications. — Le coryza aigu ou chronique, toutes les affections rhino-pharyngées, prévention de la grippe, etc.

Posologie. — 1 à 3 instillations par jour.

Présentation. — La boîte de 6 ampoules de 3 cc. : 15 francs.

**Institut de Séro et Vaccinothérapie
de Garches, INSÉVA.**

151, 153, 155 rue de Buzenval — GARCHES.

Echantillons :

60, rue de Monceau, PARIS (VIII^e).

INOSEPTA

Pommade aux antivirus de streptocoques, staphylocoques, b. pyocyaniques.

Traitement des pyodermites, furoncles, acné, impetigo, toutes lésions cutanées infectées.

Le tube : 14 francs.

Le 1/2 tube : 8 francs.

FILTRAT INOSEPTA

Présentation en ampoules du même bouillon antivirus, pour pansements locaux.

La boîte de 6 ampoules de 10 cc. : 22 francs.

INOSEPTA AURICULAIRE

Filtrat des mêmes cultures obtenu en partant de souches prélevées exclusivement sur des infections auriculaires.

Furunculose du conduit auditif, otite, mastoïdite, etc.

La boîte de 10 ampoules de 2 cc. : 18 francs.

INOSEPTA OPHTALMIQUE

Pommade à base de filtrat de cultures de streptocoques, staphylocoques, b. pyocyaniques, bacilles de Morax, pneumocoques de Fraenkel.

Traitement des blépharites, conjonctivites, orgellets, dacryocystites, toutes les infections oculaires.

Le tube avec embout : 10 francs.

INOSEPTA PUERPÉRAL

Filtrat de cultures de streptocoque puerpéral pour traitement préventif et curatif des fièvres puerpérales. En tamponnement ou injections vaginales.

La boîte de 6 ampoules de 20 cc. : 35 francs.

**Institut de Séro et Vaccinothérapie de Garches,
INSÉVA.**

151-153-155, rue de Buzenval — GARCHES.

Echantillons : 60, rue de Monceau — PARIS (VIII^e).

INOTYOL

Pommade adoucissante, réductrice et cicatrisante. Traitement de toutes les affections cutanées ou irritations de la peau : eczéma, ulcères, prurits, érythèmes, rougeurs des nouveau-nés.

POUDRE INOTYOL

Toilette des bébés, prévention des rougeurs.

Présentation :

Pommade INOTYOL : le 1/2 tube : 5 fr. 50.

— — — Le tube : 9 fr. 50.

— — — Le quadruple tube :
25 francs.

Poudre INOTYOL. La boîte poudreuse :
5 fr. 50.

Laboratoires du Docteur DEBAT

130, rue de Monceau — PARIS (VIII^e).

INOXYL

Pâte dentifrice anti-pyorrhéique, à base de cultures de streptocoques, staphylocoques, pseudo-diptériques, proteus, entérocoques, diplococcus pharyngis flavus, micrococcus, provenant d'infections buccales.

Traitement des gingivites, stomatites, pyorrhées, caries, etc.

Mode d'emploi. — En friction énergique avec une brosse à dents, 2 fois par jour ou plus.

Présentation. — Le tube : 6 francs.

INOXYL-VACCIN

Présentation du même bouillon pour instillations ou injections.

Mêmes indications.

Présentation. — La boîte de 10 ampoules de 1,5 cc.
15 francs.

**Institut de Séro et Vaccinothérapie de Garches,
INSÉVA**

151-153-155, rue de Buzenval — GARCHES.
Echantillons : 60, rue de Monceau — PARIS (VIII^e).

INSÉVACCIN

INSÉVACCIN ANTICOLIBACILLAIRE

Vaccin buvable de cultures nombreuses de colibacilles contenant 30 milliards de bacilles coli par ampoule de 5 cc.
Traitement des colibacilloses.

Présentation :

La boîte de 10 ampoules buvables de 5 cc. :
20 francs.

INSÉVACCIN ANTITYPHOÏDIQUE

T. A. B.

Vaccin buvable préventif des fièvres typhoïdes et para-typhoïdes.
Prendre une ampoule par jour, pendant 3 jours consécutifs, à jeun, le matin 1/4 d'heure après l'absorption d'une des pilules de bile jointes à la boîte.
La boîte de 3 ampoules buvables de 10 cc. :
20 francs.

INSÉVACCIN INTESTINAL :

Traitement des gastro-entérites, diarrhées, etc.

Adultes :

La boîte de 8 ampoules de 10 cc. : 24 francs.

Enfants :

La boîte de 8 ampoules de 5 cc. : 18 francs.

Nourrissons :

La boîte de 12 ampoules de 1 cc. : 16 francs.

**Institut de Séro et Vaccinothérapie
de Garches, INSÉVA.**

151, 153, 155, rue de Buzenval
GARCHES.

Echantillons :

60, rue de Monceau, PARIS (VIII^e).

INSTITUT PASTEUR

SÉRUMS :

Antidiphtérique, antitétanique, antistreptococcique, antiméningococcique, antidysentérique, anticharbonneux, antipneumococcique, antipesteux, antigrangréneux.

Sérums desséchés :

Antidiphtérique, antitétanique.

Sérums purifiés et concentrés :

Antidiphtérique, antitétanique.

Sérums antivenimeux :

E. vipères d'Europe ; A. N. serpents africains ; A. O. serpents Afrique occidentale et équatoriale ; C. serpents Inde et Egypte.

VACCINS :

Antidiphtérique, antitétanique, antipesteux, anticholérique, antityphoïdique et antipara (T. A. B.), antigonococcique, antistaphylococcique (furunculose), antistaphylococcique (ostéomyélite), antipyogène, antipneumonique, antiméningococcique, B. C. G., B. C. G. = S. C.

Extrait d'antigène tuberculeux méthylique. Tuberculine.

Les sérums et vaccins ne sont délivrés qu'aux Droguistes et aux Pharmaciens.

C'est à ces derniers que doivent s'adresser exclusivement les Médecins et le Public.

Institut PASTEUR

22, rue Dutot — PARIS.

INSULANOL

Pommade à l'Insulyl.

Mode d'action. — Agit en applications locales par l'Insuline qu'elle renferme, que les malades soient ou non diabétiques.

Indications. — 1° Ulcères variqueux et plaies atones ;
2° Prurits de toute nature ;
3° Hémorroïdes ;
4° Brûlures.

Mode d'emploi. — En onctions sur les parties malades.

Recouvrir les plaies d'un pansement aseptique.

Prix : 15 francs.

Laboratoires du D^r ROUSSEL

97, rue de Vaugirard — PARIS (VI^e).

R. C. 18.000. Tél. : Littré 68-22, 23, 24.

INSULINE

Voir **ENDOPANCRINE**

Page 642

Voir **POUDRE ET POMMADE
D'INSULINE PHYLOZE**

Page 1248

**Laboratoire
de l'Endopancrine**

48, rue de la Procession — PARIS (XV^e).

Téléph. : Ségur 26-87 et 76-82

INSULINE BUCCALE FORNET

Principe actif :

Extrait des îlots de Langerhans du Pancréas.

Présentation :

Concentration III (Pilules rouges : 4 unités par pilule).

Concentration I (Pilules vertes : 1 unité par pilule).

Posologie :

3 pilules 3 fois par jour, strictement une 1/2 heure avant les repas.

Indications :

Tous les cas justiciables de l'Insuline (cas graves exceptés). (Glycosurie, anorexie, amaigrissement, vomissements incoérables, acétoniques, etc...)

L'Insuline Fornet est utilisée sous ses deux formes (pilules et pommade) dans tous les hôpitaux de Paris.

Observations :

Avoir toujours recours à la concentration forte au début du traitement.

Prix : 49 francs et 25 francs.

Vente et Échantillonnage :

Laboratoire de Microbiologie

23, rue du Caire — PARIS (II^e).

Gutenberg : 03.45

INSULINE BYLA

Adoptée par les hôpitaux.

Purifiée, débarrassée des matières salines et protéiques de la glande.
Présentée sous deux formes injectables :

- 1° *Insuline Byla* (poudre) soluble dans l'eau, enfermée dans des ampoules stériles de 2 cc. contenant 5 ou 15 unités internationales. Chaque ampoule est accompagnée d'une ampoule de sérum physiologique servant à dissoudre l'insuline au moment de l'injection.
- 2° *Insuline Byla liquide*, en flacon de 5 cc. à 100 unités (20 u. par cc.) et en flacon de 5 cc. à 200 unités (40 u. par cc.). En boîtes de 12 ampoules de 1 cc. à 5, 10, 20 et 40 unités par ampoule.

Indications. — Traitement du diabète et de toutes ses manifestations.

Posologie moyenne. — 15 à 60 unités et davantage, par jour.

Traitement des plaies atones :

Pommade à l'Insuline Byla — Poudre à l'Insuline Byla

L'*Insuline Byla* est titrée en unités internationales, conformément à la décision du Comité d'Hygiène de la Société des Nations.

Envoi sur demande de la notice détaillée.

Prix :

Ampoules 5 unités : 12 fr. — 10 unités : 21 fr. — 20 unités : 39 fr.

Solution à 100 unités : 15 francs. — 200 unités : 28 francs.

Pommade. Poudre : 15 francs.

Les Établissements BYLA

26, avenue de l'Observatoire — PARIS.

INSULINE « LEO »

Décret d'autorisation du 8 juillet 1931 (Cette autorisation ne garantit pas l'efficacité du produit).

Indications. — Diabète, cures d'engraissement.

Forme. — Ampoules de 5 cc. contenant 100 u. i.

(1 cc. — 20 u. i.).

Ampoules de 5 cc. contenant 200 u. i.

(1 cc. — 40 u. i.).

Mode d'emploi. — En injections sous-cutanées, intramusculaires ou intraveineuses, suivant l'indication du médecin.

L'*Insuline « Leo »* ne contient aucun antiseptique, sa stérilité est absolue, les injections en sont indolores et son activité est constante grâce à sa teneur régulière en u. i.

LA SERINGUE SPÉCIALE « LÉO »

grâce à ses deux graduations permet de mesurer la dose exacte d'*Insuline* directement en unités.

Valentin AAGE MOLLER

149, rue du Palais-Gallien — BORDEAUX

Dépositaire et Pharmacien Garant pour la France :

Jean DEDIEU, pharmacien

39, rue Fondaudège — BORDEAUX

INSULYL

Autorisé par l'Académie de médecine.

Adopté dans les Hôpitaux.

Produit de la sécrétion interne du pancréas.

Action. — Abaisse la glycémie, permet l'utilisation des hydrates de carbone ingérés.

Indications. — 1° Diabète et ses complications ; 2° Athrepsie des nourrissons ; 3° Acidose ; 4° Cure d'engraissement.

Formes. — 1° Boîte de 10 ampoules de 1 cc. environ, chacune renfermant 20 unités ; 2° Boîte de 5 ampoules de 1 cc. à 40 unités par ampoule ; 3° Tube de 5 cc., chaque centicube contenant 20 unités.

Doses. — En moyenne une ampoule en injection intramusculaire avant chaque repas.

Il est nécessaire d'associer la cure diététique à la cure d'Insulyl.

Prix :

La boîte d'ampoules : 28 francs.

Le tube de 5 cc. : 15 francs.

Laboratoires du Dr ROUSSEL

97, rue de Vaugirard — PARIS (VI^e).

Tél. : Littré 68-22, 23, 24.

INTRAIT DE MARRON D'INDE DAUSSE

Préparation conservant intacts les principes actifs de la semence fraîche (stabilisation par le procédé Perrot-Goris). Vaso-constricteur veineux spécifique des *Hémorroïdes*, *varices*, *phlébites*.

Forme. — *Solution d'Intrait de marron d'Inde*: X gouttes = 0 gr. 01 d'Intrait.

Mode d'emploi. — *Usage interne*: V gouttes, matin et soir de *solution d'Intrait de marron d'Inde Dausse*.

Prix : 16 francs.

INTRAIT DE STROPHANTHUS

Préparation de *Strophanthus gratus* conservant intacts tous les principes actifs de la semence fraîche. (Stabilisation par le procédé Perrot-Goris). Toni-cardiaque puissant.

Formes. — *Solution d'Intrait de Strophanthus*: X gouttes renferment un milligr. d'Intrait.

Ampoules d'Intrait de Strophanthus dosées à un milligr. d'Intrait par cc.

Indications. — Dans tous les cas d'insuffisance cardiaque, chez les cardiaques vrais, chez les cardiopéniques et toutes les fois que la Digitale ne réussit pas.

Posologie. — *SOLUTION D'INTRAIT*: Dose d'entretien cardiotonique: V gouttes par jour pendant 15 jours.

Dose antiasystolique. — XX à XXX gouttes en une fois.

AMPOULES D'INTRAIT — Exclusivement par *voie intramusculaire*: 1/2 à 1 ampoule, en cas de collapsus cardiaque imminent.

Prix : 10 francs.

INTRAIT DE VALÉRIANE DAUSSE

Préparation dépourvue d'odeur et conservant intacts les principes actifs de la racine fraîche (stabilisation par le procédé Perrot-Goris).

**Antispasmodique,
sédatif du système nerveux.**

Forme. — *Solution d'Intrait de Valériane Dausse*.

Indications. — *Insomnie* d'origine nerveuse due à un éréthisme sensoriel ou cérébral.

Nervosisme, *irritabilité nerveuse*, *affections spasmodiques*, *dermatoses prurigineuses*, *chorée*, *tics*, *convulsions infantiles*.

Posologie. — *Solution d'Intrait de Valériane*: 2 à 3 cuillerées à café par jour. Doubler la dose si nécessaire.

Prix : 13 francs.

Laboratoire DAUSSE
4, rue Aubriot — PARIS (IV^e).

INTRAIT DE PASSIFLORE COMPOSÉ

Préparation d'intrait de Passiflore associé à l'intrait de Valériane, à l'Aubépine et au Gelsémium Dausse titré physiologiquement.

Propriétés. — Calmant de l'excitation cérébrale. Antispasmodique. Modérateur de l'éréthisme cardiaque. Sédatif nervin.

Indications. — Affections spasmodiques ; palpitations cardiaques réflexes ; états anxieux ; insomnies d'origine nerveuse.

Posologie et mode d'emploi. — Régulateur du système nerveux : 2 cuillerées à café avant chacun des 2 principaux repas.

Calmant des insomnies nerveuses :

Enfants : 1 à 2 cuillerées à café le soir au coucher.

Adultes : 1 à 2 cuillerées à dessert.

Prix : 15 francs.

Laboratoires DAUSSE

4, rue Aubriot — PARIS (IV^e).

IODALOSE GALBRUN

Gouttes titrées renfermant 5 centig. d'iode par centim. cube. Première combinaison directe de l'iode avec la peptone. Communication au XIII^e Congrès international de médecine de Paris (1900).

Remplace Iode et Iodures dans toutes leurs applications internes, sans iodisme.

Arthritisme. — **Goutte.** — **Rhumatisme.**
— **Artério-sclérose.** — **Maladies du cœur et des vaisseaux.** — **Affections glandulaires.** — **Rachitisme.** — **Goitre.**
— **Fibrome.** — **Syphilis.** — **Obésité.**

Pour les adultes : XX à LX gouttes par jour.

Pour les enfants : V à XX gouttes par jour.

Prix de vente au public : 14 fr. 50.

Laboratoire GALBRUN

8 et 10, rue du Petit-Musc — PARIS (IV^e).

IODAMELIS LOGEAIS

Formule :

Véritable combinaison définie, en gouttes concentrées, d'iodo-iodure de potassium (forme la plus active de l'iode thérapeutique) et d'hamamélidine (extrait glycé-
riné total d'hamamélis sans alcool). La combinaison
de ce tannoglucoside et du lugol donne naissance à
un iodotannin complexe dont l'activité pharmaco-
dynamique est incomparable.

Propriétés :

Modificateur circulatoire total. — Par son hamamélidine,
chez les hypertendus veineux, cyanotiques, vari-
queux ;

Par son iodo-iodure de potassium, chez les artério-
scléreux, uricémiques, hypervisqueux ;

Décongestionnant, vaso-dilatateur et hypotenseur, dimi-
nuant la viscosité sanguine et améliorant la circulation
périphérique et en retour.

Modificateur de la nutrition. — Excitant les défenses de
l'organisme et oxydant les déchets et albumines patho-
logiques ou de néoformation.

Indications :

Toutes les affections vasculaires, artérielles et veineuses :
Artério-sclérose, Hypertension, Pléthore des hyper-
visqueux, Cyanose des hypotendus, Obésité, Jambes
en poteau, Varices, Hémorroïdes, Asthme, Emphy-
sème, Bronchite chronique, Troubles circulatoires de
la Puberté et de la Ménopause, etc...

Posologie :

| | | |
|---------------|---|---------------------------|
| L gouttes | { | 0,03 Iode. |
| d'Iodamélis = | | 0,20 Iodure de Potassium. |
| | | 0,20 Hamamélidine. |

Doses :

De 20 à 40 gouttes aux deux principaux repas, dans
un peu d'eau (Vichy, de préférence).

Tolérance parfaite, pas d'iodisme.

Prix : Un flacon (1 mois de traitement) : 18 francs.

Laboratoires Jacques LOGEAIS

BOULOGNE-SUR-SEINE, près PARIS.

Tél. : Auteuil 40-15 et 40-16.

IODARSENIC GUIRAUD OU GOUTTES PAIDOPHILES

du Docteur Guiraud
Ex-Pharmacien des Hôpitaux de Bordeaux

Formule. — Solution stable au centième (procédé spécial) de triiodure d'arsenic, chimiquement pur, dans l'eau distillée.

Indications. — Tous engorgements ganglionnaires, Lymphatisme, Rachitisme, Scrofuleuse, Emphyseme, Asthme, Bronchites à répétition, Adénopathie, Trachéo-bronchite, Adénites en général, Kératites phlycténulaires, Affections de la peau (Eczémas, Impetigo, Psoriasis, Urticaire...). Enfin, toutes les fois que la médication iodée ou iodurée est mal supportée.

Posologie. — Enf. de 6 mois à 2 ans II à X gouttes par jour
— 2 ans à 8 ans IV à XX —
— 8 ans à 15 ans IV à XXX —
Adultes X à XL —

à prendre en se conformant à la notice jointe à chaque flacon, dans un peu d'eau, ou de lait sucré, au moment des deux principaux repas.

Présentation. — Flacon compte-gouttes 45 gr.

Prix : 14 francs.

Echantillons et littérature:

Laboratoire de l'IODARSENIC GUIRAUD

10, impasse Milord — PARIS (XVIII^e). — Tél.: Marcadet 37-98.

IODASEPTINE CORTIAL

Composition. — (Iodobenzométhylformine) contenant 42 p. 100 d'iode, soluble dans l'eau, dialysable, injectable, sans réaction locale ou générale. Tolérance sans réserve.

Propriétés thérapeutiques. — Dérivées de la nature de ses composants; iode et antiseptiques (Formol de l'Hexaméthylène tétramine et groupe Phényl des corps benzolés). Antiseptique général des infections chroniques ou parasitaires: Rhumatismes, Tuberculose (jamais d'hémoptysie), Adénopathies, Paludisme, Spirillose, Puissant tonique du cœur.

Prép. pharm. Posologie. — Ampoules: A. 2 cc., B. 5 cc., C., 10 cc., par voie intraveineuse ou intramusculaire à doses progressives.

Tuberculose (doses faibles): 2 à 5 cc.

Rhumatismes chroniques (doses fortes): 5 à 20 et même 25 cc. *pro die*.

Gouttes: XXX à C par jour (enfants: XX à L).

Prix:

Ampoules A. 2 cc. 18 francs — Ampoules B. 5 cc. 24 francs

— C. 10 cc. 36 francs — Gouttes, le flacon, 16 francs

Iodaseptine salicylée.

Dans les rhumatismes aigus ou subaigus en injections intraveineuses ou intramusculaires joint à l'effet Iodaseptine l'action salicylée. Tolérance parfaite. Supplée le traitement salicylé à haute dose qui ne peut être continué longtemps.

Ampoules de 5 cc. et de 10 cc. — Solution gouttes.

Doses. — Une ampoule matin et soir en injection intraveineuse. ou intramusculaire.

50 à 100 gouttes par 24 heures en deux fois.

Prix: ampoules 5 cc. 26 francs

— ampoules 10 cc. Boîtes de 4 et 10 ampoules. 16 et 38 francs

— solution, le flacon. 18 francs

Laboratoire CORTIAL. — 7, rue de l'Armorique — PARIS.

IODASSIUM

Composition. — Solution iodo-iodurée répondant à la formule du Lugol d'une stabilité parfaite, édulcorée, anisée et préparée avec de l'iode et de l'iodure de potassium de tout premier choix. Pas d'inconvénients d'iodisme.

Propriétés thérapeutiques. — Toutes les indications de l'iode et de l'iodure de potassium : bronchite chronique et emphysème pulmonaire ; tuberculose osseuse, ganglionnaire ; syphilis à toutes les périodes ; artério-sclérose ; vertiges ; insuffisance thyroïdienne : maladie de Basedow ; obésité ; troubles circulatoires de la ménopause ; asthme ; ulcères variqueux ; maladies mycosiques : sporotrichose actinomycose, trichophyties cutanées, kérion ; lymphogranulome suppuré ; angines de toutes natures (badigeonnages et *per os*)

Posologie — Une cuiller à café de cette solution contient 5 cgr. d'iode métalloïde et 10 cgr. d'iodure de potassium.

Adultes :

Dose faible : 2 cuillerées à café par 24 heures.

Dose moyenne : 2 à 6 cuillerées à café par 24 heures.

Dose forte : 6 à 12 cuillerées à café par 24 heures.

Enfants :

De X à L gouttes matin et soir, c'est-à-dire de X gouttes à une demi-cuillerée à café matin et soir, et plus suivant tolérance.

Mode d'emploi. — A prendre dans n'importe quel liquide, mais de préférence dans du lait sucré, immédiatement avant les repas.

Laboratoire G. WARIN

4, chaussée de la Muette — PARIS (XVI^e). Tél. : Auteuil 18-30

IODAUBÉPINE

Etabli sur des bases scientifiques contrôlées par une longue expérimentation chimique, l'**Iodaubépine** constitue à l'heure présente le remède qui donne les résultats les plus heureux dans les maladies dues à l'altération des cellules et des humeurs de l'organisme.

Par sa composition (association du Crataegus et de l'iode combiné avec la peptone), à laquelle sont dues ses propriétés toniques, sédatives et vaso-dilatatrices, l'**Iodaubépine** en même temps qu'il active les échanges de notre économie, en facilite l'élimination des toxines. Son emploi est particulièrement indiqué dans les Maladies du Cœur et des Vaisseaux, l'Artério-Sclérose l'Angine de Poitrine, l'Asthme et l'Emphysème, la Néphrite interstitielle et l'Obésité, le Goitre et les diverses affections glandulaires.

Doses (sauf avis spécial du Médecin).

Adultes : XX à XXV gouttes 3 fois par jour dans un peu d'eau sucrée ou non.

Enfants : V à X gouttes 3 fois par jour.

Dépôt principal :

Laboratoires ADLER

36, rue des Francs-Bourgeois — PARIS

Détail dans toutes les pharmacies.

IODÉINE MONTAGU

(Iodhydrate de Codéine.)

Propriétés. — Action calmante de la toux, régularisateur du rythme respiratoire, anti-dyspnéique, facilite l'expectoration.

Indications. — Toux, Emphysème, Asthme.

Formes pharmaceutiques :

Sirop. — 0,03 cgr. d'Iodéine par cuillerée à soupe. 15 francs.

Dose : 1 à 3 cuillerées par jour.

Gouttes. — X gouttes = 0,01 cgr. d'Iodéine crist. 15 francs.

Dose : X à XL gouttes, 3 fois par jour, dans un peu d'eau sucrée.

Pilules. — 0,01 cgr. d'Iodéine par pilule. 12 fr. 50.

Dose : 4 à 8 pilules par jour.

Ampoules (0,02 cgr.) : 2 à 3 par jour. 15 francs.

Laboratoire MONTAGU

49, boulevard de Port-Royal — PARIS.

IODENTÉROL

Iode métalloïdique et iodure de potassium en *solution* alcoolique, et *poudre* iodophile (substances amylacées et calcifiantes) assurant : 1° la tolérance parfaite de l'iode pur par la voie stomacale ; 2° la calcification simultanée de l'organisme.

Indications. — Toutes les manifestations de la bacilliose extra-viscérale : adénopathies, synovites, ostéites, etc...

Formes et doses. — *Gouttes* administrées par la voie entérale ou digestive, selon un régime progressif jusqu'à quantités massives.

Prix n° 1 : 20 francs. — N° 2 : 28 francs.

Établissements GALLINA

4, rue Candolle — PARIS (Ve).

IODE TULASNE

Iode assimilable en pilules.

Nouvelle préparation stable et inaltérable de la peptone iodée contenant une forte proportion d'iode actif libéré seulement dans l'intestin et permettant un traitement iodé intensif et prolongé sans le moindre symptôme d'intolérance ni la moindre fatigue.

Formule. — Peptone iodée spécialement préparée. Chaque pilule contient 2 cgr. 1/2 d'iode actif et correspond à 10 gouttes de peptone iodée normale.

Avantages. — Les pilules d'Iode Tulasne glutinisées ne sont dissoutes que dans l'intestin, d'où protection de l'estomac et efficacité supérieure. Elles n'ont ni goût ni arrière-goût.

Elles sont facilement transportables. Le traitement iodé qui demande en général à être assez prolongé est donc grandement facilité. Jamais d'iodisme. Tolérance parfaite.

Indications. — Toutes celles de l'iode et des iodures : ARTÉRIO-SCLÉROSE, HYPERTENSION, EMPHYSEME, LYMPHATISME, GOUTTE, RHUMATISME, OBÉSITÉ.

N. B. — L'Iode Tulasne s'est montré particulièrement actif dans l'*Obésité féminine*. Traitement facilité par la forme pilulaire.

Doses moyennes. — De 2 à 6 pilules par jour, en 2 fois, avant les repas. Pour les enfants 1/2 doses.

Prix. Le tube : 12 francs.

Laboratoires BOUILLET

48, boulevard des Batignolles — PARIS.

IODEX

Toutes les propriétés thérapeutiques de l'iode libre, aucun des inconvénients de la teinture d'iode.

Iodex simple.

Pommade renfermant 5 p. 100 d'iode éminemment absorbable. Excellent résolutif exempt d'iodures alcalins et de substances irritantes. Ses principales indications : adénopathies, oreillons, goitres, impétigos, trichophyties, furoncles, traumatismes.

Prix : 12 francs.

Iodex au Salicylate de Méthyle.

Iodex combiné à 5 p. 100 de salicylate de méthyle. Analgésique et résolutif. Préconisé dans les douleurs articulaires, rhumatismes, lumbagos, pleurites, points de côté, névrites, entorses.

Prix : 12 francs.

Iodex liquide.

Formule non irritante d'iode à 2 p. 100 pour la médication externe. Efficacité et sécurité en oto-rhino-laryngologie (pulvérisations ou badigeonnages), en gynécologie (tamponnements vaginaux, instillations intra-utérines), et en chirurgie (pansements des plaies opératoires, brûlures).

Prix : 12 fr. 50.

Echantillons et Littérature :

Laboratoires RISSA

46, rue Claude-Lorrain — LILLE.

IODHÉMA

Iodo - alcoolate - méthyle - benzyle d'hexaméthylène tétramine, en solutions aqueuses (43 p. 100 d'iode assimilable).

Indications :

Toutes les formes du rhumatisme chronique.

Formes :

- 1° *Ampoules* de 5 cc. (16 fr.) et de 10 cc. (30 fr.) ;
1 ou 2 par jour (veines et tissus), en boîtes de 10 ;
- 2° *Flacons* (30 fr.) (voie entérale ou digestive), 1 ou
2 cuillerées à café par jour dans de l'eau sucrée
entre les repas.

Mêmes présentations pour :

- 1° *Iodhéma M* (Méthyle pur) indiqué dans la goutte
aiguë et chronique (14 et 28 francs) ;
- 2° *Iodhéma B* (Benzyle pur) utilisé dans les infec-
tions urinaires et hépatiques (20 et 35 francs).

Établissements GALLINA

4, rue Candolle — PARIS (V^e).

IODINJECTOL JAMMES

Médication iodée intensive indolore.

Composition. — Iodure de formine benzosodique :
20 cgr. par ampoule de 3 cc.

Indications. — Celles de l'iode et des iodures.
IODINJECTOL salicylé (Iodinjectol + 20 cgr. de
salicylate de soude).

Action rapide et énergique sur les crises aiguës de
tous. Rhumatismes. Sciatique.

Posologie des trois formes :

Une injection intramusculaire ou intraveineuse
par jour

IODINJECTOL gouttes : 60 à 100 gouttes par jour.

Prix au public :

Ampoules : 20 francs. Gouttes : 16 francs.

Laboratoires JAMMES

86, rue Michel-Ange — PARIS (XVI^e).

iodo-BISMUTHATE DE QUININE FRAISSE

Composition :

Iodo-Bismuthate de Quinine : 0 gr. 20;
huile d'olive : 4 cc.

Indications :

Dans toutes les formes de la syphilis.
Traitement ordinaire : 30 à 35 ampoules,
dont une tous les trois jours.

Prix de la boîte de 6 ampoules : 18 francs

Laboratoires FRAISSE

8, rue Jasmin — PARIS.

iodo-BISMUTH ERCÉ

Iodo-bismuthate de quinine.

Forme. — Ampoules-seringues auto-injectables, pour injections intramusculaires.

Avantages sur les préparations analogues.

- 1° Trois fois *moins* d'excipient à injecter.
- 2° Suspension *stable* permettant d'éviter une agitation longue et pénible.
- 3° Suppression du transvasement toujours difficile d'une suspension huileuse.
- 4° *Résorption parfaite.*

Indications. — Syphilis à toutes ses périodes.

6 amp. ser. à 0 gr. 04. Prix : 20 francs.

6 amp. ser. à 0 gr. 08. Prix : 24 francs.

Laboratoires ROBERT et CARRIÈRE

37, rue de Bourgogne — PARIS.

IODOCALCIUM

La forme moderne du Sirop Iodotannique.

Présentation :

Deux formes : Sirop concentré ; Gouttes.

Composition. — Une cuillerée à café d'Iodocalcium Sirop ou vingt gouttes Iodocalcium Gouttes renferment :

Chlorure de calcium pur..... 0 gr. 20

Iode en combinaison organique..... 0 gr. 02

Indications. — Toutes celles de l'iode et du calcium. Etats de fatigue physiologique de l'enfance et de l'adolescence, pré tuberculose, tuberculoses osseuses et ganglionnaires, micropolyadénopathie, etc...

Posologie :

Enfants au-dessus de 2 ans : 1/2 à 1 cuillerée à café de sirop, ou 10 à 20 gouttes de la forme gouttes, 2 fois par jour.

Adultes : 1 cuillerée à café de sirop ou 20 gouttes, 2 fois par jour.

Mode d'emploi. — Les gouttes doivent être prises dans un peu d'eau sucrée. L'Iodocalcium se prend au début des deux principaux repas.

Laboratoires biologiques de l'Île de France.

19, avenue d'Orléans. — Paris (XIV^e).

IODOGÉNOL PÉPIN

Peptone iodée spéciale.

Remplace Iode et Iodures sans Iodisme.

Propriétés. — Très grande proportion d'iode substitué (25 %) :

Absence d'acide iodhydrique libre.

Grande stabilité des iodures organiques.

Saveur agréable. Tolérance absolue.

Indications. — Artériosclérose. Hypertension. Arthritisme, etc...

Posologie. — XL à LX gouttes par jour, en deux fois, dans un peu d'eau, au début des deux principaux repas.

Prix : 15 francs.

Laboratoires PÉPIN ET LÉBOUCQ

COURBEVOIE (Seine).

Tél. : Défense 09-71.

IODOMAÏSINE

Globules.

Combinaison directe de l'*Iode* et d'une *Albumine* d'origine strictement *végétale*.

Propriétés particulières. — Absence d'albumoses ou de peptones d'origine animale. Aucune toxicité. Tolérance absolue même à hautes doses. Suppression complète de l'iodisme. Aucune désagrégation dans l'estomac. Action directe par solubilité uniquement intestinale.

Indications. — Maladies infectieuses, tuberculose, affections parasitaires, syphilis, affections cardio-vasculaires, artériosclérose, arthritisme, obésité, carence organique d'iode, tumeurs, insuffisance thyroïdienne, goîtres, asthme, emphyseme, engorgements ganglionnaires, lymphatisme, rhumatisme, goutte. Puissant adjuvant des médications reminéralisantes.

Posologie. — Chaque globule contient un cgr. d'iode actif. Quatre globules correspondent comme effet thérapeutique à un gramme d'iodure alcalin. *Enfants* : 4 à 6 globules par jour. *Adultes* : 6 à 10 globules et au delà par jour en deux fois, avant les repas.

Prix : 15 francs.

Enregistré au Laboratoire National N° 218-3.

IODOMAÏSINE

Pommade

Iodo-Maïsine incorporée à un excipient spécial totalement exempt de vaseline ou de lanoline inabsorbables.

Propriétés particulières. — Pénétration intradermique complète. Teneur élevée en principe iodé actif. Absence de toxicité. Suppression de l'iodisme et de l'irritation locale. Efficacité 15 à 20 fois plus grande qu'une pommade iodée ou iodurée au même titre. Aucune coloration des téguments.

Indications. — Adénites, engorgements glandulaires, goîtres, sporothricoses, arthrites, lymphangites, ostéites dermatoses sèches, eczémas secs, psoriasis, affections rhino-pharyngiennes. Toutes affections justiciables d'un traitement iodé ou ioduré local.

Mode d'emploi. — Frictions (ou onctions) matin et soir sur la région choisie pendant deux ou trois minutes jusqu'à absorption complète. Aucun pansement consécutif.

L'*Iodo-Maïsine pommade* est présentée en *tube*. Une section de deux centimètres de longueur sortant du tube correspond à un centigramme d'iode complètement assimilable.

Prix : 15 francs.

Établissements SUDAN

48, rue d'Alésia — PARIS (XIV°).

Enregistré au Laboratoire National N° 218-4.

IODOMÉTINE

Solution concentrée et titrée d'iodométhylate d'hexaméthylène tétramine.

Combinaison organique d'iode soluble et assimilable, V gouttes représentent 1 centigramme d'iode ; XX gouttes agissent comme 1 gramme d'iodure alcalin.

Propriétés thérapeutiques. — Excitateur puissant des fonctions lymphoïdes, déterminant une hyperleucocytose intense. Agent anti-infectieux énergique par son radical hexaméthylène tétramine.

Indications. — Toutes affections glandulaires. Adénites, Végétations adénoïdes, Scrofulides, etc., Maladies de la nutrition, Goutte, Rhumatismes chroniques, Sciatique, Asthme, Emphysème, etc.

Posologie. — *Adultes* : XX à LX gouttes par jour.
Enfants : V à XX gouttes par jour.

Prix : 12 francs.

Laboratoire E. HAUTDIDIER

37, rue Galilée — PARIS (XVI^e).

IODONE ROBIN

Combinaison physiologique d'iode et de peptone de viande de boeuf.

Gouttes : XX gouttes correspondent comme effet thérapeutique à 1 gr. d'iodure de potassium.

Doses et mode d'emploi. — X à LX gouttes à prendre en 2 fois aux repas dans un peu de boisson.

Propriétés thérapeutiques. — Dépuratif, reconstituant assimilable, non toxique, tolérance parfaite, jamais d'iodisme.

Indications. — Maladies par ralentissement de la nutrition, artério-sclérose, obésité, polysarcie, dégénérescence graisseuse, intoxications chroniques, asthme, emphysème, rhumatisme, arthritisme, goutte, tertiarisme.

Prix : 16 fr. 50.

Laboratoires ROBIN

13, rue de Poissy — PARIS.

IODONESYL

(Gouttes)

Complexe organo-iodo-magnésien.

Formule. — 10 p. 100 Iode métalloïdique dynamisé par la présence de réducteurs hydrocarbonés et du magnésium.

Action. — L'Iode sous cette forme élective, administrée à dose élevée sans iodisme, stimule l'activité du tissu lymphoïde, réalise l'atténuation directe *in vivo* des toxines microbiennes.

Son action est alors analogue à celle d'un vaccin d'une valence strictement adéquate. Résultats cliniques surprenants.

Indications. — Toutes les indications de l'iode, en particulier *infections aiguës*, Grippe, Angines, Pneumonie, Otites, Rhumatismes, Dermatoses.

Posologie. — Doses d'attaque pour infections aiguës : deux cuillerées à café à 2 heures l'une de l'autre, puis XXX gouttes 2 fois par jour dans un peu d'eau sucrée.

Prix : 20 francs.

Laboratoires REVEL

34, rue Saint-Lazare — PARIS (IX^e).

IODONUCLÉOL

Iode organique soluble (orthoïodobenzoate de soude).

Forme. — Gouttes.

Odeur et saveur agréables. Pas de manifestations d'iodisme.

Indications. — Hypertension, Artériosclérose, Emphysème, Asthme, Obésité, Adénites, etc.

Doses. — XX gouttes avant chaque repas dans un peu d'eau, 2 ou 3 fois par jour.

Prix : 12 francs.

Laboratoire P. MAUCHANT

à GENNEVILLIERS (Seine)

iodo-salva EVESQUE

Composition. — Iode assimilable, Benzoate de soude, Teinture de Digitale, Teinture de Lobellie, *Alcaloïdes totaux du café.*

Propriétés thérapeutiques. — Médication de choix contre l'Asthme et l'Emphysème, et il est employé avec le plus grand succès dans les maladies des voies respiratoires, en général celles des bronches.

Forme et mode d'emploi. — *Asthme* : Accès moyens et mineurs, dès le début de l'accès. Crises majeures, à la fin quand la phase spasmodique violente est terminée. A la dose de 1 à 2 cuillerées à café par jour, 1/2 dose pour les enfants. On peut fractionner.

Emphysème et bronchite chronique. Il faut l'employer d'une façon subcontinue à la dose d'une cuillerée à café par jour.

Prix : 16 francs.

Dépôt général : O. C. P.
71, rue du Temple — PARIS.

Littérature et échantillons :
10, rue de Belfort — RENNES (Ille-et-Vilaine).

IODOTENSYL DUBOIS

Forme. — Dragées.

Composition :

| | |
|----------------------------------|---------|
| Di-iodhydrate de Spartéine | 5 cgr. |
| Benzoate de Benzyle | 10 cgr. |
| Extrait de Bourdaine | 3 cgr. |
| Excipient | 10 cgr. |

Par dragée.

Indications. — Hypertension, Artériosclérose, Asthme, Angine de poitrine et Spasmes divers. Troubles fonctionnels de l'âge critique chez les deux sexes.

Mode d'emploi. — *Adultes* : 3 à 5 dragées par jour, de préférence avant les repas.

Enfants : 1 à 3 dragées par jour selon l'âge.

Prix : 16 francs.

Laboratoires DUBOIS

R. Dubois, Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.
16, boulevard Péreire — PARIS (XVII^e).

IDO-THYROÏDINE CATILLON

Forme :

Tablettes de Catillon à 0,25 de Corps Thyroïde, titré, stérilisé.

Indications :

Obésité, Goitre, Myxœdème, Dermatoses.

Doses :

1 à 2 contre Myxœdème ; 2 à 8 contre Obésité, Goitre, Herpétisme, Ostéogénèse.

Prix : 12 fr. 50.

Laboratoire CATILLON

3, boulevard Saint-Martin, PARIS (III^e).

IODURASE

Description. — Capsules glutinisées contenant :

Iodure de potassium pur ... 0 gr. 50

Levurine extractive 0 gr. 10

Action thérapeutique. — La même que celle de l'iodure, mais sans iodisme, grâce à l'action spécifique de la levurine et à l'enrobage qui ne libère l'iodure que dans le milieu alcalin de l'intestin. Dosage rigoureux, conservation indéfinie et facilité d'absorption.

Indications. — 1 à 6 capsules par jour dans l'artériosclérose, l'asthme, l'emphysème, l'arthritisme, la syphilis, le goitre, l'obésité, le saturnisme.

Prix : 30 francs.

Laboratoires Ch. COUTURIEUX

18, avenue Hoche — PARIS.

IODURE D'AMIDON LUMIÈRE

Antiseptique doux à action prolongée.

Ni irritant, ni toxique.

Propriétés. — Pouvoir antiseptique élevé, réalise une antiseptie douce et continue, due à sa faculté de dégager lentement, au contact des sécrétions humorales, de l'iode à l'état naissant.

Infections gastro-intestinales (Dyspepsies, Entérites, Entéro-Colites, Flatulences, Diarrhées, Dysenterie).

Formule. — 1 flacon pilules Iodure d'amidon Lumière.

Dose. — *Adultes* : 6 à 12 pilules par jour.

Usages externes. — *Pansements et chirurgie* : La Pâte et la Poudre possèdent un pouvoir antiseptique prolongé, par dégagement lent de l'iode à l'état naissant.

Pansement Lumière : L'usage combiné de l'Iodure d'Amidon Lumière (pâte ou poudre) et *Tulle gras* Lumière, constitue un pansement dit Pansement Lumière, adopté par beaucoup de chirurgiens, l'Iodure d'Amidon Lumière entretient un état prolongé d'antise. sie. On obtient ainsi des cicatrisations d'une rapidité surprenante.

Formuler. — 1 tube de Pâte Iodure d'Amidon Lumière. 1 flacon de Poudre Iodure d'amidon Lumière.

Prix : *Pâtes Pilules* : 8 francs. — *Poudre* : 11 francs.

LABORATOIRES LUMIERE

45, rue Villon — LYON.

IODURES PACHAUT

chimiquement purs

Tubes dosés d'Iodure de potassium à faire dissoudre au moment de l'emploi. — Conservation parfaite.

Présentation :

Tubes dosés à 0 gr. 25, 0 gr. 50, 1 gr., 2 gr. et 3 gr.

Prix : à 0,25 : 12 fr. 50. — à 0,50 : 17 fr. 50.
à 1 gr. et 2 gr. : 25 francs.
à 3 gr. : 37 fr. 50.

Laboratoires PACHAUT

130, boulevard Haussmann — PARIS.

Téléph. : Laborde 16-72

IONYL

Médication bio-énergétique complète.

Composition. — Complexes phospho-marins, Acide phosphorique physiologique, Magnésium et Manganèse glycéro-phosphoriques activés et vitalisés par solution et combinaison en milieu marin.

Action thérapeutique et indications :

- 1° Stimulant, réparateur et neurotonique (Surmenage physique et intellectuel, Asthénies, Dépressions fonctionnelles, Usure sénile).
- 2° Oxydant et modificateur de la nutrition (Troubles alcalosiques, Arthritisme, Phosphaturie, Scléroses, Anoxémie).

Action immédiate. — Innocuité absolue.

Posologie. — XX gouttes (dose moyenne) au milieu des deux principaux repas, en dilution dans un verre de boisson quelconque.

Prix : 15 francs.

Littérature et échantillons :

Laboratoires LA BIOMARINE
DIEPPE (Seine-Inférieure).

IRÉNINE GONNON

Composition. — Cachets dosés à 0 gr. 71, à savoir : 0 gr. 53 d'Irénine proprement dit (combinaison fixe cristallisable de pyramidon, analgésine, phénacétine), 0 gr. 13 de sulfate de quinine, 0 gr. 05 de caféine.

Indications. — Spécifique des douleurs violentes et rebelles, névralgies, maux de tête, rages de dents, migraines, crises de rhumatisme, fièvres, grippe, influenza, douleurs périodiques, accès de goutte, etc...

Posologie. — 1, 2 ou 3 cachets par jour.

Toujours toléré par l'estomac, pas de vertiges.

Prix : 8 fr.

Produits GONNON

14, rue Victor-Hugo — LYON.

IRRASTÉRINE

Vitamine D. Standardisée.

Adoptée par les Hôpitaux.

Solution — Chocolatés.

Composition. — Ergostérine pure irradiée aux rayons ultra-violet, en solution dans l'huile d'olives, sans aucune addition de cholestérine.

Propriétés thérapeutiques. — Véritable catalyseur du calcium et du phosphore, l'Irrastérine peut être considérée comme la médication spécifique du rachitisme et de tous les troubles du métabolisme phospho-calcique.

Indications. — Traitement spécifique du rachitisme, de la tétanie et de tous les états spasmophiles. Troubles de l'ossification, Caries dentaires, Ostéomalacie, Prétuberculose et tous états de déminéralisation.

Dose et mode d'emploi. — *Solution huileuse* (1 goutte = 200 unités rat) jusqu'à 1 an, X gouttes; de 1 à 10 ans, XX gouttes; adolescents, adultes, XXX gouttes. — *Chocolatés* (1 chocolaté = 3 000 unités rat) 1 à 3 par jour.

Prix :

Solution : 15 francs. — *Chocolatés* : 18 francs.

Les Établissements BYLA

26, avenue de l'Observatoire — PARIS.

ISACÈNE « ROCHE »

Laxatif synthétique nouveau.

Action thérapeutique. — L'Isacène « Roche » est la diacétyldioxyphénylisatine, insoluble dans l'eau et l'acide chlorhydrique, soluble seulement dans le milieu alcalin du côlon, où se constitue la constipation. Action douce, constante, sans coliques, sans épreintes et sans ténésme. Rigoureusement atoxique.

Indications thérapeutiques. — Tous les cas de constipation sans aucune exception.

Posologie et mode d'emploi :

Adultes. Dose laxative moyenne : 2 à 4 granules.

Enfants. 1/4 ou 1/2 dose, selon l'âge et le cas.

ISACÈNE « ROCHE »

Flacon de 40 granules.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le numéro 504-19.

Produits

F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie

10, rue Crillon — PARIS (IV^e).

ISALAXINE

Puissant laxatif.

Pas de coliques. Pas d'accoutumance.

Composition. — Charbon activé « adsorbant », Bile totale, Entérokinase, Alginoïdes mucilagineux, Diacétyl diphénolisatine.

Le *charbon activé « adsorbant »* et *fixatif* a la propriété d'absorber 30 à 50 fois son poids et de restituer intégralement ce qu'il a absorbé quand on le place dans des conditions déterminées, d'où son nom de « charbon adsorbant » (absorbe et rend).

Le *Diacétyl diphénolisatine* est un laxatif nouveau, régulateur des selles, pas du tout irritant pour la muqueuse gastrique et dont l'action excito-motrice sur le gros intestin est d'une constance à toute épreuve.

Indications. — Entéro-colite muco-membraneuse, Hémorroïdes, Constipation chronique, Entérite chronique, Affection du foie.

Posologie. — 1 à 3 comprimés par jour, le soir au coucher ou avant le repas, dans un peu d'eau. Avaler sans croquer.

Prix : 12 francs.

Laboratoires BRICHARD et fils
BAR-LE-DUC (Meuse).

ISONAL

MÉTHYL ÉTHYL PHÉNYL MALONYLURÉE

Sédatif nerveux sans aucune toxicité.

L'intervalle entre l'effet sédatif et l'effet toxique est beaucoup plus grand que pour tout autre substance connue. Convient à tous les nerveux, n'entrave en rien la capacité de travail.

Indications. — Dépression nerveuse. Etats anxieux. Angoisse et palpitations. Insomnie. Surmenage. Nervosisme. Névroses et troubles convulsifs.

Présentation :

Tube de 20 comprimés titrés à 0 gr. 10.

— 30 — — à 0 gr. 05.

— 60 — — à 0 gr. 01.

Prix au public : 7 fr. 50 le tube.

Posologie. — Dans les cas d'éréthisme nerveux : Administrer 10 à 20 cgr. par jour en 8 ou 10 reprises.

Chez les *enfants* : 2 cgr. par année d'âge, en doses réfractées.

Chez les *nourrissons*, la dose quotidienne correspond à 0,01 par semestre d'âge.

Dans les troubles convulsifs des adultes et l'épilepsie, le traitement d'attaque nécessite chez l'adulte l'emploi de doses importantes variant de 0 gr. 30 à 0 gr. 80 par jour. Pour le traitement d'entretien on pourra les réduire par tâtonnement à condition qu'elles soient réparties en plusieurs prises.

Laboratoires du Docteur ROUSSEL
89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI^e).

ISOTONYL BOURET

(Poudre de Lausanne.)

Action.

L'Estomac dilue ou concentre son contenu de façon à lui faire atteindre toujours le point cryoscopique de 0,38, nécessaire pour que le chyme franchisse le pylore.

L'Isotonyl Bouret aide l'estomac à remplir cette condition. Il stimule la fonction sécrétrice des glandes gastriques, neutralise le suc gastrique hyper-acide, assure l'évacuation gastrique.

Formes et mode d'emploi.

Paquets, 1 pour 1 litre. Discoïdes, 2 pour 1 verre.

Adultes : 1 à 3 verres par jour.

Enfants : 1/2 verre à Bordeaux à 2 verres par jour.

Après les repas, au moment des douleurs ou pesanteurs et le matin à jeun, 1/2 heure avant le petit déjeuner.

Prix au public : 13 francs.

Pharmacie CHAUMEL

87, rue Lafayette — PARIS (IX^e).

ISPAGHUL TROUETTE-PERRET

Phytothérapie gastro-intestinale.

Mucilage naturel des Semences sélectionnées et triées
du Plantago Decumbens.

Traitement idéal de la constipation.

Avantages. — L'Ispaghul « Trouette-Perret » est un produit naturel d'une innocuité absolue et d'une tolérance parfaite. Son mode d'action est exclusivement mécanique.

L'Ispaghul « Trouette-Perret » réédue l'intestin et facilite son travail biologique normal. C'est un lubrifiant.

Indications. — Constipation sous toutes ses formes, Digestions lentes et difficiles, Gastro-Entérites, Insuffisance biliaire.

Mode d'emploi. — L'Ispaghul se prend sous la forme de fines semences dont l'absorption est très facilement acceptée. On les prend pures à sec dans de l'eau ou dans un breuvage quelconque.

Doses :

Adultes : Une cuillerée à soupe à chacun des principaux repas, midi et soir.

Enfants : Une cuillerée à café ou à dessert, suivant l'âge à chacun des deux principaux repas.

Littérature et échantillon sur demande aux : Prix : 12 francs.

Laboratoires CONDOU et LEFORT

61, avenue Philippe-Auguste — PARIS (XI^e)

IXIUM

Solution isotonique stérilisée de Thorium X
pour usage médical.

(Injections intramusculaires profondes
ou intraveineuses).

Principales utilisations et posologie du Thorium X

| <i>Affections traitées.</i> | <i>Doses de thorium X employées.</i> | <i>Marche et durée du traitement</i> |
|--|---|---|
| Rhumatismes chroniques Spondylose rhizomélisque | Commencer par 50 à 80 microgrammes et augmenter progressivement de 20 jusqu'à la dose de 150 à 200 micros. | 8 injections, au rythme d'une injection par semaine. |
| Goutte | Débuter par des doses légères, en dehors des crises douloureuses, — de 50 à 200 micros environ, par augmentations progressives de 20. | 8 injections, au rythme d'une par semaine. |
| Psoriasis | 1 ^{re} injection : 50 mgr. 2 ^e injection : 100 mgr. les 6 dernières : 150 mgr. | 8 injections, au rythme d'une par semaine. |
| Névrite Sciatique | Débuter par 50 à 80 microgrammes et augmenter progressivement de 20 jusqu'à 150 à 200 micros. | 8 injections, au rythme d'une injection par semaine. |
| Anémie Chlorose Neurasthénie | De 25 à 75 microgrammes, par augmentations successives. | 8 injections, au rythme d'une injection par semaine. |
| Leucémies Maladie de Hodgkin et Tumeurs | Commencer par 100 microgrammes pour arriver à 350 par augmentations successives de 25 microgrammes. | 5 à 10 injections, au rythme d'une injection par semaine. |

Il est bien entendu que les doses ci-dessus peuvent être modifiées au gré du médecin et que les séries peuvent être renouvelées après un intervalle d'environ 2 mois de repos.

Toutes les doses sont exprimées en microgrammes de bromure de radium.

Prix de vente réglementé à 30 p. 100.

Tarifs sur demande.

L'Ixium est préparé à Paris tous les mardis par la

Société Générale d'Applications Thérapeutiques

THERAPLIX

R. MOREUX, Pharmacien

Ancien interne des hôpitaux

93, rue de Sèvres — PARIS (VII^e).

JABOSULFÈNE

JABOrandi + hypoSULFite

« Le désensibilisant de choix ». Modifie le « terrain » et régularise le vague.

Pilules glutinisées à 0 gr. 25 d'hyposulfite de Na chimiquement pur et 0 gr. 02 de poudre de feuilles de Jaborandi stabilisée.

Doses. — 4 à 12 pilules glutinisées par jour au milieu des 3 repas.

Indications. — Toutes manifestations anaphylactiques : Urticaire, Œdème de Quincke, Prurits, Dermatoses récidivantes. Asthme, Migraine, Rhume des foins. Toutes insuffisances hépatiques.

Action. — Très grande activité due à la glutinisation qui évite la destruction de l'hyposulfite dans l'estomac et permet son action en nature au contact de l'épithélium intestinal.

La boîte de 60 pilules glutinisées : 16 francs.

Ampoules de 10 cc. pour injections intraveineuses.

La boîte de 10 ampoules : 27 francs.

Laboratoires pharmaceutiques L.-G. TORAUDE
22, rue de la Sorbonne — PARIS (V°).

JECOFLUYL HARDY

Drainage hépatique, anaphylaxie alimentaire.

Forme la plus agréable, la plus active, grâce à son absorption facile.

Une mesure de granulé (2 gr. 40) contient environ :

| | |
|---|----------|
| Sulfate de Magnésie desséché | 1 gr. 20 |
| Hyposulfite de Soude sec | 0 gr. 12 |
| Hyposulfite de Magnésie | 0 gr. 12 |
| Polypeptones (viande, œuf, poisson) | 0 gr. 24 |

qui, associés à un extrait de bouillon, permettent, par simple dissolution dans une demi-tasse d'eau chaude, d'obtenir un bouillon de saveur agréable.

Indications. — Intolérance digestive, Engorgement du foie et de la vésicule biliaire. Inappétence, Nausées, Insomnies, Obésité, Troubles hépatiques de l'arthritisme, Goutte, Maladies hépatiques des pays chauds.

Posologie. — Prendre le matin à jeun, dans une demi-tasse d'eau chaude, de 1 à 2 mesures de granulé. Attendre ensuite 20 à 30 minutes pour prendre le petit déjeuner.

Prix : 16 francs la boîte, assurant 15 jours de traitement quotidien.

Laboratoires PAUL HARDY

Docteur en Pharmacie

Ancien interne des Hôpitaux,

42, boulevard Saint-Marcel — PARIS (V°). — Tél. : Gob. 36-96.

JÉCOL

L'auxiliaire physiologique du foie.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des médicaments sous le n° 223-2.

La déficience du foie étant la cause initiale de nombreux états morbides, l'effort thérapeutique doit porter sur la cellule hépatique qu'il convient de stimuler afin d'en rétablir le délicat fonctionnement.

Par son action progressive et douce, le Jécol se classe au premier rang des médicaments destinés à traiter l'hépatisme sous toutes ses formes :

Congestion et Insuffisance du foie, Gastro-entérite, Entérite muco-membraneuse, Auto-intoxication, etc.

Formule. — *Combretum* (extrait spécialisé de kinkélibah).

Boldo (extrait aqueux).

Evonymus (extrait titré).

Forme. — Petits cachets.

Prescription. — 1 ou 2 cachets à la fin de chaque repas. — 3 à 6 semaines.

Cette dose pourra être augmentée ou diminuée chaque semaine, suivant les résultats constatés, par le médecin traitant, chez le malade.

Prix en France : 13 fr. 50

LABORATOIRE DU JÉCOL

3, rue Watteau — COURBEVOIE (Seine)

JÉCOPEPTOL

Indications. — Toutes affections gastro-hépatiques. Calme immédiatement. Effet durable par usage régulier.

Composition. — Association de 2 formules : l'une *gastrique* : poudre magnéso-bismuthée avec adjonction de silice absorbante spéciale. L'autre *hépatique* : cholagogue et désinfectante des voies biliaires.

Forme. — Poudre d'une extrême finesse, sans toxique, d'un goût excellent, d'un prix modique.

Posologie. — 1 cuillerée à soupe de poudre dans un verre d'eau après les principaux repas.

Laboratoires S. I. C. A.

R. MICHY, Pharm.

13, rue Beudant — PARIS (XVII^e).

Wagram : 75-75.

JEMALT WANDER

A base d'huile de foie de morue et d'extrait de malt à l'état de paillettes.

Composition. — Huile de foie de morue, 30 p. 100, Extrait de malt, 64 p. 100 ; Cacao, 6 p. 100 ; Essences aromatiques, Q. S.

Indications. — Le jemalt réalise la médication à l'huile de foie de morue renforcée des éléments nutritifs et digestifs (diastases) de l'Extrait de malt. Anémie en général. Croissance des enfants.

Doses. — Enfants jusqu'à 2 ans, 1 à 2 cuillerées à café par jour.

Enfants plus âgés, adolescents et adultes : 3 à 6 cuillerées à café par jour.

Se prend le matin, le soir, ou entre les repas tel que (il fond rapidement dans la bouche), ou dilué dans du lait tiède ou dans une infusion.

La boîte : 12 francs.

P. BASTIEN, pharmacien.

CHAMPIGNY (Seine).

JOUVAMELYS

Ovarine, Hamamélis total, Rhubarbe, fer et phosphates assimilables. Insuffisance ovarienne. Troubles de la puberté et de la Ménopause. 1 à 3 cachets par jour.

La boîte : 17 francs.

Laboratoires GAMBY-WISSE

Place de l'Hôtel de Ville
SALON-DE-PROVENCE
(Bouches-du-Rhône).

JUGLAND GMET

Composition. — Extrait total *sans alcool ni sucre* des feuilles de noyer (*Juglans regia*) présenté sous forme *liquide* plus actif que les pilules.

Propriétés. — Toni-dépuratif, anti-diabétique, reminéralisant (fixateur du calcium).

Indications. — Acné juvénile, furonculose, lymphatisme, scrofule, pré tuberculose, ostéomalacie, tuberculoses osseuses, rachitisme (remplace l'huile de foie de morue et le sirop iodotannique). *Diabète* sous toutes ses formes et dans toutes ses complications

Posologie. — Peut être donné à tous. Aucune contre-indication ni incompatibilité dans eau, lait, vin rouge (auquel il donne un goût de malaga).

Enfants : 1 à 2 cuillerées à café par jour.

Adultes : 1 à 3 cuillerées à café par jour.

Diabète : Pour obtenir la disparition de la glycosurie, on peut doubler la dose progressivement.

Prix. Le flacon de 133⁻⁻⁻cc. : 18 francs.

Laboratoire GMET

27, rue du Faubourg-Montmartre
PARIS (IX^e).

JUGLANE

Composition. — Principe actif du noyer sauvage.

Indications. — Toutes les formes du diabète et ses complications : acidose, acétonémie, en particulier les diabètes gras, arthritiques, hépatiques. Aucune contre-indication, tolérance parfaite, innocuité absolue, aucune incompatibilité.

Mode d'emploi. — 3 à 4 pilules avant chacun des trois repas. Cette dose peut être doublée sans inconvénient. Continuer progressivement le traitement jusqu'à complète disparition du sucre dans les urines.

Prix en France : 15 fr. la boîte de 150 pilules.

L. N. C. n° 257-1.

Produits Euthérapiques

Camille CONS, Anc. Int. des Hôpitaux de Lyon
12, rue des Ecoles — CHAMBÉRY (Savoie).

JUGLANREGINE ANDRÉ

Iodotannique phosphaté à base de feuilles de noyer, fraîches et sèches.

Indications. — Lymphatisme, tuberculose, reminéralisation, anorexie, états asthéniques, convalescence, hypothyroïdie, diabète.

Présentation. — Elixir très agréable au goût.

Dose. — 2 à 3 cuillerées (à bouche ou café, suivant âge) par jour.

Prix en France : le grand flacon : 17 francs.
Enregistré au Laboratoire National des Médicaments : 556-1.

Laboratoires BADEL

58-60, rue des Moulins — VALENCE (Drôme)

JURANOL

Huile sulfurée naturelle du Jura.

Huile d'origine animale fossile, très riche en soufre, extraite d'une roche du massif montagneux du Jura.

Réparateur puissant des tissus, décongestif, calmant, antiseptique, léger, antiprurigineux. Ni irritant, ni toxique. Ne tachant pas.

JURANOL, POMMADE A 10 p. 100.

Indications. — Plaies, brûlures, dermatoses (acné, eczéma, impétigo), périphlébites, hémorroïdes, ulcères, engelures, crevasses, etc...

Mode d'emploi. — Pansements, onctions, massages.

Présentation :

Tubes de 30 gr. : 6 francs.

Tubes de 50 gr. : 9 francs.

JURANOL, LIQUIDE A 10 p. 100.

(Soluté à l'huile d'olive stérilisée.)

Indications. — Chirurgie (plaies infectées, fractures ouvertes, ostéomyélites, abcès, pnégmons, lymphangites), urologie (cystites, urétrites), gynécologie, dermatologie, séborrhée, coryza.

Mode d'emploi. — Instillations, injections dans les drains ou trajets fistuleux, pulvérisations, compresses, tampons vaginaux.

Présentation. — Flacon de 60 cc. : 11 francs.

JURANOL, COLLODION A 10 p. 100.

Indications. — Traitement abortif des pyodermites, piqûres d'insectes, petites plaies, gerçures.

Mode d'emploi. — Badigeonnages.

Présentation. — Flacon de 8 cc. : 7 francs.

JURANOL, OVULES A 3 p. 100.

Indications. — Leucorrhées, vaginites, métrites, congestions pelviennes.

Mode d'emploi. — 1 ovule le soir au coucher.

Présentation. — Boîtes de 6 ovules : 15 francs.

Laboratoires du JURANOL

32, rue Guyot — PARIS.

KALMIGRAINE

Elixir calmant concentré.

Spécifique de la douleur.

Composition. — 10 cc. contiennent :

| | |
|------------------|-------------------|
| Codéine | 0,005 |
| Stovaine | 0,007 |
| Caféine | 0,08 |
| Salipyrine | 0,10 |
| Pyramidon | 0,40 |
| Liquueur..... | Q. S. pour 10 cc. |

Propriétés. — Puissant calmant de la douleur, agréable à prendre, très actif, bien toléré par l'estomac, rapidement assimilé. Soulage en quelques minutes.

Indications. — Céphalées, Migraines, Odontalgies, Névralgies, Rhumatismes, Torticolis, Lumbago, Goutte, Sciatique, Dysménorrhée, Zona, Cystite, Fièvre, Grippe.

Posologie :

De 8 à 15 ans : une demi à une cuillerée à café.

Adultes : Une à deux cuillerées à café, à prendre en cas de souffrance et renouveler au besoin 2 à 3 fois en 24 heures.

Présentation soignée en flacon de 120 cc. au prix de : 10 frs. 50

Laboratoires MEUNIER, Pharmacien
Lauréat 1^{er} prix de la Faculté de Montpellier,
MONTMARAULT (Allier)

KALMOBROL

(Spécialité absolument française.)

Composition. — Extrait de bouillon bromuré à base de bromure de sodium très pur.

Doses. — 1 cuillerée à café : 1 gr. de bromure de sodium.

Indications. — Tous les cas les plus divers d'Excitation nerveuse (Insomnie, Neurasthénie, etc., etc.).

Mode d'emploi. — Verser dans une tasse d'eau très chaude le nombre prescrit de cuillerées à café. On obtiendra immédiatement un délicieux bouillon que l'on absorbera bien chaud, soit au début du repas, soit à n'importe quel moment de la journée.

Prix : 16 francs.

Laboratoires du KALMOBROL
S. A. R. L.

C. CHAMARD et R. NIEL, Pharmaciens
3, rue Royet. — LYON-Caluire.

KAOBROL

Composition. — Bromure de sodium et Poudres absorbantes. Kaolin, carbonate de magnésie, carbonate de chaux, gomme pour homogénéiser la poudre.

Poudre blanche de saveur agréable, sucrée et aromatisée à la menthe.

Indications. — Toutes les dyspepsies, plus spécialement hyperchlorhydriques et nerveuses. Troubles digestifs de la femme enceinte. Gastro-entérites. Aérophagie.

Sédatif puissant de toutes douleurs gastriques.

Posologie. — Une cuillerée à café après les repas et au moment des crises douloureuses.

Littérature et Echantillons à Messieurs
les Docteurs.

Prix : 12 fr. 50.

Laboratoire du KAOBROL

J. LAROZE, Pharmacien

54, rue de Paris — CHARENTON (Seine).

Tél. : Entrepôt 01-41.

KAOLINASE

Pour pansements gastriques.

Kaolin purifié, en poudre fine très adhésive, lavé et stérilisé.

Dose et mode d'emploi. — 1 ou 2 paquets le matin à jeun (*détail* sur prospectus).

Propriétés thérapeutiques. — Le KAOLIN constitue le médicament de choix pour le *plâtrage* de l'estomac (Prof. Hayein, A. M., 13-5-1920).

Indications. — Gastralgies, Hyperchlorhydrie, Ulcères et ulcérations de l'estomac, Colites, Fermentations gastro-intestinales, etc.

La boîte de 20 paquets de 10 gr. : 12 fr.

Echantillons gratuits :

Laboratoires G. BEYTOUT

12, boulevard Saint-Martin — PARIS (X^e).

Tél. : Nord 76-85.

KAVIASE

Pilules et suppositoires.

Le sédatif de la douleur dans la sphère génito-urinaire dépourvu de toute toxicité.

PILULES :

Sédatif, antiseptique, diurétique.

Composition et mode d'action. — La Kaviase est une association de Macropiper-Methysticum (connu sous le nom de Kawa-Kawa) et de Formine).

Principes actifs. — La Kaviase et la Jenkonine lui confèrent les propriétés suivantes : Action sédatif et analgésique s'étendant à tout l'appareil génito-urinaire. Action diurétique puissante et antiseptique.

Avantages. — La Kaviase n'est pas un basalmique. Dépourvue de tout stupéfiant, est absolument *non toxique*. Pas d'accoutumance, aucune intolérance gastrique ou rénale. Ni odeur ni coloration des urines.

Indications. — Cystites, Prostatites, Urétrites, Pyélonéphrites, Orchites, Métrites et Salpingo-Ovarites.

6 à 8 pilules par jour, maximum 12.

Prix : 15 francs.

SUPPOSITOIRES

Toutes les algies ano-rectales et pelviennes.

Le plus puissant sédatif. Décongestif.

Ne contenant aucun stupéfiant ni *barbiturique*.

Indications. — Prostatites, Hémorroïdes, Règles douloureuses, Coliques néphrétiques, Douleurs du bas-ventre, Prurit anal, etc.

1 à 2 par jour.

Prix : 15 francs.

Laboratoire de la KAVIASE

76, avenue d'Italie — PARIS.

KENOL**Compensateur intestinal.**

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Extrait duodéal total | 0 gr. 045 |
| — billaire total purifié .. | 0 gr. 045 |
| — Gladiolus ceruleus.... | 0 gr. 019 |
| — Evony. atropur..... | 0 gr. 019 |
| Mag de soufre purifié | 0 gr. 035 |
| pour un comprimé-dragée. | |

Propriétés thérapeutiques. — Rétablit l'équilibre des sécrétions intestinales. Agit sur le péristaltisme. Action antiseptique puissante.

Indications. — **Constipation**, Affections hépatiques, Cholécystites, Dermatoses, Auto-intoxication.

Doses. — 1 à 3 dragées au repas du soir ou 1 à 2 à chaque repas. Avaler sans croquer. Action évacuante douce, activité constante. Pas d'accoutumance.

Prix au public : 10 fr.

A. MILLET et CH.-O. GUILLAUMIN

5, rue Ambroise-Thomas — PARIS.

KEPHEDRYL

A base d'Éphédrine naturelle.

Formule :

| | | |
|---------------------------|-------|--------|
| Éphédrine naturelle | 1 | p. 100 |
| Eucalyptol | 0,50 | — |
| Camphre | 0,30 | — |
| Huile de Paraffine | 98,20 | — |
| | 100 | p. 100 |

Indications :

Le Képhédryl est indiqué dans toutes les affections du nez :

Coryzas inflammatoires ou spasmodiques,
Catarrhe nasopharyngien, Rhume des
foins, Sinusites, Otites, Asthme.

**C'est un merveilleux traitement abortif
du rhume de cerveau.**

Posologie :

5 à 6 gouttes dans chaque narine 3 ou 4 fois
par jour.

Présentation :

La capsule compte-gouttes forme bouchon
permettant ainsi l'emploi du Képhédryl
dans les meilleures conditions d'asepsie.

Prix : 11 fr. 50.

Peut être prescrit aux Assurés Sociaux.

C'est un remède efficace et économique.

Laboratoires du KEPHEDRYL

Guy ELIE-MANTOUT, Pharmacien.
3, rue Scribe — PARIS.

KERLACTINE

Composition. — Pilules kératinisées d'acide lactique pur de ferment (principe actif de tous les ferments lactiques comprimés ou liquides) enrobées selon un procédé spécial et nouveau, qui permet de libérer l'acide lactique dans l'intestin seulement, à l'endroit précis où doit se produire sa puissante action.

Indications. — Entérites, Entéro-colites, Diarrhées, Dysenterie, Fermentations, Dermatoses d'origine intestinale, Auto-intoxications, Grippe intestinale, Entérites des Tuberculeux.

Posologie. — 5 à 6 pilules à la fin des deux principaux repas.

Pas de contre-indication.

Echantillon et littérature sur demande.

Prix : 12 francs l'étui de 60 pilules.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des médicaments sous le n° 346-7.

Marc PARIS, Pharmacien de 1^{re} Classe
1, rue Lassalle — LYON (La Boucle) (IV^e).

KIDOLINE

Huile adrénalinée au millième.

Indications.

- 1) Coryza aigu du nourrisson chez lequel la kidoline permet l'alimentation en rétablissant en partie la perméabilité nasale.
- 2) Adénoïdite aiguë de l'enfance ; décongestionne puissamment les muqueuses, modifie la nature des sécrétions et permet l'usage *utile* de sels argentiques qui sans cela pénètrent trop insuffisamment.
- 3) Accès de faux croup.
- 4) Rhinites aiguës avec menace de sinusite.

Mode d'emploi.

Chez les nourrissons instiller à la fois V à VI gouttes dans chaque narine 5 minutes avant la tétée.

Chez l'enfant : 4 fois par jour instiller VI à X gouttes. Tolérance parfaite. Aucune contre-indication.

Flacon de 20 centilitres.

Prix : 13 fr. 50.

Laboratoire R. GALLIER

38, boulevard Montparnasse — PARIS

KINÉCHOL

Composition. — Granulé soluble à base de sulfate de magnésie desséché, peptone de fibrine, extrait de boldo, hyposulfite de magnésie.

Indications. — Affections du foie et de la vésicule biliaire (calculs et coliques hépatiques).

Troubles digestifs d'origine hépatique : Vomissements, Pesanteurs, Constipation, Diarrhée d'origine hépatique.

Manifestations hépatiques : Migraines, Urticaires, Nausées, Prurit.

Contre-Indications. — Cholécystites aiguës et dysenterie.

Posologie. — Une, deux ou trois cuillerées à café dans un demi-verre d'eau tiède, le matin à jeun. Se coucher ensuite 20 minutes sur le côté droit.

Prix : 16 francs.

Laboratoire du KINÉCHOL

GENEVET, Docteur en Pharmacie

29, rue des Marchands — AVIGNON (Vaucluse).

KINECTINE

Spécifique de la Fièvre des Foins
et du Coryza aigu.

Indications. — Fièvre des foins, Coryza aigu.

Forme. — Comprimés.

Posologie. — *Adultes.* — 3 comprimés par jour.

Enfants. — Moitié dose

Prix : 8 francs.

Établissements MOUNEYRAT

12, rue du Chemin-Vert

VILLENEUVE - LA - GARENNE
près Saint-Denis (Seine).

KLUCHOL REMEAUD

à base de Benzoate d'Anéthol Solubilisé.

Forme. — Sirop d'un goût très agréable, bien accepté des enfants. — Non toxique.

Propriétés thérapeutiques. — Antispasmodique puissant, calmant et curatif de la coqueluche, des toux coqueluchoïdes ou nerveuses, asthme, etc...

Posologie. — *Adultes* : 3 à 5 cuillerées à soupe par jour.

Enfants.

| | | | |
|--------------------------|-------------------------------|---|---|
| Moins d'un an..... | 2 à 4 cuill. à café par jour. | | |
| 1 à 5 ans..... | 4 à 8 | — | — |
| 5 à 10 ans..... | 5 à 10 | — | — |
| Au-dessus de 10 ans..... | 8 à 10 | — | — |

Nota.

L'innocuité absolue permet d'augmenter progressivement, et même de doubler les doses ci-dessus, jusqu'à l'obtention rapide de l'effet désiré.

Prix : 16 francs.

LABORATOIRE REMEAUD

38, avenue J.-Baptiste-Clément — Boulogne-sur-Seine.
Téléphone : Molitor 04-59.

Dépôt général O. C. P.
71, rue du Temple — PARIS

KODOS

Composition. — Mélange effervescent de sels de potasse, de lithine, de magnésie, de soude avec de l'urotropine.

Propriétés thérapeutiques. — Elimine les déchets de la combustion vitale, Assouplit les artères, Combat la sclérose des tissus, Décongestionne le foie et les reins, Désinfecte les urines.

Indications. — Cure d'amaigrissement, Congestion du foie, Lithiase rénale, Affections de la peau, Prurit, Pyélonéphrite, Cystite, Prostatisme, Arthritisme, Rhumatisme, Troubles urinaires, Asthme et Emphyseme, etc...

Mode d'emploi. — Une pellette de poudre chaque matin à jeun au lever dans une eau très peu calcaire (de préférence l'eau minérale des Abatilles) ou une pellette un quart d'heure avant chaque repas.

Prix : 9 fr. 85 et 18 fr. 75

Laboratoire du KODOS

Route de Moulleau — ARCACHON

KOLA CAFÉINÉE AUBERT

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Caféine | 2 gr. 50 |
| Kola (extrait mou total) | 12 gr. |
| Sucre | Q. S. p. 100 gr. |

Propriétés. — Toni-cardiaque, neuro-tonique, excitant musculaire et cérébral.

Indications. — Maladies infectieuses, grippe, vieillesse, convalescence, épuisement, atonie, anémie, adynamie cardiaque.

Posologie. — 2 à 4 cuillerées à café par jour. Croquer ou faire dissoudre dans un demi-verre de vin.

Nota. — Les principes amers de ce produit excitent les fonctions digestives et améliorent la digestion. Ils influent sur les fibres lisses souvent atones des dyspepsies (dyspepsie, flatulence).

Prix : 12 francs la boîte étanche de 135 grammes.

Laboratoire du Docteur E. AUBERT

4 place Jussieu — PARIS (V°).

Approvisionnement pharmaceutique et Dépôts :

France : **O. C. P.** Paris.

Afrique du Nord : **PELISSARD**

ALGER-CASABLANCA.

KOLA GRANULÉE ASTIER

Composition. — Extrait de Kola granulé contenant tous les principes actifs de la noix fraîche : caféine, théobromine, combinaisons tanno-caféiniques, rouge de Kola et tanins actifs.

Propriétés thérapeutiques. — Régulateur du cœur. Excitant musculaire. Reconstituant du système nerveux. Tonique général des forces intellectuelles et physiques.

Indications. — Neurasthénie, adynamie cardiaque, troubles fonctionnels cardiaques, grippe, convalescence des maladies infectieuses et des maladies graves, asthénie, surmenage physique et intellectuel. Entraînement à tous les sports.

Posologie. — Dose moyenne : 2 cuill. à café par jour, à prendre tel que dans le creux de la main, ou en dissolution dans tout liquide aqueux.

Prix : 12 francs.

Laboratoires du D^r P. ASTIER

41, 42, 43 à 47, rue du Docteur-Blanche — PARIS (XVI°)

KOLA MONAVON

Présentation et composition :

Elixir (26°) : 0 gr. 30 extrait de kola par verre à liqueur (30 cc.).

Vin (21°) : 0 gr. 30 extrait de kola par verre à bordeaux (75 cc.).

Granulée : dosée à 6 p. 100 d'extrait de kola.

Pastilles : 0 gr. 035 extrait de kola par pastille.

L'Extrait de Kola rentrant dans la composition de la Kola Monavon renferme tous les principes actifs de la noix de kola fraîche : Caféine libre et combinée, théobromine, kolatine et rouge de kola, qui, sous l'influence des liquides digestifs, se dédouble en glucose, kolatannin et caféine à l'état naissant.

Propriétés thérapeutiques. — Aliment d'épargne sans égal. Agent de conservation et d'augmentation des forces musculaires et nerveuses. Régulateur de la circulation. Stimulant du système cérébrospinal. En un mot : Excitant tonique général.

Indications. — Œdèmes, anasarques et la plupart des troubles fonctionnels du cœur, migraine, céphalalgie, névralgie d'origine circulatoire, neurasthénie, surmenage, asthénie grippale, convalescences, dyspepsie, diarrhées chroniques et diarrhées des pays chauds.

Posologie :

Elixir : 1 à 2 verres à liqueur par jour, avant ou après les repas.

Vin : 1 à 2 verres à bordeaux par jour.

Granulée : 2 à 4 cuillerées à café par jour, pure, dans du café, du thé ou de l'eau.

Pastilles : 10 à 15 par jour.

Prix :

Elixir et Vin : 18 francs. — Granulée : 13 francs. — Pastilles : 8 francs.

Produits GONNON

J. et O. GONNON, pharmaciens

14, rue Victor-Hugo — LYON.

KOLATINÉS

Tonique sédatif.

Kola nature, *non caféinée* : amande traitée vivante sur place *avant toute oxydation diastasique productrice de caféine* (qui seule subsiste par contre dans les noix du commerce simplement séchées à l'air). Kolatine parfaitement inaltérée dans son complexe actif naturel solubilisé. *Pas d'additions médicamenteuses.*

Action toni-sédative rapide et puissante (stimulant régulateur fonctionnel avec *détente nerveuse*) sans aucune des contre-indications caféiques (excitation et dépression consécutive, troubles congestifs, palpitation, insomnie, etc...). *Ni accumulation, ni accoutumance.* Tolérance parfaite à tout âge (*nourrissons, vieillards*) ainsi que chez les *nerveux*, les *cardiaques*, les *hypertendus* et dans toutes les *faiblesses agitées*.

Indications. — Rétablissement du Tonus *sans excitation* : T. nerveux et activité cérébrale ; T. musculaire et activité physique ; T. cardiaque (*soutien régulier du cœur*) ; T. génésique et troubles par défaut (spermatorrhée, éjac. précoces, etc.). Activité digestive et anorexie ; Activité hémato-poïétique (*anémie, chlorose*). Asthénies nerveuses, de la ménopause, etc. Gestation, suites de couches, allaitement. Diarrhées infantiles (effet *toni-astringent* spécial à la Kolatine). Rétablissement des *défenses naturelles* au cours ou à la convalescence des maladies infectieuses : GRIPPE, tuberculose, etc...

Chirurgie. — Traitement pré et post-opératoire.

Présentation, doses. — Poudre soluble en sachets. Boîte P. M., 10 sachets (12 fr.). Boîte G. M., 30 sachets (33 fr.).

Dissoudre dans les liquides chauds : déjeuners (lait, café, thé, cacao), Infusions, Bouillons, Eau sucrée, Grog, etc...

Adultes et enfants : 1 à 3 sachets par jour, 2 habituellement.

Nourrissons : 1/4 à 1/3 de sachet à fractionner dans chaque tétée. Cure *ad libitum* sans nécessité d'interruption (*innocuité*).

Produits et Procédés CHALAS, S. A.

8, rue Victor-Noir

NEUILLY-SUR-SEINE (Seine).

KOUMYL

Concentrat de bacilles bulgares vivants en gouttes.

Le KOUMYL est une suspension de ferments lactiques extrêmement concentrée (4 milliards de bacilles par cc.) et stabilisée par son support glycérimé qui suspend la vie du bacille sans la détruire.

Avantages.

- 1° Maniement pratique.
Quelques gouttes versées au moyen du flacon compte-gouttes dans un peu de lait ou d'eau.
- 2° Ne contient ni caséine, ni matières grasses, ni peptones, ni sucre. N'est pas un milieu de culture favorable aux ensemencements accidentels.
- 3° Conservation pratiquement illimitée.
- 4° Pas de saveur désagréable.

Indications.

Toutes les affections intestinales, aussi bien chez l'adulte que chez le nouveau-né (gastro-entérites, auto-intoxication, etc.), ainsi que les dermatoses et migraines dérivées. Le KOUMYL étant d'une innocuité absolue peut être administré dès la naissance.

Posologie.

Nourrissons : I à V gouttes trois fois par jour.
Enfants : X gouttes trois fois par jour.
Adultes : XV à XX gouttes trois fois par jour.
Entre les repas dans un liquide froid ou à peine tiède. Agiter fortement avant l'usage.

Prix : 16 fr. 75.

Laboratoires DEHAUSSY
66, rue Nationale — LILLE.

KYDALOSE

Poudre non toxique.

Iode organique non caustique.

Salicylate de soude.

Priser 5 à 6 fois par jour.

Coryza aigu et chronique, Obstruction nasale et ses conséquences, Sinusites, Otites, Hypertrophie des cornets, Ozène.

N.-B. — Par le salicylate de soude que contient la KYLADOSE, ce médicament convient aussi au coryza aigu et l'enraye si l'on s'en sert dès le début de la crise. Il est de plus en plus avéré que le coryza aigu n'est autre chose qu'une fluxion rhumatismale « a frigore », par conséquent justifiable du salicylate de soude employé localement.

Son effet préventif n'est pas douteux.

Echantillons sur demande :

G. DALIN, pharmacien de 1^{re} classe.

49, quai Saint-Vincent. — LYON.

KYMOSINE ROGIER

A base de Ferment lab et sucre de lait purifiés. — Poudre blanche.

Rend le lait de vache absolument digestible, facilite la digestion du lait de femme chez le nouveau-né.

Dose. — Une cuillerée-mesure dans 200 cc. de lait tiède à 40°.

Une pincée dans une cuillerée à café d'eau avant chaque tétée.

Le flacon : 12 fr. 50.

Henry ROGIER

Docteur en Pharmacie

56, boulevard Péreire — PARIS.

LAB LACTO FERMENT MIALHE

Digestion du lait.

Indications. — Diarrhées vertes des nourrissons et dans tous les cas de mauvaise digestion du lait, troubles gastro-intestinaux, régime lacté où le malade doit absorber une forte quantité de lait.

Dose. — Pour *adultes et enfants* : une cuiller-mesure par verre de lait. *Nourrissons* : une demi-cuiller-mesure par biberon ou par tétée.

Mode d'emploi. — Mettre la dose indiquée dans 1 à 2 cuillerées d'eau, puis ajouter le lait, froid ou tiède.

Prix : 18 fr. 75.

Laboratoire du D^r MIALHE
8, rue Favart — PARIS.

LABYLAX

Composition. — Extraits biliaires, Pancréatine, Ferments lactiques, Evonymine brune, Cynara, Podophylline.

1 à 3 comprimés le soir.

Prix : 10 francs.

20 à 30 jours de traitement.

Indications. — Constipation chronique, Atonie de l'intestin, Insuffisance hépatique, Entérite, Infection intestinale, Angiocholite, Cholécystite, Lithiase biliaire.

Laboratoire P. BASUYAUX
94, rue Pasteur — FONTENAY-S.-BOIS

LACCODERMES

Vernis semi-gras, soluble à l'eau.

Pansement dermatologique.

Laccoderme à l'oxyde de zinc : Affections légères de la peau.

Laccoderme sulfo-cadique : Eczématides. Impetigo.

Laccoderme au goudron de houille : Dermatoses suintantes. Eczémas.

Laccoderme à l'ichtyol : Impétigo. Ecthyma.

Laccoderme ichtyol-stovaine : Dermatoses prurigineuses.

Mode d'emploi. — Nettoyer la peau au savon Denisol. Etendre le Laccoderme. Laisser sécher et saupoudrer avec l'Anytal Brisson.

Oxyde de zinc.

Sulfo-cadique.

Goudron de Houille.

Ichtyol.

Ichtyol et Stovaine.

Stovaine.

Laboratoires BRISSON

D^r DEDET et C^{ie}, Pharmaciens

Anciens Internes des Hôpitaux de Paris.

157, rue Championnet — PARIS (XVIII^e).

LACHÉSINE

Extrait du venin
du *Trigonocephalus lachesis*.

Forme. — Comprimés solubles dans l'eau.

Mode d'emploi. — Deux à quatre comprimés par jour en dehors des repas. Résultat rapide.

Indications. — *Troubles de la ménopause naturelle ou chirurgicale.* (Bouffées de chaleur, sueurs, vertiges, congestion céphalique, dyspepsie, mélancolie, etc.)

S'abstenir pendant les règles.

Prix : 12 francs le tube de 40 comprimés.

Laboratoire RENAUD

2, rue Pierre-Demours — PARIS (XVII^e).

Téléphone : Étoile 23-82.

LACPININE

Forme. — Liquide blanc.

Composition. — Emulsion d'essence de pin naturelle.

Indications. — Pour vaporisation, douches vaginales, bains de siège contre hémorroïdes, bains complets en cas de neurasthénie.

Mode d'emploi. — Lavages et douches vaginales : 1 à 3 cuillerées à café par 1 à 2 litres d'eau.

Vaporisation et désodorisation des locaux : 5 cuillerées à soupe par litre.

Frictions : pure ou diluée de moitié.

Pour un bain complet ou partiel, la Lacpinine s'emploie à raison de 1 cuillerée à soupe pour 100 litres d'eau.

| | | | | |
|-------|---|-----------|-------------|-----------|
| Prix. | { | Flacon de | 60 gr. : | 5 fr. 80 |
| | | — | 150 gr. : | 13 fr. |
| | | — | 750 gr. : | 43 fr. 80 |
| | | — | 1 000 gr. : | 50 fr. |

Laboratoires FISCH et C^{ie}

4, rue d'Illzach — MULHOUSE (Haut-Rhin).

Agence à Paris : 104, faubourg Poissonnière.

Tél. : Lamartine 92-52.

LAC-SER

Composition. — Lactosérum desséché.

Propriétés. — Provoque dans l'intestin des fermentations acides qui s'opposent aux putréfactions albuminoïdes toxiques. A, en outre, une action diurétique et cholagogue.

Indications. — Auto-intoxications intestinales, entérites des nourrissons, affections hépatiques.

Formes et posologie. — Paquets : 5 gr. de lactosérum desséché par paquet correspondant à 100 gr. de lactosérum liquide.

Dose : 3 à 4 paquets par jour dans un liquide (300 à 400 gr.).

Prix : 15 francs (boîte de 30 paquets).

Laboratoire MONTAGU

49, boulevard de Port-Royal — PARIS (XIII^e).

LACTAGOL

Poudre.

Nature. — Protéine galactogénique extraite par procédé spécial de la graine de cotonnier, Phospho-protéides, Phosphates organiques assimilables.

Mode d'emploi. — Poudre agréable à prendre : 3 à 6 cuillerées à café par jour avant ou après les repas, délayée dans un liquide froid ou tiède. Ne pas chauffer.

Propriétés thérapeutiques. — Accroissement de la sécrétion lactée, enrichissement du lait en principes actifs : beurre, caséine, sels, etc.

Indications. — Agalactie, Hypogalactie, Allaitement maternel insuffisant au point de vue qualités du lait, Fatigues de l'allaitement.

La boîte : Prix : 16 fr. 80

Établissements SOUDAN

48, rue d'Alésia — PARIS (XIV^e).

Enregistré au Laboratoire National N° 218-6.

LACTARIS

Bactériothérapie polyvalente nouvelle
par précipité massif de cultures lactiques acidophiles
en symbiose.

Effet thérapeutique. — Hyperactif et stabilisé.

Présentation. — Ampoules-flacons de 6 cc. à sucer, état pur, à l'aide des chalumeaux stérilisés inclus dans la boîte.

Composition. — Env. 2 mgr. 5 de bactéries lactiques acidophiles en symbiose.

Indications. — Toutes diarrhées, entérites, intoxications intestinales. *Colibacillose*.

Doses. — *Adultes, enfants* : 2 à 3 ampoules 1/4 d'heure avant les repas.

Nourrissons : 1 ampoule mélangée au biberon.

Prix : 25 francs la boîte de **18 ampoules**
(cure de 9 jours).

Laboratoire CENTRAL

129, rue de Turenne — PARIS (III^e).

MASSON, Pharmacien.

LACTIMASE

Description. — Comprimés de ferment lactique de 0 gr. 50 ; par flacons de 40 comprimés.

Action thérapeutique. — La *Lactimase* détruit les microbes pathogènes de l'intestin par accaparement du milieu, action renforcée par la symbiose du bacille Bulgare et d'une levure spéciale.

Indications. — 4 à 8 comprimés par jour dans les intoxications intestinales, diarrhées vertes des nourrissons, constipation, dysenteries, entérites.

Prix : 30 francs.

Laboratoires Ch. COUTURIEUX

18, avenue Hoche — PARIS.

LACTOBACILLINE

Comprimés de ferments lactiques
sélectionnés.

Doses et mode d'emploi. — 3 à 9 comprimés par jour, avant ou après les repas. Aucun inconvénient à augmenter ces doses.

Propriétés thérapeutiques. — Remplacement de la flore intestinale nocive par une flore bienfaisante.

Indications. — Auto-intoxication intestinale, entérites, diarrhées, dermatoses.

Prix : 12 francs.

Laboratoires DARRASSE

Rue Saint-Maurice
NANTERRE (Seine).

LACTOBYL

Composition :

| | |
|--------------------------------------|------|
| Sels biliaires..... | 0,05 |
| Poudre de glandes intestinales..... | 0,02 |
| Charbon poreux..... | 0,02 |
| Ferments lactiques..... | 0,05 |
| Poudre de laminaria flexicaulis..... | 0,05 |

Pour un comprimé.

Forme. — En comprimés de 0 gr. 35.

Propriétés thérapeutiques. — Rééducateur intestinal.

Indications. — Toutes les modalités de la constipation.

Doses et mode d'emploi. — De 1 à 6 comprimés par jour. Commencer le traitement par 2 comprimés par jour avant les repas, ou au coucher. Augmenter ou diminuer la dose suivant l'effet produit. Avaler sans mâcher.

Prix de vente au public : 12 francs.

Laboratoires LOBICA

46, avenue des Ternes — PARIS (XVII^e).

LACTOCALCINE

Composition

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Citrate de Soude..... | 5 gr. |
| Phosphate de Chaux..... | 25 gr. |
| Ferments lactiques sélectionnés..... | 20 gr. |
| Excipient vanillé.. Q. S. p. | 100 gr. |

Forme. — Granulé.

Propriétés. — Thérapeutique lactique intensive sans déminéralisation, dans les entérites aiguës ou chroniques, intoxications intestinales, etc...

Doses :

2 à 3 cuillerées à soupe par jour (*adultes*)

2 à 3 cuillerées à café par jour (*enfants*)

Prix de la boîte : 16 francs.

Laboratoires LECONTE

7, rue des Petits-Carreaux — PARIS (II^e).

LACTOCHOL

Composition. — Ferments lactiques. Sels biliaires.

Forme. — Comprimés et granulés (enfants et nourrissons).

Propriétés thérapeutiques. — Infections intestinales, entérites. (Adultes et nourrissons), Insuffisance biliaire.

Dose et mode d'emploi (*Comprimés et Granulés*) :

Adultes : 4 à 12 comprimés ou cuillerées à café et plus par jour avant les repas dans de l'eau sucrée (avalier sans mâcher).

Enfants : 2 à 6 comprimés ou cuillerées à café et plus par jour dans miel, confiture, avant les repas.

Nourrissons : 1/2 cuillerée à café de granulé avant une tétée, ou un biberon, matin et soir.

Prix de vente au public : 14 francs.

Laboratoires « LOBICA »,

46, avenue des Ternes — PARIS (XVII^e).

LACTOLAXINE FYDAU

Ferments lactiques laxatifs.

Composition. — Ferments lactiques sélectionnés, sels biliaires, agar-agar, ph-phthaléine.

Forme. — Comprimés.

Propriétés thérapeutiques. — Laxatif et cholagogue. Supprime la constipation, les intoxications gastro-intestinales, les fermentations putrides, rétablit les fonctions normales de l'intestin et du foie sans la moindre irritation.

Doses. — 1 à 3 comprimés pour adultes pris le soir avec un peu d'eau.

Enfants : 1/2 comprimé suffit.

Se vend par boîtes de 6 tubes de 6 comprimés.

Prix au public : 14 francs.

Laboratoires Biologiques

André PÂRIS

4, rue de La Motte-Picquet — PARIS (XV^e).

LACTOPROTÉIDE CARRION

Composition. — Lait homogénéisé pour injections hypodermiques ou intramusculaires.

Forme. — Ampoules de 2, 5 et 10 cc. (autres dosages sur demande).

Indications et Posologie. — Les indications sont, dans l'ensemble, celles de la Protéinothérapie.

Infections de nature diverse : générales (grippe, fièvre puerpérale, etc.) ou localisées : (suppuration, pyodermites, etc.).

Une injection intramusculaire (jusqu'à 10 cc.) le plus tôt possible, la répéter après 2 à 5 jours.

Anémies : 5 à 10 cc. tous les 5 jours.

Affections oculaires : 5 cc. tous les 2 jours.

Intolérance des enfants au lait de vache : 5 à 10 cc. puis réinjecter par doses progressives : 1/2 cc. puis 2 cc. une heure après, enfin 5 à 10 cc. une heure plus tard.

Prix :

| | |
|---------------------------|---------------------|
| La boîte de 6 ampoules de | 2 cc. : 10 francs. |
| — 6 — | 5 cc. : 15 francs. |
| — 6 — | 10 cc. : 18 francs. |

Produits Biologiques CARRION

L. CUNY, Docteur en Pharmacie.

54, rue du Faubourg Saint-Honoré — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Anjou 36-45 (2 lignes groupées)).

LACTOSEPTYL LEGRAND

Composition. — Acide lactique associé au charbon végétal chimiquement pur, au benzo-naphtol et à l'acide phosphorique.

Propriétés. — Assure la désinfection de l'intestin et empêche les fermentations. N'a pas la fragilité des ferments lactiques.

Indications. — Entérites chroniques et aiguës. Diarrhées. Dermatoses. Auto-Intoxication intestinale. Etats infectieux. Urticaire.

Présentation. — Pilules enrobées d'une couche protectrice résistant au suc gastrique.

Le 1/2 tube de 80 pilules : 10 fr. 60.

Le tube de 150 pilules : 16 fr. 80.

Posologie. — 6 à 12 pilules par jour associées au régime.

Laboratoires L. LEGRAND,

11, place Louis-XII — BLOIS (Loir-et-Cher).

LACTO-SÉRUM LAVRIL

Sérum normal de lait. Solution isotonique pH : 6,8.

Substance tampon du sang.

Diurétique — cholagogue — antitoxique — analeptique
Régulateur de l'équilibre acide-base humoral et de l'hydrophilie.
Excitant des grandes fonctions et de la diurèse.

Cure de désintoxication (5 ou 10 jours).

Flacon de 240 cc. pris à jeun en trois fois à 20 minutes d'intervalle.
Toutes affections du FOIE de la petite insuffisance à hépatite aiguë.
REIN : Néphrite, Pyélonép. Hypertension. Azotémie. Urémie, Acidose.
INTESTIN : Colibacillose, Entérite, Colites par putréfaction.

Diète :

Flacon Grande Cure (960 cc.) : 120 cc. toutes les 2 heures.
Diète des Fiévreux, Grands Malades, Typhiques, Colibacil. Urémie.
Chirurgie : Préparation opératoire. Diététique postopératoire.
Enfants : Gastro-entérite (biberons de 80 cc. de L-S pur).
Sucrer, aromatiser à volonté. Si acidité gastrique : alcaliniser.
Lacto-Sérum Lavril : Isotonique. Petite Cure 5 flacons 240 cc. : 23 fr. 90.
Grande Cure, 1 flacon 960 cc. : 13 fr. 80.
Hypéride pH 4,5. Etats infectieux, alcaloses 5 flacons : 27 fr. 50
Lactosérum sec : LACTO-SEC. Boîte de 20 tubes : 14 fr. 50.
LACTO-FERMENT LAVRIL. Poudre ou comprimés : 12 francs.

LACTOSMOSE

Pansement et Bouillie Lactique.

ASEPSIE des plaies les plus infectées : Ferment lactique en poudre.

CICATRISATION des plus rebelles : Sérum de lait.

Le Lactosmose assainit et désodorise toute plaie, même le cancer.

Emploi :

*Pansement sec avec la poudre et compresse ou vaporisation de sérum
ou : Mettre la poudre dans le sérum, panser avec le mélange.*

Gynécol. : 6 ovules et 4 injections de 200 cc. (boîte N° 2) alternées.

Compresse, mèche, drain. vapor. Instill. Pansement sec ou humide.

Inject. vag. Ovules, Bouillie lactique (éliminer le liquide du mélange).

Indications :

Plaies accidentelles, profondes, brûlures, Pl. supp., infectées, Atones.
périnéales, Néos, cystites, rectites, escarres, ulc., gang., dermatose,

Gynécol. et obst. Métrites, Métrorr, Périnéorr. Accouchements.

Présentation :

N° 1. 5 amp. 20 cc. sérum et 5 tubes poudre : 16 francs.

N° 1 bis 12 : 30 francs. — N° 2. 4 amp. 200 cc. 40 cc. poudre : 22 fr.

Flacon poudre : 12 francs. — Ovules boîte de 6 : 14 fr. 50.

Suppositoires 12 francs.

Laboratoire du Lacto-Sérum LAVRIL

PACY-SUR-EURE (Eure).

26, Boulevard des Batignolles — PARIS.

LAIT DARDELET (MODIFIÉ)

pour Nourrissons.

Lait humanisé n° 1 (Système Backauss modernisé). Semblable par sa composition et sa structure au lait de femme. Ne contient ni eau surajoutée, ni antiseptique. Allaitement de tous les nourrissons et spécialement des intolérants au lait, des prématurés, etc...

Lait humanisé n° 2. Même préparation que le précédent, mais composition intermédiaire entre le n° 1 et le lait de vache.

Tous mes produits sont homogénéisés et donnent un coagulum semblable à celui du lait de femme. Conservation sous le vide.

Babeurre Dardelet (voir rubrique Babeurre).

Mode d'emploi. — Pour tous mes produits, faire tiédire au bain-marie et donner pur ; mêmes doses que le lait maternel.

Prix. — En bouteilles (départ usine) 1/4 de litre : 2 francs. Caisses de 25 ou 50 bouteilles.

Notre situation au centre de la France et sur une grande ligne nous permet des envois immédiats en Province.

J. DARDELET

Maison fondée en 1922.

BONNARD (Yonne). — Tél. : 4.

Pour PARIS Dépôt : D^r des OUCHES

58, faubourg Poissonnière

(Prov. 82-45).

LAIT DE MAGNÉSIE PHILLIPS

Combinaison chimique définie de magnésie et d'eau (hydroxyde de magnésium) ne contenant aucun excipient destiné à maintenir la magnésie en suspension.

Propriétés thérapeutiques. — Anti-acide, sédatif gastrique, Laxatif.

Indications. — Gastralgies, Dyspepsies acides et nerveuses, Eructations, Etats bilieux, Constipation, Coliques, Diarrhées d'origine dyspeptique, toutes les affections dues à l'acidité buccale.

Posologie. — *Anti-acide.* Adultes. — D'une cuillerée à café à une cuillerée à soupe dans un verre d'eau froide, 2 heures après les repas. Enfants : 1/2 à une cuillerée à café. Nourrissons : X à XX gouttes suivant l'âge.

Laxatif. Adultes. — D'une à quatre cuillerées à soupe dans un verre d'eau ou de limonade, une heure et demie avant le petit déjeuner du matin. Enfants : de une à deux cuillerées à café. Bébés : une demie à une cuillerée à café, suivant l'âge.

Anti-acide buccal. — Après s'être brossé les dents, bien se rincer la bouche avec une cuillerée à soupe de Lait de Magnésie Phillips. Il se forme sur les dents et les gencives une pellicule alcaline qui dure plusieurs heures et les protège contre les attaques de l'acide.

Présentation : flacon de 120 cc., triple-flacon de 360 cc. environ.

Echantillons et littérature sur demande à

O. C. P.

108, rue de Picpus — PARIS (XII^e)

LAIT EN POUDRE GUIGOZ

Préparé avec le lait de la Gruyère (Suisse), est livré sous 3 formes : Lait complet, lait demi-écrémé, lait complètement écrémé.

Traité par un procédé tout à fait spécial, dans le vide, à une température de 50°, **conserve indiscutablement toutes ses vitamines** et dispense de l'adjonction du jus de fruits. C'est un lait vivant. Par sa coagulation légère, facilement fragmentable, par son extrême digestibilité, il se rapproche du lait maternel.

Indications. — *Pour nourrissons* : Diététique idéale des bébés privés partiellement ou totalement du lait maternel. Athrepsie, dyspepsies, diarrhées, coliques, gastro-entérites, hypotrophies, réalimentation, vomissements.

Pour les adultes : *Intolérances lactées* : Affections du foie et de l'estomac. Alimentation post-opératoire. Suralimentation.

Dose. — Une partie (en poids) de lait GUIGOZ pour 6 parties d'eau tiède bouillie. Ne pas ajouter de sucre. Soupe de babeurre GUIGOZ en poudre. Voir babeurre GUIGOZ, page 348.

Littérature et échantillons :

LE LAIT GUIGOZ

19, rue J.-J.-Rousseau — PARIS (1^{er}).

Tél. : Gutenberg 73-00.

LAIT GALLIA — CH. GERVAIS

Lait concentré sucré.

Préparé à NEUFCHATEL-EN-BRAY (Seine-Inférieure), concentré dans le vide à basse température, conserve toutes ses vitamines ; très sucré (42-43 p. 100), d'une grande valeur alimentaire surtout pour les *nourrissons et enfants*.

Pour dosage précis des repas, se servir du biberon TRILAC-GALLIA le seul qui indique le dosage des trois laits couramment employés dans l'alimentation des nourrissons : LAIT GALLIA concentré sucré ; LAIT naturel stérilisé ; GALLIASEC, lait en poudre soluble.

GALLIASEC — CH. GERVAIS

Sucré ou non sucré.

Lait en poudre soluble ; partiellement écrémé (matière grasse 12 p. 100). Pour enfants débiles, prématurés, premiers mois de la vie.

CARNET DE SANTÉ GALLIA

(pour nourrissons.)

Permet l'établissement d'une documentation médicale précieuse pour la maman et le médecin.

CH. GERVAIS, S. A.

11, rue de Prony — PARIS (XVII^e)

Tél. : Carnot 54-63 (5 lignes).

LANCERYL

Composition. — Formule de Lancereaux :

| | |
|------------------------|------------|
| Digitale Standard..... | } à à 0,05 |
| Scille | |
| Scammonée | |

Avantages. — Composants stabilisés et titrés physiologiquement. Complexe préparé à l'abri de toute humidité conservant une valeur thérapeutique constante.

Action. — Toni-cardiaque, diurétique albuminurique et azoturique, stimulant hépatique.

Indications. — Cardiopathies subaiguës et chroniques, œdèmes périphériques, rétention chlorurée et azotémique, cirrhoses, congestions du foie et toutes affections hépatiques.

Posologie. — 3 à 5 pilules par jour pendant 10 jours. Arrêter 5 jours et recommencer. Dose pouvant être modifiée au gré du médecin traitant, car LANCERYL est de prescription uniquement médicale.

LANCERYL est enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 1009-1.

Prix : 18 fr.

Laboratoires E. MOREAU, Pharmacien
13, rue des Nonnains-d'Hyères — PARIS
Tél. : Turbigo 87-05.

LANSOYL

HUILE DE PARAFFINE ROBERTS

Deux formes. — Liquide et gelée.

Liquide : Huile de paraffine chimiquement pure, très visqueuse et de densité très élevée. Sans goût ni odeur.

Gelée : Contient 90 p. 100 de Lansoyl liquide et 10 p. 100 de suc de fruits et d'agar-agar. Goût, odeur et aspect d'une véritable gelée de fruits. Parfait pour enfants, vieillards et personnes à estomac délicat.

Propriétés thérapeutiques. — Lubrifie l'intestin, le décongestionne, régularise ses fonctions.

Indications. — Constipation chronique, Inflammations, Entéro-Colite, Flatulences, Coliques, et en général toutes les affections ayant pour cause la constipation.

Doses. — *Adultes :* Une cuillerée à dessert le matin et le soir.

Enfants : Une cuillerée à café trois fois par jour.

Nourrissons : Une demi-cuillerée à café trois fois par jour

Prix : *Liquide :* G. M., 20 fr. ; P. M., 12 fr.

Gelée : 12 fr. 50.

Laboratoire ROBERTS et C^{ie},
5, rue de la Paix — PARIS.
Tél. : Opéra 48-91.

LANTOL

Description. — Complexe colloïdal électrique à base de rhodium ; en ampoules de 3 cc. par boîtes de 4 ampoules, et en capsules glutinisées pour la voie gastrique en flacons de 60 capsules.

Action thérapeutique. — Colloïde isotonique, non toxique et indolore. Provoque la baisse de la température, une sensation de bien-être notable et une hyperleucocytose considérable, suivie de la destruction des agents infectieux localisés ou disséminés dans l'organisme.

Indications. — 1 à 4 ampoules par jour en injections intramusculaires ou intraveineuses, dans toutes les septicémies, gripes, pneumonies, péritonites, scarlatines, typhoïdes et tous états infectieux. Les capsules servent à compléter et achever le traitement tout le temps nécessaire.

Prix : 30 francs.

Laboratoires Ch. COUTURIEUX

18, avenue Hoche — PARIS.

LARISTINE « ROCHE »

Traitement biochimique nouveau des ulcères gastro-duodénaux.

Composition — Solution isotonique, neutre et stérilisée de chlorhydrate d'Histidine en ampoules de 5 cc. dosées à 0 gr. 20 de principe actif.

Propriétés. — Dès les premières injections, sédation des douleurs et de l'intolérance gastrique ; reprise remarquable de l'état général.

Posologie et mode d'emploi. — Une injection quotidienne intramusculaire parfaitement indolore, d'une ampoule de 5 cc. pendant 21 jours.

Aucune toxicité ; pas de contre-indication.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le numéro 504-65.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie

10, rue Crillon — PARIS (IV^e).

LAROSAN « ROCHE »

Caséine-Calcium

Spécifique de la Diarrhée infantile.

Avantages. — Alcalinisation du milieu intestinal. Suppression du petit lait. Apport minimum de sucre. Taux élevé de caséine.

Indications. — Diarrhées infantiles et troubles dyspeptiques des nourrissons (Diarrhées simple, lientérique, verte, infectieuse, cholériforme. Diarrhées de dentition et de sevrage. Athrepsie, etc.)

Diarrhées toxiques des enfants et des adultes. États dyspeptiques des adultes. Ulcère de l'estomac, etc.

Modes d'emploi et doses :

On prépare des mélanges : Eau bouillie, Lait, Larosan contenant 2 cuillerées à soupe et plus de Larosan « Roche » par litre. L'administration de ces mélanges et la conduite de la cure sont variables selon les cas.

Enregistré au Laboratoire national de contrôle des médicaments sous le n° 504-20.

Produits

F. HOFFMANN-LA ROCHE et C^{ie}
10, rue Crillon — PARIS (IV^e).

LAURÉNOL MÉDICINAL

Chloro-aluminate de zinc sulfo-cuprique.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique, désodorisant, ni toxique, ni caustique.

Indications. — En chirurgie, gynécologie, obstétrique, brûlures, dermatologie, hygiène, médecine générale.

Mode d'emploi. — Pansements, injections vaginales. Puissance antiseptique absolue (solution 3 p. 100).

Doses. — Suivant les indications.

Le litre : 10 fr. — Le demi-litre : 6 fr. 25.

Formes actives. — SAVON LAURÉNOL (antiseptie, toilette). — SAVON DENTIFRICE au Laurénol (asepsie buccale, 24 h.). — OVULES au LAURENOL (métrites, vaginites, pertes, etc.). — POMMADE au LAURENOL (affections de la peau).

LAURENOL n° 2, désinfectant, sans odeur, ni mercure.

Savon Laurénol : 4 fr. — Savon dentifrice : 6 fr.

Ovules Laurénol : 12 fr. — Pommade : 10 fr.

Laurénol n° 2 :

Le litre : 6 fr. — Le demi-litre : 4 fr.

Laboratoires BELIERES

19, rue Drouot — PARIS (IX^e).

LAURIATOL

Propriétés. — Reconstituant général, Accroît le dynamisme des cellules nerveuses, Accélère les échanges nutritifs.

Indications. — Dépressions nerveuses, surmenage physique et intellectuel, neurasthénie, anémie, chlorose, insuffisance de la nutrition, convalescences, pré-tuberculose, tuberculose, croissance.

Composition. — Pour un comprimé : Nucléinate de Manganèse 0,025; Extr. sec de Noix vomique 0,0025; Salicine cristallisée 0,05; Picraena excelsa 0,05; Gonolobus Condurango 0,05; Glycérophosph. de magnésie 0,05; Phosph. tricalciq. 0,20; Excipient (Talc, Gomme) 0,20.

Forme. — Comprimés dragéifiés.

Posologie. — *Adultes* : 4 comprimés par jour, soit 2 comprimés 1/2 heure avant chaque repas.

Enfants : au-dessus de 8 ans : 1/2 dose.

Avaler sans sucer ni croquer.

Prix : 15 francs la boîte de 60 comprimés.

Laboratoire LAURIAT

LA GARENNE-COLOMBES (Seine).

LAXAMALT

50 % huile de paraffine, 50 % extrait de Malt.

Poudre cristalline d'un goût très agréable.

Posologie :

Nourrissons : 1 cuillerée à dessert administrée le soir dans le dernier biberon ou dans un peu d'eau bouillie.

Enfants : 2 cuillerées à soupe par jour avant ou après les repas ou le matin à jeun et le soir avant de se coucher.

Adultes : 3 ou 4 cuillerées à soupe le soir avant de se coucher.

Laxatif physiologique dépourvu de toute action irritante sur l'intestin.

Particulièrement indiqué chez les entéritiques, les nourrissons, les femmes enceintes et les opérés.

Prix : 14 francs.

Laboratoires LICARDY

38, boulevard Bourdon — NEUILLY-PARIS.

Téléphone : Maillot 17-75.

LAXATIFS MIRATON CHATEL-GUYON

PASTILLES MIRATON CHATEL-GUYON. —

Laxatif hydrominéral aux sels de la source Miraton Châtel-Guyon, stimulant idéal du péristaltisme intestinal, non irritant.

Dose. — 1 à 2 pastilles, le soir au coucher.

GRAINS MIRATON CHATEL-GUYON. — Sels

de la Source Miraton Châtel-Guyon associés à l'extrait total des glandes intestinales, à l'extrait biliaire et aux ferments lactiques. Régulateur physiologique de l'intestin, non irritant, sans accoutumance.

Dose. — 1 à 2 grains au repas du soir.

Prix : Pastilles. La boîte : 6 fr. 50.

Grains. La boîte : 7 fr. 50.

Enregistré au Laboratoire National n° 218-7 (grains)
n° 218-8 (pastilles).

Littérature et échantillons :

Établissements SOUDAN

48, rue d'Alésia — PARIS (XIV^e).

LAXOPEPTINE GIRARD

Ferments de céréales contenant leurs Vitamines.
Citrate de soude, Eupeptiques, poudre agréable à prendre.

Mode d'emploi :

Nourrissons : 1 à 3 cuillerées à café par jour dans lait ou eau bouillie.

Enfants : doubler ou tripler les doses.

Propriétés thérapeutiques :

Régulateur des fonctions digestives, antiseptique intestinal, laxatif idéal des nourrissons et jeunes enfants.

Indications :

Ballonnements, Gastro-entérites, Maladies infectieuses ou fébriles d'origine digestive, Vomissements du nourrisson et de l'adulte, Constipation infantile.

Prix : 10 francs.

Établissements SOUDAN

48, rue d'Alésia — PARIS (XIV^e).

Enregistré au Laboratoire National N° 405-4.

LÉCITHINE VACHERON

Granulé dosé à 0 gr. 10 de lécithine par cuillerée à café.

Propriétés thérapeutiques. — Elle accélère les échanges nutritifs, accroît les forces, augmente très rapidement le poids du corps et le nombre des globules rouges du sang, tonifie la cellule nerveuse.

Indications. — Phosphaturie, neurasthénie, affections du cerveau et de la moelle ; Chlorose, diabète, rachitisme ; Convalescences longues et pénibles.

Mode d'emploi :

Adultes : 3 à 5 cuillerées à café par jour.

Enfants : 1 à 2 cuillerées à café par jour.

Prix : 15 francs.

Produits GONNON

J. et C. GONNON, Pharmaciens

14, rue Victor-Hugo — LYON.

LENADRYL

(Huile rhinologique.)

Composition. — Antiseptiques végétaux (camphre) eucalyptol, terpinéol en solution huileuse spéciale adrénalino-éphédrinée.

Avantages. — Synergie vaso-constrictive, décongestive et antispasmodique, bactéricide, analgésique, cicatrisant. Ni caustique, ni toxique. Ne dessèche pas la muqueuse.

Indications. — Coryzas aigus et chroniques, rhumes des foins, sinusites, toutes congestions, infections et inflammations du rhino-pharynx, trachéites, laryngites.

Mode d'emploi. — X à XII gouttes matin et soir dans chaque narine, la tête renversée et penchée du côté de cette narine.

Prix : 16 francs.

Laboratoires J. BRESSIER

Docteur en Pharmacie

102, rue Vincent — MARSEILLE.

Concessionnaires :

Les Laboratoires NOVALIS

OULLINS (Rhône).

LÉNIFORME

Composition. — Huile à 2, à 5, et 10 p. 100 d'Essences végétales antiseptiques.

Indications. — Coryza, Rhinites, Sinusites, Laryngites, Trachéites.

Forme et mode d'emploi. — Se vend en flacons pour instillations et pulvérisations.

Est également présenté à 2, à 5 et 10 p. 100 sous forme de **Rhino-Capsules** en gélatine pour auto-injections nasales.

Prix : Le flacon : 11 fr. 95.

Rhino-Capsules : 9 fr. 95.

L. E. V. A.

26, rue Péterle — PARIS (IX^e).

LÉOTAMINE

Pommade à base d'Insuline « Leo » et de Vitamines A et D.

Indications. — Accélère la cicatrisation des plaies de guérison difficile chez les personnes anémiques, asthéniques, hémophiles et principalement chez les diabétiques.

Forme. — Tube de 15 et 30 grammes.

Mode d'emploi. — Application directe sur la plaie ; couvrir la plaie d'un pansement aseptique.

Valentin AAGE MOLLER

149, rue du Palais-Gallien — BORDEAUX

Dépositaire :

Pour la France : **Jean DEDIEU**

39, rue Fondaudège — BORDEAUX

LEUCAGINE

Médication radioactive et bactéricide des infections utérines aiguës et chroniques.

Application. — Pansements utérins. — 2 formes :

1° — **CRAYONS**

Présentation. — Crayons stérilisés à base d'organate d'argent et de bromure de radium, dosés à 1, 3 5 et 10 micros.

Indications. — Métrites, Affections du col et du corps : 2 applications par semaine (Consulter la Notice).

N.-B. — Utiliser pour l'application l'appareil « *Porte-pansement* » spécial.

2° — **OVULES**

Indications. — Tous les cas d'infection des voies génitales. Un ovule tous les jours.

Le crayon à 1 micro : 12 fr. ; à 3 micros 18 fr.

à 5 micros : 25 fr. ; à 10 micros : 35 fr.

La boîte de 5 ovules : 30 fr.

Laboratoires pharmaceutiques

L.-G. TORAUDE, O. ✱, O. I. ☉.

Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.

Lauréat de l'Institut et de l'Académie de Médecine.

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V°).

LEUCOLYSE

Antisepsie externe et gynécologique.

| | |
|--|----------|
| Oxycyanure de Hg | 0 gr. 10 |
| Trioxyméthylène | 0 gr. 01 |
| Sulfophénate de zinc..... | 0 gr. 10 |
| Sulfate de cuivre, traces pour colorer. | |
| Essence de Lavande. Q. S. pour parfumer. | |

Pour un comprimé effervescent.

En 5 tubes verre de 10 comprimés de 2 gr. Prix : 15 fr.

Particularités. — Comprimés effervescents, parfumés agréablement, présentés en tubes, réalisant un emploi commode pour l'hygiène intime.

Décongestif et kératoplastique.

Indications. — Ulcérations, brûlures. Angines. Hygiène de la femme. Métrites. Vaginites.

Emploi. — Antisepsie légère : 1 comprimé par litre d'eau
Désinfection énergique : 2 comprimés par litre.

Laboratoires de la BIOPAUSINE

(Spécifique circulatoire tonique.)

P. TAVERNIER

32, rue de l'Ouest — PARIS.

O. C. P. toutes Drogueries et Pharmacies.

LEUCOSEPTYL

Thérapeutique anti-infectieuse rationnelle.

Composition. — Extrait leucocytaire injectable de l'Institut biologique Mérieux de Lyon. C'est une véritable préparation opothérapique spécifique.

Propriétés thérapeutiques. — Le Leucoseptyl stimule la leucopoïèse, active la phagocytose, exalte les moyens de défense de l'organisme contre les infections.

Indications. — Toutes les infections aiguës ou chroniques, localisées ou généralisées.

Emploi. — Injection sous-cutanée ou intramusculaire. Ne jamais recourir à l'injection intraveineuse.

Le Leucoseptyl peut être employé seul ou en association avec la Vaccinothérapie, la Sérothérapie ou la Chimiothérapie.

Doses. — *Adultes et enfants* de plus de 3 ans.

Infections aiguës : 1 à 3 ampoules de 2 cc. par 24 heures.

Infections chroniques : 1 ampoule tous les jours ou tous les deux jours.

Enfants en bas âge ou nourrissons : 1 à 2 cc. par jour.

Littérature et échantillons sur demande.

Prix : 35 francs la boîte.

Dépositaire exclusif :

Laboratoires de l'OPOCALCIUM

A. RANSON, Docteur en pharmacie.

121, avenue Gambetta — PARIS

Tél. : Ménil. 62-81, 62-82.

LEVURE B-17

de H. BOULARD

Levure vivante, rigoureusement pure de ferments étrangers. Isotherme (vit et se développe à 37° C).

Livrée en boîtes de 6 ampoules de 3 cc. 5, contenant la levure en milieu isotonique où elle reste vivante plusieurs années.

Propriétés. — Elimine les ferments pathogènes de l'intestin par concurrence vitale, sans produire d'acidité notable.

Indications. — Diarrhée infantile, Diarrhée banale des adultes, Dysenterie amibienne ou bacillaire, Entérites, Furonculoses et Dermatoses, Colibacilloses intestinales et urinaires.

Posologie. — 1 à 2 ampoules par jour dans un liquide sucré, froid ou tiède.

La boîte de 6 ampoules : 16 francs.

Laboratoire des Ultra-Levures

L.-G. TORAUDE, O. ✱, O. I. O.

Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.

Lauréat de l'Institut et de l'Académie de Médecine

Membre de la Société de Pharmacie de Paris

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V^e).

LEVURE FRAICHE MYCÉTA

Composition. — La *Levure fraîche Mycéta* est une levure pure fraîchement essorée, appartenant au type *Saccharomyces cerevisiae*, sélectionnée et active, sans aucune addition de matières étrangères.

Propriétés. — Par son action fermentaire, ses diastases et ses vitamines, la levure Mycéta régularise les fonctions digestives, entrave le développement des putréfactions intestinales, agit sur les troubles de la nutrition, désintoxique le sang et augmente la résistance de l'organisme aux infections microbiennes.

Indications. — Infections microbiennes, troubles digestifs et maladies de la nutrition, en particulier : états arthritiques, insuffisance hépatique, goutte, diabète et maladies de peau (urticaires, furoncles, orgelets, etc.).

Mode d'emploi. — Une dose par jour, de 15 gr. environ, en une ou deux fois, une demi-heure au moins ou une heure avant les repas. La livraison est faite par le Laboratoire tous les deux jours.

Le prix de la cure de 12 doses pour 12 jours est de 75 fr.

Laboratoire ZYMA

9, place Félix-Faure — PARIS (XV^e).

Tél. : Vaugirard 28-83.

LEVURE MYCETA

(En comprimés.)

Composition. — Levure de bière active, sélectionnée, stabilisée selon le procédé RAPP.

Propriétés. — Par ses enzymes entrave le développement des putréfactions intestinales.

Par ses vitamines exerce une influence heureuse sur toutes les fonctions de la nutrition.

Indications. — Affections de la peau (furoncles, anthrax, acné, eczéma, dermatoses).

Troubles du métabolisme et de l'utilisation nutritive (avitaminose, carences, anémies).

Mode d'emploi :

Adultes : 3 comprimés, 3 fois par jour.

Enfants : 1 à 2 comprimés, 3 fois par jour délayés dans un peu d'eau qu'on peut ensuite ajouter à un peu de lait ou potage, soit une demi-heure avant les repas, soit immédiatement au début.

Prix : 18 francs.

Laboratoire ZYMA

9, place Félix Faure — PARIS (XV^e).

Tél. : Vaugirard 28-83.

LEVURE ZYMACULINE

Composition et forme. — Préparation à base de levure de bière sélectionnée, désamariée, desséchée à basse température, et conservant, de ce fait, son activité maximum. Poudre blanc jaunâtre dont l'odeur rappelle celle de son principe essentiel, la levure.

Propriétés. — La poudre ainsi obtenue a l'avantage de pouvoir se conserver pendant des années. L'action de la ZYMACULINE est due au pouvoir fermentatif de la levure, associé aux propriétés de ses vitamines, stérols et nucléoprotéides.

Indications. — Affections cutanées : furonculose, acné, psoriasis, urticaire, démangeaisons, etc. Troubles digestifs : gastro-entérites, constipation opiniâtre, etc. Affections oculaires : kératites, sclérites. (traitement local appuyé par traitement interne). Maladies des femmes : catarrhes vaginaux et utérins. Troubles de la nutrition : avitaminoses, diathèses, etc. Plaies, ulcères, blessures et complications (la ZYMACULINE est un puissant agent de cicatrisation).

Mode d'emploi. — Poudre : Traitement interne : 3 fois par jour, entre les repas, une cuillerée à café ou à soupe délayée dans une tasse d'eau ou de lait sucré ou non.

Enfants : demi-doses. Traitement externe : par application, poudrage et insufflation pour pansements à sec. Se fait aussi en PÂTE s'appliquant comme une pommade 3 à 4 fois par jour, et en SAVON.

Laboratoires ZYMA

9, place Félix-Faure — PARIS (XV^e).

LEVURINE EXTRACTIVE

Description. — *Comprimés* de 0 gr. 30 d'extrait sec de levure de bière en flacons de 50 comprimés.

Action thérapeutique. — Contient sous un poids 35 fois moindre tous les principes actifs de la levure fraîche, en particulier les vitamines et les corps anti-infectieux, auxquels celle-ci doit son activité, car ils agissent comme vaccin polyvalent vis-à-vis des microbes et surtout des staphylocoques. Conservation parfaite et facilité d'absorption.

Indications. — 4 à 12 comprimés par jour dans les abcès, anthrax, acné, eczéma, furoncles, herpès, phlegmons et toutes affections de la peau,

Prix : 25 francs.

Laboratoires Ch. COUTURIEUX

18, avenue Hoche — PARIS.

LEVURO - MALTINE DÉJARDIN

Levure de bière fraîche, pure, sélectionnée, extrêmement riche en vitamines B anti-névritiques.

Indications. — Anthrax, Clous, Furonculose, Eruptions cutanées, Fermentations intestinales, Tuberculose pulmonaire.

Posologie. — Avant chaque repas une forte cuillerée à café délayée dans un peu d'eau ou d'extrait de Malt français DÉJARDIN.

Prix : 15 fr. le pot.

Etablissements DÉJARDIN

10, rue Parent-de-Rosan — PARIS (XVI^e).

LICHÉNOSE DUCLOY

Acide fumaro-proto-cétrarique pur.

Médicament de la nausée et des vomissements nauséux.

Forme. — Tabloïdes de 1 cgr. dragéifiées.

Doses. — 3 à 6 par jour en moyenne. On peut doubler cette dose en cas de besoin.

Mode d'emploi. — A avaler avec une gorgée d'eau, 10 minutes avant les repas.

Indications. — *Toutes les nausées, mal d'auto, de chemin de fer, de bateau, d'avion, de théâtre, etc. Nausées d'origine psychique (émotions, dégoûts), d'origine auriculaire (vertiges), d'origine digestive, pharyngée, gastrique, duodénale, vésiculaire, colique, affections utérines, grossesse.*

Contre-indications. — Aucune. Médicament atoxique.

Prix : 12 francs.

Laboratoires DUCLOY ET Cie
ARQUES (Pas-de-Calais).

LIMOL CHURCHILL

(Hypophosphite de chaux : 0 gr. 20 par dose).

Médication reconstituante par le phosphore directement assimilable
Préparation de chaux et de phosphore au minimum d'oxydation et, de ce fait, complètement assimilable. Recalcifiant idéal.

Indications. — Recalcification, phosphaturie, tuberculose, asthénie, bronchites, rachitisme, dentition, allaitement.

Mode d'emploi. — *Adultes :*

Sirop. — 1 cuillerée à soupe dans un peu d'eau après chacun des deux principaux repas de la journée.

Comprimés. — 2 comprimés absorbés mais non dissous, à chacun des deux principaux repas de la journée.

Ampoules. — 1 injection intra-musculaire chaque deux jours.

Enfants :

Sirop. — A partir de 7 ans par cuillerée à dessert. Au-dessous de cet âge par cuillerée à café.

Comprimés. — A partir de 7 ans : 1 comprimé dans les mêmes conditions que pour les adultes.

Ampoules. — Suivant indication du médecin traitant.

Exiger la signature du docteur Churchill.

3 formes : sirop, comprimés, ampoules. — Prix 15 francs.

PRODUIT FRANÇAIS

Laboratoire CHURCHILL

12, rue Castiglione — PARIS (1^{er}).

LIMONADE (CITROSE DE VICHY)

Voir « Citrose de Vichy ».

Citrose-Vichy.

Limonade purgative à base d'eau minérale de Vichy, parfumée avec les sucs de fruits (orange et citron).

Composition. — Cette limonade préparée, avec les sels de fruits associés au *sel naturel de Vichy*, constitue un excellent purgatif d'un goût très agréable et d'une conservation parfaite.

Elle n'occasionne jamais ni coliques, ni nausées. Sa composition, par bouteille de 200 cc. répond à la formule suivante :

Sel de Vichy : 34,64 ; Sirop sucre ; 33 ; Sel essentiel de tartre : 30,32 :

Ess. de citron : Q. S. ; Ess. d'orange : Q. S. ; Acide citrique : 0,25 :

Eau saturée de gaz naturel de source : Q. S.

Mode d'emploi. — Prendre le matin à jeun au réveil :

Laxatif : Un verre à bordeaux ou un demi-verre.

Purgatif : Un verre ordinaire ou un demi-verre suivant le tempérament.

Pour les enfants : Moitié ou tiers de la dose des adultes suivant âge, tempérament et avis du médecin.

Toutes Pharmacies : 5 fr. la bouteille.

Prix spéciaux au corps médical.

Préparée par M. G. LAVERGNE, Pharmacien

111, rue du Maréchal-Pétain à VICHY — Allier.

Dépôt : 7, rue Galvani — PARIS (XVII^e).

LIMONADE GODFRIN

Limonade purgative concentrée
au *Citrate basique de Magnésie*.

Avantages. — Seule limonade liquide au citrate basique de Magnésie, pouvant être conservée.

De saveur agréable, elle ne possède aucun arrière-goût médicamenteux et n'occasionne ni nausées, ni coliques.

Formes. — Flacon pour *adultes* de 100 cc. ; flacon pour *enfants* de 50 cc.

Mode d'emploi. — Vu sa concentration, elle ne doit pas être prescrite pure, mais étendue de une à deux fois son volume d'eau. A dose réduite (1 cuillerée à café ou à soupe, suivant le cas, dans un demi-verre d'eau) elle constitue un parfait laxatif salin.

Prix au public : flacon pour adultes : 5 fr. 50 ; flacon pour enfants : 3 fr. 50.

Laboratoires P. GODFRIN

5, avenue Watteau — NOGENT-SUR-MARNE (Seine)

Enregistrée au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous les n^{os} 704-1 et 704-2.

LIN-TARIN

Graine de lin officinale (mucilage naturel).

préparée par les procédés de M. Tarin,

*Pharmacien de 1^{re} classe, ancien chef de Laboratoire
du professeur Trousseau.*

Phytothérapie de l'Intestin.

Traitement intégral de la constipation.

Préparation. — C'est grâce à une sévère sélection dans le choix des graines spécialement cultivées, ainsi qu'au mode scientifique de criblage et de préparation, qu'est due l'efficacité réelle et reconnue depuis de longues années du Lin-Tarin.

Après criblage et dépoussiérage par les procédés mécaniques les plus techniques et les plus modernes, la graine est soumise à un traitement physico-chimique ayant pour but d'augmenter ses vertus mucilagineuses, carminatives, digestives, et d'y incorporer un parfum la rendant agréable à absorber.

Indications. — Le Lin-Tarin doit être prescrit dans tous les cas de constipation opiniâtre, d'atonie intestinale ou digestive, d'insuffisance de sécrétion biliaire, de difficultés d'évacuation rénale. Ses propriétés diurétiques le font recommander dans les maladies de la vessie : son emploi n'engendre jamais de douleurs.

Le Lin-Tarin est spécialement indiqué chez les futures mères et nourrices, dont l'état ne permet pas l'absorption de purgatifs ou laxatifs drastiques.

Le Lin-Tarin doit être ordonné à titre de régime pour l'entretien des voies digestives et intestinales. C'est un lubrifiant de premier ordre, son usage constant prévient l'obésité.

Mode d'emploi. — Une cuillerée à bouche matin et soir, dans un demi-verre d'eau naturelle ou de Contrexéville, ou de lait chaud. Laisser macérer l'eau et la graine le plus longtemps possible. Absorber ensuite l'eau et la graine *sans la mâcher*.

Prix : 8 francs.

Laboratoires CONDOU et LEFORT

61, avenue Philippe-Auguste — PARIS (XI^e).

Tél. : Roq 87-34

LIPAULOL

Solution huileuse de Campho-Dithio-Carbonate double d'Or et de Sodium.

Indications. — Tuberculose pulmonaire ; Tuberculose ganglionnaire suppurée ou non ; Tuberculose pleurale ; Tuberculoses cutanées diverses ; Rhumatismes poly-articulaires chroniques.

Mode d'emploi. — Faire chaque semaine 2 injections intra-musculaires de 1 ampoule de 1 ou 2 cc.

Durée du traitement. — 3, 4, 5 mois, selon les cas.

Présentation. — En boîtes de 3, de 6, ou de 12 ampoules de 1 ou de 2 cc. (1 cc. correspond à 3 cg. or métal).

Prix de vente au public :

| | |
|---------------------------------------|--------|
| La boîte de 3 ampoules de 1 cc | 15 fr. |
| La boîte de 3 ampoules de 2 cc. | 24 fr. |
| La boîte de 6 ampoules de 1 cc. | 27 fr. |
| La boîte de 6 ampoules de 2 cc | 45 fr. |
| La boîte de 12 ampoules de 1 cc. | 50 fr. |
| La boîte de 12 ampoules de 2 cc | 80 fr. |

Laboratoire L. LECOQ et F. FERRAND.

14, rue Gravel — LEVALLOIS (Seine).

Dépôt : Pharmacie Générale LECOQ et FERRAND
54, Chaussée d'Antin, PARIS.

LIPIODOL LAFAY

Huile iodée à 40 p. 100
contenant 540 milligrammes d'iode par cc.

Emplois en thérapeutique. — Générale : Toutes les indications de l'iode et des iodures sans iodisme.

Locale : Sciatiques, Lumbagos, Algies diverses, etc...

Emplois en radiologie. — Lipiodo-diagnostic de Sicard et Forestier. Exploration du système nerveux, des voies respiratoires, de l'appareil génital de l'homme et de la femme, des abcès, des fistules, etc.

Présentations. — Flacons de 20 cc, 22 fr. ; boîtes d'ampoules, 12 amp. de 1 cc., 23 fr. ; 8 amp. de 2 cc., 23 fr. ; 6 amp. de 3 cc, 25 fr. ; 4 amp. de 5 cc., 25 fr. ; 1 amp. de 10 cc., 11 fr. Flacons de capsules, 20 centigr. d'iode par capsule, 50 capsules, 20 fr. ; 25 capsules, 11 fr. Etais de comprimés chocolatés, 4 centigr. d'iode par comprimé, 50 comprimés, 12 fr.

André GUERBET et C^{ie}

22, rue du Landy — SAINT-OUEN (Seine).

LIPO-BISMUTH ERCE

Bismuth liposoluble indolore.

Constitution. — Campho-carbonate de Bismuth, rigoureusement pur, dissous dans de l'huile d'olives.

Présentation. — Ampoules de 1 et 2 cc., dosées à 4 cgr. de Bi métal par cc.

Avantages. — Le LIPO-BISMUTH-ERCE est le « juste milieu » entre les Bi hydrosolubles et les Bi insolubles.

Il a la *rapidité d'action* des premiers sans leur brutalité d'élimination et la tolérance des seconds permettant l'*imprégnation* de l'organisme sans leurs difficultés de résorption. Aucune réaction douloureuse locale, jamais de nodules indurés, ni de stomatites ; aucune réaction rénale. Possibilité de réaliser le *traitement d'attaque* de la syphilis.

Indications. — Syphilis à toutes les périodes

Posologie. — A. *Traitement d'attaque.* Période primaire ou secondaire : chancres, plaques muqueuses, syphilides, roséoles etc...

Deux injections par semaine. Trois séries de 10 piqûres (5 semaines séparées d'un repos d'une durée égale à celle de la série.

B. *Traitement d'entretien.* Deux séries par an, pendant 4 à 5 ans.

Dans les cas où le médecin juge qu'il faut agir vite et énergiquement, la dose habituelle de 1 cc. (4 cgr. de Bi) peut être portée à 2 cc. (8 cgr. de Bi) Dans ce cas, surveiller les muqueuses et les reins

Prix : Boîte 10 ampoules de 1 cc. = 0 gr. 04 : 20 fr. — Boîte 10 ampoules de 2 cc. = 0 gr. 08 : 25 fr.

Laboratoires ROBERT et CARRIÈRE

37, rue de Bourgogne — PARIS (VII^e).

LIPOCÉRÉBRINE CHEVRETIN

Extrait éthéré de substance cérébrale.

Ampoules de 2 cc. contenant 0 gr. 20 d'extrait.

Dragées dosées à 0 gr. 05 d'extrait.

Propriétés thérapeutiques. — Agit par ses phosphatides, lipoides et antitoxines. Contient 50 p. 100 de lécithines (soit 2 p. 100 de phosphore actif) et 25 p. 100 de cholestérine. Antitoxique, Sédatif, Anticonvulsivant, Tonique.

Indications. — *Etats dépressifs du système nerveux, Neurasthénie, Anémie cérébrale, Convalescences, Hystérie, Psychoses.*

Dose. — Une injection sous-cutanée de 2 cc. tous les jours pendant 12 jours ou 2 dragées avant chaque repas. Dans les cas graves, doubler les doses.

La boîte de 12 amp. Prix : 22 francs.

Laboratoires L. LEMATTE et G. BOINOT

52, rue La Bruyère — PARIS.

Télégr. : Chevrematte-90 Paris.

LIPODÉTERPÉNOL

Composition. — Le Lipodéterpénol est un composé d'huiles essentielles déterpénées, de camphre, de lipoides et d'huiles purifiées. Il est utilisé sous deux formes : en *pommade* et en *injections* sous-cutanées.

Propriétés. — Le Lipodéterpénol injectable possède une action à la fois antigénique, antihémolytique, antitoxique, leucogénétique et auto-protecteur de l'organisme.

Indications. — *Toutes les injections graves chroniques* : larges phlegmons, septicémies, pleurésies purulentes, hématomes infectés, complications pulmonaires, etc., spécialement chez les malades manquant de réaction (37°5 à 38° de température). On obtiendra des résultats encore plus nets, notamment dans le traitement des affections graves et de l'ostéomyélite, en associant le traitement par la *Therm saline* au Lipodéterpénol. Il n'y a guère de contre-indications que dans l'hypercholestérolémie.

Mode d'emploi. — Une *injection* sous-cutanée tous les deux jours dans la région du flanc ou de la cuisse. Frictions journalières de 10 minutes avec la *pommade*, alternativement sur la poitrine, le dos, l'abdomen, les reins et les membres ou localement.

Prix : 6 ampoules : 39 francs. — Prix : Pommade : 25 francs

Laboratoire ZYMA

9 Place Félix-Faure — PARIS (XV^e).

Téléph. Vaugirard 28-83.

LIPOIODINE CIBA

Iode organique.

Dilodo-brassidate d'éthyle, 41 p. 100 d'iode. D'une élimination plus lente que les iodures de potassium et de sodium, la Lipiodine remplace avantageusement ces deux médicaments, à dose moindre, avec une tolérance meilleure et sans accidents d'iodisme.

Indications. — Celle de l'iode et des iodures : Artériosclérose, hypertension artérielle. Angine de poitrine. Affections des voies respiratoires, Rhumatisme chronique, Obésité, Goitre, Scrofule, Adénopathies, Syphilis, etc.

Doses. — *Adultes* : 1 à 6 comprimés par jour, une ampoule tous les 2 jours. — *Enfants* : 1/2 à 3 comprimés (aux repas principaux).

Le tube de 20 comprimés : 14 francs.

La boîte de 6 ampoules : 20 francs.

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND

109-113, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.

LIPOSEPTINE

Antitoxine polyvalent du professeur Lemoine.

Composition. — Extrait éthéré de levures de saccharomycès. Possède les propriétés curatives. des vaccins les plus actifs.

Indications. — Toutes les maladies infectieuses.

Mode d'emploi. — Faire l'injection d'une ampoule sous la peau, chaque jour : matin et soir dans les cas graves. L'injection ne provoque ni choc ni réaction locale.

La Liposeptine se présente également sous la forme de petites pilules. pour ingestion par voie buccale. Complètent et renforcent l'action des injections. Dose moyenne : 4 petites pilules par jour.

Ampoules — Prix : 30 francs.

Pilules. — Prix : 16 francs.

Laboratoires de la LIPOSEPTINE

2, place des Vosges — PARIS.

LIPOSPLÉNINE DU D^r GROG

Opothérapie splénique spécifique (Soula).

Références scientifiques propres à la Liposplénine du D^r Grog :

Communications à l'Académie de médecine :
18 janvier 1927 ; 18 juillet 1928.

Communications à la Société de biologie :
22 décembre 1928, 16 février 1929, 21 décembre 1929.

Communication au XX^e Congrès de médecine
de Montpellier, 18 octobre 1929.

Communication au II^e Congrès du Paludisme
Alger, 19-21 mai 1930.

Communications à la Société de Thérapeutique Paris, 12 novembre 1930, 8 février 1933.

Communication à la Société d'Hématologie
Paris, 3 février 1932.

Thèses : D^r E. Cauquil, *Rate et Rachitisme* (1928) ; D^r Fau, *Action des Extraits Lipidiques d'organes* (1928) ; D^r Radji, *Contribution au traitement des Anémies avec splénomégalie* (1929).

Composition. — 1^o Lipides insaponifiables contenus dans la pulpe splénique, dont le cholestérol, extraits par un procédé spécialement établi par le P^r L.-C. Soula ; 2^o l'Insaponifiable X partiellement soluble.

Indications. — 1^o *Médication spécifique* des :

- a. Anémies (quelles qu'en soient la cause et la nature, sauf les anémies de Biermer).
- b. Amaigrissements graves et persistants.
- c. Grossesses et retours de couches pénibles et difficiles.
- d. Retards de croissance, débilité infantile, tous états rachitiques, déminéralisations, troubles douloureux dentaires du nourrisson.

Surmenage, Convalescence, Dépression nerveuse, Neurasthénie, Faiblesse et fatigue générale, tous états de déchéance organique.

2° *Puissant modificateur du terrain dans* : Prétuberculose, Tuberculose pulmonaire, osseuse et viscérale.

Présentations. — 1° *Comprimés* dosés à 3 centigr. de principes actifs. Six à huit par jour, en deux fois, *au milieu* de chacun des deux principaux repas. Ne pas croquer les comprimés, les avaler avec une gorgée d'eau. Par séries de 80 (soit une boîte : 10 à 12 jours de traitement, 18 fr.) séparées par un repos de trois jours.

2° *Ampoules* de un cc. titrées à 2 centigr. de principes actifs. Une injection *sous-cutanée, indolore*, tous les deux jours. Repos de six jours après la huitième injection ; puis reprendre et continuer le traitement selon le rythme jusqu'à la guérison ou une amélioration nettement consolidée.
(La boîte de huit ampoules : 20 fr.)

3° *Sirop*, dosé à 8 cgr. de principes actifs, par cuillerée à café. *Spécialement réservé aux enfants*. Une à deux cuillerées à café par jour. *A prendre dans l'intervalle des repas*. (Prix : 18 fr.).

4° *Gouttes* (huile à 5 p. 100 de principes actifs). Jusqu'à un an : XXX gouttes par jour, en trois prises ; de un à quatre ans : XL gouttes ; de quatre à dix ans : LX gouttes ; au-dessus de dix ans : LXXV gouttes, toujours en trois prises dans la journée. (Prix : 18 fr.).

Littérature et échantillons :

Laboratoire des LIPIDES

Jean OLIVE, pharmacien.

14, rue des Minimes — PARIS (III^e).

Archives 03-94.

LIPOVITA (granulé)

Vitamines liposolubles.

Formule :

Carotène (Vitamine A) : 4 000 unités internationales.

Ergostérol irradié (Vitamine D) : 40 000 unités internationales pour 100 grammes.

Indications. — Troubles de croissance, Rachitisme, Déperdition de chaux et de phosphate, Carie des dents, Etats ganglionnaires.

Doses :

Nourrissons : 1 cuillerée à café par jour en deux fois.

Enfants : 2 cuillerées à café par jour.

Adolescents et adultes : 3 cuillerées à café par jour.

Prix : 16 francs.

Laboratoire MAUCHANT
à GENNEVILLIERS (Seine).

LIQUIDIX

Formule :

| | |
|-------------------------|-------------|
| Sulfate de Cuivre | 1 gr. 2174 |
| Sulfate de Zinc | 0 gr. 1492 |
| Camphre..... | 0 gr. 3141 |
| Safran..... | 0 gr. 1492 |
| Alcool à 60° | 19 gr. 1355 |
| pour 100 gr. | |

N° d'inscription au Laboratoire de Contrôle : 322-2

Indications thérapeutiques. — Toutes dermatoses

Mode d'emploi. — Simple application, pur ou étendu d'eau. Le mode d'emploi qui accompagne chaque flacon est très détaillé.

Livré en flacon de 250 cc.

Prix : 15 francs.

Toutes Pharmacies et Pharmacie DELAPRÉE
MORTAGNE-SUR-SEVRE (Vendée).

LISTOSE VICARIO

Huile de paraffine chimiquement pure.
Spécialement préparée pour l'absorption
par voie buccale.

(La première en date en France).

MANQUAT, Académie de Médecine, 27 janvier 1914
(*Paris Médical*, 25 avril 1914).

VICARIO, Nouvel emploi pour usage interne. (*Journal de Pharm. et de Chim.*, 16 février 1914).

Laxatif mécanique, doux, inoffensif, non assimilable, non fermentescible.

La **LISTOSE** se présente sous deux formes :

LIQUIDE (légèrement aromatisée).

GELÉE (consistante et sucrée).

Mode d'emploi. — Liquide : Une cuillerée à soupe matin et soir. — Gelée : Une cuillerée à café matin et soir.

Indications. — Constipation, Entérites, Colites, etc
Pendant la grossesse et après les opérations intestinales.

Prix : Gelée : 8 francs. — Liquide : 11 francs.

Laboratoires VICARIO

17, boulevard Haussmann — PARIS (IX^e).

LITA

Cuniculi-sérum Iodobenzométhylé.

Composition. — Mélange de sérum de lapin ayant reçu des doses croissantes de tuberculine (1 partie) et d'Iodaseptine (2 parties).

Présentation. — Se présente sous forme d'ampoules de 3 cc. qui peuvent être injectées par voie intramusculaire ou intraveineuse.

Mode d'emploi. Doses. — Deux injections par semaine par séries de 20 injections. Ne pas arrêter le traitement après amélioration : continuer jusqu'à guérison. Les injections seront faites de préférence *intramusculaires profondes*. Chez l'enfant, on commencera par 1 cc. pour la première injection, 2 cc. pour la seconde, 3 cc. pour la troisième.

Indications. — Chez l'adulte : Toutes formes de Tuberculose pulmonaire à toutes les périodes. Tuberculoses viscérales. Pas de choc, pas d'intolérance, pas d'accidents (hémoptysies ou autres).

Chez l'enfant : Prétuberculose, formes ganglio-pulmonaires de premier âge.

Prix : Boîte de : 6 ampoules : 70 franc
4 ampoules : 50 francs. — 2 ampoules : 25 francs.

Laboratoires CORTIAL

7, rue de l'Armorique — PARIS

LOBÉLIANE LALEUF

Composition. — Préparation exclusivement végétale à base de Lobélie, Valériane stabilisée, Aubépine, de goût et odeur agréables, dénuée de toxicité, exempte de toute addition de produits chimiques.

Propriétés et indications thérapeutiques. — Antispasmodique puissant, agissant sur le système neuro-végétatif.

Médicament de choix des affections spasmodiques névropathiques, névroses et insomnies.

La Lobéliane Laleuf est présentée sous deux formes : liquide et comprimés.

2 comprimés correspondent à 1 cuillerée à café de Lobéliane liquide.

Dose calmante : 2 à 3 cuillerées à café ; 4 à 6 comprimés par jour.

Dose hypnotique : 1 ou 2 cuillerées à café ; 2 ou 4 comprimés, après le repas du soir.

La Lobéliane se prend avec un peu d'eau ou mieux avec une infusion de tilleul.

Le flacon ou l'étui de 50 comprimés : 15 fr.

Laboratoires LALEUF

51, rue Nicolo — PARIS (XVI^e).

LOBELINE BRUNEAU

Médicament spécifique de toutes les paralysies des centres respiratoires

Composition. — Solution rigoureusement titrée de chlorhydrate de Lobeline chimiquement pur. (Conservation indéfinie).

Indications. — Tous les états asphyxiques : En chirurgie (syncopes anesthésiques). — En obstétrique (asphyxie des nouveau-nés). — En médecine générale (troubles respiratoires à la suite de pneumonie, broncho-pneumonie, etc., empoisonnements, électrocution, submersion).

Posologie et mode d'emploi.

Chez l'adulte : en injection sous-cutanée ou intramusculaire : 0,010 milligrammes par dose. On peut sans aucun danger répéter les injections toutes les 10 ou 15 minutes.

Doses maxima : 0 gr. 02 par dose. 0 gr. 10 par 24 heures.

en injection intra-veineuse : 0,003 par dose. Cette injection doit être pratiquée très lentement et ne pas dépasser 0,003 milligrammes, mais on peut faire immédiatement après une injection intramusculaire ou sous-cutanée de 0,010 milligrammes.

Chez l'enfant : en injection sous-cutanée ou intra-musculaire exclusivement :

Chez le nouveau-né et pendant les 4 premiers mois 0,003 milligr. par dose

A partir de 4 mois 0,005 — —

A partir de 1 an 0,010 — —

Présentation. — Boîtes de 2-6 et 25 ampoules titrées exclusivement à 0,003 milligr. et 0,010 milligr.

Prix : Amp. à 0,003, boîte de 2 : 5 fr. 35. — de 6 : 15 fr. 85.

— Amp. à 0,010, boîte de 2 : 13 fr. 35. — de 6 : 38 francs.

Les Laboratoires BRUNEAU et C^{ie}

17, rue de Berri, PARIS (VIII^e)

Tél. : Elysées 61-46. — Adresse télégr. : Labomédical-Paris-45

LOBÉLINE « SANDOZ »

Composition. — Chlorhydrate de lobéline pur. Alcaloïde principal de la lobélia inflata, totalement exempt d'alcaloïdes secondaires et d'impuretés toxiques.

Avantages. — Pureté chimique. Actions physiologique et thérapeutique toujours identiques. Solution stable dosée rigoureusement. Titre constant.

Indications. — Asphyxie bleue des nouveau-nés, laryngite striduleuse, broncho-pneumonie, toutes asphyxies accidentelles et médico-chirurgicales.

Posologie et présentation. — Boîtes de 3 ampoules, dosées à 0 gr. 003 et à 0 gr. 01. 1 ampoule à la fois, à répéter si nécessaire.

Prix :

Dosage faible. La boîte : 8 francs.

Dosage fort. La boîte : 20 francs.

Produits SANDOZ

20, rue Vernier — PARIS (XVIII^e).

LOBULINE

Insuline « per os »

Composition. — Extrait des îlots de Langerhans du pancréas associé à une levure glycolytique pure.

Forme. — Comprimés dragéifiés pour administration *par voie buccale*.

Indications. — Diabète.

Avantages. — Innocuité absolue. Simplicité d'emploi. Action très persistante.

Mode d'emploi. — 2 à 6 comprimés par jour, suivant la glycosurie.

Boîte de 60 comprimés.

Prix 35 francs.

Laboratoires ROBERT et CARRIÈRE
37, rue de Bourgogne — PARIS.

LOGAPHOS

Composition. — Acide monoéthylphosphorique. Noix vomique totale.

Forme. — Gouttes.

Indications. — Toutes asthénies, Tonique stomacal, Rephosphorant de la cellule cérébrale.

Dose. — 20 gouttes avant les 2 repas dans un peu d'eau.

Prix : 15 francs.

Laboratoires

L. BOIZE et G. ALLIOT

9, avenue Jean-Jaurès — LYON

LORAGA

Traitement rationnel de la constipation.

Emulsion stable et homogène, sans goût, sans arôme artificiel, *miscible à tous liquides* (lait, eau sucrée ou non, infusions, potages).

Composition :

Huile de Paraffine neutre et de haute viscosité, Agar-Agar, Phénolphthaléine.

Ne contient ni alcool, ni sucre, ni saccharine, ni alcalis.

Indications :

Toutes formes de constipations, auto-intoxications ; utile aux atoniques, femmes enceintes, nourrices ; constipation post-opératoire. Absence totale d'inconvénients.

Action Physiologique :

Lubrifie l'intestin, pénètre et ramollit le résidu alimentaire, active le péristaltisme sans provoquer l'irritation ou la constipation secondaire consécutive à l'usage des purgatifs usuels.

Ne trouble nullement les fonctions de la digestion — ne cause ni nausées, ni coliques. Absence complète de suintement. Aucune accoutumance.

Dose et mode d'emploi :

Adultes : De 1 à 4 cuillerées à café, soit pur, soit dilué, le soir, au coucher ; si nécessaire, répéter la dose le lendemain matin.

Enfants : 1/2 à 2 cuillerées à café, suivant l'âge, pur ou dilué.

Deux modèles :

210 cc. : 17 fr. 50 — 420 cc. : 30 francs.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 150-2.

Prière d'adresser toutes demandes de renseignements et d'échantillons aux :

Laboratoires SUBSTANTIA
F. Guillemoteau, Pharmacien
13, rue Pagès — SURESNES (Seine).

LUBROKAL

Composition. — 0,60 de brome (ionisé) ; 0,04 de phényl-éthyl-barbiturate de sodium.

Indications. — Epilepsie essentielle et symptomatique, insomnie nerveuse (sous forme de cure médicamenteuse), états d'angoisse, neurasthénie, hystérie, chorée, terreurs nocturnes, à titre préventif contre la migraine et la migraine ophtalmique.

Mode d'action. — L'action simultanée sur les centres corticaux (brome) et les centres mésencéphaliques (acide barbiturique) permet, avec un dosage très réduit, de calmer le système nerveux presque tout entier.

Dosage. — Prendre toujours les comprimés dissous dans l'eau. Epilepsie bénigne : 1 à 2 comprimés ; cas moyens : 3 fois par jour 1 comprimé ; cas graves : jusqu'à 3 fois par jour 2 comprimés. Posologie pour les enfants à fixer suivant leur poids.

Présentation. — Tube de 20 comprimés : 19 francs.

Laboratoires RECRESAI

Pharmacie Normale L. BÉLIÈRES

Docteur en Pharmacie,

19, rue Drouot — PARIS (IX^e).

LUCODAL

Se présente sous forme de perles, contenant chacune rigoureusement dosés à l'état le plus actif : Bromoforme, Codéine, Aconit, Belladone, Drosera.

Propriétés thérapeutiques. — La perle de Lucodal permet d'administrer son contenu sans aucune intolérance gastrique.

Elle s'adresse à toutes les formes spasmodiques, quinteuses, sèches de la toux. Toux émétisantes des tuberculeux. Toux des hépatiques, des diabétiques, etc., Toux post-grippales.

Adultes : 3 à 4 perles par 24 heures.

Enfants (seulement au-dessus de 5 ans) : 1 à 3 perles par 24 heures.

Prix : 10 fr. 50 l'étui (sans impôt).

Echantillons :

Laboratoires CARESMEL

2, quai Paul-Bert — TOURS. — Tél. : 19-42.

LUDIN

Traitement Arséno-Mercuriel dissimulé.

Formes :

Sirop. — Granules.

Composition :

1 cuillerée à soupe de sirop ou 3 granules contiennent 1 ctgr. Hg. + 1 milligr. As.
Sans iodure, sans alcool.

Doses moyennes :

Sirop :

Adultes : de 2 à 4 cuillerées à soupe par jour.

Juniors : 2 à 4 cuillerées à dessert.

Enfants : par cuillerées à café.

Granules :

Adultes : 6 à 12 granules par jour.

Juniors : 4 à 8 granules par jour.

Enfants : 2 à 3 granules par jour.

Nota. — Prendre ces doses de préférence pendant les repas.

Propriétés thérapeutiques :

Tolérance parfaite, sécurité absolue. Beaucoup plus actif que le bismuth sans en présenter les inconvénients (stomatites, etc.). Activité égale à celle des arséno-benzols sans en avoir la toxicité.

Indications thérapeutiques :

Enfants hérédos, Prophylaxie pendant la grossesse, Traitement d'épreuve, Syphilis larvée, Dysenterie amibienne relevant des Hématozoaires, Eczémas, Dermatoses, etc.
Peut être prescrit aux enfants en bas âge en diluant le sirop dans eau ou sirop simple, ou dans le lait.

Prix : Granules, 15 francs. Sirop, 16 fr. 80.
Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des médicaments sous les n^{os} 302-1 et 302-2.

Laboratoires REY — DIJON.

LUGOCALCION

Composition. — 1 cuillerée à soupe contient :
 Chlorure de calcium..... 1,50
 Adrénaline sol 1/1000 X gouttes.
 Teinture belladone. II —

Goût agréable.

Indications. — *Recalcifiant* (croissance, tuberculose, grossesse, allaitement, convalescence, etc...).
Hémostatique (hémoptysies, gastrorragies, menstruations abondantes, toutes hémorragies, préventif des hémorragies post-opératoires). *Déchlорurant* (albuminurie, néphrite, pneumonies, etc...).
Antianaphylactique (urticaire, éruptions digestives, rhume des foins, etc...). *Thérapeutique oculaire* (glaucome, rétinite, choroïdites, etc.).

Doses. — *Enfants* : 1 à 4 cuillerées à café par jour.
Adultes : 1 à 6 cuillerées à soupe par jour.

Prix : 19 francs.

Concessionnaires : Les Laboratoires NOVALIS
 OULLINS (Rhône).

LUOSTYL

Traitement mercuriel par voie buccale. Efficace et bien toléré.

Composition :

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Hermophényl | 0 gr. 20 |
| Fluorure de Sodium | 0 gr. 20 |
| Arrhénal..... | 0 gr. 15 |
| Formiate de Sodium | 1 gr. |
| Alcoolature orange douce Dausse..... | 2 gr. |
| Sirop simple..... | Q. S. p. 100 gr. |

Flacon de 310 cc. Prix : 20 francs.

Particularités. — Association très stimulante et réparatrice par sa formule. Présentation absolument discrète. Bien toléré, permet de continuer efficacement l'action des traitements par piqûres dans toutes les périodes de la syphilis héréditaire ou acquise.

Emploi :

Adultes : 1 cuillerée à soupe 2 fois par jour.

Enfants : jusqu'à 10 ans 2 cuillerées à café par jour ; de 10 à 18 ans, 3 cuillerées à café par jour.

Laboratoires du SEDARTHRYL
 (Antirhumatismal.)

A. GONTARD

22, rue de Nemours — PARIS.

O. C. P. toutes Drogueries et Pharmacies.

LUSOFORME

Formol saponiné, liquide et comprimés :

Lusoforme médical. — Antiseptique général de 1/4 à 1 p. 100.

Lusoforme brut. — Désinfectant et désodorisant de 2 à 5 p. 100.

Le Lusoforme est un savon légèrement alcalin contenant 20 p. 100 de formol et fabriqué à l'autoclave.

Indications. — Gynécologie, Obstétrique, Hyperhydroses, Pansements d'urgence.

Prix de vente au public :

Lusoforme médical, flacons de 100, 250 et 500 gr., à 3 fr. 50, 7 fr. et 12 fr. La boîte de 50 compr., 8 fr.

Lusoforme brut, bidons de 2, 5 et 10 kilos, à 10 fr., 9 fr. 50 et 9 fr. 25 le kilo.

Laboratoires CARTERET

15, rue d'Argenteuil — PARIS.

LUTÉOVAR

Indications. — Règles douloureuses Règles irrégulières. Ménopause.

Composition. — Contient 0 gr 20 d'ovarine par dragée.

Posologie. — De 4 à 6 dragées par jour (au début des repas)

Propriétés. — Régularise l'activité ovarienne. Supprime la douleur. Normalise les règles.

Prix :

Le flacon de 60 dragées : 15 francs.

Échantillons gratuits :

Laboratoires FOULON

20, faubourg Poissonnière — PARIS (X^e).

LYNÉVOL

Pommade en tube.

Composition. — Acide orthoxybenzoïque, Métadioxybenzène, ox. de zinc, ac. boriq., Baume du Pérou, Essences et Lanoline.

Indications. — Erythème fessier, Crevasses du sein, Brûlures, Coups de soleil, Prurits, Impétigo, Herpès.

Avantages. — Ne tache pas, s'enlève facilement, est imperméable aux liquides, possède une odeur agréable, est toujours toléré par les épidermes les plus sensibles. Prix au public : 6 fr. 50 et 10 francs.

**J. FABRE, Docteur en Pharmacie
Licencié ès Sciences.**

112, rue des Pyrénées — PARIS (XX^e).

LYSACRÈME L. M. L.

D'après les travaux des Docteurs Larget, Moreau et Lamère.

Constitution. — Emulsion savonneuse stable d'antivirus lysats concentrés à 70 p. 100.

Avantages. — 1^o Le savon de constitution spéciale permet une concentration considérable des antivirus, et facilite la pénétration de l'émulsion d'antivirus.

2^o Souches microbiennes non repiquées et fraîchement prélevées.

3^o Lyse par le B. Pyocyanique facilitant la concentration des antivirus

4^o Aucune réaction. Aucune contre-indication.

Indications. — Suppurations aiguës ou chroniques de la peau et des muqueuses : furoncles, orgelets, panaris, anthrax, ulcères variqueux, pyodermites. Engelures, brûlures, coups de soleil, eczéma, conjonctivites, blépharites. Plaies de toutes natures.

Mode d'emploi. — Deux à trois pansements par jour, avec massage doux et prolongé si possible. Recouvrir avec un taffetas. Dans les cavités : une mèche imbibée de LYSACREME L. M. L.

Prix :

Grand tube : 15 francs. — Petit tube : 10 francs.

Laboratoires ROBERT et CARRIERE
37, rue de Bourgogne — PARIS (VII^e).

LYSARTHROL

Granulé effervescent à base d'Uroformine, de benzoate de lithine et de diastases tissulaires rénales (complexe opo-chimiothérapique).

Propriétés thérapeutiques. — Stimulant puissant de la fonction rénale par les diastases tissulaires qu'il contient. Augmente rapidement le taux des urines.

Indications thérapeutiques. — Toutes les diathèses, toutes les maladies par ralentissement de la nutrition : Obésité, Goutte, Gravelle, Lithiase biliaire, Migraines, Rhumatismes chroniques.

Posologie. — Flacon de 125 cc. 4 bouchons-mesure par jour dans un peu d'eau 20 jours, par mois.

Prix au public : 11 francs.

Laboratoires du Docteur ROUSSEL

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI^e).

LYSAXINS L. M. L.

Constitution. — Trois constituants :

- 1° LYSATS PYOCYANIQUES.
- 2° CORPS MICROBIENS FORMOLÉS.
- 3° PEPTONES POLYVALENTES.

Avantages :

Trois avantages :

- 1° Lysats *très polyvalents* (souches extrêmement nombreuses et sélectionnées). *Très actifs* (souches non repiquées, PH spécialement étudié).
- 2° Vaccins *microbiens* très efficaces grâce à l'atténuation par la formaline (pouvoir fixateur remarquable, conservation de la sensibilité cellulaire aux agglutinines, du pouvoir antigénique des cultures, atténuation des toxines).
- 3° Adjonction du *choc peptonique* à volonté (le choc peptonique peut être supprimé par la Panphylase).

Indications :

- a) **LYSAXIN ANTIPYOGÈNE.** — Suppurations dues aux Pyogènes communs : furoncles, anthrax. Erysipèles, otites, panaris, pleurésies purulentes, *Préventivement.* — Avant toutes interventions, sur les membres en particulier, larges plaies infectées, fractures ouvertes, brûlures, etc...
- b) **LYSAXIN ABDOMINAL.** — Suppurations digestives : appendicites, cholécystites, pyélonéphrites, salpingites. *Préventivement.* — Avant toutes interventions sur l'abdomen (intestin, appareil génital de la femme, appareil urinaire).
- c) **LYSAXIN ANTI-NEISSER.** — Uréthrites anciennes, orchites, prostatites, vaginites métrites, arthrites, etc.

Posologie :

- 1° *Traitement curatif.* — Première injection ; 1/2 cc. et augmenter ensuite jusqu'à 2 cc. Faire au minimum 3 injections de 2 cc.
- 2° *Traitement préventif.* — 4 injections de 1 cc. Espacer toujours les injections de 48 heures au minimum.

Prix : 20 francs.

Laboratoires ROBERT et CARRIERE

37, rue de Bourgogne — PARIS (VII^e).

MAGBROMYL (Adultes)

Bromure de sodium pur renforcé par chlorure de magnésium. Tonique et stabilisateur du système nerveux.

MgCl² augmente l'activité thérapeutique des bromures. Plus de torpeur, plus de dépression. Pas d'anaphrodisie.

Indications. — Toutes celles des bromures.

Mode d'emploi. — 2 à 4 cuillerées à café par jour dans 1/2 verre d'eau ou de lait.

Une cuillerée à café contient : 0,50 NaBr; 0,25 MgCl² et 0,10 de CaCl².

Médecine infantile. SIROP DE MAGBROMYL

Pour enfants (jusqu'à 12 ans).

De 1 à 8 cuillerées à café par jour.

Une cuillerée à café contient : 0,25 NaBr; 0,10 MgCl² et 0,05 de CaCl².

Ces préparations, de goût vraiment agréable, masquent totalement la saveur désagréable des bromures.

Prix : 16 fr. 75. — Pour enfants : 9 fr. 50.

Laboratoire du MAGASLYL

A. ROUX, Pharmacien.

10, rue de la Mairie — IVRY-SUR-SEINE.

MAGÉCARINE

Comprimés à base de magnésie, carbonate de chaux, bicarbonate de soude et divers extraits de plantes.

Doses et mode d'emploi. — 2 à 6 comprimés au moment des troubles.

Propriétés thérapeutiques. — Neutralisant.

Indications. — Aigreurs, Brûlures d'estomac ou hyperchlorhydrie.

Prix : 14 francs.

Laboratoires DARRASSE

Rue Saint-Maurice — NANTERRE (Seine).

MAGIODYL

Soluté d'Iodure de Sodium cristallisé pur, renforcé par le Chlorure de Magnésium.

Seule préparation de goût vraiment agréable masquant totalement la saveur insupportable des iodures.

Avantages. — Le Chlorure de Magnésium augmente l'activité thérapeutique des iodures, supprime les accidents d'iodisme. Emploi facile en médecine infantile et chez les personnes délicates.

Indications. — Hypertension, artériosclérose et toutes celles des Iodures.

Mode d'emploi. — 2 à 6 cuillerées à café par 24 heures, chacune prise dans 1/2 verre d'eau ou de lait tiède, sucré ou non.

Dose variable.

Une cuillerée à café contient : 0 gr. 25 d'iodure de sodium et 0 gr. 25 de Mg Cl².

Prix : 17 fr. 75.

Laboratoire du MAGSALYL

A. ROUX, Pharmacien.

10, rue de la Mairie — IVRY-SUR-SEINE.

MAGNECYTHINE

Agent spécial de la minéralisation cellulaire.

Le rapport du magnésium au calcium est particulièrement intéressant. Calcium minéral = charpente, et magnésium minéral = activité en entretien.

Quand le magnésium s'use et disparaît, la cellule vieillit. Et quand l'âge ou la fatigue arrivent, le magnésium et ses dérivés disparaissent.

Il y a rapport de cause à effet dont on constate les résultats. La déficience magnésienne est souvent cause chez les affaiblis de l'inaction des toniques normaux : fer, manganèse, arsenic, etc...

La diminution progressive de la vitalité cellulaire en fonction du retrait magnésien est acquise scientifiquement. La cellule morte cause la déchéance générale ou locale quel que soit le nom qu'on lui donne. Et on constate que le taux magnésien est excessivement bas. *Les chlorures seuls ne sont pas supportés sans inconvénients. Le Magnecythine à ce point de vue n'est comparable à aucun autre produit.*

Mode d'emploi et dose.

Comprimés : de 1 à 6 par jour, généralement, 2 dans un petit verre d'eau avant ou après les repas.

Prix : 18 francs.

Laboratoire du Docteur TISSOT

34, boulevard de Clichy — PARIS.

MAGNELAX

Composition. — Emulsion de Magnésie et d'Huile de paraffine.

Indications. — Laxatif ne contenant aucun drastique, constipation, fermentations, acidités.

Posologie (Doses moyennes) :

Adultes : 1 cuillerée à soupe par jour.

Enfants : 1 cuillerée à dessert par jour.

Nourrissons : 1 cuillerée à café par jour dans le lait du biberon.

Prix : 15 fr. 50.

Docteurs FAURE et DUSSUEL

Pharmaciens de 1^{re} classe

AIX-LES-BAINS.

MAGNÉSIUM HARDY

Le seul chlorure de magnésium vraiment agréable.

Ses deux formes :

Sirop (14 jours traitement) : 16 fr.

Tablette-bouillon (20 jours traitement) : 18 fr.

Dose quotidienne. — 1 cuillerée à soupe de *sirop* ou 1 *tablette-bouillon* contiennent 1 gr. 20 Mg Cl² pur, sec.

Posologie recommandée par M. le professeur Delbet.

Indications. — Asthénie nerveuse, Régulateur hépatique, Dermatoses, Prurits, Verrues, Vieillesse prématurée, Prostatisme. Soutien et prolongation des cancéreux inopérables. Défense des cancéreux opérés.

Laboratoires PAUL HARDY

Docteur en pharmacie. Ancien Interne des Hôpitaux.

42, boulevard Saint-Marcel — PARIS (V^e).

Tél. : Gobelins 36-96.

MAGNÉSO-TUBES ROBINET

Chlorure de magnésium (plus de 50 p. 100) associé à des acides phosphoriques organiques : glycérophosphates, anhydrooxyméthylène diphosphates de chaux et de magnésie, acide nucléinique.

Présentation. — 30 tubes d'une poudre où se trouve masqué le goût si désagréable du chlorure de magnésium.

Emplol. — Un tube deux fois par jour (aux repas), mélangé au café, au lait, au potage, à la boisson, aux purées, etc...

Posologie. — 15 jours tous les deux mois comme reminéralisant, reconstituant, préventif du cancer, etc... Presque sans arrêt, dans les cas de lésions précancéreuses, tumeurs déclarées, et après une intervention chirurgicale.

Indications. — Amélioration des troubles du système nerveux végétatif : nerfs sympathiques. Régulateur du tonus vago-sympathique et du fonctionnement defectueux des glandes endocrines. Troubles ovariens de la puberté et de la ménopause (Syndromes pluriglandulaires). Séquelles post-opératoires. Asthénie. Fatigue générale. Rhumatismes, constipations, prostatites, cholécystites, etc... Affections de la peau : acné, psoriasis, eczéma. Lutte contre les tumeurs en général. Prophylaxie du cancer. Donne une sensation de grand bien-être.

Prix : 18 francs.

Laboratoires ROBINET

MORET-SUR-LOING (Seine-et-Marne).

« **TERRAINS MAGNESIENS ET CANCER** », par L. Robinet. — Pour la France : communiqué à l'Académie de médecine par M. le professeur P. Delbet (avril 1930). — Pour l'Alsace-Lorraine : Académie de médecine (avril 1930). — Pour l'Angleterre : Académie de médecine (juillet 1931). — Pour le Grand-Duché de Bade : Académie de médecine (juillet 1932).

MAGNÉSOVULES

Ovules au chlorure de magnésium
(0 gr. 25 par ovule) conservés suivant la

MÉTHODE SOLACTIVE

Méthode de *conception nouvelle* donnant des résultats remarquables, consistant à conserver les ovules dans un récipient de verre neutre contenant un liquide spécial.

Avantages. — Fusibilité parfaite. Activité décuplée. Asepsie. Conservation intégrale du pouvoir hygroscopique.

Indications. — Les inflammations aiguës ou chroniques de l'utérus et des annexes. Métrites, Salpingites, Ulcérations du col. Vaginites, Prurits vulvaires etc...

Mode d'emploi. — Retirer du flacon un Magnésovule en le piquant avec la petite fourche, et l'introduire dans le canal vaginal, le soir au coucher. Se garnir ensuite au moyen d'un tampon de coton et d'une serviette périodique.

Les Magnésovules s'appliquent tous les soirs ou tous les deux soirs. Dans les cas aigus, ils peuvent être employés plusieurs fois dans la journée.

Présentés de même façon, il existe des ovules à l'Ichtyol véritable, dénommés Ovules au Sulfichtyol.

Prix : 18 francs.

Docteur MARTINET

16, rue du Petit-Musc — PARIS.

MAGNOGÈNE

Forme. — Comprimés dragéifiés aux sels halogénés de magnésium.

Propriétés thérapeutiques. — Modificateur cytophyllactique stimulant biologique.

Indications. — *Adénome prostatique* : Asthénie, Débilité, Déficiences organiques, Troubles neuro-musculaires, Prurits et Dermatoses. Prophylaxie du cancer.

Dose moyenne. — 4 dragées chaque matin pendant le petit déjeuner. Avaler sans croquer.

Prix. — Le flacon : 15 francs.

Laboratoires ROMON

6 bis, rue Bridaine — PARIS.

Tél. : Marcadet 11-22.

MAGOL CHURCHILL

(Hypophosphite de manganèse : 0 gr. 20 par dose.)
Médication reconstituante par le phosphore directement assimilable.

Préparation assimilable de *phosphore* et de *manganèse*.
Métal-Ferment grand Catalyseur, Agent et Cause de toutes les oxydations qui régissent le Substratum vital.
Remplace avantageusement le Fer.

Indications. — Anémie, troubles de l'ovulation, croissance difficile, insuffisances hépatique et mitrale, diabète, chlorose.

Sirop. — 1 cuillerée à soupe dans un peu d'eau après chacun des deux principaux repas de la journée.

Comprimés. — 2 comprimés absorbés, mais non dissous, à chacun des deux principaux repas de la journée.

Ampoules. — 1 injection intramusculaire chaque deux jours.

Sirop. — A partir de 7 ans, par cuillerée à dessert. Au dessous de cet âge par cuillerée à café.

Comprimés. — A partir de 7 ans : 1 comprimé dans les mêmes conditions que pour les adultes.

Ampoules. — Suivant indications du médecin traitant.
3 formes : sirop, comprimés, ampoules. — Prix : 15 francs.

PRODUIT FRANÇAIS

Laboratoire CHURCHILL

12, rue Castiglione — PARIS (1^{er}).

MAGSALYL Mg

Soluté de Salicylate de soude cristallisé chimiquement pur associé au chlorure de magnésium à dose catalytique.

Atoxique par l'ion magnésium de $MgCl^2$, pas de dépression, empêche l'évolution des accidents cardiaques.

Seule préparation de goût vraiment agréable masquant totalement la saveur insupportable du salicylate de soude.

Possibilité de traitement prolongé. Activité intense. Cure d'entretien. Emploi facile en médecine infantile.

Indications. — Toutes celles du Salicylate de Soude.

Mode d'emploi. — De 2 à 20 cuillerées à café par 24 heures par dose de 1 à 2 cuillerées prises dans 1/2 verre ou 1 verre d'eau de Vichy ou de lait tiède, sucré ou non.

Une cuillerée à café contient : 0 gr. 50 de *Salicylate de soude cristallisé*, 0 gr. 05 de $MgCl^2$.

Prix : 18 francs.

Laboratoire du MAGSALYL

A. ROUX, Pharmacien.

10, rue de la Mairie — IVRY-SUR-SEINE.

MAIZENA

Crème de maïs de très grande pureté.

Présentation. — Poudre absolument blanche, sans goût, ni odeur, insoluble dans l'eau froide, mais soluble et formant une crème onctueuse dans l'eau chaude et si la concentration est suffisante, une gelée en refroidissant.

| | | |
|-----------|--------------------------|--------------|
| Analyse : | Carbohydrates | 87,60 p. 100 |
| | Matières grasses | 0,04 — |
| | Matières azotées | 0,72 — |
| | Matières minérales | 0,14 — |
| | Humidité | 11,5 — |
| | | <u>100</u> — |

Indication. — Aliment léger, facilement assimilable, convenant particulièrement aux enfants, aux convalescents et aux personnes d'estomac délicat.

Mode d'emploi. — Sous forme de bouillies, de potages, d'entremets sucrés et aromatisés : 1° Délayer la Maizena dans un liquide froid (lait, bouillon) pour que le mélange soit bien lisse ; 2° Verser ce mélange dans le reste du liquide en ébullition ; 3° Laisser bouillir quelques instants seulement.

Dose. — Variable, suivant le mets à préparer.

Pour les *enfants*, une cuillerée à soupe pour une bouillie de 160 gr.

Prix : La boîte de 500 gr. : 4 francs. — La boîte de 250 gr. : 2 fr. 25.

Société des PRODUITS DU MAIS

29, rue de Berri — PARIS.

MALARSAN

Sel de quinine de l'acide acétyl-amino-oxyphényl-arsinique.

Propriétés thérapeutiques. — Traitement par voie buccale : du **Paludisme** (*Plasmodium vivax* et *Plasmodium malarix*) et des **Parasitoses intestinales** à protozoaires (diarrhées rebelles à amibes, spirilles ou lamblis).

Présentation. — Tube de 30 pilules vernies et inaltérables à 0 gr. 20 de sel actif.

Posologie. — 3 pilules par jour, pendant 10 jours. Activité remarquable, tolérance parfaite. Action sur l'état général.

Prix au public : 16 francs.

Laboratoires P. AUBRY

62, rue Erlanger — PARIS (XVI).

Tél. : Jasmin 33-44.

Belgique et Congo :

Laboratoires Belges du Quinby

Romain Deschiens — 74, avenue Louis-Bertrand
BRUXELLES

MALTEA MOSER CRISTALLISÉE

Extrait de Malt sec, absolument pur.

Aliment-ferment vitaminé, pour tous les âges.

Indications. — Alimentation rationnelle (suralimentation et adjuvant des régimes). Saveur agréable.

Régulateur des fonctions digestives (entérites, entérococolites infantiles et des adultes).

Galactagogue efficace.

Préparation rapide des bouillies maltosées pour alimentation infantile.

Reconstituant général anticonstipant.

Mode d'emploi. — Se prend pure ou mélangée à toute boisson.

Adultes : 2 à 4 cuillerées à soupe par jour.

Enfants : 3 à 6 cuillerées à café par jour.

Prix : 14 francs le flacon (usage 15 jours).

MOSER et C^{ie}

8, chemin de Montbrillant — LYON (Monplaisir).

MALT ETHEL

Malt d'orges touraillé et torréfié (succédané du café).

Le malt Ethel est composé uniquement d'orges germées (malt), touraillées et torréfiées.

Il contient tous les principes actifs et nutritifs de l'orge dans une forme facilement assimilable ; il remplace le café dont il n'a pas la nocivité.

Le Malt Ethel est très riche en vitamines et enzymes (diastases).

Il convient particulièrement :

1° A tous les débilités, anémies et aux gastro-hépatiques dont il stimule et régularise les fonctions digestives.

2° A tous ceux auxquels l'usage du café est interdit : cardiaques, rénaux, excités, nerveux etc., car il constitue également un sédatif puissant du système nerveux.

Mode d'emploi.

Avoir soin de moudre en gros grains, infuser à l'eau chaude, remplacer progressivement le café par du malt Ethel, tant dans le café noir que dans le café au lait.

Le malt Ethel peut être consommé indéfiniment sans le moindre inconvénient.

Pour tous renseignements et échantillonnage, prière de s'adresser aux

USINES ETHEL S. A.

Malteries et Torréfaction de malt à SCHILTIGHEIM près Strasbourg (Bas-Rhin).

ou à l'Agent Général

Pierre RONCIN

132, rue du Faubourg Saint-Denis — PARIS (10°)

Téléphone : Nord 32-13

Conditions spéciales à MM. les Docteurs.

MALT FRANÇAIS DEJARDIN

(Extrait de)

Bière de santé extrêmement concentrée additionnée de glycérophosphates.

Indications. — Les nourrices défaillantes, les dyspeptiques, les anémiques et les chlorotiques.

Aliment des faibles, des délicats, des épuisés.

Remède des arthritiques, scrofuleux et lymphatiques.

Posologie. — *Pour les adultes :* Pur, un verre à bordeaux un quart d'heure avant les repas et mélangé comme boisson, en mangeant, dans la proportion de 1 pour 3, à une eau naturelle très légèrement alcaline.

Pour les enfants : Le quart ou la moitié de ces doses.

Prix : 3 fr. 30 verre compris.

Etablissements DÉJARDIN

10, rue Parent-de-Rosan — PARIS (XVI°).

MALTOSAN

Soupe maltée en poudre.

Composition. — Maltose, 30 p. 100. Dextrines, 25 p. 100. Céréales, 40 p. 100. Sels minéraux, 2 p. 100. H²O, 3 p. 100. Diastases.

Indications. — Affections gastro-intestinales de la première et seconde enfance : dyspepsies diverses. Réussit dans les cas les plus rebelles. Rend aisé le sevrage et en évite les périls.

Doses. — 2 mesures par repas de 100 gr. (lait et eau). Augmenter de 1 mesure nouvelle par 50 gr. de liquide supplémentaire.

Cuire rapidement sans cesser de remuer.

Retirer du feu au premier bouillon.

La boîte : 9 fr. 50.

Établissements WANDER

151 bis, route de Joinville — CHAMPIGNY (Seine).

MALT PAILLETÉ

Composition. — Extrait de malt cristallin garanti pur. Reconstituant diastasique vitaminé.

Préparé par évaporation dans le vide des liqueurs extractives du malt. Renferme la totalité de la diastase, du malt du maltose des phosphates naturels, de la lécithine des peptones et des vitamines.

Propriétés. — Aliment très concentré de digestibilité parfaite.

Indications. — Convalescents Anémiés, Surmenés, Opérés, Dyspeptiques, Cardio-Rénaux, Hépatiques.

Mode d'emploi. — *Adultes* : 3 à 6 cuillerées à soupe par jour, soit tel quel, soit dans de l'eau ou dans une infusion.

Enfants : 2 à 3 cuillerées à soupe par jour, à faire prendre de la même façon.

Prix : 16 francs la boîte de 300 grammes environ.

Laboratoires PROGIL

77, rue de Miromesnil — PARIS (VIII^e).

MALT WANDER ou GLOMA

GLOMA PUR

(*Extrait de malt sec.*)

Composition. — Matières azotées 5,87 p. 100, Hydrates de Carbone (maltose et dextrine), 89,17 p. 100 ; Substances minérales, 1,56 p. 100 ; Eau, 3,40 p. 100 ; Acide phosphorique en pour cent des substances minérales, 9 p. 100. Diastases. Vitamines.

Forme. — Paillettes.

Indications. — Aliment végétal nutritif et digestif dans les cas d'Asthénie générale, Convalescence, Dyspepsie, Entérocolite chronique par insuffisance amyloïdique. Scorbut et maladies par avitaminose. Permet la préparation des bouillies maltosées.

Le grand flacon : 15 fr. Le flacon : 10 fr.

PEPSO-GLOMA

Composition. — Pepsine, pancréatine, extrait de malt diastasique.

Forme. — Paillettes.

Indications. — Insuffisances digestives : digestions pénibles, dilatation et pesanteur de l'estomac ; accidents d'anaphylaxie alimentaire : eczéma, urticaire, prurit, etc. ; maladies de la dénutrition : amaigrissement, débilité ; convalescence.

Doses. — *Enfants* : 1 à 2 cuillerées à café. *Adultes* : 1 à 2 cuillerées à soupe à la fin des principaux repas dissous dans de l'eau ou une infusion, ou délayé dans un peu de compote, de purée ou de bouillie.

Le flacon : 12 francs.

GLYCÉRO-GLOMA

(*Gloma aux glycérophosphates.*)

Composition. — 1 cuillerée à soupe = 0 gr. 10 de Glycérophosphates combinés de chaux, de soude, de fer, de magnésie.

Indications. — Convalescence des maladies aiguës (grippes, bronchites, typhoïdes, etc.). Surmenage, déminéralisation, anémie, tuberculose. L'extrait de malt facilite la digestion et favorise l'assimilation des médicaments qui lui sont, ici, associés.

Doses. — *Enfants* : 1-3 cuill. à café 3-4 fois par jour.

Adultes : 1-3 cuill. à soupe 3-4 fois par jour. Au début des repas pur ou dissous dans de l'eau ou du lait.

Le flacon : 10 francs.

CALCIO-GLOMA

(*Gloma au Phosphate de chaux.*)

Composition. — 1 cuillerée à soupe = 0 gr. 15 de chlorhydrophosphate de chaux.

Indications. — Contribue par son phosphore à la nutrition du système nerveux, par sa chaux à celle des tissus osseux (rachitisme, scrofule, etc.). Permet la cure de récalcification dans la tuberculose. Utile aux femmes enceintes et à celles qui allaitent.

Doses. — (Voir *Glycéro-Gloma.*)

Le flacon : 10 francs.

P. BASTIEN, pharmacien.

CHAMPIGNY (Seine).

MANCOBENE

Complexe opo-mangano-calcique associé à un catalyseur de premier plan, le *Carbonate de Cobalt*.

Composition. — Présenté sous forme de granulé dont 100 grammes contiennent :

| | | | |
|----------------------------|------|---------------------------|------|
| Carbonate de cobalt..... | 0,02 | Chlorure de magnésium.... | 1,50 |
| Nucléinate de manganèse.. | 0,20 | Hypophosphite de chaux... | 0,50 |
| Méthylarsinate de soude... | 0,20 | Hypophosphite de soude... | 0,50 |
| Phosphate tricalcique..... | 1,50 | Surrénale..... | 0,50 |
| Glycérophosphate de Chaux. | 4,50 | Thymus..... | 0,50 |

Propriétés thérapeutiques. — La présence d'extraits de glandes endocrines et d'un catalyseur, le carbonate de cobalt, favorise le métabolisme du calcium dans l'organisme. Récalcifiant et reminéralisateur de tout premier ordre.

Indications. — Asthénie, Croissance, Phosphaturie, Rachitisme, Débilité, Lymphatisme, Prétuberculose, Tuberculose, Fractures, Carie dentaire, Grossesse, Allaitement.

Doses et mode d'emploi. — *Adultes* : 3 cuillerées à dessert par jour.

Enfants de 5 à 12 ans : 3 cuillerées à café.

Enfants jusqu'à 5 ans : 1 à 2 cuillerées à café suivant l'âge.

Prix : 18 francs.

Laboratoire du Docteur TAVERNIER

32, rue de l'Ouest — PARIS Tél. : Ségur 08-13.

MANGAÏNE

Polyoxyde de Manganèse
chimiquement pur.

Forme et Dose :

Tablettes 0,10 de Polyoxyde de Manganèse.

Propriétés thérapeutiques :

Elles constituent la préparation la plus rationnelle pour l'assimilation rapide et efficace des sels de manganèse.

Indications thérapeutiques :

Dyspepsies gastro-intestinales, Anémies.

Dose :

4 à 6 tablettes par jour.

Prix : 12 francs.

Pharmacie SCHMIT

71, rue Sainte-Anne — PARIS.

MANGANESIA

Solution permanganique arsenicale

Traitement du Diabète.

Propriétés thérapeutiques. — Le Manganésia diminue la soif, diminue la quantité des urines et celle du sucre qu'elles contiennent, favorise les échanges nutritifs, tonifie le système nerveux, rétablit les fonctions de la peau et rend au sang son alcalinité normale.

Dose et mode d'emploi. — XX gouttes au commencement de chaque repas dans du vin.

Continuer pendant trois semaines, se reposer une semaine, puis reprendre.

En cas d'intolérance, commencer par X gouttes par repas, puis augmenter progressivement.

On doit compter dans le diabète moyen sur un traitement d'environ 3 mois.

Les diabétiques qui font usage du Manganésia peuvent s'alimenter comme en état de santé.

Prix : 16 francs.

Laboratoires des Produits DANNEC'H

BRUN et MARTINEAU

64, rue des Tournelles — PARIS (III^e).

R. C. Seine 218.670.

MANGANO-PHOSPHAL

Gouttes sans aucun toxique.

Composition. — XX gouttes contiennent :

Ac. phosphorique offic. pur..... 0 gr. 40

Magnésium et polyglycéroph. 0 gr. 80

Sels de manganèse..... 0 gr. 10

en solution sans alcool et sans sucre.

Indications. — Puissant reconstituant, sans aucun toxique, agissant très rapidement et donnant des résultats durables. Enfants, adultes, femmes enceintes ou qui nourrissent, diabétiques, vieillards même hypertendus.

Posologie :

Enfants : II gouttes par jour par année d'âge dans un peu d'eau sucrée.

Adultes : XX gouttes à chacun des repas de midi et du soir, dans 1/2 verre de liquide.

Aucune contre-indication.

Prix : 15 francs.

laçon gratuit sur demande :

Louis ULIEN, Docteur en Pharmacie.

105, rue de Rennes — PARIS (VI^e).

MANGARSENIC

Composé organique d'Arsenic et de Manganèse,
Activité intense, Toxicité nulle.

Propriétés thérapeutiques. — Possède les propriétés classiques de l'ion As, complétées et exaltées par le catalyseur de choix qu'est l'ion Mn. Agit comme un catalyseur intense des réactions d'oxydation.

Indications. — Tous les états de dénutrition, Tuberculose à tous les degrés, Anorexies, Amaigrissements, Athrepsies, Hypotrophies, Diabète.

Posologie. — Deux comprimés midi et soir au début des repas (4 par jour).

Enfants : 1 comprimé midi et soir.

Prix 17 fr. 50.

Echantillons :

Docteur LAVOUÉ — RENNES.

MANGRATINES

Composition. — Nucléinate de manganèse, Extrait splénique, Sérum de cheval.

Propriété. — Tonique. Cytoplasmique par excellence.

Indications. — Toutes dépressions, anémie, chlorose, troubles de la puberté et de la ménopause. Convalescences, rachitisme, paludisme.

Doses. — 2 à 4 dragées par jour 1/4 d'heure avant les repas.

Prix : 16 francs l'étui de 40 dragées.

Laboratoire E. VERGELOT

163, rue de Flandre — PARIS (XIX^e).

Enregistré au Laboratoire national des médicaments sous le n° 997-16.

MARIMINE

Le Médicament des Enfants.

Forme. — Granulé irradié, à base de Vitamine D et de Parathyroïde.

Indications. — Insuffisances pluriglandulaires, affections ganglionnaires et osseuses. Rachitisme, Déformations osseuses. *Adénopathies trachéo-bronchiques*, anémies diverses de l'enfance. *Anorexie* de l'enfance et du nourrisson.

Formule. — Glycérophosphate de chaux, de fer et de magnésie, Nucléinate manganèse. Persulfate de soude formiate de chaux. Hypophosphite de chaux. Silicate de chaux. Surrénine. Parathyroïdes ergostérine irradiée.

Doses. — *Enfants* au-dessous de 3 ans : 1 cuillerée à café rase aux repas ou dans un des biberons.

Enfants au-dessus de 3 ans : 1 cuillerée à café aux deux repas.

La **Marimine** se prend dissoute dans l'eau ou **croquée**. Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 403-2.

Prix : 22 francs.

Littérature et échantillons :

Laboratoires HOCQUETTE

191, faubourg Saint-Antoine — PARIS.

MARINOL

Reconstituant marin physiologique.

Inaltérable. De goût agréable.

Composition. — Eau de mer captée au large. Iodalgol (Iode organique). Phosphates calciques en solution organique. Algues marines iodifères. Méthylarsinate disodique.

Particularités. — Seul succédané naturel de l'huile de foie de morue. Permet seul l'administration de l'iode organique marin dans son véhicule normal, l'eau de mer. Tolérance absolue.

Indications. — Lymphatisme. Anorexie. Tuberculose. Anémie. Convalescences.

Posologie. — *Adultes* : 2 à 3 cuillerées à soupe. *Enfants* : 2 à 3 cuillerées à dessert. — *Nourrissons* : 1 à 3 cuillerées à café.

Avant ou après les repas. Pur ou dilué.

Prix : 15 francs.

Littérature et échantillons :

Laboratoires LA BIOMARINE

DIEPPE (Seine-Inférieure).

MARRUBÈNE

Principes actifs végétaux du Marrube et de l'Aunée en association synergique avec la Terpène et le Benzoate de soude.

Propriétés. — Possède la triple action : *Fluidifiante, Expectorante, Aseptisante*, sur les produits d'expectoration. Facilite l'expectoration, calme la toux.

Indications. — Rhumes, Bronchites, Catarrhe des bronches, suites de Grippe, Dilatation des bronches, Tuberculose.

Mode d'emploi. — Le Marrubène se présente sous forme de cachets, de dragées, de granulés et d'élixir. Prendre chaque jour en moyenne 4 cachets, ou 6 dragées, ou 4 cuillerées à café de granulés, ou 2 à 3 cuillerées à soupe d'élixir.

Prix : Cachets-Dragées : 15 francs.

— Elixir : 18 francs.

— Granulé : 16 francs.

Laboratoires de la LIPOSEPTINE

2, place des Vosges — PARIS.

MARRUBIASE

Extrait de plantes « incisives » et surtout de Marrube blanc.

Formes. — Dragées et sirop.

Propriétés. — Diarrhée rapidement jugulée sans constipation. Suppression presque immédiate du sang et des glaires. Retour à bref délai de la selle moulée quotidienne. Aucune toxicité. Pas de contre-indication.

Indications et Posologie. — *Diarrhée infantile* (nourrissons) : 1 cuillerée à café toutes les 2 heures (pure ou dans un peu d'eau sucrée).

Inoxications, Dysenteries (selles nombreuses) : 2 cuillerées à soupe ou 4 dragées toutes les 2 heures.

Entérite chronique : Progressivement 2 à 5 cuillerées ou 4 à 10 dragées par jour avant les repas et au coucher.

Enregistré au Laboratoire National de contrôle des Médicaments n^{os} 103-3 et 4.

Prix : 14 francs.

COMTE, Pharmacien,

60-62, rue Saint-Guilhem — MONTPELLIER.

MARRUCOL

Composition. — Sulfogaïacolate de potasse, Marrube blanc, Glycérophosphate de chaux, Méthylarsinate de soude, Noix vomique pulvérisée.

Indications. — Agit particulièrement comme Traitement d'entretien dans les Bronchites aiguës ou chroniques, Pleurésies, Pneumonies, Congestions pulmonaires, Maladies de Poitrine. Est également indiqué dans Toux, Rhume, Catarrhe, Asthme, Grippe, Crachats persistants, Anémie, Rachitisme.

Propriétés. — Antiseptique pulmonaire et modificateur de la muqueuse respiratoire. Fluidifie les sécrétions et facilite l'évacuation des mucosités filandreuses et transparentes. Calme la toux, Recalcifiant, Reminéralisant, Tonique, Excite l'appétit.

Mode d'emploi. — Un cachet matin, midi et soir, avant les repas.

Prix : 12 francs.

Laboratoire COIRIER

69, avenue du Maine — PARIS (XIV^e).

MARUBOR

Sirop à base d'extrait hydro-alcoolique stabilisé de Marrube Blanc.

Propriétés. — Modificateur des sécrétions bronchiques, expectorant, antithermique, tonique cardiaque.

Indications. — Bronchites chroniques, Toux rebelles, Catarrhe, Asthme, Tuberculose.

Aucune contre-indication.

Posologie. — Agréable malgré sa haute teneur en Marrube (10 gr. d'extrait stabilisé par litre), ce sirop se prescrit à la dose moyenne de 4 cuillerées à soupe par jour.

Prix : 14 francs, net d'impôt.

Littérature et échantillons aux

Laboratoires du MARUBOR

1, rue d'Arras — BETHUNE (Pas-de-Calais).

MATÉ DOUGLAS

au Maté du Paraguay.

Indications. — Nutritif, fortifiant, stimulant. Développe les facultés intellectuelles. Tonifie le système nerveux. Détermine une sensation de bien-être et de vigueur sans amener de dépression, ni d'inconvénient quelconque après son emploi.

Composition. — Vin : Muscat de Samos et Maté.
Prix : 20 fr.

Elixir : Crème de Cacao et Maté. Prix : 18 fr.

Granulé : Maté glycérophosphaté composé.
Prix : 12 francs.

Littérature et échantillons aux Docteurs en exercice,
sur demande adressée au Dépôt général :

PHARMACIE ANGLAISE DES CHAMPS-ELYSEES

62, avenue des Champs-Élysées — PARIS (VIII^e).

Tél. : Elysées 22-52.

MÉNATOL

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 363-2.

Forme. — Dragées.

Composition. — Poudre d'ovaires, Marron d'Inde, Genêt, Rhamnus, Viburnum, Capsicum, Hydrastis, Hamamélis.

Propriétés pharmacodynamiques. — Vaso-constricteur utérin. Tonique et décongestif du réseau veineux. Opothérapie ovarienne.

Indications. — Troubles de la ménopause. — Règles douloureuses. — Régulateur des fonctions utéro-ovariennes.

Mode d'emploi. — Deux à six dragées par jour, au début des repas.

L'étui : 15 fr. (en France).

Laboratoires A. BAILLY

15, rue de Rome — PARIS (VIII^e).

MÉNOSÉDINE

Extraits végétaux associés à calmants minéraux et substance protéidique tirée de l'ovaire. Sans toxicité.

Indications. — 1° Sédatif utérin. Calme les phénomènes douloureux et malaises qui accompagnent et précèdent les règles.

2° Aménorrhée, flux menstruel trop peu abondant, règles espacées.

Deux formes : Comprimés. Liquide.

Comprimés. — 3 comprimés dès le début des malaises occasionnés par la menstruation avec une infusion chaude ou dans un peu de confiture. — 3 comprimés une demi-heure après, si besoin est.

Liquide. — Une cuillerée à bouche, une deuxième une demi-heure après, si la première n'a pas suffi (de préférence dans une infusion chaude).

Prix : 10 francs.

LABORATOIRES DEMASLES

à VIENNE (Isère).

MENSUOSEDYL

**Sédatif spécifique inoffensif
des Douleurs Menstruelles.**

Composition :

| | |
|--------------------------|------------------|
| Un analgésique | Pyramidon. |
| Un diurétique | Théobromine. |
| Un antispasmodique | Extr. Valériane. |
| Un sédatif | Extr. Anémone. |
| Un tonique | Guaranine. |

(Procédé spécial de conservation.)

Avantages. — 1° La suppression de la douleur et des troubles nerveux, quelle qu'en soit la cause, est **immédiate**.

2° La théobromine (physiologiquement contrôlée) décongestionne le rein, généralement hyperémié pendant cette période et pallie à l'inconvénient du pyramidon vis-à-vis de certains reins ; 3° La fonction ovarienne n'est pas influencée autrement que par la sédation et la décongestion pelvienne ; 3° La guaranine soutient heureusement le coeur et évite toute dépression possible par le pyramidon.

Indications. — Malaises menstruels et douleurs des suites de couches. Troubles nerveux de la vie génitale. Adjuvant à tout traitement de la dysménorrhée.

Posologie. — 1 cachet dès l'apparition des douleurs. 3 cachets par 24 heures.

(Aucune contre-indication)

La boîte de 12 cachets : Prix : 12 francs.

La demi-boîte : Prix : 6 fr. 50

Paul AUGIER, pharmacien

Ex-Interne des Hôpitaux de Paris

2-4, rue des Lombards — PARIS (IV^e).

Tél. : Archives 09-04.

MESOFORME

BACTÉRICIDE PUISSANT

Désodorisant — Antiseptique — Désinfectant.

Non caustique, non irritant, non toxique.

(Ne tache pas le linge.)

Composition. — Solution saponifiée de thymol et de paraldéhyde, avec adjonction de sels alcalins supprimant toute causticité.

Indications. — *Gynécologie* : Hygiène de la femme. Leucorrhée, Métrite, Salpingite, Accouchements. — *Laryngologie* : Angines, Amygdalites, Abscess. — *Stomatologie* : Gingivites, Carie.

Mode d'emploi. — *Action prophylactique* : 1 cuillerée à dessert pour 2 litres d'eau bouillie, chaude. — *Accouchements et Gynécologie* : 1 ou 2 cuillerées à dessert pour 2 litres d'eau bouillie chaude. — *Laryngologie* : 2 cuillerées à dessert pour 1 litre d'eau bouillie chaude. — *Stomatologie* : XXX gouttes dans 1 verre d'eau.

Littérature et échantillon gratuit à MM. les Docteurs pour leurs essais cliniques.

Prix : 12 francs.

Peut être prescrit aux Assurés Sociaux.

Laboratoires DORANTOWICZ

17 bis, avenue Parmentier — PARIS

MESOGASTRINE

Μησος (milieu). γαστρ (estomac).

Normalement, le chyme possède au moment de passer dans l'intestin une concentration moléculaire constante répondant au degré cryoscopique $\Delta = 0,38$.

La MESOGASTRINE en solution (1 cuill. à café de poudre dans une tasse à thé d'eau ou d'infusion **non sucrée**) possède ce même degré cryoscopique. Elle servira à diluer le contenu gastrique pour ramener à « un juste milieu » ses écarts de concentration moléculaire, assurer l'évacuation normale et supprimer toute douleur liée à un trouble de cette évacuation.

Action. — Physique, sur la fonction musculaire.

Ne trouble en rien le chimisme gastrique.

(Evite les gastrites médicamenteuses secondaires.)

Indication. — Véritable traitement « omnibus » pour tous syndromes douloureux gastriques, qu'ils soient liés à un fonctionnement hyper ou hypo de l'estomac.

Composition. — Poudre composée soluble (Phosphate de soude + Citrate de soude + Lactose).

Mode d'emploi. — 1 cuill. à café dans une tasse à thé d'eau ou d'infusion **non sucrée** (1 tasse à thé = 120 cc. ou 8 cuill. à soupe d'eau). Bien respecter ces proportions pour obtenir une solution à degré cryoscopique $\Delta = 0,38$. — Prix : 12 francs.

Laboratoires du Dr BAREY

37, avenue J.-Coutant — IVRY-SUR-SEINE

MÉSOTHINE RHEMDA

Comprimés radioactifs à base de Bromure de Mésothorium, associé à la médication dialytique du Professeur HAYEM (lithine-citrate de soude-hexaméthylène tétramine.)

Action. — 1° La MÉSOTHINE augmente la solubilité de l'*Acide urique* et de la *Cholestérine*.

2° Elle en ralentit la production en les détruisant en partie au moment de leur formation par activation des ferments uricolitiques (travaux de Sarvonat et Rebattu sur l'émanation du Radium).

Diathèse arthritique.

Indications. — Goutte, Rhumatisme, Sciatique, Hypertension, Maladies de la cinquantaine, Affections vésico-rénales et biliaires.

Tubes de 20 comprimés.

Prix de vente au public : 12 francs.

Prix médical : 7 fr. 55.

La teneur en produit radioactif de chaque fabrication de nos produits est dosée par le Service des Mesures de SFERC.

Laboratoires RHEMDA

Fondés en 1914.

S. MOGAN, Pharmacien.

17, rue d'Hauteville — PARIS (X^e).

Usine : 51, rue d'Alsace — COURBEVOIE (Seine).

Tél. : Wagram 58-89. — R. C. : Seine 255.068 B.

MÉSOTHORIUM BUISSON

Solution de bromure de mésothorium pour injections intramusculaires profondes, intraveineuses ou intratumorales.

1° Solution faible (concentration A) : dosée à 1/4 de micr. par cc. Injecter de 1 à 2 cc. par jour, pendant une ou 2 semaines. Observer des intervalles de repos d'environ une semaine entre chaque série.

Indications. — Artério-sclérose, états asthéniques et anémiques, prétuberculose.

2° Solution moyenne (concentration B) : dosée à 1 micr. par cc.

Indications. — Rhumatisme chronique, rhumatisme infectieux, anémie. Séries de 12 piqûres, au rythme d'une piqûre tous les jours ou tous les 2 jours, intervalles de repos d'une semaine entre 2 séries. Dans l'adénite tuberculeuse 1 à 2 injections intratumorales par semaine.

3° Solution forte (concentration C) : dosée à 2 micr. par cc.

Indications. — Rhumatisme chronique, rebelle et déformant, rhumatisme blennorragique, sciatique, névrites, leucémie, cancers inopérables, tumeurs de la prostate et de la vessie. Séries de 12 piqûres, au rythme d'une ou deux piqûres tous les jours ou tous les 2 jours, intervalles de repos d'une semaine entre 2 séries.

4° Solution forte spéciale (concentration D) : 2 micr. par cc. en ampoules de 5 cc.

Indications. — Tumeurs malignes, cancers de la vessie. Plus spécialement réservée aux instillations vésicales.

Prix de vente au public :

- | | |
|------------------|---------------------------------------|
| Concentration A. | Boîte de 6 amp. 1 cc. : 16 fr. 50. |
| — | B. Boîte de 3 amp. 1 cc. : 22 francs. |
| — | C. Boîte de 6 amp. 1 cc. : 55 francs. |
| — | D. Boîte de 2 amp. 5 cc. : 82 fr. 50. |

Société Générale d'Applications Thérapeutiques

THERAPLIX

R. MOREUX, Pharmacien

Ancien interne des Hôpitaux

98, rue de Sèvres — PARIS (VII°).

MÉSOTHORIUM RHEMDA

Solution isotonique de Bromure de Mésothorium en ampoules.

Primesol. — 1/5 de micro par centimètre cube. Boîtes de 6 ampoules de 1 cc. Traitement prolongé des états morbides peu graves : arthritisme, convalescence des maladies infectieuses, lymphatisme. Traitement d'une douzaine de jours : 1 à 3 cc. par jour.

Prix vente au public : 9 fr. — Prix médical : 5 fr. 65

Bimesol. — 1 micro par centimètre cube. Boîtes de 3 ampoules de 1 cc. Angine de poitrine, artériosclérose, hypertension, manifestations goutteuses, rhumatisme.

1 à 3 cc. par jour pendant une douzaine de jours.

Prix vente au public : 17 fr. — Prix médical : 10 fr. 70

Trimesol. — 2 micros par centimètre cube, 2 ampoules de 5 cc. par boîte. Utilisé pour effet rapide, infections de haute gravité. (Prompte amélioration de la formule sanguine), traitement palliatif et analgésique du cancer.

5 à 20 micros par jour pendant 8 jours.

Prix vente au public : 59 fr. — Prix médical : 37 fr. 15

a teneur en produit radioactif de chaque fabrication de nos produits est dosée par le Service des Mesures de SFERO.

Laboratoires RHEMDA

Fondés en 1914

S. MOGAN, Pharmacien

17, Rue d'Hauteville, Paris (X^e)

Usine : 51, Rue d'Alsace, COURBEVOIE (Seine)

Téléphone : Wagram 58-89 — R. C. Seine 255-068 B.

MÉTACARBINE

| | |
|---|------------------|
| Formine (recristallisée dans l'alcool)..... | 3 gr. |
| Charbon hyper-actif | 15 gr. |
| Sucre aromatisé..... | Q. S. p. 100 gr. |

Propriétés. — Anti-infectieux interne, absorbant et puissant adsorbant.

Indications. — Infections biliaires, urinaires ou gastro-intestinales d'origine épidémique, parasitaire avec ou sans fermentation (entérites, entéro-colites muco-membraneuses, colites spasmodiques, colibacilloses, etc...).

Posologie. — 1 à 3 cuillerées à café le matin et après les 2 principaux repas. A croquer ou délayer dans un peu d'eau.

Nota. — Le pouvoir adsorbant de ce charbon a été considérablement augmenté par une préparation spéciale. Il ne ressemble en rien aux autres charbons dont la force attractive envers les toxines et les poisons ne peut être comparée à celle du charbon hyper-actif.

Prix : 12 francs la boîte de 135 gr.

Laboratoire du Docteur E. AUBERT

3, place Jussieu — PARIS (V^e).

Approvisionnement Pharmaceutique et Dépôts : France
O. C. P. Paris.

Afrique du Nord : **PELISSARD**

ALGER-CASABLANCA.

MÉTACITRINE

| | |
|------------------------------------|----------|
| Citrate trisodique..... | 6 gr. 50 |
| Phosphate de soude..... | 7 gr. 50 |
| Sulfate de soude..... | 8 gr. 50 |
| Lactose et sucre effervescent..... | 100 gr. |

Poudre granulée très effervescente.

Propriétés. — Favorise la digestion, active la sécrétion biliaire, fluidifie le sang, prévient la lithiase intestinale.

Son action (leïtonique) sur le muscle lui-même et (cholagogue) sur la sécrétion biliaire, détermine une réaction directe et indirecte sur les glandes annexes.

Indications. — Dyspepsies, gastropathies, crise hémoclasique, diathèse arthritique, stase veineuse.

Posologie. — 1 à 2 cuillerées à café le matin à jeun ou 1 cuillerée à café matin, midi et soir avant les repas. Dans un grand verre d'eau tiède.

Nota. — Si le Phosphate Acide de Soude dissout les calculs phospho-carbonatés, le Sel de Magnésie agit moins en dissolvant les concrétions oxalo-phosphatées qu'en empêchant leur formation.

Prix : 13 fr. 50 le flacon de 150 gr.

Laboratoire du D^r E. AUBERT

3, place Jussieu — PARIS (V^e).

Approvisionnement Pharmaceutique et Dépôts : France

O. C. P. PARIS.

Afrique du Nord : **PELISSARD**

ALGER-CASABLANCA.

METACUPROL

(A base de sulfate de cuivre.)

Puissant antiseptique gynécologique et dermatologique. Ni caustique, ni irritant. Peut s'employer sans eau bouillie.

Propriétés. — Efficacité certaine dans toutes les Streptococcies et Staphylococcies.

Indications :

Gynécologie : Leucorrhées, Métrites, Démangeaisons, Hygiène intime.

Dermatologie : Furunculose, Anthrax, Impétigo, Eczémas, Brûlures, Affections suintantes, Boutons.

Formes :

Comprimés effervescents de 1 gr.

Ampoules de 2 cc. et 5 cc. pour injections intraveineuses au 1/200^e (utiliser des aiguilles fines).

Pommade en tube. Non grasse. Soluble dans l'eau.

Posologie :

Gynécologie : 1 à 2 comprimés pour 2 litres d'eau (hygiène).

1 à 2 comprimés pour 1 litre d'eau (cas aigus).
Position couchée.

Dermatologie : 1 comprimé par litre d'eau.

Pommade : Matin et soir.

Ampoules :

Enfants : 1 ampoule de 2 cc. par jour.

Adultes : 1 ampoule de 2 cc. par jour, ou
1 à 2 ampoules de 5 cc. par jour.
(cas graves.)

Tolérance parfaite. Aucune toxicité.

Prix : Ampoules, 25 fr. Pommade, 10 fr.
Comprimés, 10 fr.

Laboratoire du MÉTACUPROL

5, rue François-Ponsard — PARIS (XVI^e).

Tél. : Auteuil 35-25.

MÉTAFORMINE

(Comprimés)

Composition. — *Formine* spéciale, chimiquement purifiée, recristallisée dans l'alcool, 0,50 par comprimé soluble.

Propriétés. — Puissant antiseptique interne diffusible.

Indications. — Maladies infectieuses : gripes, septicémies, colibacilloses, pyuries, cystites, etc...

Posologie. — 2 à 3 comprimés par jour. Faire dissoudre dans un grand verre d'eau.

Nota. — On augmente considérablement l'activité de la **MÉTAFORMINE** en administrant des doses fractionnées (1/2 comprimé par exemple à 8 heures du matin, 11 heures, 16 heures, 21 heures, et en faisant uriner le malade avant l'absorption du produit.

Prix. — Boîte étanche : 14 francs.

10 à 12 jours de traitement.

Laboratoires du Docteur E. AUBERT

3 place Jussieu — PARIS (V^e).

Approvisionnement Pharmaceutique et Dépôts : France :

O. C. P. PARIS

Afrique du Nord : **PELISSARD**

ALGER-CASABLANCA

MÉTAFORMINE

(Granulé effervescent.)

Composition :

| | |
|---|---------|
| Rein (extrait total)..... | 3 gr. |
| Formine (anhydro-citrate)..... | 2 gr. |
| Pipérazine (tartrate)..... | 2 gr. |
| Lithine (citrate) | 2 gr. |
| Lactose et sucre effervescent Q. S. p. | 100 gr. |

Propriétés. — Stimulant diastasique rénal, diurétique atonique. Diallytique. Anti-urique.

Indications. — Arthritisme, Uricémie, Goutte, Gravelle, Rhumatisme, Migraine.

Posologie. — 2 à 3 cuillerées à café par jour. Dans un grand verre d'eau. Le matin à jeun, avant les repas; le soir au coucher.

Etats aigus : 4 cuillerées à café par jour.

Prix : Grandeboîte étanche : 135 gr. : 16 francs.

10 jours de traitement.

Laboratoires du Docteur E. AUBERT

3, place Jussieu — PARIS (V^e).

Approvisionnement pharmaceutiques et

Dépôts France : **O. C. P. PARIS**

Afrique du Nord : **PELISSARD**

ALGER-CASABLANCA

MÉTA-TITANE

Pommade introduisant le titane en thérapeutique.

Indications. — *Prurits, Erythèmes : Eczémas, Intertrigo, Brûlures du 1^{er} degré, Coups de soleil, Engelures, Piqûres d'insectes, Erythèmes des nourrissons, Croûtes de lait, Gerçures des seins, etc.*

Propriétés et Avantages. — Donne des résultats encore jamais atteints jusqu'ici par aucun autre topique (Cf. Thèse Delahaye, Prof. Nicolas, Tourneux, Juster etc.).

Aucune toxicité. — Antiseptique, Epidermisant, Antiprurigineux à action durable. *Absolument aucun similaire.*

Remarque. — Les sels de titane utilisés ne se trouvent pas dans le commerce. D'ailleurs, ils sont obtenus par un procédé tout particulier qui n'est pas encore publié. Ils sont *rigoureusement purs.*

Présentation :

Tube : 15 fr. — Tube d'essai : 7 fr.

**Laboratoires METADIER
TOURS.**

MÉTAUX COLLOIDAUX ET DÉRIVÉS CINNAMIQUES

Procédés **ANDRÉ LANCIEN**

Académie des Sciences (1907-11-15-24-34)

Société Médicale des Hôpitaux de Paris (1911-1912)

Journées médicales de Bruxelles (Médaille d'or 1926)

| DÉSIGNATION DES PRODUITS | COMPOSITION ET DOSE | MALADIES TRAITÉES |
|--|---|--|
| BANIKOL A L (B. 5a 3 cc.) | Iodure de tétra méthyl- ammonium 3 inj. par semaine. | Algies - Rhumatisme Asthme - Hypertension Intoxic. nicotin. |
| BANIKOL A L (B. 40 comp) | Iodure de tétra méthyl- ammonium en associa- tion nucléo-argentique 6 à 10 comp. par jour. | Algie - Rhumatisme Asthme - Hypertension Intoxic. nicotin. |
| Bismuth A L (B. 4a 3 cc) | Bismuth amiconique 3 inj. par semaine. 10 inj repos 10 jours | Syphilis |
| ETAIN A L (B. 4a 3 cc) | Etain amiconique 3a par sem. 10 inj. repos 10 jours. | Furonculose - Acné |
| ETAIN A L (B. 40 comp.) | Etain colloïdal 4 à 6 comprimés p. jour jusqu'à guérison. | Furonculose - Acné |
| GLANDACTINE A L (B. 40 comp) | Total glandulaire acti- vé U V et catalysé par Cu et Be. 6 à 8 comp. p. jour | Décépériences organiques |
| Magnésium A L (B. 4a 3 cc) | Magnésium amiconique | Néoplasme, Hépatites |
| Osmium A L (B. 4a 3 cc.) | Osmium amiconique Une inj. t. l. j. 10 inj. repos 20 jours | Sciaticques, Tabès Sclérose en plaques |
| Or A L (B. 4a 3 cc.) | Or amiconique 3 inj. par sem. 15 inj. repos 10 jours | Angine de Ludwig Bacillose, Streptococies |
| PLUROLAN A L (B. 4a 3 cc.) | Complexe colloïdal ami- conique, Arsenic , Fer , Manganèse , Vanadium , 1 inj. tous jours 15 inj. Repos 30 jours | Anémies |
| RHODIUM A L (B. 4a 3 cc.) | Rhodium amiconique par 3 cc. ou 6 cc 2 fois par jour pendant l'infection | Typhoïdes, Gripes Pneumonies, Pleurésies Septicémies streptococciques |
| Sélénium A L (B. 4a 3 cc.) | Sélénium amiconique 1 inj. t. les jours 20 inj. repos 1 mois | Néoplasmes |
| Sélénium-Vanadium A L (B. 4a 3 cc.) | Complexe amiconique Sélénium-Vanadium | Néoplasmes |

| DÉSIGNATION DES PRODUITS | COMPOSITION ET DOSE | MALADIES TRAITÉES |
|--|--|--|
| TUNOL A L (B. 40 comp) | Etain colloïdal, Soufre colloïdal, Levure de Bière, Lait irradié 4 à 6 comp p. j. jusqu'à guérison. | Acné, Furonculose, Folliculite. |
| SOUFRE A L (B. 4a 3 cc.) | Soufre électrique amiconique 3a par sem. pend. 15 j. repos 10 jours | Rhumatismes et Insuffisance sulfurée |
| SOUFRE A L (B. 40 comp.) | Soufre colloïdal 4 à 5 comp. p. j. jusqu'à guérison | Rhumatismes et Insuffisance sulfurée |
| Soufre A L pommade | Onction quotidienne | Dermatose, Eczéma, Acné, Urticaire, Pityriasis |
| ZARYL (B. 14 cigarettes) | Fibre médicamenteuse aux Huiles essentielles sans Eucalyptus ni toxiques 6 à 8 cig par jour. | Congestion des voies respiratoires et Asthme |
| ZIMBYL A L (B. 5a 3 cc.) (B. 20a 3 cc.) | Cin. Ethyl. Formine en sol. aq. 3a par semaine s0 inj. Repos 10 jours. | Bacillose, Convalescences, Grippe Aff. gyn. et Urinaires |
| ZIMBYL A L (B. 40 comp) | 6 à 8 comp. par jour | Baciloses, Convalescences, Anémies |
| ZIMBYL-BISMUTH A L (B. 5a 3 cc) | Cin. Ethyl. Formine-Bismuth 3a par semaine 10 inj. Repos 10 jours | Syphilis |
| ZIMBYL - CUIVRE A L (B. 5a 3 cc.) | Cin. Ethyl. Formine-Cuivre 3a par semaine 15 inj. repos 10 jours | Tuberculose cutanée Anémies graves. Lèpre |
| ZIMBYL-OR. A L (B. 4a 3 cc.) | Cin. Ethyl. Formine-Or 3a par semaine, 15 inj. Repos 10 jours | Bacilose. Convalescences, Anémies |
| Zimbyl-Sélénium A L (B. 5a 3 cc) | Cin. Ethyl. Formine-Sélénium - 1 a ts. 1. j. 20 inj. repos 1 mois. | Néoplasmes et Bouton d'Orient |

N. B. — Des prix exceptionnels de bon marché sont faits à tous les hôpitaux, cliniques, œuvres de bienfaisance, pour les ampoules livrées en vrac et par **quantité** importante.

Tous les produits en ampoules sont à **20** francs, la boîte (public).
— — en comprimés sont à **15** francs

Laboratoire des Procédés ANDRÉ LANCIE

G. MIARD-COUTURIER, Pharmacien

26, Rue de Gonesse — AULNAY-SOUS-BOIS

PARIS-FRANCE

Tél. : Aulnay 251

MÉTA-VACCIN

Vaccin en pommade aux antiviruses de Besredka.

Indications. — Toutes les suppurations : Plaies, Furoncles, Anthrax, Impétigo, Abscesses, Panaris, Pyodermites, Sycosis, Ulcères, Ecorchures, Brûlures, Orgelets, Blépharites, tous pansements après accouchement.

Avantages. — 1° Activité due à l'origine des souches, directement extraites de malades et jamais repiquées ; 2° Polyvalence extrême ; 3° Essai avant mise en vente, d'où garantie d'activité ; 4° Absorption parfaite ; 5° Commodité ; 6° Aucune réaction ; 7° Innocuité absolue.

Emploi :

1. *Immunsation locale* : Bien faire pénétrer par un léger massage, si possible ; sinon, mettre sur gaze, et faire pansement habituel. Renouveler deux ou trois par jour.
2. *Immunsation générale* : Dans les cas de furonculose générale ou de phlegmons avec lymphangite, il est recommandé de faire faire des frictions aux plis des aines et aux aisselles, et même d'introduire du Meta-Vaccin dans le rectum.

Présentation. — En tubes grand modèle : 18 fr., et en tubes d'essai : 7 fr.

**Laboratoires MÉTADIER
TOURS.**

METOPHAN

Composition. — Association d'acide carbolquinolique nocivité rénale neutralisée, ferments lactiques, Formine citratée.

Propriétés thérapeutiques. — Antisep-tique par l'acide carbolquinolique où le radical phényl si souvent nocif pour le rein a été neutralisé grâce à notre procédé spécial de préparation.

Eliminateur d'acide urique, bactéricide par ses ferments lactiques, antipyrétique, analgésique puissant.

Aucune action nocive sur l'estomac, le cœur, les reins et le système nerveux.

Plus actif que les produits similaires.

Indications. — Tous les cas de rhumatismes, goutte, lumbago, sciatique, névralgies, etc...

Mode d'emploi :

1 à 6 cachets par 24 heures, avant les repas, *dans les cas aigus.*

1 à 2 cachets par jour, pendant 20 jours, *dans les cas chroniques.*

Doit être accompagné de boissons alcalines abondantes, à prendre aux repas.

Prix : 16 francs.

HY, Pharmacien

61, avenue de Choisy — PARIS (XII^e)

LA MÉTRICINE

Formule. — Tanin, Borate de Soude, Acide Borique, Bicarbonate, Perborate, Coumarine, Vanilline, Musc, Essence de Lavande.

Indications. — Traitement de toutes les affections organiques de la femme. Métrites, Leucorrhées, etc.

Mode d'emploi. — Une cuillerée à soupe pour 2 litres d'eau chaude, en injection.

Prix : 14 fr. 95, la boîte de 24 doses.

Echantillon sur demande :

Laboratoire de la MÉTRICINE

23, Grande-Rue — ASNIÈRES (Seine).

MÉTRITOLS

THÉRAPEUTIQUE GYNÉCOLOGIQUE

Comprimés gynécologiques effervescents, antiseptiques, alcalins astringents.

Composition — Acide picrique, oxyquinoléine, oxycyanure de Hg., thymol, bicarbonate, amidon, formaldéhyde. Parfum agréable des essences de labiées alpestres associées à l'essence de cèdre.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptiques, alcalins, alcalins, astringents, les MÉTRITOLS donnent des résultats certains dans les leucorrhées de toute nature et les vaginites.

Mode d'emploi. — Injections vaginales. Un comprimé dans 1 litre d'eau bouillie chaude 40 à 50°. Position couchée, bock très bas.

Prix : 12 francs.

CRAYONS INTRA-UTÉRINS « MÉTRITOLS »

Composition. — Oxyquinoléine, Mercurochrome, Nucleinate d'argent, Chlorothymol, Parachlorométacrésole, Chloroxylénol.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique, Polyvalents, Cicatrisants, Décongestionnants.

Métrites chroniques endocervicales de toute origine.

Mode d'emploi. — Placer un crayon intra-utérin tous les 2 ou 3 jours.

Prix : 16 francs.

OVULES « MÉTRITOLS »

Composition. — Oxyquinoléine — Mercurochrome — Paramétacrésole — Chloroxylénol — Sous-gallate de Bis-muth, Oxyde de titane, Essences de cèdre et de Labiées.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptiques calmants, cicatrisants, désodorisants.

Leucorrhées, Vaginites, Métrites.

Mode d'emploi. — Un ovule tous les 2 ou 3 jours.

Prix : 16 francs.

Laboratoires LEES

Docteur Pierre ROLLAND, Directeur.

Dépôt : 127, boulevard Saint-Michel — PARIS (Ve).

MEXYL

Pâte dentifrice antispirillaire à l'arsénobenzol en dérivé stable (oxyacétylaminophénylarsinate de soude).

Propriétés. — L'oxyacétylaminophénylarsinate de soude, composé arsenical organique de la série arsénique, par sa teneur en arsenic, son grand pouvoir de diffusibilité, est un agent antispirillaire puissant. Il présente l'avantage d'une grande stabilité et d'une très forte diffusibilité, propriétés qui en font l'agent thérapeutique de choix des spirochètoses buccales.

Indications. — Pyorrhée alvéolaire, gingivites, stomatites, noma, gangrène buccale, hygiène buccale préventive.

Mode d'emploi. — Brosser gencives et dents, faces externe et interne. Si les gencives ne supportent pas la brosse, masser avec doigt enduit de pâte.

Prix : le tube, 6 francs.

L. N. C. M. n° 574-1.

Laboratoires MEXYL

6, rue des Dames — PARIS (XVIII^e).

MIALBAÏNE

Solution d'ouabaïne Mialhe à 1/1000,
XXV à C gouttes par 24 heures.

Laboratoire du Docteur MIALHE

8, rue Favart — PARIS.

MICELLIODE

Iode colloïdal micellaire électro-positif.

Préparé à partir de foies frais.

Composition :-

Iode métalloïdique libre..... 0 gr. 15

Glycogène extrait du foie frais. 2 gr. 50

Pour 100 gr. de pseudo-solution aqueuse.

Soit 0 gr. 0015 (1 mgr. 1/2) d'iode libre par gr. ou cc.

Avantages. — Résultats cliniques surprenants à doses infinitésimales d'iode libre grâce à la forme colloïdale.

Jamais d'iodisme

Indications thérapeutiques. — Toutes les indications de l'iode.

Présentation :

1° *Gouttes* pour la voie buccale (flacon avec compte-gouttes).

2° *Ampoules* injectables (boîte de 10 ampoules de 2 cc.).

Posologie :

Gouttes : Doses par 24 heures à fractionner en 2 fois dans la journée.

Adultes : LX à C gouttes.

Adolescents : L à LXXX gouttes.

Enfants : XXX à L gouttes.

Nourrissons : XV à XX gouttes.

Ampoules :

Adultes : une ampoule de 2 cc.

Adolescents : 1 cc. 1/2.

Enfants : 1 cc.

Nourrissons : 1/2 cc.

Tous les 2 jours jusqu'à concurrence de 10 injections consécutives représentant une série à renouveler selon besoin.

Prix :

Gouttes : Le flacon..... 18 fr.

Ampoules de 2 cc. : La boîte de 10.. 18 fr.

Echantillons sur demande :

Laboratoires Albert ROLLAND

4, rue Platon — PARIS (XV^e).

MICROLYSE

Nouvel antiseptique de synthèse
à pouvoir fortement bactéricide sur le

COLIBACILLE

et le

GONOCOQUE

Travaux du professeur Louis Gaucher

(Communication à l'Académie de Médecine du
24 janvier 1933.)

Action. — Eclaircit rapidement les urines ; Tarit l'urétrite et arrête la pyurie ; Calme la douleur ; Remonte l'état général ; pas de toxicité ni d'action congestive.

Composition. — C'est le premier antiseptique conçu dans un but thérapeutique déterminé et étudié d'après les données de la pathogénie moderne. Son efficacité rapide et constante est due à la synergie de ses deux facteurs α et β .

SEL α

Chlorhydrate

de 6-Méthyl

8-Oxyquinoléine

Imprègne l'organisme
grâce à sa lente élimi-
nation et y détruit
progressivement le

Colibacille

et le

Gonocoque.

SEL β

Chlorhydrate

d'Ortho-

Oxyquinoléine

S'élimine rapidement
et se porte sur l'arbre
urinaire qu'il

calme

et

assainit.

Indications :

COLIBACILLOSES. — Infections des voies intestinales et biliaires, Entérocolites, Cholécystites, Lithiases.

INFECTIONS URINAIRES. — En général : Pyélonéphrites, Cystites, Prostatites.

GONOCOCCIES. — Urétrites, Métrites, Salpingites.

Mode d'emploi :

Comprimés : 3 à 4 par jour pendant les repas.

Prises pour enfants, à délayer dans du lait.

Prix : 18 francs.

Pour 10 jours de traitement.

Laboratoires de la Microlyse

10, rue de Strasbourg — PARIS (X^e).

MICTASOL

DÉCONGESTIF PELVIEN

Composition.

Comprimés : Bromure de Camphre 0,02, Formine 0,05, Noix de Malva purpurea 0,25.

Suppositoires : Stovaïne 0,01, Ext. de Jusquiame 0,05, Ichtyol 0,25, Malva purpurea 0,50.

Ovules : Malva purpurea 1,50, Ichtyol 0,50, Ext. de Jusquiame 0,05, Glycérine solidifiée Q. S.

Propriétés thérapeutiques.

Décongestif pelvien, antiseptique urinaire, sédatif génital. Tolérance parfaite. Innocuité absolue. Sans contre-indication.

Indications thérapeutiques.

Prostatisme vasculaire. Rétention. Incontinence, Cystites, Séquelles de blennorragie. Néphrites. Pyélonéphrites. Métrites, Salpingites Vaginites. Hémorroïdes.

Mode d'emploi.

Comprimés : 6 à 10 comprimés par jour, à prendre aux repas, avec un peu d'eau.

Suppositoires : 1 ou 2 par jour.

Ovules : 1 le soir au coucher.

Comprimés : 14 fr. — **Suppositoires :** 15 fr.
Ovules 18 fr.

Laboratoires du MICTASOL

BARBE pharmacien

155, boul. Magenta — PARIS (IX^e).

Tél. : Trudaine 50-34.

MICTOPHILE RICHER

Antiseptique. — Diurétique. — Analgésique.

Comprimés glutinisés au bleu de Méthylène.

Composition :

| | |
|----------------------------|-------|
| Bleu de méthylène | 0,02 |
| Lactose..... | 0,28 |
| Extrait de belladone | 0,003 |
| — de mauve..... | 0,05 |
| pour 1 comprimé glutinisé. | |

Indications. — Syndromes entéro-rénal et vésical. Cystites aiguës ou chroniques, Pyélites, Pyélonéphrites, Blennorrhagies, Prostatites, Colibacillurie.

Mode d'emploi. — 3 à 6 comprimés par jour (de préférence avant les repas). Avaler sans croquer avec un peu d'eau.

Le flacon de 40 comprimés. Prix : 15 fr.

Laboratoire RICHER

Docteur en pharmacie.

45, Faubourg Saint-Denis — 1, rue d'Enghien
PARIS

MICTOSEPTOL

(Antiseptique urinaire liquide).

Composition. — Synthèse nouvelle diurétique, antiseptique et balsamique de benzoate d'Hexaméthylène-tétramine et d'*Arbutine* dans un excipient légèrement stomachique.

Indications. — Toutes les affections et infections urinaires : Lithiases, Pyélonéphrites, Cystites, Prostatites, Urétrites, Blennorrhagie à toutes ses périodes ; maladies infectieuses : Grippe, Rougeole, Scarlatine.

Mode d'emploi. — Une cuillerée à café dans un peu d'eau ou de tisane avant ou entre les repas.

Doses. — *Adultes* : 3 à 5 cuillerées à café par jour ;
Enfants : par demi-cuillerée à café.

Prix : 15 francs.

Laboratoires B. C. L.

29, faubourg de Bourgogne — ORLÉANS.

Dépôt général : Office commercial pharmaceutique,
71, rue du Temple, PARIS (III^e) — et ses succursales.

MICTUALINE

Antiseptique. Sédatif. Décongestif.

1° PILULES :

| | |
|---|-----------|
| Collargol à 80 p. 100 argent pur..... | 0,02 |
| Urotropine recristallisée | 0,10 |
| Bleu de méthylène pur | 0,01 |
| Bromure de camphre | 0,02 |
| Extraits d'Uva-ursi et seneçon.. Q. S. p. | 1 pilule. |

Indications :

- 1° *Maladies des voies urinaires* (métrites, cystites, pyélonéphrites, prostatites, hypertrophie de la prostate, etc.)
- 2° *Maladies des voies génitales* des deux sexes.
- 3° *Maladies intestinales* dans leurs rapports avec le tractus génito-urinaire (syndrome entéro-rénal, colibacillose etc...).

Posologie. — 6 à 9 pilules par jour.

Prix : 18 francs.

2° SUPPOSITOIRES :

| | |
|--------------------------|------|
| Extrait Belladone | 0,01 |
| — Jusquiame | 0,05 |
| — Hamamélis | 0,10 |
| Bromure de camphre | 0,10 |
| Analgésine | 0,40 |

Toutes algies : 1 à 2 par jour. — Prix : 15 francs.

Laboratoire H. CLUZEL

60, Cours Emile-Zola — LYON-VILLEURBANNE

MILKASE

Papaïne, citrate trisodique en solution stérile et infermentescible. Peptonisant et anticoagulant facilite l'assimilation du lait ; combat intolérance gastrique des nourrissons et tous les troubles gastro-intestinaux.

1 à 3 cuillerées à café par jour au moment des tétées.

Le flacon : 12 francs.

Laboratoires GAMBY-WISSE

Place de l'Hôtel-de-Ville

SALON-DE-PROVENCE

(Bouches-du-Rhône).

MINERGIL

Médication minérale sous forme organique assimilable.

Propriétés. — Apporte tous les éléments minéraux indispensables à la constitution des tissus comme au bon fonctionnement de l'organisme. Donne toutes les vitamines qui, directement ou indirectement, sont ou peuvent être intéressées à l'utilisation des matières minérales.

Indications. — Tous les cas de menace de déminéralisation de l'organisme (grossesse, lactation, tuberculose, diabète). Croissance, convalescence, anémie. Rachitisme, dépression nerveuse, etc.

Conditions d'emploi. — Avant chaque repas, matin, midi et soir : *Enfants* : 1 comprimé. *Adultes* : 2 comprimés. Ces doses pourront être augmentées suivant avis du médecin. Elles seront doublées et triplées dans les cas de rachitisme.

Prix de la boîte : 16 fr. 50.

Laboratoires PROGIL

77, Rue de Miromesnil — PARIS (VIII^e).

MINERVOL

Pommade en tube.

Composition. — Acide benzoïque du toluol 0 gr. 20. Baume du Pérou, 1 gr. 50. Stéarate de zinc, 10 gr. Métadioxyphénol 0 gr. 70. Lanoline et essence de verveine.

Indications. — Erythème fessier, rougeurs, démangeaisons, crevasses du sein et des mains, engelures, gerçures, brûlures, coups de soleil, prurits, et toutes dermatoses.

Propriétés. — Donne d'excellents résultats pour les cas indiqués, ne renferme aucun produit toxique, ne tache pas et s'enlève facilement.

(Publicité exclusivement médicale)

Présentation :

Tube moyen : 6 fr. 50. Grand tube : 10 francs.

Enregistré au Laboratoire National de contrôle des médicaments sous le N^o 888-2.

Laboratoires DE RIVE

82-84, rue de Belleville — PARIS (XX^e).

MIROXYL

FORME SIROP

Propriétés thérapeutiques. — Calmant de la toux, Expectorant d'action antiphlogistique certaine. Phagocytogène. Puissant modificateur de toutes les bronchites aiguës ou chroniques.

Propriétés actives. — Action synergique du Méthylarsinate de Codéine et du Sulfogaiacolate de Potasse.

Une cuillerée à bouche contient :

| | |
|----------------------------------|------------|
| Méthylarsinate de codéine..... | 0 gr. 024 |
| Sulfogaiacolate de potasse | 0 gr. 60 |
| Iodhydrate de codéine..... | 0 gr. 0048 |
| Cinnamate de soude..... | 0 gr. 0168 |

Préparation agréable au goût, pas d'intolérance, pas de constipation.

Posologie. — *Affections aiguës* : 3 à 4 cuillerées à soupe par 24 heures éloignées des repas.

Affections chroniques : 1 cuillerée à soupe matin et soir.

Indications thérapeutiques. — Toutes affections des bronches, Bronchites sous toutes ses formes, Tuberculose, Toux rebelles et émetisantes, Grippe, Asthme, Emphysème.

Prix : 15 fr.

FORME GOUTTES

Composition. — Méthylarsinate de Codéine associé à l'éther de Kay et au Chlorhydrate d'Ephédrine. Action renforcée par l'adjonction de teinture de serpolet, thym, gelsemium, grindelia, drosera ; ballote, aconit et belladone.

Indications thérapeutiques. — Toux spasmodique et quinteuse en général. Coqueluche, Grippe, Toux rebelles et nerveuses, Asthme, Toux émetisante, Toux laryngée, Médication symptomatique de l'adénopathie trachéo-bronchique.

Mode d'emploi. — A absorber loin des repas dans un liquide tiède, sucré de préférence : tisane béchique, eau, grog ou lait.

Doses moyennes par jour, en 4 fois. — *Adultes* : CCXL gouttes. *Enfants* : XII gouttes par année d'âge à partir de deux ans.

Dans les Coqueluches, doses fractionnées et croissantes.

Doses initiales. — *Adultes* : CXX gouttes.

Enfants : VIII gouttes par année d'âge à partir de deux ans.

A prendre en 3 à 4 fois par jour, après une quinte. Augmenter progressivement pendant les huit premiers jours.

Consulter la posologie détaillée par âge, dans la notice jointe au flacon. En cas de somnolence accentuée, interrompre le traitement pendant 24 heures.

Prix : 15 fr.

Laboratoires TAVERNIER

32, rue de l'Ouest — PARIS.

Tél. : Ségur : 08-13.

Pour la BELGIQUE : **HERMAN** Labor. S. A.

19, rue des Cultivateurs — BRUXELLES.

MOLÈNE

Indications. — Tuberculose pulmonaire à toutes périodes (action d'autant plus rapide que le traitement est appliqué à une période plus précoce de l'infection tuberculeuse); adénites tuberculeuses évolutives, à tendance suppurative; tuberculose pleurale; tuberculoses cutanées diverses.

Contre-indication. — Néphrite avec albuminurie abondante.

Mode d'emploi. — Voie intraveineuse ou voie intramusculaire. La dose moyenne est d'une injection d'une ampoule de 1 cc. tous les 2 ou 3 jours; chez les grands fébricitants, espacer les injections de 4 ou même 5 jours; dans les lésions torpides, injecter de 1 à 5 cc. tous les 3 jours.

Présentation. — En boîtes de 12 ampoules de 1 cc. (1 centimètre cube correspond à 0,05 centigrammes d'anhydride Molybdique pur).

Prix de vente au public : 25 fr. la boîte de 12 ampoules.

Laboratoire L. LECOQ et F. FERRAND
14, rue Gravel — LEVALLOIS-PERRET (Seine).

Dépôt : Pharmacie Générale LECOQ et FERRAND
54, Chaussée d'Antin, PARIS.

MORÉTHYL DAUSSE

Morrhuate d'Ethyle : solution huileuse à 25 p. 100
(Ampoules de 2 cc.)

Traitement de la tuberculose pulmonaire.

Indications. — Le Moréthyl est actif contre toutes les formes de la tuberculose pulmonaire, où il relève l'état général, fait baisser la courbe thermique en même temps qu'il diminue l'expectoration bacillaire et produit, dans certains cas, la rétrocession des lésions. Les formes rapides de la maladie et la granulie ne semblent, par contre, nullement influencées. — Le Moréthyl ne comporte aucune contre-indication et ne provoque dans aucun cas de réaction locale ou générale.

Posologie. — 20 injections quotidiennes successives par voie sous-cutanée ou intra-musculaire. Laisser un repos intercalaire de 10 jours et pratiquer de la sorte plusieurs séries d'injections. Durée du traitement : 3 mois au minimum.

Prix : 18 francs.

Laboratoires DAUSSE
4, rue Aubriot — PARIS (IV^e).

MORISLAND

(Granulé fondant.)

Composition. — Ergostérine irradiée, Lipoides de Foie de Morue, Iode, Tanin, Lécithine, Cholestérine, Glycogène, Acide nucléinique, Glycérophosphates de Chaux, Soude, Magnésie.

Indications. — Engorgements ganglionnaires, tous états de Faiblesse générale, Rachitisme, Bacillose.

Posologie :

Adultes : 2 cuillerées à dessert par jour.

Enfants : 2 cuillerées à café par jour.

Prix : 18 fr.

Echantillons sur demande :

Laboratoire CHEVILLON

99, rue de Paris — MASSY (Seine-et-Oise).

MORPHEROÏNN LEISYN

Remplace l'Héroïne et la morphine. N'est pas soumise à la réglementation du tableau B sur les stupéfiants. Accoutumance pratiquement nulle.

Formuler : 1 boîte ampoules **MORPHEROÏNN LEISYN.**

L'ordonnance pourra être renouvelée sans difficulté si le médecin y porte la mention : « à renouveler ».

Présentation. — Ampoules de 1 cc. correspondant aux mêmes ampoules contenant 2 cgr. d'Héroïne.

Mode d'emploi. — Injections hypodermiques.

Indications. — Toutes indications de l'Héroïne et de la Morphine et des extraits totaux injectables d'Opium. Cures de désintoxication, Angines de poitrine. Hypertension.

Toxicité et accoutumance pratiquement nulles.

Échantillonnage. — Le prix de revient très élevé de ce médicament ne permet pas l'échantillonnage.

Les Laboratoires LEISYN

1 bis, rue Molitor — PARIS (XVI^e).

Téléphone : Auteuil 14-73. C. C. postaux : PARIS 1075-98

Adresse télégraphique : LABOLEISYN-PARIS.

MORRHUALÈNE GAUTIER

Médication leucogène organique phospho-ferro-iodo-arseniée (entièrement assimilable).

Forme. — Sirop (saveur agréable sans action nocive, ni irritante pour les muqueuses gastro-intestinales).

Compos : — Iode physiologique stable et inaltérable ; fer organique d'origine protéique, entièrement assimilable ; sel sodique de l'acide phospho-glycérique : méthylarsinate disodique, rhamnus frangula.

Action physiol. — Stimulant des organes lymphoïdes et des séreuses ; modificateur vaso-moteur ; excitant des organes hématopoiétiques ; reminéralisateur puissant ; tonique général ; excitant de la nutrition.

Indicat : — Lymphatisme (adénopathies de la scrofule et de la tuberculose, végétations adénoïdes, impétigo), Hypoglobulie (anémie vraie, chlorose, diminution de la proportion d'hémoglobine, débilité générale). Maladies de la nutrition (rhumatisme chronique, artériosclérose, rachitisme, infantilisme). Convalescence de toutes les maladies.

Posologie. — De 2 à 5 ans, 3 cuillerées à café par jour ; de 5 à 10 ans, 2 à 3 cuillerées à dessert par jour ; adultes, 2 à 3 cuillerées à potage par jour. (Avant les repas dans un peu d'eau).

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des médicaments, sous le n° 586-10.

Prix 18 francs.

Echantillons et littérature :

Laboratoires DORANTOWICZ

17 bis, Avenue Parmentier — PARIS (XI^e). Tél.: Roquette 14-12.

MORRHUÉTINE JUNGKEN et MORRHUÉTINE JUNGKEN VITAMINÉE

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments.

Forme et Composition. — Liqueur à base de glycérine pure contenant : Iode métallique, 15 mgr. Hypophosphites composés (NaO, CaO, Manganèse), en tout 15 cgr. par cuillerée à soupe. Phosphate de soude : 15 cgr.

Produit de composition fixe et stable, de goût très agréable ; pas d'irritation des muqueuses ; pas de troubles des fonctions gastriques. Très bien toléré en toutes saisons.

La Morrhuéline Jungken Vitaminée est le même produit avec, en plus, toutes les Vitamines d'huile de foie de morue.

Propriétés. — Dépurateur, Tonique, Reconstituant.

Indications. — Anémie, Lymphatisme, Tuberculose, Convalescences des maladies infectieuses, d'opérations et blessures.

Doses et Mode d'emploi. — *Enfants* : 1/2 ou 1/3 de verre à liqueur. — *Adultes* : 1 ou 2 verres à liqueur, après les repas, pure ou étendue d'eau ou au début des principaux repas.

Prix : solution : 16 francs. — Vitaminé : 18 francs.

BRACQUEMOND et C^{ie}

105, rue de Normandie — COURBEVOIE (Seine).

R. C. Paris 207-767 B.

MORRHUXINE

Composition. — Iode organique. — Brôme. — Glycérophosphates alcalins et arrhénal à raison de un demi-centigr. par cuillerée à soupe. — Véhicule glyciné et sirop de fruits très agréable au goût et très assimilable.

Propriété. — Apéritif tonique, reconstituant antilymphatique.

Indications. — Succédané de l'huile de foie de morue ; est indispensable dans tous les cas où l'huile de foie de morue n'est pas tolérée par le malade.

Doses. — *Enfants* : 2 à 3 cuillerées à café par jour.

Adultes : 2 à 4 cuillerées à soupe par jour.

La bouteille pour 12 jours de traitement : 12 francs.

E. VERGELOT, Pharmacien

163, rue de Flandre — PARIS (XIX^e).

Tél. : Nord 48-22.

Enregistré au laboratoire national des médicaments sous le n^o 997-25.

MORSINE

Forme. — Elixir reconstituant, de goût agréable.

Composition. — Méthylarsinate de soude, Huile de foie de morue, Glycérophosphate de chaux, Glycérophosphate de soude, Vin généreux.

Indications. — Anémie, Chlorose, Lymphatisme, Neurasthénie, Rachitisme, et toutes affections provenant d'un vice de la nutrition.

Posologie :

Adultes : 2 cuillerées à soupe par jour.

Enfants : 2 cuillerées à café ou à dessert suivant l'âge, avant le repas.

Prix : 16 francs.

Laboratoires LECONTE

7, rue des Petits-Carreaux — PARIS (II^e).

Tél. : Louvre 53-16.

MORUBIASE

Extrait hépatique total de morue irradié et sans corps gras.

Principes actifs. — Lipophosphatides, acide morrhuique, vitamines.

Formes. — *Pilules et granulé.* Une pilule ou une cuiller à café de granulé contient les principes actifs de 30 gr. d'huile de foie de morue.

Avantages. — Petit volume, aucun goût, parfaite digestibilité, sans corps gras, se prend l'été comme l'hiver.

Indications. — Celles de l'huile de foie de morue : Anémie, Lymphatisme, Rachitisme, Affections chroniques des voies respiratoires.

Posologie :

Adultes : 6 à 8 pilules, par jour au début ou à la fin des repas.

Enfants : 2 à 6 cuillers à café suivant l'âge.

Arrhéno-Morubiasé : Synergie thérapeutique : extrait hépatique et méthylarsinate disodique (0,005 mgr. par pilule).

Gaïaco-Morubiasé : Extrait hépatique et 0,05 carbocinnamate de gaïacol par pilule.

Prix : 10 francs.

Laboratoires MEYNET-CROSNIER

44, rue de Lagny — MONTREUIL-PARIS.

MOTHERSILL'S SEASICK REMEDY

Médication contre le mal de mer, des airs, du chemin de fer et de l'automobile. Préviend et arrête tous les maux de voyages.

| Composition | Poudres | Rose | Brune |
|-------------|--------------------------------|--------|--------|
| | Sucre de lait..... | 33,0 % | 0,0 % |
| | Cannelle | 0,0 — | 29,4 — |
| | Caféine | 8,2 — | 8,4 — |
| | Acide stéarique..... | 18,0 — | 17,4 — |
| | Trichlorbutyl-alcool tert..... | 40,1 — | 44,5 — |

Posologie et mode d'emploi. — a. *Préventif* : prendre une capsule rose et une brune environ une heure avant de prendre le bateau, le train, l'auto ou l'avion. Ces doses doivent être prises 1 heure avant de manger ou 2 heures après. Les doses ultérieures seront prises à intervalles de 6 heures tant que la nausée continue.

Remarque : Pour obtenir les meilleurs résultats, ne jamais prendre ce remède durant l'heure qui précède le repas ou durant les 2 heures qui suivent celui-ci.

b. Pour arrêter les vomissements, répéter la dose dès que le premier vomissement violent est terminé. Au cas où les vomissements sont continus, vider les capsules et en avaler le contenu comme une poudre en prenant quelques gorgées d'eau.

Présentation et prix : Boîte petit modèle, 3 doses : 16 fr. 80.

Boîte grand modèle, 8 doses : 33 fr. 60.

Société Anonyme MOTHERSILL REMEDY COMPANY

5, rue de Provence — PARIS (IX^e).

MOVEBIL

Le nouveau régulateur de la sécrétion biliaire.

Composition. — Alcoolé d'une seule plante, la Chirette, originaire des Indes, l'*Ophelia Chirayta* (Himalaya), renferme de l'acide ophélique et de la chiraytine qui, en s'hydrolysant, donne de l'acide ophélique et de la chiraytogénine.

Propriétés thérapeutiques. — MOVEBIL modère la sécrétion biliaire si elle est trop forte et l'augmente si elle ne l'est pas assez.

Indications. — Insuffisances hépatique et biliaire, Congestions du foie, Cirrhose, Auto-intoxications.

Formes. — Gouttes et Pilules.

Prescription. — X à XXX gouttes, trois fois par jour, dans une cuillerée à soupe d'eau, 10 minutes au réveil et au coucher. — 1 à 2 pilules, 3 fois par jour. — Innocuité absolue : les doses mentionnées peuvent être dépassées, sans inconvénient, si le docteur le juge nécessaire.

Laboratoire L. GOUZERH

5, place Bisson — LORIENT.

MUCICARBOS

Composition. — Charbon animal chimiquement pur (Carbos), associé à un mucilage pur pour éviter la constipation.

Forme. — Granulé rond : **Mucicarbos simple** ; **Mucicarbos benzo-naphtolé**.

Indications. — Diarrhées avec hypersécrétion avec lésions ou avec infection de la muqueuse, Entérites, Entérocolites, Diarrhées des tuberculeux, Dyspepsies gastro-intestinales avec constipation et flatulences, Colites avec fermentations, Colites avec putréfactions.

Posologie. — 1 à 3 cuillerées à café avant ou après les repas.

Prix : 15 francs.

Laboratoires E. MILLET
RAMBOUILLET (Seine-et-Oise).

MUCILAXINE

Composition. — Huile de Paraffine de haute viscosité et neutre, associée à un mucilage pur sans cellulose (*action purement mécanique sans aucune addition de produit laxatif*).
Suppression du suintement.

Forme. — Crème-émulsion facile et agréable à prendre.

Indications. — Rééducation et pansement de l'intestin. Constipation. Colite. Entérocolite muco-membraneuse. Constipation des opérés, des accouchées, des enfants, des nourrissons, etc.

Posologie. — 1 à 3 cuillerées à soupe, à dessert ou à café par jour, suivant l'âge et au début des repas.

Prix : 14 francs.

Laboratoires E. MILLET
RAMBOUILLET (Seine-et-Oise).

MUCINUM (Comprimés de)

Composition :

| | |
|------------------------|-----------|
| Entérokinase..... | 0 gr. 005 |
| Erepsine..... | 0 gr. 005 |
| Pancréase | 0 gr. 005 |
| Bile | 0 gr. 010 |
| Atropa Belladona..... | 0 gr. 005 |
| Cassia acutifolia..... | 0 gr. 075 |
| Phenolphthaléine..... | 0 gr. 075 |

Propriétés thérapeutiques. — Laxatif doux, n'irritant jamais l'intestin et ne provoquant pas d'accoutumance. Réussit dans tous les cas de *Constipation* du fait de la pluralité des éléments qui le composent.

Forme. — Petits comprimés, très friables, sans saveur, pouvant être croqués ou avalés.

Posologie. — 1/2 à 2 comprimés par jour selon l'âge et la réaction individuelle (généralement au repas du soir).

Prix : 6 fr. 50.

Laboratoires CHANTEREAU

26 bis, rue Dombasle — PARIS.

MUCOBISMUTHINE

Pansement du tube digestif (Carbonate de bismuth pur en suspension dans un mucilage végétal, à l'exclusion de tout autre produit de remplacement).

Une cuillerée à soupe contient 2 gr. 50 de carbonate de bismuth.

Indications. — Syndromes douloureux, gastriques et duodénaux. Hyperacidité, Ulcérations, Colites, Entérites aiguës saisonnières, Fermentations intestinales, Oxyurase.

Doses et modes d'emploi. — Suivant les cas, 2, 3 ou 4 cuillerées à bouche; la présence d'un mucilage permettant de diminuer les doses habituellement données de carbonate de bismuth.

Prix au public : le flacon : 18 francs.

Le 1/2 flacon : 10 francs.

Laboratoire du Curogène

Docteur J. GALIMARD *

145, rue Yves-Le-Coz — VERSAILLES.

MUCOSODINE

Antisepsie des muqueuses
Bouche, Nez, Gorge, Oreilles.

Composition. — Bicarbonate de soude, Hyperborate de soude, Chlorure de sodium, Borate de soude.

Propriétés. — Donne un sérum boraté, alcalinisé et oxygéné. Elle déterge la muqueuse pituitaire et la décongestionne. Elle dissout les mucosités et les sécrétions.

Indications. — Coryza aigu et chronique, Rhinites, Rhume des foins, Sinusite, Ozène. — Amygdalites, Angines, Laryngites, Otites.

Mode d'emploi. — Une cuillerée à café pour un verre d'eau chaude.

Bain nasal, douche nasale, Gargarismes, Bains de bouche, Irrigations.

Le flacon : 8 francs.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 339-1.

Laboratoires CAILLAUD

37, rue de la Fédération — PARIS (XV^e).

Téléphone : Suffren 12-63.

MUCYLLIUM

Traitement rationnel et moderne de la constipation par le plus parfait des Mucilages.

Semences sélectionnées, cultivées spécialement et purifiées scientifiquement de **Psyllium noir**.

Innocuité absolue. Pas d'accoutumance. Aucune toxicité. Pas d'action irritante. Aucune contre-indication.

Indications du Mucyllium. — Le Mucyllium doit être employé dans toutes les constipations, qu'elles soient d'origine atonique ou spasmodique, par stase ou par dolichocôlon, et ce, aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte.

On peut prescrire par conséquent dans tous les états pathologiques où la constipation est en cause, tels que troubles toxiques, état saburral des voies digestives, gastrites, colites segmentaires ou totales, fermentations intestinales, états dysentériques, colites ulcéreuses et hémorragiques, hémorroïdes, fissures anales, appendicite chronique, cholécystites, troubles cutanés, acné, furonculose, manifestations anaphylactiques, eczéma, urticaires, migraine, bouffées de chaleur. Syndrome entéro-rénal, coli-bacillurie.

Doses. — *Enfants* : suivant l'âge, 1 cuillerée à café à 2 cuillerées à soupe.

Adultes : 2 à 6 cuillerées à soupe ou plus, au moment des repas, dans un peu d'eau, de purée ou de potage.

Prix : boîte de 250 grammes : 12 francs.

Prix : boîte de 500 grammes : 23 francs.

Prix : boîte de 1 kilogr. : 45 francs.

Laboratoire de Contrôle des Médicaments n° 914-1.

Peut être prescrit aux Assurances Sociales.

Littérature et échantillons médicaux sur demande :

Laboratoires BERNARD-GARCIN

SAINT-SATURNIN-LES-AVIGNON (Vaucluse)
France.

**Eugène GRAS, pharmacien de 1^{re} classe,
Ex-Interne des hôpitaux.**

MURONES DU D^r ROBERT JACQUES

1^o **MURONE aéro-gène.** — Redressement fonctionnel du poumon par activation des échanges respiratoires et oxydation.

Indications. — S'adresse aux anémiés, aux troubles de la croissance, et à tous les *menacés* de tuberculose.

Composition. — Essences oxydées et essence phénol en proportion juste : ampoule n^o 1, et essence diffusible : ampoule n^o 2, contenues dans la même boîte.

Mode d'emploi. — Injecter quotidiennement en alternant ampoule 1 et ampoule 2 pendant 24 jours, repos 6 jours. Traitement : trois mois.

2^o **MURONES A. B. C.** — Oxygénation et oxydations intratissulaires par oxydoréduction.

Indications. — Tuberculose pulmonaire, osseuse, laryngée, suppurations pulmonaires, bronchites fétides.

Composition. — Murone A : essences oxydantes à doses plus actives ; Murone B : balsamique très diffusible ; Murone C : doué de grande activité infertilisante, ne doit être employé qu'après amélioration des signes généraux et fonctionnels.

Mode d'emploi. — Alternier les injections chaque jour, au début dans l'ordre A. B. B. A. B. B., puis A. B. A. B. A. B., puis A. B. C., B. A. B. C.

Voir notices et formules dans chaque boîte. — Prix en France : 15 fr.

Fabrique par les laboratoires **AUG. LUMIERE**

Dépôt et vente :

Etablissements **SILBERT et RIPERT**

30, rue Bénédit — MARSEILLE

MUSCULOSINE BYLA

Suc de viande crue hyperactivé par les oxydases et la catalase du sang et les vitamines musculaires.

Propriétés thérapeutiques. — Antibactérienne, Toni-nutritif, Excitant physiologique.

Indications. — Convalescences, Anémies, Tuberculose, Neurasthénie.

Dose et mode d'emploi. — 1 à 2 cuillerées à bouche aux repas, dans la boisson préférée, toujours froide ou tiède, gazeuse ou non.

Prix :

Le flacon : 18 fr. — Le grand flacon : 34 fr.

Les Etablissements **BYLA**

26, avenue de l'Observatoire — PARIS.

MUTHANOL

Hydroxyde de Bismuth radifère.

Indications. — Syphilis à toutes ses périodes. Pian, Angine de Vincent, Lupus érythémateux.

Dose normale : Ampoule de 2 centimètres cubes renfermant 13 centigrammes de Bismuth métal.
Boîte de 10 ampoules : 30 francs.

Double dose : Ampoule de 3 centimètres cubes renfermant 26 centigrammes de Bismuth métal.
Boîte de 10 ampoules : 40 francs.

Dose infantile : Ampoule de 1 centimètre cube renfermant 2 cgr. 6 de bismuth métal.
Boîte de 10 ampoules : 20 francs.

Mode d'emploi. — Une ampoule tous les 2 jours ou 2 ampoules tous les 5 jours.

Traitement de sécurité : Suppositoires Muthanol, adultes et enfants.

Laboratoire du MUTHANOL : G. FERMÉ

55, boulevard de Strasbourg — PARIS (X^e).

R. C. Seine 143.981.

MYCIDOL BADEL

Combinaison allylique et sulfurée de méthanal, essences aromatiques et sels de radium.

Externe. — Antiseptique général, chirurgie, gynécologie, obstétrique.

Dose. — 2 cuillerées à café par litre d'eau.

Prix : 8 francs.

Interne. — Infections gastro-intestinales, non spécifiques dysentériques, typhiques et grippales. Helminthiase.

Dose. — 50 à 100 gouttes par jour.

Prix : 10 francs.

Enregistré au Laboratoire National des Médicaments
556-2, 556-3.

Laboratoires BADEL

58-60, rue des Moulins — VALENCE (Drôme).

MYCOLYSINE

du Docteur DOYEN.

Solution colloïdale phagogène polyvalente. — Stimule la phagocytose.

Formes et doses :

Mycolysine buvable, 4 à 12 cuillerées par jour.
Extrait de Mycolysine, 1 à 4 cuillerées par jour.
Mycolysine injectable, ampoules de 10 cc.
Pastilles de Mycolysine, 15 à 20 pastilles par 24 h.

Indications. — Action thérapeutique rapide dans les affections aiguës des voies respiratoires, dans les phlegmons profonds, les lymphangites infectieuses, les fièvres éruptives et la grippe, la méningite cérébro-spinale, etc.

Prix :

Buvable-Extrait : 20 francs.
Ampoule : 6 francs. — Pastilles : 8 fr. 50.

Laboratoires LEBEAULT

BESINS et C^{ie} pharmacien

5, rue Bourg-l'Abbé — PARIS (III^e).

MYGDAL

Traitement organothérapique des troubles amygdaliens et pharyngiens.

Composition. — Extractif de tissus amygdaliens en solution hydroalcoolique, pour administration par voie buccale, selon la méthode des D^{rs} Cuvier et Carrère.

Indications. — Dans l'hypertrophie simple des amygdales. Dans les troubles persistant après leur ablation. Dans les amygdalites dues à des états diathésiques (rhumatismales, etc...). Dans certains troubles pharyngiens et laryngiens (enrouements, etc...).

Posologie :

Chez l'enfant : 1 goutte 2 à 3 fois par jour.

Chez l'adulte : 1 goutte 3 à 4 fois par jour.

Loin des repas.

Forme. — Gouttes pour administration par voie buccale ou en gargarismes. Traitement pour 2 mois.

Prix au public : 30 francs.

Préparé par **G. MOSSER, Pharmacien.**

sous le contrôle du

LABORATOIRE DE RECHERCHES BIOLOGIQUES

30, place Gambetta — BORDEAUX

Littérature. Echantillons. Commandes :

Laboratoires H. BOISSEL

295 bis, rue de la Benaige. — BORDEAUX.

Dépôt général : O. C. P., 71, rue du Temple. — PARIS.

MYOCHRYSINE

Aurothiomalate de Sodium titrant 50 p. 100 d'or métal sous forme de solution aqueuse et de suspension huileuse pour injections intra-musculaires ou sous-cutanées. A utiliser dans les cas où les injections intraveineuses de CRISALBINE sont impossibles. Bien toléré localement.

Indications. — Tuberculose pulmonaire de l'adulte et T. P. infantile. T. ganglionnaires et cutanées. Tuberculides. Rhumatismes chroniques et infectieux.

Présentations. — Solution aqueuse (étiquettes bleues) et suspension huileuse (étiquettes jaunes). Dosages : 0,01, 0,05, 0,10, 0,20, 0,30, 0,50. Boîtes de 1 et 10 ampoules.

Tuberculose pulmonaire. — Débuter à 0,05 et ensuite 0,10, puis 0,20 et 0,30 par semaine.

Rhumatisme. — Débuter à 0,01 et ensuite 0,05 et 0,10 ou 0,20 par semaine (consulter la notice).

Société Parisienne d'Expansion Chimique

SPECIA

Marques Poulenc frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

MYODEN

Elixir Antirhumatismal et Antigoutteux
au Phosphohexaparadiazinammonium.

Composition. — Phosphohexaparadiazinammonium, Sel de Gregory, Extrait stabilisé de belladone, Extrait fluide de bulbes de colchique stabilisés, Teinture de digitale pourprée, Ethanol pur, Eau bi-distillée.

Indications. — Rhumatismes, Arthralgies et Arthropathies aiguës ou chroniques, Goutte, Arthrite goutteuse, Rhumatisme polyarthritique progressif, Sciatique, Affections articulaires chroniques, Lumbago.

Posologie. — *Adultes* : 3 cuillerées à café par jour pur ou dans de la tisane de feuilles de frêne.

Enfants au-dessus de 10 ans : 2 demi-cuillerées à café par jour.

Nota. — Le MYODEN peut être prescrit par le Corps médical pour les Assurances Sociales.

Médicament enregistré au Laboratoire national de Contrôle des Médicaments sous le n° 726-1.

Prix : 18 francs.

Laboratoires E. DAUPEZ

37, rue des Lois — TOULOUSE (Haute-Garonne).
Tél. : 224-55.

MYORAL

Le MYORAL est un sel d'or insoluble en suspension huileuse. Il correspond à la formule de l'aurothioglycolate de calcium, soit 64,16 d'or métal et 6,54 de calcium.

C'est le sel le plus riche en or métal employé jusqu'ici, ce qui lui assure une *remarquable efficacité*.

Son insolubilité, d'une part, sa présentation en suspension dans l'huile, d'autre part, en font le *mieux toléré* de tous les sels d'or.

Il doit être utilisé en injection intra-musculaire qui est *absolument indolore*.

Le MYORAL est présenté en ampoules de 1 cc., 2 cc., 3 cc., on peut sans inconvénient en injecter 2 doses de 3 cc. par semaine jusqu'à une dose totale de 50 cc. à 60 cc.

Mode d'emploi :

2 injections intra-musculaires par semaine.

En commençant par des doses faibles, arriver le plus vite possible à injecter dans la même semaine 2 ampoules de 3 cc. Jusqu'à une dose totale de 50 cc. à 60 cc., soit environ 3 à 4 gr. d'or métal pour une série. Attendre deux mois avant d'entreprendre une deuxième série.

Prix de vente :

10 francs l'ampoule de 0,05. (demi-dose).

15 — — 1 cc. (6 cg. 41 or métal).

20 — — 2 cc. (12 cg. 83, or métal).

25 — — 3 cc. (19 cg. 24. —

Laboratoires du MYORAL

20, rue des Ecoles — PARIS (V^e). (Danton 81-53).

MYOTHERMINE

Médication externe, imprégnation par essences végétales, réaction thermogène, révulsion atténuée. Onguent non coloré en tube étain.

Indications. — Douleurs articulaires, Courbature, Lumbago, Torticolis, Point de côté, Engelures, Congestions de la gorge, Trachéites, Bronchites, Grippe pulmonaire, Congestion pulmonaire, Pneumonies, Broncho-pneumonies, Pleurésies.

Mode d'emploi. — Étendre une couche de Myothermine avec un tampon de coton, recouvrant largement le point douloureux, la gorge ou le thorax, suivant les cas.

Pour obtenir une révulsion atténuée, non pénible, couvrir avec le papier imperméable spécial contenu dans la boîte.

Prix du tube : 13 francs.

Echantillon grandeur normale sur demande.

Laboratoire d'Hygiène et Thérapeutique appliquées

47, rue Bokanowski — ASNIÈRES (Seine).

MYOVARSYL

Sulfarsénobenzol, voie intramusculaire ou sous-cutanée.

Indications. — Syphilis à toutes les périodes. Médication de choix des sujets à veines difficiles : femmes, enfants, nourrissons.

Présentation. — En boîtes unitaires : ampoule de 0,015 à 0,50.

Prix au public : suivant dose, de 2 fr. 50 à 14 fr. 30.

Usines Chimiques des Laboratoires Français

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI^e).

Dépositaire :

Laboratoire et Pharmacie A. MILLET

5, rue Ambroise-Thomas — PARIS (IX^e)

Tél. : Provence 58-43.

NAIODINE LOGEAI

Formule : 1° *Normale*, ou A solution aqueuse à 1 % d'iodure de sodium stabilisé (pour intramusculaires).

2° *Concentrée*, solution B aqueuse à 5 %. *Spéciale pour intraveineuses.*

Formes :

Solution normale à 1 % :

Boîte 6 amp. de 10 cc. : 23 fr. net. Boîte vrac 24 de 10 : 72 fr.

Boîte 6 amp. de 20 cc. : 30 fr. net. « « 12 de 20 : 48 fr.

Solution B à 5 % :

Boîte 6 amp. de 10 cc. : 27 fr. net. Boîte vrac 24 de 10 : 85 fr.

Boîte 6 amp. de 20 cc. : 35 fr. net. « « 12 de 20 : 56 fr.

Boîtes vrac de 50 ou 100 ampoules réservées au Corps Médical. Prix courant réduit sur demande.

Propriétés. — *Solution normale : sédatif type de l'élément douloureux dans les algies rebelles*, grâce à l'action neurophile intense de NaI stabilisé (imprégnation nerveuse par l'ion I de la NAIODINE).

Véritable traitement spécifique de la sciatique, c'est en outre un précieux succédané des stupéfiants (algies rebelles, toxicomanies, néoplasmes, douleurs du tabès, etc.).

Solution B à 5 %. — Action antiseptique et anti-infectieuse puissante par voie intraveineuse dans le traitement des maladies infectieuses du système nerveux et leurs séquelles. Cure intraveineuse des algies rebelles.

La NAIODINE A ou B est atoxique, stabilisée, indolore à l'injection, immédiatement assimilable, sans réactions secondaires.

Indications. — *Solution normale.* Tout syndrome douloureux, aigu ou chronique : Sciatique, Lumbagos, Zonas, Rhumatisme articulaire aigu, Rhumatisme déformant, Névralgies faciales, intercostales et lombaires, Névrites, Myalgies, Asthme, Emphysème, Toxicomanies, etc.

Solution B à 5 %. — Maladies infectieuses du système nerveux et leurs séquelles. Algies rebelles.

Posologie. — *Solution normale :* Traitement d'attaque à doses massives : 20 à 40 cc. par jour, en une seule séance, jusqu'à sédation. Injections intramusculaires indolores lentes (loco dolenti si possible). Ni réactions, ni incompatibilité, ni contre-indications. Pas d'iodisme, ni d'accumulation.

Solution B. — *Injections strictement intraveineuses* très lentes : 20 à 40 cc par jour pendant dix jours, 20 jours de repos entre chaque série d'injections.

Laboratoires Jacques LOGEAI

BOULOGNE-SUR-SEINE, près Paris.

Tél. : Auteuil 40-15 et 40-16.

NARCYL

Médicament spécifique de la Toux.

Laryngites, Bronchites, Coqueluche.

En particulier : *Toux de la Tuberculose.*

Sirop dosé à 0 gr. 03 ctg. de Narcyl par cuillerée à soupe (chlte d'éthylnarcéine synt.).

Comprimés dosés à 0 gr. 02 de narcyl et 0 gr. 25 de benzoate de Na.

Doses :

Sirop :

Adultes : 3 à 4 cuillerées à bouche par jour.

Enfants : 2 à 4 ans : 1 à 3 cuill. à café par jour.

— 4 à 7 ans : 4 à 5 cuill. à café par jour.

— 7 à 15 ans : 1 à 2 cuill. à bouche par jour.

Comprimés : *Adultes* : 4 à 6 comprimés par jour.

Sirop, le flacon : 14 fr. — Comprimés : 14 fr.

Laboratoires LONGUET

34, rue Sedaine — PARIS (XI^e).

NASARGINE

Solution à base d'argyrol de Barnes et de résorcine.

Avantages. — Associés à la résorcine, les sels d'argent ont une action antiseptique plus efficace sur les muqueuses.

Indications. — Rhinites, Coryzas, Grippe, Sinusites, Adénoïdites, Otites et toutes les affections du rhinopharynx et du larynx.

Modes d'emploi :

| | |
|-------------------------------------|---|
| <i>Nourrissons</i> : I à II gouttes | } dans chaque narine 2 à 3 fois par jour. |
| <i>Enfants</i> : III gouttes. | |
| <i>Adultes</i> : IV à VI gouttes. | |

Badigeonnages. Pulvérisations.

Laboratoires MAIRE

171, rue de Belleville. — PARIS.

NASOBORE (Comprimés)

Puissant désinfectant des voies respiratoires
Non irritant, Non toxique.

Composition. — *Chloramine T*, associée aux essences balsamiques et aux principes de plantes sélectionnées.

Formule. — *Chloramine K*, Baume du Pérou, Borate de Soude, Bicarbonate de Soude, Essences aromatiques.

Indications. — Antisepsie des voies respiratoires, Affections de la gorge, Enrouement, Angines, Laryngites, Trachéites, Trachéo-Bronchites, Sinusites, etc.

Mode d'emploi. — 1° *Inhalations* : 2 à 3 comprimés dans un bol d'eau bouillante. Respirer les vapeurs plusieurs fois par jour.

2° *Gargarismes* : 1 comprimé dans un demi-verre d'eau bouillie chaude.

Prix : 15 francs.

Laboratoire J. BRESSIER

Docteur en Pharmacie,

102, rue Vincent — MARSEILLE.

Concessionnaires :

Les Laboratoires NOVALIS

OULLINS (Rhône).

NASOPON

Deux formes : Huile et Pommade.

Formule. — Huile éphédrinée à l'essence de pin. Pommade avec résorcine et salol.

Action. — Décongestif, antiseptique, désinfectant.

Indications. — Préventif et curatif de toutes les affections nasales (Coryzas, sinusites).

Antiseptique général dans les maladies infectieuses : Grippe, Rougeole, Scarlatine.

Désinfectant avant les interventions (Végétations, Sinusites).

Posologie. — **Huile** :

Adultes : XX à XXX gouttes 2 à 3 fois par jour ou en pulvérisations avec un pulvérisateur à huile.

Enfants : Nourrissons jusqu'à 1 an : III gouttes 3 fois par jour.

Enfants de 2 à 5 ans : V gouttes 3 fois par jour.

Enfants 5 à 10 ans : X gouttes 3 fois par jour.

Pommade. — 2 à 3 fois par jour dans chaque fosse nasale.

Prix :

Nasopon Huile : 10 francs. — Nasopon Pommade : 8 francs.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments
N° 915-1 et 2, réglementé à la Nationale Réglementation.

Laboratoire du NASOPON et du PANIODE

BOSDURE, Pharmacien

239, rue Paul-Bert — LYON.

NASO-SULFOLARSAN

Antiseptique sulfureux sans odeur.

Non caustique, non toxique.

Indications. — Affections du nez et de la gorge : Coryza aigu ou chronique, Sinusites, Ozènes, Otites, Muguet, Angines.

Présentation. — Pommade en tube à embout nasal.

Mode d'emploi. — Gros comme un pois, 2 à 3 fois par jour.

Le tube : 10 francs.

Laboratoires DOMERGUE
AGEN (Lot-et-Garonne).

NATIBAÏNE NATIVELLE

Seule association renfermant 1/3 de **Digitaline Nativelle** et 2/3 d'**Ouabaïne Arnaud**.

Formes. — Solution au 1/1000. Ampoules à 3/10 de mgr. pour injections intraveineuses.

Indications. — Myocardites avec Tachycardies, Arythmie complète avec troubles du tonus, Hypertension artérielle avec tendance à la Tachycardie, Dissociation atrio-ventriculaire avec ébauche de décompensation.

Doses. — *Per os* : Doses faibles (d'entretien) : XV gouttes de **Natibaïne Nativelle** par jour pendant 5 jours.

Doses moyennes (de soutien) : XXX gouttes de **Natibaïne Nativelle** par jour pendant 5 jours.

Doses fortes (d'attaque) : L gouttes de **Natibaïne Nativelle** par jour en deux fois pendant les 5 premiers jours, puis XX gouttes par jour les 5 jours suivants.

Injections : 1 cc. d'une ampoule par jour pendant 4 jours.

Prix : 16 francs.

LABORATOIRE NATIVELLE
27, rue de la Procession — PARIS-15.

NATIROSE

Dragées de Trinitrine à noyau liquide.

Composition. — Chaque dragée renferme :

Trinitrine..... 0 gr. 00065

Chlorhydrate de Codéthyl-

line 0 gr. 003

Sulfate neutre d'Atropine. 0 gr. 0001

Essence de menthe.

Indications. — Angine de poitrine, Aortite, Artérite, Asthme cardiaque, Bradycardie, Hypertension artérielle, Œdème aigu du poumon.

Doses. — 1 à 2 dragées au moment de l'accès sans dépasser 8 à 10 dragées par 24 heures.

Prix : 20 francs.

LABORATOIRE NATIVELLE

27, rue de la Procession — PARIS-15.

NATROSYL

Forme pharmaceutique. — Soluté.

Composition. — Soluté alcalin à base de baume du Pérou et d'essences antiseptiques aromatiques.

Action. — Antiseptique, lénitive, décongestionnante.

Indications. — Traitement médical des affections vagino-utérines, leucorrhée, métrite puerpérale, etc.

Doses. — 1 à 3 cuillerées à café par litre d'eau bouillie en injections vaginales.

Prix : 10 francs.

**Laboratoires
du Dr Pierre ROLLAND**

Dépôt : 127, Bd St-Michel — PARIS (V^e).

NAZINETTE

(Baume Nasal.)

Composition. — Mélange complexe d'essences choisies d'après leur pouvoir antiseptique et d'après leur coefficient de volatilité. *Pas de menthol.* Pas d'adrénaline. Pas de toxiques. Pas de poudres insolubles. Pas de produits chimiques.

Avantages. — Homogénéité absolue. Consistance fluide, fusible à 36°. Laisse les narines libres. Adhère aux muqueuses (action prolongée) et partiellement absorbable par elles (action immédiate et exceptionnelle). Tient lieu d'inhalation. Usage prolongé possible. N'irrite jamais. Ne tache pas le mouchoir.

Présentation. — Tube d'étain pur avec une canule permettant l'introduction facile dans les narines.

Prescription. — Un tube de *Nazinette* : introduire gros comme un petit pois dans chaque narine.

Propriétés. — Calmant, décongestionnant, bactéricide. Supprime les irritations de la muqueuse.

Indications. — Rhumes de cerveau, rhinites et toutes inflammations de la muqueuse rhino-pharyngée, végétations, sinusites (action remarquable), ozène, surdité, etc. ; prévention des maladies infectieuses, coqueluche, etc.

Prix : 6 francs.

Laboratoires Biologiques

E. GILBERT, Docteur en Pharmacie

6, rue du Laos — PARIS (XV^e).

NÉALGYL BOTTU

Composition et présentation. — Comprimés constitués d'une association de deux groupements médicamenteux : un noyau antalgique à base d'une nouveauté : la chloralopyrine de Bottu et un groupement correctif des effets nocifs secondaires sur le cœur et le rein (caféine-hexaméthylèneamine).

Les comprimés dragéifiés sont insolubles mais faciles à déglutir. Présentés en boîtes de 12 comprimés dont chacun représente 0,27 de chloralopyrine, 0,10 d'oxyéthylacétanilide, 0,05 de caféine et 0,07 d'hexaméthylène.

Indications et posologie. — Toutes les algies depuis les bénignes (courbatures, céphalées, odontalgies) jusqu'aux douleurs tenaces et rebelles (goutte, sciatique, mensturalgies). A ordonner spécialement chez les malades dont l'estomac ou le rein ne peuvent supporter les spécifiques anti-douleur courants.

Pour un effet immédiat et massif, 2 comprimés d'emblée suivis à 20 minutes de distance d'un troisième et, si besoin, d'un quatrième. Pour une action prolongée et soutenue, 6 à 8 comprimés par jour toutes les deux heures, avant ou pendant les repas, mais jamais pendant le travail de la digestion.

Pour les algies vespérales et insomnies douloureuses, 2 comprimés d'emblée le soir dans un liquide très chaud.

La boîte de 12 comprimés : 6 fr. 50.

Laboratoires BOTTU

115, rue Notre-Dame-des-Champs — PARIS (VI^e).

NÉOARSITE

(Liquueur de Fowler spéciale.)

Propriétés. — Les composés arsenicaux, tels que cacodylates, méthylarsinates, etc. ont été adoptés thérapeutiquement pour remplacer les sels arsenicaux anciens, arseniates, arsenites, mais leur efficacité n'est réelle qu'à des doses importantes, c'est-à-dire à des doses voisines de leur toxicité spécifique.

De tous les arsenicaux, seule la liqueur de Fowler a une valeur thérapeutique bien définie. Aussi le prof^r Roger a-t-il étudié pour ce médicament de toute efficacité les conditions optima de son absorption sous des formes nouvelles.

Formes :

1° *L'Ampoule isovisqueuse de Néoarsite*, grâce à sa viscosité qui est égale à la viscosité moyenne du Myoplasma sanguin, est résorbée presque instantanément et sans réaction.

2° *Les Perlules de Néoarsite*, solubles seulement dans l'intestin, suppriment les inconvénients de l'absorption gastrique. Chaque perle correspond à IV gouttes de Liqueur de Fowler et à un milligramme de quassine.

Posologie :

Ampoules : 1 par jour.

Perlules : 1 au repas du midi. 1 au repas du soir.

Prix : Ampoules, 20 fr. ; Perlules, 15 fr.

Dépôt : Laboratoire NOGUÈS

7, rue Galvani — PARIS.

NÉOBIOL

Composition. — Soufre colloïdal et complexe hydrocarburé spécial, dégraissant et d'odeur agréable.

Indications. — *Séborrhée* et ses manifestations : chute des cheveux, pellicules, peaux grasses, points noirs, acné.

Mode d'emploi :

Au visage :

En applications externes quotidiennes.

En frictions douces avec un tampon de coton hydrophile.

Au cuir chevelu :

Écarter les cheveux par quelques raies faites au peigne, et procéder de même qu'au visage.

Prix au public : 18 fr. 90.

Laboratoire L. JAUFFRET, Pharmacien

Ex-Interne des Hôpitaux.

4, place du Val — VANVES (Seine).

NÉO-CALCILINE

Reconstituant biologique, para-hépatopancréato-splénique.

Composition. — Os frais épiphysaire, Parathyroïde Thymus, Surrénale, Diastase pancréatique, Poudre de Muqueuse intestinale, Extrait lipoïdique de Foie, Extrait lipoïdique de Rate.

Doses. — 2 comprimés, 2 mesures (granulé) avant chaque repas.

Enfants : 1/2 doses.

Prix : 16 francs.

**Laboratoires Gastro-Entérologiques
ODINOT**

21, rue Violet — PARIS (XV^e).

Tél. : Ségur 69-13.

NÉO-CARDYL

Butyl-thio-laurate de Bismuth oléosoluble.

Indications. — Bismuthothérapie de la syphilis acquise ou héréditaire, par voie intramusculaire.

Présentations et posologie. — Néo-Cardyl (pour adultes), solution huileuse dosée à 0 gr. 05 de Bi métal par cc. Ampoules de 1 cc. 5 contenant 0 gr. 075 de Bi métal (boîtes de 12 ampoules). Série de 12 injections bi-hebdomadaires ; intervalle de 5 semaines environ entre deux séries consécutives.

Néo-Cardyl infantile : Solution huileuse dosée à 0 gr. 015 de Bi métal par cc. Ampoules de 1 cc (boîtes de 10 ampoules). Dose par injection, suivant le poids de l'enfant (consulter la notice détaillée).

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

NÉO-CHLORAL-NAU

Une nouveauté thérapeutique.

Antiseptique puissant, ni caustique, ni irritant. Décongestif, astringent, analgésique, hémostatique.

Formule. — Thymol crist. 2 gr. — Hydrate de chloral, 100 gr. — Résorcine, 50 gr. — Novocaïnum, 2 gr. 50. — Adrénaline au 1 000^e, 25 gr. — Excipient aqueux spécial, 1 000 gr. — La nouveauté consiste en la **solubilisation** (sans intervention de sels sodiques ou autres) et la *stabilisation* du thymol cristallisé en milieu rigoureusement aqueux.

Indications :

1^o Affections du RHINO-PHARYNX : Angines, rhinites, amygdalites, etc...

2^o En **STOMATOLOGIE** : interventions traumatisantes, abcès, pyorrhée alvéolaire, etc...

Posologie. — 1 à 2 cuill. à café dans un grand verre d'eau bouillie chaude, en bains de bouche, gargarismes, etc...

1 à 3 cuill. à soupe par litre d'eau en lavages de la gorge, irrigations nasales, etc...

Présentation. — En flacon de 2 grandeurs :

P. M. à 8 francs ; G. M. à 16 francs.

Laboratoires du NÉO-CHLORAL-NAU
21, Grande-Rue — ARGENTEUIL (.S-et-O.).

NÉO-COLLARGOL

Le Néo-Collargol assure au Corps médical la garantie d'un produit à teneur en argent très élevée (80 p. 100 d'argent métal).

Ni irritant, ni toxique, c'est un bactéricide des plus énergiques dont l'emploi est toujours utile pour le traitement des maladies infectieuses et pour le pansement des plaies.

Il s'emploie en :

Pommade Néo-Collargol cocaïné pour le pansement de toutes plaies opératoires, variqueuses, brûlures.

Pommade Néo-Collargol non cocaïné pour frictions dans maladies infectieuses.

Ovules Néo-Collargol réalisant le pansement continu des vaginites, métrites, ulcérations du col utérin. Les sécrétions diminuent et la guérison suit rapidement.

Suppositoires Néo-Collargol pour hémorroïdes, fissure anale et prostatites.

Pilules Néo-Collargol pour les entérites, la coli-bacillose et l'appendicite chronique.

Compte-Gouttes pour le coryza et la grippe.

Prix :

Pommade cocaïnée : 18 francs. — *Pommade non cocaïnée* : 14 francs. — *Ovules* : 14 francs. — *Suppositoires* : 14 francs. — *Pilules* : 14 francs. — *Compte-Gouttes* : 13 francs.

Laboratoires du D^r MARTINET
16, rue du Petit-Musc — PARIS.

NÉO-DMÈGON

Vaccin curatif des complications de la gonococclæ.

Stock-vaccin atoxique stabilisé constitué par des émulsions de cultures diverses de *gonocoques* et de *synocoques* traitées par le fluorure de sodium.

Indications. — Complications diverses de la Blennorragie (Orchi-épididymites, cystites, prostatites, arthrites, ophtalmie, etc...), dans lesquelles le Néo-Dmègon agit notoirement sur les symptômes douloureux et inflammatoires.

Présentation et mode d'emploi. — Ampoules de 1 cc. (boîte de 6) à étiquette blanche ou bleue (races diverses). En principe, 1 ampoule tous les 2 jours, en alternant les ampoules à étiquette blanche et bleue. Voie hypodermique ou intra-musculaire.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc frères et Usines du Rhône
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

NÉO-DMÈTYS

Vaccin curatif et préventif de la coqueluche.

Stock-vaccin atoxique stabilisé constitué par une émulsion de cultures diverses de Bacilles de Bordet traitées par le fluorure de sodium.

Indications. — Traitement et prophylaxie de la coqueluche.

Présentation et mode d'emploi. — Ampoules de 1 cc. (boîte de 6) à étiquette blanche ou bleue (souches différentes). Une injection intramusculaire, de préférence (ou sous-cutanée), en principe tous les 2 jours ; commencer par 1/2 ampoule pour atteindre 1 ampoule à la troisième ou quatrième injection. Chez les très jeunes enfants, s'en tenir à 1/2 ampoule. Le traitement comporte en général de 6 à 10 ampoules (soit 10 à 20 jours environ). Alternier les ampoules à étiquette blanche et bleue.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

NÉOL

Constitution. — Préparation aqueuse peroxy-sulfatée, d'origine électrolytique, constituant une solution auto-génératrice d'Ozone naissant.

Propriétés. — Aucune toxicité, antiseptique-cicatrisant, essentiellement cytophyllactique, kératoplastique et décongestif.

Indications. — Brûlures par le feu, le radium ou le froid. Ulcérations cutanées et muqueuses. Plaies phagédéniques. Métrites, angines, pharyngites.

Mode d'emploi. — L'eau néolée (*Néol*, 1 partie, eau, 4 parties) remplace avantageusement l'eau oxygénée dans toutes ses indications. — Attouchements, badiageonnages (Angines, Stomatites, Laryngites, Métrites et Endométrites) : *Néol pur*. — Pansements (Brûlures, Plaies diverses) : *Eau néolée*. — Gargarismes : une cuill. à soupe par verre d'eau avec une pincée de bicarbonate de soude. — Injections, grands lavages : Quatre cuill. à soupe par injection de deux litres d'eau.

Le flacon de 200 cc. Prix : 5 fr. 60.

Laboratoires **BOTTU**

115, rue Notre-Dame-des-Champs — PARIS (VI^e).

NÉO-LAXATIF CHAPOTOT

Laxatif.

Composition. — Suc d'orange et manne.

Forme. — Sirop.

Indications. — Laxatif agréable pour les enfants, les dames et les personnes âgées ou affaiblies.

Ne renferme ni produits chimiques, ni phtaléine du phénol, ni drastiques, ni stupéfiants.

Peut être donné aux enfants, même nouveau-nés.

Posologie

Enfants du premier âge : 1/3 à une cuillerée à café.

Enfants de 3 à 5 ans : une à deux cuillerées à café.

Enfants de 6 à 14 ans : une à deux cuillerées à entremets.

Adultes : une à deux cuillerées à soupe. S'il y a lieu, augmenter les doses jusqu'à effet actif pour revenir ensuite à des doses moindres, mais suffisantes.

Prix : 12 francs.

Laboratoires CHAPOTOT

56, boulevard Ornano

PARIS (XVIII^e)

Téléphone : Nord 28-90.

R. C. 231917 B.

NÉOLYSE

Composé silico-magnésien.

Propriétés thérapeutiques. — Reminéralisateur et antinéoplasique. Le meilleur traitement médical des affections cancéreuses.

Indications. — Prophylaxie et traitement des néoplasmes. Traitement préventif des récidives et des métastases. Traitement des verrues et des lésions du type pré-cancéreux. Traitement des troubles asthéniques (fatigue, dépression, surmenage). Adénome prostatique.

Posologie. — Un cachet avant les 3 principaux repas, pendant 20 jours. Interrompre le traitement pendant 10 jours.

Boîte de 60 cachets : 20 francs.

Une ampoule par jour, voie hypodermique, intramusculaire ou interstitielle ; séries de 16 injections, repos de 15 jours.

Boîte de 4 ampoules ordinaires : 10 francs.

Boîte de 4 ampoules radioactives : 20 francs.

Laboratoire G. FERMÉ

55, boulevard de Strasbourg — PARIS (X^e).

NÉO-NEUROSINE PRUNIER

Saccharure granulé à base de :

| | |
|--|---------------|
| Phospho-glycérate de calcium pur | 0,05 centigr. |
| Glycéro-phosphate de sodium pur | 0,10 — |
| Chlorure de magnésium pur.. | 0,15 — |
| par cuillerée à café, soit 5 grammes. | |

Propriétés thérapeutiques. — Médication tonique, phosphorée, calcique et magnésienne. Prophylaxie des affections cancéreuses.

Posologie. — 2 à 4 cuillerées à café par jour, à prendre en nature ou dans de l'eau.

Dépôt général :

CHASSAING, LE COQ ET Cie

(Anc. M^{on} Chassaing-Prunier)

1, quai Aulagnier — ASNIERES (Seine).

NÉOPANCARPINE

Solution d'Extrait total de Jaborandi.

Formes. — Gouttes, Granules, Ampoules injectables

Indications thérapeutiques :

Traitement de fond des troubles vago-sympathiques, en particulier des *altérations de la sensibilité organique* (nerf pneumogastrique et annexes).

ASTHME - GRIPPE

RHUME DES FOINS-CORYZAS SPASMODIQUES

TOUX QUINTEUSES

COQUELUCHE

Accidents respiratoires et digestifs
post-anesthésiques au cours des
opérations.

Manifestations anaphylactiques.

URTICAIRE - ECZÉMA

Mode d'emploi :

Commencer toujours par des doses faibles. S'en tenir ensuite aux doses moyennes. Augmenter les doses en cas d'insuffisance d'action.

Doses moyennes :

Gouttes : Enfants : III à X gouttes.

— Adultes : VIII à XV gouttes.

3 à 4 fois par jour, immédiatement après les repas.

Granules : Adultes : 1 granule 3 à 4 fois par jour.

Ampoules : Adultes : Commencer toujours par 3/4 d'ampoule, puis l'ampoule entière. Continuer à la dose la mieux tolérée. **1 ou 2 ampoules par jour.**

Le traitement par ampoules peut être continué sans toxicité pendant toute la période du rhume des foins, combiné avec le traitement interne et les instillations nasales et oculaires de **RHINOFLUINE**.

Dans l'asthme, il peut être poursuivi par périodes de plusieurs semaines, 3 à 4 fois dans l'année comme traitement de fond jusqu'à disparition des crises.

Prix : Gouttes, Granules : 16 francs.

Ampoules : 20 francs.

Laboratoire de Pathologie Générale de Paris
5, rue François-Ponsard — PARIS (XVI^e). Auteuil 35-25.

NÉOPHAGE

Traitement médical des cancers et des états précancéreux.

Néophage n° 1. — Levure injectable travaillant à 37°.

Néophage n° 2. — Extraits glandulaires : Thymus, Thyroïde, Hypophyse, Pancréas. Métaux colloïdaux : Cu, Fe, Se, Mn, Mg.

Injections intramusculaires tous les 2 jours du contenu total d'une ampoule n° 1 et de 1/3 d'une ampoule n° 2 ; augmenter progressivement les doses de n° 2.

Prix public : 100 fr. la boîte de 12 ampoules

Laboratoires JAMMES

86, rue Michel-Ange — PARIS (XVI^e).

NÉO-PHYSIO

Admise dans les Hôpitaux de Paris

Toutes infections de moyenne intensité.

Indications thérapeutiques. — Grippe, Angine, Broncho-Pneumonie, Fièvre typhoïde, Fièvre puerpérale et toutes les infections.

Forme. — Boîtes de 8 ampoules de 5 cc.

Injections intramusculaires, région rétro-trochantérienne au point de Barthélemy ; l'injection est indolore. Pas de réaction sérique. Pas de phénomène de choc. Toxicité nulle.

Prix : 22 francs.

PHYSIOSTHÉNINE

Toutes infections graves.

Formes. — Boîtes *Adultes* : 4 ampoules 20 cc.

Boîtes *Enfants* : 4 ampoules 10 cc.

Prix : 40 francs.

Laboratoires DROUET et PLET
RUEIL-MALMAISON (Seine-et-Oise).

NÉOPULMINE

Affections aiguës et chroniques des voies respiratoires.

Composition :

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Sulfogaiacolate de potasse | 1,00 |
| Benzoate de sodium. | 1,50 |
| Extrait thébaïque | 0,02 |
| Dionine | 0,02 |
| Teinture de belladone..... | 0,65 |
| — de drosera..... | 0,65 |
| — de grindelia | 0,65 |
| Sirop de baume de tolu. | 15,00 |
| Excipient aromatique Q. s. p. 100 cc. | |

Indications. — Trachéite, laryngite, bronchite aiguë et chronique, asthme, grippe, catarrhe, etc.

Mode d'emploi. — 4 à 5 cuillerées à soupe pour les adultes et 2 à 3 cuillerées à café pour les enfants au-dessus de 6 ans.

Prix : 13 fr.

Laboratoires RICHER

Docteur en pharmacie.

45, Fg Saint-Denis — 1, r. d'Enghien, PARIS.

NÉORAL

Médication biologique adjuvante et palliative des Néoplasies.

Composition. — Extractif inactivé de tissus néoformés pour administration par voie buccale, selon la méthode des D^r Carrère et Cuvier.

Indications. — *Comme adjuvant* à la suite des interventions chirurgicales ou physiothérapiques. Médication d'appoint influant sur le terrain par rétablissement des métabolismes perturbés.

Comme palliatif dans les cas jugés incurables par les traitements classiques pour chercher à obtenir la diminution des saignements, de la douleur, le relèvement de l'état général et du moral et, dans certains cas, la régression ou la stabilisation des masses tumorales.

Posologie et formes. — 1^o Voie buccale :

Gouttes : 1 goutte 3 fois par jour en dehors des repas (traitement pour 2 mois). Prix : 60 francs.

Cachets : 1 cachet par jour à partir de la 1^{re} semaine, comme 4^e prise quotidienne. Prix : 60 francs.

2^o Pommade en application locale. Prix : 30 francs.

Préparé par **G. MOSSER, pharmacien**,
sous le contrôle du

LABORATOIRE DE RECHERCHES BIOLOGIQUES

30, place Gambetta — BORDEAUX.

Littérature. Echantillons. Commandes :

Laboratoires H. BOISSEL

295 bis, rue de la Benaige — BORDEAUX

Dépôt général : O. C. P. 71, rue du Temple — PARIS

NÉO-RHOMNOL

Rhomnol Strychno-Arsénié (Nucléinate de Strychnine défini et Cacodylate de Soude).

Injections hypodermiques et comprimés.

Indications thérapeutiques. — Hypotension artérielle, Neurasthénie, Grippe, Convalescences, Intoxications, Dépressions nerveuses, Etats cachectiques, Suites d'infections, etc. (Spécificité). Amyosthénie. Corps nouveau défini, à effets réguliers et constants.

Mode d'emploi. — *Ampoules* : Tous les jours une ampoule (en injections intramusculaires de préférence), deux dans les cas graves. Habituellement, la boîte de 12 étant terminée, on institue un repos d'une semaine, suivi de la reprise des piqûres, si c'est nécessaire.

Comprimés : Un comprimé à chaque repas, avaler sans croquer.

Prix de vente au public : 18 francs.

Laboratoires du D^r M. LEPRINCE

62, rue de la Tour — PARIS (XVI^e).

NÉO-RIODINE

$C^3 H^6 O^4 I S Na$

Composition. — Dérivé sodique à 40 p. 100 d'iode organique en solution aqueuse.

Formes. — Boîtes de 10 ampoules de 2, 3, 5 cc.

Propriétés thérapeutiques. — *Action immédiate et intensive.* Aucune intolérance.

Indications. — Artério-sclérose, cardio-sclérose, myocardites chroniques, hypertension, Emphysème pulmonaire, bronchites chroniques, asthme. Obésité, rhumatisme chronique, maladies spécifiques et dans tous les cas où la médication iodée ou iodurée à effets rapides est indiquée.

Doses et mode d'emploi. — Par voie buccale : 1 ampoule par jour le matin à jeun dans un peu d'eau. En injections intraveineuses ou intramusculaires de 2, 3, 5 et 10 cc. suivant les cas.

Prix : 18 francs.

Laboratoires du D^r P. ASTIER

41, 42, 43 à 47, rue du Docteur-Blanche — PARIS (XVI^e)

NEO-SETI

Solution buvable de soufre et d'iode.

Propriétés thérapeutiques. — L'association de Soufre sous forme de Rhodanate de Potassium et d'Iode sous forme d'Iodure de Sodium, permet le traitement *per os* de toutes les manifestations douloureuses de la Diathèse Rhumatismale et de l'Arthritisme.

Indications. — Rhumatismes chroniques, Arthrites, Névralgies rebelles, Hypertension artérielle.

Mode d'emploi. — Prendre XXX gouttes, 3 fois par jour aux repas, dans un peu d'eau pure ou sucrée.

Laboratoires BRISSON

Dr DEDET ET Cie, Pharmaciens

Anciens Internes des Hôpitaux de Paris.
157, rue Championnet — PARIS (XVIII^e).

NÉOSPASMODYL

Anciennement : **NÉOSPASMINE « Vély »**

Composition. — Dragées glutinées à base de : Salicyl. Amidopyrine, Phényléthylmalonylurée, Camphre brom., Extrait Crataegus, Extrait de Belladone, Extrait de Valériane.

Indications. — Régulateur neuro-végétatif : instabilité nerveuse, angoisse, éréthisme cardiaque, Nervosisme prémenstruel, Angor pectoris, spasmes vasculaires, Menstruations douloureuses. Déséquilibre du vague et du sympathique.

Posologie. — 1 à 3 dragées avec chacun des deux principaux repas, pendant 12 à 15 jours, et après un repos de 8 jours, nouvelle cure.

Prix : 20 francs.

Laboratoires des Produits Vély
132, avenue Victor-Hugo — PARIS.
Tél. : Passy 87-85.

NÉOSULINE

Hormonothérapie anticancéreuse par voie buccale.

Principe actif. — Insuline-Fornet (Cf. *Pommade-Fornet*, page 1238) plus, hormone régulatrice de la croissance, extraite de la moelle d'os longs d'animaux jeunes.

Indications. — Affections cancéreuses de toutes natures et de toutes localisations.

Posologie. — 3 pilules 3 fois par jour une demi-heure avant les repas.

Propriétés thérapeutiques. — Amélioration presque instantanée de l'état général, disparition de l'anorexie, rétablissement des forces, soulagement des douleurs, ralentissement, arrêt du développement, et même décroissance de la tumeur.

Prix : 49 francs.

Vente et échantillonnage :

Laboratoire de Microbiologie

23, rue du Caire — PARIS (II^e).

Tél. : Gutenberg 03-45.

NÉO-TANNURGYL

du Docteur LE TANNEUR

Chlorhydrate de Vanadium en ampoules buvables.

Arrête la Phosphaturie, clarifie et réacidifie les urines sans être acide lui-même.

Mêmes indications générales que le Tannurgyl (voir TANNURGYL).

Indications spéciales urologiques. — Colibacillurie. Urétrites chroniques. Impuissance psychique.

Posologie. — 1 ampoule dans 1/3 de verre d'eau le matin.

Renseignements médicaux :

Docteur LE TANNEUR

87, avenue Borriglione — NICE

NÉOTHORIUM MILLOT

Traitement des MÉTRITES CHRONIQUES et des Ulcérations du Col.

Les sels de terres rares (Néodyme, Thorium, etc.) possèdent, en applications externes, de remarquables qualités antiseptiques, topiques et cicatrisantes.

Ces propriétés ont été mises à profit par divers auteurs (A. FROUIN, L. HUDELO, GUENOT, GRENET, DROUIN et MUFFAT), dans le pansement des plaies alones, et principalement dans le traitement des ulcérations du col de l'utérus, et des métrites chroniques.

Les sels de terres rares réalisent la médication idéale de ces affections, en effet :

Energiquement antiseptiques et antivirulents, ils amènent rapidement le tarissement de la suppuration.

Décongestionnants et astringents, ils suppriment en quelques jours les phénomènes douloureux et fluxionnaires.

Kératoplastiques, ils stimulent énergiquement la cicatrisation des ulcérations les plus tenaces.

Dépourvus de toute toxicité et de toute causticité, ils sont absolument inoffensifs.

Incolores et inodores, leur emploi est aussi discret qu'on peut le souhaiter à un traitement de ce genre.

Soucieux de rendre pratique cette intéressante médication, les LABORATOIRES MILLOT mettent à la disposition du Corps Médical les quatre préparations suivantes :

Ovules Néothorium Millot.

Métrites : un tous les jours, puis tous les deux jours.

Prix médical : la boîte de 6 ovules : 9 francs.

Crayons Néothorium Millot.

Endométrites : 2 à 3 par semaine.

Prix médical : la boîte de 8 crayons : 12 francs.

Comprimés Néothorium Millot.

Leucorrhée et Hygiène quotidienne : 1 ou 2 dans de l'eau chaude en irrigation.

Prix médical : la boîte de 36 comprimés : 8 francs.

Tampons Néothorium Millot.

Ulcérations du col : un tous les jours, puis tous les deux jours. Prix médical : la boîte de 6 tampons : 12 francs.

Nota. — Le prix médical ne peut être accordé qu'aux commandes adressées directement à nos Laboratoires.

Laboratoires MILLOT

177 rue de Courcelles — PARIS (XVII^e)

Tél. Etoile 29-54.

NÉO-TRÉPOL

Traitement de la syphilis par le bismuth métalloïdique pur.

Médication spirillicide intramusculaire dosée à environ 96 p. 100 de Bi élément en milieu aqueux isotonique. (Ampoules de 2 centimètres cubes.)

Adopté par le Ministère de l'Hygiène, l'Assistance et tous les services publics.

Prix de la boîte de 6 ampoules : 20 fr.

— 12 — : 36 fr.

Pour tous renseignements sur le mode d'emploi, la technique et la littérature de cette préparation, s'adresser aux

Laboratoires pharmaceutiques

L.-G. TORAUDE, O. , O. I. ,

Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris,
Lauréat de l'Institut et de l'Académie de Médecine.

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V^e).

NÉOTROPHÈNE

Tablettes au Chlorure de Magnésium d'un goût agréable.

Composition. — 0 gr. 20 de Chlorure de Magnésium cristallisé par tablette. Excipient : Q. S.

Posologie. — 6 tablettes en moyenne par jour, après les repas de préférence. Action laxative à jeun.

Indications. — Dermatoses, Eczéma en particulier, Prurits, Acné, Reconstituant très efficace dans les asthénies nerveuses. Facilite le travail. Convalescence. Cholagogue, régularise les fonctions digestives. Laxatif. Prophylactique du cancer. Nourriture de la cellule.

Prix : La boîte de 44 tablettes, 12 fr. 50.

« Laboratoire de **CHIMIE APPLIQUÉE DE NANTERRE** »

G. LEFRANC, Pharmacien

31, rue du Chemin-de-Fer. — NANTERRE (Seine)

NÉOVARYL

Complexe médicamenteux diffusible, directement absorbable par la peau, POUR TRAITEMENT EXTERNE des troubles de la circulation veineuse.

Indications. — Action préventive et curative des varices, phlébites ; lourdeurs et enflures des jambes, des traumatismes : foulures, entorses, etc. Préviend la stase, la dilatation et l'engorgement des veines.

Tonifie leurs parois et active la circulation.

Calme les crampes, les démangeaisons, les brûlures des jambes et des pieds. Dissout les enflures et les œdèmes, et rend aux veines leur élasticité complète.

Mode d'emploi. — En badigeonnages, compresses, ou pulvérisations.

Prix : Le flacon : 20 francs (toutes pharmacies).

Laboratoire PHILBERT

6, avenue Mirabeau et 56 Ch. de l'Arbre-Inférieur
NICE.

NEPHRYLAN

du Dr Lobry (Comprimés)

**ALBUMINURIE, OLIGURIE,
COLIBACILLURIE**

et toutes affections des voies urinaires.

Composition. — Lactate de strontium, Chlorophylle pure, Extrait de rein, Cantharis (à dose homéopathique), Extraits de Lawsonia, de Chymaphyla, d'Aphloia, d'Uva ursi.

Mode d'emploi. — 6 comprimés par jour. Suivre l'avis du médecin.

Prix : 18 francs.

Laboratoires du Docteur LOBRY

6, rue Parrot — PARIS (XII^e).

NEPTAL

Hydroxy - mercuri - propanolamide de l'acide ortho-carboxy-phénoxy-acétique.

Diurétique mercuriel peu toxique et d'action rapide.

Indications :

Oligurie des affections cardio-rénales, Œdèmes, Anasarque, Ascites, Épanchements pleuraux.

Présentation : Boîte de 3 ampoules de 1 cc. 5 (sol. à 9,2 p. 100).

Posologie et mode d'emploi. — Injection intramusculaire du contenu d'une ampoule à renouveler éventuellement après 6 à 10 jours. En cas d'épanchement, ponction préalable. S'abstenir chez les cachectiques, les fébricitants et les azotémiques à partir de 1 gr.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

NERGINE HEUDEBERT

Composition. — La Nergine apporte le phosphore organique, les éléments minéraux combinés et les vitamines du germe de blé naturel et constitue un reminéralisant précieux et un stimulant des sécrétions glandulaires.

Indications. — A recommander aux enfants en voie de croissance et dans tous les troubles de la nutrition accompagnant les affections aiguës ou chroniques : neurasthénie, anémie, tuberculose, typhoïde, surmenage et convalescence.

Excellent complément des farines lactées préparées à l'eau.

Mode d'emploi. — Pour le nourrisson, délayer dans un peu de lait, à la dose de 1 à 2 cuillérées à café par jour.

Pour les adultes, à prendre en plusieurs fois 4 à 6 fortes cuillérées à café par jour, dans une infusion tiède ou mélangée aux aliments habituels.

Prix : Poudre : 9 francs.

Granulé : 7 fr. 50. — Nergine chocolatée : 12 francs.

Produits de Régime HEUDEBERT

85, rue Saint-Germain — NANTERRE (Seine).

2 et 4, chemin Feuillat — LYON.

NERVOCITHINE (HÉPATISÉE)

du Docteur TISSOT
HEPATOCITHINE

Ampoules buvables, Dragées, Sirop.

(Hémoglobine et extrait de foie.)

Méthode de Whipple complétée et activée par sels organiques.

Composition et formes. — Sirop, dragées, ampoules buvables par boîtes de 6 ou boîtes de 12.

Hémoglobine et Extrait de Foie frais activés par sels organiques.

Puissance effective supérieure à celle de ces produits pris séparément. Tout mauvais goût supprimé.

Indications thérapeutiques. — Toutes les fatigues, anémies, faiblesses, diminution de résistance, anorexie, pertes de forces, convalescences, épuisements, etc. (Paludisme, maladie du foie, etc.).

Doses. — *Adultes* : 1 à 2 ampoules par jour ; 1 à 2 dragées à chaque repas ou 1 à 2 cuillerées de sirop (très agréable)

Enfants : Au-dessus de 7 ans, moitié dose.

Prix :

Sirop : 16 fr. — *Dragées* : 12 fr. — *Ampoules* : 14 fr.

Ampoules buvables : boîtes de 6 : 10 francs.

— — — de 12 : 20 francs.

Laboratoire du Docteur TISSOT

34, boulevard de Clichy — PARIS

NESAL

Produit granulé à dissoudre dans l'eau sucrée.

**Composition et formule
pour une mesure :**

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Tartroborobromol | 0 gr. 816 |
| Phényléthylmalonylurée | 0 gr. 03 |
| Extr. Hydr. Alc. de Belladone.. | 0 gr. 01 |

Sédatif et hypnotique, sûr, actif, inoffensif.

La plus intéressante synergie sédative hypnotique de la thérapie moderne.

Aucune intolérance.

Indications spéciales. — Épilepsie, Neurasthénie, Chorée, Troubles nerveux de la puberté et du retour d'âge, Insomnie, Anxiété, Convulsions de l'enfance, Angoisse, Neurasthénie sexuelle, Surmenages intellectuels, Gastralgies nerveuses, Migraine, Mal de mer, etc...

Posologie. — 1 à 3 mesures par jour.

Dans l'épilepsie, on peut donner jusqu'à 5 mesures par jour, en surveillant la tolérance du malade.

Laboratoires LOBRU

26, rue Vauquelin — PARIS (V^e).

Tél. : Glacière 28-33.

NESTOGÈNE

Lait en poudre Nestlé.

Lait en poudre demi-gras et sucré (sucres variés) obtenu par le procédé du brouillard.

Composition :

| | | |
|--------------------------|-----|--------|
| Matière grasse..... | 12 | p. 100 |
| Matières protéïques..... | 20 | — |
| Lactose | 30 | — |
| Maltose-dextrine | 15 | — |
| Saccharose | 15 | — |
| Cendres..... | 4,7 | — |
| Eau..... | 3,3 | — |

Riche en vitamines, de longue conservation, de haute valeur nutritive et de grande digestibilité.

Indications. — Allaitement normal dès les premiers jours des nourrissons sains, des intolérants au lait, des prématurés et des dystrophiques.

Posologie. — (Voir tableau spécial des dosages sur l'étiquette de la boîte.)

Prix : La boîte de 250 gr. : 12 fr. — 500 gr. : 19 fr.

Société NESTLÉ

6, avenue César-Caire — PARIS (VIII^e).

NESTOSYL

Anesthésie superficielle par contact.

Caractéristiques. — Association d'éthers des séries phtalique et paraaminobenzoïque. Aucun produit des tableaux A et B. Antiseptique.

Propriétés. — Puissante anesthésie de surface par simple contact, pourvu que l'intégrité de la peau soit modifiée, soit accidentellement (ablation, érosion ou même distension), soit naturellement (muqueuse). Suppression rapide et inoffensive de toute douleur, qui provient ou est accompagnée de plaie, érosion, excoriation, inflammation, irritation, éruption, œdème ou qui a son siège sur une muqueuse.

Dans les cas aigus, guérison locale.

Formes de présentation. — *Pommade au Nestosyl* (Voir à cette rubrique).

Solution huileuse au Nestosyl (Voir à cette rubrique).

Suppositoires au Nestosyl (Voir à cette rubrique).

Ovules au Nestosyl (Voir à cette rubrique).

Pommade : Prix : 12 fr. 50.

Ovules, Solution, Suppositoires : Prix : 15 francs.

Laboratoires du NESTOSYL

P. BAUDE, Pharmacien

72, rue Saint-Dominique — PARIS (VII^e).

Tél. : Ségur 96-46. — Adr. télégr. : Nestosyl-27 PARIS.

NEURÈNE

Solution et Comprimés.

Bornéol soluble, principe actif inodore de la valériane associé au principe actif antispasmodique du serpolet.

Doses et mode d'emploi.

Le Neurène, Valériane + Serpolet, se présente sous deux formes :

1° La *solution*, aromatisée au parfum de pêche, agréable à prendre.

Adultes : 3 à 6 cuillerées à café, prises en 3 fois, entre les repas, dans un peu d'eau sucrée froide.

Enfants : 1 à 3 cuillerées à café par jour.

2° Les *comprimés* : 3 à 6 comprimés par jour. Avaler chaque comprimé avec une gorgée de liquide. Ni sucer, ni croquer.

Chaque comprimé représente la valeur exacte, en principes actifs, d'une cuillerée à café de la solution.

Propriétés thérapeutiques :

Toutes les affections nerveuses.

Prix : 16 francs.

Admis aux Assurances Sociales.

Laboratoires A. DANIEL-BRUNET

62, Bd Jean-Jaurès — BOULOGNE-SUR-SEINE

Tél. : Auteuil 11-86. — Paris-Ouest.

NEURÉOL

Présentation et composition. — Association soluble de Véronal, Pyramidon, Valériane, Cratægus, Extrait de Coca.

Propriétés thérapeutiques. — Analgésique, antispasmodique, sédatif et hypnotique.

Avantages. — En solution aqueuse, bien toléré, pas d'accoutumance, aucune action nuisible sur le cœur, les reins, la mémoire.

Posologie et mode d'emploi. — Deux cuillerées à café dans un peu d'eau sucrée, avant le dîner ou de se coucher.

Prix : 14 francs.

Laboratoires LAFARGE

6, boulevard Arago — PARIS.

NEURIDOR

Forme. — Solution aromatisée.

Composition. — *Pyramidon, Chloral, Chloralosane, Valériane, Passiflore, Cratægus, Saule blanc.*

Propriétés thérapeutiques. — Antispasmodique. Régulateur, tonique et sédatif du système nerveux.

Indications. — *Néuralgies, Migraines, Neurasthénie, Insomnie, Tics nerveux, Agitation, Convulsions, Epilepsie.*

Mode d'emploi. — 2 à 4 cuillerées à café par 24 heures.

Ne peut être administré aux enfants au-dessous de 15 ans.

Prix : 15 francs.

Laboratoires SAUBA
MONTREUIL (Seine).

NEURINASE

Solution ou comprimés à base de Valériane fraîche stabilisée inodore, renforcée par une faible dose de Diéthylmalonylurée (0 gr. 15 de Diéthylmalonylurée pure par comprimé ou cuillerée à café de solution).

A. Dose et mode d'emploi. — 1° Sédatif : 1 cuillerée à café, ou 1 comprimé matin et soir dans de l'eau sucrée ; 2° Hypnotique : de 1 à 4 cuillerées à café ou de 1 à 4 comprimés le soir au coucher.

Enfants : 1/2 dose. — *Nourrissons* : quelques gouttes.

B. Indications. — Régulateur du système nerveux contre Insomnies, Mélancolie, Hystérie, Troubles névropathiques de la Ménopause, Maladie de Basedow, Tics, Alcoolisme aigu et autres délires toxiques, Eretisme cardiaque, Palpitations, Tachycardie, Excitation générale, Dermatoses d'origine nerveuse, Prurit, Surmenage.

Contre-indication : Néant.

Prix : Solution : 16 fr. — Comprimés : 10 fr.

Laboratoire A. GENEVRIER
45, rue du Marché — NEUILLY-PARIS

NEUROBORE

PUR. — *Solution.*

Composition. — Solution inaltérable de tartrate borico-potassique pur. — 1 gr. par cuillerée à café.

Prop. thérap. — Spécifique des affections nerveuses. Calmant antispasmodique.

Indications thérapeutiques. — Agitation, Insomnies, Convulsions, Troubles névropathiques, Epilepsie, etc.

G. ASSOCIÉ. — *Cachets.*

Composition. — Tartrate borico-potassique, 1 gr. Pyényléthyl-malonylurée, 0,05 ; correctif, par cachets.

Solution. Prix : 14 fr. 50.

Cachets. Prix : 20 fr. 50.

Médication d'attaque.

Après effet obtenu, substituer le *Neurobore pur*.

Laboratoire E. BOUTEILLE

23, rue des Moines — PARIS (XVII^e).

NEUROCALCIUM

Sirop antispasmodique de l'enfance.

Composition. — Associe aux vertus sédatives connues depuis longtemps du bromure de calcium, les qualités antispasmodiques plus récemment mises en évidence du chlorure de calcium.

Indications. — Tous les syndromes nerveux, spasmodie, troubles de la dentition, convulsions, insomnies, cris, terreurs nocturnes.

Formule. — Chlorure de calcium : 0 gr. 20 par cuillerée à café. Bromure de calcium : 0 gr. 05 par cuillerée à café.

Posologie :

Nourrissons : 2 cuillerées à café par jour et jusqu'à 6 cuillerées à café en cas d'accidents aigus.

Après un an : 2 à 5 cuillerées à dessert par jour.

Prix de vente : 10 francs.

Laboratoires Biologiques de l'Île de France.

19, avenue d'Orléans — PARIS (XIV^e).

NEUROFLORINE

Sédatif Nervin.

Antispasmodique, Cardiotonique.

Présentation. — Solution et Comprimés.

Composition. — Synergie phytothérapique non toxique de : Passiflore, Valériane stabilisée, Saule, Cypripedium, Crataegus.

Avantages. — Sédatif puissant inoffensif et sans accoutumance ; véritable régulateur du système nerveux. *Il redonne la stabilité.*

Inodore.

Tolérance parfaite des voies digestives, du foie et des reins.

Sans dépression secondaire. Aucune contre-indication.

Indications. — Nervosisme, Etats spasmodiques et anxieux, Insomnies.

Posologie. — *Dose sédatif* : 1 à 2 cuillerées à café ou 2 à 4 comprimés à chaque repas dans un peu d'eau.

Dose hypnotique : 2 à 3 cuillerées à café ou 4 à 6 comprimés en une seule fois dans une infusion chaude, une heure avant le coucher.

Prix : 14 francs.

Laboratoires CROSNIER

44, rue de Lagny — MONTREUIL-PARIS.

NEUROPOL

Composition. — Glycérophosphate de Calcium, Fer et Magnésie associés au Nucléinate de Manganèse et à des extraits opothérapiques nécessaires pour assurer la fixation des éléments minéraux et rétablir le jeu normal des fonctions endocriniennes.

Propriétés thérapeutiques. — Tonique, reconstituant protecteur de la cellule nerveuse. Mordance du tissu nerveux, lors des traitements hydrargyriques, bismuthiques et arsenicaux.

Présentation. — Comprimés solubles.

Deux formes :

Sexe masculin (testicule), — Sexe féminin (ovaire).

Indications. — Toutes les dépressions, déminéralisation, maladies nerveuses, impuissance, amenorrhée, rachitisme, pré-tuberculose, frigidité, tétanie.

Doses. — 3 à 9 comprimés par jour.

Laboratoire R. FAURE

83, boulevard de la Villette PARIS.

Échantillons sur demande :

Société d'Expansion Thérapeutique

46, faubourg du Temple — PARIS (XI^e).

NEUROSINE PRUNIER

(*Phospho-Glycérate de Chaux, Procédé G. Prunier*).

Propriétés thérapeutiques. — Reconstituant du Système nerveux et tonique général.

Mode de présentation. — La « Neurosine Prunier » est présentée sous trois formes : granulé, cachets, sirop.

Indications. — Neurasthénie, Phosphaturie, Rachitisme, Débilité, Surmenage, Prétuberculose, etc.

Posologie. — 2 à 3 cuillerées à café par jour de granulé ; 2 à 3 cachets par jour ; 2 à 3 cuillerées à bouche par jour de sirop. Chaque cuillerée à café de granulé, chaque cachet et chaque cuillerée à bouche de sirop contiennent 0 gr. 30 de Glycérophosphate de chaux (Procédé G. Prunier).

Dépositaires généraux :

CHASSAING, LE COQ et C^{ie}

(Anc. Maison Chassaing-Prunier)

1, quai Aulagnier — ASNIÈRES (Seine).

NEUROTENSYL

Traitement rationnel des affections du sympathique.

Composition :

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Chlorhydr. de Papavérine | 0 gr. 005 |
| Sulfate de Spartéine | 0 gr. 01 |
| Extrait de Gui..... | 0 gr. 05 |
| Extrait de Crataegus..... | 0 gr. 05 |
| Anémone pulvérisée. | 0 gr. 02 |

Présentation. — Comprimés dragéifiés.

Indications. — Bouffées congestives, vertiges, insomnies tenaces, émotivité, hyperexcitabilité, angoisse, hypertension, troubles cardio-vasculaires, arythmie ; en un mot : toutes les manifestations relevant du déséquilibre du système vago-sympathique.

Mode d'emploi. — Prendre avec un peu d'eau, sans croquer, 2 à 3 comprimés avant chacun des principaux repas.

Prix : le tube de 60 comprimés : 18 francs.

Laboratoires du NEUROTENSYL

72, boulevard Davout — PARIS (XX^e).

NEUROTROPHOL BYLA

Elixir, Granulé, Dragées.

A base de nucléorquine Byla, d'acide nucléinique, et de glycérophosphate de soude.

Doses et mode d'emploi. — *Elixir* : 1 verre à liqueur pour les adultes ; 1 cuillerée à dessert ou à café pour les enfants.

Granulé : 1 cuillerée à bouche pour les adultes ; 1 cuillerée à café pour les enfants. *Dragées* : Adultes : 4 à 8. Enfants : 2 à 4 par jour. Après chaque principal repas.

Propriétés thérapeutiques. — Tonique neuromusculaire. Excitant de la nutrition. Indiqué dans tous les états de fatigues ou d'épuisement, l'anémie, le paludisme, les convalescences, etc.

Indications. — Neurasthénie, Surmenage, Dépression, Sénilité, Asthénie musculaire, Epuisement, Psychoses génitales, Chlorose.

Prix : 18 francs.

Les Établissements BYLA

26, avenue de l'Observatoire — PARIS.

NEUROVAROL

Traitement de l'**Insuffisance ovarienne** et de ses **troubles secondaires** (excitabilité nerveuse, états congestifs, etc.).

Chaque cachet contient :

| | | | |
|---|---|-------------------------------------|------------|
| 1 comprimé lc... | { | Thyroïde..... | 0 gr. 0025 |
| | | Ovaire. | 0 gr. 10 |
| | | Ext. valériane stabilisée Dausse .. | 0 gr. 10 |
| Poudres végétales à propriétés vaso-constrictives.. | { | Hydrastis. | 0 gr. 10 |
| | | Gossypium. | 0 gr. 10 |
| | | Viburnum..... | 0 gr. 10 |
| | | Hamamélis. | 0 gr. 30 |

Posologie. — 1° Troubles par hypo-fonction ovarienne, 1 à 2 cachets par jour.

2° Ménopause physiologique ou opératoire, 1 à 2 cachets par jour pendant 20 jours.

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle des Médicaments sous le n° 233-1.

Prix : 16 francs.

Laboratoires DOUETTEAU frères

20, Faubourg-Saint-Honoré — PARIS (8°).

NEUSÉDA

Calmant du cœur.

Calmant du sympathique.

| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Chlorhydrate de papavérine | 0 gr. 006 |
| Phényl-éthyl-malonylurée | 0 gr. 004 |
| Bromhydrate de quinine | 0 gr. 033 |
| Anémone pulsatile pulvérisée | 0 gr. 040 |
| Extrait d'aubépine | 0 gr. 006 |
| Excipient | Q. S. p. 1 comprimé kératinisé |

Dose moyenne. — 3 à 4 comprimés par 24 heures.

Indications. — *Algies et troubles cardiaques* : 4 à 9 comprimés en 2 ou 3 fois dans un peu d'eau. Déséquilibre vago-sympathique, *Anxiétés* et troubles nerveux, troubles d'hypertension (vertiges), etc... : 1 comprimé toutes les 2 heures.

Spasmes, Douleurs, Coliques (intestinale, rénale, hépatique, ovarienne) : 1 comprimé toutes les demi-heures.

Excitations nocturnes de la blennorrhagie : 2 à 4 comprimés au repas du soir.

Prix : 18 fr. 50.

Durée du flacon en moyenne : 10 à 12 jours.

A. LYONS, Pharmacien.

30, rue Monge — PARIS (V^e).

NÉVORAL RAFEY

Le NÉVORAL est parfaitement toléré par les estomacs délicats ; c'est en même temps un fortifiant, un tonique et un fébrifuge. Il ne contient aucun composé ou dérivé de l'opium, ni aucun hypnotique. Les actions des divers produits pharmaceutiques qui le composent se multipliant l'une par l'autre lui donnent un pouvoir thérapeutique considérable, quelles que soient l'origine et la cause de la douleur.

Indications thérapeutiques. — Névralgies, Rhumatismes, Migraines, Maux de tête et de dents, Courbatures, Fièvre grippale, Sciatique, Lumbago, Zona.

Le NÉVORAL supprime la douleur, tandis que d'autres médicaments ne font que l'endormir.

Dose et mode d'emploi. — Adultes, 1, 2 ou 3 cachets par jour. Si 1 cachet n'a pas suffi, en prendre un second 1 heure après le premier. Enfants, le 1/4, le 1/3 ou la moitié du contenu d'un cachet à prendre dans un liquide sucré, de la confiture ou du miel.

La boîte de 12 cachets : 9 francs.

Dépôt général :

Laboratoires RAFEY

Raoul FEIGNOUX, pharm. de 1^{re} classe
95, rue de Turenne — PARIS (III^e).

NÉVRALGOL BROSSARD

(Cachets).

Analgésiques — Antithermiques — Fébrifuges.

Indications. — Grippe — Toutes Névralgies : faciales, dentaires, stomacales, oculaires, intercostales, utérines, sciatiques — Rhumatismes — Migraines.

Doses et mode d'emploi. — Un à trois cachets par 24 heures pour les adultes.

Prix : 9 fr. la boîte de 12 cachets.

4 fr. 70 la boîte de 6 cachets.

0 fr. 80 le cachet.

Laboratoire CORNAUD et BROSSARD

1, rue des Cordouans — LA ROCHELLE.

Echantillons sur demande des Docteurs.

NEVROSAN

Sédatif du système nerveux.

Action élective sur le système *neuro-végétatif*.

Composition. — Teinture de Cratægus, Passiflore, Alcoolature de ballote.

Action. — L'action bien connue du Cratægus et de la Passiflore est renforcée par la Ballote (antispasmodique à action principalement sur l'irritabilité neuro-végétative).

Indications. — Insomnies nerveuses, Troubles nerveux de la vie génitale, Etats spasmodiques, Troubles fonctionnels du cœur, Psychoses fonctionnelles, etc.

Doses. — Action sédative : LX gouttes le soir au coucher. Action antispasmodique : XXX gouttes 3 fois par jour avant les repas, dans un verre à vin d'eau pure ou sucrée.

Pharmacie Centrale de Belgique. S. A

12, rue du Téléphone — BRUXELLES.

NÉVROSTHÉNINE FREYSSINGE

A base de Glycérophosphates cérébraux alcalins.

Forme. — Gouttes concentrées, sans sucre, chaux, alcool, arsenic, ni strychnine; 20 gouttes = 0,40 cgr. de glycérophosphate composé à base de soude, de potasse et de magnésie.

Dose. — XV à XX gouttes à chaque repas dans le premier verre de boisson, sans interruption nécessaire jusqu'à effet obtenu.

Propriétés. — Reconstituant rationnel par suite de sa composition qui est celle même des Tissus nerveux. Aucune contre-indication.

Indications. — Neurasthénie, Paralysie générale, Dépression et Fatigue nerveuses, Surmenage, Anémie cérébrale, Vertiges, Convalescence, etc.
Prix : 12 francs.

Laboratoire FREYSSINGE

6, rue Abel — PARIS.

NIGÉRINE VINCENT

Charbon médicinal de haut pouvoir adsorbant.

Fixateur par excellence des toxines
et alcaloïdes.

Forme. — Poudre noire sans odeur ni saveur.

Indications. — Diarrhées, gastro-entérites aiguës et chroniques, intoxications d'origine gastro-intestinale, empoisonnements.

Doses. — 3 cuillerées à café par jour entre les repas dans un peu d'eau. — Dans les empoisonnements, 3 fortes cuillerées à soupe en une ou plusieurs fois.

Prix : 15 francs.

VINCENT, pharmacien,

14, avenue Mac-Mahon — PARIS.

NISAMELINE **de TROUETTE-PERRET**

Préparation à base d'extrait de Guaco ; doit être employée « INTUS et EXTRA » — action physiologique, à l'intérieur sur les centres nerveux sensitifs et sur la sécrétion rénale ; à l'extérieur sur les terminaisons des nerfs de la sensibilité générale.

Indications. — Prurits, Dermatoses, Névralgies.

Traitement interne :

Pilules Nisaméline TROUETTE-PERRET (0 gr. 10 extrait de Guaco). 2 à 5 pilules à chacun des deux repas. Prix : 16 fr.

Sirop Nisaméline TROUETTE-PERRET (0 gr. 20 extrait de Guaco). 1 à 2 cuillerées à soupe à chacun des deux repas. Prix au public : 20 fr.

Traitement externe :

Poudre Nisaméline TROUETTE-PERRET. 1/2 flacons ou 1 flacon, pour un grand bain. — 1 à 4 cuillerées à café pour 1/2 litre d'eau froide ou tiède, pour lotions, compresses, etc. Prix : 16 fr.

Pommade Nisaméline TROUETTE-PERRET. Prix : 10 fr.
En onctions pour prurits et dermatoses localisés.

Savon Nisaméline TROUETTE-PERRET. Prix : 5 fr.

Pour lavages et soins hygiéniques,

Bien spécifier : **NISAMÉLINE**
« **TROUETTE-PERRET** » pour avoir le véritable Guaco.

Laboratoires TROUETTE-PERRET

61, avenue Philippe Auguste — PARIS (XI^e).

NITIUM

Bromure de radium suractivé enrichi
en rayonnement alpha.

Crayon. — Traitement des métrites chroniques et
hémorragiques. Curetage médical.

Ovules. — Vaginites, Ulcérations du col.

Pommades.

Pommade A : Dermatoses, Bartholinites, Chancres mou,
Lupus érythémateux, ulcérations diverses, ulcères
variqueux, herpès génital.

Pommade B : Ulcérations étendues et infectées, ulcères
variqueux rebelles.

**Pommade O (Pommade porphyrisée pour l'usage des
ophtalmologistes) :** Ulcères de la cornée.

Bougie : Urétrites chroniques.

Chaque crayon, ovule, bougie ou tube de pommade
contient 6 microgrammes de bromure de radium
suractivé.

Frix de vente au public :

Crayon, ovule, bougie, pommade : 25 fr.

étui de 3 crayons, 3 ovules, 3 bougies : 70 fr.

Société Générale d'Applications Thérapeutiques
THERAPLIX

R. MOREUX, Pharmacien

Ancien interne des hôpitaux

98, rue de Sèvres — PARIS (VII^e).

NITROYL LEISYN COMPRIMÉS

Formuler 2 ou 3 comprimés au commencement de chaque repas, soit
6 à 9 comprimés par jour pendant au moins 3 semaines. Commencer
par les comprimés jaunes ; prendre ensuite les comprimés roses.

Indications. — Rhumatismes aigus et chroniques, articulaires et muscu-
laires, ankylose, arthrite, sciatiques, toutes les manifestations de l'ar-
thritisme aigu et chronique.

Action. — Dissolvant et éliminateur nucléinique extrêmement rapide et
puissant de l'acide urique, des urates et oxalates. Paraît éliminer envi-
ron 8 fois son poids en principe actif, d'acide urique. Modifica-
teur profond et rapide du terrain.

Composition. — Dérivés nucléiniques, synchroniques, phénoliques,
en symbiose synergique combinée avec diurétiques.

Aucune toxicité ni contre-indication.

Échantillonnage. — Le prix de revient très élevé de ce médicament ne
permet pas l'échantillonnage.

Les Laboratoires LEISYN

1 bis, rue Molitor — PARIS (XVI^e).

Téléphone : Auteuil 14-73. — C. C. postaux : PARIS 1075-98.

Adresse télégraphique : LABOLEISYN-PARIS.

NITROÏL LEISYN INJECTABLE

Formuler : 1 boîte ampoules **NITROÏL LEISYN** injectable ou bien 1 boîte ampoules **PYRO-NITROÏL LEISYN** injectable.

L'activité pharmacodynamique du **NITROÏL LEISYN** étant évaluée à 10, celle du **PYRO-NITROÏL LEISYN** peut être évaluée à 3.

La conservation des ampoules de **NITROÏL LEISYN**, préparé à très basses températures, est beaucoup plus longue que celle du **PYRO-NITROÏL LEISYN**, préparé à chaud.

Mode d'emploi. — Ampoules de 1 cc. pour injections hypodermiques ou intra-musculaires en nombre proportionné au volume des articulations :

| | |
|------------------------------|--------|
| Hanche, creux cotyloïde..... | 4 à 6 |
| Epaule, genou, malléole..... | 4 ou 5 |
| Coude, poignet | 3 |
| Phalange | 1 ou 2 |
| Sciatique..... | 7 à 12 |

Chaque injection est de 1 ampoule entière. On injectera donc, par exemple, 4 à 6 ampoules divisées en 4 à 6 points différents, à la même séance, dans une arthrite de la rotule.

Espacer les séances de 48 heures, 3 ou 4 séances sont habituellement suffisantes.

Plonger les ampoules dans l'eau chaude et les secouer vigoureusement avant de remplir la seringue.

Indications. — Rhumatismes aigus, subaigus et chroniques, articulaires et musculaires, ankyloses, arthrites⁴ sciatiques, lumbagos, névralgies faciales, etc... etc...

Action. — Médicament à effets immédiats, même dans les cas anciens. Amène la disparition extrêmement rapide de la douleur et des phénomènes morbides ainsi que la réapparition de la liberté des mouvements.

Composition. — Symbiose de sels de terres rares activée électriquement par procédé EVOO, Yttrium, Samarium activés.

Innocuité absolue. Aucune contre-indication. Non toxique. Communications à la Société de Biologie et à l'Académie de Médecine.

Les Laboratoires LEISYN

1 bis, rue Molitor, — PARIS (XVI^e).

Téléphone : Auteuil 14-73. C. C. postaux : PARIS 1075-98
Adresse télégraphique : LABOLEISYN-PARIS.

NOCTISEDYL

Spécifique de l'insomnie relevant de la douleur ou d'un état nerveux.

Composition. — Pyramidon, Valériane, Anémone, Diéthylmalonylurée (0 gr. 25) Théobromine.

(Procédé spécial de conservation)

Avantages. — Synergie atoxique très active. La théobromine assure l'élimination naturelle de l'hypnogène et respecte le rein.

Posologie. — 1 à 2 cachets au coucher, avec une infusion.

La boîte de 12 cachets : Prix : 12 francs.

La demi-boîte : Prix : 6 fr. 50

P. AUGIER, pharmacien.

2, rue des Lombards — PARIS (IV^e).

Tél. : Archives 09-04.

NOPIRINE VICARIO

Aspirine Phénédine caféinée.

Action antinévralgique plus rapide et plus durable que l'Aspirine.

Mode d'emploi. — Comprimés : 2 à 3 par jour. Granulés : 2 à 3 cuillerées à café par jour.

Indications. — Névralgies rhumatismales. Migraines arthritiques. Céphalées des neurasthéniques. Grippe, etc.

Le tube : 4 francs.

Laboratoires VICARIO

17, boulevard Haussmann — PARIS (IX^e)

NORMACOL

Mucilage Évacuant

puissant, facile à ingérer, actif.

Possède toutes les propriétés à exiger d'un mucilage thérapeutique : pureté, pouvoir de gonflement considérable, infermentescible, inassimilable, extrême division (les grains restant indépendants même après gonflement), ingestion facile, presque agréable.

Action. — Laxatif mécanique.

Augmente le volume du contenu intestinal.

S'oppose à sa dessiccation excessive.

Rend sa surface onctueuse et glissante.

Forme. — Granulé dragéifié très menu.

Dose (moyenne). — 1 à 2 cuillerées à café après les repas.

Différentes préparations :

Normacol (ordinaire) : avec bourdaine (constipés habituels).

Normacol pur : sans bourdaine (entéritiques, diarrhéiques).

Normacol sans sucre : avec bourdaine (diabétiques).

Normacol atropiné : Voir SPASMACOL.

Prix { Ordinaire-spécial : 13 francs.
 { Sans sucre-atropiné : 16 francs.

Laboratoires NORGAN

Pierre ALEXANDRE, Pharmacien.

41, rue de Rome — PARIS (VIII^e). Tél. Laborde 08-00.

NORMATENSOL BOURET

Composition

| | |
|----------------------------------|------------|
| Tartrate borico-potassique | 1 gramme. |
| Lactose..... | 3 grammes. |
| Mélange sucro-édulcorant | Q. S. |

pour un paquet.

Effets physiologiques. — Par le Bore agit sur la thyroïde (Loeper) et libère la sécrétion interne de cette glande hypotensive (De Cyon), est diurétique et débarrasse l'organisme des produits de déchet. Par le Potassium il a des effets modérateurs sur le myocarde et les fibres lisses des vaisseaux (Claude Bernard).

Indications. — Hypertension artérielle, Néphrites chroniques, Céphalées persistantes, Dermatoses dues à une insuffisance de l'épuration urinaire.

Avantages. — Pas de toxicité, pas de contre-indication, parfaitement toléré par le tube digestif.

Mode d'emploi. — 1 paquet le matin à jeun et 1 le soir en se couchant, dans 1/2 verre d'eau froide ou tiède, 12 jours par mois ou 2 périodes de 6 jours.

Prix au public : 12 fr.

Pharmacie CHAUMEL

87, rue Lafayette — PARIS (IX^e).

NORMOGASTRYL

Tous dyspeptiques et aérophages.

Formule :

| | |
|--|-------------------|
| Bicarbonate de soude..... | 0 gr. 60 |
| Sulfate de soude sec..... | 0 gr. 285 |
| Phosphate de soude sec..... | 0 gr. 195 |
| Bromure de sodium desséché..... | 0 gr. 25 |
| Acide citrique q. s. pour 1 comprimé effervescent de 2 gr. | |
| 5 tubes de 10 comprimés de 2 gr. | Prix : 15 francs. |

Particularités. — Présence de bromure de Sodium sédatif de l'aérophagie et de l'état général.

En une solution agréable au goût, le dyspeptique trouve l'activation de ses digestions et la disparition de son aérophagie, s'il la prend avant le repas (dégagement de citrate de soude) ; une sédation de ses brûlures et malaises s'il la prend après, dans 1/2 verre d'eau.

Emploi. — 1 comprimé avant les repas (hyposthéniques, aérophages) ou après ceux-ci (hypersthéniques) dans 1/2 verre d'eau, matin midi et soir.

Indications. — Dyspepsies, Gastralgies, Hyperacidité. Hypoacidité. Aérophagie. Hépatisme.

Laboratoires de la PELVIFORMINE
(Spécifique urinaire total.)

J. OLIVE

14, rue des Minimes — PARIS
O. C. P. Toutes Drogueries et Pharmacies.

NOVACÉTINE PRUNIER

(Saccharure granulé à base de Sulfosalicylate de Pipérazine, Lithine et Soude).

Antiarthritique énergique
agréable à prendre.

Indiqué contre les manifestations rhumatismales et gouteuses de l'arthritisme.

Posologie. — 3 à 4 cuillerées à café par jour (suivant les cas et l'avis du médecin), à prendre au moment des repas, dissoutes dans un peu d'eau.

Chaque cuillerée à café contient 0 gr. 30 de sulfosalicylate composé.

Dépositaires généraux :

CHASSAING, LE COQ et C^{ie}

(Ancienne maison Chassaing-Prunier)
1, quai Aulagnier — ASNIÈRES (Seine).

NOVARGYRE

Ampoules Guillaumin
à l'oxycyanure d'hydrargyre indolores

Composition. — Les ampoules de Novargyre contiennent : Oxycyanure d'hydrargyre : 1 centigr. ; Stovaïne : 1 centigr. : Eau distillée : 1 cm. cube.

Propriétés. — Solution très stable, rigoureusement dosée, neutre, indolore, ne coagulant pas les albuminoïdes, d'une action très prompte et très sûre.

Indications. — Accidents syphilitiques.

Mode d'emploi. — Injections intramusculaires tous les 2 jours de 1 à 2 cc. selon l'intensité de la maladie ou la susceptibilité du sujet. Faire 8 à 12 injections et laisser reposer le malade pendant 1 ou 2 semaines. Renouveler ensuite le traitement s'il est nécessaire.

Prix : 15 francs.

Laboratoires ANDRÉ GUILLAUMIN

13, rue du Cherche-Midi — PARIS.

NOVARSÉNOBENZOL BILLON

Dioxy-diamino-arsénobenzène méthylène-
sulfoxylate de sodium.

Teneur en arsenic : 20 p. 100.

Donne avec l'eau distillée des solutions *neutres* injectables exclusivement par voie veineuse.

Indications :

Syphilis, Symbioses fuso-spirillaires, Pian, Protozooses, Charbon, Sodoku.

Présentation : Ampoules unitaires de 0 gr. 15, 0 gr. 30, 0 gr. 45, 0 gr. 60, 0 gr. 75, 0 gr. 90.

Posologie et mode d'emploi. — Séries d'injections intra-veineuses graduées : 0 gr. 15 à 0 gr. 90. Applications en poudre ou collutoire comme topique local.

Le **Novarsénobenzol Billon** est contrôlé biologiquement par rapport au Standard de la Société des Nations.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône
21, rue Jean Goujon — PARIS (VIII^e).

NOVATROPINE

Bromométhylate d'Homatropine.

Indications. — Hyperpepsies, ulcères gastro-duodénaux, sueurs des tuberculeux, sialorrhée, bronchorrhée, arythmie, angine de poitrine, spasmes des vaisseaux périphériques, dystonie vagale, vomissements des nourrissons.

Propriétés thérapeutiques. — Toutes celles de l'atropine : antispasmodique, hypocrinique, inhibant du vague.

Avantages. — 50 fois moins toxique que l'atropine, à effet thérapeutique identique. Respecte le système nerveux central.

Formes et prix :

Tubes de 20 comprimés à 0 gr. 0025 : 15 francs.

Boîtes de 5 ampoules de 1 cc (0 gr. 0025) : 18 francs.

Posologie :

1 à 2 comprimés 3 fois par jour avant les repas.

1 à 3 ampoules par jour en injection sous-cutanée. En cas d'urgence, 1/2 à 1 ampoule en intra-veineuse.

Laboratoire R. L. MATHIVAT

66, rue de la Pompe — PARIS (XVI^e)

Tél. : Trocadéro 32-91.

NOVO-BROL

Bouillon bromuré en tablettes, avec addition de lupulin et de phosphates.
(Bromure non spécifié.)

Préparation et marque absolument françaises.

Le Novo-Brol est le seul produit utilisant les remarquables vertus calmantes du lupulin (extr. du houblon) associé au bromure (A.-C. Guillaume et H. Leclerc).

Les phosphates du Novo-Brol entretiennent l'élément nutritif du noyau cellulaire, toujours déphosphatisé chez les névropathes.

Indications. — Hyperexcitabilité morale ou physique, crises nerveuses et syndrome sympathicotonique.

Mode d'emploi et dose. — Ecraser les tablettes de Novo-Brol dans une tasse d'eau bouillante pour obtenir un bouillon que l'on absorbe bien chaud, tel quel, ou mélangé à l'alimentation habituelle. Na Br chim. pur desséché 1 gr. par tablette.

Dose normale : 1 à 3 tablettes par jour. — Dose forte : 3 à 6 tablettes par jour. — *Enfants nerveux* : 1/2 à 2 tablettes (suivant l'âge).

(Enveloppage spécial des tablettes Novo-Brol dans aluminium ou étain paraffiné — dépôt de garantie.)

Prix : 16 francs.

Admis aux Assurances Sociales.

Laboratoires A. DANIEL-BRUNET

62, Bd Jean-Jaurès. — BOULOGNE-SUR-SEINE

Tél. : Auteuil 11-86. — Paris-Ouest.

NOVOLACTOL DAGUIN

Forme. — Granulé agréable pour les enfants.

Composition. — Papaine extractive, Benzo-naphtol, Ferments lactiques, Magnésie hydratée.

Dose. — *Nourrissons* : 3 demi-cuillerées à café délayées dans un peu d'eau dans l'intervalle des tétées.

Enfants de 2 à 3 ans : 3 cuillerées à café dans l'intervalle des repas.

Enfants de 5 à 12 ans : 3 cuillerées à dessert.

Indications. — Affections gastro-intestinales et gastro-entérites des nourrissons. Intoxication alimentaire.

Prix : 12 francs.

Etablissements DAGUIN

SAINT-MAUR (Seine).

NOVOLUG

Elixir.

Composition :

| | |
|---|--------------------|
| Arrhénal | 0,01 |
| Hydrarogyrophenoldisulfonate de soude (hermophényl) | 0,20 |
| Sirop aromatisé à la groseille framboisée | Q. S. pour 100 gr. |

Indications. — Traitement arséno-mercuriel dissimulé

Dose :

| | |
|------------------|--------------------------------|
| <i>Adultes</i> : | 2 cuillerées à soupe par jour. |
| 3 à 6 ans : | 2 cuillerées à café par jour. |
| 6 à 14 ans : | 2 cuillerées à café par jour. |
| 14 à 20 ans : | 2 cuillerées à café par jour. |

Observation importante. — Produit au goût très agréable. Etiquette discrète présentant le produit comme tonique, dépuratif et reconstituant.

Prix : 18 francs.

Concessionnaires : Les Laboratoires NOVALIS
OULLINS (Rhône).

NUCLÉARSITOL ROBIN

Association de la combinaison nucléo-phosphatée avec le méthylarsinate de soude, nucléophosphate de chaux et de soude méthylarsiné.

Granulé. Comprimés. Ampoules injectables.

Doses et mode d'emploi. — Adultes : 4 à 6 cuillers mesures, 4 à 6 comprimés ou 1 à 2 injections hypodermiques par 24 heures.

Propriétés thérapeutiques. — Antituberculeux. Reconstituant puissant.

Indications. — Cachexie des pays chauds, fièvres paludéennes, syphilis, tuberculose, scrofule, lymphatisme.

Prix: *Granulé* : 15 francs.

Comprimés : 16 fr. 50. — *Ampoules* : 18 francs.

Laboratoires ROBIN

13, rue de Poissy — PARIS.

NUCLÉASINE

Composition. — Iode, Phosphore, Arsenic organique directement assimilables. Extrait hépatique, Vitamine.

Propriétés. — Excitant du métabolisme général. Reconstituant puissant.

Indications. — Croissance, Amaigrissement, Anémie, Dépression nerveuse, Surmenage, Fatigabilité.

Doses. — Une cuillerée à café à la fin des repas.

Le flacon de granulé : 16 francs.

Laboratoire E. VERGELOT

163, rue de Flandre — PARIS (XIX^e).

Enregistré au Laboratoire national des médicaments sous le n^o 997-17.

NUCLÉATOL ROBIN

Combinaison de glycérophosphates
et d'acide nucléinique.

Granulé : glycérophosphate de chaux et de soude
et acide nucléinique. — **Injectable :** glycérophos-
phate de soude pur et acide nucléinique.

Doses et mode d'emploi. — *Adultes :* 4 à 6 cuil-
lerées-mesures de granulé aux repas ou 1 ou
2 ampoules en injection par 24 heures.

Propriétés thérapeutiques. — Exaltant de la
Phagocytose, abaisse la température en quelques
heures. Effets analogues à ceux des ferments
métalliques ou des colloïdes.

Indications. — S'emploie dans les convalescences,
les débilités, les cachexies ; provoque la défer-
vescence dans les fièvres infectieuses, puerpé-
rales, érysipèles, typhoïdes, etc. ; s'emploie aussi
préventivement dans les opérations chirurgicales.

Prix : *Granulé :* 15 francs. — *Ampoules :* 18 francs.

Laboratoires ROBIN

13, rue de Poissy — PARIS.

NUCLÉIGÈNE

Puissant reconstituant général.

Granulé irradié. — Ergostérine irra-
diée, Nucléinates Soude et Manga-
nèse, Glycéro de chaux, Arrhénal,
Ext. de Kola et vanille ; 2 à 4 cuil-
lerées à café par jour.

Prix : 18 francs.

Prescrire : Nucléigène irradié granulé.

Indications. — Prétuberculose, Tu-
berculose, Rachitisme, Anémies.

Laboratoire CHEVILLON

99, rue de Paris — MASSY (Seine-et-
Oise).

NUCLÉOCARDYL

Médication spécifique de l'angine de poitrine.
Toni-cardiaque et Hypotensive.

Composition. — NUCLÉOSIDES VASO-MOTRICES,
Chlorophylle spéciale, Extraits de cœur et d'aorte,
Chlorure de calcium.

Propriétés thérapeutiques. — Action vaso-dilatatrice,
toni-cardiaque, hypotensive, diurétique et eupnéique.

Mode de présentation. — Comprimés dragéifiés.

Indications. — Artério-sclérose, Hypertension, Angine
de poitrine, Asystolie compensée, Œdèmes circula-
toires, etc., Maladies infectieuses, Pneumonies, Rhu-
matismes.

Posologie :

Traitement d'attaque : 4 à 6 comprimés par jour.

Traitement d'entretien : 2 à 4 comprimés par jour.

Prix : 18 francs.

Laboratoire DEFFARGE

Docteur en Pharmacie

2, rue Lauzac — BORDEAUX

NUCLÉOPHORÉNE

Reconstituant, Accélérateur de la Nutrition.

Composition. — Nucléinate de soude, Phos-
phate disodique, Méthylarsinate Na, Maté,
Kola, Essence spéciale.

Indications. — Neurasthénie, Lymphatisme,
Bronchites chroniques, Convalescence de
Grippe et de Maladies infectieuses.

Formes. — Elixir.

Doses :

Adultes : 2 cuillerées à soupe par jour.

Enfants : 2 cuillerées à café par jour.

Prix : 16 francs.

Laboratoire Moderne

d'Opothérapie et Biologie Médicale

40, rue Claire-Paulhac — TOULOUSE.

NUCLERGOL

Granulé à base de Manganèse, Phytines, Lipides spléniques, Carotènes (Vitamines A), Oxalate de fer.

Reconstituant général des forces physiques et du système nerveux, Chlorose, Asthénie, Convalescence, Dénutrition, Troubles de la croissance.

Posologie :

Adultes : 1 cuillerée à dessert au début de chaque repas.

Enfants : à partir de huit ans, une cuillerée à café.

Prix : 18 francs.

Dépôt général :

Laboratoires UNIS-SPÈS

14, rue Demarquay — PARIS (Xe).

NUJOL

Huile de paraffine.

Description. — Le NUJOL est une huile de vaseline parfaite, incolore, inodore et sans goût, possédant un degré exactement défini de viscosité et de densité.

CRÈME DE NUJOL

Émulsion.

Description. — La Crème de Nujol est une émulsion d'un blanc très pur et d'un goût agréable, à base de Nujol, dont elle possède les propriétés thérapeutiques. Ne contient pas de sucre ; convient aux diabétiques. Est recommandé pour les enfants et toute personne acceptant difficilement l'huile de paraffine pure.

Indications. — Traitement de la constipation.

Dépôt Général :

**Société Générale
d'Applications Thérapeutiques**

THERAPLIX

98, rue de Sèvres — PARIS (VII^e).

NUPHOS

Puissant reconstituant de la cellule nerveuse et de l'état général.

Sirop sous 3 formes thérapeutiques :

A. *Adultes* : 1 cuillerée à soupe au repas de midi.

B. *Enfants et adolescents* : 1 cuillerée à café au repas de midi.

C. Sans strychnine. { *Adultes* : 2 cuillerées à soupe par jour.
 { *Enfants* : 2 cuillerées à dessert par jour.
 { *Bébés* : 1 à 2 cuillerées à café par jour.

Composition. — Phosphate de soude, Acide phosphorique, catalysés par un sel de manganèse, édulcorés de façon agréable ; strychninés à dose très active dans les formes A et B.

Indications thérapeutiques. — Anémies, Reconstituant. — Asthénies ; Reminéralisant. — Anorexies ; Réconfortant. — Aliment de la cellule cérébrale. — Hausse rapide du potentiel travail.

Prix : 20 francs.

Laboratoires de Pharmacodynamie,
E. POINSIER,
 à MERU (Oise).

NUTROMALT

Composition. — Maltose 30 %, Dextrines 67 %, Chlorure de Sodium 1 %, H²O 2 %.
 Sucre nutritif ne fermentant pas dans l'intestin. Complément indispensable du lait de vache dans l'allaitement artificiel.

Forme. — Poudre.

Indications. — Affections gastro-intestinales, selles acides et diarrhéiques des nourrissons et des enfants.

Doses. — Nourrissons de 1 mois : 4 1/2 cuillerées à café par 2-3 décilitres de lait.
 Doses variables suivant l'âge.

Établissements **WANDER**
 CHAMPIGNY (Seine).

OCRÉINE GRÉMY

Traitement des insuffisances ovariennes de la puberté à la ménopause.

Formule : Chaque pilule correspond à 0^{gr.}, 20 de corps jaune frais.

Existe sous 3 formes pharmaceutiques.

Pilules : 4 à 6 par jour.

Gouttes : 30 à 50 par jour dans un peu d'eau.

Ampoules : 1 injection intramusculaire tous les 2 jours pendant la période du traitement.

Indications :

Permet de réaliser, en association avec la **Follestrine Grémy** (Voir à ce nom) le cycle ovarien normal chez les ménopausiques.

Règles rares, peu abondantes, douloureuses, bouffées de chaleur, migraine, obésité, rhumatisme de la ménopause, acrocyanose et toutes les manifestations de l'insuffisance ovarienne.

Prix : *Pilules-Gouttes* : 20 francs.

Ampoules : 25 francs.

14, rue de Clichy — PARIS (IX^e).

ODARSOL

Opiat dentifrice antispérochétosique, contenant 0 gr. 50 p. 100 de Sulfo-Tréparsénan, parfumé aux essences de menthe et de badiane.

Indications. — Préventif et curatif des infections buccales : Pyorrhée alvéolaire, polyarthrite alvéolo-dentaire, ulcérations buccales, amygdalites, angine de Vincent.

Peut être utilisé journellement pour l'hygiène dentaire.

Forme. — Tube de 35 grammes.

Laboratoires CLIN. — **COMAR et Cie.**
20, rue des Fossés Saint-Jacques — PARIS.

ŒNOPHOS

*Acidés hydro-éthylène-phosphoriques.
Reminéralisation phospho-dolomitique.*

Méthode des Professeurs DUBARD et VOISENET de Dijon.

Formes. — Elixir, granulé, gouttes.

Propriétés thérapeutiques. — Neurotonique, reconstituant énergétique : *fixateur électif* de la magnésie et de la chaux (voir fiche DOLOMA). Médication phosphorique rationnelle.

Indications. — Phosphaturie, neurasthénie, psychasthénies, surmenages physique et nerveux, cancers, tuberculose.

Doses et mode d'emploi. — *Adultes* : A chaque repas : 1 cuill. à soupe d'Elixir ou 2 cuill. à café de Granulé ou LX gouttes dans un demi-verre d'eau ou de vin léger sucré. *Enfants* : réduire les doses suivant l'âge. Pour la cure reminéralisante, voir « DOLOMA ».

| | |
|---------------------------------|--------|
| Prix: La boîte granulé Œnophos. | 15 fr. |
| Le flacon gouttes | 12 fr. |
| — élixir | 18 fr. |

Laboratoire général d'Études Biologiques
S. A., 29, place Bossuet — DIJON.
Téléphone : 16-42.

OËRÉLIODE

Iode de l'Otorhinolaryngologiste.

La plus active et la mieux tolérée des préparations iodées.

Solution huileuse d'Iode d'absolue pureté, *non combiné*, entièrement diffusible à froid.

Huile *violette*, neutre, indolore, non irritante.

Indications. — Rhinites, Affections catarrhales et inflammatoires du nez, Infections et congestions des muqueuses naso-pharyngées, du larynx, des amygdales, otites, otites mycosiques.

Echantillons gratuits sur demande.

Le flacon de 50 cc. Prix : 12 francs.

— 30 — — 9 fr. 25.

Laboratoire BOUVOT

AUVERS-SUR-OISE (S.-et-O.).

ŒSTROBROL « ROCHE »

Extrait de bouillon végétal concentré
achloruré et bromuré
associé à une solution de Folliculine.
titrée physiologiquement.

Tablettes — 1 tablette contient :

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| NaBr | 1 gramme. |
| Folliculine | 100 unités internationales. |

Mode d'emploi et doses. — 1 à 2 tablettes 2 fois par jour : matin et soir.

Dans une tasse d'eau très chaude, on fait dissoudre 1 ou 2 tablettes d'ŒSTROBROL « ROCHE » : on prépare ainsi un bouillon savoureux qu'il convient d'absorber le plus chaud possible.

Indications thérapeutiques. — Tous les troubles nerveux accompagnant une dysfonction ovarienne : Aménorrhée, Dysménorrhée et surtout Ménopause.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le numéro 504-62.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie.
10, rue Crillon — PARIS (IV^e).

OKAMINE

Solution stérilisée d'acides aminés du docteur
DANI HERVOUET, la seule préparée sous
sa direction et résumant ses recherches
de 1918 à 1934.

Formule :

Monométhylglycocolle 1 gr. 75
Monométhyl N Leucine gauche. 1 gr. 125
Solvant isotonique q. p. 100 cc.
En boîtes de 10 ampoules de 2 cc.

Prix : 45 francs.

Mode d'emploi. — Injection sous-cutanée
d'une ampoule en moyenne tous les 3 jours.

Indications. — Tuberculoses et toutes défi-
ciences organiques.

P. BLOUIN, Pharmacien

50, rue de Turenne.

Dépôt général :

DARRASSE Frères,

13, rue Pavée — PARIS.

OLBIA

Spécifique de la Syphilis.

Solution huileuse de Bismuth.
(Dicamphocarbonate de Bismuth).

Indications. — Syphilis et parasyphilis.

Formes :

- 1^o Ampoules de 2 cc. pour injections intra-musculaires
indolores.
2^o Ampoules de 1 cc., pour injections intra-musculaires
indolores.

Posologie :

Adultes : Injecter dans la région fessière une ampoule
de 2 cc. tous les 4 jours.

Enfants : Injecter dans la région fessière 1 ampoule de
1 cc. tous les 4 jours.

La boîte de 10 ampoules de 2 cc. : 22 fr. 50.

| | | | |
|---|----|---|----------------|
| — | 10 | — | 1 cc. : 15 fr. |
| — | 6 | — | 2 cc. : 12 fr. |
| — | 6 | — | 1 cc. : 8 fr. |

Établissements MOUNEYRAT

12, rue du Chemin-Vert

VILLENEUVE-LA-GARENNE, près Saint-Denis
(Seine).

OLCALAN

Composition :

Borate de soude, Huile d'Olive stérilisée,
Eau de chaux, Lanoline.

Trois présentations : OLCALAN SIMPLE,
OLCALAN SALICYLIQUE, OLCALAN
RESORCINE.

Tubes de pommade.

A employer dans toutes les irritations de l'é-
piderme : Eczémas, Brûlures, Rougeurs
des Nouveau-Nés, Prurit, etc...

Le tube : 6 fr.

Echantillons sur demande.

Laboratoires SERRE

7, place Pey Berland
BORDEAUX (Gironde).

OLÉOCHRYSINE LUMIÈRE

Chrysothérapie par voie intramusculaire. Traitement des
Tuberculoses, des Rhumatismes chroniques, des mala-
dies infectieuses, des dermatoses.

Imprègne l'organisme lentement, régulièrement, sans
interruption pendant 4 ou 5 jours.

Constitution. — Suspension huileuse d'aurothiopropar-
nol sulfonate de calcium.

Indications. — Au premier chef dans les tuberculoses
pulmonaires avec des succès particulièrement tangibles
à l'égard des poussées évolutives. Tuberculoses chro-
niques et tuberculoses externes, cutanées, osseuses,
laryngées, ganglionnaires. Dans les rhumatismes et
plus particulièrement la grande polyarthrite chronique
infectieuse. Enfin dans les maladies infectieuses di-
verses : Lèpre, syphilis et les dermatoses, Tubercu-
lides, psoriasis, on obtient des résultats inégalés dans
de telles affections par tout autre traitement chimique.

Présentation :

Ampoules dosées à 0 gr. 10 : 15 fr. ; 0 gr. 20 : 20 fr. ;
0 gr. 30 : 25 fr.

Laboratoires LUMIERE

45, rue Villon — LYON.

OLÉOCIDASE

ACIDE OLÉIQUE PAUL THIBAUT

Capsules dosées à 0 gr. 50 d'Acide Oléique pur, extrait de l'huile d'olive, procédé Paul Thibault, licencié ès sciences physiques, ancien président de la Société de pharmacie de Paris. Sous un volume très restreint l'*Acide Oléique Paul Thibault* réalise, avec effet rapide et constant, l'action toujours très lente et souvent incertaine attribuée à l'huile d'olive dans la désagrégation des calculs de cholestérine. La plus sûre méthode de drainage biliaire.

Indications. — Lithiase biliaire, Cholélithiasie, Cholécystites lithiasiques, Cholestérinémie, Ictères, Crises de Coliques hépatiques, Evacuation des calculs de Cholestérine par désagrégation.

Posologie. — 3 capsules le matin à jeun, 3 capsules dans le milieu de la journée et, si besoin, 3 capsules le soir dans un peu d'eau minérale bicarbonatée ou chlorurée sodique tiède (Vichy, Châtel-Guyon, Vals, etc.).

Nota. — Pour éviter l'emploi d'acides oléiques impurs, prescrire toujours : capsules d'*Oléocidase Paul Thibault*.

Prix : 15 francs.

Établissements SOUDAN

48, rue d'Alésia — PARIS (XIV^e).

Enregistré au Laboratoire National n° 218-9.

OLÉOFORMINE CORBIÈRE

Comprimés glutinisés et dragéifiés.

Composition :

| | |
|------------------------------|------|
| Acide cholique..... | 0,05 |
| Oléate de soude anhydre..... | 0,20 |
| Hexaméthylènetétramine..... | 0,25 |

Indications. — Lithiase biliaire, Coliques hépatiques, Cholécystite, Ictères, Cirrhoses, Insuffisance hépatique, Cholémie familiale.

Mode d'emploi. — Deux comprimés à avaler avec un peu d'eau, avant chacun des deux principaux repas, pendant 20 jours.

Présentation. — En boîtes aluminium de 40 comprimés. Prix : 12 francs.

Laboratoires pharmaceutiques CORBIÈRE

27, rue Desrenaudes — PARIS (XVII^e).

Téléphone : Carnot 78-11.

OLÉO-MEL

« LE LAXATIF DE RÉGIME »

Formule. — Huile de paraffine extra neutre à viscosité maxima et spéc. raffinée pour l'usage interne. } P. E.
— Miel surfin premier choix.

Indications. — L'association de ces deux substances réalise une synergie parfaite qui relève, pour le traitement de la **Constipation et des Affections gastro-intestinales**, de toutes les indications et de la posologie même de l'huile de paraffine. **Action mécanique. Innocuité absolue.**

Préparation. — L'Oléo-Mel, préparé par un procédé spécial, se présente sous forme d'une gelée homogène, absolument stable et inaltérable; il conserve tout l'arome et toute la saveur du miel, ce qui en fait une médication des plus agréables et des plus faciles à prendre.

Laxatif idéal des Enfants et des personnes délicates.

Prix : 10 francs.

Laboratoire DELFOUR

à **POUILLON** (Landes)

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments, sous le n° 246-1.

OLÉOPHÉDRINE BÉRAL

Huile d'Éphédra à 2 p. 100 d'éphédrine naturelle, à alcalinité atténuée, sans adjonction d'analgésique.

Pour instillations et pulvérisations nasales contre rhinites, sinusites, rhume des foins, coryzas, surdités catarrhales, céphalées sinusiennes, etc...

(Éphédriseur BÉRAL, pulvérisateur de poche : 20 francs).

Prescrire : **OLÉOPHÉDRINE BÉRAL**,
un flacon : 15 francs.

Laboratoires BÉRAL

194, rue de Rivoli — PARIS.

OLÉOVULES

**Seuls ovules à l'acide picrosalique
à la Rubacrine et au Sulfostérol.**

Action thérapeutique des composants :

Acide picrosalique : dérivé nitré voisin de l'acide picrique ayant une action kératoplastique et microbicide supérieure sans avoir aucun des inconvénients de l'acide picrique. — *L'acide picrosalique ne tache pas les téguments.*

La Rubacrine (rouge d'acridine) renforce puissamment ce pouvoir antiseptique (Thèse S. Lurié);

Le Sulfostérol est un cicatrisant et un décongestionnant de grande valeur.

Indications. — Infections de toute nature des voies génitales inférieures (Blennorragie après la phase aiguë, Infections streptococciques post-puerpérales, etc.). Principalement : Métrites, Cervicites, ulcérations et érosions du col, Vaginites.

Posologie. — 2 ou 3 ovules par semaine.

Mode d'emploi. — Mettre l'ovule le soir au coucher, si possible après une injection vaginale chaude ; le fixer avec un tampon de coton.

Pour les pays chauds, prescrire les *Oléovules G*, moins sensibles à l'action des températures élevées.

Les *Oléovules* sont couramment employés dans les services de gynécologie des hôpitaux.

Littérature. — Thèse de G. Donet ; Communication à la Société de gynécologie du 20 février 1933 ; Travaux de MM. Chéron, Vigneron, Thiéry, Fuchs, Fayot, de Manet, etc.

Prix : 15 francs la boîte de 6 *Oléovules*.

Echantillons et littérature :

Laboratoires SFÉAT

15, rue Catulienne — SAINT-DENIS (Seine).

OLÉTHYLE-BENZYLE

L'Oléthyle-Benzyle, qui sert à faire en France les premières études cliniques sur le Benzoate de Benzyle et permet son introduction dans la thérapeutique, est une présentation de Benzoate de Benzyle pur.

Propriétés physiologiques. — Antispasmodique et Hypotenseur dépourvu de tout pouvoir narcotique ne produisant aucun effet nocif sur le cœur, les reins, l'appareil respiratoire et le système nerveux.

Indications :

I. — Hypertension, Angine de Poitrine, Angio-Spasmes.

II. — Tous les états spasmodiques de la musculature lisse :

Spasmes bronchiques, asthme, coqueluche, hoquet persistant d'origine périphérique, péristaltisme exagéré de l'intestin (dysenterie, diarrhées, pylo-rospasme), coliques hépatiques, néphrétiques, intestinales, constipation spasmodique, spasmes de la vessie, dysménorrhées spasmodiques.

Présentation. — Gouttes et gélules.

L'Oléthyle-Benzyle Gouttes est une solution de Benzoate de Benzyle synthétique pur titré à 20 p. 100.

L'Oléthyle-Benzyle Gélules est la présentation de choix de ce produit permettant au malade d'avoir toujours sur lui en toutes circonstances son médicament dosé de façon précise (chaque gélule renferme 0,10 de Benzoate de Benzyle).

Posologie. — Oléthyle-Benzyle Gouttes, 20 à 30 gouttes trois ou quatre fois par jour, dans un peu de lait ou d'eau sucrée, de préférence au début ou au milieu des petits et grands repas.

Oléthyle-Benzyle Gélules 3 à 5 gélules par jour, espacées dans le courant de la journée, de préférence au début ou au milieu des petits et grands repas.

Prix :

Oléthyle-Benzyle gouttes : 13 francs.

Oléthyle-Benzyle gélules : 14 francs.

Laboratoire Central de Paris.

122, faubourg Saint-Honoré — PARIS

OLIPHÉDROL

Antisepsie des voies respiratoires

Sans menthol. Sans adrénaline. Sans cocaïne.

Formule. — Essences végétales antiseptiques, 4 + Camphre, 1 + Ephédrine naturelle, 0,5 + Stovaine, 0,1 — Huile végétale neutre purifiée Q. S. P. 100.

Indications. — Affections du Rhino-pharynx : Coryza, Rhume des foies, Rhinites sinusites, Ozène, Céphalées rhinogènes, etc.

Préservation des affections contagieuses. Grippe, Rougeole, Coqueluche, etc.

Propriétés, avantages. — Vaso-constricteur, sédatif, antiseptique, Sans menthol, ne contenant que des essences naturelles, l'OLIPHÉDROL peut être employé chez le nourrisson, chez l'enfant comme chez l'adulte.

Propre et pratique, sans odeur désagréable.

Présentation sous deux formes :

Solution. Flacon de 30 cc, avec compte-gouttes nasal.

Capsules. Boîte de 24 capsules pour nasa-instillation.

Prix : Les deux formes : 12 francs.

Mode d'emploi. — Plusieurs fois par jour, soit 6 à 8 gouttes, soit une capsule dans chaque narine.

Chez le nourrisson, demi-dose.

Laboratoires de l'OLIPHÉDROL

18, rue Daval — PARIS (II^e).

OLIRICYL HARDY

Ex-Oliricin.

Associe à l'huile de ricin et à l'huile d'olive saponifiées les propriétés cholagogues et laxatives de la bile dépigmentée et du soufre.

| | |
|--------------------------|-----------|
| Ricinate de soude..... | 0 gr. 025 |
| Oléate de soude..... | 0 gr. 05 |
| Bile dépigmentée..... | 0 gr. 03 |
| Soufre..... | 0 gr. 02 |
| Poudre de belladone..... | 0 gr. 015 |
| Excipient..... | Q. S. |

par comprimé dragéifié glutinisé, ne se décomposant pas dans l'estomac.

Laxatif cholagogue parfait : doux, régulier, sans accoutumance : ne contient aucun drastique dissimulé (scammonée, jalap) et surtout pas de phtaléine du phénol ni d'huile de croton.

Posologie. — 1 à 5 comprimés par jour avant ou après le repas, ou le soir avant de se coucher.

Prix : Le tube de 40 dragées : 12 francs.

Pour 15 à 20 jours de traitement normal.

Laboratoires PAUL HARDY

Docteur en Pharmacie,

Ancien interne des hôpitaux

42, bd Saint-Marcel — PARIS (V^e). Tél. : Gobelins 36-96,

OLISOL

Traitement des affections du nez et des voies respiratoires.

Composition. — *Essences antiseptiques végétales, Résorcine (1 p. 100), Huile d'olive.*

Formes. — Liquide et capsules.

Indications thérapeutiques. — *Rhinites, Sinusites, Coryza, Laryngites, Trachéites.*

Mode d'emploi. — Instillations et pulvérisations avec l'Olisol liquide. Auto-injections nasales avec les capsules.

Prix : *Flacon* petit modèle, 5 francs ; grand modèle, 9 francs
Capsules : 9 francs.

OLISOL ÉPHÉDRINÉ

Composition. — *Ephédrine (1 p. 100), Essences antiseptiques végétales, Huile d'olive.*

Mêmes formes, indications et mode d'emploi que pour l'OLISOL.

Prix : *Flacon* petit modèle : 6 francs ; grand modèle, 12 francs.
Capsules : 12 francs.

Laboratoires SAUBA
MONTREUIL — PARIS

OLIVÉOL

Olivéol pilules, 6 par jour.

Olivéol globules, 1 à 2 par jour.

Olivéol gouttes (pour enfants) X à XL, gouttes suivant l'âge.

SPÉCIFIQUE HÉPATIQUE

augmente la sécrétion biliaire,
se retrouve dans la bile hypersecrétée,
dissout le calcul de cholestérine.

Prix : Globules-Gouttes : 12 francs.

Prix : Pilules : 14 francs.

Laboratoire de l'OLIVÉOL

Ed. BRUN, Pharmacien de 1^{re} classe
Ancien interne des Hôpitaux de Lyon
TASSIN-LA-DEMI-LUNE (Rhône).

ONCTION ANGELINI

Guérison de la Gale même infectée

Sans bains.

Sans frotte — En une seule application. —

Adoptée par la Marine nationale.

Traitement des maladies rebelles de la peau.

L'Onction Angelini, à base de soufre et huile de cade, est en usage dans les hôpitaux maritimes de Brest, Cherbourg, Lorient, Rochefort, Toulon, Bizerte.

Prix au public : 10 francs.

Angelini, Pharmacien.

61, rue de Seine — PARIS.

Tél. : Danton 92-73.

ONCTION LEISYN

Adoucissante, Cicatrisante, Décongestionnante, Antiprurigineuse, Antiseptique, respectant l'intégrité des tissus cicatriciels les plus délicats.

Formuler : un tube **ONCTION LEISYN**.

Mode d'emploi. — Etendre sans frotter, 2 fois par jour, en couche épaisse et recouvrir d'un taffetas chiffon et d'une bande.

Dans les hémorroïdes et le prurit anal, faire pénétrer aussi profondément que possible.

Indications. — Toutes les dermatoses, même chroniques. Tous les prurits. Eczémas aigus et chroniques, Eczéma du nourrisson, Ecthymas, Sycosis, Impetigo, Psoriasis, Hémorroïdes externes et internes, Prurit anal et vulvaire. Ulcères variqueux de toutes natures, Fluxions rhumatismales, Goutte, Crevasses du sein, Brûlures, Engelures, Plaies, Phlébites atones ou suppurantes, Blessures, Radiodermites, Dermites médicamenteuses, Lupus, Ophthalmologie, Gynécologie.

Ne donne aucun résultat vis-à-vis de l'Urticaire, des Dartres, de certaines formes de l'Acné et du Lichen.

Action. — Efficacité et rapidité d'action inconnues jusqu'ici. Calme instantanément les prurits les plus rebelles. Pénètre très profondément dans les tissus et les imprègne de ses principes actifs. Permet d'obtenir des guérisons souvent presque immédiates.

Médicament constant, fidèle, réellement efficace et de toute sécurité.

Composition. — Médicament nouveau à l'Yttrium, Samarium, Lanthane, Titane, Caesium, Extraits et Sécrétions bulbo-glandulaires, préparé par procédé EVOO.

Non toxique. Non caustique. Aucune contre-indication.

Communication à l'Académie de Médecine.

Les Laboratoires LEISYN

1 bis, rue Molitor — PARIS (XVI^e).

Téléphone : Auteuil 14-73.

C. C. postaux : PARIS 1075-98.

Adresse télégraphique : LABOLEISYN-PARIS.

ONGUENT FREVAL

Composition. — 45 p. 100 de mercure ; 2 p. 100 d'extrait frais de Belladone et 10 p. 100 d'extrait frais de ciguë.

Propriétés thérapeutiques. — Antiphlogistique, Résolutif, Antiseptique, Calme immédiatement la douleur et localise l'infection.

Indications. — Tout état inflammatoire : Piqûre infectée, Furoncle, Phlegmon, Panaris, Anthrax, Hémorroïdes, Phlébite, Orchite, Arthrite aiguë, Adénite. Tumeurs blanches et autres tuberculoses ostéo-articulaires et ganglionnaires.

Tout traitement mercuriel par frictions (très recommandé pour les enfants ou comme traitement discret chez les adultes).

Mode d'emploi. — Etendre l'onguent, le recouvrir d'un linge propre ou d'une gaze et faire tenir.

Dose journalière. — Chez l'adulte : gros comme une noisette en une ou deux fois.

Prix : le tube 18 fr. 50

Laboratoire du DELTA

84, rue de Rochechouart — PARIS (IX^e).

Tél. : Trudaine 45-18.

OPOBYL

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle des Médicaments sous le n° 363-3.

Forme. — Dragées.

Composition. — Extrait hépatique, Sels biliaires, Boldo et Combretum.

Propriétés pharmacodynamiques. — Cholagogue, Rééducateur des fonctions entéro-hépatiques, Décongestif du foie et des intestins.

Indications. — Hépatites. — Ictères. — Cholécystites. — Lithiase biliaire. — Entérocolites, Constipation chronique. — Dyspepsie gastro-intestinale.

Mode d'emploi. — 1 à 2 dragées au début ou à la fin des repas, 2 ou 3 fois par jour.

L'étui : 12 fr. (en France).

Laboratoires A. BAILLY

15, rue de Rome — PARIS (VIII^e).

OPOCALCIUM DU Dr GUERSANT

Reminéralisation. Polyopothérapie.

Composition. — Extraits totaux de glandes endocrines. Parathyroïde (titrant 200 unités Collip au gr.), Surrénale, thymus, hypophyse, (ce dernier dans le granulé seulement), associés au fluorure, phosphate, glycéro-phosphate, carbonate de Ca, phosphate de Mg et nucléinate de Mn.

Formes. — Cachets (en tubes d'aluminium), comprimés, poudre, granulé (recommandé pour enfants).

Propriétés thérapeutiques. — La décalcification et d'une façon générale la déminéralisation de l'organisme sont dues moins à un apport insuffisant des minéraux alimentaires qu'à la déficience des glandes endocrines.

Pour recalcifier et reminéraliser, il faut donc procurer à l'organisme les extraits des glandes dont l'action hormo-stimulatrice et régulatrice assure le métabolisme des minéraux.

Indications. — Prétuberculose, tuberculose, neurasthénie, surmenage, débilité, croissance, phosphaturie, convalescence, lymphatisme, rachitisme, fractures, carie dentaire, grossesse, allaitement.

Doses et mode d'emploi. — *Adultes* : 3 cachets, 6 comprimés, 3 cuillerées à dessert de granulé, 2 à 3 cuillers-mesures de poudre.

Enfants jusqu'à 10 ans : 1 cachet ou 2 comprimés, 3 cuillerées à café de granulé, 2 cuillers-mesures de poudre.

Enfants jusqu'à 5 ans : 2 cuillerées à café de granulé, 1 cuiller-mesure de poudre. Durée du traitement : minimum 10 jours.

Opocalcium arsénié (avec 1 cc. de méthylarsinate disodique). — Une seule forme : cachets.

Adultes : 3 cachets par jour ; avant 12 ans : 1 ou 2 cachets par jour.

Opocalcium gaiacolé (avec sulfo-gaiacolate de potasse). — Antisepsie pulmonaire et reminéralisation associées.

Adultes : 3 cachets par jour ; avant 12 ans : 1 ou 2 cachets par jour.

Opocalcium irradié. — (Voir plus loin).

Opoferrine (avec fer organique et extraits organiques). (Voir notice plus loin).

Adultes : 4 à 6 comprimés par jour.

Enfants : 2 à 4 comprimés par jour.

Cachets. — Prix : 15 francs. — **Comprimés.** — Prix : 15 francs.

Granulé. — Prix : 16 fr. 50. — **Poudre.** — Prix : 16 fr. 50.

Laboratoires de l'OPOCALCIUM

A. RANSON, Docteur en pharmacie.

121, avenue Gambetta — PARIS (XX^e).

Tél : Ménilmontant, 62-81, 62-82,

OPOCALCIUM IRRADIÉ DU D^r GUERSANT

Composition. — Vitamine D pure cristallisée titrant 40 millions d'unités internationales au gramme, associée au complexe endocrino-minéral de l'Opocalcium. (L'extrait parathyroïdien titre 200 unités Collip au gramme).

Formes. — Cachets (présentés en tubes d'aluminium). Comprimés, granulé.

Propriétés thérapeutiques. — L'Opocalcium irradié assure une reminéralisation intégrale. Il fixe le calcium et le phosphore dans les tissus.

Indications. — Rachitisme, Croissance, Carence, Ossification, Dentition, Lymphatisme, Dénutrition, Prétuberculose, Tuberculose, Débilité, Asthénie, Surmenage, Phosphaturie, Infections, Fractures, Grossesse, Allaitement, Anémie, Convalescence.

Doses journalières et mode d'emploi :

Cachets : *Adultes* : 3.

Comprimés : *Adultes* : 6.

Granulé : *Adultes* : 3 à 4 cuillerées à café.

Enfants jusqu'à 10 ans : 1 à 3 cuillerées à café.

Enfants jusqu'à 5 ans : 1 cuillerée à café.

Durée du traitement : minimum 10 jours.

Littérature et échantillons ;

Laboratoires de l'OPOCALCIUM

A. RANSON, Docteur en Pharmacie.

121, avenue Gambetta — PARIS (XX^e).

Tél. : Ménil. 62-81 et 62-82.

OPOCHOL

Composition :

Oléate de soude, Bile dépigmentée et décholestérinée, Extrait hépatique, Extrait de Boldo, Extrait de Kinkélibah.

Forme pharmaceutique :

Comprimés dragéifiés glutinisés.

Indications thérapeutiques majeures :

Affections hépatico-biliaires. — Hépatites, Cirrhoses, Petite insuffisance hépatique, Cholémie simple familiale de Gilbert et Lereboullet, Lithiase biliaire, Angiocholite, Coliques vésiculaires, Cholécystites médicales, Ictères.

Affections intestinales. — Constipation par insuffisance de chasse biliaire. Entéro-colite muco-membraneuse.

Indications thérapeutiques secondaires :

Maladies de la nutrition. — Diabète par hypohépatie, Goutte, Obésité, Arthritisme, Hépatisme de Roger Glénard, Etats hypercholestérinémiques.

Affections de l'appareil circulatoire avec participation du foie. — Foie cardiaque, Syndrome d'hypertension portale, Varices et Hémorroïdes des hépatiques, hémophilie, certaines Anémies.

Infections. Intoxications.

Neuro-psychiatrie. — Psychasthénie avec signes hépatiques, Mélancolie anxieuse présénile, dépression avec troubles hépatiques.

Mode d'emploi :

A. *En période de crise.* — 4 comprimés par 24 heures, 2 comprimés au moment des repas de midi et du soir.

B. *Dans l'intervalle des crises.* — 2 comprimés par 24 heures, 1 comprimé à midi et un autre le soir aux repas.

Incompatibilités :

Aucune incompatibilité.

Prescrire :

Opochol : comprimés, 1 flacon.

Prix, le flacon de 50 comprimés : 15 francs.

Laboratoire de MÉDECINE EXPÉRIMENTALE

1 et 3, rue de Malherbe — BEAUVAIS (Oise). Tél. : 4-84.

Echantillons et littérature à la disposition
de MM. les Docteurs.

OPODERMYL

Onguent cutané opothérapique.

Composition :

Extraits embryonnaires, albumoses et sérum hémopoïétique, tous principes actifs de la régénération cutanée.

Propriétés thérapeutiques.

Agent spécifique de l'épidermisation en toutes circonstances.

Indications :

Plaies atones, Pertes de substance chirurgicales ou diathésiques, Engelures, Brûlures, Erythèmes, Crevasses du sein, Prurits, Dermatoses.

Mode d'emploi :

Application permanente en couche épaisse, renouvelée aussi souvent que possible.

Prix au public : 12 francs.

J. BENSIMON

36, rue des Martyrs — PARIS (IX^e).

OPOFERRINE VITAMINÉE

Thérapeutique anti-anémique.

Composition. — Association des Peptonates de fer et de manganèse, à l'extrait hépatique (méthode de Whipple) et à l'extrait splénique, en présence des Vitamines A (Carotène) et C (Chlorophylle), qui commandent le métabolisme du fer.

Action. — Le plus complet et le plus puissant agent de régénération sanguine, stimule l'hématopoïèse et accroît la valeur globulaire.

Indications. — Anémies pernicieuses, anémies de toutes natures (post-hémorragiques, infectieuses, parasitaires, toxiques, cancéreuses, de l'enfance, etc...), la chlorose, les altérations et les affections sanguines, les maladies hémorragipares, les déficiences spléno-hépatiques, les états post-opératoires, la convalescence, la puberté, le surmenage, les intoxications (saturnisme, oxyde de carbone, alimentaires, etc...), l'hypotension, l'amaigrissement.

Forme. — Granulé.

Doses journalières. — Adultes : 2 à 3 cuillerées à dessert.

Enfants : 1 à 3 cuillerées à café. A prendre au début des repas. Aucune action toxique. Peut être prescrit aux jeunes enfants. Durée du traitement : minimum 10 jours.

Prix : 18 francs.

Laboratoires de l'OPOCALCIUM

A. RANSON, Docteur en Pharmacie,

121, avenue Gambetta — PARIS

Tél. : Ménil. 62-81, 62-82.

OPONUCLYL IRRADIÉ TROUETTE-PERRET

Catalyseur fixant le Phosphore et le Calcium.
Vitamine D.

Médication synergique organo-minérale.

Composition. — Lipoïdes médullaires et spléniques, Orchitine, Hémoglobine, Acide nucléinique, Cinnamate de manganèse et de fer, Algostérine irradiée.

Indications. — Anémie, Chlorose, Convalescence, Croissance, Surmenage, Neurasthénie, Lymphatisme, Tuberculose.

Doses. — *Adultes* : 2 sphérules à chaque repas.
Enfants : 1 sphérule à chaque repas.

Prix au public : 16 francs.

Littérature et Echantillons :

Laboratoires TROUETTE-PERRET

61, avenue Philippe Auguste
PARIS (XI^e).

OPOPHOS GRANULÉ

Composition. — Glycérophosphate de chaux, Inosito-Phosphate de chaux et magnésie; Phosphate bicalcique, de magnésie, de manganèse; Protoxalate de fer, Splénine, Thymusine, Parathyroïdine.

Indications. — Anémies, Chlorose, Asthénie, Surmenage, Rachitisme, Lymphatisme, Carences, Troubles de Croissance et de Nutrition, Dénutrition, Caries dentaires.

Forme. — Granulé sucré, aromatisé. Ne contenant aucun produit toxique (arsenic, strychnine, etc.), l'OPOPHOS constitue la forme la plus facile et la plus agréable pour faire prendre fer et phosphates aux enfants et aux bêtes.

Doses. — *Bébés* : 1/4 de cuillerée à café 2 fois par jour. — *2 à 5 ans* : 1/2 cuillerée à café 2 fois par jour. — *5 à 15 ans* : 2 cuillerées à café par jour.

— *Adultes* : 4 cuillerées à café par jour

Prix : 15 francs.

Laboratoire DENISOT

19, rue de Fleurus — PARIS (VI^e).

OPOSTYL BOUTY

Tonique de l'énergie

Composition. — Complexe endocrino-chimique réalisant 4 associations en synergie du sel minéral et de la glande qui le fixe dans l'organisme.

Cortico-Surrénale + Arsenic organique.

Moelle osseuse + Hypophosphites.

Thymus + Magnésium. — Rate + Fer.

contient aussi, Manganèse, Cuivre (catalyseur de l'assimilation du fer) et Strychnine minimale.

Action thérapeutique. — 1° Stimule puissamment le pouvoir anti-infectieux et l'hématopoïèse. — 2° Rend possible la création des réserves consommables même sur le terrain peu favorable d'un organisme déprimé. — 3° Restaure le tonus nerveux.

Indications. — Épuisement des réserves (amaigrissements, surmenage, croissance, fatigue due à l'insuffisance organique). — Insuffisance de l'appareil hémopoïétique : anémies primitives ou secondaires. — Convalescences de gripes, bronchites ou maladies infectieuses. — Tous épuisements nerveux.

Forme. — *Comprimés et liqueur.*

Posologie.

Liqueur. — 2 à 4 cuillers à café par jour avant les repas, pure ou dans un peu d'eau, sucrée ou non.

Comprimés. — 2 à 4 par jour avant les repas, à avaler sans croquer ni sucer.

Prix :

Liqueur (160 cc.) et comprimés (50) : 13 francs.

Laboratoires BOUTY

3, rue de Dunkerque — PARIS (10^e).

OPOTHÉRAPIE BOUTY

Extraits totaux d'organes frais desséchés sous un vide profond vers 0° et présentés en comprimés dragéifiés à froid permettant une conservation indéfinie.

| | | |
|--------------------------------|---|--------------------------------------|
| Thyroïdine Bouty | { 0 gr. 10 de corps thyroïde desséché par dragée. } | Obésité. Myxœdème. |
| Ovigénine Bouty | { 0 gr. 12 d'ovaires desséchés par dragée. } | Ménopause naturelle ou artificielle. |
| Séquardine Bouty | { 0 gr. 10 de testicule desséché par dragée. } | Insuffisance organique. |
| Hépatine Bouty | { 0 gr. 30 de foie desséché par dragée. } | Cirrhose, Ictère, Diabète. |
| Surrénaline Bouty | { 0 gr. 10 de capsules surrénales desséchées par dragée. } | Basedowisme, Addisonisme. |
| Néphrine Bouty | { 0 gr. 15 de rein desséché par dragée. } | Néphrite. |
| Biliol Bouty | { Extrait concentré de bile de porc en dragées kératinisées. } | Ictère, Icthiase biliaire, etc. |
| Gastrozymase Bouty | { Comprimés effervescents de suc gastrique de porc. } | Dyspepsie, embarras gastrique. |
| Liqueur à la thyroïdine | { Indication infantile, 1 cuillerée à café = 0 gr. 02 de thyroïde desséchée } | Myxœdème. |
| Globépal | { Poudre de foie frais. 1 godet égale 125 grammes de foie. } | Anémie. |

ASSOCIATIONS PURIGLANDULAIRES

| | | |
|--------------------------|---|---|
| Triglandine Bouty | { Chaque dragée contient Corps thyroïde desséché..... 0 gr. 08 Hypophyse..... 0 gr. 05 Ovaire 0 gr. 10 } | Asthénies endocriniennes. Sexe féminin. |
| Triglandol Bouty | { Chaque dragée contient Corps thyroïde desséché..... 0 gr. 08 Hypophyse desséchée 0 gr. 05 Testicule desséché. 0 gr. 10 } | Asthénies endocriniennes. Sexe masculin. |

Tous les produits opothérapiques ci-dessus sont également présentés en ampoule de 1 centimètre cube et de 3 centimètres cubes.

AUXOTHÉRAPIE BOUTY

| | | |
|----------------------|--|-----------------------|
| Opostyl Bouty | { Pour composition voir la page <i>Opostyl</i> ci-avant. } | Tonique de l'énergie. |
|----------------------|--|-----------------------|

Laboratoires BOUTY
3, rue de Dunkerque — PARIS
Tél.: Nord 32-52 (2 lignes).

OPOTHÉRAPIE BYLA

Nouvelles présentations brevetées.

SANS ODEUR, CONSERVATION INDEFINIE,
CONSTANCE D'ACTIVITE

1° **Cachets « OPO »** contenant dans le même pain azyme, deux **comprimés** concentriques renfermant, l'un le substratum cellulaire sec, l'autre le lipéide correspondant (procédé breveté).

Posologie. — Uniforme pour tous les Opos : 2 à 4 par jour.

Prescrire : OPO-OVARINE-BYLA, etc.

2° **Les « EXO » BYLA**, sucs totaux **inaltérables**, préparés par exolyse des **organes** frais (procédé breveté).

Prescrire : EXO-THYROIDINE BYLA, etc.

Posologie. — Uniforme pour tous les Exos : 2 à 4 cuillerées à dessert par jour.

3° **Les GLANDULES BYLA** (comprimés dragéifiés), enrobés de sucre, afin d'empêcher l'action de l'air sur le principe actif et d'éviter toute odeur.
Conservation indéfinie.

Prescrire : GLANDULES DE SURRÉNINE BYLA.

Posologie. — (4 à 8 par jour).

4° **Les AMPOULES BYLA** : préparées à partir des **ORGANES FRAIS** ; amenées à un état voisin de l'isotonie et présentées en ampoules de 1 cc. correspondant à 0 gr. 25 d'organe frais.

Prescrire: AMPOULES D'HÉPATINE BYLA, etc.

Pour les doses massives : AMPOULES « ISO » BYLA de 2 cc. correspondant à 1 gr. d'organe frais par cc.

Prescrire : AMPÔULES ISO REIN BYLA, etc.,

Posologie. — 1 ampoule tous les 2 jours.

Opothérapie simple, pluriglandulaire et panglandulaire.

Les Établissements BYLA

26, avenue de l'Observatoire — PARIS (XIV^e).

OPOTHÉRAPIE BYLA

Cachets OPO - Glandules - Exolysés - Ampoules ISO

Formule

MÉDICATION ASSOCIÉE

| | | |
|-------|--|---|
| 1 | Hypophysine. 0.10 Orchitine. . . 0.60 | Myxœdème. Troubles endocriniens. |
| 2 | Hypophysine. 0.10 Ovarine. . . . 0.20 | Troubles de la ménopause et insuffisances glandulaires. |
| 3 | Orchitine. . . 0.60 Thyroïdine. . 0.025 | Myxœdème. Insuffisances glandulaires. |
| 4 | Ovarine. . . . 0.20 Thyroïdine. . 0.025 | Insuffisances thyroïdienne et ovarienne. |
| 5 | Surrénine. . . 0.10 Hypophysine. 0.10 | Asthme essentiel. Myasthénies. Insuffisances surrénales. Basedowisme. |
| 6 | Surrénine. . . 0.10 Thyroïdine. . 0.025 | Retards de croissance. |
| 7 | Hypophysine. 0.10 Thyroïdine. . 0.025 | Syndromes pluri-glandulaires, Sclérose, Obésité. |
| 8 | Surrénine. . . 0.15 Hypophysine. 0.05 Thyroïdine. . 0.025 | Asthme essentiel. Myasthénies. Insuffisances surrénales. Maladie d'Addison. |
| 8 bis | Ovarine. . . . 0.15 Surrénine. . . 0.05 Hypophysine. 0.05 | Insuffisances glandulaires. Troubles de la puberté et de la ménopause. Syndromes adiposo-génitaux. |
| 9 | Hypophysine. 0.05 Ovarine. . . . 0.20 Thyroïdine. . 0.025 | Troubles de la ménopause. Syndromes adiposo-génitaux. |
| 9 bis | Ovarine. . . . 0.20 Surrénine. . . 0.05 Thyroïdine. . 0.025 | Troubles de la puberté et de la ménopause. Syndromes adiposo-génitaux. |
| 10 | Hypophysine. 0.05 Orchitine. . . 0.60 Thyroïdine. . 0.025 | Développement tardif. Myxœdème. Insuffisances glandulaires. |
| 11 | Hypophysine. 0.05 Thyroïdine. . 0.025 Surrénine. . . 0.05 Orchitine. . . 0.10 | Infantilisme masculin. Insuffisances glandulaires. Sénilité précoce. |
| 12 | Hypophysine. 0.05 Thyroïdine. . 0.025 Surrénine. . . 0.05 Ovarine. . . . 0.10 | Troubles de la puberté et de la ménopause. |

MÉDICATION PANGLANDULAIRE

contenant toutes les glandes en proportion normale.

PANGLANDULAIRES BYLA : Masculins, Féminins, Infantiles.

Exécution de toute formule sur ordonnance médicale.

Echantillons et Littérature :

Les Établissements BYLA, 26, avenue de l'Observatoire, Paris.

OPOTHÉRAPIE CARRION

1^{re} POUDRES OPOTHERAPIQUES

Les poudres opothérapiques CARRION renferment inaltérées chimiquement les substances spécifiques contenues dans les organes frais.

Formes. — Elles se présentent, soit sous la forme de cachets, soit sous la forme de comprimés. Mais nous recommandons plus spécialement la forme comprimés, car elle préserve mieux la poudre contre les altérations possibles.

Doses. — La posologie se trouve très simplifiée, car nos cachets ou comprimés sont dosés de telle manière que le médecin peut prescrire 2 à 3 cachets ou comprimés par jour (un par repas).

Liste des principales poudres opothérapiques :

Corps jaune, Fiel de Bœuf, Foie, Glande mammaire, Hypophyse, Moelle osseuse, Orchitique, Ovaire, Parathyroïde, Rate, Substance grise.

2^{de} DRAGÉES PLURIGLANDULAIRES

Forme. — Nous présentons dix formules de mélanges pluriglandulaires sous forme de dragées, mais nous pouvons, pour répondre à certaines indications opothérapiques complexes, préparer sur demande des cachets de toutes compositions.

Liste des 10 préparations :

T. O. S. H. — T. A. S. H. — T. O. H. — T. O. S. — T. S. H. — O. S. H. — S. H. — T. A. — T. O. — O. M.

T. (Thyroïde). — A. (Testicule). — O. (Ovaire). — H. (Hypophyse). — S. (Surrénale). — M. (Mammaire).

Les formules les plus courantes sont T.O.S.H. ou T.O. (sexe féminin). T. A. S. H. ou T. A. (sexe masculin).

3^{de} EXTRAITS INJECTABLES

Les extraits injectables sont en solution aqueuse et désalbuminés.

Forme. — Ampoules de 2 cc. Chaque ampoule correspondant à 0 gr. 10 de poudre opothérapique (sauf pour la Parathyroïde et le lobe postérieur d'Hypophyse).

Posologie. — Une ampoule de 2 cc. tous les jours ou tous les deux jours. La liste de ces extraits injectables est la même que celle des poudres.

4^{de} PER-EXTRAITS INJECTABLES

Nos préparations de Per-Extraits sont faites d'après une technique nouvelle en opérant sur les organes frais prélevés au moment de l'abattage ; ils sont totalement désalbuminés.

Forme. — Ampoules de 2 cc. Chaque ampoule correspond à 1 gr. de produit frais.

Posologie. — La posologie des Per-Extraits est exactement semblable à celle des extraits injectables.

5^{de} EXTRAIT INJECTABLE DE LOBE POSTÉRIEUR d'HYPOPHYSE

Nous avons deux dosages en unités internationales, pour cet extrait spécial :

Rétropituite N^o 2 (deux unités internationales) pour accouchements.
Rétropituite N^o 10 (dix unités internationales) pour autres usages.

Produits biologiques CARRION

L. CUNY, docteur en pharmacie.

54 Faubourg Saint-Honoré — PARIS (VIII^e).

Tél. : Anjou 36-45 (2 lignes groupées).

OPOTHÉRAPIE CHOAY

I. LES EXTRAITS TOTAUX CHOAY sont des poudres d'organes (Codex) préparées à froid (0°) et dans le vide profond, de propriétés pharmacodynamiques équivalentes à celles des pulpes fraîches correspondantes.

Formes pharmaceutiques. — *Cachets* et *Comprimés* présentés en tubes hermétiques.

Posologie moyenne. — 4 à 6 par jour.

Nomenclature et dosage des produits les plus couramment utilisés :

| | | |
|------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Cachets et comprimés : | Hépatiques | 25 et 50 cgr. |
| | Hypophysaires..... | 5 et 10. — |
| | Mammaires..... | 25 et 50 — |
| | Orchitiques (ou Androïques).. | 25 et 50 — |
| | Ovariens..... | 10, 20 et 25 — |
| | Pancréatiques..... | 25 et 50 — |
| | Spléniques..... | 25 et 50 — |
| | Surrénaux..... | 10 et 20 — |
| | Thyroïdiens.. | 1 et 5 mgr., 1, 2, 5 et 10 — |

Prix : De 12 à 20 fr. la boîte de 24 à 40 cachets ou comprimés suivant dosage.

II. LES EXTRAITS INJECTABLES CHOAY sont des solutions aqueuses, désalbuminées, stérilisées et sensiblement isotoniques.

Formes pharmaceutiques. — Ampoules de 1 à 10 cc.

Nomenclature et posologie des solutions les plus utilisées :

| | | |
|---|--------------------------------|---------------------|
| Ampoules hépatiques..... | 1, 2 et 5 cc., | 1 tous les jours. |
| — hypophysaires (glande totale)..... | 2 cc..... | 1 tous les 2 jours |
| Ampoules hypophysaires (lobe antérieur)..... | 2 cc..... | — |
| Ampoules hypophysaires (lobe postérieur)..... | Voir « Post-Hypophyse Choay ». | |
| Ampoules mammaires..... | 1 et 2 cc..... | 1 tous les 2 jours. |
| — orchitiques..... | 1 et 2 cc..... | — |
| — ovariennes..... | 1 et 2 cc..... | — |
| — spléniques..... | 1, 2 et 5 cc.... | — |
| — surrénales..... | 1/2 et 1 cc.... | — |
| — thyroïdiennes..... | 1/2 et 1 cc.... | — |

Prix : Boîtes de 6 ampoules : de 12 à 30 fr.

Boîtes de 12 ampoules : de 25 à 35 fr.

OPOTHÉRAPIE ASSOCIÉE : Syncrines Choay (Voir ce mot).

Laboratoire CHOAY

48, avenue Théophile-Gautier — PARIS (XVI^e).

Tél. : Auteuil 44-09 et 44-10.

OPOTHÉRAPIE du D^r FRAYSSE

(Associations)

THYRODOSE. — Pastilles de chocolat de 1 gr. contenant : ovaire 0,10, thyroïde 0,025.

Doses. — *Adultes* : 2 à 3 pastilles par jour.

Indications. — Insuffisances thyroïdienne et ovarienne. — Troubles de la croissance, de la puberté et de la ménopause. — Obésité, etc.

Prix : 20 francs.

NEURODOSE. — Pastilles de chocolat de 1 gr. contenant, orchitine 0,20, substance grise, 0, 10.

Doses. — *Adultes* : 4 pastilles par jour.

Indications. — Epuisement nerveux sous toutes ses formes. — Impuissance sexuelle, surmenage. — Infantilisme, etc.

Prix : 20 francs.

PLACENTODOSE. — Granulés de Placenta et de mammaire.

Doses. — 4 cuillerées à café par jour.

Indications. — Flaccidité utérine. — Métrorragies. — Insuffisance lactée. — Flaccidité et atrophie des seins. — Métrite. — Tumeurs. — Fibromes, etc.

Prix : 20 francs.

SPLENODOSE. — Granulés de Rate. — Foie. — Surrénale. — Hémoglobine osséine.

Doses. — 4 cuillerées à café par jour.

Indications. — Déminéralisation. — Maladies du Foie et de la Rate. — Chlorose. — Anémie. — Maladies infectieuses. — Paludisme, etc.

Prix : 20 francs.

Laboratoires du D^r FRAYSSE

21, rue de Neuilly — NANTERRE (Seine). Tél. : 1288.

Notices et échantillons sur demande.

(Voir, aussi, *Folli-Lobine*).

OPOTHÉRAPIE FOURNIER

Extraits totaux préparés à froid dans le vide.

Endocrisines.

Forme. — 1^o *Cachets et comprimés.*

Doses usuelles toutes préparées. — Thyroïde, 0,025 mgr., 0,10 cgr. ; ovaire, 0,10 cgr. ; orchitine, 0,20 cgr. ; surrénale, 0,10 cgr. ; hypophyse, 0,10 cgr. ; foie, 0,50 cgr. ; reins, 0, 25 cgr.

Cachets pluri-glandulaires.

M, sexe masculin.

F, sexe féminin.

Troubles de croissance, infantilisme, arriération.

2^o *Ampoules :*

Thyroïde, Ovaire, Surrénale, Hypophyse, Orchitine, Rate. — Association hyposurrénale, Asthme. — Hypophyse lobe postérieur, usage obstétrical (dite **Physo-crisine**).

Formuler : **Endocrisines-glande Fournier.**

Solution de foie (en ampoules buvables), amp. de 10 cc. correspondant à 150 gr. de foie par ampoule (méthode de Whipple)

Solution de Rate (ampoules injectables) de 3 cc. Méthode Thomas Paul. Affections eczémateuses et prurigineuses.

Formuler : **Splenocrisine.**

Laboratoires FOURNIER Frères

7, rue Biscornet — PARIS.

OPOTHÉRAPIE ISCOVESCO

**Extraits éthéro-alcooliques imputrescibles
de tous les organes (Lipoïdes H.I.).**

Les Lipoïdes H. I. par eux-mêmes, ainsi que par les vitamines lipo-solubles qu'ils contiennent, représentent dans certains cas **la totalité** et dans d'autres **la partie la plus importante** des substances actives des organes dont ils proviennent.

Formes :

- 1° Pilules, dosées à 2 centig. de substance active.
- 2° Ampoules huileuses, de 1 cc. stérilisées à 110° pour injections hypodermiques, indolores. Elles sont titrées à 2 centig. de principes actifs.

Posologie :

6 à 9 pilules par jour ou une injection hypodermique.

Nomenclature :

Adrénol Cortex

(Partie corticale des glandes surrénales).

Adrénol total

(Glande surrénale totale) sans adrénaline.

Androcrinol (Testicule).

Cérébrocrinol (Cerveau).

Gynocrinol

(folliculine et toutes les hormones ovariennes).

Gynolutéol (Corps jaune).

Hépatocrinol (Foie).

etc., etc... Lipoïdes de tous les autres organes.

LIPOÏDES ASSOCIÉS

Andro-Polycrinol

(Testicule, Thyroïde, Hypophyse, Surrénale).

Gyno-Polycrinol

(Gynocrinol, Thyroïde, Hypophyse, Surrénale).

Gyno-Hypophysol

(Hormone ovarienne, Hormone hypophysaire associées).

Le tube de 60 pilules : 20 francs.

La boîte de 12 ampoules : 30 francs.

AUTRES PRÉPARATIONS

Yo-Androl. }

Yo-Gynine. }

Voir à Yo-Androl.

OPOPEDOL (granulé thyroïdien) à l'usage infantile.

Laboratoire ISCOVESCO

107, rue des Dames — PARIS (XVII^e).

Téléphone : Wagram 07-90.

Adresse télégraphique : Lipoïdes — Paris, 54.

« **OPOTHÉRAPIE MONCOUR** »

En sphérulines, pilules inaltérables et toujours solubles grâce à leur enrobage spécial. A tous extraits totaux d'organes desséchés à froid, dans le vide profond.

Dosages :

(suivant extraits) 10 centigr. et 20 centigr.

Posologie :

1 à 6 par jour, sauf hépatiques et rénales,
1 à 16.

SPHÉRULINES SYNERGIQUES

(associations opothérapiques.)

Thyro-ovariennes, Thyro-orchitiques, Thyro-surrénales, Hypophyso-ovariennes, Surréno-ovariennes, Surréno-orchitiques, Surréno-hypophysaires, Entéro-pancréatiques, Thyro-surréno-ovariennes, Hypophyso-surréno-Thyroïdiennes, - Hypophyso-surréno-ovariennes, - Hypophyso-ovaro-thyroïdiennes, - Hypophyso-thyro-surréno-ovariennes, - Hypophyso-thyro-surréno-orchitiques.

Posologie. — 1 à 6 par jour.

NÉO-SPHÉRULINES MONCOUR

Préparées de suite après demande médicale. Préparations datées. Tous organes, dosages et associations. Renseignements sur demande.

Laboratoire « MONCOUR »

49, avenue Victor-Hugo
BOULOGNE-SUR-SEINE (Seine).

Téléphone : Molitor 08-47.

OPOTHÉRAPIQUES PELLISSIER

Leur doctrine : Clarté, Simplicité, Loyauté.

Le procédé Pellissier utilisé pour la fabrication des produits opothérapiques est breveté. Il a fait l'objet de communications à l'Académie des Sciences le 21 mars 1921, à l'Académie de Médecine le 15 mai 1923, à la Société de Pathologie comparée le 11 novembre 1924.

Les appareils de fabrication sont les plus puissants qui existent dans le monde et les poudres d'organes qu'ils permettent d'obtenir, sans aucun dégraissage, sont d'une activité incomparable, d'ailleurs reconnue et de conservation indéfinie.

Deux formes pharmaceutiques :

Pour les adultes : le *cachet* et le *suppositoire* (Opositoire).

Pour les *jeunes enfants* : le *suppositoire* (Opositoire).

Exemple de prescription pour les adultes :

Ovaire Pellissier, cachets à 0 gr. 25, 1 boîte.

Glande mammaire Pellissier, cachets à 0 gr. 50, 1 boîte.

Pancréas Pellissier, cachets à 0 gr. 25, 1 boîte, etc.

Opositoires Pellissier de Prostate, à 0 gr. 25, 1 boîte.

Opositoires Pellissier d'ovaire, à 0 gr. 25, 1 boîte, etc.

Exemple de prescription pour les enfants :

Opositoires Pellissier de thyroïde, 1 milligr., 1 boîte.

Opositoires Pellissier d'hypophyse, à 0 gr. 05, 1 boîte.

Opositoires Pellissier de surrénale à 0 gr. 05, 1 boîte.

Opositoires Pellissier de thymus, à 0 gr. 25, 1 boîte.

Les **Laboratoires PELLISSIER** ont introduit également dans la thérapeutique :

Les *Comprimés de Silicate de soude Pellissier*, à 0 gr. 25.

Les *Ampoules de Silicate de soude Pellissier*, pour l'injection intraveineuse, pour le traitement de l'*artériosclérose*. Communication à l'Académie des Sciences (17 août 1920).

Laboratoires PELLISSIER

33, avenue de Villiers — PARIS (XVII^e).

Tél. : Wagram 14-59.

Usine : 18, Grande-Rue — ASNIÈRES (Seine).

OPO-VACUOLINE et VACUOLINE-EMULSION

Traitement de la Constipation.

L'association de ces deux préparations constitue une médication rationnelle de la constipation et s'adresse à tous les cas.

1° L'une est active : **Opo-Vacuoline** (suc intestinal associé à une émulsion d'huile de paraffine et d'agar-agar).

Indications. — Constipation chronique ou aiguë, Insuffisance duodénale.

Doses. — 1 à 3 cuillerées à café au milieu des repas.

Prix du flacon : 18 francs.

2° L'autre, émolliente : **Vacuoline-Emulsion** (huile de paraffine émulsionnée à des algues marines, sans laxatif, sans drastique).

Action purement mécanique.

Rééducation intestinale rapide sans irriter.

Indications. — Constipation, Entérite, etc. Préparation excellente pour enfants et nourrissons, recommandée pendant la grossesse et l'allaitement.

Doses. — 1 à 2 cuillerées à soupe au milieu des repas.

Prix du flacon : 15 francs.

Laboratoires DECHOSAL

39, rue de la Gare — BONDY (Seine).

OPOZONES LUMIÈRE

Organothérapie moderne.

Médication des Troubles endocriniens.

Constitution. — Totalité des principes actifs des organes glandulaires frais, éléments chimiques, ferments organiques, albuminoïdes.

Propriétés. — Les dragées d'OPOZONES LUMIÈRE sont obtenues :

1° Sans déshydratation vraie, par un procédé de pseudo-dessiccation qui dissimule l'eau et tous les liquides de constitution en des complexes cristallins. De ce fait, les OPOZONES LUMIÈRE sont les plus actifs des médicaments opothérapiques s'administrant par voie buccale. Il est, en effet, avéré qu'un organe qui a perdu 60 p. 100 de son eau de constitution est devenu inactif.

2° Avec rapidité (inégalisée par tout autre procédé), d'où il résulte que les pollutions et les phénomènes d'autolyse n'ont pas le temps de se produire.

3° La mise immédiate sous forme de dragées glutinisées et vernies protège les OPOZONES LUMIÈRE contre toute désintégration spontanée, toute oxydation, toute hydrolyse ultérieures et contre l'action destructive d'une attaque brutale par les sucs digestifs.

Les OPOZONES LUMIÈRE, même préparées depuis fort longtemps, demeurent inodores. *Ouvrez une dragée, son contenu n'a pas d'odeur.*

Doses courantes. — Commencer avec une dragée par jour en augmentant graduellement.

Formuler. — Une boîte de 54 dragées d'OPOZONES LUMIÈRE, en spécifiant l'extrait désiré.

Prix : 20 francs.

LABORATOIRES LUMIÈRE.

45, rue Villon — LYON.

OPTALIDON « SANDOZ »

Forme et composition. — Comprimés dragéifiés renfermant : Isobutylallylmalonylurée, 0 gr. 050 ; Diméthylaminophénazone, 0 gr. 125 ; Caféine, 0 gr. 025.

Propriétés. — Association *antinévralgique*, sédative et hypnagogue. Apaise la douleur sans stupéfier. Aucun danger d'accoutumance. Bien toléré par les estomacs les plus délicats. Laisse et restitue au malade toute faculté de s'occuper, de travailler ou de se distraire.

Indications. — Toutes douleurs, insomnies douloureuses.

Posologie. — Dose antinévralgique : commencer par 2 dragées prises à la fois et continuer, s'il y a lieu, par 1 dragée, de 1/2 heure en 1/2 heure. Au maximum 8 dragées par jour. Dose hypnagogue dans l'insomnie douloureuse : 2 à 4 dragées 1/2 heure avant le coucher.

Enfants : 1 à 3 dragées par jour, à partir de 5 ans.

Présentation. — Tubes en aluminium de 10 dragées. Flacons de 25, de 100 et de 250 dragées.

Prix :

Tube de 10 : 6 fr. — Flacon de 25 : 12 fr. ; de 100 : 42 fr. ; de 250 : 96 francs.

PRODUITS SANDOZ

20, rue Vernier — PARIS (XVII^e)

OPTIPLASTE

Composition. — Sparadrap caoutchouté au ZnO.

Forme. — Occlusive ou perforée, en rouleaux de 1 m. de long de 1 à 5 cm. de large ; 5 m. de long de 1 à 20 cm. et plus de large.

Avantages. — Adhésivité parfaite, aucune irritation de la peau, grande facilité à l'enlèvement, longue conservation dépassant largement celle habituellement admise pour les produits similaires, aucune odeur.

Indications. — Contention des pansements ; pansements de tractions, d'extensions, etc...

Laboratoires FISCH et Cie.

4, rue d'Illzach — MULHOUSE

Agence à PARIS :

104, faubourg Poissonnière (X^e).

Tél. : Lamartine 92-52.

Bain oculaire

OPTRAEX (Famel)

Nouvelle formule médicale pour le traitement des états inflammatoires des yeux et de leurs annexes.

Composition : pour 100 grammes :

| | |
|---|--------------------------------|
| Extrait de <i>Potentilla Tormentilla</i> | 0 gr. 50 |
| Extrait de <i>Polygonum Bistorta</i> | 0 gr. 50 |
| Extrait d' <i>Erigeron canadensis</i> | 0 gr. 50 |
| Extrait d' <i>Euphrasia officinalis</i> | 0 gr. 50 |
| Extrait d' <i>Hamamélis Virginica</i> | 0 gr. 50 |
| Acide borique 1 gr. | Salicylate de soude.. 0 gr. 08 |
| Borate de soude 2 gr. | Sulfate de zinc..... 0 gr. 10 |
| Eau distillée d' <i>Hamamélis Virginica</i> | 25 gr. |

Propriétés. — Décongestif, hémostatique, bactéricide oculaire, inoffensif, sans aucun toxique ni contre-indications.

Indications. — Tous les cas de congestion ou inflammation de la conjonctive et des paupières, des voies lacrymales ; blépharites, orgelets, conjonctivites rebelles, etc...

Préventif pendant les maladies infectieuses.

Recommandé aux porteurs de verres, yeux faibles ou fatigués.

Mode d'emploi. — Deux à trois bains d'yeux par jour,

Prix du flacon · 12 fr. 75. Prix du double flacon : 21 fr 20

Laboratoire P. FAMEL

16-22, rue des Orteaux — PARIS (XX^e).

ORARGOL AMICROS

**Complexe colloïdal électrique
Or et Argent.**

Anti-Infectieux Général.

I. ORARGOL INJECTABLE (0,05 %). AMPOULES

Boîte de 6 amp. 5 cc. : 20 fr.

Tube de 1 amp. 10 cc. : 7 fr.

**Septicémies, Grippe, Fièvres, Traite-
ment pré et post-opératoire.**

Posologie. — 5 à 20 cc. intramusculaire ou intraveineux tous les jours ou tous les deux jours. Chez les enfants, 1 cc. par année d'âge. En injection dès le début d'une infection seul ou combiné à la vaccinothérapie ou à la sérothérapie.

II. ORARGOL NON INJECTABLE (0,1 %).

Gouttes. — Flacon de 60 gr. : 20 francs.

**Grippes, Fièvres, Thérapeutique infan-
tile.**

Posologie. — XX à C gouttes par jour en plusieurs fois dans une boisson quelconque. Ces doses peuvent être doublées si cela est nécessaire sans inconvénient.

Rhino-Orargol. — Fl. 20 gr. : 15 francs.
(Compte-gouttes et instillateur nasal.)

IV à V gouttes en instillations nasales.

X à XV gouttes en gargarismes.

III. ORARGOL-COLLYRE

Orargol-Collyre (solution isotonique 0,2 %).

Boîte de 4 ampoules 1 cc. 5 : 15 francs.

Toutes les indications de l'Argent colloïdal comme collyre.

Laboratoire des Produits AMICROS

177, rue de Courcelles — PARIS (XVII^e).

Tél. : Étoile 29-54.

ORCALCINE

Granulé.

Régénérateur complet du sang et recalcifiant intégral. Synergie endocrinominérale, polymétallique, vitaminée. Véritable régénérateur organique, Résultats surprenants.

Composition. — Adjonction à un extrait hépatique spécial, concentré 33 fois, et à l'extrait splénique (méthode de Whipple) des ions — fer, manganèse + phospho-glycérate de magnésie, chaux, dont le métabolisme est assuré par la présence des 2 vitamines de croissance récemment isolées = Vitamine B (Chlorophylle), vitamine A (Carotène, 250 unités Javillier) et de sels d'or à dose homéopathique.

Indications. — Anémies de toutes natures. Déminéralisation, rachitisme, allaitement, grossesse, puberté, ménopause, amaigrissement, états bacillaires ou prébacillaires chroniques, surmenage physique et intellectuel, états post-opératoires, et toutes convalescences des maladies aiguës ou chroniques.

Posologie :

Enfants : 2 à 3 cuillerées à café par 24 heures.

Adultes : 2 à 3 cuillerées à dessert par 24 heures.

Remise aux Pharmaciens : 40 p. 100.

Dépôt chez tous les Grossistes.

Laboratoires de l'ORCALCINE,

2, place Meissonier — LYON.

OREX

Opothérapie complémentaire féminine.

Composition. — Extrait orchitique total standardisé.

Gouttes : Solution alcoolique. 1 cc. (XXXV gouttes) = 2 gr. de glande fraîche.

Dragées : 1 dragée = V gouttes.

Mode d'action. — Active la fonction ovarienne. Remplace l'imprégnation spermatique. Rétablit l'équilibre nerveux.

Indications. — Troubles psycho-génitaux par carence sexuelle. Insuffisances ovariennes rebelles.

Posologie. — Dose moyenne : X à XXX gouttes par jour, en 2 ou 3 fois, *loin des repas*, vingt jours par mois. (2 à 6 dragées à croquer).

Prix : Gouttes ou dragées : 16 francs.

Laboratoires CRINEX-UVÉ

18, rue Saint-Amand — PARIS (XV^e).

ORGANI-CALCION ENDOCRINIEN POLYVITAMINE

Opothérapie stimulante.

Granulé fondant de Calcium et Phosphore organiques associés à une synergie glandulaire et aux vitamines A B et D. Assimilable par voie gastrique. Association médicamenteuse très active, répondant aux plus récentes données de l'endocrinologie et de la biologie.

Indications. — Déficiences glandulaires, neurasthénie, pré-carences (troubles entériques, asthénie, anémie). Rachitisme, fractures, carie dentaire, troubles de la croissance. Toutes déminéralisations, convalescence, surmenage, débilité. Grossesse, allaitement, Tuberculose, Rhumatisme chronique.

Posologie. — Nourrissons : 1/2 cuillerée à café par jour ; *enfants* de 1 à 5 ans : 1 à 2 cuillerées à café ; de 5 à 10 ans : 3 cuillerées à café ; *adultes* : 3 cuillerées à dessert. A croquer (goût agréable) ou à délayer.

Aucune contre-indication : ni arsenic, ni strychnine, ni surrénales, ni thyroïde.

Prix : 20 francs.

Laboratoire National de Contrôle, 196-3.

Laboratoires du VIOPHAN

81 et 83, rue de Lille — ROUBAIX

ORGANI-CALCION SIMPLE

30 Cachets de gluconate de Ca français dosés à 0 gr. 50
2 à 10 par jour

Ne possède pas les inconvénients du chlorure de calcium (saveur désagréable, phénomènes d'acidose).

Utilise au maximum, grâce à sa combinaison organique, les propriétés thérapeutiques du Ca ionisé.

Son emploi est curatif et préventif : Hémostatique, coagulant. Hémorragies : opératoire, gastrique, intestinale, pulmonaire, menstruelle. Déchlorurant-diurétique (œdème, ascite, albuminurie, néphrite). Antitoxique (intoxication gastro-intestinale avec dermatoses). Anticlasique : réactions sériques, urticaire, rhume des foies, asthme. Recalcifiant : Grossesse, allaitement, tuberculose.

Troubles vago-sympathiques : hypervagotonie, spasmodophilie, tétanie, etc.

A noter que l'Organi-Calcion augmente considérablement l'effet thérapeutique de la médication thyroïdienne.

Prix : 15 francs.

Organi-Calcion Injectable : 5 amp. de 5 cc. solution
10 p. 100 stable.

Prix : 15 francs.

Laboratoire Nationale de Contrôle, 196-4.

Laboratoires du VIOPHAN

81 et 83, rue de Lille — ROUBAIX

ORTHO-GASTRINE

Formule :

| | |
|----------------------------------|----------|
| Sulfate de Soude anhydre | 0 gr. 25 |
| Phosphate de Soude anhydre | 0 gr. 25 |
| Bicarbonate de Soude..... | 0 gr. 10 |
| CITRATE de Soude | 0 gr. 10 |

Pour 1 paquet; N° 30.

Avantages. — Sels purs et anhydres, absolument conformes au Codex. Chaque prise donne un verre à Bordeaux de solution limpide et facile à boire même pour les enfants, toujours stable comme goût et composition.

Indications. — Toutes celles de la solution alcalino-sodique dite de Bourget. Insuffisance sécrétoire du foie et de la vésicule biliaire. Dyspepsie, Gastralgie, Hyperchlorhydrie, Entérite, Intoxication alimentaire, etc.

Posologie. — Adultes : 2 à 4 paquets par jour.

Enfants (sucrer légèrement) de 6 mois à 1 an 1/2 : 1 paquet par jour dans le lait et les bouillies.

De 1 an à 3 ans : 1 paquet par jour.

Prix : 9 francs.

Laboratoire A. LEBLOND

Pharm de 1^{re} Classe, Ex-interne des Hôpitaux de Paris.
51, rue Gay-Lussac — PARIS (V^e).

R. C. Seine 56049.

ORTHOGÉNOL

Traitement de Base des Maladies
de l'Age mûr.

Formule de redressement biologique (1)
du Docteur A. VERNIER.

Composition. — Phosphore, Magnésium, Manganèse, Silice, Soufre, Lithine, Diurétine, Scille, Ac. Thyminique (solv. urique physiologique.)

+ Opothérapie homostimulante, substitutive et régulatrice : Foie, Hypophyse antér., Thyro-Parathyroïdes, Glande interstitielle mâle, Sur-rénale (privée d'adrénaline).

— Régénérations cellulaires. Réactivation physiologique. Dépuration.

Indications. — Déficiences organiques et fonctionnelles qui constituent l'usure physiologique. Troubles biologiques intriqués de l'Involution sénile normale ou pathologique. Age critique des deux sexes. Arthritisme, Artériosclérose, Rhumatismes (2), Diabète, Obésité, Azotémie, Anuries médicales.

Présentation. — Deux formes : *Cachets* et *Elixir*.

Posologie. — L'ORTHOGÉNOL, traitement de Base, se prescrit à la dose minima, longtemps soutenue, de 3 cachets ou cuillerées à soupe d'élixir par jour. Dans les grandes *Anuries* (avec *Anasarque*, *Hydropisie*, *Asystolie*), cette posologie doit être doublée pour obtenir fidèlement les *Débâcles libératrices* sous l'action conjuguée des *Dépurateurs tissulaires*, des *Diurétiques rénaux* et des facteurs *Endocriniens* de la Diurèse (1).

(1) Sénescence et morbidité sénile, M. Mazauric (*Thèse de Montpellier*, 1931).

(2) Dermo-révuulsion par effleurage « en raies de feu ». *Le Polycautére du Dr Vernier*, R. Grégoire (*Thèse de Montpellier*, 1933).

— Prix : 32 francs.

Laboratoires BELIERES

19, rue Drouot — PARIS (IX^e).

ORTHOZOMINE

Principe actif du plasma musculaire total.
Zomine désalbuminée selon la technique du Professeur Richet.

L'Orthozomine présente les propriétés stimulantes de la **Zomine** sous une forme concentrée et très agréable à prendre (sirop).

ANÉMIES. CROISSANCE. CONVALESCENCES.

Enfants : 1 à 3 cuillerées à café par jour.

Adultes : 2 à 4 cuillerées à café par jour.

A prendre pure ou dans un peu d'eau froide.

Le flacon : 20 francs.

Laboratoires LONGUET

34, rue Sedaine — PARIS (XI^e).

OSMOLÉINE

Pommade stérilisée antiseptique pour pansement de la muqueuse des fosses nasales.

Composition. — Camphre, Benzoate de soude, Soufre précipité. Acide borique. Menthol, Essence de géranium rosat.

Propriétés. — Désinfection de l'auvent nasal, de la filière nasale jusqu'à sa partie postérieure.

Indications. — Toutes les affections subaiguës ou chroniques des fosses nasales : l'ozène avec sécrétion et croûtes fétides, les séquelles de sinusite maxillaire et frontale.

Mode d'emploi. — Après avoir mouché pour vider les fosses nasales, aspirer doucement par l'une et par l'autre narine alternativement, le volume d'un pois de la pommade, 3 fois par jour.

Présentation. — Tube d'étain pur avec olive nasale.

Prix : 8 francs.

L. N. C. 314-35

Laboratoires ECHEMAN

26, rue des Moines — PARIS.

OSMO-VACCINS BRÉANT

1° Osmo-vaccins Bréant Colibacille :

Infections intestinales (colites, entéro-colites) et syndrome entéro-réna .
Par voie buccale, lavages, lavements.

2° Osmo-Vaccins Bréant Gynécologiques :

Traitement des métrites, salpingites, vaginites, etc.

Par tampon, mèche, injection intra-cervicale.

Existe également en : Ovules à l'osmo-vaccin Bréant gynécologique.

3° Osmo-Vaccins Bréant Rhino :

Pour le traitement des rhinites aiguës et chroniques, sinusites, otites
(pansements et pulvérisations).

4° Osmo-vaccins Bréant Gonococciques :

Traitement des affections à gonocoque chez l'homme : Urétrites, blennorrhagies, Cystites, Pyonéphrites gonococciques, Prostatites, etc.
(Par injections urétrales.)

5° Osmo-Vaccins Bréant Staphylococciques :

Pour le traitement des affections à staphylocoque : Furonculose, anthrax, acné, etc. (Par pansements et par voie buccale.)

La boîte de 8 ampoules..... 36 fr.

La boîte cure de 18 ampoules..... 50 fr.

LABORATOIRE D'ANALYSES BRÉANT

11, rue de Clichy — PARIS. (Trinité 23-84.)

OSTÉOGÈNE

Phosphate calcique moléculaire véritablement assimilable à l'état naissant et très riche.

Une cuillerée à café arrasée contient 1 gr. de Phosphate de Chaux actif.

Forme. — Crème agréable au goût, non acide.

Indications. — Convient à tous les âges.

Enfants : favorise leur croissance.

Adolescents : toutes les affections osseuses.

Adultes : tous les cas de déficience minérale : phtisie, allaitement, surmenage, vide cérébral, etc...

Mode d'emploi. — 1 à 3 cuillerées à café par jour aux repas.

Le pot de 400 gr. environ : 18 francs.

Laboratoires H. AMMANN, Pharmacien.

BOULOGNE-BILLANCOURT, Impasse Adam, 3.

Tél. : Molitor 01-90.

OSTÉOGLANDULOL

Granulé — Comprimé
Opothérapie glandulaire

Par l'emploi de glandes fraîches à sécrétion interne conservant toute leurs propriétés par un procédé spécial de fabrication.
Traitement rationnel des insuffisances glandulaires et de la décalcification.

Indications. — Anémie, Rachitisme, Déminéralisation, Chlorose, Croissance tardive, Décalcification, Sénilité précoce, Neurasthénie, Hypochondrie, Troubles nerveux.

Granulé : Une cuillerée à café (10 cent) :

Poudre d'os..... 0,10 Moelle osseuse..... 0,02
Surrénale..... 0,01 Orchitine.... 0,10 Excipient saccharolé q. s.

Doses. — *Adultes* : 1 cuillerée à café matin midi, et soir, directement ou dans un 1/2 verre d'eau. *Enfants* : 1/2 cuillerée à café, 2 ou 3 fois par jour suivant les indications du médecin.

Comprimés. — Même composition que le granulé.

Deux comprimés représentent 1 cuillerée à café.

Les comprimés peuvent être prescrits aux diabétiques.

Doses. — *Adultes* : 4 à 6 comprimés par jour, en 3 fois, matin, midi et soir. *Enfants* : 1 à 2 comprimés par jour

Peut être prescrit aux assurés sociaux.

Prix : 16 francs.

Laboratoire BERGER, 14, rue des Pyramides — PARIS.

Envoi gratuit d'un flacon d'Ostéoglandulol (granulé ou comprimé) au choix du Docteur.

OTALGOLEX

(Ex-Otalgol-Spécifique des Otalgies)

Tube instillateur de soluté neutre glyciné rendu adhésif au tympan par un procédé spécial.

Composition. — Sol. d'adrénaline, stovaine, eau de laurier-cerise, borate de soude, glycérolé d'amidon glycérine chimiquement pure.

Propriétés. — Analgésique des affections auriculaires, antiseptique et décongestionnant.

Indications. — Otites catarrhales, otites aiguës et subaiguës, otalgies, myringites.

Mode d'emploi. — Plonger le tube bien fermé dans un bol d'eau tiède pendant 2 minutes, puis instiller 3 fois par jour dans le conduit auditif IV à V gouttes en maintenant la tête inclinée vers l'épaule opposée pendant 5 minutes.

Prix du tube : 10 francs.

Dépôt général pour la France.

Laboratoire ASEPTOR

21, rue Feydeau — PARIS (II^e).

Téléphone : Central 83-15.

OTOLÉINE

Composition. — Butelline, adrénaline, acide phénique cristallisé, glycérine neutre.

Propriétés. — Analgésique, vaso-constrictive, décongestive et antiseptique.

Indications. — Otites externes, Otites moyennes, sèches ou suppurées, et toutes affections congestives, subaiguës ou chroniques de l'appareil auditif.

Présentation et prix. — Un flacon : 12 francs.

Posologie et mode d'emploi. — 3 fois par jour, instiller après avoir fait tiédir au bain-marie quelques gouttes d'OTOLÉINE dans chaque oreille, et recouvrir d'un tampon d'ouate stérile.

**Laboratoires de Thérapeutique
Oto-rhino-laryngologique.**

72, rue de Bagneux — MONTROUGE (Seine).

Tél. : Alésia 02-41.

OUABAÏNE ARNAUD

Principe actif cristallisé du Strophantus Gratus isolé par le procédé particulier du professeur Arnaud. Désignée comme Etalon International.

Indications. — Insuffisances cardiaques, Dilatation aiguë des cavités droites, Cardiopathies valvulaires, Asthénie du myocarde, Arythmies, Tachycardies.

Formes :

Comprimés à 1 mg.

Solution à 4/1000 (50 gouttes = 4 mg.)

Amp. 1/4 mg. (= 1 cc.) p. inject. intravein.

Ampoules 1/2 mg. (= 2 cc.) p. inject. intram.

Propriétés. — Cardio-tonique énergique, Diurétique puissant.

Doses

Per os : Doses moyennes : 2 à 3 mg. par jour pendant les 7 premiers jours de chaque quinzaine.

Doses fortes : 4 mg. par jour.

L'Ouabaïne Arnaud ne s'accumulant pas, le traitement doit être poursuivi jusqu'à obtention de l'effet désiré.

Injections : 1 cc. d'une ampoule pour injections intraveineuses ou 2 cc. d'une ampoule pour injections intramusculaires par jour pendant 4 à 5 jours.

Prix : *Ampoules* : 16 francs.

Comprimés : 16 —

Solution : 17 —

LABORATOIRE NATIVELLE

27, rue de la Procession — PARIS-15.

OUATAPLASME

du D^r Ed. LANGLEBERT.

Pansement humide, complet.
Instantané, aseptique émollient.

Indications. — Furoncles, Anthrax, Absès, Brûlures, Eczéma, Phlébites, Coliques, Plaies contuses.

Mode d'emploi. — Se prépare instantanément par simple immersion dans l'eau bouillie, chaude ou froide. Il peut être arrosé de substances médicamenteuses (Liquueur de Labarraque, Eau d'Alibour, Laudanum, etc.). Conserve son humidité pendant 24 heures.

Peut facilement se **sinapiser** en étendant à sa surface une couche de farine de moutarde qu'on aura au préalable délayée dans un peu d'eau froide ; ainsi préparé, il est le cataplasme sinapisé idéal.

L'enveloppe entière, avec imperméable : 9 fr. 25.

L'enveloppe entière, sans imperméable : 6 fr. 60.

Établissements SABATIER

10, rue Pierre-Ducreux — PARIS (XVI^e).

OVAIRE

Préparations ovariennes
des **Endocrisines Fournier.**

1^o Ovaire total :

Cachets : 10, 20, 25, 30, 50 cgr.

Prix : suivant dosages.

Comprimés : 0,10.

Prix : 15 francs.

Ampoules : correspondant à 0,50 de
glande. En boîtes de 6.

Prix : 15 francs.

2^o Folliculine de l'ovaire, en ampoules.
Solution huileuse : 200 U. souris par
ampoule.

Prix : 20 francs.

3^o Lipoïde de l'Ovaire dit « **Minova-
rium** ». En pilules correspondant à
0 gr. 15 d'Ovaire (40 pilules).

Prix : 16 francs.

4^o Association : Ovaire - Vitamine E,
dite « **Vit-E-lutéine** ».

Prix : 18 francs.

(Vitamine E de la génération et
Hormone du corps jaune.)

En pilules. Boîte de 40.

Notice spéciale sur demande aux
Laboratoires FOURNIER frères
7, rue Biscornet — PARIS (XII^e).

OVAIRE ISCOVESCO

Gynocrinol : Tous les éléments naturels de l'opothérapie ovarienne.

Gynolutéol : Extrait purifié de corps jaune.

Gynohypophysol : Association d'ovaire et d'antéro-hypophyse.

Gynopolycrinol : Ovaire, Surrénale, Thyroïde, Hypophyse.

Yo-Gynine : Ovaire, Antéro-Hypophysine, Vitamine E, etc...

(Voir « OPOTHÉRAPIE ISCOVESCO »).

Laboratoire ISCOVESCO

107, rue des Dames — PARIS (XVII^e).

Tél. : Wagram 07-90.

Adr. tél. : Lipoïdes Paris 54.

OVULES AU NESTOSYL

Anesthésie superficielle par contact.

Caractéristiques. — Voir à la rubrique *Nestosyl*.

Indications. — Suppression rapide et inoffensive de la douleur dans : Vaginites, Vaginisme, Absès du vagin, Fistules, Plaies, Tumeurs, Blennorrhagies, Métrites, Règles douloureuses, Vulvites, Bartholinites, Papillomes, et tous examens et petites interventions gynécologiques (Speculum, curetage, cautérisations, dilatations, etc.).

Posologie. — Délai nécessaire pour la fusion complète : 3 heures environ. Compte tenu de ce renseignement, introduire 1 ou 2 ovules en temps utile. Renouveler cette introduction chaque fois que le besoin s'en fait sentir. Si l'affection est à la fois interne et externe, employer en outre à l'extérieur la *Pommade au Nestosyl*.

Dans les pays tropicaux où l'ovule est inutilisable, y substituer un tampon vaginal imbibé de *Solution huileuse au Nestosyl*.

Prix : 15 francs.

Laboratoires du NESTOSYL

P. BAUDE, Pharmacien

72, rue Saint-Dominique, PARIS (VII^e).

Tél. : Ségur 96-46, — Adr. télégr. : Nestosyl 27 PARIS.

OVULES CHAUMEL

à la Glycérine solidifiée.

Indications :

Aménorrhée. — Ovules Chaumel emménagogues (apiol, cannelle).

Antisepsie. — Ovules Chaumel acide borique.

Congestions. — Ovules Chaumel simples et ichtyol.

Douleurs. — Ovules Chaumel sédatifs (belladone-morphine).

Inflammations. — Ovules Chaumel résolutifs (iodure-belladone).

Leucorrhée. — Ovules Chaumel astringents (tannin-sulfate de zinc).

Métrites. — Ovules Chaumel ichthyol.

Vaginites. — Ovules Chaumel ichthyol.

Prix : 18 fr. 10

Crayons CHAUMEL

Très appréciés pour leur fusion et la facilité avec laquelle le médecin les pose.

Prix : 16 francs.

Établissements FUMOUCHE

78, faubourg Saint-Denis — PARIS.

OVULES INSÉVA

Traitement des affections gynécologiques par vaccinothérapie locale.

Les OVULES INSÉVA sont à base de bouillon de cultures microbiennes de colibacilles, entérocoques, streptocoques, staphylocoques, bacilles d'Hoffmann.

Indications. — Toutes les affections gynécologiques, leucorrhées, métrites.

Action. — Supérieure à celle des antiseptiques. Modifie la nature de l'écoulement, le tarit rapidement.

Mode d'emploi. — Après une injection d'eau bouillie, introduire soir et matin, si possible, un ovule dans la cavité vaginale.

Présentation. — La boîte de 6 ovules : 16 francs.

Institut de Séro et Vaccinothérapie de Garches, INSÉVA.

151-153-155, rue de Buzenval — GARCHES.

Echantillons : 60, rue de Monceau — PARIS. (VIII^e)

OVULES INTIMA

Composition. — Extraits de pavots et de guimauve et glycérine solidifiée.

Actions thérapeutiques. — Calmants, décongestionnants et puissamment résolutifs.

Indications. — Métrites, annexites et pelvipéritonites de toutes natures, vaginite.

La boîte de 6 ovules : 12 francs.

Leur efficacité est heureusement complétée par l'emploi des *Comprimés Intima*.

Antiseptiques, astringents, hygiéniques, effervescents, très solubles et délicatement parfumés. Indiqués dans toutes les affections gynécologiques et les soins quotidiens de la femme. Comme les *Ovules Intima*, ils sont ni toxiques, ni caustiques et ne tachent pas le linge.

Dose. — 1 à 2 comprimés pour 2 litres d'eau.

La boîte de 32 comprimés : 10 francs.

Laboratoire LAGOUTTE

85, cours Albert Thomas. — LYON (III^e).

OVULES RHEMDA RADIOACTIFS

(Radiovules.)

Composition. — A base de terres radioactives et de Terpinéol : d'une radioactivité égale à une unité uranique.

Action. — Par émission de radiations amenant une action bactéricide et leucocytogène.

Indications thérapeutiques. — Vaginites, Métrites, Leucorrhée, etc.

Boîte de 6 ovules.

Prix de vente au public : 15 francs.

Prix médical : 9 fr. 45.

La teneur en produit radioactif de chaque fabrication de nos produits est dosée par le Service des Mesures de SFERC.

Laboratoires RHEMDA

Fondés en 1914

S. MOGAN, Pharmacien

17, rue d'Hauteville — PARIS (X^e).

Usine : 51, rue d'Alsace — COURBEVOIE (Seine).

Tél. : Wagram 58-89. — R. C. Seine 255-068-B.

OVULES « ROCHE »

au Thigénol.

(Voir également page « Thigénol »)

Propriétés thérapeutiques. — Analgésiques, antiseptiques, décongestionnants et puissamment résolutifs. On constate au bout de quelques jours du traitement par les *Ovules « Roche »* la sédation parfaite des douleurs, et, après quelque temps, l'arrêt complet des pertes. De même, les ulcérations rétrocedent rapidement et le volume des organes hypertrophiés diminue dans des proportions notables, ce qui permet de retarder, sinon d'éviter une intervention chirurgicale.

Indications thérapeutiques. — Vaginites, Vulvovaginites, Métrites, Paramétrites, Gonorrhée, Leucorrhée, Métorrhée, etc., etc.

Enregistré au Laboratoire national de contrôle des médicaments sous le n° 504-47.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et C^{ie}
10 rue Crillon — PARIS (IV^e).

OXYDOTHYRINE PÂRIS

Composition. — La totalité des principes actifs de la glande Thyroïde privée de toxine par un procédé spécial. Est sans action sur le cœur.

Indications. — Embonpoint. Obésité. Fibrome. Goitre et tous les états dus à l'insuffisance thyroïdienne.

Forme. — Pilules renfermant 0 gr. 10 de substance active.

Posologie. — 1 à 2 par 24 heures prises de préférence le matin à jeun.

Prix : 20 francs le flacon de 50 pilules.

Laboratoires Biologiques

André PÂRIS

4, rue de La Motte-Picquet — PARIS (XV^e).

OXYDOVARINE PÂRIS

Composition. — Tous les principes actifs de l'ovaire. Corps jaune et cellules interstitielles.

Forme. — Pilules dosées à 0 gr. 10 de substance ovarique totale.

Posologie. — 2 à 6 par 24 heures aux repas.

Indications. — Troubles de la menstruation. Retentissements pathologiques de l'ovariotomie. Irrégularités. Insuffisance. Douleurs périodiques, accidents de la ménopause, etc.

Prix : 20 francs le flacon de 50 pilules.

Laboratoires Biologiques

André PÂRIS

4, rue de La Motte-Picquet — PARIS (XV^e).

OXYFUGE

Cachets.

Composition :

| | |
|--------------------------------|----------|
| Chenanthol | 0 gr. 09 |
| Thymol | 0 gr. 45 |
| Calomel chimiquement pur | 0 gr. 45 |
| Semen contra pulv. | 2 gr. 70 |
| Tanacétum pulv. | 2 gr. 70 |

Pour 9 cachets.

Indications. — Destruction et expulsion des parasites intestinaux : ascarides, ankylostomes, tricocéphales et tout particulièrement des *oxyures*.

Mode d'emploi. — (Adultes seulement) Pendant 33 jours consécutifs, faire prendre le matin à jeun avec une infusion 3 cachets, chacun de 1/2 heure en 1/2 heure. N'absorber aucun aliment jusqu'au repas de midi qui sera normal.

Présentation. — Tube aluminium renfermant 9 cachets.
Prix : 12 francs.

Laboratoires CASTEL

1, place Bouquerie — NIMES.

A. CASTEL, Pharmacien.

Ingénieur-chimiste, Licencié ès Sciences.

OXY-INJECTEUR DU D^r FIALIP

Appareil pour injections sous-cutanées d'oxygène naissant.

Indications. — Toutes les insuffisances respiratoires : Asthme, Emphysème, en diminuant la dyspnée ; Tuberculose, Broncho-pneumonie, *Asphyxies accidentelles et cyanose des nouveau-nés*, septicémies et intoxications en oxydant et détruisant les toxines ou poisons organiques.

Avantages de l'appareil. — Portatif, peut se mettre dans une poche de manteau. — Fabrique son oxygène au moment de l'emploi. — Pas d'obus à recharger. — Toujours prêt à fonctionner.

Complet avec tous ses accessoires : 125 francs.

Laboratoires du D^r FIALIP

23, av. de la Motte-Picquet, PARIS (VII^e).

OXYLÉINE

Forme. — Comprimés. Flacons de 50.

Principe actif. — Sulfate neutre d'oxyquinoléine.

Indications Thérapeutiques :

Troubles intestinaux : Diarrhées estivales, fermentations, infections, parasites intestinaux, excepté le ténia, ulcères, colites.

Troubles des voies biliaires : Cholécystites.

Troubles des voies urinaires : Toutes infections, colibacillose, gonococcie et ses complications, pyélites, tuberculose des voies urinaires.

Mode d'emploi :

Adultes au-dessus de 15 ans : De 3 à 4 comprimés à chaque repas du midi et du soir.

Enfants de 8 à 15 ans : De 2 à 3 comprimés à chaque repas du midi et du soir.

Enfants de 4 à 8 ans : 1 comprimé à chaque repas du midi e du soir.

Avaler, ne pas croquer pour éviter le goût désagréable.

Prix 14 francs. Durée : 8 jours.

Laboratoires DROUET & PLET
RUEIL-MALMAISON (Seine-et-Oise).

OXYMENTHOL PERRAUDIN

(Tablettes et pâtes)

A base d'oxygène naissant, menthol, cocastovaïne, benzoate de soude, etc.

Tablettes et pâtes de goût agréable.

Doses et mode d'emploi. — Adultes, 6 à 10 par jour à sucer ; Enfants, 3 à 6 par jour à sucer.

Propriétés thérapeutiques. — Anesthésiques, antiseptiques, pectorales.

Indications. — Affections des voies respiratoires et de la gorge, Toux, Gripes, Pharyngites, Bronchites, Asthme, Emphysème, Tuberculose, hygiène de la bouche et des dents.

Prix au public : Tablettes, 6 fr. ; Pâtes, 4 fr. 50.

Autorisé par les *Assurances Sociales*.

Laboratoire des Produits SCIENTIA

D^r E. PERRAUDIN, pharmacien

21, rue Chaptal — PARIS.

OXYOL LEISYN

Anti-diabétique énergique.

Formuler : 1 flacon gouttes OXYOL LEISYN et 1 boîte poudre OXYOL LEISYN.

Dans les cas graves, formuler en outre : 1 boîte cachets OXYOL LEISYN.

Mode d'emploi. — XX gouttes dans vin rouge, aux repas. Avaler aussitôt. Deux fois par jour, tisane faite avec une cuillerée à soupe bien pleine de la poudre. Passer sur linge fin. A prendre à n'importe quel moment.

Dans les cas graves, ajouter 1 cachet d'OXYOL LEISYN à chacun des repas.

Indications. — Diabète sucré et ses complications.

Action. — Puissant oxydant organique activant les combustions, modifiant le métabolisme. Fait le plus souvent rapidement tomber le taux du sucre urinaire et cesser les accidents dus au diabète.

Composition. — Convoyeurs d'oxygène, Catalyseurs, Cuprammonium, Méthyle Cupréine, Huile de Gabian aromatique.

Vitalisé et activé par procédé électrique EVOO.

Aucune toxicité ni contre-indication.

Les Laboratoires LEISYN

1 bis, rue Molitor, — PARIS (XVI^e).

Téléphone : Auteuil 14-73. — C. C. postaux : PARIS 1075-98.

Adresse télégraphique : LABOLEISYN-PARIS.

OZOBIASE

Principe actif. — Catalyseur oxydant (Facteur O de R. Monceaux. Prix Meige 1929). Communication Société de biologie, 27 février 1926 ; Société de Thérapeutique, 10 février 1926 ; Dr Moricet, Thèse de Paris 1926.

Indications thérapeutiques. — Amaigrissements, Nutrition du tuberculeux, Hypotrophie.

Forme. — *Comprimés* : Boîte de 60 et 1/2 boîte de 30.

Doses. — *Adultes* : 2 à 3 comprimés avant chaque repas du midi et du soir.

Enfants de 10 à 15 ans : 1 à 2 comprimés midi et soir.

Au-dessous de 10 ans : 1 comprimé midi et soir.

Pour les petits : 1/2 comprimé écrasé dans du lait ou des confitures.

Pour l'adulte : avoir soin de casser les comprimés avant de les avaler.

Prix : 20 francs la boîte. 12 francs la demi-boîte.

Durée : 10 à 12 jours.

Laboratoires DROUET et PLET
RUEIL-MALMAISON (Seine-et-Oise)

OZOBIASE OPOTHÉRAPIQUE

Principe actif. — Catalyseur oxydant (Facteur O de R. Monceaux — Prix Meige 1929 — et 0,03 Ext. total de glandes surrénales). Communication Société de biologie, 27 février 1926 ; Société de thérapeutique, 10 février 1926 ; Dr Moricet, Thèse Paris 1926.

Indications thérapeutiques. — Amaigrissements, Nutrition du tuberculeux, Hypotrophie.

Forme. — *Comprimés*. Boîte de 50.

Doses. — *Adultes* : 2 à 3 comprimés avant chaque repas du midi et du soir.

Enfants de 10 à 15 ans : 1 à 2 comprimés midi et soir ;
au-dessous de 10 ans : 1 comprimé midi et soir. *Avoir soin de casser les comprimés avant de les avaler.*

Prix : 16 fr. la boîte.

Durée : 8 à 10 jours.

Laboratoires DROUET et PLET
RUEIL-MALMAISON (Seine-et-Oise).

OZOTHINE

(Ozone-Térébenthine.)

Composition. — Térébenthine des Landes rendue assimilable par procédé spécial.

Formes pharmaceutiques :

Ozothine interne. — A prendre sous forme de gouttes. X gouttes, 2 fois par jour dans de l'eau sucrée. Augmenter chaque jour d'une goutte jusqu'à XXXV et redescendre à X gouttes.

Ozothine externe. — Pour inhalations, liniment.

Pour inhalations : 1/2 cuillerée à café dans un bol d'eau très chaude.

Propriétés thérapeutiques.

Ozothine interne. — Gouttes OZOTHINE. Rhumes, bronchites, Asthme, Emphysème, Tuberculose pulmonaire ou intestinale, Voies urinaires et génito-urinaires.

Ozothine externe. — *Inhalations* pour nez, larynx, pharynx, sinus. *Frictions ou massages.* — Affections arthro-rhumatismales. Sciatique

Prix :

| | |
|------------------------------|--------|
| Gouttes OZOTHINE..... | 18 fr. |
| Liniment et Inhalations..... | 19 fr. |

Laboratoire OZOTHINE

23, rue Sébastien-Mercier — PARIS (XV^e).

J. POMPANON, Pharmacien-Directeur

✦ PADÉRYL

Composition. — Dragées de :

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Bromhydrate de papavérine | 0,03 |
| Bromhydrate de codéine | 0,02 |
| Extrait de valériane stabilisée | 0,10 |
| Extrait de jusquiame stabilisée | 0,035 |

Propriétés et Indications :

Calmant de la toux : toux pharyngolaryngée, toux rebelles et persistantes des affections pleuro-pulmonaires chroniques, toux coqueluchoïdes, toux réflexes au cours des insufflations du pneumothorax artificiel, toux incoercibles et émétisantes de certaines affections pulmonaires aiguës ou tuberculeuses.

Sédatif nerveux sans action hypnotique, troubles fonctionnels d'origine nerveuse et neurovégétative : *surmenage, troubles nerveux menstruels, insomnies* (qu'il jugule sans causer de troubles au réveil).

Posologie. — De 1 à 4 dragées par jour et plus selon prescription médicale.

Laboratoires CLIN, COMAR et Cie.

20, rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS.

PAIN ESSENTIEL

avec ou sans chlorure.

Composition. — Le **Pain Essentiel** est préparé avec des gruaux de blé dur, riches en gluten, additionnés de protéines du lait solubilisées.

Présentation. — Chaque baguette de 10 gr. représente la valeur nutritive de 16 gr. de pain ordinaire, et renferme 6 gr. d'hydrocarbones.

Avantages. — A été étudié pour convenir à tous les régimes. Très friable, mais oblige le malade à mastiquer ses aliments.

Indications thérapeutiques. — Produit de haute valeur nutritive. A recommander dans tous les cas de convalescences, surmenage et alimentation difficile ; aux dyspeptiques, entéritiques et diabétiques légers. Aux obèses : maximum 3 et 4 baguettes par repas.

Dans d'excellentes panades galactagogues.

Sans chlorure pour arthritiques et albuminuriques.

Prix : 11 francs.

Produits de Régime HEUDEBERT

85, rue Saint-Germain — NANTERRE (Seine).

2 et 4, chemin Feuillat — LYON.

PAIN MASSÉ « SANA »

(Formule du Professeur Rémond) L. N. C. n° 970-1;

Composition. — Le Pain Massé « Sana » est à base de gluten frais, combiné avec les principes actifs du Boldo, du juglandier et des feuilles d'artichaut.

Présentation. — Sous forme de flûtes, chacun des pains représente environ 80 gr. de pain ordinaire et ne renferme qu'une très faible proportion d'hydrocarbones.

Indications thérapeutiques. — Le Pain Massé « Sana » est spécialement recommandé pour les Diabétiques et insuffisances du foie, la suralimentation sous un faible volume et les obèses. Remplace la biscotte pour le café au lait du matin.

C'est le pain idéal des coloniaux.

Il se fabrique sans chlorure pour albuminuriques et arthritiques.

Pâtes spéciales pour Diabétiques, Arthritiques.

Société des Produits « Sana »

GAILLAC (Tarn).

PAIN REDEUIL

Pain de régime.

Préparé avec des procédés de fabrication spéciaux, diastasé, le PAIN REDEUIL fournit à l'organisme des aliments féculents après les avoir préalablement ramenés à une forme particulièrement apte à l'assimilation. (Transformation, par fermentation, des glucoses et saccharoses en hydrates solubles et complètement inoffensifs.)

Ne donne aucun excès de sucre, ni dans le sang, ni dans les sécrétions.

De digestion facile, il est parfaitement bien toléré par l'estomac et ne provoque pas de constipation.

De goût très agréable, comparable au pain de gruau du commerce, il ne rebute pas les malades soumis au régime, comme les biscottes, les biscuits, etc...

Pain frais.

En pains de 100 grammes, se conservant une dizaine de jours, ce qui permet de l'expédier à de longues distances.

Pain de conserve.

Préparé suivant les mêmes principes que le pain frais, de conservation pratiquement illimitée.

Biscuits aux amandes.

Aliments de régime.

Pâtes alimentaires, Chocolat, Farines, Sucre Excelsior.

Prix : pain frais de 100 gr. : 1 fr. 50.

De conserve, 17 fr. 50 le kg.

Etablissements REDEUIL

7, rue Couche — PARIS (XIV^e). — Tél. : Gob. 53-74.

PAINS SPÉCIAUX HEUDEBERT

Les **Pains spéciaux Heudebert** ont été créés pour l'alimentation des malades auxquels l'usage du pain est interdit.

Pour tous régimes.

Pain Essentiel avec ou sans chlorure (voir article spécial).

Dyspepsie, entérite.

Pains grillés, Longuets et Gressins.

Constipation.

Pain complet.

Obésité.

Gressins, Pain Essentiel.

Diabète.

Pain de gluten (régime très sévère, 5 à 10 p. 100 d'hydrocarbonés). Pain d'aleurone (régime sévère, 15 à 20 p. 100). Spécial diabétique (régime normal, 30 à 35 p. 100 d'hydrocarbonés).

Albuminurie, arthritisme.

Pain hypoazoté, Biscottes, Longuets et Gressins sans sel.

Pain des villes d'eaux.

Pain de Royat (cœur, vaisseaux), **Pain de Contrexéville** (reins, voies biliaires), **Pain de Châtel-Guyon** (constipation), **Pain de St-Nectaire** (albuminurie), **Tranches de Plombières** (estomac, intestins), **Pain de Brides** (obésité), **Pain de Vittel** (arthritisme), **Pain d'Evian** (néphrites, artériosclérose).

La haute valeur nutritive de ces pains permet de régler médicalement leur consommation.

Produits de Régime HEUDEBERT

85, rue St-Germain — NANTERRE (Seine).

2 et 4, chemin Feuillat — LYON.

Jus de raisin naturel

PAMPRYL

Blanc et rouge.

Composition. — Pur jus de raisin frais naturel, préparé à Nuits-Saint-Georges (Côte-d'Or), sans pasteurisation, par filtration stérilisante. Donc jus de raisin intégral, sans concentration ni modification.

Indications. — **Nutritif, Antitoxique, Alcalinisant, Diurétique.**

Toutes les indications de la cure de raisin : Auto-intoxications, Entérites, Insuffisance hépatique et rénale, Urologie, Néphrites, Arthritisme, etc.

Boisson de chevet des malades dans tous les états infectieux et fébriles.

Dose moyenne. — 3 verres à bordeaux par jour, on peut augmenter sans inconvénient.

Se trouve dans toutes les Pharmacies : bouteille, 10 fr. 50; demi-bouteille, 6 fr. 70 ; quart, 4 fr. 75.

Bien spécifier la marque « Pampryl ».

Société du PAMPRYL

29, rue Tronchet, PARIS. — Tél. : Anjou 26-57.

PANBILINE

Formes. — Pilules et Solution.

Définition. — La Panbiline, spécifique total des *Maladies du Foie* et des affections qui en dérivent, agit simultanément sur la sécrétion hépatique et sur l'excrétion biliaire.

(Voir *Rectopanbiline*.)

Composition. — Elle associe synergiquement les Opothérapies Hépatique et Biliaire avec les meilleurs Cholagogues sélectionnés et réunit, en milieu glyciné: Extrait hépatique, extrait biliaire intégral, extrait de Boldo, podophyllin (traces). La Panbiline n'est ni toxique ni irritante, et ne contient ni sucre, ni alcool.

Indications. — Insuffisances hépatique et biliaire, Lithiase biliaire (Coliques hépatiques, Ictères), Hépatisme-Arthritisme, Cholémie familiale, Diabète par Dyshépatie, Artériosclérose, Tuberculose et Lymphatisme justiciables de l'Huile de Foie de Morue, que la Panbiline remplace. Dyspepsies, Hyperchlorhydrie, Entérite mucomembraneuse, Constipation, Appendicite, Fièvre typhoïde, Intoxications, Infections, Névroses, Troubles de la grossesse, Dermatoses par dyshépatie, Maladies des pays chauds, Congestions du foie, Hépatites et Cirrhoses (Alcool, Paludisme, Syphilis).

Doses moyennes. — 6 pilules de Panbiline ou 6 cuillerées à café de Panbiline liquide par jour, au début des repas. Demi-dose pour les enfants.

Prix au public :

12 francs la boîte de pilules de Panbiline.

17 francs le flacon de Panbiline liquide.

Laboratoire du Docteur PLANTIER

ANNONAY (Ardèche).

PANCALCION

Chlorure de Calcium d'action rapide.

Composition. — Solution titrée de *chlorure de calcium* cristallisé, stable et pur. 80 gouttes (1/2 cuillerée à café = 1 gr. de CaCl_2).

L'adjonction de traces d'halogènes et de PH. qui sont les satellites habituels du CaCl_2 dans l'organisme lui assure une orientation biologique qui explique sa rapidité d'action (ils fixent le calcium à la lumière des catalyseurs).

Indications. — *Récalcifiant* : croissance, rachitisme, fractures, lymphatisme, tuberculose, grossesse, allaitement. *Anti-hémorragique* : Préventif et curatif de toutes les hémorragies. *Diurétique-déchlorurant* : pleurésie, ascite, œdèmes, néphrites, albuminuries. *Anti-anaphylactique* et *redressant humoral* : accidents du sérum, urticaire, asthme, spasmophilie, tétanie.

Doses. — Se souvenir que 80 gouttes = 1 gr. de CaCl_2 .

Dose quotidienne pour adultes, à prendre dans un peu d'eau sucrée avant les repas.

Recalcifiant : 1 gr. (2 fois 40 gouttes).

Hémostatique : 2 à 4 gr. (4 fois 40 gouttes ou 4 fois 80 gouttes).

Diurétique-déchlorurant ou anti-anaphylactique : 3 à 6 gr.

Enfants : 5 à 20 gouttes par année d'âge suivant cas.

Prix : 16 francs.

Laboratoire LEBRUN

155, boulevard Magenta — PARIS (IX^e).

Tél. : Trudaine 50-34.

PANCARBO HARDY

Charbon Polyvalent activé

Deux formes :

Granulé fondant. — Comprimé friable.

Association des trois charbons actuellement employés en thérapeutique animal, végétal, végétal activé (acti-carbone)

| | Granulé | Comprimé |
|-------------------------------------|---|--|
| | 1 cuillerée à café contient environ 0 gr. 90 de charbon polyvalent. | Chaque Comprimé est dosé à 0 gr. 45 de charbon polyvalent. |
| Charbon végétal | 0 gr. 25 | 2 Comprimés correspondent à une cuillerée à café de granulé. |
| Charbon activé (acti-carbone) | 0 gr. 25 | |
| Charbon animal pur | 0 gr. 40 | |
| Formine | 0 gr. 10 | |
| Carbonate de Chaux | 0 gr. 10 | |
| Bromure de Sodium | 0 gr. 10 | |
| Teinture de Belladone | 2 gouttes | |
| Essence de Menthe et d'Anis | Q. S. | |
| Sucre | | |

Indications. — Toutes les infections et intoxications gastro-intestinales, anti-acide. Sédatif des algies gastriques et intestinales. Digestions difficiles ou douloureuses.

Posologie. — Après chaque repas, croquer à sec ou diluer dans un peu d'eau 1 à 2 cuillerées à café de granulé ou 2 à 3 Comprimés.

Prix. — 12 fr. la boîte de granulé ou de Comprimés assurant huit à dix jours de traitement normal.

Laboratoires Paul HARDY

Docteur en Pharmacie, Ancien interne des Hôpitaux

42, boulevard Saint-Marcel — PARIS (V^e). Tél. : Gobelins 36-96

PANCRÉANNE

Composition. — Association de poudre de pancréas, pancréatine, tanin, sous forme de comprimés.

Action thérapeutique. — Assure la digestion totale des différentes sortes d'aliments, régularise la sécrétion intestinale, excite la sécrétion interne des Îlots de Langerhans.

Indications. — Dyspepsie. — Entérites. — Insuffisances digestives. — Diabète (cure d'entretien et de remplacement de l'insuline injectable).

Mode d'emploi. — 2 à 3 comprimés à la fin des repas.

Prix au public : 15 fr. 80.

Laboratoire des VALÉROMENTHOL

10, rue Poncelet — PARIS.

Tél. : Wagram 37-58.

PANCRÉASTASE DEFRESNE GRANULÉE

Caractéristiques. — Suc duodéno-pancréatique total activé maltasé à 5 p. 100. Ne contenant ni pulpe, ni déchet et présenté sous forme de granulés protégés par un enrobage spécial.

Indications. — Digestions difficiles et prolongées. Troubles de l'assimilation : croissance insuffisante, amaigrissement, accidents anaphylactiques, urticaire, eczéma, réactions sériques.

Chez le nourrisson. — Traitement de l'intolérance au lait de vache, de l'athrepsie, du rachitisme, par la technique de prédigestion du lait au moyen de la Pancréastase.

Aucune contre-indication.

Doses. — *Enfants* jusqu'à 6 ans : 2 à 6 cuillers-mesures par jour. *Grands enfants* ou *adultes* : 6 à 12 cuillers-mesures par jour.

Prix : 15 francs.

Littérature et échantillons

Laboratoires DEFRESNE
19, rue Jacob — PARIS.

PANCRÉATOSE IDON

| | |
|-----------------------------------|------|
| Cl7 H19 AzO ³ HCl..... | 0,50 |
| Na Cl | 30 |
| Carb. Ca..... | 50 |
| Lactose | 30 |
| Pancréatine..... | 25 |
| Mg | 15 |
| Na H CO ³ | 850 |
| Essence d'Anis..... | 1 |

Poudre, cachets et granulés cacaotés à base de pancréatine, lactose, magnésie, chlorure de sodium, essence d'anis et un calmant.

Indications. — Maladies d'estomac, du foie et des intestins.

Gastrite, gastralgie, urticaire, fermentations intestinales, dermatose aérophagie, auto-intoxication, insuffisance hépatique.

Posologie:

Poudre : 1 cuillerée à café avant ou après les principaux repas dans de l'eau.

Cachets : 1 cachet avant ou après les principaux repas dans de l'eau.

Granulé : 1 cuillerée à soupe avant ou après les principaux repas dans de l'eau.

Prix : Poudre et cachets : 10 fr. au public.

Granulé : 14 fr. au public.

Laboratoire Idon BLOCH *

Docteur en Pharmacie.

89, rue Saint-Georges — NANCY (M. et M.).

PANCREBILE

Composition :

| | |
|--|------------------------------|
| <i>Pancréas</i> total (ext. spécial) | 0 gr. 10 |
| <i>Bile</i> dépigmentée, décholestérinée | 0 gr. 20 |
| <i>Glandes del'intestin</i> (ext. pulv.) | 0 gr. 05 |
| <i>Oléate de soude</i> | 0 gr. 05 |
| <i>Podophyllin</i> (peltatum) | 0 gr. 004 |
| <i>Carbonate de chaux</i> | Q. S. p. 1 dragée glutinisée |

Propriétés. — Stimulant hépato-pancréatique, Cholagogue, Anti-infectieux, Laxatif doux.

Indications. — Foie, Intestin, Constipations, Dermatoses.

Posologie. — 1 à 2 dragées avant ou après les repas. Avaler sans croquer. Constipations : 3 à 4 dragées le soir au coucher.

Nota. — PANCREBILE n'est pas un purgatif irritant, mais un cholagogue doux. Son action est augmentée par la présence du carbonate de chaux qui neutralise l'Acidité et dont le Calcium agit comme Auxoferment ou Zymosthénique.

PANCREBILE s'administre 1 heure avant les repas si on cherche un effet excito-sécrétoire; 1 heure après, si on veut suppléer à la sécrétion pancréatique déficiente.

Prix : 14 francs.

Laboratoire du Docteur E. AUBERT

3, place Jussieu — PARIS (V^e).

Approvisionnement pharmaceutique

et Dépôts France : O. C. P. — PARIS.

Afrique du Nord : PELISSARD — ALGER-CASABLANCA.

PANCRÉPATINE LALEUF

Capsules glutinisées.

Composition. — Extrait spécial de *Pancréas* activé par addition de *Suc hépatique* et analgésine. Chaque capsule contient 25 centigrammes de principes actifs.

Propriétés et indications thérapeutiques. — Opothérapie du *Diabète* par médication interne. Sous l'influence de la Pancrépatine, on remarque :

- 1° Abaissement de la Glycémie ;
- 2° Abaissement et disparition totale fréquente de la Glycosurie ;
- 3° Disparition de la Polyphagie et retour à un appétit normal ;
- 4° Disparition des troubles secondaires, soif, polyurie, prurit, etc. ;
- 5° Amélioration rapide de l'état général.

Mode d'emploi et doses. — Les capsules de Pancrépatine Laleuf doivent toujours être prises au cours des repas. De 6 à 12 capsules par 24 heures suivant prescription médicale.

Etui de 100 capsules : 24 francs.

Laboratoires LALEUF

51, rue Nicolo — PARIS (XVI^e).

PANCRINOL

Complexe d'extrait désalbuminé et délipéidé de foie, rate, rein et surrénale.

Indications. — Toutes les anémies, anémies banales ou secondaires, en particulier celles s'accompagnant d'état asthénique. — Toutes les convalescences des maladies aiguës ou infectieuses. — Toutes les dépressions physiques ou nerveuses, le surmenage, etc.

Action. — Reprise de l'appétit, réapparition des forces, augmentation du nombre des globules rouges et du taux de l'hémoglobine, élévation du poids.

Posologie :

Adultes : 2 à 4 ampoules de 7 cc. par jour.

Enfants : 1 à 3 ampoules de 3 cc. ou cuillerées à café de sirop par jour.

Présentation :

Adultes : Boîte de 10 ampoules de 7 cc. : 18 francs ;
— 30 ampoules de 7 cc. : 48 francs.

Enfants : Boîte de 12 ampoules de 3 cc. : 12 francs.

Le flacon de sirop : 18 francs.

Laboratoires du Docteur DÉBAT

60, rue de Monceau — PARIS (VIII^e).

PANDRÉNALINE JULIEN

Gouttes.

Composition. — Extrait *total* désalbuminé et stabilisé de *glandes surrénales* contenant, en solution *exactement titrée et stable* :

— Un pour mille d'adrénaline *naturelle* extraite de la zone médullaire.

— Tous les *principes extractifs* antitoxiques contenus dans la zone corticale.

Indications. — *Insuffisances surrénales* au cours des maladies infectieuses et toxiques, *asthénies* et *états neurasthéniques*, *hypotension*, *collapsus* et *choc*, *affections digestives*, *vomissements gravidiques*, *hémorragies*, *intoxications aiguës*.

Posologie. — Exactement la même que la solution d'adrénaline au 1/ 1 000^e : V à XXX gouttes.

Prix : 12 fr. 50. — Flacon gratuit sur demande.

Louis JULIEN, Docteur en Pharmacie,

105, rue de Rennes — PARIS (VI^e).

PANFÉBRINE

Médicament de la fièvre et de toutes les fièvres.

Stimulant les fonctions hépatique, biligène et splénique, sans action déprimante sur le cœur.

Traitement du paludisme : Panfébrine AB.

Spécifique de toutes les pyrexies : Panfébrine B.

1° Panfébrine B (toutes fièvres).

Composition. — Alcaloïdes totaux hydrogénés des Cinchonas. Opothérapie hépatique, biliaire et splénique.

Son rôle. — Antithermique dans toutes les *pyrexies*.

Action. — 1° Apyrétique énergique chez tous les tuberculeux fébricitants ;

2° Maladies infectieuses (grippe, dothiéntérie, scarlatine, etc., et phlegmasies de toutes sortes).

Posologie. — Un cachet-comprimé de Panfébrine B dès que la température est à 38° ou au-dessus (peut être renouvelée 2 à 4 fois en 24 heures).

Prix : le tube de 10 *cachets*, 10 francs.

2° Panfébrine AB (paludisme).

Composition. — Panfébrine A : Acide méthylarsinique $As = O-CH^3 (OH)^3$. Alcaloïdes totaux hydrogénés des Cinchonas. Opothérapie hépatique, biliaire et splénique.

Panfébrine B : Composition indiquée ci-dessus.

Son rôle. — Action spécifique dans le paludisme (n'occasionne jamais d'accidents quiniques).

Avantage. — Innocuité absolue.

Posologie. — Préventif : 1 cachet-comprimé A le matin, 1 cachet-comprimé B le soir. — Paludisme aigu et chronique : 3 cachets-comprimés A et 3 cachets-comprimés B par jour. — *Enfants* : 12 ans, 2 cachets-comprimés A et 2 cachets-comprimés B par jour ; de 7 à 8 ans, 1 cachet-comprimé B par jour.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des médicaments, sous les n^{os} 586-11 et 586-12.

Prix : la boîte de 40 *cachets*, 25 francs.

Echantillons et littérature :

Laboratoires DORANTOWICZ

17 bis, avenue Parmentier — PARIS (X^{le})

Tél. : Roquette 14-12.

PANGADUINE

Bloc total de Vitamines et Principes actifs des Foies de Morues.

Composition. — La *Pangaduine* contient tous les alcaloïdes, phosphoglycérides, lécithines, vitamines et principes actifs des foies de morue.

Elle permet d'absorber, sous un petit volume et sous une forme de goût très agréable, la valeur d'une grande quantité d'huile de foie de morue.

Indications (Fatigue générale). — Les indications de la *Pangaduine* sont celles de l'huile de foie de morue que peu d'enfants et de grandes personnes tolèrent.

C'est le médicament par excellence des enfants et des jeunes gens déprimés par une croissance difficile ou trop rapide, des neurasthéniques, des convalescents et de toutes les personnes fatiguées par un travail excessif ou pour toute autre cause. C'est le médicament à prescrire dans l'insuffisance hépatique.

Action. — La *Pangaduine* agit :

1^o Comme stimulant de la nutrition et de la circulation ;

2^o Comme diurétique.

Au bout de quelques jours de traitement on remarque toujours le retour de l'appétit et la reprise des forces.

Deux formes agréables et actives :

Adultes : Pangaduine Elixir : 1 verre à liqueur avant chaque repas.

Prix : 18 francs.

Enfants : Pangaduine granulée. 1 à 2 cuillerées à café avant chaque repas selon l'âge.

Prix : 10 francs.

Docteur MARTINET

16, rue du Petit-Musc — PARIS (IV^e).

PANGASTROL

Pansement de l'Estomac.

Composition. — Kaolin, Bismuth, Belladone, Codéine, Carbonate de Chaux, Magnésie.

Forme. — Sachets de 10 grammes.

Propriétés thérapeutiques. — De par sa composition, le PANGASTROL réalise le pansement gastro-intestinal le plus parfait, et soulage rapidement les douleurs les plus aiguës.

Indications. — Hyperchlorhydries, Spasmes gastriques, Ulcères, Aérophagie, Dyspepsies, Diarrhées, Fermentations.

Prix : 14 fr.

Laboratoire STOULS

156, avenue Victor-Hugo — PARIS.

Téléphone : Passy 68-14.

PANGERMINE

Embryons de froment en paillettes.

Propriétés. — Eminemment assimilable pour enfants-adultes, convalescents, diabétiques. Contient tout le phosphore, tous les éléments reminéralisateurs, toutes les vitamines du blé.

Indications. — Tous les cas où il faut relever l'état général de l'organisme: *surmenage physique et intellectuel, anémie, convalescence, tuberculose, grossesse, allaitement.*

Mode d'emploi. — *Enfants:* 1 cuillerée à café 3 fois par jour. — Chez les *bébé*s une demi-dose.

Adolescents: 3 à 4 cuillerées à dessert par jour.

Adultes et vieillards: 3 à 4 cuillerées à soupe par jour. On peut l'absorber à sec ou délayée dans une cuillerée de potage ou de boisson quelconque froide ou tiède.

Présentation. — La PANGERMINE est en boîtes de métal et se conserve parfaitement.

Prix: 14 francs.

Laboratoire de la PANGERMINE

E. HAMEL

Docteur en Pharmacie

10, place Thiers — LE MANS (Sarthe).

PANGESTYL NARTY

Nature et action. — Le *Pangestyl Narty* est un produit mixte qui agit : 1° Par les antiseptiques et absorbants qu'il contient, comme désinfectant remarquable du tube digestif ; 2° par l'heureuse combinaison des ferments qui en font un digestif de tout premier ordre, d'où son nom :

PANGESTYL (*qui digère tout*).

Indications. — Dyspepsies, Hypo ou Hyperchlorhydrie, Stases gastriques, Dilatations d'estomac, Désinfection intestinale, Diarrhées. Excellent désinfectant du foie et de ses voies d'excrétion ; Coliques hépatiques, Ictère ou Jaunisse, Angiocholites, Cholécystites, etc.

Formes et Mode d'emploi. — *Granulés ou Cachets*. Une cuillerée à café de granulé ou un cachet à la fin des repas ou au moment des malaises dans une infusion chaude, café, tilleul, thé, camomille, etc.

Granulés : 15 francs.

Cachets : 12 francs.

Laboratoires Georges TINARD

134, boulevard Péreire — PARIS (XVII^e).

PANGLANDINE

Description. — Capsules glutinisées (50 par flacon) contenant une synthèse opothérapique : thymus, ovaires, rate, duodénum, hypophyse, capsules surrénales, thyroïde, pancréas, testicules, foie, prostate, parathyroïdes et moëlle rouge, en proportions physiologiques.

Action thérapeutique. — L'insuffisance fonctionnelle d'une glande à sécrétion interne, entraînant un surcroît de travail pour les autres, la médication opothérapique doit renforcer l'action des principales glandes en suppléant celle qui est déficiente et, par conséquent, comporter un mélange synthétique.

Indications. — 4 à 8 comprimés par jour dans le surmenage, la neurasthénie, les retards de croissance, les troubles de la puberté, le myxoedème, l'infantilisme, les troubles ovariens, la ménopause, l'obésité, la sénilité.

Prix : 25 francs

Laboratoires Ch. COUTURIEUX

18, avenue Hoche — PARIS.

PANIODE

Solution complexe alliant les propriétés de certaines plantes marines riches en iode et extraits végétaux agissant sur le système circulatoire.

Formule. — 15 p. 100 d'iode végétal associé à l'hamamélis et au marron d'Inde amer par la noix vomique, régulateur circulatoire par la teinture d'anémone.

Action. — Rétablit la circulation, entraîne dans le torrent circulatoire les toxines.

Posologie. — *a.* Stimulant général et excitant endocrinien 10 minutes avant les principaux repas dans un peu d'eau :

Enfants de 1 à 5 ans : IV gouttes 2 fois par jour ; de 5 à 10 ans : VI gouttes 2 fois par jour ; de 10 à 15 ans : X gouttes 2 fois par jour.

Adultes : XX gouttes 2 fois par jour.

b. Hypotension et Tr. circulatoires (varices, phlébites, hémorroïdes) : XX à XL gouttes 2 fois par jour.

c. Rhumatisme chronique (arthrite sèche) : XXV à XL gouttes 2 fois par jour pendant un mois, ensuite 20 jours par mois.

d. Surdit  chronique, bourdonnements, vertiges, troubles visuels. : XII à XVIII gouttes 2 fois par jour.

e. Troubles nerveux du c ur, angoisses : VIII à X gouttes 2 fois par jour.

Prix : 12 francs.

Enregistr  au Laboratoire National de Contr le des M dicaments sous le n  915-3. R gl ment    la Nationale R glementation.

Laboratoire du NASOPON et du PANIODE.

239, rue Paul-Bert — LYON.

PANLABYL

Extraits biliaires, Ferments lactiques, Pan-cr atine, Cynara Scolymus, Palicou ra.

Posologie. — 4 comprim s par jour un peu avant les repas, midi et soir.

En cas de dysenterie grav , la dose peut  tre augment e, sans inconv nient, jusqu'  10, 12 ou 14.

Indications. — Dysenteries, Dysenterie amibienne, Infection intestinale, Lithiase biliaire, Insuffisance h patique, Chol cystite, Angiocholite.

Ent rites   forme dysent rique.

Le tube : 10 francs. Traitement normal : 10 jours.

Laboratoire P. BASUYAUX

94, rue Pasteur

FONTENAY-S.-BOIS (Seine).

PANLYSINE

Composition :

| | |
|-----------------------------|----------|
| Papaïne..... | 0 gr. 15 |
| Pancréatine | 0 gr. 10 |
| Diastase | 0 gr. 10 |
| Bicarbonate de Soude... | 0 gr. 30 |
| Carbonate de Chaux | 0 gr. 10 |
| Condurango pulv. | 0 gr. 10 |
| <i>Charbon animal</i> | 0 gr. 10 |

Forme. — Cachets.

Propriétés. — Affections de l'estomac, Digestions pénibles.

Doses. — 1 cachet midi et soir après les repas avec une tasse d'infusion.

Prix : 15 francs.

Laboratoires LECONTE

7, rue des Petits-Carreaux — PARIS (II^e).

PANOSTYL

Régénérateur total

à base de sang pur de pur-sang boulonnais.

Renferme l'hémoglobine totale et les hormones en solution dans le plasma sanguin dilué-fluoruré.

Anémie, Tuberculose, Dénutrition, Croissance, Surmenage, Convalescences, Paludisme, Déchéances organiques.

Présentation. — Boîte de 6 ampoules. Voie buccale, réalisant l'opothérapie sanguine intégrale.

Posologie. — 2 ampoules par jour aux repas.

Aucune contre-indication.

Prix de vente au public : 18 francs.

Littérature et échantillons :

Pharmacie biologique

G. COMBASTEL, pharmacien,

F. RICHSHOFFER, successeur.

Fournisseur des hôpitaux.

57, rue Mathurin-Régnier — PARIS (XV^e).

PANSOLANÉE

Composition. — Extrait de belladone spécialement titré.

Indications. — Excellent médicament susceptible d'apaiser l'état nerveux des malades anxieux, quelle que soit l'origine de cette anxiété, elle est la médication apaisante par excellence en ce sens qu'elle apaise l'excitation nerveuse de ces malades en même temps qu'elle calme les douleurs qu'ils ressentent et leur rend confiance.

Mode d'emploi :

Ampoules : 1 injection sous-cutanée par jour.

Comprimés : 2 à 3 par jour.

Suppositoires : 1 par jour le matin ou le soir de préférence après une selle.

La boîte de 15 ampoules : 25 francs.

La boîte de 8 ampoules : 17 francs.

La boîte de 30 comprimés : 10 francs.

La boîte de 16 suppositoires : 30 francs.

La boîte de 8 suppositoires : 19 francs.

Laboratoires de la LIPOSEPTINE

2, place des Vosges — PARIS.

PANSTOMASE

Ampoules buvables

Méthodes de Castle et de Whipple associées.

Composition. — Extrait de foie de veau ; Extrait et suc frais de muqueuse d'estomac, d'antrum pylorique et de jejunum de porc. Renferme donc, à la fois tous les principes antianémiques et tous les ferments digestifs à l'état naissant, notamment la Pepsine et la Sécrétine.

Indications. — Toutes les Anémies, Cirrhoses du foie, Cholécystites, Tuberculoses, Achylies, Dyspepsies, Gastrites chroniques hypoacides, Entérococolites, Diarrhées.

Posologie. — Ampoules buvables de 5 cc. : 1 à 3 par jour, aux repas.

Prix de la boîte de 10 ampoules buvables de 5 cc. : 28 francs.

Laboratoires GENEVRIER

45, rue du Marché — NEUILLY (Seine).

PANTOPON « ROCHE »

Opium total injectable. — Tous les alcaloïdes de l'opium sous forme de chlorhydrates solubles et injectables.

0 gr. 01 de Pantopon « Roche »
= 0 gr. 50 ctg. de teinture d'opium,
= 0 gr. 025 mgr. d'extrait d'opium,
= 0 gr. 005 mgr. de morphine.

Posologie et modes d'emploi.

Voie buccale :

PANTOPON « ROCHE » SIROP

(dosé à 0,01 ctg. de Pantopon « Roche » par cuillerée à soupe.)

Adultes : 1 à 3 cuill. à soupe par jour et plus.

Enfants : 1 à 3 cuill. à café selon l'âge.

PANTOPON « ROCHE » COMPRIMÉS

(1 comprimé = 0,01 ctg. de Pantopon « Roche »).

Adultes : 1 à 3 par jour et plus.

Enfants : 1/3 à 1 par jour, selon l'âge.

Voie Hypodermique :

PANTOPON « ROCHE » AMPOULES

(1 ampoule = 1 cc. = 0,02 ctg. de Pantopon « Roche »).

Boîtes de 3, 6 et 12 Ampoules.

Adultes : 1 à 2 par jour et plus.

Enfants : 1/4 à 1/2 ampoule selon l'âge.

Indications thérapeutiques. — Toutes celles de l'opium, de la morphine et de leurs dérivés.

Enregistré au Laboratoire national de contrôle des médicaments sous les n^{os} 504-25 (*poudre*), 504-26 (*sirop*), 504-23 (*comprimés*); 504-22 (*ampoules*).

Produits

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}

10, rue Crillon — PARIS (IV^e).

PANVITA

Vitaminothérapie intégrale.

Composition. — Vitamines A, B, B', C, D, E, associées aux acides aminés nobles.

Propriétés thérapeutiques. — Agent d'équilibre et de résistance aux infections, favorise la croissance.

Mode de présentation. — Comprimés immédiatement solubles.

Indications. — Troubles de croissance, Prétuberculose, Convalescence, Toutes les carences.

Posologie. — *Nourrissons* : 2 comprimés par jour.
Enfants : 4. — *Adultes* : 6.

Prix : 18 francs.

Laboratoire A. DEFFARGE

Docteur en Pharmacie,

2, rue Lauzac — BORDEAUX.

PANXYLON LOGEAIS

Auto-défense de l'organisme par immunisation indirecte contre les infections aiguës, subaiguës et chroniques.

Injectons sous-cutanées ou intramusculaires atoxiques indolores et alternées de :

1° Cinnaméine (amp. A) :

| | |
|----------------------------------|----------|
| Cinnaméine totale du Miroxylon | |
| Pereirae..... | 0 gr. 10 |
| Oleum olivae neutrum deshyd..... | 5 cc. |

2° Campholine (amp. B)

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Camphorate de choline..... | 0 gr. 02 |
| Soluté physio stab. saturé de camphre | |
| droit..... | 5 cc. |

Pharmacodynamie :

La Cinnaméine totale LOGEAIS est extraite directement du Baume du Pérou, dont elle contient tous les principes actifs et naturels.

Elle est donc plus active que le seul Cinnamate de Benzyle préparé synthétiquement.

La Cinnaméine a une action immunogène et leucocytaire intense (Brown Séquard).

La Campholine joint à son pouvoir cholestérinogène une intense action toni-cardiaque et sympatico-tonique ainsi qu'une augmentation considérable des globules rouges. L'association de ces deux produits en une synergie médicamenteuse réalise l'auto-défense de l'organisme.

Indications. — Anémies, Asthénies, Convalescences médicales et chirurgicales, Etats infectieux des voies respiratoires, Fièvres éruptives, Gripes, Infections pulmonaires spécifiques ou non, Tuberculoses extra-pulmonaires, Fistules, Adénites, Périviscérités.

Mode d'emploi. — Une ampoule chaque jour en alternant les ampoules A et B. Dans les cas aigus, injecter simultanément les 2 ampoules A et B en des lieux anatomiques différents.

Avant injection, faire tiédir l'ampoule Cinnaméine.

Forme et prix au public :

| | |
|---|--------|
| 8 amp. 2 cc. 5 (4 amp. A, 4 amp. B) ... | 18 fr. |
| 8 amp. 5 cc. (4 amp. A, 4 amp. B)..... | 21 — |
| 12 amp. 5 cc. (6 amp. A, 6 amp. B)..... | 25 — |

Laboratoire Emile LOGEAIS

24, rue de Silly — BOULOGNE-SUR-SEINE

Tél. : Auteuil 40-15 et 40-16.

PAPAÏNE **de TROUETTE-PERRET**

Ferment digestif, énergique, extrait du suc du *Carica Papaya*, digère les produits azotés, *quelle que soit la réaction de l'estomac*, acide, neutre ou alcaline.

Indications. — Toutes les fois que l'on digère mal.

Pour les Adultes :

Elixir « TROUETTE-PERRET » à la *Papaïne*. Prix au public : 18 fr.
Un verre à liqueur après chaque repas.

Cachets « TROUETTE-PERRET » à la *Papaïne*. Prix au public : 14 fr.
Un à deux cachets à chaque repas.

Comprimés « TROUETTE-PERRET » à la *Papaïne*. Prix au public : 14 fr.
Deux à huit comprimés à chaque repas.

Pour les Enfants :

SIROP DE PAPAÏNE **de TROUETTE-PERRET**

Gastro-Entérite des nourrissons, Diarrhées, Vomissements.

Une demi ou une cuillerée à café avant ou après chaque repas ou tétée.

A souvent réussi après échec de toute autre médication. Prix au public : 18 fr.

Bien formuler : *Elixir, Sirop, Cachets, Comprimés de TROUETTE-PERRET, à la Papaïne.*

Laboratoires TROUETTE-PERRET

61, avenue Philippe-Auguste
PARIS (XI^e).

PAPAVERYL

Comprimés de Chlorhydrate de Papaverine chimiquement pur dosés à 4 centigrammes.

Toxicité très minime (le moins toxique des alcaloïdes de l'opium). Contrôle physiologique. Ne fait plus partie du tableau B.

Indications. — *Tous les spasmes musculaires lisses.* Résultats particulièrement remarquables dans : l'hypertension, l'angine de poitrine, les spasmes digestifs, l'entérocolite muco-membraneuse, les coliques hépatiques, néphrétiques, la constipation spasmodique, l'asthme, les toux spasmodiques (Coqueluche), le hoquet, la dysménorrhée, etc...

Posologie. — 2 à 6 comprimés par jour et plus (la toxicité chez l'homme est extrêmement faible); chez l'enfant, 1/4 de comprimé par année d'âge (1 centigramme). Mieux supporté et plus actif que la belladone.

Présentation. — Tube de 20 comprimés dosés à 4 centigr. par comprimé.
20 francs.

Boîtes de 6 et 12 ampoules de 2 cc. dosées à 2 centigrammes par cc.
15 et 24 francs.

Littérature sur demande. Thèse Baconnet 1927, Paris ; Rosenberg Mendel Wolf 1929, Paris.

Laboratoires ORRILLARD

245, rue de Vaugirard — PARIS.

Tél. : Suffren 78-88.

PAQUETS VÉDÉ

Antigastralgiques du Docteur de Montmorot.

Hyperchlorhydrie et affections du tube digestif.

Réalisant une chimiothérapie saturante totale de l'acidité gastrique. Les résultats obtenus ne sont nullement comparables à ceux enregistrés avec une poudre de saturation quelconque, les produits entrant en composition étant d'une pureté chimique absolue.

Hydrate de magnésie extra blanc de Carlo-Erba,
Bicarbonate de soude sursaturé raffiné d'Adrian,
Carbonate de chaux « Bador », Lactose H. M. S.,
Essence d'anis de France.

2 à 4 paquets par 24 heures aux repas.

Boîte de 15 paquets : 9 fr. 50.

Boîte de 30 paquets : 15 francs.

Boîte de 90 paquets : 39 francs.

Laboratoires VÉDÉ

2 et 4, place Gambetta — PARIS (XX^e).

PARADOLINE

Calmant, antispasmodique (*sans opium ni aucun sédatif narcotique*), cholagogue et diurétique.

Indications. — *a.* Suppression rapide de la douleur dans les affections hépatiques (Col. hépat.), Rénales (Col. néphr.), Génitales (Spasmes des accouchées), Rhumatismales.

b. Traitement polyvalent des manifestations arthritiques.

Forme et composition. — Bicarbonate et Salicylate de soude, Glycérine, Extraits d'Artichaut, de Romarin, Boldo, Buchu, Pichi, Piscidia, Uva-Ursi, Maïs. L'action sédative ne revient à aucun des composants en particulier, mais à leur combinaison.

La PARADOLINE *dragées* contient en outre de l'oléate de soude et de la bile décholestérinée. L'employer de préférence dans les cas rebelles. Exemptes de sucre, les dragées peuvent être prescrites aux diabétiques.

Posologie :

Cas aigus : (Coliques hépatiques et néphrétiques, Spasmes utérins, Douleurs urinaires, Rhumatismes) : au moment des douleurs, sans se préoccuper des repas, prescrire de 1/4 d'heure en 1/4 d'heure une dose, soit :

Elixir : 1 cuillerée à café dans 1/4 de verre d'eau.

Solution : 1 verre à madère de solution pure.

Dragées : 2 dragées avec un peu d'eau.

Maximum : 5 à 6 doses par jour.

Etats chroniques : (Traitement de cure et d'entretien) : pendant 2 ou 3 semaines par mois, prescrire 4 à 5 doses par jour, réparties dans la journée.

PARADOLEX

(PARADOLINE EXTERNE)

Liniment.

S'emploie en frictions concurremment avec la PARADOLINE interne ; renforce considérablement l'action de celle-ci dans les douleurs rhumatismales, rénales et utérines.

Elixir et Dragées : 15 francs. — *Solution* : 16 francs. —
Liniment Paradolex : 12 fr. 50.

Laboratoire CHEVILLON

99, rue de Paris — MASSY (Seine-et-Oise).

PARAGELOSE

Composition :

Emulsion pure d'huile de paraffine et de mucilages décellulosés. Goût agréable.
Sans phénolphtaléine, sans drastiques.

Indications :

Toutes les constipations, spasmes, etc...

Posologie :

Une à trois cuillerées à bouche par jour au moment des repas.

Prix du flacon : 18 francs.

Produits PASSEUR

11, rue de Clichy — PARIS

(Trinité 23-84).

PARALACTINE BYLA

Deux formes actives :

Comprimés sur lactose.

Culture pure sur lait.

Composition. — La *Paralactine Byla* est constituée par une culture de ferments lactiques, d'activité et de stabilité contrôlées.

Indications. — Entérites aiguës et chroniques des enfants et des adultes, eczéma, urticaire, acné, herpès, toutes affections de la peau, et tous phénomènes consécutifs à l'auto-intoxication d'origine intestinale.

Mode d'emploi. — *Comprimés* : 1 à 3 comprimés dissous dans un peu d'eau sucrée, froide ou tiède, trois fois par jour.

Prix : le tube, 12 francs.

Culture sur lait. — Quatre cuillerées à café par jour, délayées dans un peu d'eau lactosée.

Prix : 4 flacons, 16 francs.

Les Établissements BYLA

26, avenue de l'Observatoire — PARIS (XIV^e).

PARATHYROCALCINE

« MONCOUR »

REMINÉRALISATION

Fixation des SELS de CALCIUM
par l'utilisation, comme MORDANT,
de l'EXTRAIT TOTAL PARATHYROÏDIEN

Indications. — Prébacillose, bacillose, scrofule, convalescence, croissance, fractures, affections osseuses, décalcification dentaire, et, en général, toutes affections avec déminéralisation.

Notre Extrait total Parathyroïdien, élément essentiel de la médication, est préparé avec des glandes soumises à un contrôle histologique régulier.

Cachets : 1 à 3 par jour.

Comprimés : 2 à 6 —

Laboratoire MONCOUR

49, avenue Victor-Hugo — BOULOGNE-PARIS.

Tél. : Molitor 08-47.

PARATYRONE

Composition. — La Paratyrone est l'hormone parathyroïdienne, physiologiquement titrée (1 cc. = 20 unités).

Indications thérapeutiques. — La PARATYRONE est indiquée dans toutes les insuffisances parathyroïdiennes, soit dans toutes les tétanies et les états spasmophiles, l'ostéomalacie, les *ulcères digestifs*, les troubles trophiques cutanés, le *rhumatisme chronique*, les diarrhées des tuberculeux, etc...

Présentation et posologie. — La PARATYRONE est présentée en *flacons* de 5 cc. contenant 100 unités, soit 20 unités par cc. et en *ampoules* (boîte de 12) de 10 unités par ampoule de 1 cc. Une injection quotidienne de 1/2 à 1 cc., sous-cutanée.

Dans certains cas, il sera utile d'ajouter aux injections de PARATYRONE une cure par l'IRRASTERINE BYLA (ergostérine irradiée) dont on sait la puissance comme fixateur du calcium.

Prix. *Flacon* : 40 francs. — *Ampoules* : 55 francs.

Les Etablissements BYLA

26, avenue de l'Observatoire — PARIS.

PAROLAGAR

(**Marque déposée.**)

Le Parolagar est une émulsion perfectionnée de 65 % d'huile de paraffine et d'agar-agar

Formes thérapeutiques et indications :

N° 1. *Parolagar simple* (étiquette bleue).

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Huile de paraffine..... | 65 % |
| Agar-agar, eau distillée..... | 35 % |
| | <hr/> 100 % |

Traitement de choix de la constipation habituelle, doit être employé à la suite du Parolagar phtaléiné, lorsque l'habitude de l'évacuation à heure fixe aura été provoquée.

N° 2. *Parolagar phtaléiné* (étiquette rouge).

| | |
|------------------------------|----------------|
| Huile de paraffine..... | 65,00 % |
| Phénolphtaléine..... | 0,32 % |
| Agar-agar, eau distillée ... | 34,68 % |
| | <hr/> 100,00 % |

Renferme la dose prudente de 5 centigrammes de phénolphtaléine par cuiller à potage.

Indiqué comme traitement d'attaque de la stase chronique et surtout pour les malades ayant abusé de purgatifs. On lui substituera la forme simple dès que l'habitude de l'évacuation régulière aura été obtenue.

Posologie.

Adultes : Une cuillerée à soupe le soir, pendant le repas, ou matin et soir, si nécessaire.
Peut être pris dans de l'eau ou du lait.

Enfants : Une cuillerée à café ou une cuillerée à soupe. Peut être mélangé aux aliments ou au biberon.

Pas de suintement. Pas d'accoutumance.

LABORATOIRES DU PAROLAGAR

348, rue Saint-Honoré — PARIS.

PAROXYL

(Gouttes spécifiques contre la coqueluche.)

Le *Paroxyl* n'est pas toxique. Il ne renferme aucune substance vénéneuse, ni stupéfiante.

Propriétés thérapeutiques. — Action régulière et sûre.

Effet *non seulement calmant, mais curatif.*

Indications. — Coqueluche (nourrissons, enfants et adultes).

Pas de contre-indication.

Posologie. — 3 prises par jour (quel que soit l'âge du malade).

Trois prises par jour :

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Enfants de moins de 1 an | X à XXX gouttes. |
| — de 1 à 5 ans..... | XX à LX gouttes. |
| — de 5 ans et au-dessus.. | XX à C gouttes. |
| Adultes | XXX à C gout. |

Prix : 11 francs.

THIRIET et C^{ie}

26 et 28, rue des Ponts — NANCY.

PARVULA

Semences Laxatives.

(*Plantago Ispaghula* Roxb.)

Propriétés. — Ces semences, produit végétal naturel, fournissent dans l'intestin un mucilage abondant qui provoque des contractions péristaltiques et réveille la tonicité de l'intestin par action réflexe. Dépourvues d'action offensive sur la muqueuse, elles la lubrifient simplement.

Indications. — Le rééducateur intestinal, traitement rationnel de la constipation, laxatif de choix de la grossesse, des entéritiques, des malades à hypersensibilité intestinale, etc...

Posologie et mode d'emploi. — 3 à 5 cuillerées à café le soir avec le potage, ou le matin avec le petit déjeuner. Peuvent être également prises pures ou incorporées à de la confiture, purée de légumes, etc.

Prix : 12 fr. 75.

Echantillon gratuit sur demande.

Laboratoire A. BRUNSCHWIK

Pharmacien de 1^{re} classe.

3 bis, rue Vallier — LEVALLOIS-PERRET

PASSICARBONE

**Charbon animal purifié, Charbon végétal,
Charbon végétal activé.**

L'étude comparative des différents charbons utilisés en thérapeutique démontre que, suivant leur porosité, leur texture capillaire et leur origine, ils semblent avoir des propriétés variables d'absorption et d'adsorption. On a donc intérêt à associer les trois charbons. C'est à cette formule que répond le *Passicarbhone*.

La désinfection de l'intestin doit être plus l'œuvre de moyens mécaniques doux et prolongés que de moyens chimiques : l'emploi associé de dérivés phénolés, naphtolés ou méthylés risque à la longue de déclancher des typhlo-colites douloureuses. D'autre part, l'atteinte latente ou patente de la cellule hépatique ou rénale au cours des infections intestinales contre-indique l'action prolongée d'un désinfectant chimique illusoire, mais dangereux pour l'intégrité des parenchymes essentiels. Nous n'avons donc pas retenu l'association de nos charbons avec des désinfectants chimiques.

Usages :

Intoxications.

Affections stomacales : Gastrite infectieuse, Ulcère, Gastrite post-anesthésique, Gastro-entérite, Aéro-phagie, Pyrosis.

Affections intestinales : Colite ou Typhlo-colite, Colibacilloses, Diarrhées diverses, Entérite, Grippe à forme intestinale et états intestinaux toxico-infectieux, Fermentations intestinales.

Affections hépatiques : d'origine microbienne (Ictère etc.).

Doses. — 1 à 3 cuillerées à café après chaque repas
Prix : La boîte, 15 francs.

Laboratoires G. REAUBOURG

2, rue Boucicaut — PARIS (XV^e).

Bureau : 31, rue Saint-Georges, Paris (IX^e).

PASSIFLORINE

Traitement phytothérapeutique des états
névropathiques.

Composition. — Une cuill. à café contient
0 gr. 50 extrait fluide de *Passiflora incar-*
nata ; 0 gr. 25 extrait mou de *Salix Alba* ;
XX gouttes alcoolé de *Cratægus oxya-*
cantha.

Action. — La *Passiflore* diminue la tension
artérielle, régularise l'influx nerveux dans
le domaine du grand sympathique et est un
sédatif et un antispasmodique de premier
ordre.

Son action est renforcée et prolongée dans la
Passiflorine par le *Saule*, sédatif nervin
que les auteurs américains ont comparé
au bromure, et par le *Cratægus* dont l'ac-
tion tonicardiaque et équilibrante du sys-
tème nerveux est bien connue (Huchard,
Renon, H. Leclerc, etc.).

Indications. — Tous états névropathiques :
angoisse, anxiété, neurasthénie, etc. In-
somnie nerveuse, troubles fonctionnels du
cœur d'origine nerveuse (palpitations,
tachycardie, etc.), troubles nerveux de la
vie génitale, etc.

Posologie. — Comme médicament équil-
brant du système nerveux : une cuillerée à
café midi et soir avant les repas.

Contre l'insomnie nerveuse : une à trois
cuillerées à café le soir.

Prix : 15 francs.

G. RÉAUBOURG, docteur en pharmacie,
2, rue Boucicaut — PARIS (XV^e)

Bureaux : 31, rue St-Georges — PARIS (IX^e)

PASTA PALM

(Le laxatif appétissant.)

Forme. — Tablettes à mâcher.

Composition. — Essentiellement végétale : Figs, raisins, séné.

Propriétés pharmacodynamiques. — Purgatif, Laxatif, Dépuratif.

Indications. — Rééducation de l'intestin. Traitement physiologique de la constipation sous toutes ses formes, paresse intestinale.

Mode d'emploi. — *Dose laxative.* — *Adultes* : 1 à 1 tablette 1/2.
Enfants : 1/4 à 1/2 tablette,

Dose purgative. — *Adultes* : 1 1/2 à 2 tablettes. *Enfants* : 1/2 à 1 tablette.
On croquera la tablette, ou, si l'on veut, on la délaiera dans un peu d'eau ou de lait.

N. B. — A prendre de préférence avant de se coucher, l'effet se produisant de 8 à 10 heures après l'ingestion.

A conserver dans un endroit sec et frais.

L'étui de 15 tablettes : 12 francs (en France).

Dépôt général :

Pharmacie A. BAILLY

15, rue de Rome — PARIS (VIII^e).

PASTILLES M. B. C.

Chaque pastille correspond à la formule suivante :

Composition :

| | |
|---|--------|
| Chlorhydrate de cocaïne..... | 0,0002 |
| Stovaïne..... | 0,0003 |
| Menthol..... | 0,005 |
| Borate de soude..... | 0,02 |
| Chlorate de potasse..... | 0,06 |
| Sucre et gomme Q. S. pour une pastille de 1 gr, | |

Mode d'action. — Antiseptique, Anesthésique, Cicatrisant.

Indications. — Affections de la gorge (angines, amygdalites, laryngites, stomatites, etc...). — Désinfection de la bouche (fumeurs, haleine fétide, etc...). — Hygiène de la voix (chanteurs, professeurs, conférenciers, etc...)

Mode d'emploi. — 8 à 10 pastilles par jour.

Prix : 4 fr. 50

Etablissements GOY

23, rue Beautreillis — PARIS (IV^e).

PÂTE GINGIVALE A L'ACÉTYLARSAN

Préparation où se trouvent associés l'ACÉTYLARSAN, spirillicide bien connu et le ricinoléate de sodium, savon bactéricide, antitoxinique et générateur d'anti-virus.

Indications. — Traitement préventif et curatif des infections fuso-spirillaires, des gingivites et des stomatites aiguës ou chroniques. Traitement de la pyorrhée alvéolo-dentaire. Prévention de la carie dentaire.

Mode d'emploi. — Dans les cas de lésions pyorrhéiques étendues ou importantes, appliquer la pâte sur les gencives pendant 15 minutes 1 fois par jour, après brossage préalable à l'aide d'une brosse dure.

Dans les cas légers ou à titre prophylactique, employer la pâte gingivale comme une pâte ordinaire, suivant les règles habituelles.

Présentation. — En tube étain d'environ 50 gr.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

SPECIA

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

PÂTE MIREILLE

A l'extrait concentré de Sirop Mireille.

(Voir à *Sirop Mireille*.)

Mêmes propriétés : même composition (avec en plus : Stovaine et chlorate de potasse).
Même saveur plaisante.

Prix au public : 4 fr. 50 (exempt d'impôt).

LABORATOIRES LEGENDRE et C^{ie}.

Section D. S. — Houilles (S.-et-O.).

DÉPOT GÉNÉRAL :

France, Colonies et Protectorats :

O. C. P., 71, rue du Temple — PARIS (III^e).

Belgique : M. Ramlot, 72, rue de l'Escaut,
à Bruxelles-Maritime.

PATE SPECIA

**Granulée antidysentérique
selon la formule du D^r Ravaut.**

Indications. — Formes subaiguës et chroniques de la dysenterie amibienne, entérococolites cryptogénétiques.

Présentation. — Boîte de 150 grammes.

Posologie et mode d'emploi. — Cure de 20 jours : un jour sur deux 1 à 4 cuillerées à café de granulés aux deux principaux repas ; le jour intermédiaire, un sel arsenical : **Sanluol** (voir p. 1344) ou **Stovarsol** (voir p. 1462).

Société Parisienne d'Expansion Chimique
« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

PATHOLYSINE

(Traitement interne des néoplasmes.)
Deux formes : Ampoules et Pilules.

Composition. — Salicyl - arséni - oxybenzénol - magnésien.

Indications. — S'emploie dans tous les cas où le tissu conjonctif sous-cutané est intéressé, c'est-à-dire dans tous les cas de cancer, sauf le cancroïde.

Mode d'emploi. — 1^o Ampoules : Injecter quotidiennement une ou deux ampoules de 1 centimètre cube. En injections sous la peau de l'abdomen ou des membres ou en injections intramusculaires dans les muscles fessiers ou dans ceux de l'épaule.

2^o Pilules : Quatre pilules par jour, au moment des repas.

Prix : *Ampoules*, 20 fr.; *Pilules*, 15 fr.

LABORATOIRES A. LEJEUNE
142, rue de Picpus — PARIS (XII^e).

PAVÉRINOL LALEUF

(Capsules glutinisées.)

Composition. — Chaque capsule contient très exactement :

| | |
|------------------------------|-------|
| Papavérine chlorhydrate..... | 0,015 |
| Camphre monobromé..... | 0,15 |

Propriétés et Indications thérapeutiques. — Puissant stimulant respiratoire, cardiaque et circulatoire.

Le PAVÉRINOL dilate les vaisseaux coronaires, amplifie les contractions cardiaques, diminue l'excitation des fibres musculaires et en empêche la paralysie passagère.

Son emploi est recommandé dans les états infectieux et spasmodiques entraînant une insuffisance cardiaque.

Doses et mode d'emploi. — De 4 à 6 capsules par jour, suivant les indications du médecin traitant. Maximum : 10 à 12 dragées par 24 heures.

Etui de 60 capsules : 20 francs.

Laboratoires LALEUF

51, rue Nicolo — PARIS (XVI^e).

PAVÉRON DAUSSE

(Alcaloïdes totaux de l'Opium.)

Hypnotique, sédatif, analgésique.

Complexe alcaloïdique renfermant à l'état de chlorhydrates solubles tous les alcaloïdes de l'Opium.

0 gr. 02 de Pavéron = 0 gr. 01 de Morphine.

Action plus douce, plus régulière et plus durable que celle de la Morphine.

Indications. — Toutes les indications de l'Opium, de la Morphine et de ses succédanés.

Formes et posologie. — Ampoules de Pavéron dosées à 0 gr. 02 de Pavéron par cc.

Dose : 1 ampoule à la fois,

Prix : 6 ampoules : 16 francs. 12 ampoules : 25 francs.

Dragées de Pavéron dosées à 0 gr. 01 de Pavéron. —

Dose : 1 ou 2 dragées à la fois.

Prix : 15 francs.

Laboratoires DAUSSE

4, rue Aubriot — PARIS (IV^e).

PAXENE

Trois synergies phytothérapiques.

Sédatif Nervin : Valériane et Cypripedium.

Antispasmodique : Chaton de saule et Passiflore.

Cardiotonique : Cereus grand. et Aubépine.

Indications : Névropathies, Cardiopathies, Insomnies nerveuses.

Doses. — *Insomnies nerveuses* : 2 à 3 cuillerées à café le soir, pur ou dans un peu de tisane.

Nervosisme en général : 1 à 2 cuillerées à café à chaque repas.

Médication très active, agréable, non toxique et sans accoutumance.

Prix au public : 16 fr.

A. MILLET et CH.-O. GUILLAUMIN

5, rue Ambroise-Thomas — PARIS.

PECTINE OBERLIN

Une cuillerée à soupe contient :

| | |
|----------------------------------|----------|
| Benzoate de soude | 0 gr. 50 |
| Eau de laurier-cerise | 0 gr. 20 |
| Sulfogaïacolate de potasse | 0 gr. 50 |
| Sirop de morphine..... | 5 gr. |
| Sirop de punch..... q. s. p. | 20 gr. |

Indications. — Toutes les affections broncho-pulmonaires.

1 cuillerée à soupe 3 ou 4 fois par 24 heures.

Prix : 11 francs.

Laboratoire OBERLIN

17, rue Cadet — PARIS

J. TINARDON, Pharmacien de 1^{re} classe

PELVIFORMINE

Spécifique urinaire total. Prostatisme. Décongestif, antiseptique sédatif des voies urinaires : Reins, vessie, prostate, Urèthre.

Formule :

| | | | |
|---------------------|-----------|--|----------|
| Kawakawa poudre... | 0 gr. 05 | Extrait de jaborandi... | 0 gr. 01 |
| Théobromine..... | 0 gr. 05 | Extrait de piscidia.... | 0 gr. 02 |
| Phénacétine..... | 0 gr. 05 | Poudre de Gelsémium. | 0 gr. 01 |
| Caféine..... | 0 gr. 025 | Citrate d'hexaméthylène tétramine..... | 0 gr. 05 |
| Lupulin..... | 0 gr. 05 | Benzoate de soude.... | 0 gr. 10 |
| Bromure de camphre. | 0 gr. 05 | | |

Pour 1 comprimé.

Présentation : 50 comprimés : 16 francs la boîte.

Particularités. — Action diurétique, décongestive, essentiellement sédativ par ses composants (piscidia, gelsémium, bromure de camphre, lupulin), antiseptique (urotropine, benzoate de soude) ; non déprimante (caféine).

Emploi. — Doses faibles : 4 comprimés par jour aux repas. Doses fortes 8 à 10 comprimés.

Laboratoires du NORMOGASTRYL

(Spécifique gastrique total.)

J. OLIVE

14, rue des Minimes — PARIS.

O. C. P. Toutes Drogueries et Pharmacies.

PENGHAWAR DES ILES

(Hémostatique Végétal.)

Composition. — Penhgawar Djambi finement trié à la main.

Propriétés. — Hémostatique très sûr ; sans contre-indications, sans danger ; à effet très rapide.

Indications. — Hémorragies dentaires et nasales, Hémostase après applications de sangsues. Toutes coupures superficielles persistant à saigner.

Mode d'emploi. — Pratiquer une légère compression à l'aide de petits tampons sur les points hémorragiques.

Echantillons sur demande.

Prix au public : 4 francs.

D. RINGEADÉ, pharmacien.

FOSSEBOUDEAU-BLAYE (Gironde).

PENNÈS (Produits).

Sel de J.-A. Pennès :

« **Véritables bains de mer chauds.** »

Hygiénique, reconstituant, stimulant. Remplace les bains alcalins et ferrugineux et surtout les bains de mer.

Nouveau conditionnement en étui léger, souple, facile à vider, imperméable, assurant la conservation indéfinie.

Gynécologie. — Préventif des vergetures par assouplissement des fibres élastiques du derme — Stimule les nouveau-nés chétifs.

Prix : 4 fr. 25.

Vinaigre de J.-A. Pennès.

« **Le seul vinaigre antiseptique salicylé.** »

Hygiénique, désinfectant, rapport favorable de l'Académie de Médecine. Gynécologie. Antisepsie.

Prix : Flacon : 10 fr. 15 ; Litre : 60 fr. 15.

Laboratoires BOUTY

3, rue de Dunkerque. — PARIS (X^e).

Tél. : Nord 32-52 (2 lignes).

PENTALUÈS

Complexe arsenical pentavalent de toxicité pratiquement nulle, injectable par voie intra-musculaire ou sous-cutanée.

Indications. — Syphilis du nourrisson et du jeune enfant. Syphilis acquise.

Posologie :

Chez l'adulte : une injection de 3 à 5 cc., deux fois par semaine, selon le poids.

Chez l'enfant : deux injections par semaine de 1 à 3 cc.

Totaliser 12 injections par série.

Présentation et prix :

La boîte de 8 ampoules de 5 cc. Prix : 25 francs.
Ampoules de 1 cc. sur demande.

Echantillons et littérature :

Laboratoires SFÉAT

15, rue Catulienne — SAINT-DENIS (Seine).

PÉPIODON HENRY

Composition. — Combinaison de l'iode, avec les produits de dégradation moléculaire des protéiques, par la *trypsine* et l'*épepsine*. Chaque cc. contient 50 mgr. d'iode combiné.

Le Pépiodon est la combinaison idéale de l'iode parce que :

- 1° C'est un produit dérivant d'une hydrolyse trypsique et épepsique poussant la dégradation des peptones jusqu'à sa phase ultime, *acides aminés*. De ce fait, le *Pépiodon* est plus assimilable que les peptones iodées.
- 2° C'est un produit où l'iode y a un dosage toujours constant de 50 mgr. par cc.
- 3° Le *Pépiodon* n'est pas décomposé par le suc gastrique et n'irrite donc pas la muqueuse stomacale.

Doses. — *Adultes* : 20 à 60 gouttes par jour aux repas. Ces doses peuvent être augmentées ; certains médecins prescrivent 100 à 200 gouttes par jour sans la moindre intolérance.

Enfants : 5 à 10 gouttes et plus suivant âge.

Flacon de 45 gr. : 16 francs.

Laboratoires HENRY

39, rue de Sclessin — LIEGE.

PEPTALMINE

Peptones de Viande et de Poisson
Extraits d'Œuf et de Lait
Farine de blé dans l'enrobage.

Propriétés thérapeutiques. — Médication anti-anaphylactique polyvalente.

Indications. — Migraines, Urticaires, Troubles digestifs par assimilation défectueuse, Rougeurs de la face, Somnolences ou Pesanteurs après les repas, Colites, Asthme, Prurits, Eczémas et, en général, les diverses manifestations anaphylactiques.

Doses et mode d'emploi. — *Adultes* : 2 dragées ou 2 cuillers à café de granulés, *une heure avant chacun des trois repas*.

Enfants : Moitié de ces doses.

Prix au public : dragées : 15 fr. ; granulés : 15 fr.

Autorisé par les *Assurances Sociales*.

Laboratoire des Produits SCIENTIA

D^r E. PERRAUDIN, pharmacien

21, rue Chaptal — PARIS.

PEPTALMINE MAGNÉSIÉE

Peptones de viande et de poisson.

Extraits d'œuf et de lait.

Farine de blé dans l'enrobage.

Sulfate de Magnésie.

Propriétés thérapeutiques. — Médication anti-anaphylactique et cholagogue.

Indications. — Troubles digestifs d'origine hépatique, insuffisance hépatique, congestions du foie, cholécystites chroniques et toutes les manifestations anaphylactiques avec participation hépatique.

Doses et mode d'emploi. — *Adultes* : 2 cuillérées à café de granulés ou 4 dragées 1 heure avant chacun des 3 repas.

Enfants : moitié de ces doses.

Prix au public : dragées : 15 fr. ; granulés : 15 fr.

Autorisé par les *Assurances Sociales*.

LABORATOIRE

DES PRODUITS SCIENTIA

D^r E. PERRAUDIN, pharmacien

21, rue Chaptal — PARIS.

PEPTODIASE

Stimulant gastrique

Forme. — Gouttes.

Composition. — 1^o Association de :

Chlorure de calcium.

— magnésium.

— sodium.

sels qui stimulent la sécrétion et la motilité gastriques et augmentent considérablement le pouvoir digestif du suc gastrique.

2^o **Principes amers de la gentiane**, renforçant l'action des chlorures.

Propriétés thérapeutiques :

Réveille l'appétit.

Augmente la sécrétion et l'activité des sucs digestifs.

Accélère la digestion.

Favorise l'évacuation de l'estomac.

Indications. — Atonie gastrique.

Hypoacidité.

Hyposécrétion.

Digestion lente.

Aérogastrie.

Anorexie.

Posologie. — XXX gouttes dans un peu d'eau sucrée au début ou au milieu des repas.

Enfants : IV gouttes par année d'âge et par 24 heures.

Prix : 15 francs.

Laboratoires du Docteur ZIZINE

Docteur en Médecine — Docteur en Pharmacie — Ex-Interne en Pharmacie —
Lauréat des Hôpitaux, Lauréat des Fac. de
Méd. de Paris et Bordeaux.

24-26, rue de Fécamp — PARIS (XII^e).

Tél. : Diderot 28-96.

PEPTO-FER JAILLET

Composition. — Combinaison organique chlorée de peptonate de fer.

Avantages. — Le fer dans le PEPTO-FER du Dr JAILLET est *animalisé* par la peptone, ainsi l'organisme l'assimile-t-il avec une grande facilité ; le taux d'hémoglobine dans le torrent circulatoire est rapidement augmenté, sans aucune fatigue, ni pour l'estomac ni pour l'intestin. La peptone facilite la digestion et y apporte son rôle antianaphylactique.

Le PEPTO-FER du Dr JAILLET n'a pas la saveur styptique de la plupart des préparations ferrugineuses, mais son goût agréable le fait accepter favorablement par le malade ; de plus, il ne noircit pas les dents et ne constipe pas.

Indications. — *Anémies.*

Forme pharmaceutique. — Elixir.

Doses. — *Grandes personnes* : 1 verre à liqueur après chaque repas.

Enfants : 1 à 2 cuill. à café après les repas dans un peu d'eau.

Ce produit peut être prescrit aux bénéficiaires des Assurances sociales.

Prix : 14 francs au public.

DARRASSE

13, rue Pavée — PARIS.

PEPTOGIL

Peptones gastriques et pancréatiques.

Propriétés thérapeutiques. — Médication antianaphylactique polyvalente spécifique de tous les albuminoïdes.

Indications. — Urticaire, migraines, phénomènes congestifs qui suivent les repas, troubles du foie et de l'intestin et toutes manifestations anaphylactiques des enfants et adultes.

Conditions d'emploi. — 3 fois par jour 1/2 heure avant les repas, 2 à 4 comprimés.

Prix de la boîte : 16 fr. 50.

Laboratoires PROGIL

77, rue de Miromesnil — PARIS (VIII^e).

PEPTO KOLA ROBIN

Type du Médicament Aliment.

Liqueur très agréable contenant des glycéro. et de la Kola.

Dose et mode d'emploi. — 1 verre à liqueur avant chaque repas.

Indications. — Fatigues passagères physiques ou intellectuelles, Albumine, Diabète, etc.

Prix : 19 francs.

Laboratoires ROBIN

13, rue de Poissy — PARIS.

PEPTO-MAGNÉSIE VASSAL

Composition. — *Granulé de Peptones Polyvalentes* (de viande, d'oeuf, de lait, de gélatine, de poissons, de céréales) et de *Sulfate de Magnésie pur sec*, goût agréable.

Propriétés thérapeutiques. — Stimulant Hépatobiliaire, puissant Cholagogue qui agit efficacement sur le foie et les voies biliaires, puissant antianaphylactique polyvalent.

Indications et posologie. — Cholécystite, congestion du foie, Ictère, Entéro-Colites mucomembraneuses, Lithiase biliaire, constipation, asthme, urticaire, Eczémas, Vertiges et migraine.

1 à 3 cuillerées à café dans un 1/2 verre d'eau chaude, le matin à jeun.

Prix de la boîte : 18 francs.

Echantillons sur demande :

Aux Établissements Léon DANJOU

28, rue Hôpital-Militaire — LILLE.

PEPTOMALTONE DÉJARDIN

Préparée dans le vide à basse température donc sans destruction des vitamines.

Deux préparations :

A. Etiquette verte : sans œufs ni cacao.

B. Etiquette bleue : sans œufs mais aromatisée au cacao.

Indications. — Pour combattre toutes les déficiences de la nutrition, remédier aux déphosphatisations.

Posologie. — de 2 à 4 cuillerées à café par tasse, mais après refroidissement, à bonne température, du liquide choisi comme excipient, eau, lait, café ; préalablement bouilli.

Prix : 8 fr. 50 la boîte de 250 gr. environ.

Établissements DÉJARDIN

10, rue Parent de Rosan — PARIS (XVI^e).

PEPTONAL

Composition. — PEPTONE de viande totale rendue inaltérable par dragéification spéciale.

Action. — Le meilleur préventif de la migraine par action empêchante de la crise hémoclasique ; curatif de l'urticaire par atténuation des effets de la crise.

Indications. — Migraine, somnolence, frissons, lourdeur après les repas (crise hémoclasique atténuée). Urticaire.

Formes pharmaceutiques. — Comprimés dragéifiés. — Granulé.

Dose. — Deux comprimés 1 heure avant chaque repas, ou une cuiller à café de granulé.

Prix : 14 francs.

**Laboratoires DURET et REMY
et du Docteur Pierre ROLLAND
ASNIÈRES (Seine).**

PEPTONATE DE FER ROBIN

Combinaison définie de peptone, de glycérine et de fer.

Gouttes concentrées. Elixir. Vin.

Doses et mode d'emploi. — *Adultes* :

X à XXX gouttes ou 1 verre à liqueur d'Elixir ou de vin à chaque repas. *Enfants* :

I goutte par année d'âge 2 fois par jour.

Propriétés thérapeutiques. — Reconstitution du globule rouge du sang.

Indications. — Tous les états anémiques et chlorotiques.

Prix : *Gouttes* : 14 francs.

Elixir : 19 francs. — *Vin* : 22 fr. 50

Laboratoires ROBIN

13, rue de Poissy — PARIS.

PEPTONE VASSAL

Viande de bœuf digérée.

SÈCHE

Représente 12 fois son poids de viande de boeuf.

Cette Peptone, fabriquée d'après les dernières données scientifiques, est un produit remarquable tant par ses qualités organoleptiques que par sa richesse en matières directement assimilables. Cette Peptone a en outre l'avantage d'être d'un *prix modéré* qui en permet un usage prolongé.

Dose. — 3 cuillerées à soupe par jour dans le potage ou dans du vin de Malaga.

Chaque flacon de 50 gr. « Peptone » représente 600 gr. de viande de bœuf solubilisée.

 Echantillon gratuit sur demande.

Prix : 20 francs.

Etablissements Léon DANJOU

LILLE.

PEPTOSTHÉNINE CHOAY

Composition. — Association opothérapique digestive suivant formule :

| | |
|---------------------------|---------|
| Poudre gastrique | 15 cgr. |
| — entéro-pancréatique ... | 15 — |
| — hépatique | 15 — |
| — biliaire | 5 — |

Pour 1 cachet ou 1 comprimé de 50 cgr.

Indications. — Troubles dyspeptiques par insuffisance des glandes digestives.

Mode d'emploi. — Un cachet ou comprimé à la fin de chacun des principaux repas.

Prix : 15 francs la boîte de 24 cachets ou 30 comprimés.

Laboratoire CHOAY

48, av. Théophile-Gautier — PARIS (XVI^e).

Téléphone : Auteuil 44-09 et 44-10.

PERCAÏNE CIBA

Anesthésique local.

Chlorhydrate de la diéthylène-diamide de l'acide a-butyloxyinchoninique.

Anesthésique local à l'action très intense (10 fois celle de la cocaïne) et d'une très longue durée. Utilisable par injections et en surface. Médicalement son action analgésique est précieuse dans le traitement des états douloureux les plus divers.

Anesthésie par infiltration. — Solution de 1 à 2 p. 1.000, additionnée ou non d'adrénaline.

Anesthésie rachidienne. — Ampoules de 20 cc. à 1 p. 1500 (Jones), et de 2 cc. à 5 p. 1.000 (Quarella).

Anesthésie des muqueuses, du nez, de la gorge, de l'urètre, de la vessie: — Solutions de 1/1.000 à 2 p. 100 (oto-rhino-laryngologie).

Présentation :

Comprimés de 5 centigrammes pour la préparation extemporanée des solutions. Tube de 20 comprimés : 18 francs.

Ampoules de diverses contenances pour infiltration et rachi (demander notice).

PERCAÏNAL CIBA

Onguent analgésique et antiprurigineux.
à base de Percaïne.

Calme la douleur et la démangeaison dans toutes les lésions ou éruptions douloureuses de la peau et des muqueuses. Assure le repos et le sommeil; favorise la guérison des lésions muqueuses ou cutanées.

Indications principales. — Eczémas, prurigo, crevasses, gerçures, ulcères, zona, prurit anal et vulvaire, fissure anale, hémorroïdes, etc.

Le tube : 12 francs.

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND

109-113, Boulevard de la Part-Dieu — LYON

PERCALCINE

Composition. — Association d'arrhénal, de divers sels de chaux (en particulier du silicate) de fenugrec et de girofle. (Boîte de 30 cachets)

Propriétés thérapeutiques. — Reconstituant intensif, Augmente l'appétit, l'assimilation, le poids.

Indications. — Prétuberculose, tuberculose, anémie, déphosphatisation, carence calcique, dépressions nerveuses, Neurasthénie, Croissance difficile, faiblesse musculaire et osseuse, fractures.

Grossesse et allaitement.

Mode d'emploi :

A prendre 20 jours par mois.

Adultes : 3 cachets par jour au milieu des repas.

Enfants : au-dessus de 10 ans : 2 cachets ; de 4 à 10 ans : le contenu d'un cachet pris en 2 fois, aux repas de midi et du soir, mélangé aux potages, aliments ou confitures.

Prix : 16 francs.

Laboratoire du DELTA

84, rue de Rochechouart — PARIS (IX^e).

Tél. : Trudaine 45-18.

PÉRICOLS DU D^r LEGROS

Présentation. — Conglomérés à base de glycérine pouvant contenir tous médicaments, de forme discoïde, d'élasticité parfaite.

Avantages. — Entre en contact parfait avec la muqueuse du col utérin, épousant la forme des culs-de-sac. Fonte parfaite.

Composition. — Péricols bellado-iodurés ; au thigénol ; à l'ichtyol ; au collargol.

Et toute formule spéciale désirée par le médecin.

Indications. — Toutes les affections gynécologiques.

Prix :

La boîte de 6 : 16 fr. — La boîte de 20 : 38 fr.
inscrit aux Ass. Sociales

Laboratoires G. LESOURD

88, rue Duhesme — Paris (XVIII^e).

PÉRISTALTINE CIBA

Laxatif-eccoprotique.

Glucoside pur du *Rhamnus Purshiana* agissant exclusivement sur le péristaltisme, sans provoquer de coliques. Utilisable également par voie hypodermique (Ampoules de 1 cc. 1/2).

Indications. — Constipation chronique : formes atoniques et spasmodiques. Atonie post-opératoire : injecter préventivement 1 ou 2 ampoules après l'intervention.

Comprimés — Cachets — Ampoules.

Doses. — *Adultes* : 1 à 2 cachets, 2 à 4 comprimés, 1 à 2 ampoules. — *Enfants* : 1/2 à 1 1/2 comprimé, 1 cachet. — Injectée ou ingérée, la Péristaltine agit au bout de 10 à 15 heures.

La boîte de 20 cachets : 8 fr. 50.

Le flacon de 20 comprimés : 7 fr. 50.

La boîte de 5 ampoules : 18 francs.

La boîte de 20 ampoules : 65 francs.

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND

109-113, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.

PERLES TAPHOSOTE LAMBIOTTE FRÈRES

Perles gélatineuses contenant 0 gr. 25 de tannophosphate de créosote d'une irréprochable pureté et d'une parfaite tolérance gastrique.

Propriétés thérapeutiques. — Asséchant bronchique, bactéricide, sclérogène, modificateur des échanges respiratoires.

Indications. — Bronchites aiguës et chroniques, catarrhes, prétuberculose, tuberculose pulmonaire.

Mode d'emploi. — 5 perles par jour prises de préférence une à une, à tout moment de la journée. Dans les affections chroniques, procéder par alternance des périodes de cure (10 jours) et de repos (5 jours).

Prix : 14 francs.

Littérature et Echantillons :

Produits LAMBIOTTE FRÈRES

20, rue Dumont-d'Urville — PARIS (XVI^e).

124, avenue Rogier — BRUXELLES.

PERQUINOL

Composition. — Sulfate double d'Ortho-Oxyquinoléine et de potasse.

Antiseptique et anticryptogamique puissant, ni toxique, ni caustique, ne coagule pas les albuminoïdes. Détruit les microbes et inhibe leur action sur les tissus. Favorise le processus de régénération des tissus.

Principales indications :

Usage interne. (Dragées). — Troubles gastro-intestinaux (coliques, fermentations, dysenteries, etc...). Cholécystites, angiocholites, colibacillose, ictère infectieux, etc...

Usage externe. — Traitement des plaies infectées, Ulcères, blessures, brûlures, des affections vaginales et utérines, microbiennes. (Leucorrhée, Vaginite, métrites, etc...) Urétrites, colibacillose, pyélonéphrites, pyélites, cystites, angines. Affections dentaires, abcès, phlegmons, stomatites ulcéreuses, aphtes, etc.

Lésions cutanées de causes microbiennes et cryptogamiques.

Présentations :

Comprimés. — Tubes de 10 et 20 comprimés à 0 gr. 50, très solubles dans l'eau.

Ovules. — Pour pansements gynécologiques.

Pommade. — Pour O. R. L. et dermatologie à 0,5 p. 100 d'oxyquinoléine.

Posologie :

1 à 3 comprimés à dissoudre dans 1 litre d'eau. Lavages, pansements humides, gargarismes, instillations.

Pommade : — Applications, onctions renouvelées très souvent.

Dragées au Perquinol.

Usage interne.

Composition. — Ortho-oxyquinoléine.

Administré *per os*, le PERQUINOL est éliminé par les reins et les voies urinaires, sans être altéré, il garde donc toutes ses propriétés durant son passage à travers l'organisme.

Prix :

En flacon de 35 dragées à 0 gr. 10. Prix : 15 francs.

Posologie :

Adultes : 3 à 6 dragées par jour.

Enfants de 10 à 15 ans : 2 à 4 dragées par jour.

de 5 à 10 ans : 1 à 2 dragées par jour.

Laboratoires du PERQUINOL

J. E. PAGNIEN, Docteur en Pharmacie.

22, Cité Trévis — PARIS.

PERSODINE LUMIÈRE

Traitement de l'Hypo-nutrition et de l'Anorexie.

Constitution. — Préparation stable à base de Persulfates alcalins purs, établie par nos procédés spéciaux, sous forme de comprimés.

Propriétés. — Active le métabolisme général et crée le besoin de s'alimenter.

La PERSODINE LUMIÈRE réalise l'oxygénothérapie interne par la production d'oxygène naissant qui active dans une très large mesure les échanges nutritifs, accroît très notablement l'assimilation.

Les aliments ingérés avec faim sous son influence sont assimilés parce qu'ils répondent à une sollicitation organique profonde.

Indications. — Toutes anorexies, que l'étiologie en soit lésionnelle ou fonctionnelle.

Éviter l'usage de la PERSODINE LUMIÈRE chez les malades présentant une hyperchlorhydrie accentuée.

Doses courantes. — 2 fois par jour, un quart d'heure avant les repas, dans un quart de verre d'eau pure, non sucrée.

Adultes : 3 comprimés.

Enfants de 8 à 14 ans : 2 comprimés.

Enfants de 2 à 7 ans : 1 comprimé.

Formuler. — Flacon de comprimés de PERSODINE LUMIÈRE.

Prix : 9 francs.

LABORATOIRES LUMIÈRE.

45, rue Villon — LYON

PERUBORE (Comprimés)

Désinfectant rationnel des voies respiratoires.

Inhalations — Gargarismes.

Composition et forme. — Association d'essences balsamiques et de principes actifs de plantes, présentée sous forme de comprimés progressivement solubles.

Chaque comprimé contient

| | | | |
|--------------------------|-------|---------------------------|------|
| Baume du Pérou | 0 03 | Borate de soude | 0 60 |
| Essences aromatiques ... | 0 025 | Bicarbonate de soude | 0 30 |

Propriétés thérapeutiques. — Pansement antiseptique et sédatif du revêtement intérieur des voies respiratoires.

Indications thérapeutiques. — Rhumes, angines, toux, affections de la gorge, enrrouements, laryngites, trachéites, trachéo-bronchites, sinusites, coryza.

Posologie et mode d'emploi. — 1° *Inhalation* : à faire matin, midi et soir, de 1 à 2 comprimés dans un bol d'eau bouillante ou dans un inhalateur, respirer les vapeurs par le nez et la gorge pendant cinq minutes.

2° *Gargarisme* : à faire plusieurs fois par jour, un comprimé pour un demi-verre d'eau bouillie chaude.

Pulvérisation : dissoudre 2 à 3 comprimés dans l'eau du pulvérisateur à vapeur et faire une pulvérisation de 5 minutes.

Prix : 13 francs.

Laboratoires MAYOLY-SPINDLER

1, place Victor-Hugo — PARIS (XVI^e).

A Bruxelles : LE MARINEL, pharm., 4, avenue Orban Van Volxem.

PHAGOSTHYL

Sérum neurotonique, Cytophile, Hémopoiétique, Reconstituant, phagocytaire. (*Pour adultes.*)

Formule :

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Cacodylate de soude pur..... | 20 centigr. |
| — de magnésie pur..... | 10 — |
| Sulfate de strychnine..... | 2 milligr. |
| Soluté chloruré isotonique..... | 5 cc. |

Indications :

Tuberculose, Prétuberculose, Anémies, Asthénie Neurasthénie, Grippe, Convalescences, Paludisme, Dermatose, Tertiarisme, Etats cancéreux, Cachexies.

Emploi :

Une injection intramusculaire ou sous-cutanée tous les jours ou tous les deux jours au niveau de la cuisse ou de la fesse. Absolument indolore.

Se vend en boîtes de 12 ampoules de 5 cc.

Prix au public : 22 francs.

Laboratoires Biologiques André PÂRIS

4, rue de La Motte-Picquet — PARIS (XV^e).

PHAGOSTHYL MANGANÉ

(Exempt de strychnine.)

Formule :

| | |
|-------------------------------|------------|
| Cacodylate de manganèse | 2 centigr. |
| — de soude..... | 10 — |
| — de magnésie | 8 — |
| — de calcium | 10 — |

Eau distillée..... 5 cc.

Indications. — Carences, Dénutrition, Décalcification, Anémies, Asthénie, Convalescence des Maladies aiguës, Anergie grippale, Surmenage, Amaigrissement, Troubles endocriniens.

Emploi. — Une injection intramusculaire ou sous-cutanée tous les jours ou tous les deux jours, dans la région fessière, en prenant les précautions aseptiques d'usage.

L'injection des Phagosthyl est absolument indolore.

Se vend en boîtes de 12 ampoules de 5 cc.

Prix au public : 22 francs.

Laboratoires Biologiques André PÂRIS

4, rue de La Motte-Picquet — PARIS (XV^e).

PHAGURYL

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments, sous le N° 363-5.

Forme. — Dragées.

Composition. — Santalol β , Essence de Cèdre, Térébenthine, Salicylate de Phényle, Lupulin, Formine.

Propriétés pharmacodynamiques. — Antiseptique des voies urinaires, Décongestif, Balsamique et Diurétique.

Indications. — Blennorrhagie, Rétrecissements, Urétrites, Cystites, Prostatites.

Mode d'emploi. — Six, huit à douze dragées par 24 heures.

L'étui : 15 fr. (en France).

Laboratoires A. BAILLY

15, rue de Rome — PARIS (VIII^e).

PHARYNGASEPTYL

Composition. — Résorcine, Méthylpyrocatechine, Acides borique, salicylique, tartrique, benzoïque, Terpinéol, Cinéol, Myrthol, Pinènes et Polyterpènes purifiés.

Forme. — Poudre.

Indications. — Laryngites, Trachéites, Sinusites, Chordites, Fatigue vocale, Enrouement, Catarrhe tubaire, Stomatites, Pharyngites, Amygdalites, Angines diverses.

Posologie. — *Adultes* : 1 cuillerée à café dans un verre d'eau chaude, 2 à 4 fois par jour en gargarismes, bains de gorge, fumigations, inhalations, vaporisations, lavages et bain nasal.

Enfants : 1/2 cuillerée à café.

Prix : 15 francs.

Laboratoire des Vaso-Rhinol

20 bis, rue Gravelotte — TOULOUSE

PHARYNGOLÉINE

Composition. — Adrénaline, benzoate de soude, bromure de sodium, analgésine, alcool de menthe, glycérine neutre, eau de laurier cerise.

Propriétés. — Antiseptique, analgésique, décongestive.

Indications. — Toutes affections inflammatoires et microbiennes de la bouche et du carrefour aéro-digestif, stomatites, gingivites, aphtes, muguet, pharyngites, laryngites.

Posologie. — Une cuillerée à café dans un verre d'eau en bains de bouche ou gargarismes, ou en pulvérisations avec un pulvérisateur type Lucas-Championnière.
Pure en badigeonnages.

Présentation et prix. — Un flacon : 14 francs.

**Laboratoires de Thérapeutique
oro-rhino-laryngologique,**

72, rue de Bagneux — MONTROUGE (Seine).

Tél. : Alésia 02-41.

PHÉNACODINE

Composition. — Diéthylmalonylurée, Lactophénétidine, Codéine phosphatée. Hexaméthylène tétramine.

Forme. — Comprimés.

Mode d'action. — Hypnotique doux et inoffensif.

Indications. — Toutes les Insomnies : Insomnies nerveuses banales, Insomnies dues au surmenage, Insomnies de la neurasthénie, des diverses névroses, Insomnies causées par la douleur ainsi que dans les cures de désintoxication.

Mode d'emploi. — Avaler 1 à 4 comprimés avec de l'eau, 1 ou 2 heures avant de se coucher.

Prix : 20 francs.

Laboratoires des Produits VELY

132, avenue Victor-Hugo — PARIS (XVI^e).

PHILOGASTRINE

(Comprimés.)

Traitement dialytique des dyspepsies. Réalise la concentration optima du contenu gastrique. Assure l'évacuation pylorique.

Forme. — Comprimés de 2 gr. 50.

Composition p. 100 :

| | |
|---------------------------|----|
| Lactobiose | 90 |
| Citrate de soude..... | 2 |
| Bicarbonate de soude..... | 8 |

Emploi. — 2 comprimés dans 125 cc. d'eau tiède 2 heures après le repas, en une fois. Même dose, par gorgées, en cas de douleurs.

Indications. — Toutes dyspepsies.

Action rapide sur douleurs, aigreurs, brûlures, pesanteur, etc... Usage prolongé fait disparaître les troubles sécrétoires.

Prix : 10 francs.

Laboratoires REVEL

34, rue Saint-Lazare — PARIS (IX^e).

PHLEBOS

Forme. — Dragées et Gouttes.

Composition. — 2 dragées ou XV gouttes correspondent à : Intrait de marron d'Inde Dausse : 0,006. Extrait de Berberis : 0,20. Extrait de Ficaire : 0,20. Extrait de Seneçon : 0,20. Extrait d'anémone : 0,10. Extrait de noix vomique : 0,02.

Actions thérapeutiques. — Vasoconstricteur, périphérique énergique, sédatif puissant, régulateur, emménagogue, décongestif, hémostatique et tonique vasculaire.

Indications. — Spécifique des hémorroïdes, varices, ulcères variqueux, phlébites, hémorragies viscérales et utérines, hémoptysie, Dysménorrhée, Aménorrhée.

Posologie. — XV gouttes ou 2 dragées avant les deux principaux repas.

Prix : 15 francs (dragées et gouttes).

Laboratoire LAGOUTTE

85, cours Albert-Thomas — LYON.

PHLÉBOTONINE

Solution d'extraits fluides ou stabilisés agissant sur le cœur (gui, genêt, aubépine) et les vaisseaux (hamamélis, viburnum, cupressus, etc...).

Avantages. — Aucun trouble digestif et aucune toxicité.

Indications. — Troubles circulatoires, Varices, Phlébites, Hémorroïdes, etc.

Forme. — Liquide, flacon de 125 cc. pour un traitement de 10 à 12 jours.

Dose. — 1 cuillerée à café avant chaque repas.

Prix : 16 francs.

G. MARTINIE, Pharmacien

62, avenue Philippe-Auguste — Paris (XI^e)

Services commerciaux : 37, av. de l'Echo

SAINT-MAUR (Seine).

R. C. Seine 440-107.

Tél. : Roquette 86-84 ; Gravelle 04-32.

PHOSBIOSE

Sel magnésien de l'acide anhydro-méthylène diphosphorique.

Produit naturel retiré des céréales, le plus riche en magnésium des phosphates organiques végétaux.

Se dissout dans le suc gastrique.

Contient de 18 à 19 p. 100 de phosphore, associé intimement avec les ions magnésium et calcium et une molécule organique complexe dans des proportions sensiblement les mêmes que dans les céréales à l'état vivant.

Indications. — Troubles de la croissance, Rachitisme, Lymphatisme, Anémie, Tuberculose, Neurasthénie, Cancer, Convalescences longues et difficiles.

Présentation :

Granulé : la 1/2 boîte, 10 francs ; la grande boîte, 18 francs

Poudre pure : le flacon, 25 francs

Posologie. — Poudre (formules magistrales) : 0 gr. 50 à 2 gr. par jour ou une à 4 mesures de 0 gr. 25.

Granulé { *Bébés* : demi-cuillerée à café 2 fois par jour.
Enfants : 2 cuillerées à café par jour.
Adultes : 4 cuillerées à café par jour.

Laboratoires BOYER et Cie

12, rue Pavée — PARIS

PHOSCAMINE

**Granulé recalcifant hématogène,
Activateur de la nutrition.**

Principes actifs. — Glycérophosphates de : chaux, magnésie, fer et manganèse. Méthylarsinate de soude, acides aminés provenant de l'hydrolyse des hématies.

Indications. — Anémie, Convalescence, Tuberculose, Néoplasmes, Dyspepsie, Retard de développement et de croissance.

Doses :

Adultes : 2 cuillerées à café avant chaque repas.

Enfants : 1 cuillerée à café.

Prix : 12 francs.

Laboratoire MAUCHANT
à GENNEVILLIERS (Seine)

PHOSOFORME

Formes. — Solution, Solution arsénée, Gouttes.

Principe actif. — Acide éther éthylorthophosphorique.
Bibliographie : Professeur Cavalié, Bordeaux. — Prof. Escat, Toulouse. — Professeur Gérard, Lille. — Professeur Laignel-Lavastine, Paris. — Professeur Rémond, Toulouse. — Professeur Spillmann, doyen Faculté de Nancy, etc.

Indications thérapeutiques. — Etats dyspeptiques. — Neurasthénies. — Rhumatisme chronique. — Lithiases. — Convalescences : Grippe, etc. — Phosphaturie. — Asthénie. — Azotémies. — Nutrition des tuberculeux et prédisposés. — Dermatoses. — Alcaloses.

Mode d'emploi. — *Solution et solution arsénée :* 2 cuillerées à soupe par jour, chaque cuillerée dans un grand verre d'eau, de boisson, de vin blanc ou rouge sucré, à absorber au cours des repas.

Gouttes. — C gouttes midi et soir, prises comme ci-dessus.

Prix : 20 fr. le flacon ; 12 fr. le 1/2 flacon.

Durée : 12 à 15 jours.

Laboratoires DROUET et PLET
RUEIL-MALMAISON (Seine-et-Oise.)

PHOSOL

(Forme Elixir et forme Granulés)

PHOSOL ELIXIR

Composition. — Acide phosphorique officinal, Glycérophosphate de soude, Teinture de noix vomique, Extrait de ratanhia, Phosphate bicalcique, Vin kola muscat, Excip.

Indications. — Suralimentation, convalescence, croissance et anémie, surmenage, neurasthénie, amaigrissement, affaiblissement général.

Mode d'emploi. — Dans un grand verre d'eau ou de vin : 2 cuillerées à soupe par jour pour les adultes ; pour les enfants 2 à 3 cuillerées à café. A ne pas donner aux enfants au-dessous de 9 ans.

Prix : 13 fr.

PHOSOL GRANULÉS

Composition. — Sulfate manganèse, Acide phosphorique, Hypophosphite de chaux, Extrait quinquina, Extrait kola, Alc. oranges douces, Cacao, sucre vanillé.

Indications. — Suralimentation, convalescence, anémie, surmenage, neurasthénie, amaigrissement, affaiblissement général.

Mode d'emploi. — *Adultes* : 1 cuillerée à dessert à chaque repas.

Enfants : 1 cuillerée à café à chaque repas.

Prix : 13 fr.

Echantillons et littérature :

Laboratoire QUINET

143, rue du Temple — PARIS.

PHOSORINE

(Pommade nasale)

Forme pharmaceutique et composition.

— Pommade à base d'oxyde de Terpilène, camphre, alcool mentholique, essences végétales.

Propriétés. — Décongestionnante, antiseptique, calmante.

Avantages. — Très active et nullement irritante pour la muqueuse nasale.

Indications. — Toutes les inflammations du nez et du pharynx. Traitement préventif de toutes les épidémies.

Présentation. — En tube.

Prix : 7 fr. 50

Laboratoires C. VIDAL

46, rue de Grenelle — PARIS (VII^e).

PHOSOTE LAMBIOTTE FRÈRES

Phosphate de Créosote chimiquement pur, stable et complètement assimilable.

Propriétés thérapeutiques. — Puissant antiseptique, modificateur direct des lésions, antioxygène (met obstacle aux phénomènes d'autoxydation). Grand pouvoir asséchant. Tonifie l'organisme.

Indications. — Bronchite aiguë et chronique, broncho-pneumonie, grippe, prétuberculose, tuberculose pulmonaire.

Mode d'emploi. — 1° Injections intramusculaires profondes de 1 cc. tous les jours (ou 2 cc. tous les 2 jours, ou 3 cc. tous les 3 jours), par cures de 21 jours suivies de 9 jours de repos ; 2° Suppositoires dosés à 0 cc. 5 : 2 par jour. S'abstenir de recourir simultanément à la médication arsenicale.

Prix :

1 cc. : 17 fr. — 2 cc. : 20 fr. — 3 cc. : 22 fr. — supp. : 17 fr.

Littérature et Echantillons :

Produits LAMBIOTTE FRÈRES

20, rue Dumont-d'Urville — PARIS (XVI^e).

124, avenue Rogier — BRUXELLES.

PHOSPHARSOL

Composition. — Préparation phosphoarsénée organique combinée à la strychnine.

Indications thérapeutiques. — Reconstituant général dans l'anémie, la neurasthénie, l'impuissance, la tuberculose, etc.

Doses et mode d'emploi. — De 2 à 4 tablettes, en progressant, à chacun des deux principaux repas. *Ne pas dépasser ces doses.*

Prix en France : 12 fr. 50 la boîte.

Dépôt général pour le gros :

Laboratoires RICARDOU

Docteur en pharmacie

46, rue Pierre-Charron — PARIS (VIII^e).

Tél. : Elysées 76-48.

PHOSPHATE DE CHAUX DU DOCTEUR PINARD

Phosphate tricalcique extrait directement des os
en particules infinitésimales
en suspension dans un liquide isotonique.

Doses quotidiennes :

Adultes : 2 à 4 cuillerées à potage.

Enfants et Nourrissons : 2 à 4 cuillerées à dessert.

Prix : 13 francs le flacon.

PHOSPHATE DE CHAUX IRRADIÉ DU DOCTEUR PINARD

Phosphate de Chaux simple du Docteur Pinard
et ergostérine irradiée

(750 unités internationales par cuillerée à potage)

Doses quotidiennes :

Adultes : 2 cuillerées à potage.

Adolescents : 2 cuillerées à dessert.

Enfants : 2 cuillerées à café.

Prix : 17 fr. 50 le flacon.

90, boulevard St-Denis — COURBEVOIE-PARIS
(Seine).

PHOSPHATE VITAL DE JACQUEMAIRE

Glycérophosphates très purs qui ont servi aux expériences de M. le professeur Albert Robin. (Communication à l'Académie de Médecine du 24 avril 1894).

Forme et dose. — Solution gazeuse (de glycérophosphate de chaux) : 2 à 4 cuillerées à soupe par jour.

Propriétés et indications. — Double action reconstituante :

- 1° *Action reminéralisatrice* par l'apport du phosphore uni aux bases qui lui sont normalement associées dans l'organisme, sous la forme même — directement assimilable — adoptée par celui-ci.
- 2° *Puissante action stimulante sur la nutrition*, par l'intermédiaire du système nerveux et de tout le système glandulaire.

Prix du flacon : 16 francs.

J. BONTHOUX, Pharmacien.
Laboratoires FLUXINE
VILLEFRANCHE (Rhône).

PHOSPHATINE FALIÈRES

Se présente sous deux formes :

1^o *Spéciale*, sans cacao : Enfants du premier âge.

S'administre au biberon avec lait, eau, bouillon de légumes.

2^o *Normale*, aromatisée au cacao (3 p. 100) Sevrage, croissance.

Forme avec le lait une bouillie de digestion facile, d'assimilation parfaite.

La *Phosphatine* facilite la dentition, aide la formation des os, donne force et santé.

CHASSAING, LE COQ et Cie

1, quai Aulagnier — ASNIERES (Seine).

PHOSPHOBROM

Composition. — Bromure, Phosphate, Citrate alcalin.

Forme. — Granulé fondant soluble de goût agréable.

Mode d'emploi. — *Adultes* : 2 à 4 cuillerées à café par jour. *Enfants* : 1 à 2 cuillerées à café par jour selon l'âge.

Indications thérapeutiques. — Névropathie. — Fatigues nerveuses. — Neuroarthritisme. — Insomnies. — Palpitations des fausses cardiopathies. — Convulsions de l'enfance. — Dyspepsies nerveuses. — Aérophagie. — Menstrues douloureuses. — Vomissements incoercibles de la grossesse.

Laboratoire SERINDAT

22, rue Poncelet — PARIS (XVII^e).

PHOSPHO-FLUOR BEYNET

Reconstituant général aux phosphates organiques fluorés contenant aussi de la magnésie, du fer, de la silice dans les proportions où on les trouve dans l'économie.

Forme. — Granulé, cachets, comprimés.

Indications. — Différentes tuberculoses, rachitisme, ostéites, caries dentaires, grossesse, allaitement, anémie, convalescence, surmenage nerveux, phosphaturie

Dose et mode d'emploi. — Granulé : *Adultes* : 2 à 4 cuillerées à café par jour, pur ou dans un liquide.

Enfants de 3 à 10 ans : 1/2 dose.

Nourrissons : une pincée dans la bouillie.

Cachets ou comprimés : 2 à 4 par jour ; enfants 1/2 dose.

Chaque cuillerée à café de granulé de chaque cachet ou comprimé contient 0 gr. 50 de principe actif.

Prix actuel : 12 francs.

Envoi d'échantillons sur demande adressée à la

Pharmacie SEGUIN

165, rue Saint-Honoré — PARIS.

PHOSPHOGAIACOL MARY

Nature. — A base de sels calciques assimilables, avec addition de sulfogaiacolate de potasse et de nucléinate de manganèse.

Propriétés thérapeutiques. — Modification rapide des sécrétions bronchiques. Disparition de la toux, de l'expectoration, des engorgements ganglionnaires et du lymphatisme.

Forme. — S'emploie sous la forme de granulé très agréable au goût, à la dose de 2 à 3 cuillerées à café.

Prix : 15 francs.

Laboratoire

du reconstituant MARY

32, rue de l'Ouest — PARIS.

P. TAVERNIER, Docteur en pharmacie.

PHOSPHOGÈNE FAVRICHON

Aliment de croissance pour les enfants, le plus riche en phosphates assimilables.

Composition. — Froment de faible densité, trié, préparé, moulu sur meules et bluté modérément. On conserve ainsi la plus grosse partie des éléments minéraux. 7 p. 100 de légumineuses amènent le taux d'azote à son optimum et donnent un peu de sels métalliques (fer).

Indications. — Alimentation des enfants. Plus spécialement : rachitisme, retard à l'ossification. Femmes enceintes et nourrices (contre la déphosphatation).

Surmenés et convalescents.

Emploi. — 1 ou 2 potages par jour.

Littérature et échantillon sur demande :

Produits diététiques FAVRICHON

Pharmacien-chimiste

SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY (Loire).

PHOSPHOLÉOSE DEMASLES

Succédané de l'huile de foie de morue.

Reconstituant physiologique de goût agréable.

Composition. — *Phospholéose A* : Iode organique, tannin, phosphore, glycéro-arséniate de soude (nouveau sel d'arsenic organique). — *Phospholéose B* : Même composition, mais sans arsenic.

Indications. — Lymphatisme, pré tuberculose, anémie, croissance, adénopathies, convalescences.

Présentation. — Une seule forme : liquide.

Posologie :

De 3 ans à 6 ans : une cuillerée à café avant les 2 principaux repas.

Au-dessus de cet âge : une cuillerée à soupe avant les 2 principaux repas.

Phospholéose C. — Traitement arséno-mercuriel dissimulé associé à l'iode.

Composition :

Une cuillerée à soupe de PHOSPHOLÉOSE C contient : 0,01 de Hg + 0,001 de As + 0,10 d'iode + 0,10 de phosphate.

Posologie :

Adultes : 2 à 4 cuillerées à soupe ; *Enfants* : par cuillerées à café ;

Enfants jusqu'à 1 an : XX gouttes par 24 heures en 2 fois ;

Enfants de 3 à 8 ans : 1 cuillerée à café 2 fois par jour.

Prix : 14 fr.

Laboratoires DEMASLES

à VIENNE (Isère).

PHOSPHOMAGNÉSIUM

Composition. — Hypophosphite, glycérophosphate, carbonate, citrate de magnésium.

Mode d'emploi. — 3 comprimés par jour.

Indications thérapeutiques. — Le *Phosphomagnésium* protège et fortifie la cellule. Toutes les insuffisances physiologiques dues à la carence magnésienne.

Laboratoire SERINDAT

22, rue Poncelet — PARIS (XVII^e).

PHOSPHONINE SOULIÉ

(Solution et Gouttes.)

Composition. — Acide Phosphorique. Biphosphate de Chaux mielleux. Phosphate de Soude.

Indications. — Tonique de la cellule nerveuse centrale et périphérique, régulateur du système sympathico-glandulaire.

Asthénies, Surmenages physique et intellectuel, Convalescences, Anorexies.

Posologie :

Adultes (Prescrire *Solution*). 1 cuillerée à café dans un peu d'eau avant chacun des 2 grands repas.

Enfants : 1/2 ou 1/4 de dose suivant l'âge.

Nourrissons (Prescrire *Gouttes*) : 1 goutte par mois d'âge, 2 fois par jour dans un peu d'eau ou dans le lait des biberons.

Laboratoire COLONIAL

21, rue Mouton-Duvernet — PARIS (XIV^e).

Tél. : Ségur 77-70.

PHOSPHOPINAL-JUIN

Phosphore colloïdal assimilable en combinaison organique.

Indications. — *Reminéralisateur* : Maladies de la nutrition, tuberculose, convalescence, anémie.

Fixateur des sels de chaux. — *Aliment de la cellule nerveuse* : Maladies du système nerveux, dépression mentale, neurasthénie, surmenage, fatigue cérébrale.

Pas de contre-indication.

Formes et doses moyennes.

Capsules : adultes : 4 à 6 par jour.

 enfants : 2 à 3 par jour.

Elixir : adultes : 2 cuillerées à café par jour.

 enfants : 1 cuillerée à café par jour.

Gouttes : adultes : 40 à 60 par jour.

 enfants : 20 à 30 par jour.

Ces doses peuvent être doublées sans inconvénient.

LE PHOSPHOPINAL-JUIN se prend dans un peu d'eau ou de boisson froide.

Prix : 14 fr.

Laboratoire du PHOSPHOPINAL-JUIN

10, impasse Milord — PARIS.

Tél. : Marcadet 37-98.

PHOSTYL PY

Composition. — Acide orthophosphorique, Méthylarsinate de strychnine, Manganèse.

Propriétés. — Augmente le nombre des globules rouges et les enrichit par fixation de Fer. Donne le coup de fouet nécessaire à la remise en route et agit comme un tonique d'effet rapide et cependant durable. Puissant reminéralisateur, il arrête la Phosphaturie et permet la fixation de Ca-Na-K-Mg.

Indications. — Anémie générale et cérébrale, Neurasthénie, Dépression, Surmenage, Convalescence, Suites de grippe, Phosphaturie, Asthénie, Anorexie, Dénutrition des tuberculeux, Migraines.

Posologie :

Adultes XXV gouttes midi et soir.

12 à 18 ans XV — —

6 à 12 ans VI — —

Prescrire : **PHOSTYL PY** : 1 Flacon.

Prix : 15 francs.

Laboratoire PY

58, bd Richard-Wallace — PUTEAUX (Seine).

PHYLACTONE BYLA

Cachets et Granulé

Peptone spéciale à polyvalence protidique hautement différenciée, résultant du mélange de peptones de : viande, poisson, lait, oeufs.

Dose et mode d'emploi. — Un cachet ou une dose-mesure une heure avant les repas, dans un peu d'eau froide. *Enfants* : 1/2 dose.

Propriétés thérapeutiques. — Anti-anaphylactique par excellence.

Indications. — Migraines, Céphalées, Urticaires et tous états morbides relevant d'une intoxication alimentaire d'origine anaphylactique.

Phylactone magnésinée

(dragées, granulé.)

Drainage des voies biliaires.

2 à 4 doses-mesures dans 1/2 verre d'eau tiède, ou 4 à 6 dragées, le matin à jeun.

Prix : 15 francs.

Les Établissements BYLA

26, avenue de l'Observatoire — PARIS.

PHYLLA

DYN

Chlorophylle pure solubilisée.

Seul le pigment chlorophyllien pur, isolé *et solubilisé*, est actif et assimilable, contrairement à la chlorophylle des légumes verts, crus ou cuits.

Indications :

Hypotensions artérielles (idiopathique, permanente, symptomatique),

Acrocyanoses (adynamie circulatoire).

Anémies pernicieuses, anémies post-hémorragiques
(La chlorophylle relève le taux de l'hémoglobine et active les effets de l'opothérapie hépatique).

Anorexies des nourrissons — Anorexies des tuberculeux — (La chlorophylle augmente l'appétit sans altérer la muqueuse gastrique).

Asthénies — Surmenage — Convalescences (tonique dépourvu de toute toxicité).

Adynamie des Cancéreux et des Tuberculeux.

Hypotrophies — Rachitisme — Carences solaires.
(La chlorophylle sensibilise l'organisme aux radiations (X et U. V.) et à l'action des médicaments irradiés).

Néoplasmes — Cancers cutanés — Lupus.

Posologie :

XX à XXX gouttes avant les trois repas,
15 jours par mois.

Le flacon compte-gouttes : 18 francs.

Remboursable par les Caisses d'Assurances Sociales
(n° 734-2).

Société d'Applications pharmacodynamiques.

5 et 7, rue Claude-Decaen — PARIS (XII^e).

Tél. : Diderot 37-93.

PHYMO-STÉRYL LEISYN

(Perfectionnement du KOCH-i-CIDE LEISYN.)

Formuler : 1 boîte pilules **PHYMO-STÉRYL LEISYN** et 1 boîte ampoules intra-veineuses **PHYMO-STÉRYL LEISYN**.

Dans les cas graves ou pour les traitements rapides, formuler en outre 1 boîte ampoules **ÉLIMINATRICES PHYMO-STÉRYL LEISYN**.

Mode d'emploi. — Pilules : 2 à 5 au début de chacun des 3 repas quotidiens, soit 6 à 15 pilules par jour. Débuter par 6 pilules par jour. N'augmenter les doses que progressivement ; les diminuer en cas de diarrhée PERSISTANTE.

1 ampoule intra-veineuse tous les 2 ou 3 jours.

Comme traitement adjuvant de grande utilité, 1 ampoule intramusculaire tous les 2 jours ou 3 fois par semaine.

Présentation. — Boîte d'environ 300 pilules pour 1 à 2 mois 1/2 de traitement environ.

Boîte de 30 ampoules intra-veineuses de 2 cc. environ.

Boîte de 15 ampoules **ÉLIMINATRICES** pour injections intramusculaires, de 4/5 cc. environ.

Indications. — Tuberculoses de toutes natures, pulmonaire, osseuse, cutanée.

Action. — Médication extrêmement diffusible, paraissant dissoudre l'enveloppe ciro-graisseuse du B. K. et créant autour du bacille un milieu dans lequel il ne peut subsister. Hyper-antiseptique à l'égard du B. K. Action très rapide se manifestant par l'arrêt des expectorations. Stérilisation des foyers tuberculeux. Négativité des crachats. Baisse thermique. Liberté respiratoire. Aération auscultatoire. Augmentation de poids. Suppression des transpirations. Aucune toxicité. Aucune contre-indication. Aucun inconvénient.

Composition. — Ampoules de 2 cc. pour injections intra-veineuses : Yttrium, Samarium, Caesium. Non toxiques.

Pilules : Métaux précieux, Hg, Terres rares, Organates, Thymolates, Terpènes et Sulfonates polyvalents, Bornéine, Chlorure de Tétraméthylaminodiphénylpentazinium.

Ampoules éliminatrices : Magnésie, Chaux, Organates de potasse, Soude, Alumine, Albumine, Acides acétique et citrique.

Ces trois préparations sont hyperactivées par procédé électrique EVOO.

Echantillonnage. — Le prix de revient très élevé du **PHYMO-STÉRYL LEISYN** ne permettant pas l'échantillonnage gratuit, nous consentons, suivant nos disponibilités, à céder une seule fois à chaque médecin un traitement composé de :

1 boîte de pilules, 1 boîte d'ampoules intra-veineuses, 1 boîte d'ampoules éliminatrices,

pour la somme globale de 110 francs, plus frais de contre-remboursement s'il y a lieu.

Les Laboratoires LEISYN

1 bis, rue Molitor — PARIS (XVI^e).

Téléphone : Auteuil 14-73. — C. C. postaux : PARIS 1075-98

Adresse téléphonique : LABOLEISYN-PARIS.

PHYSIOSTHÉNINE

Admise dans les Hôpitaux de Paris.

Toutes infections graves.

Indications thérapeutiques. — Grippe, Angine, Broncho-Pneumonie, Fièvre Typhoïde, Fièvre Puerpérale et toutes les infections.

Injections intramusculaires, région rétro-trochanterienne au point de Barthélemy ; l'injection est indolore. Pas de réaction sérique. Pas de phénomène de choc. Toxicité nulle.

Formes. — Boîtes *Adultes* : 4 ampoules 20 cc.

Boîtes *Enfants* : 4 ampoules 10 cc.

Prix : 40 francs.

NÉO-PHYSIO

Toutes infections de moyenne intensité.

Forme. — Boîtes de 8 ampoules de 5 cc.

Prix : 22 francs.

Laboratoires DROUET et PLET

RUEIL-MALMAISON (Seine-et-Oise).

PHYSOCRISINE

Solutions de lobe post. d'hypophyse.

(Opothérapie Fournier : Endocrisines.)

1° *Ampoules de 1 cc.* (boîte de 5), usage obstétrical seul.

Prix : 25 francs.

2° *Ampoules de 10 cc.* (boîte de 3).

Injections intraveineuses toutes préparées. Trait. des Hémoptysies.

Prix : 25 francs.

Lab^{res} FOURNIER Frères

7, rue Biscornet — PARIS (XII^e).

PHYTINE CIBA

Tonique reconstituant dynamogénique.

Phosphate calco-magnésien naturel extrait des réserves végétales. Contient 22 p. 100 de phosphore en combinaison organique. Le plus assimilable des médicaments phosphorés. Tonique et reconstituant. Stimulant des échanges nutritifs et de l'hématopoïèse.

Indications. — Débilité constitutionnelle, Neurasthénie, Névroses, Surmenage sous toutes ses formes, Tuberculose, Chlorose, Anémie, Anorexie. Convalescences difficiles, Troubles de la grossesse et de la lactation, etc.

Doses. — *Adultes* : 1 gr. par jour (2 cachets, 4 comprimés, 2 cuillerées à café de granulé).

La boîte de 20 cachets : 14 francs.

Le flacon de 40 comprimés : 14 francs.

Le flacon de granulé : 16 francs.

Enfants : 1/4 ou 1/2 dose de l'adulte.

On peut aussi formuler la Phytine magistralement

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND

109-113, boulevard de la Part-Dieu — LYON

PHYTOGÉNINE BYLA

Composition. — Complexe bio-minéral et opothérapique, intégralement assimilable : Phytosphosphine, fluorure de sodium, nucléinate de manganèse associés à thymus, rate, surrénales, parathyroïdes, foie, moelle osseuse et os épiphysaire.

Propriétés thérapeutiques. — Reminéralisateur intensif, modificateur puissant des échanges nutritifs.

Indications. — Troubles de la croissance, tuberculose, rachitisme, dépression nerveuse, convalescences, phosphaturies, anémies et tous états de déchéance organique.

Dose et mode d'emploi. — *Granulé* : 3 cuillerées à dessert par jour, à croquer. — *Cachets* : 2 à 4 par jour. — *Comprimés* : 4 à 8 par jour. (*Enfants* : demi-dose).

Prix : 15 francs.

Les Établissements BYLA

26, avenue de l'Observatoire — PARIS.

PHYTOGYL

Granulé réminéralisateur.

Vitamine D cristallisée, d'origine végétale, chimiquement pure, associée à la Germine (phosphore, chaux, magnésium, assimilables).

Indications. — Toutes décalcifications ; anémies, convalescence, surmenage, dépressions nerveuses, états ganglionnaires, pré-tuberculose. Stimulant de la nutrition.

Présentation. — Granulé fondant au premier contact avec la muqueuse buccale, en flacon de 125 cc.

Une cuillerée à café contient 1/5 de mgr. de Vitamine D cristallisée et 10 cgr. de Germine.

Doses journalières :

De la naissance à 1 an : jusqu'à 1 cuillerée à café.

De 1 à 10 ans : 1 à 2 cuillerées à café.

Au delà de 10 ans et chez l'adulte : 2 à 3 cuillerées à café.

La cure peut être continuée pendant 2 ou 3 mois ; si elle a été interrompue, elle peut ensuite être reprise sans aucun inconvénient.

Prix au public : le flacon 15 francs.

Laboratoires du docteur ROUSSEL

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI^e).

PHYTO-LÉCITHINE

Médication phosphorée organique de l'anémie, la fatigue, les troubles nerveux, les croissances lentes, etc...

Propriétés thérapeutiques. — A toutes les propriétés de la Lécithine de l'œuf dont elle possède une composition globale identique, mais, d'origine végétale, extraite de graines oléagineuses, elle ne contient aucune substance capable de provoquer des phénomènes toxiques ou anaphylactiques.

Indications. — Particulièrement indiquée dans la convalescence d'affections aiguës ayant provoqué de l'amaigrissement et laissant derrière elles de la fatigue ; dans les surmenages de tous ordres, physiques ou intellectuels, dans les périodes de puberté et de grossesse.

Conditions d'emploi :

Pour enfants : 3 comprimés par jour.

Pour adultes : 6 comprimés par jour.

Prix de la boîte : 16 fr. 50.

Laboratoires PROQIL

77, rue de Miromesnil — PARIS (VIII^e).

PHYTOMENSYL

Médication végétale des troubles menstruels et des insuffisances veineuses.

Association harmonieuse d'extraits végétaux atoniques (*hamamélis, hydrastis, viburnum, marron d'Inde, anémone pulsatille*) présentée sous une forme agréable et facile à prendre (*gouttes*).

Indications. — Tous les troubles de la Menstruation : Aménorrhée, Dysménorrhée, Ménorragies.

Action complémentaire efficace dans les insuffisances veineuses : Varices, Hémorroïdes.

Posologie. — XXV à XXX gouttes, dans un peu d'eau au repas de midi et au repas du soir, pendant quinze jours par mois.

Prix : 15 francs.

Laboratoires STELVIA

Georges BLAQUE

Docteur en Pharmacie, Licencié ès Sciences

59, rue Boissière — PARIS (XVI^e).

Tél. : Kléber 88-70.

PHYTOSPLÉNOL PLÉ

Synergie opothérapique et minérale : lipides spléniques, poudres de thymus, moelle osseuse rouge, surrénales, parathyroïdes, d'os frais, Nucléinate de fer et de manganèse, composé phosphoré organique végétal et Vitamine A stabilisée.

Propriétés. — A tous les âges relève le tonus neuro-végétatif, active les échanges, reminéralise, favorise la croissance staturale et pondérale.

Indications. — Asthénies, Allaitement, Amaigrissement, Anorexie Convalescences, Croissance, Déminéralisation, Dentition, Grossesse, Fractures, Rachitisme et pré-rachitisme, Spasmophilie.

Présentation. — En granulés aromatisés (150 grammes) et en dragées également aromatisées (50 dragées).

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments (Fac. Pharm.) sous les n^{os} 82-7 et 82-8.

Posologie. — Prescrire avant ou au cours de deux repas journaliers : *Nourrissons* : 1 cuiller à café de granulé.

Enfants : 2 cuillers à café de granulé ou 2 dragées.

Adolescents et adultes : 3 cuillers à café de granulé ou 3 dragées.

Prix : 18 francs.

Laboratoires J. PLÉ

Docteur en Pharmacie.

11 bis, rue de Turenne, Paris (III^e).

Tél. : Archives 83-52.

PHYTO-VITAMINES PLÉ

Solution non huileuse des vitamines A et D étalonnées à l'état *colloïdal* associées aux vitamines B, à la chlorophylle pure, soluble, d'action vitaminique semblable à la vitamine C, et aux acides aminés.

Propriétés. — Haute activité vitaminique en synergie. Aucune toxicité. Est miscible directement à l'eau. Saveur agréable.

Indications. — A titre prophylactique : chez les enfants en fin d'hiver et au printemps, régimes alimentaires, femmes enceintes et allaitantes, nourrissons ; à titre curatif : comme adjuvant aux traitements anti-infectieux, le lymphatisme, les anémies, états ganglionnaires, chez les prématurés et les athrepsiques ou hypotrophiques, les troubles du métabolisme phospho-calcique.

Présentation. — Liquide aqueux d'emploi aisé avec son « Compte-gouttes Doseur ». Une dose = XX gouttes.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 82-9.

Posologie : Avant les deux repas :

Nourrissons : 1 dose. *Enfants :* 2 doses. *Adolescents et Adultes :* 3 doses.

Prix : 16 fr. 50.

Littérature et échantillons aux

Laboratoire J. PLE, Docteur en Pharmacie

111 bis, rue de Turenne — PARIS (III^e).

Tél. : Archives 83-52.

Gouttes PILKA

(Pilka Golaz ou Thymipin).

Composition. — Les gouttes *Pilka* sont essentiellement composées des dialysés de Thym, Grasset et Drosera (absolument sans danger pour les nourrissons).

Propriétés. — Action élective spéciale due aux constituants des plantes entrant dans cette préparation.

Indications. — A recommander dans la *coqueluche* et les *toux convulsives* des enfants et des adultes, ainsi que les *toux des tuberculeux* et les *affections des bronches* en général : bronchite, pneumonie, asthme.

Mode d'emploi. — On donne 2 à 3 fois par jour : aux *nourrissons* I à V gouttes ; aux *enfants*, V à X gouttes de *Pilka*, et aux *adultes*, X à XXX gouttes dans un peu d'eau ou tisane.

Laboratoire ZYMA

9, place Félix Faure — PARIS (XV^e).

Tél. : Vaugirard 28-83.

PILULES du D^r DEBOUZY

Opothérapie biliaire.

Pilules de 0 gr. 30, extrait total de bile sélectionnée, stérilisée, et boldine.

Ne renfermant aucun drastique ni laxatif.

Affections hépatiques. Lithiase biliaire. Insuffisance hépatique. Entéro-colite.

Dose. — 4 à 8 pilules par jour, prises aux repas.

Le flacon de 100 pilules : 15 francs.

— 50 — : 8 francs.

Laboratoires LONGUET

34, rue Sedaine — PARIS (XI^e).

PILULES

du D^r SEJOURNET

Antidiabétiques.

Indications thérapeutiques. — Traitement du DIABETE sans régime trop rigoureux, le guérit souvent, l'améliore toujours sans crainte d'inconvénients. Evite les complications.

Doses et mode d'emploi. — Complexe sous forme de pilules dosées à 0 gr. 01 de Santonine, avec excipient balsamo-résineux.

Reconstituant de premier ordre, etc.

1 Pilule à chaque repas.

Prix de vente au public : 18 fr.

Laboratoires du D^r M. LEPRINCE

62, rue de la Tour — PARIS (XVI^e).

PILULES HÉLÉNIENNES NAUD

Composition. — A base d'Hélénine cristallisée, protoxalate ferreux et quassine.

Indications. — D'après les essais cliniques les plus récents (thèse du Dr E. PARIZOT) l'*Hélénine* constitue le spécifique par excellence de la Leucorrhée, sans lésions anatomiques.

Mode d'emploi. — Sauf indication contraire du médecin, 4 à 8 pilules par jour aux repas.

Peut être prescrit aux assurances sociales.

Echantillon et littérature sur demande :

Prix : 14 francs.

Laboratoires LACROIX

MEROBIAN et FILS, successeurs.

37, rue Pajol — PARIS (XVIII^e).

PILULES LITHURANÉES

du Docteur BOVEIL

Traitement du diabète

Composition. — *Uranium* : Radio-actif, active la sécrétion des glandes.

Helonin : Décongestif du foie et du pancréas.

Benzoate de lithine : Dissolvant de l'acide urique, en excès chez les diabétiques.

Arséniate de soude : Tonique général. Stimulant des glandes endocrines.

Géranium Robertianum : Tonique et astringent.

Indications. — Le diabète sous toutes ses formes.

Doses et mode d'emploi. — 6 pilules par jour : 2 avant chaque repas avec un demi-verre d'eau de Vichy ou de Vals.

Traitement normal : 2 mois environ.

Echantillon et littérature sur demande.

Prix : 12 fr. l'étui de 60 pilules.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 346-2.

Marc PARIS, Pharmacien de 1^{re} classe

1, rue Lassalle — LYON (La Boucle) (IV^e).

PILULES MYOSOTIS

Molles

Composition :

| | |
|-----------------------------|-------|
| Bichlorure de Hg. | 0,005 |
| Poudre d'opium | 0,005 |
| Poudre fraîche de coca..... | 0,15 |
| Extrait de gentiane. | 0,04 |

Indications. — Traitement mercuriel *per os* suivant technique adoptée par le D^r Vernes.

Emploi :

- 1^{re} semaine : 1 pilule par jour au repas de midi.
 2^e semaine : 2 pilules par jour aux repas : midi et soir.
 3^e semaine : 3 pilules par jour aux repas : matin, midi et soir.
 4^e et 5^e semaines : 4 pilules aux repas : 1 matin, 2 midi, 1 soir.
 6^e et 7^e semaines : 5 pilules aux repas : 1 matin, 2 midi, 2 soir.
 8^e et 9^e semaines : 6 pilules aux repas : 2 matin, 2 midi, 2 soir.
 En cas d'intolérance, redescendre à la dose immédiatement inférieure.

Prix : Flacon de 50 pilules, 9 francs.

Pierre ALEXANDRE, Pharmacien

41, rue de Rome — PARIS (VIII^e)

Tél. : Laborde 08-00.

PILULES V. E. DOUMER

Formule :

Chaque pilule contient 5 centigr. de bleu de méthylène *chimiquement pur*.

Doses :

De 4 à 10 pilules par jour, suivant les cas, espacées dans la journée.

Indications :

Affections des voies urinaires, entérite bacillaire, paludisme, fièvre de Malte, grippe, angine de poitrine, sciatique, rhumatismes, etc.

Laboratoires BOMEL

ANNONAY (Ardèche) — France.

PIPERAZINE MIDY

Diéthylène Diamine, $\text{NH} \begin{array}{c} \text{CH}^2\text{-CH}^2 \\ \text{CH}^2\text{-CH}^2 \end{array} \text{NH}$, alcalin organique du groupe des Pyridines (inscrit au Codex français 1908).

Granulé effervescent, dosé à 0 gr. 20 de PIPERAZINE pure par cuillerée à café.

Doses et mode d'emploi. — 2 à 3 cuillerées à café par jour comme préventif ; 4 à 6 cuillerées à café par jour dans les crises aiguës, dissoutes dans un demi-verre d'eau à distance des repas.

Propriétés thérapeutiques. — Dissout 92 p. 100 des composés de l'acide urique : réduit les déchets uratiques en stimulant l'activité hépatique ; antiseptise les urines.

Indications. — Le plus actif des remèdes à prescrire dans toutes les manifestations de l'Arthritisme et de l'Uricémie : Goutte, Rhumatisme, Gravelle, Calculs, Coliques hépatiques et néphrétiques, Sciatique, Artério-Sclérose, Eczéma, Diabète.

Aucune contre-indication, innocuité absolue (cœur, estomac, vaisseaux).

Prix : 18 francs.

Laboratoires MIDY

67, avenue de Wagram — PARIS (XVII^e).

PIPERAZYL

Composition. — Solution à 5 p. 100 de diéthylène diamine associé au chlorhydrate de pseudo-cocaïne droite.

Indications. — Toutes les manifestations de la diathèse arthritique : *arthrites gouteuses*, sciatique, gravelle, rhumatismes chroniques, etc...

Avantages. — L'injection sous-cutanée *rendue indolore* constitue la façon la plus active d'administrer la pipérazine, celle-ci étant reconnue comme le plus puissant dissolvant de l'acide urique.

Mode d'emploi. — Injection sous-cutanée journalière de préférence au voisinage de la région douloureuse.

Présentation et prix. — Boîte de 6 ampoules de 2 cc. : 20 francs ; de 12 ampoules : 30 francs.

Laboratoires RAIMBALDI

30, boulevard Raimbaldi — NICE.

PITUILOBINE BYLA

(En ampoules.)

Composition. — Extrait épuré de lobe postérieur d'hypophyse, *titré physiologiquement sur utérus* de cobaye. Quatre dosages en *unités internationales*
AMPOULES : O = 10 u. i. (1/16 lobe), A = 20 u. i. (1/8 lobe) ; B = 40 u. i. (1/4 lobe) ; E (intraveineuses) = 40 u. i. (1/4 lobe).

Indications. — Inertie utérine, hémorragie de la délivrance, traitement de l'ulcus gastro-duodéal, etc. Hémoptysies des tuberculeux, défaillances du myocarde, constipation atonique, diabète insipide, épistaxis et toutes hémorragies, etc.

Mode d'emploi. — Injections hypodermiques le plus généralement. La voie intraveineuse (ampoules E) est surtout utilisée dans les hémoptysies.

Ampoules O : 5 fr. A : 15 fr. B : 7 fr. E : 15 fr.

Les Établissements BYLA

26, avenue de l'Observatoire — PARIS.

PLASMA DE QUINTON

Nom déposé en 1907.

Composition. — Eau de mer puisée dans l'Atlantique, avec des précautions spéciales, en des lieux et à des moments où la pureté de l'eau est parfaite ; transportée à Paris sans délai, ramenée à un degré de concentration saline qui la rend comparable à ce point de vue au sérum du sang, stérilisée sans emploi de l'ébullition ni des agents chimiques, mise en ampoules de verre neutre et inattaquable.

Le Plasma de Quinton (toutes manipulations selon la méthode authentique de R. Quinton) *est l'unique préparation marine du monde entier soumise à un contrôle biologique quotidien qui en garantit l'efficacité et la régularité d'action.*

Bibliographie. — Pour les idées générales relatives à la Méthode marine, 23 p. de références in R. QUINTON : *L'eau de mer, milieu organique*, MASSON, Paris, 1912, 2^e éd. Pour les applications thérapeutiques de l'eau de mer, une centaine de références in JARRICOT : *Le Dispensaire marin*, MASSON, Paris, 1921.

Indications :

Traitement prénatal. Application la plus féconde en beaux résultats et celle qui possède les applications les plus nombreuses. L'Eugénique n'a pas d'arme plus puissante. On sait qu'il a été fondé (D^r ARNULPHY, 1922) une *Ligue du Traitement prénatal*.

Ce traitement a pour objet (et l'expérience montre qu'il a pour résultat) : 1^o de conduire à terme le produit conçu ; 2^o de s'opposer à l'athrepsie et aux états de dénutrition si fréquents chez les héréditaires (tuberculose, syphilis, paludisme) ; 3^o d'améliorer la nutrition de la femme enceinte (disparition constante et rapide des vomissements, même dans les cas les plus sévères).

Entérites des adultes et des grands enfants. Le traitement marin est efficace, quelle que soit la forme affectée par la maladie : colite muco-membraneuse, diarrhée, constipation pure, constipation avec débâcles.

Gastro-entérites des nourrissons. Qu'il s'agisse des formes vulgaires ou de l'entérite aiguë (entérite cholériforme), la guérison est la règle. Le traitement doit être institué sans hésitation, même dans les cas les plus redoutables. Plus le cas est grave, plus l'indication d'agir sans délai est formelle. Il n'existe aucune raison, en aucun cas, de différer le traitement.

Intolérance lactée, Athrepsie. L'amélioration se manifeste dès les premières heures qui suivent la première injection. Quel que soit le retard, l'athrepsique s'accroît immédiatement avec l'intensité maxima, l'accroissement normal du premier mois de la vie, s'il est d'ailleurs nourri et réchauffé comme il se doit.

Maladies de la peau (Psoriasis, Eczéma, Tuberculoses cutanées); *Maladies du Système nerveux* (Névralgies, Enuresis, Algies diverses, Gynalgie, Neurasthénie); *Tuberculoses osseuses et ganglionnaires.* Les succès sont habituels, impressionnants parfois de rapidité.

Régimes, doses d'injections. — Pour tous ces points essentiels au succès de la cure marine par le *Plasma de Quinton*, se reporter aux notices envoyées gracieusement, par retour, à toute demande.

Présentation. — Ampoules de 5, 10, 30, 50, 100, 200, 300 et 500 cc.

Renseignements et littérature (Renseignements oraux à Paris et renseignements par correspondance; envois de notices sur les applications et la posologie du *Plasma de Quinton*; DISPENSAIRE RENÉ QUINTON, 4, rue de l'Arrivée, Paris (Gare Montparnasse).

Commandes et ordres d'expéditions :

LABORATOIRES DE BIOLOGIE APPLIQUÉE.

H. CARRION et C^{ie},

54, Faubourg-Saint-Honoré — PARIS.

Tél.: Elysées 36-64 et Elysées 36-45.

Adresse télégr. Rioncar-Paris-123.

PLASMARINE

Analeptique marin polyminéralisé.

Composition. — Calcium en combinaisons minérale et organique assimilables ; Phosphates et acide phosphorique calco-manganique ; Iode en solution marine ; Manganèse glycérophosphorique assimilable ; éléments en combinaison et solution dans le Plasma Marin naturel isotonique.

Action thérapeutique :

- 1° Réveil immédiat de l'appétit.
- 2° Reminéralisation intégrale intensive.
- 3° Action tonique et réparatrice.
- 4° Action dépurative.
- 5° Modification favorable du terrain.

Energique, agréable, atoxique.

Posologie :

Adultes : 2 à 3 cuillerées à soupe.

Grands enfants : 2 à 3 cuillerées à dessert.

Petites enfants : 2 à 3 cuillerées à café,
soit au début, soit à la fin des repas.

Prix : 15 francs.

Littérature et échantillons :

Laboratoires « LA BIOMARINE »

DIEPPE (Seine-Inférieure).

PLASMOCALCIUM

Chlorure de Calcium assimilable, associé aux extraits végétaux antihémorragiques et aux agents de reminéralisation.

Formule :

| | |
|--|-----------------|
| Chlorure de calcium | 24 gr. |
| Chlorure de magnésium | 2 gr. |
| Chlorure de manganèse | 0 gr. 50 |
| Teinture de jusquiame | 2 gr. |
| Extrait fluide de prêle..... | 5 gr. |
| Extrait fluide géranium maculatum..... | 5 gr. |
| Extrait d'ortie grièche | 2 gr. |
| Excipient | Q. S. p. 45 cc. |

Prix : 15 francs.

Particularités. — Associé à la Prêle (silice), au magnésium, au manganèse, à des extraits végétaux antihémorragiques, le Plasmocalcium forme une médication totale antihémorragique et reconstituante.

Indications. — Hémorragies. Récalcification. Diurèse.

Emploi. — 35 gouttes contiennent 1 gr. de Chlorure de Calcium.

Enfants : 3 gouttes par année d'âge.

Adultes : Récalcification : 20 gouttes 3 fois par jour. — Diurèse
30 gouttes 3 à 4 fois par jour. — Hémorragies : 30 gouttes 6 fois par jour

Laboratoires de l'ERGEPATINE

(Médication hépatique et de désintoxication.)

J. C. ARNAULT

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE (Oise).

O. C. P. Toutes drogueries et Pharmacies.

PLASMOSTHÈNE

Médication sthénique totale des débilités, surmenés physiques et intellectuels.

Formule :

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Méthylarsinate de soude..... | 3 gr. 25 |
| Glycérophosphate de magnésium | 3 gr. |
| Glycérophosphate de manganèse..... | 3 gr. 50 |
| Cacodylate de fer..... | 0 gr. 30 |
| Cacodylate de strychnine..... | 0 gr. 075 |
| Acide phosphorique | 20 gr. |
| Sérum de Quinton } | |
| Glycérine | à Q. S. p. 100 gr. |

En flacon compte-gouttes de 45 cc. Prix : 15 francs.

Particularités. — Association synergique complète phosphorique, magnésienne, ferrique en milieu d'eau de mer, associée à la strychnine et au manganèse.

Emploi :

Adultes : 20 gouttes 2 à 3 fois par jour. } Existe en ampoules

Enfants : 5 gouttes 2 fois par jour. } 1 ampoule par jour.

Indications. — Tous les états de dépression physique et morale, Anémies, Phosphaturie, Sénilité, Ménopause.

Laboratoires du NORMOGASTRYL

(Spécifique gastrique total.)

J. OLIVE

14, rue des Minimes — PARIS.

O. C. P. Toutes Drogueries et Pharmacies.

PLASTHAMÉLYNE

Pâte absorbante **non grasse** à l'eau d'Hamamélis.

Composition. — Talc, Oxyde de zinc, Glycérine, Menthol, Eau distillée d'Hamamélis, Eau de Rose.

Propriétés. — Topique isolant et sédatif des dermatites inflammatoires et prurigineuses, ne présentant aucun des inconvénients des préparations dermatologiques à *excipient gras*.

Indications. — Erythèmes des nourrissons. Irritations cutanées, Intertrigo, Prurigo strophulus, Prurit, Urticaire, Engelures.

Mode d'emploi. — Matin et soir, appliquer largement une couche épaisse sur toute l'étendue des lésions.

Prix : Le tube : 12 francs.

Laboratoires STELVIA

Georges BLAQUE,

Docteur en Pharmacie. Licencié ès Sciences.

59, rue Boissière — PARIS (XVI^e).

Tél. : Kléber 88-70.

PLEXORINE

(Médication bromée discrète.)

Dragées glutinisées à base de :

Tri-bromure de sodium, ammonium, stronium, Codéine, Levurine extractive, Paullinia sorbifolia.

Action thérapeutique. — Calmant du système nerveux antispasmodique.

Avantages. — Elimination rapide. Pas d'action secondaire sur la tension sanguine ni sur le myocarde ; pas de dépression intellectuelle.

Indications. — Sédatif de l'excitabilité motrice et vasculaire. Puissant analgésique non toxique ; chorée, tics, hystérie, crises nerveuses. Etats sympathicotoniques.

Mode d'emploi. — 1° Action sédatrice (émotifs anxieux) doses légères réfractées : 2 à 4 dragées par jour ; 2° Action hypnotique, doses relativement massives : 4 à 8 dragées le soir, une heure avant le sommeil.

Prix : 20 francs.

Laboratoires des Produits VÉLY

132, avenue Victor-Hugo — PARIS (XVI°).

Tél. : Passy 87-85.

PLOMBYL

Principe actif. — Diéthylphosphate de plomb, corps nouveau, *non toxique* aux doses thérapeutiques.

Indications thérapeutiques. — Cancers et toutes tumeurs malignes.

Forme. — Ampoules de 5 cc. en boîte de 10.

Dose. — Une ampoule tous les 3 jours, injections intramusculaires.

Prix : 60 francs .

Laboratoires DROUET et PLET
RUEIL-MALMAISON (Seine-et-Oise).

PLURIBIASE

Indications. — Algies dyspeptiques, antiseptique intestinal.

Composition. — Comprimés à 2 noyaux. Le 1^{er} externe, pepsine T. 500 ; Ext. Belladone ; Ext. Jusquiame, Sucre.

Le 2^e interne, Boldo, Bile dépigmentée, Pancréatine (T. 200), Kinase, Erepsine, Ferments lactiques.

Doses. — 2 comprimés avant chaque repas.
Prix : 16 francs.

**Laboratoires Gastro - Entérologiques
ODINOT**

21, rue Violet — PARIS (XV^e).
Tél. : Ségur 69-13.

PLURION

Description. — Complexe colloïdal d'arsenic, fer, manganèse et vanadium, isotonique, indolore, non toxique, en ampoules de 2 cc. (8 ampoules par boîte).

Action thérapeutique. — Le PLURION augmente l'activité des organes hématopoiétiques et fournit aux globules rouges les éléments minéraux nécessaires à leur constitution (fer), à leur accroissement (arsenic) et à leur activité (manganèse et vanadium).

Indications. — 2 à 4 ampoules par jour dans les *anémies graves*. 1 ampoule par jour dans les *anémies des convalescents, paludéens, syphilitiques, cancéreux*. 1 ampoule tous les deux jours dans les cas plus bénins.

Prix : 30 francs.

Laboratoires Ch. COUTURIEUX
18, avenue Hoche — PARIS

PNEUMOGÉINE RENARD

Composition. — Iodure double de caféine et de théobromine (chaque cuillerée à café = 0,05 de caféine + 0,10 de théobromine combiné à l'iode et en solution dans un véhicule qui en masque le goût.

Propriétés thérapeutiques. — L'action de l'iode et de la caféine se trouve renforcée et complétée par l'adjonction de la théobromine « le plus fidèle, le plus constant, le plus inoffensif des diurétiques » (Huchard).

La PNEUMOGÉINE, par son action :

régulatrice respiratoire, assure aux poumons le maximum de rendement fonctionnel ;

cardio-tonique, soutient le myocarde défaillant, abaisse la tension artérielle ;

éliminatrice, débarrasse le sang des toxines et des déchets qui y sont accumulés, augmente la diurèse.

Indications. — I. Tous les états dyspnéiques : asthme, emphysème, bronchite chronique, dyspnées cardio-rénales, dyspnées névropathiques, etc.

II. Syndrome cardio-rénal.

Posologie. — Pendant les crises paroxystiques, 4 à 8 cuillerées à café par jour dans de l'eau bien sucrée. Entre les crises, 2 à 5 cuillerées.

Dragées : 15 Francs — Liquide : 14 fr. 75

Laboratoires RENARD

35, rue de Paris — CLICHY.

Tél. : Péreire 14-08.

PNEUMOGÉNOL

Deux formes : Sirop. — Dragées.

Deux formules : S. (sans digitale). — D (avec digitale)

Codéine, 0,01 ; Morphine chl., 0,000625 ; Extrait Ipéca, 0,005 ; Extrait Belladone, 0,005 ; *Extrait Digitale*, 0,002 ; Extrait Aconit, 0,0025 ; Extrait Drosera, 0,0025 ; Eau de Laurier-Cerise, 0,50 par cuillerée à café et par dragée.

Indications principales. — Toux rebelle, Bronchites chroniques, Catarrhe, Asthme, Emphyseme, Tuberculose.

Doses et mode d'emploi. — 4 cuillerées à café ou 4 dragées dans la journée. 1 cuillerée à soupe ou 2 dragées le soir au coucher.

Prix : 12 fr.

Echantillons et littérature :

Laboratoire de THÉRAPEUTIQUE

EPINAL (Vosges)

74, Faubourg d'Ambrail.

PNEUMO-LIPASE

Ampoules injectables.

Médication leucogène nutritive, antituberculeuse surtout.

Formule et technique du Docteur Victor Simon.

Composition. — Cholestérol, Ether benzyl-cinnamique, Huile d'olives camphrée débarrassée de ses acides. Trois concentrations (doses progressives) n^{os} 1, 2, 3.

Mode d'emploi et indications.

INJECTIONS EXTRA-PLEURALES, INTRA-PLEURALES INTRA-PULMONAIRES : Pleurésies séro-fibrineuses, purulentes. Tuberculoses chroniques, évolutives, fébriles ou non. Asthme. Emphyseme.

INJECTIONS INTRA-LARYNGO-TRACHÉALES : Tuberculoses laryngées.

INJECTIONS INTRA-MÉNINGÉES : Tuberculoses méningées.

INJECTIONS INTRA-PÉRITONÉALES : Tuberculoses péritonéales.

INJECTIONS SOUS-CUTANÉES ET INTRA-MUSCULAIRES : Pré-tuberculoses, anémies, convalescences post-opératoires, surmenage, infections grippales, bronchites chroniques, infections urinaires (prostatites, etc.).

Littérature et échantillons sur demande :

Prix : 30, 35 et 40 francs.

Laboratoires H. YVRARD, 17, rue Soufflot — PARIS (V^e).

Tél. : Odéon 56-67.

PNEUMOSTYL DAGUIN

Forme. — Ampoules de 2 cc. et ampoules de 6 cc.

Composition. — Morrhuate d'éthyle, cholestérine, cinnamate et benzoate de benzyle, camphre, goménol, eucalyptol, essences de labiées et huile d'olives neutre.

Mode d'emploi. — 1° Pneumostyl hypodermique (2 cc.). Boîte de 12 ampoules : 18 fr.
2° Pneumostyl intratrachéal (6 cc.). Boîte de 7 ampoules : 24 fr.

Indications. — Tuberculose, prétuberculose et toutes les affections des voies respiratoires.

Echantillons sur demande aux

Etablissements DAGUIN

SAINT-MAUR (Seine).

POLIOL CHURCHILL

(Hypophosphites composés de 0 gr. 20 par dose.)
Médication reconstituante par le phosphore directement assimilable.

Association du *phosphore* avec les bases de l'organisme dans leur proportion avec 1 milligr. de méthylarsinate de strychnine par dose. Reconstituant complètement assimilable. Reminéralisant de choix.

Indications. — Neurasthénie, surmenage intellectuel et physique, convalescence, déminéralisation, phosphaturie, affaiblissement.

Sirop. — 1 cuillerée à soupe dans un peu d'eau après chacun des deux principaux repas de la journée.

Comprimés. — 2 comprimés absorbés mais non dissous, à chacun des deux principaux repas de la journée.

Ampoules. — 1 injection intramusculaire chaque deux jours.

Sirop. — A partir de 7 ans par cuillerée à dessert. Au-dessous de cet âge par cuillerée à café.

Comprimés. — A partir de 7 ans : 1 comprimé dans les mêmes conditions que pour les adultes.

Ampoules. — Suivant indications du médecin traitant.
3 formes : sirop, comprimés, ampoules. — Prix : 15 francs.

PRODUIT FRANÇAIS
Laboratoire CHURCHILL

12, rue Castiglione — PARIS (1^{er}).

POLYBROMURE GONNON

Bromures de sodium, potassium, ammonium et strontium.

Forme et Posologie.

Sirup : 1 cuillerée à soupe avant le coucher dans une infusion aromatique (2 gr. de polybromure).

Poudre : 1 mesure : 1 gr. de polybromure.

Propriétés thérapeutiques. — Médication bromurée très énergique, sans bromisme et sans fatigue d'estomac grâce à la présence du bromure d'ammonium et du bromure de strontium qui est un excellent eupeptique.

Indications. — Toutes maladies nerveuses, toutes affections du cerveau et de la moelle épinière, états convulsifs et troubles de l'intelligence.

Prix : Sirup, 12 fr. Poudre, 9 fr.

Produits GONNON

14, rue Victor-Hugo — LYON

POLYCAUTÈRE

Révuision par effleurage en **Raies de feu sans électrodes** avec le POLYCAUTÈRE (1) du Dr A. Vernier. Breveté S. G. D. G. (Déposé.)

Polycautère « Raies de feu » avec câbles pour tableau, 200 fr.

Polycautère « Raies de feu » avec coffret réducteur 110 v. alternatif, 25 périodes, 945 fr.

50 périodes, 925 fr.

Polycautère « Raies de feu » avec coffret contenant une commutatrice 110 volts continu ou alternatif, 1 250 fr.

Tous autres voltages et pièces chauffantes interchangeables sur demande.

Affections pleuro-broncho-pulmonaires et rhumatismales, Algies diverses.

P. MICHEL, ingénieur-constructeur
90, avenue Gambetta — HYERES (Var).

Dépôt et vente :

PHARMACIE NORMALE

19, rue Drouot — PARIS.

(1) R. Grégoire, *Thèse de Montpellier*, 1933.

POLYFERMENTS LALEUF

Granulé et Tablettes.

Composition. — Ferments digestifs totaux, associés aux Sels de Sodium et de MAGNÉSIUM.

Propriétés et Indications thérapeutiques. — Stimulant de la sécrétion glandulaire. Médicament de choix des dyspepsies de toute nature et de toutes les affections du tube digestif et de ses annexes.

Mode d'emploi et doses. — Une ou deux cuillerées à café ou 2 à 4 tablettes, à croquer ou à délayer dans 1/2 verre d'eau légèrement tiède, à la fin des principaux repas, ou au moment des troubles digestifs.

L'étui de granulé ou la boîte de 48 tablettes :
16 francs.

Laboratoires LALEUF

51, rue Nicolo — PARIS (XVI^e).

POLYIODURE GONNON

(*Iodures de Sodium, Ammonium, Strontium.*)

Forme. — Sirop comprenant 1 gr. par cuil. à soupe d'iodures alcalins, associés aux écorces d'oranges amères et au vin de Bordeaux.

Propriétés thérapeutiques. — Tonique dépuratif, non toxique, action rapide, tolérance parfaite.

Indications. — Engorgements, tumeurs, abcès, asthme, rhumatisme, goutte.

Posologie. — 1 à 2 cuillerées à soupe par jour au milieu des repas.

Prix : 15 francs.

Produits GONNON

14, rue Victor-Hugo — LYON.

POLYPEPTINE

du Docteur ROGER WEBER
Comprimés hyperdigestifs friables.

Formule. — Pepsine, 0,50 ; pancréatine, 0,20 ; muqueuse gastrique, 0,10 ; muqueuse duodénale, 0,10 ; muqueuse intestinale, 0,10 ; bile intégrale, 0,03 ; sulfate de magnésie, 0,05 ; belladone stabilisée, 1 mgr. ; carbonate de chaux, 0,05, pour 1 comprimé.

Indications. — Dyspepsie (mauvaises digestions), Gastrite, Douleur, Spasme, Gastro-Entérite.

Posologie. — 1 à 3 comprimés au milieu de chacun des 2 principaux repas, croquer sans goûter le ou les comprimés et avaler à l'aide d'une gorgée d'eau.

Prix (la boîte de 30 comprimés) : 18 francs.

Gros : Laboratoire de la POLYPEPTINE
61, rue de Seine — PARIS. Tél. : Danton 92-73.

Angelini, Pharmacien.

et chez tous les Commissionnaires et Droguistes.
Détail : Dans toutes les Pharmacies.

POLYPEPTONAL

Composition. — Peptonates polyvalents de Magnésie. Digestats chlorhydropepsiques de Foie total et d'Albumines végétales.

Indications. — Nouvelle médication polyvalente, Antichoc, cholagogue et antianaphylactique. Troubles digestifs, Troubles anaphylactiques généraux, Insuffisances hépato-biliaires.

Posologie :

Comprimés : *Adultes* : 1 à 5 une 1/2 heure avant les repas.

Enfants : 1 comprimé une 1/2 heure avant les repas.

Granulés : *Adultes* : 1 à 2 cuillerées à bouche.

Enfants : 1 cuillerée à café dissous ou non dans un peu d'eau une 1/2 heure avant les repas.

La simple dose (comprimés ou granulés). Prix : 16 fr.

La triple dose (comprimés ou granulés). — 36 fr.

Laboratoires DURET et RÉMY
et du Docteur Pierre ROLLAND réunis
ASNIERES (Seine).

POLYVALINE du Dr Bayle

Nature. — Extrait spléno-surrénal.

Indications. — Les maladies infectieuses : Grippe, Typhoïde, Paratyphoïdes, Pneumonie, Bronchopneumonie, Erysipèle, Fièvres éruptives, Oreillons, etc., où il agit comme un sérum spécifique très actif.

Emploi. — 1 ou 2 injections par jour (intramusculaires à la fesse ou sous-cutanées abdominales) jusqu'à la défervescence.

Doses. — *Adultes* : *POLYVALINE injectable A* (10 cc.). La boîte de 2 ampoules de 10 cc. : 20 francs.

Enfants : 1 cc. par année d'âge de *POLYVALINE injectable B*. La boîte de 4 ampoules de 5 cc. : 20 fr.

Nota. — Il existe aussi des comprimés de *POLYVALINE* que l'on peut employer à la dose de 4 à 10 par jour à titre prophylactique dans les épidémies. Le flacon : 12 fr. 50

Laboratoires CHAIX

8 et 10 rue Alphonse Bertillon (ancienne rue de l'Orne) — PARIS (XV^e).

POMMADE AIPHÈME (F. M.)

Composition. — Pommade genre *Pâte de Lassar* à laquelle est adjoint de l'acide salicylique et du Menthol.

Action. — *Antieczémateuse* par excellence. *Antiprurigineuse* remarquable.

S'emploie contre : les *Eczémas* aigus, l'Impétigo, l'Intertrigo, tous les Prurits et Erythèmes, *Acné*, Dartres et aussi contre les piqûres d'insectes.

Le tube : 7 francs.

Laboratoires F. MERCIER

54, rue d'Étretat — FÉCAMP
(Seine-Inférieure).

Fernand MERCIER

Pharmacien, ex-interne des Hôpitaux
de Paris, Directeur.

POMMADE AU NESTOSYL

Anesthésie de surface par contact.

Caractéristiques. — Voir à la rubrique *Nestosyl*.

Indications. — Suppression rapide et inoffensive de la douleur ou démangeaison dans : Eczémas, Ulcères variqueux, Prurit vulvaire ou anal, Prurit sénile, Prurit diabétique, Dermite infantile, Prurigo, Hémorroïdes, Brûlures, Engelures, Gerçures, Crevasses du sein, Phimosis, Vaginisme, Vulvites, Bartholinites, Papillomes, Gelures, de doigts ou d'orteils, Pansements douloureux, Plaies post-opératoires, Escarres, Radio-dermites, Zona, Furoncles, Anthrax, Impétigo, Lupus, Eruptions ou Tumeurs lépreuses, Chancres, Fractures compliquées, Gale, Urticaire, Herpès, Ampoules, Intertrigo, Erythèmes solaires, Boutons de chaleur, Piqûres d'insectes, en résumé tous les Prurits, Plaies, Dermatoses, Lésions des muqueuses. Dans les cas aigus, *guérison locale*.

Conditions d'efficacité. — Nécessité d'une modification de l'intégrité de la peau, soit accidentelle (érosion, ablation ou distension), soit naturelle (muqueuse); un épiderme absolument intact est un obstacle à l'action de la pommade.

Nécessité, pour obtenir une action prolongée, de maintenir la pommade en permanence sur la lésion sous forme de pansement.

Posologie. — Aucune limite ni dans les doses, ni dans la durée du traitement. Prix : 12 fr. 50.

Laboratoires du NESTOSYL — P. BAUDE, pharmacien.

72, rue Saint-Dominique — PARIS (VII^e).

Tél. : Ségur 96-46. — Adr. télégr. : Nestosyl 27-PARIS.

POMMADE BERTOL-VICHY

Composition. — Benzénol chim. pur, Résine fluide, Benjoin, Acide orthoxybenzoïque, sol. d'Adrénaline, Peroxyde de zinc chim. pur, Sérum homopoiétique, Acide nitrique de Bismuth neutre de Benzoate.

La Pommade « Bertol-Vichy » est un médicament de premier ordre calmant les douleurs, désodorisant et facilitant une rapide *cicatrisation esthétique* ; une désensibilisation et un régime appropriés, plus la Pommade « Bertol-Vichy » feront un traitement qui ne sera plus décevant.

Indications. — Ulcères variqueux rebelles, Eczéma variqueux, Eczéma des nouveau-nés, Eczéma d'eau, Eczéma chronique, Hémorroïdes, Démangeaisons, rougeurs, boutons, brûlures et toutes lésions de la peau.

Mode d'emploi. — En pansements renouvelés tous les jours.

Prix : 12 francs.

HY, Pharmacien

61, avenue de Choisy — PARIS (XIII^e).

POMMADE-CRÈME LUDIN

Spécifique des affections de la peau et du cuir chevelu.

Composition. — Hg-As-B. du Pérou ; H. de Cade ; Soufre ; Acide Salicylique ; Oxyde de zinc.

Propriétés thérapeutiques. — Calmante, Adoucissante, Décongestive, Dermatophylactique, Innocuité absolue.

Indications Thérapeutiques. — Staphylococcies et Streptococcies cutanées, Psoriasis et Eczématides psoriasiformes, Dermatoses sèches et squameuses, Pelade, Plaies atones cicatrisant mal, Dermatoses exotiques d'origine microbienne ou ulcérées, Rougeurs, Affections prurigineuses de cause externe, etc., Erythèmes.

Mode d'emploi :

Dans les affections de la peau. — Appliquer sur la région malade une quantité suffisante de pommade, l'étendre. Puis, par massage très appuyé de quelques minutes, la faire bien pénétrer dans la peau. Essuyer ensuite l'excès avec un linge propre et sec. Recouvrir d'un pansement si nécessaire. Renouveler matin et soir.

Note. — *Le massage de la pommade sur la peau est très important. Une pommade, pour qu'elle soit efficace, ne doit pas être étendue sur la peau en couche épaisse, mais elle doit être incorporée à la peau et absorbée par elle.*

Il ne faut jamais oublier que :

Incorporée à la peau, la pommade peut agir.

Superposée à la peau, la pommade ne fait que salir.

Dans les affections du cuir chevelu. — Ecarter avec un peigne les cheveux de façon à former des raies. Appliquer peu de pommade. L'étendre et procéder à un massage, dur, vigoureux et prolongé. Enlever alors l'excès de pommade avec un linge sec. Procéder à un bon savonnage le lendemain matin.

Note. — Un bon massage, pour un cuir chevelu à cheveux courts, demande un quart d'heure.

Prix : Le tube, 10 francs.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 302-4.

Laboratoires REY
DIJON.

POMMADE FORNET

à l'Insuline Fornet

Principe actif :

L'Insuline FORNET véhiculée par un excipient spécial, a pouvoir transdermique remarquable. Titrage régulier. Aucun adjuvant.

Indications :

Ulcères variqueux. Plaies de toute nature.

Recommandations spéciales.

Cancers ulcérés de la peau : *Presse Médicale*, du 21 octobre 1931.

Prurits : Hôpitaux de Paris.

Orgelets récidivants, Blépharites-Ulcères de la cornée : Service Ophtalmologie d'Ambroise Paré.

Radiodermites : Communication Gomès da Costa.

Brûlures : Service chirurgical. Hôpital de Lyon.

La Pommade FORNET est utilisée dans tous les hôpitaux de Paris.

Prix : 15 francs.

Renseignements et échantillonnage :

Laboratoire de MICROBIOLOGIE

23, rue du Caire — PARIS (II^e).

Téléphone : Gutenberg 03-45.

POMMADE INSÉVA

Traitement des affections ano-rectales par vaccino-thérapie locale.

La pommade **INSÉVA** est à base de bouillon-vaccin de colibacilles et d'entérocoques, auxquels sont imputables, pour la plupart, les infections hémorroïdaires.

Elle contient pour 100 grammes : 600 milliards de colibacilles ; 240 milliards d'entérocoques, et les produits vitaux de leur lyse.

Indications. — Hémorroïdes internes, hémorroïdes externes, eczéma anal, ano-rectal ou péri-anal, tumeurs hémorroïdaires.

Action. — Guérison rapide des hémorroïdes et tuméfactions hémorroïdaires, sédation du ténesme.

Mode d'emploi. — Appliquer localement, ou introduire dans l'anus, au lever et au coucher, et après chaque selle.

Présentation :

Le tube : 14 francs.

Le 1/2 tube : 8 francs.

Institut de Séro et Vaccinothérapie de Garches, INSÉVA

151-153-155, rue de Buzenval — GARCHES.

Echantillons : 60, rue de Monceau — PARIS (VIII^e).

POMMADE KLÉOS

Pommade Kléos Douce.

Indications. — Feux, rougeurs, eczéma, éruptions dues à la dentition des bébés. Brûlures. Gerçures. Coups de soleil.

Compositions. — Baume du Pérou, Silicate de Magnésie hydratée, Oxyde de zinc, Dermarone, Oléate de zinc, Essences naturelles, excipient non gras.

Forme. — Pommades non grasses renfermées en tube étain.

Pommade Kléos Forte.

Indications. — Maladies de peau anciennes, gourme, acné, intertrigo.

Composition. — Essences naturelles, Ichtyol, Baume du Pérou, Magistère de Soufre, Carbonate de Chaux, Stéarate de zinc, Oxyde de zinc, excipient non gras.

Forme. — Pommades non grasses renfermées en tube étain. Ces pommades, étudiées spécialement pour les enfants, sont tout indiquées pour les épidermes particulièrement délicats.

Prix du tube : 5 fr. 50. Le double tube : 10 francs.

Littérature et échantillons :

Laboratoires QUERET,

2, rue des Cordeliers — MEUNG-SUR-LOIRE (Loiret)

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle sous les n^o 963-4 et 5.

POMMADE LENOIR

à la Cinnamoléine.

Traitement spécifique des *dartres chroniques* ; s'adresse exclusivement à ces eczémas à forme sèche, desquamant sans cesse, souvent prurigineux dont la tenacité est si désespérante pour le malade et pour le médecin.

Dans le *Pityriasis* du cuir chevelu, en décrapant la couche épaisse des pellicules qui enserrant et étouffent les cheveux, elle enrayer la calvitie et permet de recourir avec succès aux diverses lotions excitantes et microbicides qui, sans elle, ne pourraient atteindre le sebum-bacille enfermé dans les glandes sébacées.

Employée aussi avec succès contre les *verruës plates séborrhéiques* du visage, dites *crasse des vieillards*, les *psoriasis*, le *sycois*, la *leigne*, le *favus*.

Mode d'emploi. — Onction matin et soir sur la partie malade.

Prix : 12 francs.

Laboratoires A. LEJEUNE

142, rue de Picpus — PARIS (XII^e).

POMMADE LOGEAI

Composition

| | |
|----------------------------------|---------|
| Extrait d'Hamamélis..... | 6 gr. |
| Sulfoichtyolate de Soude..... | 6 gr. |
| Onguent populeum Q. S. pour..... | 100 gr. |

Propriétés :

ATOXIQUE : Nistupéfiant, ni adrénaline.

ANALGÉSIQUE : Décongestion rapide et durable de la média-veineuse.

ASTRINGENTE : Action tonique et régénératrice de la fibre lisse.

ANTISEPTIQUE : Action élective de l'huile sulfitée sur la muqueuse rectale.

Indications. — Hémorroïdes externes. Prurits anal et vulvaire. Gercures des seins. Prostatites.

Mode d'emploi. — Après bain savonneux, onction matin et soir avec le doigt enduit d'une forte couche de pommade LOGEAI et jusqu'à sédation de la douleur (quelques minutes).

Une canule est jointe à chaque tube.

Prix de vente au public : 15 francs.

Laboratoires Emile LOGEAI

24, rue de Silly — BOULOGNE-SUR-SEINE.

Téléphone: Auteuil 40-15 et 40-16.

POMMADE MIDY

(Adrénostyptique.)

| | |
|---|------------|
| Adrénaline | 0 gr. 0066 |
| Stovaine | 1 gr. |
| Anesthésine | 1 gr. |
| Extrait de Marron d'Inde frais stabilisé | 2 gr. 50 |
| Extrait d'Hamamélis | 0 gr. 50 |

Pour 100 grammes de pommade.

Mode d'emploi. — Une application matin et soir, et après les garde-robes. Précéder d'une application, pendant 10 minutes, ou de glace ou de compresses à 45°.

Propriétés thérapeutiques. — Sédation des douleurs, arrêt des hémorragies, décongestion et vaso-constriction, antiseptie.

Indications. — Traitement rationnel des hémorroïdes externes et internes.

Une canule rectale s'adaptant au tube permet d'atteindre les hémorroïdes internes, haut placées.

Prix : 13 francs.

Laboratoires MIDY

67, avenue de Wagram — PARIS (XVII°).

POMMADE NOELLINE

Composition. — Pommade à base d'acide benzoïque et de tanin incorporés à un excipient à la fois gras et alcool.

Action. — Traitement préventif et curatif des gerçures des seins, et des rougeurs des bébés.

Mode d'emploi :

a. Gerçure des seins. *A titre préventif* : en massage des mamelons dans les derniers mois de la grossesse.

A titre curatif : En pansements, après lavage antiseptique.

b. Rougeurs des bébés. Application locale recouverte de poudre Noëline.

Prix : le tube, 6 fr.

Laboratoire de la NOELLINE
GUINGAMP (Côtes-du-Nord).

POMMADE RAIMOA

Principes actifs. — Aristol, Éther. Cicatrisants très actifs, Analgésiques.

Indications. — Brûlures à tous degrés. Plaies de tous genres, infectées ou non. Eczémas. Ulcères.

Mode d'emploi. — Avec ou sans lavage d'éther préalable, une application matin et soir.

Laboratoire des Produits RAIMOA

Collignon-Savers,

264, boulevard Voltaire — PARIS (XI^e).

Téléphone : Diderot 54-96.

POMMADES ASEPTIQUES DULCIS

Argolène (1, 5 et 10 p. 100) : Bactéricide, conjonctivites aiguës.

Aristol (1, et 2 p. 100) : Antiseptique.

Asepto-Bismuth (5 p. 100) : Bactéricide puissant, non irritant, inodore.

Atropine (0,50 et 1 p. 100) : Mydriatique.

Bleu de Méthylène (0,50 et 1 p. 100) : Colorant aseptisant, indolore.

Cadmiol-Zinc (1 p. 100) : Conjonctivites à diplobacilles.

Calomel (5 p. 100) : Antiseptique, résorbant.

Cuprinol (1, 2 et 5 p. 100) : Conjonctivites chroniques

Cuproléine (5 p. 100) : Trachome à toutes ses périodes.

Dionine (2 p. 100) : Lymphagogue, analgésique profond.

Ektogan (1 p. 100) : [remplacé par **Kilogan**] Antiseptique non irritant.

Eserine (Sulfate 0,50 p. 100) : Myotique.

Huile de Chaufmoogra : Trachome.

Ichtyol-Zinc : Blépharites.

Iodo-Calcoique : Cataracte.

Iodo-Rubidium : Cataracte.

Iodoforme (1, 2 et 3 p. 100) : Antiseptique.

Kilogan (anciennement Ektogan) Antiseptique non irritant.

Myosine faible : Myotique.

Myosine forte : Myotique puissant.

Mydriasine : Mydriatique énergique.

Novoptine : Ulcères à pneumocoques.

Oxyde Orangé de Mercure (1, 2, 3, 4 et 5 p. 100) : Antiseptique résorbant.

Oxyde de Zinc (5 p. 100) : Blépharites.

Ophtalmoforme (1, 2 et 3 p. 100) : Antipurulent.

Pilocarpine (1, 2 p. 100) : Myotique.

Précipité blanc (1, 2, 5 p. 100) : Antiseptique résorbant.

Rouge écarlate (5 p. 100) : Cicatrisant.

Séroléine (Brûlures des paupières et de la conjonctivite.

Thiosinamine (1 p. 100) : Opacités de la cornée.

Xéroforme (5 p. 100) : Antipurulent.

Polyvaccin-Antivirus Dulcis : Immunisent les cellules en contact et stérilisent le foyer infecté, sans réaction locale ni générale. Pommade Type Ophtalmo et Type Oto-Rhino.

Ampoules de 2 cc. Type Ophtalmo et type Oto-Rhino.

Pilules Cytogénol Dulcis

Laboratoire du Docteur FERRY

MONTE-CARLO

POMMADES OPHTALMIQUES CHIBRET Optima

Pommades en tubes à canule dévissable et stérilisable, et à canule fixe, faites par des procédés spéciaux de fabrication à : l'Oxyde Jaune, Violet de Méthylène, Bleu de Méthylène, Aristol, Vioforme, Iodoforme, Rouge Ecarlate, Cuivre (hémocuivre), Oxyde de Zinc, Zinc Cadmium, Zinc Tuménol, Zinc Ichtyol, Calomel, Fondante (Ki +, CaCl²), Ichtyol, Soufre, Tannin, Précipité Blanc, Bismuth Hydroxyde, Dermatol, Extrait thyroïdien, Peroxyde de zinc, Collargol, Argyrol, Azotate d'argent, Protargol, Cocaïne, Ethylhydrocupréine (Optochine), Rose de Bengale, Xéroforme, Orthoforme, Essence du Niaouli (Goménol), Bismuth Violet, Bismuth Rose, Optochine Rose, Violet rose, Colorant Composé, Esérine, Euphtalmine, Scopalamine, Atropine, Pilocarpine, Adrénaline, Dionine, Homatropine, Bétuline Hg, Bétuline Ag, Bétuline Cu, Chibromercurobrome,

Radio Bleu (Radio Activé au bromure de Ra associé au bleu de Méthylène) à employer lorsque l'on veut obtenir une cicatrisation rapide des tissus cornéens et conjonctivaux.

Ampoules fondantes chloro-iodo-calcique (Bains d'yeux pour cataracte).

Œillères Chibret à rebord caoutchouté.

Pommade pour le nez : Baume du Pérou, Adrénaline.
(Voir à *Collyres* la suite des Produits Chibret).

LABORATOIRES CHIBRET,

5, rue Saint-Herem — CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme)

POMMADE V. E. DOUMER

Formule :

| | |
|--------------------------|----------|
| Bleu de Méthylène | 1 gr. |
| Essence de Thym | 0 gr. 50 |
| Essence de Romarin | 0 gr. 50 |
| Essence d'Eucalyptus... | 0 gr. 50 |
| Essence de Serpolet..... | 0 gr. 50 |
| Glycérolé d'Amidon | 30 gr. |
| Lanoline..... | 70 gr. |
| Huile de Cade..... | 0 gr. 25 |

La Pommade V. E. Doumer s'emploie en applications quotidiennes dans les brûlures, l'eczéma, les ulcères variqueux, etc... Toutefois son emploi, en raison de sa coloration, semble contre-indiqué dans les affections de la face.

Laboratoires BOMEL
ANNONAY (Ardèche) — France.

POST-HYPOPHYSE CHOAY

Nature. — Extrait purifié injectable, désalbuminé, stérilisé, de lobe postérieur d'hypophyse.

Formes pharmaceutiques et mode d'emploi :

Post-hypophyse n° 2. — Solution *obstétricale*.

Ampoules de 1 cc., titrées à 5 unités internationales.

Indication. — Inertie utérine secondaire, en l'absence de toute dystocie. Injection sous-cutanée de 1/2 cc. à 1 cc., à dilatation complète (tête fixée).

Prix : 10 fr. la boîte de 3. — 15 fr. la boîte de 6 ampoules.

Post-hypophyse n° 4. — Solution *chirurgicale*.

Ampoules de 1 cc., titrées à 10 unités internationales.

Indications. — Prévention des hémorragies opératoires : 1/2 à 1 cc. avant l'intervention.

Parésie intestinale : 1/2 à 1 cc. Diabète insipide : 1 cc. par jour.

Prix : 15 fr. la boîte de 3, 20 fr. la boîte de 6 ampoules.

Post-hypophyse n° 5. — Solution *hémostatique* diluée dans du sérum. Ampoules de 10 cc. titrées à 5 unités internationales.

Indication. — Hémoptysies des tuberculeux : Injection intraveineuse à pousser *très lentement*.

Prix : 15 fr. la boîte de 3 ampoules.

Laboratoire CHOAY

48, avenue Théophile-Gautier — PARIS (XVI°).

Tél. : Auteuil 44-09 et 44-10.

POTION ADOL

Composition. — Préparation à base de : Bromure d'ammonium, Amidopyrine, Iodure d'ammonium, Sulfate de Sparteïne, Stovaïne, Citrate de Caféine, Intrait de Valériane.

Action thérapeutique. — Analgésique et antalgique extrêmement puissant.

Avantages. — Pas de toxicité, goût agréable, action constante. Pas de contre-indications.

Indications. — Douleurs aiguës, quelle qu'en soit l'origine. Céphalées, migraines, rachialgies, lombago, sciatiques, névrites, coliques néphrétiques et hépatiques, douleurs rhumatismales, grippe.

Mode d'emploi. — 1 à 6 cuillerées à bouche par jour, loin ou avant les repas.

Prix : 16 francs

Laboratoire ADOL

L. GIROUD, Pharmacien de 1^{re} classe

78, cours de la Liberté — LYON.

POUDRE CASSARINI

Médication Sédativè du Système Nerveux

ÉPILEPSIES — HYSTÉRIE — NÉVROSES DIVERSES

(En Comprimés.)

Nouvelle combinaison antitoxique bromée aux extraits végétaux.
Spécifique héroïque des épilepsies et des affections nerveuses avec hyper-excitation du système nerveux.

Prix au public : 22 fr, 50 la boîte (un mois de traitement environ).

Posologie :

Adultes : 6 comprimés par jour. 2 immédiatement avant chacun des trois principaux repas. Dissous dans un demi-verre d'eau.

Adolescents : 10 à 15 ans : 3 jusqu'à 4 comprimés par jour. Un ou deux immédiatement avant les trois principaux repas, dissous dans un demi-verre d'eau ou dans le potage.

Enfants de 6 à 10 ans : 2 jusqu'à 3 comprimés par jour, un immédiatement avant le petit déjeuner, un avant le repas du soir, dissous dans n'importe quel liquide.

Enfants au-dessous de 5 ans : Demander doses spéciales.

Littérature sur demande :

R. COLUMEAU, Pharmacien spécialiste

LABORATOIRE COLUMEAU, 45 rue d'Aix — MARSEILLE.

POUDRE CHAUMEL

Hygiène de la Femme.

Borate de soude et Essence de Lavande,
entièrement soluble dans l'eau, Odeur
agréable et discrète.

Indications. — Décongestionnante, Anti-septique, Adoucissante.

Hygiène intime de la femme ;

Hygiène des yeux (blépharites, conjonctivites). Traitement des plaies.

Mode d'emploi. — Un sachet pour un à deux litres d'eau chaude.

Prix : La boîte de 20 sachets, 18 fr. 10.

Etablissements FUMOUE

78, faubourg Saint-Denis — PARIS

POUDRE DANICA

Anisée, d'une finesse extrême, se délaye très facilement, très agréable dans l'eau gazeuse, calme la soif instantanément.

Composition. — Carbonate de Ca et Mg, Silicate de Mg.

Indications. — Toutes affections d'estomac, intestin et foie, Solarités, Régularise les garde-robes. Efficace contre hyperacidités et hypertension. Equilibre le pH sanguin. Stimule la fonction rénale. Fait passer dans le sang des chlorures de Ca et Mg et des silicates solubilisés. Reminéralise. Prévient le cancer. Supprime l'insomnie digestive.

Mode habituel d'emploi. — Toutes variantes possibles. Une 1/2 cuillerée à café avant les repas : une cuillerée à café au coucher et au réveil.

La boîte : 12 fr. 50.

P. BLOUIN, Pharmacien

50, rue de Turenne — PARIS (III^e).

POUDRE DU DOCTEUR SOULIGOUX

(Poudre laxative de Vichy)

Composée de principes végétaux et aromatiques et d'un soufre spécialement traité, la Poudre du Dr Souligoux s'emploie à la dose d'une cuillerée à café dans un demi-verre d'eau, le soir en se couchant. Très agréable, facile à prendre. De résultat constant.

CHASSAING, LE COQ et C^{ie}

1, Quai Aulagnier
ASNIÈRES (Seine).

POUDRE ESCOUFLAIRE

Poudre et cigarettes anti-asthmatiques.

Composition. — A base de nitre et des solanées les mieux triées (récoltes de 1^{er} choix).

Indications thérapeutiques et formes. — N° 2 (la plus faible) : Bronchite chronique, oppressions cardiaques, etc. — N° 1 : Asthme nerveux, Asthme des foins, fins de coqueluche, etc.

Mode d'emploi. — Une bonne pincée ou une demi-cuiller à café de poudre, allumée sur un fond de soucoupe recouverte d'un entonnoir ou d'un cornet en papier dirigeant la fumée vers la gorge. Avaler la fumée.

Ne pas attendre les affres de la crise : la prévenir par une fumigation anticipée et surtout la fumigation préventive du soir, avant de se mettre au lit.

Prix de vente : 9 fr. (pour environ 30 fumigations ou 30 cigarettes).

Laborat. ESCOUFLAIRE — Baisieux (Nord).
(Echantil. grat. sur demande de MM. les Docteurs.)

POUDRE ET POMMADE D'INSULINE PHYLOZE

Forme et composition. — Insuline purifiée de fabrication française en poudre et en pommade.

Mode d'action. — Excite la vitalité cellulaire et active la cicatrisation des plaies.

Indication. — Ulcères variqueux, plaies atones, fermeture rapide de la plaie.

Mode d'emploi. — Déterger la plaie par un pansement humide, la saupoudrer de Poudre d'Insuline Phyloze ou appliquer la Pommade d'Insuline Phyloze et recouvrir d'une gaze.

Appliquer la Poudre ou la Pommade d'Insuline Phyloze une fois par jour.

Dans les cas graves et après cicatrisation de l'ulcère, pour parachever la guérison, recourir aux injections d'Endopancrine. (Voir ce mot).

Prix pour 20 pansements : 23 francs; pour 10 pansements : 12 francs.

LABORATOIRE DE L'ENDOPANCRINE

48, rue de la Procession — PARIS (XV^e).

Tél. : Ségur 26-87 et 76-82.

POUDRE « MASS » PLASTIQUE

La POUDRE MASS, nouveau composé oléique sulfureux, assouplit la peau et la tonifie. Son usage fréquent assure le rajeunissement de la cellule et la régénération de la peau.

I. Indications chirurgicales. — Escharres, garniture intérieure des appareils plâtrés et orthopédiques.

II. Indications médicales : Eczéma, Prurit, Zona, Acnés, Plaies suintantes non suppurées, Impétigo, Varices et Ulcères variqueux, Phlébites, Proliférations cornées, Arthrites (simples ou déformantes).

Maladies infectieuses cutanées : Rougeole, Scarlatine, Varicelle, Fièvre typhoïde.

Adénopathies, Tuméfactions douloureuses.

Rides du visage, Peaux grasses, Moiteur, Hyperhydroses.

Présentation :

Boîtes de POUDRE MASS, pour massages, pansements, petites applications. Prix : 20 francs.

Coussins de POUDRE MASS (voir indications ci-dessus) type standard : Prix : 30 francs. 30 cm. \times 11 cm. Sur demande spéciale du Chirurgien ou du Médecin adressée directement à nos laboratoires, nous établissons des coussins de toutes dimensions et de toutes formes.

Pour tous renseignements, s'adresser :

Laboratoires H. YVRARD
Pharmacien de 1^{re} classe
17, rue Soufflot — PARIS (V^e).

POUDRE NOELLINE

Composition.

Poudre à base de Dermatol et Acide Borique.

Indications.

Rougeurs des bébés, Intertrigo, Escarres.

Mode d'emploi.

En application locale tant à titre préventif qu'à titre curatif.

Prix. La boîte poudreuse : 6 fr.

Boîte décorée de luxe, pour table de toilette : 18 fr.

Laboratoire de la NOELLINE
GUINGAMP (Côtes-du-Nord).

POUDRE PATERSON

Composition :

Sous-nitrate de bismuth pur, *léger*, Magnésie calcinée, Sucre pur.

Propriétés :

Le meilleur saturant neutre. Ne constipe jamais, *Agit à faibles doses*.
Le seul saturant gastrique neutre présenté en *pastilles*, obligeant à la salivation. Action inoffensive. Très supérieur au carbonate de bismuth et aux produits de substitution (kaolin).

Indications :

Poudre en paquets : Pansement gastrique, Saturation. Gastropathies douloureuses. Dyspepsies. Hyperchlorhydrie. Acidités anormales. Ulcus gastrique et duodéal. Entérites et infections intestinales. Dyspepsies gravidiques. Troubles digestifs du nourrisson.

Pastilles : Traitement d'entretien. Troubles digestifs légers ou chroniques. Digestions pénibles. Etats nauséux de la grossesse.

Formes et posologie :

Paquets : (2 gr.) 2 à 5 par jour, et plus, au moment des crises douloureuses.

Pastilles : 15 à 20 par jour. Laisser fondre en bouche.

Prix au public : Poudre, la boîte (40 paquets), 15 francs ; la demi-boîte (20 paquets), 8 fr. Pastilles ; La boîte, 7 fr. 50 ; la demi-boîte, 4 fr.

Laboratoires des Produits PATERSON. G. et M. Armingeat.

43, rue de Saintonge — PARIS (III^e).

POUDRE ROCHER LAXATIVE

Traitement de la constipation.

Laxatif doux et agréable, agissant sûrement et sans coliques.

Composition. — Association en proportions convenables de substances émollientes et aromatiques.

Posologie. — Une ou 2 cuillerées à café dans un demi-verre d'eau le soir, au coucher.

Echantillon franco à Messieurs les Docteurs.

Prix : 5 fr. 50.

Laboratoires E. FERRÉ

19, rue Grégoire-de-Tours — PARIS (VI^e).

POUDRE SATINE

Composition :

| | |
|--------------------------|--------|
| Stéarates | 24 gr. |
| Acide borique..... | 6 gr. |
| Silic. de Magnésie | 4 gr. |
| Carbonate de chaux..... | 6 gr. |

Par boîte.

Propriétés thérapeutiques. — Irritations de la peau ; rougeurs des nouveau-nés. Ne se laisse pénétrer par aucun liquide.

Indications. — Toilette des bébés. Irritations cutanées, escarres des malades alités, feux du rasoir. La boîte : 7 francs.

Laboratoires NOGUÈS

7, rue Galvani — PARIS.

PRAGMOLINE

Solution stable de bromure d'Acétylcholine.
Hypotenseur et excito-moteur des fibres lisses.

Indications. — Accidents de l'hypertension en général. Affections spasmodiques d'origine artérielle (artérites sténosantes des membres; maladie de Raynaud, localisations cérébrales, rétiennes, auriculaires, etc.). Hypovagotonie. *Sueurs des Tuberculeux.*

Présentations et Posologie. — Boîte de 10 ampoules.

Solution A : Dosée à 6 p. 100 de bromure d'acétylcholine (ampoule de 1/2 cc.).

Solution B : Dosée à 12,5 p. 100 (ampoule de 1 cc.).
Injection sous-cutanée ou intramusculaire : 0 gr.03 à 0 gr. 06 pour les sueurs des tuberculeux ; 0gr.25 à 0 gr. 50 pour les angiospasmodiques. Débuter par de petites doses.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

PRÉCIBÍASE

(Anciennement PRÉCIKASE)

Laxatif cholagogue.

Soufre neutre (à l'état d'hyposulfite de sodium), 0 gr. 025 ;
Calomel, 0 gr. 01 ; Boldo (extrait), 0 gr. 005 ; Bile
(extrait décholestériné), 0 gr. 025 ; Oxyde d'étain,
0 gr. 005 ; Belladone (extrait), 0 gr. 005.

Posologie. — Cholagogue léger : 1 pilule tous les soirs.
Laxatif : 2 à 6 pilules au repas du soir.

Avantages. — La Précibiase ne détermine pas de
douleurs abdominales. Elle exalte le péristaltisme de
l'intestin sans irriter la muqueuse.

Elle détermine une sécrétion hépatique (cholérétique)
et une excrétion biliaire (cholagogue) efficaces et très
appréciées des malades.

Indications. — Constipation, Etats hépatiques, Paresse
intestinale. Maladies de peau : Acné, Séborrhée, etc.

La boîte de 60 pilules : 12 francs.

Laboratoires pharmaceutiques L.-G. TORAUDE

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V^e).

PRÉVALIDINE

Forme. — Pommade résorbable en tube gradué.

Composition :

- 1° Camphre et huiles essentielles aromatiques ;
- 2° Baume du Pérou, Acide cinamique ;
- 3° Extrait opothérapique de peau animale.

Indications. — Grippe, Bronchite, Broncho-
pneumonie, Emphysème, Coqueluche, Tubercu-
lose, etc.

Mode d'emploi. — Une onction par jour, le
premier jour le dos, le second jour la poitrine,
troisième jour l'un des bras, quatrième jour l'autre
bras, le cinquième les cuisses.

Présentation. — Tube gradué par onction.

Prix : 9 francs.

Laboratoires FISCH et C^{ie}

4, rue d'Illzach — MULHOUSE.

Agence à Paris : 104, faubourg Poissonnière.

Tél. : Lamartine 92-52.

PRÉVARSYL

Comprimés d'acide acétylamino oxyphénylarsinique utilisables par voie buccale.

Indications. — Traitement ambulatoire de la syphilis, Hérédo-syphilis, syphilis nerveuse. Complément indispensable de la cure de quinine dans le paludisme. Action élective sur la dysenterie amibienne et le Pian.

Présentation. — Prix au public :

Flacon de 22 comprimés à 0,25 : 18 francs.

— 40 — à 0,05 : 10 —

— 60 — à 0,01 : 7 —

Posologie. — *Adultes* : Doses progressives de 25 à 75 cgr en plusieurs fois, au moment des repas.

Enfants : 0,02 par année d'âge.

Usines Chimiques des Laboratoires Français,
89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI^e).

Dépositaire :

Laboratoire et Pharmacie A. MILLET
3, rue Ambroise-Thomas — PARIS (IX^e).
Tél. : Provence 58-43.

PRÉVENTYL

Nécessaire de poche de prophylaxie
antivénérienne.

Le premier créé en France sous le contrôle et d'après les conseils des Maîtres de la vénéréologie française.

Composition. — En trois tubes de couleur différente :

1° Pommade de Metchnikoff (calomel 33 p. 100) ;

2° Gelée au protargol à 2 p. 100 ;

3° Poudre de savon ;

4° Une cartouche de ouate hydrophile.

Présentation. — Grand modèle (15 fr.), pour 8 à 10 applications.

Petit modèle (8 fr.), aspect et format d'une boîte d'allumettes, pour 3 applications.

Echantillons et littérature sur demande aux

Laboratoires MARCHAND et LEROY,
Etablissements MARREL, Successeurs.

74, rue des Jacobins — AMIENS (Somme).

PREZYMASE

Cure de désensibilisation.

Composition. — Peptone de poisson, peptone de viande, extrait sec de quinquina.

Mode d'action. — Prémunit l'organisme contre les accidents de la sensibilisation (Théorie de Widal, Méthode de Pagniez, et Pasteur-Vallery-Radot).

Posologie. — Une à deux dragées une demi-heure avant chaque repas.

Laboratoires **LEBOIME**

3, rue Fernand-Widal — PARIS (XIII^e)

PRIMULYSE

Composition :

| | |
|---|-------|
| Racine de primevère. (Extrait mou stabilisé)..... | 0,05 |
| <i>Travaux des Docteurs H. Leclerc, Wasicky, Kofler, etc.</i> | |
| Bromoforme. Combinaison organique stable..... | 0,01 |
| Codéine et Dionine, ââ..... | 0,005 |
| Extraits mous de Grindélla..... | 0,01 |
| Belladone et Aconit, ââ..... | 0,002 |

Propriétés thérapeutiques. — Sédatif de la toux.

Indications. — Affections broncho-pulmonaires. Toux rebelles, Bronchites, Asthme, Catarrhe, Grippe, etc., etc.

Forme et mode d'emploi :

Adultes : 6 comprimés par 24 heures.

Enfants : 2 ou 3 comprimés selon l'âge.

Prix : 14 francs.

Établissements **GOY**

23, rue Beautreillis — PARIS (IV^e).

PRODUITS MAIAS

Méthode du Professeur FABRE

à l'essence de térébenthine

Accouchements :

Emulsion en ampoules tyndallisées pour injections intra-utérines.

Gynécologie :

Emulsion en flacons de 150 cc. pour injections vaginales.

Abcès de fixation. — Leucofixine.

SAVON LIQUIDE MAIAS

à l'essence de Bergamotte

Chirurgie, Désinfectant, Accouchement, Gynécologie.

Laboratoire FOUCHERE

RIVE-DE-GIER (Loire).

PRODYNASE

Médication Phosphorée, Calolque, Magnésiée.

Composition. — Comprimés comprenant :

Méthyl phosphate de Chaux..... 0 gr. 20

Méthyl phosphate de Magnésie..... 0 gr. 05

Propriétés. — Produit introduit nouvellement en thérapeutique par les auteurs. Médication spécifique du système nerveux. Puissant facteur de croissance. Contribue à la formation du squelette. Régulateur de la Nutrition.

Indications. — Surmenage, Croissance, Dystrophie phosphocalcique, Rachitisme, Fractures, Altérations dentaires, Grossesse, Allaitement, Tuberculose, Diabète, Asthénie, Cancer.

Mode d'emploi :

Adolescents : 1 comprimé au début des repas, midi et soir.

Adultes : 2 comprimés au début des repas midi et soir.

Prix : 20 fr.

Laboratoires A. GUILLAUMIN et A. GERARD

Docteurs en Pharmacie

12, rue Charles-V — PARIS.

PROGASTER (procédé Hély)

(Nom déposé.)

Sous forme de comprimés.

Composition. — Per-oxyde de magnésium préparé par une méthode spéciale (procédé Hély), permettant sa décomposition instantanée en présence du suc gastrique en oxygène et en chlorure de magnésium naissants.

Propriétés. — Désinfectant remarquable du tube digestif, amélioration surprenante de l'état général. Action combinée de l'oxygène et du chlorure de magnésium à l'état naissant. Chaque comprimé dégage 5 centigrammes d'oxygène pur.

Indications. — Troubles digestifs, hépatiques, arthritisme, artériosclérose, diabète, toutes asthénies, caries dentaires, convalescences, etc.

Mode d'emploi. — 2 à 6 comprimés par 24 heures, pas de contre-indications, pas d'accoutumances du nourrisson au vieillard.

Remise aux pharmaciens = 40%. Prix : 9 fr. 60

Usines NOVALIS

LYON-OULLINS (Rhône).

PROGONE

Chimiothérapie anti-infectieuse par l'acridine.

Ampoules pour injections intraveineuses et comprimés.

PROGONE (Ampoules). — Chlorhydrate du 2-7 diméthyl, 3-6 diéthanol amino-acridine en solution à 0,05 p. 100. Ampoules de 10 cc.

Indications. — Le Progone est un puissant agent anti-infectieux ; il permet l'acridinothérapie des septicémies, des infections urinaires et surtout de la blennorragie avec les meilleurs résultats et sans aucun incident thérapeutique. (Thèse de S. Lurié, travaux de J. Fuchs, P. Barbellion. etc.)

Propriétés. — Le Progone ne donne pas de choc acridinique ni d'accidents rénaux ou hépatiques, il ne sclérose pas les veines et ne tache pas les vêtements.

Posologie. — *Blennorragie aiguë* : 5 injections intraveineuses par semaine pendant 2 à 3 semaines.

Blennorragie génito-urinaire chronique de l'homme et de la femme.
Complications. Infections urinaires diverses : 1 injection tous les deux jours par série de 15 injections.

Septicémies : un jour sur deux, 2 à 3 injections selon l'état du malade.

Compléter l'action des injections de PROGONE en prescrivant les jours intercalaires 3 à 6 comprimés de PROGONE.

PROGONE (Comprimés). — Les comprimés de Progone associent au dérivé d'acridine de la forme injectable :

La Kawaïne (seul balsamique utilisable à la période aiguë).

L'Arbutine (calmant et antiseptique bien connu).

Indications. — La blennorragie masculine et féminine à toutes ses périodes : urétrites, cystites, prostatites, etc.

Les infections urinaires (pyélonéphrites, colibacillrose, etc).

Posologie. — *Blennorragie aiguë* : 3 à 6 comprimés par jour.

Blennorragie génito-urinaire chronique de l'homme et de la femme.
Complications. Infections urinaires : 3 comprimés par jour.

Présentation et prix :

Progone ampoules : la boîte de 5 ampoules de 10 cc... 14 francs.

Progone comprimés : le flacon de 30 comprimés 14 francs.

Echantillons et littérature :

Laboratoires SFÉAT

15, rue Catulienne — SAINT-DENIS (Seine).

PROMÉTHINE

Cholagogue et Décongestionnant physiologique.

Forme. — Granulé de saveur agréable.

Composition. — Peptone sèche pure, Sulfate de magnésie anhydre, Salicylate de soude, Excipient spécial.

Indications. — Insuffisances hépato-biliaires, Lithiase biliaire, Congestion hépatique et vésiculaire, Ictère, et tous troubles d'origine hépatique.

Posologie. — 1 à 3 cuillerées à café, le matin dans 1/2 verre d'eau tiède.

Laisser passer la phase aiguë des Cholécystites. Tâter la susceptibilité des Lithiasiques en commençant par des doses faibles.

Prix : 17 fr. 50.

Laboratoires R. GOUIN

20, rue des Ecoles — PARIS

Tél. Danton 81-53.

PROPIDEX

Pommade à base de Propidon.
voir (Propidon).

Vaccination cutanée.

Indications :

Toutes plaies suppurées ou exposées à la suppuration. — Furoncles, Brûlures, Ulcérations, Engelures, Excoriations, etc.

Présentation: tubes étain de 30 grammes.

Mode d'emploi. — Applications deux fois par jour ; recouvrir d'un tissu souple stérilisé.

PROPIDON-PANSEMENT

Présentation du Propidon en ampoules de 5 cc. comportant un nécessaire stérile pour applications locales.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon, PARIS (VIII^e).

PROPIDON

Bouillon stock-vaccin du professeur Pierre Delbet.

L'association de cultures de streptocoques, de staphylocoques et de B. pyocyaniques, atténuées à la fois par la chaleur et par le vieillissement, confère à ce vaccin une action très efficace dans les affections à pyogènes.

Indications :

Staphylococcies fébriles, Anthrax, Phlegmons, Panaris, Lymphangites, Erysipèles, Affections gynécologiques, Vaccination pré-opératoire.

Posologie et mode d'emploi :

Injection intramusculaire ou sous-cutanée profonde du contenu d'une ampoule (4 cc.). A renouveler, s'il est nécessaire, après 24 ou 36 heures, jusqu'à 3 ampoules.

L'injection donne lieu à une forte réaction fébrile d'ailleurs bien supportée.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

PROSTAPHILE LEISYN

Médication à action élective sur la prostate, Innocuité absolue.

Aucun inconvénient. Aucune contre-indication.

Formuler : 1 boîte ampoules **Prostaphile Leisyn**.

Mode d'emploi. — Injecter 1 ampoule de 4 à 5 cc. environ hypodermiquement, chaque jour, les 20 premiers jours. Ensuite, injecter la même dose tous les jours ou tous les deux jours, mais intra-musculairement. On peut également injecter dans la prostate même jusqu'à 2 cc. du liquide contenu dans l'ampoule. Cette injection est à faire à l'aide d'un anuscope et d'une longue aiguille de 10 cent. environ. Ces injections intra-prostatiques se révèlent très actives.

Présentation. — Ampoules de 5 cc. pouvant être injectées indifféremment, hypodermiquement, intra-musculairement ou dans la glande même.

Indications. — Congestion, hypertrophie et sclérose de la prostate, Prostatismes, Prostatites, complications de l'hypertrophie de la prostate, Cancer de la prostate.

Action. — Desclérosant, décongestionnant.

Composition — Acide Acétique, Acide Citrique, Acide Phosphorique Alumine, Ammoniaque, Chaux, Chlorure, Magnésie, Potasse, Soude Sucre, préparé, activé et vitalisé par procédé spécial au Sodium et gaz acétylène à hautes températures et à très hautes pressions, Procédé **Evooc**.

Les Laboratoires LEISYN.

1 bis, rue Molitor PARIS (XVI^e).

Téléphones : Auteuil 14-73 — C. C. Postaux — PARIS 1075-98.

Adresse télégraphique : Laboleisyn — PARIS.

PROSTATOLS BEAUXIS LAGRAVE

Suppositoires calmants, fondants, décongestifs, anti-infectieux, résolutifs de toutes affections prostatiques, aiguës ou chroniques.

Composition. — Ion Hg + (très petite dose), extrait de solanées et de papavéracées, Hamamélis, Hormones prostatiques totales.

Indications thérapeutiques. — Toutes douleurs, Inflammations (prostatites aiguës ou chroniques) Blennorrhagie et ses complications génito-urinaires, Tenesmes, Contractures, Spasmes divers. Pollakiurie nocturne, Pesanteurs et irradiations périnéales. Hypertrophie (adénomes-tumeurs) et toutes affections de la prostate, opérables ou non.

Mode d'emploi. — Le plus habituel, un le soir au coucher.

La grande boîte : 18 francs.

Laboratoires BEAUXIS-LAGRAVE

74, quai de Jemmapes — PARIS.

Tél. : Botzaris 38-78.

PROSTHÉNASE GALBRUN

Gouttes titrées. Solution organique de fer et de manganèse combinés à la peptone et à la glycérine, entièrement assimilable.

L'association de ces deux métaux en combinaison organique renforce singulièrement leur pouvoir catalytique et excito-fonctionnel réciproque. Ne donne pas de constipation. Tonique puissant. Reconstituant énergétique.

Anémie, Chlorose, Débilité, Convalescence.

XX gouttes de Prosthénase contiennent 1 centigr. de fer et 5 milligr. de manganèse.

V à XX gouttes pour les enfants,

X à L gouttes pour les adultes.

Prix de vente au public : 14 fr. 50.

Laboratoire GALBRUN

8 et 10, rue du Petit-Musc — PARIS (IV^e).

PROSTIGMINE « ROCHE »

Médicament synthétique destiné au traitement de la parésie intestinale post-chirurgicale.

Composition. — Ester de l'acide diméthyl-carbamique et du m-oxyphényltriméthylammonium-méthylsulfate en solution de 0,5 p. 1 000 pour injections sous-cutanées ou intramusculaires.

Propriétés. — Action nettement supérieure à celle de la Physostigmine (Esérine) et sans aucun effet sur l'activité cardiaque et sur la pression sanguine.

Posologie et mode d'emploi. — 1° *Pour provoquer l'évacuation des gaz* : 1 ampoule de 1 cc. le lendemain de l'opération.

2° *Pour provoquer l'évacuation alvine* : 1 ampoule de 1 cc. suivie d'un lavement de 200 cc. environ d'une solution glycinée à 10 p. 100 une demi-heure après l'injection.

Enregistré au Laboratoire national de contrôle des médicaments sous le n° 504-56.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie
10, rue Crillon — PARIS (IV°).

PROTENSÈNE LEJEUNE

Composition. — Cinq gouttes contiennent :

| | |
|--|--------|
| Iode bisublimé..... | 1 cgr. |
| Peptone de cœur..... | 4 cgr. |
| Extrait fluide stabilisé de gui..... | 5 cgr. |
| Extrait fluide stabilisé de genêt..... | 1 cgr. |

Propriétés thérapeutiques. — Propriétés de l'iode et des iodures sans iodisme.

La *Peptone de cœur* est un agent thérapeutique précieux de la débilité myocardique constitutionnelle et de la dégénérescence myocardique acquise.

L'*extrait de gui* est un hypotenseur éprouvé, il régularise les battements du cœur.

Le *genêt* est en même temps un toni-cardiaque et un diurétique.

Indications. — Hypertension, artériosclérose, affections cardio-vasculaires.

Mode d'emploi. — XX à XXX gouttes à chacun des 2 principaux repas.

Prix : 15 francs.

Laboratoires A. LEJEUNE
142, rue de Picpus — PARIS (XII°).

PROTÉODYNE

Professeurs DUBARD et VOISENET de Dijon.

Composition. — Sélection de noyaux aminés de Peptones et d'Albumoses.

Formes. — Ampoules de 5 cc. à 0 gr. 25 de principes actifs (*Enfants*).

Ampoules de 5 cc. à 0 gr. 50 de principes actifs (*Adultes*).

Injections hypodermiques **indolores**.

Jamais de **choc**, ni de **réactions anaphylactiques**.

Propriétés. — Par ses effets **préventifs et curatifs** des infections fébriles et des intoxications, la **Protéodyne** est une arme puissante toujours à la disposition du médecin devant une infection dont il n'a pas le sérum spécifique.

Indications. — Infections fébriles en général. Grippe, Pneumonies, Fièvres typhoïdes, **puerpérales**, etc. Dermatoses par auto-intoxication, Urticaires, Furunculose ; désensibilisation de tout syndrome anaphylactique : Asthme vrai, Asthme des foin, Migraines, etc.

Doses. — *Adultes* : 1 à 2 ampoules à 0 gr. 50 à la première injection.

Enfants : 1 à 2 ampoules à 0 gr. 25 à la première injection.

A renouveler de 24 en 24 heures ou de 48 en 48 heures si la sédation des accidents infectieux n'a pas été obtenue ou ne s'est pas maintenue.

Chez le jeune enfant, réduire la dose suivant l'âge et le poids.

La Protéodyne ne doit être employée que sous le contrôle du médecin.

Prix : La boîte 4 ampoules Protéodyne, 18 fr.

Communications du professeur DUBARD de Dijon : Journal de médecine et de chirurgie pratique, 1919 ; La Clinique et le Scalpel, 1923.

Littérature et Echantillons sur demande au

Laboratoire général d'Études Biologiques

S: A., 29, place Bossuet — DIJON.

PROTÉODYNE DRAGÉES

Composition. — Albumoses et Peptones iodées, Sulfate de magnésie.

Propriété. — Désensibilisation de tout syndrome anaphylactique.

Indications. — Manifestations anaphylactiques, en général : migraines, urticaires, prurits, eczémas, entérocolites, asthmes, troubles digestifs par assimilation défectueuse : rougeurs de la face, somnolences, flatulences, pesanteurs après les repas, etc., etc.

Forme. — Comprimés dragéifiés, à 0 gr. 40 de principes actifs.

Doses et mode d'emploi. — Une heure avant chacun des trois repas. *Adultes* : deux dragées. *Enfants* : une dragée. La dragée ne doit être ni croquée, ni sucée, mais avalée avec un peu d'eau. Prix : la boîte de 50 dragées Protéodyne : 15 fr.

Littérature et échantillons sur demande.

Laboratoire général d'Études Biologiques
S. A., 29, place Bossuet — DIJON.

PROVEINASE MIDY

(Comprimés) type de l'Endocrino-Phytothérapie.

Composition ;

1° Extraits secs (desséchés dans le vide) de plantes stabilisées : Cupressus, Genêt, Marron d'Inde, Hamamélis et Viburnum.

2° Poudres *titrées* d'organes *frais*, prélevés aux abattoirs de Paris, obtenues dans nos Laboratoires par procédé spécial MIDY : **Thyroïde** 0,005, **Surrénale** 0,025, et **Hypophyse** 0,015.

Ces poudres sont mises en comprimés *dès fabrication*.

Propriétés thérapeutiques. — Synergie régulatrice de l'Insuffisance veineuse. Associe les effets organothérapeutiques des glandes endocrines et les vertus vaso-constrictives de plantes soigneusement sélectionnées.

Indications. — Toutes les affections du système veineux : Varices, Varicosités, Varicocèles, Ulcères variqueux, Hémorroïdes, Œdèmes post-phlébitiques, Troubles consécutifs de la Ménopause et de la Puberté.

Mode d'emploi :

Etats chroniques : 2 à 4 comprimés par jour.

Etats aigus : 3 à 6 comprimés par jour.

Prix : 15 francs.

Laboratoires MIDY

67, avenue de Wagram — PARIS (XVII^e).

PROXYTOL

Association des Proxylases des organes de la digestion (Foie, Estomac, Intestin, Pancréas).
Spécifique des affections gastro-intestinales.

Mode d'action. — Assure le fonctionnement cellulaire normal par l'apport des ferments de synthèse ; active la nutrition de l'organe, rétablit les sécrétions.

Indications. — 1° Les dyspepsies ; 2° les entérites ; 3° l'insuffisance hépatique ; 4° les gastro-entérites des nourrissons.

Forme. — Boîte de 36 comprimés.

Doses. — *Adultes* : Croquer de 4 à 6 comprimés par jour le matin à jeun ou loin des repas.

Enfants : Demi-doses.

Nourrissons : 2 à 3 comprimés dissous dans l'eau, à prendre 3/4 d'heure avant les tétées.

Prix : 12 francs.

Laboratoires du D^r ROUSSEL

97, rue de Vaugirard — PARIS (VI^e).

PRUNAGAR

Pruneaux, Agar-Agar, Cholagogues végétaux.

Le **PRUNAGAR** est sans danger ; son efficacité est souveraine pour le traitement de la constipation chronique ou accidentelle et de toutes ses conséquences (vertiges, migraines, énervements, pituites, glaires, états nauséux, dyspepsies, congestions, etc.), il devient un parfait régulateur de l'intestin.

Le **PRUNAGAR** n'irrite pas l'intestin en forçant sa muqueuse à sécréter ; il provoque des contractions douces, semblables à celles qu'on obtiendrait par un massage bien fait.

Le **PRUNAGAR** est en comprimés, en forme de lentilles ; d'un emploi facile, en avaler sans la croquer une ou deux lentilles, avant ou pendant le repas du soir, suivant le résultat cherché. La selle arrive naturellement le matin, sans colique, ni douleur.

En boîte aluminium de 50 lentilles.

L. N. C. 428-1.

Laboratoire du Docteur VERMERSCH,
Pharmacien

71, rue Saint-Jacques — PARIS (V^e).
R. C. S. 116-789.

PRUNINE SENTINI

aux Prunes d'Ente d'Agen.

Principes actifs. — Pruneaux d'Agen, Phtaléine, Cephaelis Ipécacuanha.

Indications. — Laxatif et Purgatif doux.

Présentation. — Délicieux bonbons d'extrait de Pruneaux d'Agen, enrobés de chocolat. Goût exquis, efficacité parfaite. Pas d'accoutumance, pas de coliques.

Laxatif : Un bonbon le soir au souper.

Purgatif : 2 à 3 bonbons le soir au souper.

Enfants au-dessus de cinq ans : Mêmes doses.

Prix : 12 fr. 50.

Laboratoires DOMERGUE

AGEN (Lot-et-Garonne).

PSORÉON

Spécifique du Psoriasis.

Réducteur externe au chryshydrargyre, association chrysophanique-hydrargyrocadique pure sans odeur, peu irritante.

Spécialité type. — Seule médication *externe* préparée exclusivement contre le *psoriasis*, le PSOREON constitue un traitement nouveau particulièrement efficace et pratique.

Unique en son genre et en son but. Exclusif comme indication. Unique comme efficacité.

Le PSOREON possède des propriétés thérapeutiques indiscutables et reconnues, devant toujours être utilisées dans le traitement du *psoriasis* récent ou ancien.

S'emploie en applications pendant la nuit.

Présentation en tubes pour la clientèle. Peut être fourni en vrac aux hôpitaux seulement.

Prix : 20 francs.

Laboratoire EON

DINAN (Côtes-du-Nord).

PSOTHANOL

Composé arséno-bismuthique soluble.

Indications thérapeutiques. — Parakératoses, psoriasiformes. Psoriasis avec ou sans arthropathies.

Présentation. — Ampoules de 3 cc. avec anesthésique pour injections intramusculaires.

Ampoules de 3 cc. sans anesthésique pour injections intraveineuses.

Posologie. — Une ampoule tous les 2 jours en commençant par 1/4 d'ampoule au maximum, et en augmentant la dose suivant la tolérance du malade. Séries de 30 injections.

Boîte de 10 ampoules : 30 francs.

Thérapeutique autophylactique, rénovation leucocytaire : Psöthanol en amp. de 1 cc. pour injections intramusculaires.

Boîte de 10 ampoules : 25 francs.

Laboratoire G. FERMÉ

55, boulevard de Strasbourg — PARIS (X^e).

PULMODION

1^o Tube de 30 comprimés à base de Dionine.

Chaque comprimé représente :

| | |
|---|-------|
| Dionine (chlorhydrate d'éthylmorphine)..... | 0,004 |
| Extrait d'Aconit | 0,003 |
| Extrait de Belladone | 0,003 |
| Extrait de Marrube | 0,10 |
| Extrait de Drosera | 0,01 |
| Terpine | 0,05 |

2^o Sirop à base de Dionine, Sulfogalaçolate de potasse, Bromoforme.

Indications. — Affections respiratoires, Traitement énergique de la toux et de l'oppression dans les cas de bronchite, Trachéite, Laryngite, toux nerveuses.

Grâce à la Dionine, activité remarquable sans accoutumance et tolérance parfaite par l'estomac.

Mode d'emploi :

Par 24 heures :

1^o Comprimés : enfants à partir de 10 ans : 2 à 4 comprimés suivant l'âge.

Adultes : 4 à 6 comprimés à prendre en dehors des repas.

Avaler sans sucer ni croquer.

2^o Sirop : enfants au-dessus de 10 ans : 3 à 5 cuillerées à café.

Adultes : 3 à 5 cuillerées à soupe.

A prendre le plus loin possible des repas. Prix : 14 fr.

Laboratoires JUIN

10, Impasse Milord — PARIS (XVIII^e).

PULMODYNOL

Spécifique broncho-pulmonaire tonique et eupnéique

Formule :

| | | | |
|-------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| Chlorhydrate d'Ephédrine..... | 0 gr. 05 | Codéine | 0 gr. 015 |
| Sulfate de Sparteïne.. | 0 gr. 075 | Alcoolature rac. d'ac- | |
| Chlorhydrate d'éthyl- | | nit..... | 0 gr. 36 |
| morphine..... | 0 gr. 015 | Teinture de Belladone. | 0 gr. 36 |
| Acide phosphorique.. | 1 gr. | Teinture de Drosera.. | 0 gr. 72 |
| Sulfogalaolate de po- | | Teinture de Grindelia. | 0 gr. 72 |
| tasse | 1 gr. 10 | Essence de Rhum.... | 0 gr. 09 |
| | | Sirup de sucre q. s. p. | 100 gr. |

Flacon de 210 gr. environ. Prix : 15 francs.

Particularités. — Contient éphédrine, sparteïne et acide phosphorique associés aux sédatifs de la toux et aux antiseptiques pulmonaires. Goût très agréable. Tolérance absolue.

Emploi. — De 2 à 4 cuillerées à soupe par jour. { Existe en ampoules
1 à 2 par jour

Indications. — Affections pulmonaires aiguës et chroniques. Bronchites, Emphysème, Asthme, Catarrhe. Grippe, Laryngites.

Laboratoires du SEDARTHRYL

(Antirhumatismal.)

A. GONTARD

22, rue de Nemours — PARIS

O. C. P. Toutes Drogueries et Pharmacies.

PULMOFLUIDE

Elixir glycéro-ALCOOLIQUE sucré de TERPINE et terpinol associés aux principes balsamiques du Tolu, benjoin, eucalyptus. FLUIDIFIANT et ASEP-TISANT les sécrétions bronchiques ; dont l'expectoration est facilitée par l'IPÉCA. Les propriétés DECONGESTIVES de l'Ipéca s'ajoutent à celles de l'ACONIT. La SEDATION de la Toux est obtenue par de faibles doses de BELLADONE et surtout par la CODÉINE, le plus sûr et le plus inoffensif des alcaloïdes de l'Opium.

Indications. — RHUMES, BRONCHITES, Grippe, tuberculose ; et en général tous les cas où un dégagement broncho-pulmonaire s'impose RAPIDEMENT.

Le Pulmofluide Fluidifie.

Pas de contre-indications.

Doses. — *Adultes* : 3 à 5 petits verres à liqueur par jour, pur, par petites gorgées ; ou dans un liquide quelconque.

Prix : 12 francs le flacon de 180 cc. Lab. N. C. N° 46
Contre l'Asthme : PULMOFLUIDE EPHÉDRINÉ, mêmes doses.

Laboratoires LEURQUIN

50-52, rue Pierre-Legrand — LILLE.

PULMOGROG

Seul sédatif de la toux ne produisant ni constipation, ni inappétence, ni dépression.
Aucune notice intérieure.

Pulmogrog adultes, sans stupéfiants.

Elixir agréable (Dionine, bromoforme, aconit, noix vomique et cannelle).

Prix : 10 francs.

Doses :

3 à 5 cuillerées à café de 5 à 10 ans.

3 à 5 — à dessert au-dessus et vieillards.

3 à 5 — à bouche pour les adultes.

Pulmogrog enfants, sans toxiques.

Sirop agréable aux bromures (Ca, Mg, AzH^2 , chloral et belladone). Toux spasmodiques, coqueluche.

Doses :

Par demi-cuillerées à café jusqu'à 1 an.

3 à 5 cuillerées à café de 1 à 3 ans.

3 à 5 — à dessert de 3 à 5 ans.

Par cuillerées à soupe au-dessus.

Prix : 9 francs.

Pharmacie FERCOCQ

Licencié ès sciences

SAINT-MAUR (Seine).

PULMOSÉDOR Médication Béchique.

Sirop calmant la toux, traitant et évitant bronchites et catarrhes.

**Calmant, Antiseptique, Fluidifiant, Expecto-
rant.**

Formule. — Une cuillerée à potage contient :

Bromure de Codéïne..... 0 gr. 01

Thiocol..... 0 gr. 60

Marrube..... 0 gr. 45

Excipient à l'orange Q. S.

Posologie :

Adultes : 3 à 4 cuillerées à potage par jour.

Enfants : 2 à 4 cuillerées à café.

Prix : 14 francs.

Pharmacie MARCEAU

7, avenue Marceau — PARIS (XVI^e).

PULMOSERUM

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle des
Médicaments sous le n° 363-7.

Forme. — Solution.

Composition. — Infusion de Pulmonaire. — Infusion de Carragahen. — Phospho-Gaïacolate de Codéine. — Acide phosphorique.

Propriétés pharmacodynamiques. — Tonique Modificateur de l'expectoration. Sédatif de la toux. Antiseptique des voies respiratoires. Reconstituant de l'état général.

Indications. — Grippe. — Toux catarrhale. Laryngites. — Bronchites. — Congestions pulmonaires. — Séquelles de Coqueluche et de Rougeole.

Mode d'emploi. — 1 cuillerée à soupe, matin et soir, ou au milieu des repas, dans un peu d'eau.

Le flacon : 14 fr. (en France).

Laboratoires A. BAILLY

15, rue de Rome — PARIS (VIII^e).

PULMOSITOIRES

Forme. — Suppositoires créosotés.

Formule :

Adultes : XXX gouttes créosote par suppositoire.

Enfants : X gouttes créosote par suppositoire.

Indications. — Bronchites, broncho-pneumonies, pneumonies, prévention des complications post-opératoires.

Prix : 15 francs.

Laboratoire LECOMTE


82, rue Duhesme — PARIS (XVIII^e).

PULMOVERNE

Antisepsie des voies respiratoires.

Composition. — Solution neutre, sans sucre, ni stupéfiants, contenant par cuillerée à dessert Gaïacol cristallisé 0,075 et Bromoforme 0,033.

Propriétés. — Modificateur des sécrétions bronchiques. Antiseptique, antispasmodique, sédatif de la toux. Sans action sur l'estomac, ne constipant pas.

Indications. — Rhumes, toux rebelles, catarrhes,  bronchites aiguës ou chroniques, toutes affections de l'appareil respiratoire. Grippe, sequelles de rougeole et de coqueluche.

Posologie. — 2 à 4 cuillerées à dessert, dans une boisson (lait, tisane, eau sucrée). Enfants par cuillerées à café.

Le flacon : 12 fr.

Laboratoire VERNE
GRENOBLE

PULSAMONE

Phytothérapie antispasmodique.

Médication exclusivement végétale associant pour la première fois la **Pulsatille** (*Anémone Pulsatilla*), excellent modérateur de l'excitabilité nerveuse et douloureuse, à trois autres plantes également douées de propriétés antinerveuses : **gui**, **saule blanc** (châtons) et **passiflore**.

C'est donc le prototype de l'*anti-spasmodique végétal*, sans stupéfiant, ni toxique dont l'action n'est jamais suivie de dépression.

La **Pulsamone** ne comporte pas de contre-indication et n'offre aucun danger d'accoutumance. C'est pourquoi elle peut être conseillée aux moins résistants : vieillards, enfants, etc., ainsi qu'aux malades particulièrement susceptibles : cardiaques, hépatiques, etc.

Indications. — Véritable médication équilibrante du système nerveux, la **Pulsamone** sera prescrite dans : Neurasthénie, Irritabilité, Angoisse, Anxiété, Psychonévroses, Insomnies, Troubles nerveux de la menstruation et de la ménopause, Troubles cardiaques d'origine nerveuse, Insomnie des biliaires, Excitation nerveuse des hépatiques, Aérophagie.

Dosologie. — Une à deux cuillerées à café, dans un peu d'eau, avant chaque repas ; et, dans les *insomnies*, trois à quatre cuillerées à café, dans une infusion chaude, au coucher.

Prix : 15 francs.

Laboratoires de la **PULSAMONE**

6, rue Dombasle — PARIS (XV^e).

PULVÉOL

(Poudre et pastilles.)

réalisant l'antisepsie du carrefour aéro-digestif.

Antiseptique volatil, dénué de causticité, à base de menthol, eucalyptol, terpinol, essences volatiles, acide borique et borate de soude.

INDICATIONS. — *Oto-rhino-laryngologie et stomatologie courantes.*

— Sinusites, rhinites, pharyngites, trachéites, affections du cavum, angines, stomatites, gingivites. Calme toutes les dysphagies.

Affections respiratoires. — Trachéo-bronchites, gripes à forme respiratoire, asthme, coqueluche.

Hygiène du nez, de la gorge, et de la bouche dans les pyrexies ; dentifrice en nature sur la brosse à dents dans les traitements spécifiques mercuriels ou bismuthiques.

Usage hygiénique : tous professionnels de la voix.

MODE D'EMPLOI. — **Poudre :** inhalation avec une cuiller à café de poudre dissoute dans un bol d'eau bouillante.

Les éléments volatils disparus, il reste une excellente solution tiède antiseptique et isotonique pour gargarismes, bains de gorge ou lavages de bouche.

PASTILLES. — 8 à 10 par jour.

Prix : Poudre : 12 fr.

— Pastilles : 4 fr. 75.

Laboratoire du PULVEOL

10, impasse Milord — PARIS (XVIII^e).

Téléph. : Marcadet 37-98.

PULVITA

Poudre des 4 Gluconates (Mn, Mg, Ca, AzH₄).

Licence exclusive Sandoz.

Pulvita est employé en pansement local dans les affections pulmonaires en particulier.

Prix : 20 francs et boîte grand modèle contenant 7 boîtes ordinaires, au prix de 6 boîtes : 120 francs.

Traitement appliqué en pulvérisations à l'aide d'un pulvérisateur électrique ou à alcool, dit pulvérisateur « Pulvita » appareil indispensable pour pouvoir suivre un traitement par **Pulvita** dans de bonnes conditions.

Prix : Elect. : 150 francs. — Alcool : 80 francs.

Pulvita est admis aux Assurances sociales.

Pour toute documentation écrire aux

Laboratoires A. DANIEL-BRUNET

62, boulevard Jean-Jaurès

BOULOGNE-SUR-SEINE

Tél. : Auteuil 11-86 (Paris-Ouest).

PURAGAR

Cachets.

Laxatif rééducatif de l'intestin.

Composition. — Agar-Agar pulvérisé et stérile. 1 gramme pour un cachet.

Indications. — Toutes constipations avec matières fécales, durcies et desséchées.

Posologie. — 3 à 10 cachets par 24 heures.

Laboratoire de Thérapeutique Normale

CH. LAVIRE, pharmacien de 1^{re} classe

46, rue de Rome

MARSEILLE (B.-du-R.).

PURARGOL

Solution d'argent colloïdal à 5 p. 100.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique puissant dénué de toute causticité et toxicité ; ne coagule pas l'albumine, n'altère pas les épithéliums.

Indications. — Infections des voies respiratoires supérieures ; coryzas aigus et chroniques ; sinusites, rhino-pharyngites, adénoïdites, laryngites, ophtalmologie, obstétrique, otologie, otites. Prophylaxie et traitement des maladies contagieuses : grippe, fièvre éruptive, etc...

Mode d'emploi :

Rhinologie : 4 à 5 gouttes dans chaque narine une ou plusieurs fois par jour.

Otologie : quelques gouttes dans l'oreille malade deux ou trois fois par jour :

Oculistique : introduire deux fois par jour, II à IV gouttes dans l'œil malade.

Obstétrique introduire I ou II gouttes dans chacun des yeux du nouveau-né, sitôt sa première toilette faite.

Prix : 16 francs.

Laboratoires J. BRESSIER

Docteur en pharmacie,
103, rue Vincent — MARSEILLE.

Concessionnaires :

Les **Laboratoires NOVALIS**
OULLINS (Rhône).

PURGANOL DAGUIN

(C²⁰H²⁴O⁴)

Forme. — Pastilles laxatives, à la menthe, dosées chacune à 0 gr. 25 de médicament actif. Bien préférable à la forme comprimés qui se désagrègent mal.

Mode d'emploi. — *Adultes* : 1/2 à une pastille le soir, au coucher.

Enfants : 1/4 à 1/2 selon l'âge. Sucrer lentement et boire ensuite.

Ne donne pas de coliques, ne congestionne pas les organes du petit bassin, ce qui permet aux femmes enceintes d'en faire usage, Laxatif préféré des nourrices.

Le flacon contient 20 pastilles soit 40 doses laxatives. Prix : 7 francs.

Echantillons sur demande aux
Etablissements DAGUIN
 SAINT-MAUR (Seine).

PURGOS

Eau Minérale purgative, Sulfatée sodique et magnésienne. Contient tous les principes de l'Eau Minérale Naturelle de Vichy alliés aux Sels purgatifs MgO — NaO; 60 grammes de Sulfates par bouteille 1/2 litre.

Dose purgative : 1 à 2 grands verres.

Dose laxative : 1 verre à bordeaux le matin à jeun.

3 fr. 50 la bouteille; toutes pharmacies

Dans le cours des voyages, dans les localités où l'Eau de Purgos viendrait à manquer, on peut lui substituer les

COMPRIMÉS PURGOS

qui, dissous dans une Eau Minérale de Vichy, offrent, sous une présentation pratique, toutes les qualités de l'Eau Purgative.

Dose purgative : 4 à 6 comprimés.

Dose laxative : 2 à 3 comprimés.

Le matin à jeun.

En tubes de 24 comprimés, 6 francs toutes pharmacies

Prix spéciaux pour le Corps Médical.

Société PURGOS

Administration :

7, rue Galvani — PARIS.

Exploitation :

111, rue du Maréchal-Pétain — VICHY (Allier).

PYO-AMPHOGEL RONCHÈSE

Gelée molle à l'*Ampho-vaccin* pansement antipyogène.

Composition. — Le *Pyo-amphogel* n'est pas une pommade ni un pansement gélosé. C'est une gelée molle, non grasse, contenant une très forte proportion (75 p. 100) de bouillon-vaccin polyvalent, antipyogène (*staphylocoques*, *streptocoques*, *B. coli*, *entérocoques*, *B. pyocyaniques*).

Avantages. — Ne nécessite pas de fusion préalable. Eminemment absorbable par la peau. Favorise la cicatrisation. Son emploi n'offre aucun danger, il n'a aucune contre-indication.

Indications. — Abscès, Furoncles, Anthrax, Acné, Impétigo, Intertrigo, Eczémas suintants, Ulcères, Sycosis, Mastites, Orgelets Plaies infectées, Brûlures, etc...

Mode d'emploi. — Déposer la gelée sur la région à traiter en se servant d'un coton ou d'une gaze stérile qui sera laissée si un pansement à demeure est possible. Dans le cas contraire, la gelée adhère suffisamment par elle-même.

Prix : 15 francs.

Laboratoires des AMPHO-VACCINS.

A. D. RONCHÈSE, docteur en pharmacie.

Laboratoires : 6, rue Rothschild NICE

Services Commerciaux : 7, rue Foncet — NICE.

Dépôt à PARIS : 62, rue Charlot.

PYOFORMINE

Ampoules de 2 cc.

Mélange de leucocytes, et ferments sécrétés par les globules blancs en suspension dans une solution physiologique d'UROFORMINE GOBEY (Leucocythérapie).

Propriétés thérapeutiques. — Médication préventive et curative de toutes les affections microbiennes non chroniques. Doit être injectée dès l'apparition des symptômes infectieux qu'elle fait alors souvent avorter.

Indications. — Grippe traînante ou compliquée, Suppurations, Angines, Typhoïdes et Paratyphoïdes, Colibacilloses, Cholécystites, Péritonites, Pyélonéphrites, États puerpéraux, Infections pleuro-pulmonaires, Méningites, Encéphalites.

Présentation. — Boîte de 4 ampoules de 2 cc.

Posologie. — Voie intramusculaire ou, en cas d'extrême urgence, voie intraveineuse.

Chez les adultes : 2 à 3 ampoules par jour.

Chez les enfants : 1/2 dose

La PYOFORMINE doit être employée précocement, elle ne détermine aucune réaction, ni locale ni générale.

Prix au public :

La boîte de 4 ampoules : 20 francs.

Laboratoire du Docteur ROUSSEL

89, rue du Cherche-Midi. — PARIS.

PYO-VACLYDUN

Lysats vaccins du Docteur Duchon.

Composition. — Lysat de Streptocoques et de Staphylocoques.

Indications. — Suppurations : phlegmons, abcès, panaris, adénophlegmons, plaies infectées, fractures ouvertes, pyodermites du nourrisson : pemphigus, etc...

Posologie. — Ampoules de 1 cc. Une première injection de 1/2 de cc. les suivantes un centicube tous les jours, puis tous les deux jours. Mêmes doses pour enfants et adultes.

Présentation. — Boîte de 6 ampoules de 1 cc.

Prix : 25 francs.

PYO - VACLYDUN PANSEMENTS

Vaccination locale ampoules de 5 cc.

Mode d'emploi. — Imbiber de vaccin une compresse stérilisée Mettre sur la plaie et recouvrir d'un imperméable. Pour les cavités introduire une mèche imbibée de Pyo-Vaclydun pansement.

Présentation. — Boîte de 6 ampoules de 5 cc.

Prix : 18 francs.

Laboratoire Pharmaceutique CORBIERE

27, rue Desrenaudes — PARIS (XVII^e).

Tél. : Carnot 78-11.

PYRÉLAINE COLLAS

Composition. — Fixation à chaud du soufre sur les acides gras non saturés d'une huile végétale.

Chaque cc. contient 0 gr. 04 de soufre organique combiné non oxydé doué de son pouvoir catalytique. Excipient balsamique.

Propriétés. — Permet d'administrer du soufre actif par voie digestive. Contrairement aux formes habituelles du soufre « per os », la Pyrélaine n'est pas oxydée dans l'estomac et possède une action nette.

Indications. — Toutes celles du soufre. *Carences Sulfurées.* Résultation thérapeutique. Toutes affections tributaires de la Diathèse lithiasique, notamment *Lithiase biliaire*, Cholécystite, Rhumatismes chroniques, Goutte, Dermopathies, Parasites intestinaux.

Pas de contre-indications.

Forme et posologie. — Capsules gélatineuses dosées à 0 gr. 25 (Soufre : 0 gr. 01 par capsule). Affections chroniques et doses d'entretien : 2 à 3 capsules par jour avant les repas, dans une gorgée d'eau.

Crises aiguës : 3 à 6 capsules par jour.

Enfants : moitié de ces doses.

Le tube de 50 capsules : Prix au public : 12 fr.

Société des Produits COLLAS et BOUDAULT

MOUGNAUD et C^{ie}, pharmaciens

Étab. M. Levassor, 35, av. de Beauté — Le Parc St-Maur (Seine).

Tél. : Gravelle 00-37.

PYRÉTHANE

Antinévralgique puissant.

Forme liquide ; Gouttes ; Ampoules.

Composition. — Diméthylaminopyrazoline phenazone carbamate d'éthyle (uréthane.)

Emploi et doses. — Doit se prendre dilué en eau bicarbonatée sodique (Vichy, Vals ou eau ordinaire ou sucrée, 60 cc. avec 0,30-0,50 de bicarbonate.

Gouttes. — *Adultes* : XXV-L à répéter à intervalles de 20 minutes. Chercher la dose-levier et passer aux doses massives LXXX-C, si nécessaire. Maximum : CCC *pro die*.

Enfants : I à II gouttes par année d'âge.

Indications antithermiques : Donner à doses réfractées.

Ampoules A. — 2 cc. antithermiques : 1 à 2 ampoules avec ou sans médication intercalaire.

Ampoules B. — 5 cc. antinévralgiques. Grandes névralgies, tabes, névrites, sciatiques : 1 à 2 par jour, avec ou sans médication intercalaire intensive. Maximum : CC gouttes.

Injectons intramusculaires.

Indications. — Migraines, Céphalalgies, Névralgies essentielles, intercostales, faciales, oculaires (XXV-L à répéter), chercher la dose-levier ; Dysménorrhées (XXV-L) ; Arthrites, Lumbagos, Sciatiques, Radiculites, Polynévrites, Syringomyélie (doses variables) ; Algies syphilitiques, Tabes, Cancer (LX-LXXX-C gouttes, *permettent de garder en main médicale l'emploi de la morphine, de la diminuer ou de l'espacer*) ; Rhumatisme chronique et séquelles rhumatismales (XXV-L, 2 fois par jour) ; phénomènes douloureux, inflammatoires et traumatiques ; Pansements douloureux (Post-opératoire en petite chirurgie). — Echantillons et Littérature.

Gouttes : 18 fr. — **Ampoules A-B** : 16 francs.

Dépôt à Paris : **Pharmacie P. LOISEAU**

61, boulevard Malesherbes — PARIS.

Laboratoires CAMUSET

18, rue Ernest-Rousselle — PARIS.

PYRI-PYRIDIUM

(Phényl-azo- α - α' -diamino-pyridine.)

Un corps chimique nouveau pour la désinfection génito-urinaire par voie buccale; rend antiseptiques les urines même alcalines, pénètre et se fixe dans l'épithélium de l'appareil génito-urinaire; possède une remarquable action analgésique.

Indications. — *Pyélites, Pyélo-néphrites, Cystites, Colibacillose.*

Posologie. — 3 à 6 comprimés par jour après les repas. (Le Pyri-Pyridium colore les urines en jaune-orangé.)

Contre-indication. — Urémie.

Comprimés dragéifiés à 0 gr. 10.

Flacon 20 comprimés : 23 fr. — Flacon 100 comprimés : 105 fr.

Laboratoires SERVIER

25, rue Eugène-Vignat — ORLÉANS

PYROLÉOL EDET

Composition. — Principes actifs de plantes non toxiques à saturation (mélilot, mille-pertuis, eucalyptus, etc.) solution huileuse.

Propriétés. — Neutre et aseptique, non toxique, analgésique et antiseptique, stimulant, tonique et cicatrisant.

Indications. — Brûlures, plaies atones, dermites, radiodermites, ulcères variqueux, engelures, escarres, eczéma, zona.

Présentation. — En flacons : 1/4, 1/2, entier.

Mode d'emploi. — Laver à l'eau bouillie et à l'eau oxygénée. Appliquer compresses stérilisées imbibées de *Pyroléol*. Renouveler après 24 ou 48 heures.

Résultats. — Disparition de la douleur, suppression de suppuration fétide. Production rapide de cicatrices vascularisées lisses, souples, non adhérentes.

Prix au public : 13, 20 et 35 fr.

Pharmacie Centrale de France

7, rue de Jouy — PARIS (IV°).

PYUROL

Composition. — C'est une combinaison de l'urotropine avec :

- 1^o Deux métaux qui en suractivent les propriétés et augmentent l'acidité urinaire, le calcium qui l'oriente vers le rein, le magnésium qui augmente le flux biliaire ;
- 2^o Le buchu, antiseptique urinaire, le boldo, cholagogue puissant.

Indications. — Action antiseptique sur l'appareil urinaire, action sur l'appareil digestif et sur le foie, action sur la diurèse.

Forme et mode d'emploi. — Granulé soluble.

Adultes : infections urinaires moyennes, 3 cuillerées à café dissoutes dans un verre d'eau ou de tisane, prises :

La première à jeun,

La seconde une heure avant le déjeuner,

La troisième une heure avant le repas du soir.

Infections urinaires aiguës, 3 cuillerées à entremets aux mêmes heures

Enfants : ces doses sont diminuées de moitié.

Dosé pour 7 jours. Prix : 15 fr.

Laboratoire A. LE BLOND

Pharmacien de 1^{re} classe, Ex-Interne des Hôpitaux de Paris.,
51, rue Gay-Lussac — PARIS (V^e).

Téléphone : Odéon 20-06. — R. C. Seine 56 049.

QUASSIA-KINA RABOT

Aux écorces d'oranges amères.

Propriétés thérapeutiques. — Reconstituant énergétique. Le meilleur stimulant de l'appétit.

Très bien toléré par les estomacs les plus délicats.

Indications. — Asthénie, Vertiges stomacaux, Inappétence, Débilité, Convalescences.

Formes pharmaceutiques et mode d'emploi.

VIN : Un verre à madère aux 2 principaux repas.

Véhicule idéal de la médication iodée, même intensive. — Prix : 25 fr.

DRAGÉES : Recommandé aux malades, auxquels le vin est contre-indiqué. *Adultes :* 3 à 6 par jour, 1/4 d'heure avant les repas. *Enfants :* 1/2 dose. — Prix : 12 fr. 50.

GRANULE : Convient particulièrement aux enfants. *Adultes :* 1 cuillerée à café aux repas. *Enfants :* 1/2 dose. Prix : 12 fr. 50.

Les Établissements C. DAVID-RABOT

C. DAVID & ses Fils, pharmaciens

49, rue de Bitche — COURBEVOIE (Seine).

QUASSINE HOUDÉ

Granules titrés à un milligramme.

Quassine Houdé

Principe actif *cristallisé* du quassia amara.

Propriétés thérapeutiques :

Amer, excitant énergétique de l'appétit, prescrit dans dyspepsies atoniques, embarras gastrique, contre les borborygmes, l'inappétence, etc.

Doses et mode d'emploi :

4 à 6 granules par jour, pris 5 ou 10 minutes avant les repas.

Laboratoires HOUDÉ

9, rue Dieu — PARIS.

QUEBRALGINE « FOUCHÉ »

Composition. — Québrachine cristallisée, Ovarine, Extrait mammaire associés à l'Hamamelis, l'Hydrastis et le Viburnum, comme catalyseurs de l'action sédative de la Québrachine.

Action thérapeutique et indications. — Médication sédative des phénomènes congestifs et douloureux de l'appareil utéro-ovarien, par action tonique sur le système ortho et para sympathique ; équilibre et régularise le flux cataménial, supplée à son insuffisance ou à sa suppression naturelle (Ménopause) ou chirurgicale (Hystérectomie totale).

Indications. — Ménopause, Menstruations douloureuses, Métrorragies et tous les troubles fonctionnels liés à un hypo-fonctionnement de l'appareil utéro-ovarien. *Spécifique des douleurs de la Menstruation*: aucune toxicité, ne provoque jamais d'accidents.

Posologie. — 6 comprimés par jour, davantage suivant les cas.

Laboratoire R.-P. FOUCHÉ

2, boulevard Pershing — PARIS.

QUERGÉMOL

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle des Médicaments sous le n° 363-8.

Forme. — Dragées.

Composition. — Extrait Cérébrique. Extrait Splénique, Bromhydrate de Quinine, Méthylarsinate disodique, Nucléinate de Manganèse.

Propriétés pharmacodynamiques. — Reconstituant opothérapique du cerveau et de la rate, Antitoxique, Antihémolytique, Régénérateur des globules sanguins, antiasthénique.

Indications. — Paludisme chronique. — Anémie palustre. — Fièvres intermittentes, — Asthénie post-grippale.

Mode d'emploi — 2 à 6 dragées par jour au début des repas.

L'étui : 20 fr. (en France).

Laboratoire A. BAILLY

15, rue de Rome — PARIS (VIII^e).

QUINA BARON

à l'extrait sec complet de quina.

Solution sans alcool, correspondant à 0 gr. 50 d'extrait par cuillerée à soupe.

Mode d'emploi :

Deux à trois cuillerées à soupe par jour, avant chaque repas.

Propriétés :

Anémiés, convalescents, tuberculeux, opérés, femmes enceintes, nourrices et dans tous les cas où l'organisme doit être tonifié.

Prix : 15 francs.

P. FOURNIE

Pharmacien de 1^{re} classe

3, place de la Miséricorde — LYON.

QUINACRINE (866 R. P.)

Dichlorhydrate de la chloro 2-diéthylamino-pentylamino 5-méthoxy 7-acridine.

Médication antipaludique essentiellement schizonticide, bien tolérée par les voies digestives, pouvant dans tous les cas remplacer la quinine.

Indications. — Action élective sur les schizontes et les gamètes du *Pl. quartanum* (fièvre quarte) et *Pl. vivax* (fièvre tierce bénigne). Actif à l'égard des schizontes de *Pl. précqx*. Prophylaxie du paludisme.

Présentation et posologie. — Comprimés dosés à 0 gr. 10 de Quina-crine. Flacons de 15 et 30 comprimés.

Dose habituelle.

Adultes et enfants de plus de 8 ans : 0 gr. 30 par jour.

Enfants de 4 à 8 ans : 0 gr. 20 par jour.

Enfants jusqu'à 4 ans : 0 gr. 10 par jour.

Durée du traitement : 5 jours au minimum, 8 jours au maximum. Périodes de repos de 3 à 4 jours. A titre prophylactique, un comprimé tous les soirs. Prendre les comprimés, sans les faire dissoudre, au moment des repas.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

SPECIA

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône.

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

QUINA pepsiné **BLOT** **Gouttes.**

Composition. — Extrait total dosé de quinquina succimbra, combiné à la pepsine. Obtenu *sans sucre ni alcool*.

Caractéristiques. — Agit à doses dix fois moindres que les teintures courantes. Pas de phénomènes d'intolérance.

Indications. — Faiblesse générale. Dénutrition. *Paludisme*. Maladies pneumococciques. Tuberculoses. Nervosisme et maladie de Basedow. Constipation. Diabète.

Doses. — Comme stimulant de la nutrition : 15 gouttes un quart d'heure avant chaque repas.

Dans la prophylaxie de la grippe : 2 gouttes (5 mgr. d'alcaloïdes) le matin.

Dans le traitement du paludisme : 50 à 60 gouttes deux fois par jour.

Comme tonique du système nerveux et du cœur : 10 gouttes à chaque repas.

Le flacon : 14 fr. 40.

Le 1/2 flacon : 9 francs.

Laboratoire du QUINA BLOT
38, boulevard de Strasbourg
TOULOUSE.

QUINARSOL ANTIANÉMIQUE

Extrait de quinquina Grandval
associé aux Strychno-Phospharsinates.

Propriétés thérapeutiques :

Tonique. — Stimulant général. — Apéritif.

Composition. — *Chaque comprimé contient :*

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Quinquina Grandval..... | 0 gr. 30 |
| Glycérophosphates composés..... | 0 gr. 30 |
| Strychnine combinée..... | 1 mgr. 60 |
| Arsenic combiné | 0 mgr. 18 |

Indications. — Anémie, Surmenage intellectuel et physique, Faiblesse générale, toutes convalescences, Grippe. — Diabète et ses complications, Séquelles du Paludisme.

Permet l'absorption facile du Quinquina et de la Strychnine.

Dose :

2 comprimés avant chacun des deux principaux repas.
La boîte de 32 comprimés : 12 fr.
(Toutes pharmacies.)

Laboratoires GRANDVAL

12 et 14, rue Féry — REIMS.

QUINARSOL FÉBRIFUGE

Extrait de quinquina à haut titre aloaloïdique
avec fer et arsenic assimilable.

Composition. — *Chaque comprimé contient :*

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Quinquina Grandval (à haut titre) .. | 0 gr. 60 |
| Fer combiné | 0 gr. 015 |
| Arsenic combiné | 0 mgr. 90 |

Propriétés thérapeutiques :

Antipaludique. — Permet, suivant la dose, soit de juguler l'accès, soit de combattre l'état chronique et de faciliter la résistance de l'organisme. — Régénérateur du Globule et des Eléments protoplasmiques.

Indications :

Paludisme et ses conséquences, Fièvre de Malte, Affections produites par le séjour dans les pays chauds.

Dose :

Pendant la crise, 4 à 8 comprimés par jour, suivant la violence de l'accès. — **Etat chronique**, 4 comprimés par jour.

La boîte de 30 comprimés : 14 fr. (toutes pharmacies).

LABORATOIRES GRANDVAL

12 et 14, rue Féry — REIMS.

QUINBY ET QUINBY SOLUBLE

Quinio-Bismuth, formule Aubry.

Adoptés par les hôpitaux de Paris, les Ministères de la Santé publique, des Colonies, de la Guerre et de la Marine. — Produits originaux à base d'iodo-bismuthate de quinine chimiquement pur :

a. En suspension huileuse 10 p. 100 (QUINBY) ;

b. En solution aqueuse incolore (QUINBY SOLUBLE).

Propriétés thérapeutiques. — *Syphilis* : A toutes ses périodes et sous toutes ses formes. — *Pian*. — *Fièvre typhoïde*. — *Fièvre de Malte*, injections intramusculaires indolores. Pas de stomatite, ni abcès, ni indurations. Aucune toxicité.

Présentation. — *Quinby* : 1° Ampoules normales de 3 cc. correspondant à 0 gr. 075 de bi-métal (boîtes de 12 et 6 ampoules).

2° Ampoules double dose (étiquette bleue) de 3 cc. correspondant à 0 gr. 15 bi-métal (boîtes de 12 et 6 ampoules) ;

3° Ampoules infantiles de 1 cc. 5 correspondant à 0 gr. 0375 de bi-métal (boîtes de 12 ampoules seulement).

Quinby soluble : 1° Ampoules de 5 cc. (adultes) correspondant à 0 gr. 05 de bi-métal (boîtes de 6 ampoules).

2° Ampoules de 2 cc. (enfants) correspondant à 0 gr. 02 de bi-métal (boîtes de 6 ampoules).

Posologie. — *Adultes* : 12 injections de 3 cc. (Quinby) ou 18 injections de 5 cc. 2 injections par semaine.

Enfants : idem, mais à raison de 2/10 de cc. par année d'âge.

Fièvre typhoïde. — Une injection tous les 2 jours et dans les cas graves tous les jours, jusqu'à concurrence de 5 à 6 injections après lesquelles la défervescence totale est obtenue.

Fièvre de Malte. — Douze injections environ (1 tous les 2 jours) pour obtenir la disparition de la fièvre.

N. B. — Dans la syphilis, les ampoules QUINBY SOLUBLE sont plus spécialement réservées au traitement d'attaque de la maladie ou de ses manifestations morbides, les ampoules QUINBY (étiquette bleue) lorsque l'on désire faire des piqûres moins fréquentes.

Toutes ces ampoules peuvent être livrées directement, en vrac, par boîtes de 25, 50 ou 100, à des prix très avantageux, à MM. les docteurs qui en font la demande directe aux Laboratoires, ou aux Agents.

Prix au public : (France)

| | |
|--|--------|
| <i>Quinby</i> (normal ou étiq. bleue), la boîte de 12 ampoules | 35 fr. |
| <i>Quinby</i> (normal ou étiq. bleue), la boîte de 6 ampoules | 20 fr. |
| <i>Quinby infantile</i> , la boîte de 12 ampoules | 25 fr. |
| <i>Quinby soluble</i> , adultes, la boîte de 6 ampoules | 20 fr. |
| <i>Quinby soluble</i> enfants, la boîte de 6 ampoules | 15 fr. |

N. B. — En France, tous les médecins peuvent se procurer *gratuitement* nos ampoules, pour leurs malades pauvres, en adressant leurs demandes à l'organisme départemental créé à cet effet par le Ministère de la Santé publique.

En Belgique, nos ampoules peuvent être prescrites aux frais de l'État, par MM. les médecins autorisés.

Laboratoires P. AUBRY

62 rue Erlanger — PARIS (XVI^e). — Tel. : Jasmin 33-44

Belgique et Congo :

Laboratoires Belges du Quinby

Romain Deschiens — 74, avenue Louis Bertrand — BRUXELLES

QUINÉINE

Extrait intégral des principes actifs
du quinquina.

Préparation concentrée, de titrage fixe, très active, faite avec des écorces choisies de même origine, concassées de la même façon, etc. XL gouttes deux fois par jour comme tonique. Dose fébrifuge : par 1/2 cuillerée à café. En solution non alcoolique.

Indications. — Paludisme, grippez, asthénie, convalescences, anémies.

Prix au public : 15 francs.

Autorisé par les *Assurances Sociales*.

Laboratoire des Produits SCIENTIA

Dr E. PERRAUDIN, pharmacien,
21, rue Chaptal — PARIS.

QUINICARDINE

Forme. — Comprimés à 0 gr. 20.

Ampoules à 0 gr. 50 pour injections intra-veineuses.

Indications. — Arythmie complète permanente par fibrillation auriculaire, Arythmie extra-systolique, Tachycardie paroxystique totale, Tachycardie paroxystique par flutter non-permanent, Tachycardie permanente régulière par flutter permanent, Tachycardie avec syndrome de Basedow.

Doses. — Consulter la notice complète qui sera adressée sur demande.

Prix : 14 francs.

LABORATOIRE NATIVELLE

27, rue de la Procession — PARIS-15.

QUININO-PHYTINE CIBA

Phosphate organique de quinine.

Contenant 57 p. 100 de quinine et 11 p. 100 de phosphore il réunit l'action spécifique de la quinine à l'action tonique et reconstituante de la Phytine. Très soluble. Tolérance parfaite.

Indications. — Celles de la quinine en général et plus particulièrement : Grippe, Migraines, Névralgies, Paludisme (surtout les formes anciennes accompagnées de cachexie et d'anémie). Maladies infectieuses, Coqueluche, Diabète, etc.

Doses. — Les mêmes que pour le sulfate ou le chlorhydrate de quinine.

Le tube de 20 comprimés : 10 francs,

Le flacon de 50 comprimés : 20 francs.

On trouve aussi la Quinino-Phytine en prac, et on peut la formuler comme les autres sels de quinine.

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND

109-113, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.

QUINIO-STOVAR SOL

4 oxy-3 acétylamino-phényl-
1 arsinat de quinine.

Combinaison chimique définie, renfermant des proportions égales de Quinine et de Stovarsol ; le pouvoir curatif des composants est exalté par cette association.

Indications :

Paludisme (prophylaxie et traitement).

Présentation : Tubes de 20 comprimés.

Posologie et mode d'emploi :

Traitement curatif : 4 comprimés à 0 gr, 25 par 24 heures (3 ou 4 séries de 10 jours, séparées par 5 jours de repos).

Prophylaxie : 1 comprimé le matin à jeun.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

QUINOFORME LACROIX

Composition. — Formiate basique de quinine découvert par H. Lacroix, inscrit au Codex (1925).

Avantages. — Le plus soluble et le plus actif des sels de quinine. Le plus riche en quinine (87,56 p. 100) des sels basiques ou neutres. Injection indolore, n'occasionnant jamais d'abcès.

Indications. — Paludisme, Fièvres malariques, Fièvres intermittentes

Formes pharmaceutiques :

Ampoules : 6 et 12 ampoules de 0,25, 0,50, 0,75, 1 gr., 1,25 et 1,5.

Cachets : 6 et 12 cachets de 0,25 et 0,50.

Comprimés : 10 et 20 comprimés de 0,10 à 0,50.

Pilules à 0,10.

Ampoules, boîte de 6. Prix : 9 fr. 50, 13 fr., 16 fr. 50, 22 fr., 27 fr. 29 fr. 50.

Boîte de 12. Prix : 15 fr., 24 fr., 29 fr. 50, 37 fr., 44 fr., 49 fr.

Cachets, boîte de 6. Prix : 7 fr., 12 fr.

Boîte de 12. Prix : 12 fr., 22 fr.

Comprimés, boîte de 10. Prix : 5 fr. à 16 fr. 50.

Boîte de 20. Prix : 9 fr. à 26 fr. 50.

Pilules. Prix : 11 fr.

Peut être prescrit aux Assurances sociales.

Laboratoires H. LACROIX

V. Merobian et fils, successeurs.

37, rue Pajol — PARIS (XVIII^e).

QUINOÏDINE DURIEZ

dérivé du quinquina.

Antiseptique du sang, tonique général et toni-cardiaque, antinévralgique.

GRIPPE, Paludisme et leurs séquelles : Prévention et traitement. Névralgies grippales ou palustres.

Convalescence de maladies infectieuses : Pneumonie, Diphtérie, Typhoïde, etc.

Petites défaillances, Nervosité ou Irrégularités du cœur avec ou sans lésions.

Aucun des inconvénients de la quinine, même après usage prolongé (Voir *Bull. Académie de médecine* : Communication du D^r Burdel ; communications des D^{rs} Le Moine, Dardenne, Dujardin-Beaumetz, etc.).

0 gr. 10 quinoïdine pure par dragée. 2 à 8 dragées par jour, au début des repas, pendant plusieurs semaines au besoin.

DURIEZ

20, place des Vosges — PARIS.

QUINQUINA GMET

Composition. — Extrait total obtenu directement et exclusivement à l'aide du quinquina succirubra. Coloration et amertume parfaitement naturelles. *Sans alcool.*

Propriétés. — Stimulant apéritif fébrifuge. *Active remarquablement la phagocytose.*

Indications. — Anémie, anorexie, grippe, tuberculose, épidémies, paludisme, tous les états fébriles ou non où l'activité leucocytaire doit être stimulée. Aménorrhée. Athrepsie.

Posologie. — 1 à 3 cuillerées à café dans un peu d'eau ou de vin *immédiatement avant un repas* ou l'absorption d'une tisane, d'un peu de lait, d'un biscuit.

Le grand pouvoir apéritif du Quinquina GMET peut occasionner (si le malade ne mange pas aussitôt après) la sensation nauséuse consécutive à la faim non apaisée.

Prix : 18 francs.

Laboratoire GMET

27, faubourg Montmartre — PARIS (IX^e).

QUINSAL

Médication Quino-salicylique-lithinée
en tablettes glutinisées.

ACTION THERAPEUTIQUE POLYVALENTE

Calmant Immédiat de la Douleur par le groupement acétylsalicylique et la Quinine.

Antithermique par la Quinine.

Diurétique et Uricolytique par le Sel de Lithine et la Quinine.

Spécifique antirhumatismal par l'ion salicylé. Tolérance parfaite (tablettes glutinisées).

Indications. — Rhumatismes, Sciaticque, Lumbago, Névralgies, Douleurs grippales et en général toutes les Algies.

Posologie. — *Cas aigus.* — De 7 à 12 tablettes en trois fois par 24 heures, de préférence loin des repas afin que l'action sédatrice soit plus rapide.

Cas chroniques : Dans l'intervalle des accès : 3 par 24 heures.

Enfants : de 1 à 3 par 24 heures.

Prix de la boîte : 15 francs. Peut être prescrit aux A. S.

Laboratoire du QUINSAL

F. BOLLA, Docteur en pharmacie.

Licencié ès-sciences.

GRAY (Haute-Saône)

Echantillon et littérature sur demande.

QUINTHÉRYL

Composition. — Ether anesthésique, essence de serpolet, oléo-campbre.

Applications. — Traitement *curatif* de la coqueluche, de la trachéite, de la laryngite; *correctif* de toutes les toux quinteuses émétisantes, de l'asthme et de l'emphysème. Peut être employé dans les affections des voies pulmonaires.

Présentation :

1° Ampoules de 1cc. (série A) pour les enfants de moins de 2 ans.

2° Ampoules de 2 cc. (série B) pour les enfants plus âgés et les adultes.

Posologie. — Une injection *Intramusculaire* (pratiquement *indolore*), hebdomadaire pour les enfants, tous les quatre jours pour les adultes.

Prix : Série A : 12 fr.

Série B : 15 fr.

DÉPOT GÉNÉRAL,

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS :

M. LÉONARDON, Docteur en pharmacie.

Licencié ès sciences. Ancien Élève de l'Institut Pasteur.
ARCACHON (Gironde).

QUINTOZONE

(Inhalant)

Médication naturelle et externe des maladies de l'appareil respiratoire.

Formule. — Essences balsaniques ozonisées (Pin, Eucalyptus, Lavande, Serpolet... etc), 13 + Benzoate de benzyle, 1 + Iodure d'éthyle, 0,5 + Acétate d'éthyle, 0,2 + Excipient, 85, 3.

Indications et mode d'emploi :

Coqueluche, bronchite, broncho-pneumonie, badigeonnages et frictions sur le thorax.

Asthme, Rhume des foins, Coryza : Inhalations fréquentes sur un mouchoir.

Laryngites, trachéites, Angine : Compresses, Inhalations.

Assainissement des chambres des malades : Vaporisation, Evaporation.

Propriétés. — Avantages. — Odeur agréable, analgésique, antispasmodique, anti-congestif.

Le QUINTOZONE agit par évaporation et endosmose.

Présentation. — Flacon stilligoutte pour usage externe

Prix : 10 francs.

Laboratoires de l'OLIPHÉDROL

18, rue Daval PARIS (II^e).

QUINURYL

Spécifique de l'*Azotémie*, adjuvant du régime hypoazoté. Cachets à base d'acide quinique.

Indications. — Symptômes de la petite azotémie. Céphalées, vertiges, éblouissements, bourdonnements d'oreilles, etc...
2 à 4 cachets par jour à prendre de préférence avec une infusion de fleurs de sureau ou de feuilles de bouleau.

La boîte : 16 francs.

Laboratoires LONGUET

34, rue Sedaine — PARIS (XI^e).

RADIOGASTROL

Le médicament de choix des Gastropathies rebelles.

Composition. — Bismuth Salicylate, Charbons activés polyvalents, Carbonate de chaux.

Indications. — Dyspepsies, Gastralgies, Hyperchlorhydrie, Intoxications, Fermentations, Ulcérations, Pyrosis, Entéro-colites, Asthénie, Débilité, Carence de déminéralisation.

Présentation :

Forme poudre. — Forme comprimés.

La grande boîte : 16 fr. — La 1/2 boîte : 10 fr.

Posologie :

Poudre : 1 cuillerée à café avant les repas et une autre après, si besoin.

Comprimés : 4 à 6 comprimés avant les repas et autant après, si besoin.

Laboratoires BOYER et Cie

12, rue Pavée — PARIS (IV^e).

RADIO-MORDANT LEISYN

Formuler : 1 boîte 15 ampoules **RADIO-MORDANT LEISYN**.

Présentation. — Ampoules de 4/5 cc. environ.

Technique. — Une injection de 1 ampoule, soit 4/5 cc., avant la séance de radiothérapie. Les jours où il n'y a pas séance de radiothérapie ou entre les séries d'applications de rayons, ou encore pendant les applications de radium, l'injection peut être faite à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit, sans tenir compte des phénomènes digestifs ou menstruels.

Indications. — Tumeurs cancéreuses et néoplasies de toutes sortes traitées par le radium ou la radiothérapie.

Action. — Renforce et prolonge considérablement l'action du radium ou de la radiothérapie en paraissant produire une sorte de fixation sur les manifestations malignes de toutes sortes.

Composition. — Fer (oxydé et préparé par procédé spécial), Chaux, Alumine, Magnésie, Chlore, Soude, Potasse, Ammoniaque, Acide sulfurique, Acide citrique, Acide acétique, Acide phosphorique, Essence antiseptique. Préparé par procédé spécial au Sodium et gaz acétylène à hautes températures et à très hautes pressions. Préparation négativée à ne pas confondre avec l'ANEO LEISYN qui est une préparation non négativée.

Aucune toxicité. Innocuité absolue. Aucun inconvénient. Pas de contre-indication.

Echantillonnage. — Afin de faciliter l'expérimentation nous consentons à céder, d'après nos disponibilités, à chaque médecin, une seule boîte de 15 ampoules de **RADIO-MORDANT LEISYN** au prix de 50 francs (52 fr. 50 contre remboursement). Ce prix de 50 francs, qui ne représente qu'une partie de notre prix coûtant, ne peut être accordé qu'une seule fois et ne peut être utilisé par un médecin ayant déjà été échantillonné en **RADIO-MORDANT LEISYN**.

Les Laboratoires **LEISYN**

1 bis, rue Molitor — PARIS (XVI^e).

Téléphone : Auteuil 14-73. C. C. postaux : PARIS 1075-98

Adresse télégraphique : LABOLEISYN-PARIS.

RADIOPAQUE HEUDEBERT

Composition. — Le RADIOPAQUE Heudebert est un repas d'épreuve pour examen radiologique du tube digestif; son opacité est obtenue par le sulfate de baryum gélatineux en suspension dans un support alimentaire composé d'hydrates de carbone, de graisses et de matières azotées représentant une valeur nutritive de 750 calories pour la dose de l'examen.

Avantages. — En raison de sa réelle valeur alimentaire, le RADIOPAQUE ne modifie en rien le rythme des contractions et permet l'examen du tube digestif dans son état de fonctionnement normal; de plus, son goût très agréable de crème au chocolat le fait accepter sans répulsion par les malades les plus difficiles.

Présentation. — Il est présenté en flacons de 400 cc. pour examens complets et en 1/2 flacons pour examens partiels et examens des enfants. Il est prêt à l'emploi sans aucune préparation supplémentaire et son bouchage dans le vide suivi de 2 stérilisations lui assure une conservation indéfinie.

Prix : le flacon : 20 francs.

Produits de Régime HEUDEBERT

85, rue Saint-Germain — NANTERRE (Seine).

2 et 4, chemin Feuillat — LYON.

RADIOTÉTRANE GÉRARD

Composition. — Tétra-ido-phénol-phtaléine disodique.

Mode d'action. — Opacifie la vésicule biliaire aux rayons X.

Avantage. — Stable, de composition constante, non toxique. *

1° *Forme dragées* : grâce à son enrobage spécial, la dissolution intestinale et la visibilité vésiculaire sont assurées.

2° *Forme colloïdale* : préparation liquide faite pour les malades ne pouvant absorber les dragées.

3° *Forme poudre* : préparation à faire dissoudre dans un demi-verre d'eau.

4° *Forme ampoules* : pour injection intraveineuse.

Indications. — Examens radiologiques de la vésicule biliaire.

Forme et mode d'emploi :

1° *Dragées* : 15 à 20 au cours du repas. Visibilité maxima entre la 14^e et 18^e heure : 25 francs.

2° *Forme colloïdale* : mélanger le contenu des deux flacons immédiatement avant l'absorption. Absorber la totalité du liquide (environ 60 cc.) : 25 francs.

3° *Forme poudre* : faire dissoudre dans un demi-verre d'eau et prendre en une ou deux fois : 23 francs.

4° *Forme intraveineuse* : Faire dissoudre dans 50 cc. d'eau bi-distillée et injecter très lentement : 12 fr. 50.

5° *Forme colloïdale grand modèle*, créé pour l'application de la méthode Sandström : 50 fr.

Laboratoire du Docteur LAURENT-GÉRARD

Docteur ès sciences. Ancien chef de Laboratoire à la Faculté de Médecine de Paris.

40, rue de Bellechasse — PARIS (VII^e).

LE RAISIN QUOTIDIEN

Composition. Pur jus de raisin frais sans alcool. Préparé avec les meilleurs raisins de l'Anjou, pasteurisé à température modérée, renferme intégralement toutes les vitamines, albumines, corps azotés. Maintenu dans le vide dans sa bouteille, ce qui évite toute oxydation. Ni antiseptique, ni acide sulfureux.

Indications. — Auto-intoxication, Arthritisme, Maladies de l'estomac, du foie, de l'intestin, des reins, Boisson de table pour estomacs délicats.

Mode d'emploi. — Pur ou mélangé d'eau à table, ou un verre à bordeaux avant chaque repas.

Prix : 10 francs la bouteille.

Henri CHARTIER
SAUMUR

RANGOL

Forme. — Comprimés.

Formule :

Gardénal, Tartrate borico-potassique, NaBr, Extraits de datura, jusquiame, gelsemium, cratægus, ballote, passiflore, valériane stabilisée, pancréas.

Indications :

Irritabilité du sympathique, angor, névroses, insomnies, spasmes.

Posologie :

2 à 8 comprimés par 24 heures par doses fractionnées.

Prix : 18 francs.

Laboratoires LACOR

81, rue de la Roquette — PARIS.

RÉALPHÈNE

Ether phosphorique du glucose
et Stovarsol calcique.

Augmentation rapide et durable
de l'appétit, du poids et des forces.

Indications :

Asthénie, Anorexie, Amaigrissement, Convalescences, Anémies, Surmenage, Entérites chroniques, Troubles généraux de la nutrition.

Formes :

1° comprimés ; 2° cachets ; 3° granulé ; 4° élixir.

Posologie :

Adultes. Comprimés et cachets (10 centigr. de Stovarsol calcique et 2 centigr. d'éther phosphorique du glucose par comprimé ou cachet) : 1 à 2 par jour, pendant 6 jours, et repos d'une semaine.

Granulé (5 centigr. de Stovarsol calcique et 2 centigr. d'éther phosphorique du glucose par mesure) : 2 à 4 mesures par jour, pendant 6 jours et repos d'une semaine.

Elixir (5 centigr. de Stovarsol sodique et 2 centigr. d'éther phosphorique du glucose par cuillerée à potage) : 2 à 4 cuillerées à potage, par jour, pendant 6 jours, et repos d'une semaine.

Enfants : Jusqu'à 12 ans. *Granulé* : 1 à 2 mesures par jour pendant 6 jours et repos d'une semaine.

Nourrissons. Granulé : 1 à 3 demi-mesures par jour pendant 4 jours et 4 jours de repos (1 centigr. 1/2 à 2 centigr. de Stovarsol calcique par kilogr. de poids et par jour).

Prix de vente au public :

Granulé, comprimés, cachets : 20 fr.

Elixir : 15 fr. Coffret de 3 flacons de granulé : 50 fr.

Société Générale d'Applications Thérapeutiques
THERAPLIX

R. MOREUX, Pharmacien
Ancien interne des hôpitaux

98, rue de Sèvres — PARIS (V II^e).

RECONSTITUANT MARY

Propriétés thérapeutiques. — Tonique de premier ordre ; grande richesse thérapeutique.

Nature à base de Noix vomique, Arrhénal, Kina, Coca, Kola, Colombo, Gentiane, etc. Traitement curatif des anémies, lymphatisme, anorexie, convalescences.

Mode d'emploi. — 1 à 2 verres à madère au milieu du repas. Demi-dose pour enfants.

Prix : 20 francs.

**Laboratoire
du reconstituant MARY**

32, rue de l'Ouest — PARIS.

P. TAVERNIER, Docteur en pharmacie.

RECRESAL

Composition. — Orthophosphate monosodique.

Indications. — 1° Toutes les maladies infectieuses aiguës

2° Faiblesse constitutionnelle ; anémie, rachitisme, scrofuleuse, tuberculose, y comprise la tuberculose osseuse.

3° Etats d'épuisement général, physique ou psychique, par suite de surmenage, spécialement aussi chez les enfants en âge scolaire ; stimulation de la capacité de rendement physique et mental.

4° Stimulation énergique de la guérison après interventions chirurgicales et gynécologiques.

Posologie. — Comprimés de Recresal : 3 fois par jour 1 à 3 comprimés 1/4 d'heure après le petit déjeuner et le déjeuner de midi.

Présentation :

Petite boîte : 30 comprimés : 10 francs.

Grande boîte : 60 comprimés : 18 francs.

Laboratoire RECRESAL

Pharmacie Normale L. BÉLIERES,
Docteur en Pharmacie

19, rue Drouot — PARIS (IX^e).

RECTAGINE

(Suppositoires radifères).

Composition. — Organate d'argent à 17 p. 100 d'argent pur, Hydrargyre, sulfo-oléo sulfonate de sodium camphré, et bromure de radium.

Indications. — 1° *Chez l'homme* : Agit sur les complications de la blennorrhagie, sur l'urètre, les testicules, les vésicules séminales, la prostate, etc.

2° *Chez la femme* : Action complémentaire des crayons Leucagine dans le traitement des métrites à tous stades ; médication de tous les états congestifs ou infectieux de l'utérus, des trompes et des ovaires.

3° *Cas particuliers* : Action résolutive très nette sur : le prurit anal, les érosions de l'an us, les hémorroïdes internes et les oxyures.

Posologie. — Introduire un suppositoire au moment du coucher, pendant 10 jours consécutifs, ou tous les 2 jours suivant le cas.

La boîte de 10 suppositoires : 15 fr.

Laboratoires pharmaceutiques

L.-G. TORAUDE, O. ✱, O. I. Q.

Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.
Lauréat de l'Institut et de l'Académie de Médecine.
22, rue de la Sorbonne — PARIS (V°).

RECTOLINE

Pommade lanolinée à base d'Œsculine adrénalinée et d'Ortho-cocaïne, livrée en tube avec canule spéciale.

Pansement hémorroïdicure parfait.

Prop. thér. — Action calmante, décongestionnante, hémostatique et directement curatrice. Absorption facile, inodore, incolore. Application méthodique *loco dolenti* et toujours aseptique.

Prix : 14 francs complète.

Tube de rechange : 12 francs.

Laboratoire de la Varilaxine
SURGÈRES (Charente-Inférieure).

RECTOPANBILINE

Formes. — Solution pour lavement et suppositoires.

Définition. — Lavement établi d'après les dernières données scientifiques et les travaux du D^r Bensaude amenant, en quelques minutes, sans réaction nocive, par un mécanisme physiologique, une évacuation complète de tout le gros intestin. — Non irritant, non douloureux, non toxique, non salissant. — Concourt, en outre, à la guérison durable de la *Constipation* en rétablissant la biligenèse normale grâce à sa teneur en *Panbiline*. (Voir *Panbiline*.)

Composition. — Est une *Panbiline* avec prédominance d'Extrait de *Bile fraîche* additionnée dans les suppositoires de glycérine solidifiée.

Indications. — Toutes les modalités de *Constipation* médicale. En s'opposant à l'*Auto-intoxication intestinale*, supprime ses nombreuses manifestations pathologiques (troubles digestifs, nerveux, nutritifs, cutanés, etc.). Est le meilleur moyen d'entraver le développement de l'*Artériosclérose* dont le point de départ est aujourd'hui rattaché universellement à l'*Auto-intoxication intestinale* (Huchard, Chauffard, etc.). Résout parfaitement le problème posé par Metchnikoff dans ses travaux sur la *vieillesse précoce*.

Autres indications : Hémorroïdes, Vers intestinaux, Etats où la défécation doit se faire sans efforts, Hernies, Grossesse, Accouchements.

Posologie. — Un ou 2 suppositoires par jour ou 1 à 3 cuillerées à café de solution dans 160 gr. d'eau bouillie chaude à prendre en lavement à garder quelques minutes. — Demi-dose pour les enfants.

Prix au public : 12 francs le pot de Rectopanbiline.
10 francs la boîte de suppositoires.

Laboratoire du Docteur PLANTIER
ANNONAY (Ardèche).

RECTOSOL (Suppositoires)

Antihémorroïdaires.

A base d'iodorésorcinosulfite de Bismuth avec excipient Rectoline.

Indications. — Hémorroïdes internes et leurs complications.

Dose et mode d'emploi. — Introduire un ou deux suppositoires le matin une heure environ avant la selle, après l'application de la Rectoline, ou le soir en se couchant lorsque les hémorroïdes sont congestionnées et douloureuses, par suite de la fatigue de a journée.

Prix : 14 francs.

Laboratoire de la VARILAXINE
SURGÈRES (Charente-Inférieure).

RÉNALEPTINE

3 - 4 dioxypényl - 1 méthyl - amino - éthanol.
(Adrénaline pure lévogyre.)

Indications :

Toutes les affections où l'on recherche des effets vaso-constricteurs.

Prévention et traitement des crises nitritoïdes.

Présentation : Solution au 1/1000.

Flacon de 15 cc., 30 cc. — Boîtes de 5 et 10 ampoules.

Solution au 1/2000 : Boîtes de 5 et 10 ampoules.

Posologie et mode d'emploi. — Solution de Rénaleptine à 1/1000. Doses par 24 heures :

Voie buccale : X à XXX gouttes de la solution à 1/1000.

Voie sous-cutanée ou intramusculaire : 1 ampoule de 1 cc. de la solution au 1/1 000 ou de la solution au 1/2000.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

RENION VINCARDI

Diurétique rénal.

Principes actifs. — Théobromine pure recristallisée, Extrait Scille stabilisée, Scammonée.

Forme. — Comprimés se délitant rapidement dans les liquides aqueux, tisanes, infusions, eaux minérales. Ne provoque ni nausées, ni céphalées.

Indications. — Régulateur de la fonction rénale, Diurétique énergique et inoffensif, Affections cardio-rénales, Asthénies, Hypertension, Néphro-sclérose, albuminuries.

Doses. — 3 à 4 comprimés par 24 heures dans infusions ou eaux minérales au milieu des repas principaux.

Littérature et échantillons sur demande :

Laboratoire VINCARDI

Ph. VIGUIER, pharmacien.

14, avenue G.-Clemenceau — NICE (A.-M.)

R. C. Nice : 9046.

RÉNOVOL

Composition. — Hamamélis, Hydrastis, Marron d'Inde, Viburnum, Sénéçon, Piscidia, Cratœgus, Passiflora, Condurango, Cascara, Peptone iodée.

Indications. — Tous les accidents de la puberté, de la menstruation et du retour d'âge, douleurs des règles, maux de tête, Constipation, Varices, Hémorroïdes, Ulcères variqueux, Etats congestifs. Sédatif du système nerveux.

Mode d'emploi. — 2 cuillerées à café par jour dans un peu d'eau avant les repas.

Prix : 12 francs.

Laboratoires du Rénovol

A. DEBROCK

Pharmacien de 1^{re} classe

22, rue de Paris — HOUILLES (S.-et-O.).

RÉPARATEUR THUAU

(Vin)

Reconnu médicamenteux par la Faculté de Pharmacie de Paris après analyse du Laboratoire National de Contrôle des Médicaments. Sous le n° 183.

Composition. — Pour un verre à liqueur :

| | |
|---|-----------|
| Extrait hydroalcoolique de Kola stabilisée.. | 0 gr. 15 |
| Extrait hydroalcoolique de Coca du Pérou.. | 0 gr. 15 |
| Extrait sec de Noix Vomique | 0 gr. 009 |
| Samos et bouquet oenanthique pour 20 cent. cub. | |

Mode d'emploi. — Deux verres à liqueur par jour, après les deux principaux repas.

Action. — Tonique reconstituant, stimulant, anti-dépériteur. Médication pour adultes.

Indications. — Convalescences, épuisement, surmenage, neurasthénie, faiblesse générale.

Présentation. — Vin. Son prix : 15 francs.

Fabrication. — Laboratoire du Réparateur THUAU, Angers.

Vente. — Dans toutes les bonnes Pharmacies.

Laboratoire du Réparateur THUAU

22, faubourg Saint-Michel — ANGERS (Maine-et-Loire).

Envoie Echantillons et Littérature.

RÉSOCAINE

Pommade nasale. Non toxique.

Effets remarquables.

Pas d'accoutumance.

Forme. — Pommade nasale.

Composition. — Adrénaline, S. G. Bismuth, Stovaïne, Résorcine, Essences antiseptiques.

Indications. — *Affections aiguës* : Sinusites, Coryza, Obstructions nasales, etc...

Affections chroniques : Rhume des foins, Ozène, Asthme, etc...

Doses. — Gros comme un pois dans chaque narine plusieurs fois par jour.

Laboratoires J. BRESSIER

Docteur en Pharmacie

102, rue Vincent — MARSEILLE

Concessionnaires :

Les Laboratoires NOVALIS

OULLINS (Rhône).

RÉSYL CIBA

Antiseptique pulmonaire, anticatarrhal.

Ether glycéro-gaiacologique soluble. Non caustique, libère du gaiacol à l'état naissant. Modificateur des sécrétions bronchiques. Sous son influence la bronchorrhée diminue, les bacilles se raréfient, l'état général et les signes stéthoscopiques s'améliorent.

Indications. — Tuberculose pulmonaire avec ou sans température. Bronchites et toutes les affections de l'appareil respiratoire en général.

Sirop, Comprimés, Ampoules.

Doses. — *Sirop* : 2 à 6 cuillères à café par jour.

Comprimés : 2 à 6 par 24 heures.

Ampoules : Une tous les 2 jours.

Médecine Infantile. — Chez les nourrissons, XXV à CXX gouttes de sirop mélangées aux biberons.

Le petit flacon sirop 8 fr. 50

Le grand flacon sirop 15 fr. "

Le tube de 20 comprimés 7 fr. "

La boîte de 12 ampoules 15 fr. "

Laboratoires CIBA-O. ROLLAND

109-113, boulevard de la Part-Dieu — LYON.

RÉTHRAGINE

(Bougies antiblennorragiques radifères).

Médication bactéricide et radio-active des affections urétrales aiguës et chroniques chez l'homme et chez la femme.

Nature du produit :

La *Réthragine* est une composition médicamenteuse présentée sous forme de bougies renfermant, en milieu indolore, de l'argent, de l'acide urique et du bromure de radium à l'équilibre radio-actif et répondant à des constantes physiques nettement déterminées.

Présentation :

Les bougies *Réthragine* sont vendues sous le nom de « Bougies *Réthragine* H » pour les hommes et de « Bougies *Réthragine* F » pour les femmes.

Il existe deux concentrations radifères : 1 et 2 micros (2 micros pour les hommes seulement).

Prescrire : *hommes* : Bougies *Réthragine* H. à 1 ou 2 micros ; *femmes* : Bougies *Réthragine* F.

Mode d'emploi :

En présence, chez l'homme, d'une urétrite confirmée par l'examen microscopique, commencer les grands lavages uréthro-vésicaux au permanganate de potasse, solution à 0,25 p. 1000. Introduire ensuite une bougie et la maintenir en place en recouvrant le méat urinaire d'un tampon de coton stérile et par-dessus, d'un préservatif. Il est indispensable que la bougie reste en contact le plus longtemps possible ; aussi faut-il recommander aux malades de n'uriner que cinq heures environ après l'application. Continuer les grands lavages qui seront faits tous les jours, ainsi que les applications des bougies.

Durée du traitement :

L'application de 8 à 10 bougies est généralement suffisante, même dans les cas d'urétrites les plus rebelles.

Prix :

| | | |
|---|----|---|
| La bougie <i>Réthragine</i> H. (1 micro)..... | 12 | » |
| La boîte de 5 bougies <i>Réthragine</i> H. (1 micro) .. | 55 | » |
| La bougie <i>Réthragine</i> H. (2 micros)..... | 15 | » |
| La boîte de 5 bougies <i>Réthragine</i> H. (2 micros). | 70 | » |
| La bougie <i>Réthragine</i> F. (1 micro)..... | 12 | » |
| La boîte de 5 bougies <i>Réthragine</i> F. (1 micro) .. | 55 | » |

Laboratoires pharmaceutiques :

L. G. TORAUDE O. * O. I. ☉

Docteur en pharmacie de l'Université de Paris.
Lauréat de l'Institut et de l'Académie de médecine.
Membre de la Société de pharmacie de Paris.

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V°).

RÉVULSIF LIQUIDE BOUDIN

Propriétés thérapeutiques :

- 1° Il produit en une minute une révulsion intensive ;
2° Etant liquide, il peut être appliqué très rapidement sur une très large surface ; 3° Après le badigeonnage, le malade ne pouvant l'arracher, est forcé d'en subir les effets ; 4° Il ne colore pas et n'abîme pas la peau, peut être renouvelé et appliqué plusieurs fois par jour ; 5° absorbé par la peau, il agit efficacement sur les régions profondes qu'il décongestionne très vite ; 6° il ne contient aucun produit nuisible pour les reins et se conserve indéfiniment ; 7° il n'entre dans sa composition, ni cantharide, ni produit caustique ou acide.

Indications thérapeuthiques :

- 1° Maladies aiguës des voies respiratoires : Rhume, Laryngite, Bronchite, Congestion pulmonaire, Fluxion de poitrine, Pleurésie, Pneumonie, Broncho-Pneumonie ; — 2° Maladies chroniques des voies respiratoires : Asthme, Emphysème, Catharrhe, Bronchite chronique, Tuberculose pulmonaire ; — 3° Douleurs, Rhumatismes, Névralgies, Torticolis, Lumbago, Points de côté, Rhumatismes aigu et chronique, Arthrites, Névralgies de toutes sortes.

Mode d'emploi :

- 1° Dans les maladies aiguës ou chroniques des voies respiratoires, badigeonner deux fois par jour avec le pinceau imbibé du Révulsif le dos et la poitrine du malade. Laisser sécher et appliquer flanelle ou ouate ; 2° Dans les douleurs, rhumatismes, névralgies, badigeonner deux fois par jour avec le pinceau imbibé du Révulsif toute la région douloureuse ou malade et la recouvrir ensuite de flanelle ou d'ouate. Pour les enfants dont l'épiderme est plus sensible que chez les grandes personnes, on peut additionner le Révulsif d'eau de Cologne ou d'alcool par partie égale.

Laboratoire BOUDIN

9, avenue Jean-Jaurès

JOINVILLE-LE-PONT (Seine).

RÉVULSIF MILKO

Innovation thérapeutique.

Composition. — Essences naturelles. Terpènes. Alcool.
(Ne renferme pas de produits phénoliques, d'essences de moutarde ou de capsicum, prurigineux.)

Présentation. — 3 concentrations différentes :

N° 1. *Pour bébés* (nourrissons et jeunes enfants) : 5 fr. 50.

N° 2. *Pour enfants* (de 5 à 13 ans environ) : 6 fr. 50.

N° 3. *Pour adultes* : 8 francs.

Le **Révulsif Milko** détermine une vaso-dilatation intense sans provoquer de phlyctènes. Ne tache ni n'altère les *téguments*, d'où répétition à volonté des badigeonnages. Pas d'action lacrymogène, ni sternutatoire. Odeur agréable.

Action secondaire : Antisepsie pulmonaire par absorption cutanée des essences et élimination bronchique.

Indications. — Rhume, Bronchite, Broncho-pneumonie, Coqueluche, Pleurite, Pleurésie.

Laboratoire H. CLUZEL

60, cours Emile-Zola — LYON-VILLEURBANNE

Médaille d'Or : Strasbourg 1927.

RÉVULSIF PROCIPHA

Forme. — Liquide, incolore, aromatique.

Composition. — Mélange d'essences : Terpène, Pinène, Carvacrol, irrite légèrement l'épiderme ; odeur très agréable.

Indications. — Rhume, Laryngite, Bronchite, Maladies des voies respiratoires aiguës et chroniques ; Affections rhumatismales et névralgiques.

Mode d'emploi. — Badigeonner avec un pinceau la surface à révulser.

Pour bains de pieds, 1 à 3 cuillerées à café.

Enfants : diluer à 50 p. 100 avec alcool ou eau de Cologne.

Prix : 7 francs,

Laboratoires FISCHE et Cie

4, rue d'Illzach — MULHOUSE

Agence à PARIS :

104, faubourg Poissonnière (X^e).

Tél. : Lamartine 92-52.

RHAGADINE BRACQUEMOND

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments.

Forme et composition. — Pommade en tubes, Composé organique à base de kératine, Excipient gras.

Propriétés thérapeutiques. — Régénérateur de l'épiderme. Cicatrisant. Calmant aseptique et non toxique.

Indications thérapeutiques. — Crevasses des seins, érythèmes des nouveau-nés, fissures anales, écorchures, brûlures, ulcères variqueux, plaies atones, toutes irritations et érosions cutanées.

Prix. — Le tube : 7 fr. 75.

Echantillons sur demande :

Pharmacie ROUSSEAU

71, avenue de Villiers — PARIS (XVII^e).

RHÉANTINE LUMIÈRE

Vaccinothérapie polyvalente Antigonococcique.

Constitution. — Stock vaccin polyvalent, forme de 24 souches différentes de gonocoques, rigoureusement stérilisées et desséchées à froid par des procédés spéciaux, divisées ensuite en sphérules kératinisées.

Propriétés. — La RHÉANTINE LUMIÈRE est un vaccin antigonococcique dont l'absorption, par voie buccale, constitue l'originalité propre. Elle est toujours parfaitement tolérée, même par les malades les plus délicats et n'entraîne aucune réaction générale.

Indications. — Affections gonococciques locales et métastatiques chez l'homme et chez la femme. Rhumatisme et arthrite blennorragiques, orchites, cystites, pyélites, épидидymites, ophtalmies, d'origine gonococcique, etc.

Traitement le plus simple, le plus anodin et le plus efficace.

Dose courante. — 4 sphérules par jour, 2 le matin et 2 le soir, une heure avant les repas, dans une gorgée d'eau.

Formuler. — Boîte de RHÉANTINE LUMIÈRE. Prix : 18 francs.

AUTO-VACCINS. — Pour provoquer chez les malades atteints de lésions complexes ou spéciales un processus humoral curatif, il faut se rapprocher des groupes infectants et le moyen de beaucoup le plus sûr réside dans l'emploi de vaccins autogènes auto-vaccins, préparés à partir du pus recueilli sur le sujet lui-même.

Les LABORATOIRES LUMIÈRE préparent des vaccins autogènes sur demande spéciale du médecin auquel ils fournissent gratuitement, le cas échéant, le matériel nécessaire pour le prélèvement et l'expédition du pus.

LABORATOIRES LUMIÈRE.

45, rue Villon — LYON.

RHÉSAL VICARIO

Succédané inodore du salicylate de méthyle.

Liquide rapidement absorbable par la peau, sans provoquer la moindre irritation cutanée.

Action prompte et durable.

Mode d'emploi. — En onctions, deux à trois fois par jour, en recouvrant de flanelle ou même de taffetas gommé.

Indications. — Rhumatismes. Goutte. Névralgies.

Le flacon : 8 francs.

Laboratoires VICARIO

17, boulevard Haussmann — PARIS (IX^e)

RHINACRIDYL « LERSAM »

Désinfectant des cavités rhino-pharyngées.

Composition. — Soluté isotonique de chlorure de 3-6 diamino, 10 méthyl-acridinium à 1 p. 200.

Indications thérapeutiques. — Puissant bactéricide indiqué comme préventif des maladies infectieuses en périodes d'épidémies et dans le traitement des affections du rhinopharynx : coryzas, stomatites, angines, pharyngites : grippe, rougeole, scarlatine, coqueluche, infections saisonnières. Stérilisation des porteurs de germes diphtériques et méningococciques.

Mode d'emploi. — Instillations, pulvérisations nasales, gargarismes. Peut être associé au traitement par l'ACRIDIA (voyez ce mot).

Le soluté Rhinacridyl ne provoque *aucune irritation* et est accepté très facilement par les enfants.

Prix. Le flacon compte-gouttes : 14 francs.

Admis aux Assurances Sociales.

Echantillons, Littérature :

Laboratoires LERSAM

92, Bd. Murat PARIS (XVI^e)

RHINADRARGOL

Baume nasal semi-fluide à base de sels d'argent, adrénaline, essences végétales antiseptiques en milieu paraffinique absolument neutre.

Curatif, Préventif, Désinfection sérieuse du Cavum.

Sinusites, Coryzas, Fièvre scarlatine, Rougeole, Diphtérie et toutes les maladies infectieuses.

Chaque boîte contient deux tubes, l'un réservé pour le malade, l'autre pour les autres membres de la famille, à titre préventif.

Prix : 7 fr. 50.

Laboratoires P. DORDIN

56-58, Grande-Rue — HARNES (P.-de-C.).

RHINAQUINTINE LESCENE

Anaquinine gouttes nasales.

Composition. — Aldéhydes, Thymoforme, Eucalyptol, Thymol, Ephédrine (à faible concentration). Huile neutralisée.

Forme. — *Flacon avec stilli-compte-gouttes nickelé stérilisable*, breveté, sans caoutchouc, permettant aux gouttes de pénétrer sans pression dans le nez et le cavum.

Indications. — Rhumes. Rhume des foins, coryza des nouveau-nés (facilite les tétées). Rhinites, Sinusites, Ozène, adénoïdites, Toux, Grippe, Coqueluche, Laryngites, Croup, Faux-croup.

Désinfection du Rhino-pharynx dans les maladies contagieuses. Prophylaxie des contagions. Désinfection du cavum avant et après ablation des végétations. Eclaircit la voix des chanteurs ou des orateurs.

Mode d'action. — Sédatif puissant. Décongestionnant doux. Détersif non irritant. Nettoie les muqueuses, draine les sinus et le cavum. Empêche la stagnation du pus. Débouche le nez d'une façon douce et prolongée et facilite l'action des inhalations.

Evite la sécheresse des muqueuses (climats secs, chauffage central).

Indiquée en injections intra-trachéales dans toux laryngées, asthme, croup, laryngites striduleuses.

Mode d'emploi. — 2 à 8 gouttes dans chaque narine 2 à 8 fois par jour. Injections intra-trachéales 2 à 4 cc. en une fois.

Laboratoire. LESCENE

PARIS, 58, rue de Vouillé. — LIVAROT (Calvados)

Tél. : Vaugirard 08-19.

RHINASPIR

Poudre soluble et non caustique en étui saupoudreur pour aspirations et pulvérisations nasales.

Composition. — Adrénaline au 1/100, Scuro-forme, Aristol, Benzonaphtol, Salicylate de soude, Lactose, Acide borique, Terpinéol, Essence de pin.

Propriétés. — Décongestionne et antiseptise la pituitaire, fluidifie, puis tarit les sécrétions.

Indications. — Coryza aigu et chronique, obstruction nasale par hypertrophie des cornets, ozène, sinusites.

Mode d'emploi. — 5 à 6 fois par jour, priser une pincée ou mieux la projeter dans chaque fosse nasale avec le lance-poudre Rhinaspir.

Prix de l'étui : 10 francs.

Dépôt général pour la France :

Laboratoire ASEPTOR

21, rue Feydeau — PARIS (II^e).

Téléph. : Central 83-15.

RHINODROPS BÉRAL

Capsules nasales à l'Huile d'Ephédra chlorétonée.

Propriétés. — *Balsamiques, Antiseptiques, Décongestifs.* Assurent la perméabilité des fosses nasales. Préservent des complications naso-pharyngées.

Indications. — *Toutes inflammations, congestions et obstructions nasales. Insuffisances respiratoires des Adénoïdiens et des Déformés du naso-pharynx. Toutes affections aiguës susceptibles de se compliquer d'infection naso-pharyngée.*

Mode d'emploi. — Couper l'extrémité du Rhinodrops et en vider la moitié dans chaque narine. (Faire incliner la tête du côté injecté.)

Formuler : Rhinodrops Béral, une boîte.

Prix : 10 francs.

Laboratoire BÉRAL

194, rue de Rivoli — PARIS

RHINOFLUINE

Solution isotonique et stérilisée d'extrait de Jaborandi.

Forme. — Ampoules (instillateur spécial dans les boîtes).

Indications thérapeutiques. — Action élective sur les terminaisons sensitives des nerfs trijumeau et pneumogastrique, au niveau des muqueuses oculaire, nasale et laryngo-trachéale.

Rôle essentiel : Régulation de la sensibilité des troubles congestifs et sécrétoires.

1° En Rhinologie. — La Rhinofluine doit être utilisée en instillations dans les cas suivants :

Congestions et Obstructions Nasales

(Vaso-motrices)

Rhino-Pharyngites

Rhinites Atrophiques — Ozène

Rhume des foins

et Rhino-Bronchites Asthmatiques

Céphalées Rhinogènes

Il est nécessaire dans l'Ozène et dans les Coryzas spasmodiques (rhume des foins en particulier) de combiner ce traitement local avec le traitement général par les produits de jaborandi (Néopancarpine ou Vaso-Neurine) qui constituent le traitement de fond.

2° En Ophtalmologie. — La Rhinofluine est employée en instillations. Elle réalise une décongestion rapide de la muqueuse conjonctivale (disparition de la rougeur et de la tuméfaction) et atténue l'hypersécrétion lacrymale (larmolement). Par son action sur les terminaisons sensitives et la décongestion ainsi réalisée, les phénomènes douloureux orbitaires et périorbitaires sont rapidement atténués (picotements, cuisson, tension douloureuse, névralgies, migraine ophtalmique, céphalalgies).

Mode d'emploi :

Les instillations de Rhinofluine peuvent être pratiquées 2 ou 3 fois par jour si nécessaire.

Pour les yeux, il sera toujours préférable de faire l'instillation de I à II gouttes dans le coin de l'œil, le soir, avant de s'endormir, si l'on ne fait l'instillation qu'une fois par jour. L'action de la Rhinofluine provoque en effet une contraction de la pupille qui peut gêner momentanément l'accommodation. La solution est parfaitement tolérée par la muqueuse oculaire et n'a aucun effet toxique.

Pour le nez et la gorge, les instillations peuvent être renouvelées 2 à 3 fois par jour (III à IV gouttes chaque fois dans chaque narine).

Les gouttes instillées tombant dans la gorge peuvent être avalées.

Prix : 15 francs.

Laboratoire de Pathologie générale de Paris

5, rue François-Ponsard — PARIS (XVI^e).

Tél. : Auteuil 35-25.

RHINOGENOL

Antiseptique nasal à excipient gélosé.

Composition. — Menthol 0 gr. 02, Camphre 0 gr. 02, Essence de Géranium 0 gr. 15, Teinture de Benjoin 0 gr. 60, Goménol 0 gr. 75, Excipient Gélose, 30 gr.

Indications. — Coryza, Rhinites, Sinusites et toutes affections des voies respiratoires supérieures.

Présentation. — Tube-canule sous étui cellophané.

Posologie et mode d'emploi. — Introduire dans une narine, à l'aide du tube-canule, gros comme un pois de RHINOGENOL ; obturer l'autre narine par pression avec le doigt : aspirer d'abord légèrement, puis fortement, pour tapisser de RHINOGENOL toute la muqueuse nasale.

Procéder de même pour les deux narines et plusieurs fois par jour.

Remarque importante. — L'efficacité de cette préparation réside dans l'emploi, comme véhicule, de la GELOSE qui constitue actuellement le plus parfait excipient connu permettant le contact direct des principes actifs avec la cellule et une absorption complète.

Les Laboratoires LUTSIA

4 villa Ornano. — PARIS (XVIII^e).

Tél. : Marcadet 23-31.

RHINO-GLOTTYL

Composition. — Erysimum, Belladone, Euphorbia pilulifera, Ephedra, Essence de Niaouli, Amyléine.

Propriétés thérapeutiques. — Désinfectant. Puissant décongestif. Antispasmodique.

Indications. — Coryzas, Rhinites, Laryngites, Trachéites, Sinusites, Asthmes, Rhumes des foin, Insuffisances respiratoires. Toutes manifestations congestives des voies respiratoires supérieures.

Formes :

- 1^o *Solution huileuse* (Instillations nasales ou pulvérisations dans le nez ou le pharynx).
- 2^o *Capsules nasales* (Couper l'extrémité effilée de la capsule et en vider le contenu dans chaque narine).

Prix : 15 francs.

Laboratoires R. DENIS

85 bis, rue du Ranelagh — PARIS
(XVI^e).

Tél. : Auteuil 13-89.

RHINOL

A base de Menthoforme, éther, non Irritant, dérivé du menthol et du formol.

1° **OUATE RHINOL.** — Véritable filtre nasal, spécifique du coryza, Céphalée, Rhume des foins. Indispensable en temps d'épidémie, et dans tous les cas de grippe, influenza, bronchite, enrouement.

La boîte : 3 fr. 50.

2° **POMMADE RHINOL.** — Vaseline au menthoforme, eucalyptol, essences volatiles. Mêmes indications.

Le tube avec canule : 6 francs.

3° **COMPRIMÉS RHINOL.** — A base de menthoforme, borate de soude, baume du Pérou, essences de pin et d'eucalyptus.

Inhalations : gargarismes, pulvérisations, dans tous les cas de rhinites, rhino-pharyngites, sinusites, maux de gorge, amygdalites, laryngites, trachéites, trachéo-bronchites.

La boîte : 13 francs.

Laboratoire du Docteur DUBAT

80, rue du Faubourg-Saint-Denis — PARIS.

RHINO-LIPOSEPTINE

Solution concentrée de l'antitoxine du Professeur Lemoine pour pulvérisation dans le nez et la gorge.

Composition. — Extrait éthéré de levures de saccharomycès. — Possède toutes les propriétés curatives des vaccins les plus actifs.

Indications. — En pulvérisations ou instillations dans le nez et la gorge dans tous les cas de maladies infectieuses où ces cavités sont atteintes : Angines, Coryza, Rhinopharyngites, Ozène, Sinusites, Grippe, Bronchites, Diphtérie, Rougeole, Scarlatine.

Mais ne présente aucun des inconvénients du menthol, pas d'irritation des muqueuses.

Mode d'emploi. — La Rhino-Liposeptine se présente en solution huileuse et en Capsulines auto-rhino-injectables. Pulvériser ou instiller plusieurs fois par jour.

Prix : 13 francs.

Laboratoires de la LIPOSEPTINE

2, place des Vosges — PARIS.

RHINOPHARYNXOIL

Capsules nasales d'huile balsamique

Composition. — Huile végétale diffusible, neutralisée, d'arôme agréable, à base de santalol et de camphre.

Tolérance absolue : aucun élément caustique, irritant ou toxique.

Action. — Lubrifie, décongestionne et déterge, sans les irriter, les muqueuses du nez et de la gorge : grâce à son pouvoir de diffusion, cette huile se répand dans toutes les voies aériennes supérieures ; elle exerce une action particulièrement élective sur les cordes vocales.

Indications. — Coryza, aigu ou chronique. — Maladies du nez, de la gorge, du larynx, de la trachée. — Affections grippales des voies respiratoires supérieures. Protection contre les multiples maladies infectieuses à début rhino-pharyngé et en particulier contre celles du premier âge (Rougeole, scarlatine, etc...). Spécifique rationnel contre l'enrouement.

Mode d'emploi. — Couper préalablement le col de la capsule à sa partie supérieure ; par une légère pression, en verser le contenu dans chaque narine, en prenant soin de renverser la tête en arrière.

Prix : 9 fr. 60

Formule. — Chaque capsule d'environ 0 gr. 50 contient :

| | |
|---------------------------------|------------|
| Santalol | 0 gr. 0036 |
| Camphre | 0 gr. 0030 |
| Huile végétale aromatisée | 0 gr. 4934 |

Laboratoire de pharmacologie générale (Dr Ph. CHAPELLE)

8, rue Vivienne. — PARIS

RHINO-SALVA

Pommade

Composition. — Association Adrénaline-éphédrine, Résorcine, Dermatol, Stovaine, Essences et balsamiques.

Propriétés thérapeutiques. — Excellent remède contre toutes les affections des voies respiratoires qui, presque toutes, débutent par une infection des fosses nasales. C'est le remède spécifique du Coryza spasmodique et du Rhume des foins.

Recommandé aux chanteurs et aux orateurs pour maintenir en parfait état leurs résonateurs supérieurs et conserver la souplesse de leur timbre.

Mode d'emploi. — Gros comme un grain de blé dans chaque narine, matin et soir.

Prix : 7 francs.

Le RHINO-SALVA existe aussi en solution huileuse, pour pulvérisations nasales.

Dépôt : O. C. P.

71, rue du Temple — PARIS.

Littérature et échantillons.

10, rue de Belfort — RENNES (Ille-et-Vilaine).

RHINO-VACLYDUN

Lysats vaccins du Docteur Duchon.

Vaccination locale.

Composition. — Lysat des germes pathogènes du rhino-pharynx.

En application sur la muqueuse nasale et pharyngée détermine une immunité cellulaire locale.

Indications. — Coryza, rhino-pharyngites, adénoïdites, Angines, Prophylaxie des complications des maladies contagieuses (Grippe, Rougeole, Coqueluche, Diphtérie, etc.).

Posologie. — En instillations ou mieux en pulvérisations locales, 3 à 4 fois par jour. (Le Rhino-Vaclydun n'est pas injectable.)

Présentation. — Boîte de 4 ampoules de 2 cc.

Prix : 18 francs.

Nécessaire Rhino-Vaclydun contient 2 ampoules de lysat vaccin et un petit pulvérisateur spécial.

Prix : 18 francs.

Laboratoires Pharmaceutiques CORBIERE

27, rue Desrenaudes — PARIS (XVII^e).

Téléphone : Carnot 78-11.

RHIZOTANIN CHAPOTOT

Composition. — Tanin de rhizome de fraisier extrait à l'eau, évaporé dans le vide à 0°. Phosphates et glycérophosphates de chaux et de magnésie. Cardamome.

Formes. — Cachets pour *adultes*. Poudre pour *enfants*. Granulé pour *adultes et enfants*.

Indications. — Tuberculose pulmonaire. Etats tuberculeux et pré-tuberculeux. Anémies. Bronchites chroniques (diminution des sécrétions et de l'expectoration). Amélioration rapide des accidents diarrhéiques quelle qu'en soit l'origine. Néphrites albuminuriques.

Posologie. — *Adultes* : 4 à 6 cachets ou 2 à 4 cuillerées à café de granulé par jour.

Enfants : 2 à 4 cuillerées mesure de poudre ou 2 à 4 1/2 cuillerées à café de granulé par jour.

Laboratoire CHAPOTOT

56, boulevard Ornano — PARIS (XVIII^e).

Tél. : Nord 28-90. — R. C. 231 917 B.

RHOCYA DYN

Rhodanate de potassium pur.

(Solution titrée : 1 goutte = 1 centigramme).

Le rhodanate de potassium possède toutes les propriétés biologiques des iodures et des préparations iodées, *sans contenir d'iode dans sa molécule* et sans en présenter les inconvénients (iodisme, réactions congestives ou thyroïdiennes).

Indications. — *Rhumatismes chroniques.* — Puissant effet analgésique, décongestif et trophique dans :

- 1° Les polyarthrites déformantes chroniques ;
- 2° Les séquelles des pseudo-rhumatismes infectieux, en particulier gonococciques ;
- 3° Les rhumatismes diathésiques.

Hypertension artérielle. — Abaissement évident des chiffres manométriques (Mx et Mn) dans les deux tiers des cas. Action directe sur l'athérôme artériel.

Emphysème. — Asthme vieilli, séquelles respiratoires des gazés.

Scléroses viscérales. — Sénescence précoce, polyscléroses, scléroses par intoxications chroniques endogènes (goutte, oxalémie) ou exogènes (saturnisme, hydrargyrisme, bismuthisme, éthylisme). Lésions scléro-gommeuses de la syphilis tertiaire.

Avantages. — Aucune toxicité. Ni intolérance, ni accoutumance. Action thérapeutique supérieure à celle de l'iode.

Pas d'iode, donc pas d'iodisme.

Posologie. — X à XX gouttes avant les 3 repas, 3 semaines par mois.

Le flacon compte-gouttes : 18 fr.

Remboursable par les Caisses d'Assurances Sociales (n° 734-3).

Société d'Applications Pharmacodynamiques

5 et 7, rue Claude-Decaen — PARIS (XII^e).

Tél. : Diderot 37-93.

RHODARSAN

Dioxy-diamino-arsénobenzène méthylène-sulfoxy-
late de sodium.

Teneur en arsenic : 20 p. 100. Donne, avec l'eau distillée, des solutions neutres, injectables par voie veineuse exclusivement.

Présentations :

Doses unitaires de : 0 gr. 15 — 0 gr. 30 — 0 gr. 45 —
0 gr. 60 — 0 gr. 75 — 0 gr. 90.

Indications

Syphilis, Symbioses fuso-spirillaires, Plan, Protozooses, Charbon, Sodoku.

Posologie et mode d'emploi. — Séries d'injections graduées de 0 gr. 15 à 0 gr. 90.

Applications en poudre ou collutoires comme topique local.

Le Rhodarsan est contrôlé biologiquement par rapport au Standard de la Société des Nations.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône
21, rue Jean-Goujon — Paris (VIII^e).

RHODAZIL

Benzoate de Benzyle.

Antispasmodique, non toxique.

Indications :

Asthme vrai, Hypertension, Dysménorrhée.

Hoquet persistant, Spasmes divers, Mal de mer.

Posologie :

Adultes : Une demi-cuillerée à café de solution ou 2 capsules, à renouveler plusieurs fois par jour.

Enfants : IV gouttes de solution, par année d'âge.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

RHOFÉINE

Association d'acide acétylsalicylique (50 centigr.) et de caféine (5 centigr.) pour un comprimé, (tubes de 20), ou un cachet (étuis de 10 c.).

La caféine dote la Rhoféine de ses propriétés toni-cardiaques.

Indications. — **Grippe, États fébriles, Migraines, Névralgies.**

Posologie. — 1 à 6 comprimés ou cachets par 24 heures.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

RHOMNOL

A base d'acide nucléinique pur et de nucléophosphates naturels.

Indications thérapeutiques. — Puissant reconstituant du noyau cellulaire, anti-neurasthénique de choix, indiqué dans toutes les affections dyscrasiques consomptives.

Doses et mode d'emploi. — *Pilules* à 0,05 : 4 à 6 par jour aux repas. — *Saccharure* (granulé) 0,10 par cuill. à dessert ; une cuill. à dessert aux repas, pour adultes ; moitié ou quart pour les enfants, suivant l'âge. — *Ampoules* 1 cc. (0,05 de nucléinate de soude par cc.) pour injections intramusculaires de préférence (spécialement indiquées dans les maladies infectieuses aiguës).

Prix de vente au public : 18 fr.

Laboratoires du D^r M. LEPRINCE
62, rue de la Tour — PARIS (XVI^e).

RICILAX

Formule : Ricinoléate de magnésie.... 30
Dihydroxyphtalophénone... 1
*Combinaison nouvelle d'huile de ricin et
d'oxyde de magnésie*

LAXATIF - PURGATIF

Avantages. — Contient uniquement l'acide ricinoléique ; dépourvu de ricinine et de ricine qui sont toxiques.

Chaque composant renforce l'action du produit auquel il est associé, l'acide ricinoléique agissant immédiatement et l'oxyde de magnésie prolongeant l'effet purgatif. Aucune action congestive sur le tractus et les glandes digestives, ni sur les organes du petit bassin. Peut être administré à tous les malades, en particulier : enfants, femmes enceintes, nourrices.

Indications. — Constipation sous toutes ses formes, banales ou spasmodiques, et toutes leurs conséquences. Entérocolite muco-membraneuse. Colites. Appendicite chronique.

Formes. — Adultes : Cachets ou granulé aromatisé. Enfants : Granulé spécial sans dihydroxyphtalophénone.

Mode d'emploi et doses :

Laxatif : Adultes : le soir au coucher un cachet ou une cuillerée à café de granulé. Enfants : granulé spécial, 1/2 cuillerée à café par 3 années d'âge.

Purgatif : Adultes : le matin au réveil 4 cachets ou une cuillerée à soupe de granulé. Enfants : granulé spécial, 1 cuillerée à café par 3 années d'âge.

Remarques. — Les granulés, de goût agréable, doivent être croqués tels que.
Posologie pouvant être modifiée suivant les tempéraments.

Laboratoire ROUX

60, route de Châtillon. — MALAKOFF

RIODINE



Composition. — Éther glycérique iodé de l'acide ricinoléique contenant environ 20 % d'iode.

Forme. — Flacon de 50 perles. Chacune représentant l'action de 0,20 cgr environ d'iodure alcalin.

Propriétés thérapeutiques. — Médicament iodo-organique type, directement et totalement assimilable. *Action prolongée et durable* sans iodisme.

Pour obtenir une *action rapide et intensive* prescrire la **Néo-Riodine** : mêmes applications.

Indications. — Artériosclérose, myocardites chroniques, hypertension, etc. Emphysème pulmonaire, bronchites chroniques, asthme, etc... Obésité, rhumatisme chronique, scrofule, syphilis, et dans toute affection où la médication iodée ou iodurée est indiquée.

Doses. — 2 à 6 perles par jour avant les repas.

Prix : 12 francs.

LABORATOIRES du D^r P. ASTIER

41, 42, 43 à 47, rue du Docteur-Blanche — PARIS (XVI^e)

ROB OBERLIN

| Contenance pour | Une cuillerée à café | Une cuillerée à entremets | Une cuillerée à soupe. |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Bi-iodure de mer- cure | 3 mgr. | 6 mgr. | 1 egr. |
| Iodure de sodium. | 0 gr. 02 | 0 gr. 04 | 0 gr. 06 |
| Arséniate de soude | 1/2 mgr. | 1 mgr. | 1mgr. 1/2 |

Adultes : 1 à 6 cuillerées à soupe par jour.

Adolescents : 2 à 4 cuillerées à entremets par jour.

Enfants de 5 à 10 ans : 2, 3 et jusqu'à 4 cuillerées à café par jour.

Le **Rob Oberlin** se vend en flacons d'environ 420 cc.

Prix : 16 fr. 50.

ROB CABANÈS

| Contenance pour | Une cuillerée à café. | Une cuillerée à entremets. | Une cuillerée à soupe. |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Bi-iodure de mer- cure | 3 mgr. | 2 mgr. | 3 mgr. |
| Iodure de sodium. | 0 gr. 006 | 0 gr. 012 | 0 gr. 018 |

En moyenne, 1 cuillerée à café par jour et par année d'âge, soit :

Un an : demi-cuillerée à café 2 fois par jour.

Deux ans : 1 cuillerée à café 2 fois par jour.

Trois ans : 1 cuillerée à café 3 fois par jour.

Quatre et cinq ans : 1 cuillerée à entremets 2 fois par jour.

Six à sept ans : 1 cuillerée à soupe 2 fois par jour.

Le **Rob Cabanès** se vend en flacons d'environ 280 cc.

Prix : 14 fr. 50.

Leur présentation est discrète.

Laboratoire OBERLIN

J. TINARDON, Pharmacien de 1^{re} classe
de la Faculté de Pharmacie de Paris.

17, rue Cadet — PARIS.

ROGERMA

Traitement cytophylactique des affections de la peau et des muqueuses. Stimulant de la phagocytose.

Puissant régénérateur cellulaire.

Indications. — Anthrax, brûlures, plaies atones, suppurations, ulcères variqueux, pansements post-opératoires.

Mode d'emploi. — Pur et tiède en pansements très humides.

Présentation. — Litres, demi-litres, flacons de spéciaux oto-rhinos.

Echantillons médicaux :

Laboratoire MAHIEU

LENS (Pas-de-Calais).

ROMARANTYL TROUETTE-PERRET

est le spécifique des Affections du Foie.

Elixir ou granulé aromatiques à base de :

Romarin-Piscidia-Aphloïa-Ononis-Menthe.

L'Efficacité du *Romarantyl T. P.* est due à son action cholagogue, stimulante, diurétique, antispasmodique.

Mode d'emploi :

1 à 2 cuillerées à café avant chaque repas.

Prix : 16 francs.

Echantillons et littérature sur demande aux

Laboratoires TROUETTE-PERRET

61, avenue Philippe-Auguste

PARIS (XI^e).

ROMARENE

Présentation. — **Granulé** aromatique fondant de saveur agréable.

Composition. — Association de végétaux cholérétiques (*romarin, pissenlit, combretum*) et de sels alcalins (*citrate de soude*).

Action thérapeutique :

Cholérétique : augmente passagèrement la sécrétion hépatique et fluidifie la bile. Evite les réactions vésiculaires.

Stomachique : résout les syndromes gastro-hépatiques et facilite l'évacuation gastrique.

Favorise la *diurèse* et la *régularisation* intestinale.

Indications :

Hépatisme, insuffisance hépatique et ses conséquences, congestion du foie, cholémie familiale, ictères bénins, cures d'entretien des hépatiques légers, etc...

Syndromes gastro-hépatiques, troubles digestifs, dyspepsies, gastralgies, flatulences, état saburral, etc...

Mode d'emploi. — 1 à 3 cuillerées à café par jour dans 1/2 verre d'eau chaude (ou de tisane aromatique, menthe, boldo, etc.).

Action cholérétique : à jeun ou entre les repas.

Action stomachique : après les repas.

Action laxative : augmenter la dose.

Prix : 14 fr. 50.

Laboratoire BEAUFOUR

Docteur en Pharmacie,

Licencié ès Sciences,

Ancien Interne des Hôpitaux de Paris

DREUX (Eure-et-Loir).

ROSALYL

Composition :

| | |
|--|----------|
| Ail..... | 0 gr. 80 |
| Thym | 2 gr. 00 |
| Marrube..... | 1 gr. 00 |
| Drosera | 0 gr. 40 |
| Grindelia..... | 0 gr. 20 |
| Bromure de sodium..... | 0 gr. 60 |
| Excipient liquide sucré et glyciné Q. S. p. | 100 gr. |

Propriétés thérapeutiques. — Calmant, sans toxiques, des grandes toux quinteuses et spasmodiques. Puissant désinfectant des bronches. Vermifuge par l'ail et le thym.

Forme. — Liquide sucré et glyciné. Une seule forme maintenant.

Indications. — *Coqueluche*. Toux nerveuses. Bronchites.

Posologie. — 1 an et 2 ans : 4 et 6 cuillerées à café par 24 heures.

3 ans et 4 ans : 4 et 5 cuillerées à café par 24 heures.

5 ans et au-dessus : 6, 7, 8 cuillerées à dessert par 24 heures.

Prix au public : 15 francs le flacon de 200 cc.

Préparé par : **Laboratoire MALMANCHE**

Pharmacien, Docteur ès sciences.

Vente et échantillons :

Laboratoires Drouet et Plet — RUEIL-MALMAISON (Seine-et-Oise).

ROSASEPTOR

Poudre émolliente, tonique, décongestionnante et antiseptique. Spécifique de l'inflammation oculaire ainsi que de la bouche, des amygdales et du pharynx.

Indications. — Conjonctivites, Blépharites, Iritis, Chalazions, Orgelets, Ophtalmies, etc...

Mode d'emploi. — Le contenu d'un sachet ROSASEPTOR dans la valeur d'un verre d'eau bouillie chaude donne environ 150 gr. d'une solution stérilisée, antiseptique, **tonique** et émolliente pour lavages, compresses et bains d'yeux et traitement des stomatites, abcès dentaires, angines, pharyngites etc.

La boîte de 10 sachets : 10 francs.

— 20 — 18 francs.

Dépôt général :

Laboratoire ASEPTOR

21, rue Feydeau — PARIS (II^e).

Tél. : Central 83-15.

ROZODERME

Le *Rozoderme* est une pommade rose à base d'essences végétales antiseptiques (type Lucas-Championnière) et de substances chimiques (boro-zinciques) inoffensives destinées à créer et entretenir un milieu favorable à la réfection des tissus. Présentation en tubes.

Propriétés. — Le *Rozoderme* calme la douleur et l'irritation, aseptise les plaies en détruisant les germes nocifs, stimule la vitalité des tissus et active la cicatrisation. Convient parfaitement pour la toilette journalière des jeunes enfants.

Indications. — Erythème fessier, feux de dents des nourrissons, gerçures du sein, brûlures et diverses formes d'eczémas : aigu, chronique ou variqueux, dermites toxiques, zona intercostal, etc.

Mode d'emploi. — Appliquer une couche légère sur la partie malade, préalablement lavée et séchée, recouvrir de gaze et renouveler le pansement toutes les vingt-quatre heures.

Prix : 7 fr. 50.

Laboratoire du ROZODERME

11, rue des Deux-Ponts — PARIS (IV^e).

RUBYL

Iodure double de quinine et de bismuth. Suspension huileuse, injectable par la voie intramusculaire, bien tolérée. Ampoules de 3 cc. dosées à 0 gr. 10 par cc. (Boîtes de 12 ampoules.)

Indications :

Bismuthothérapie de la Syphilis.

Posologie et mode d'emploi :

Injection du contenu d'une ampoule (3 cc.) tous les trois ou quatre jours ; série de 12 injections.

Chez les enfants : par année d'âge 1/20^e de la dose conseillée chez l'adulte.

Société Parisienne d'Expansion Chimique
« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

RUTONAL

Phényl-méthyl-malonylurée.

Propriétés hypnotiques et anti-épileptiques très voisines de celles du Gardénal, dont il est le succédané pour les malades intolérants ou résistants à ce médicament.

Présentations :

Comprimés à 0 gr. 20 (tubes de 20).

— 0 gr. 05 (tubes de 30).

Indications :

Épilepsie, Chorée, Convulsions, États anxieux, Constitution épileptoïde.

Posologie : Deux à quatre comprimés à 20 centigr. par 24 heures.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

RYTHMOS LEISYN

Formuler 2 à 6 cuill. à café par jour, à n'importe quel moment, dans un liquide quelconque. En cas d'urgence, absorber pur ; effets immédiats.

Présentation. — Liquide.

Indications. — Asystolie, même lorsque les succédanés de la Digitale se montrent inefficaces, Asthme, Angine de poitrine, Arythmies, Endocardites, Eréthisme, Insuffisance aiguë du cœur gauche, Insuffisance irréductible du cœur droit, même accompagnée d'une stase abdominale considérable. Insuffisance aortique ou mitrale, Myocardites, Névroses cardiaques, Sclérose artérielle, Sténose mitrale et coronaire, Tachycardies, tous les troubles cardiaques des maladies infectieuses.

Action. — Toni-cardiaque de grande puissance et d'extrême souplesse. Eupnéique et Hypotenseur énergique à action durable ramenant constamment la tension artérielle à sa valeur normale. Sans action sur l'Hypotension. Régénérateur et Régulateur parfait des fonctions cardiaques, Curatif réel des affections cardio-vasculaires par son action régénératrice sur le Myocarde. Aucun des inconvénients des médications digitales. Soulagement immédiat.

Composition. — Muguet, Aubépine, Maïs, Crataegus, Bornéine, Gui, Samarium, Yttrium, Caesium.

Médication préparée par procédé spécial électrique EVOO qui lui confère son efficacité. Aucune contre-indication. Innocuité absolue.

Les Laboratoires LEISYN — 1 bis, rue Molitor — PARIS (XVI^e).

Téléphone : Auteuil 14-73. — C. C. postaux PARIS 1075-98.

Adresse télégraphique : LABOLEISYN-PARIS.

RYTHMOSYSTOL

Marrube blanc, $\frac{3}{4}$; adonis vernalis, $\frac{1}{4}$.

Formes : Dragées, Gouttes.

Propriétés. — Régularisation du Rythme cardiaque (*extrasystoles*). Pas d'accumulation. Pas de contre-indications, aucune toxicité.

Posologie. — *Dragées* : 10 par jour.
Gouttes : LX par jour. — Enregistré au Laboratoire National de contrôle des Médicaments n^{os} 103-1 et 2.

Prix : 14 francs.

COMTE, Pharmacien
60, rue Saint-Guilhem
MONTPELLIER.

SAINT-ARÉ

(Même minéralisation que Carlsbad.)

Sulfatée sodique à 6 p. 1000.

Chlorurée, bicarbonatée, magnésienne, calcique, cholagogue, diurétique, hypotensive.

Indications thérapeutiques :

Syndromes vésiculaires et hépato-coliques.

Alcalose. Insuffisance hépatique. Dyspepsie biliaire. Stase du côlon droit.

Traitement à domicile.

**Société des Eaux Minérales de Decize
(Nièvre)**

Bureau à Paris, 49, boulevard de Port-Royal.

SALANTALE

**Vaccins Polyvalents Polymicrobiens antiseptiques,
Antivirus, Antigènes.**

Procédé breveté d'après la méthode du D^r MARXER

POMMADE

Traitement des affections purulentes.

Indications. — Furoncles, Anthrax, Panaris, Plaies infectées et toutes suppurations post-opératoires, abcès incisés, Ulcères variqueux purulents, blessures accidentelles, Acné pustuleuse, Eczéma suintant, Intertrigo, Erysipèle, Mastites.

Mode d'emploi. — Appliquer la pommade sur l'emplacement malade à l'aide d'un pansement de gaze enduit d'une couche abondante de Salantale. Renouveler le pansement jusqu'à guérison.

Dans certains cas, par exemple dans la furonculose, la vaccination cutanée est indiquée, en même temps que l'application locale.

Prix de vente : 9 fr. 75 le petit tube ; 15 francs le grand tube.

OVULES SALANTALE

Vaccination par pansements gynécologiques.

Indications. — Toutes Leucorrhées et affections purulentes, Vulvo-vaginites, Urétrites, Métrites, Périmétrites, Salpingites, Annexites, Bartholinites et toutes affections gonococciques.

Mode d'emploi. — Pansements gynécologiques. Ne tachant pas le linge, odeur agréable.

Prix de vente : 17 fr. 50 la boîte.

OPHTALMO SALANTALE

(Sous forme de pommade). Vaccination par application locale.

Indications. — Orgelets, Blépharites, Conjonctivites purulentes et toutes autres suppurations.

Mode d'emploi. — Appliquer matin et soir la pommade sur les parties malades à l'aide de l'embout du tube. Répartir ensuite la pommade par un léger massage des paupières.

Prix de vente : 15 francs le tube.

OTO SALANTALE

(Sous forme de pommade). Vaccination par application locale. Le tube muni d'une canule métallique interchangeable facilite l'application dans le conduit auditif et toujours sous le contrôle de la vue.

Indications. — Furoncles et affections douloureuses du conduit auditif : Eczéma impétigineux. Pansements post-opératoires. Otites moyennes et externes, aiguës et chroniques.

Prix de vente : 17 fr. 50 le tube avec canule.

Prix de vente : 15 francs le tube sans canule.

RHINO SALANTALE

Pommade nasale.

Indications. — Rhumes, Grippe, Sinusites aiguës, Mastoïdites et autres inflammations rhino-pharyngiennes.

Mode d'emploi. — Introduire matin et soir, plusieurs fois par jour, après s'être mouché, un peu de RHINO-SALANTALE, dans les narines, puis masser légèrement l'extérieur des narines pour bien répartir la pommade.

Prix de vente : 9 fr. 75 le petit tube.

Prix de vente : 15 francs le grand tube.

RECTO-SALANTALE

Sous forme de pommade rectale (en tube avec canule rectale).

Indications. — Affections du Rectum et de l'Anus, Hémorroïdes.

Prix de vente : 17 fr. 50 le tube.

SUPPOSITOIRES SALANTALE

Indications. — Hémorroïdes, Fistules et Fissures anales.

Prix de vente : 17 fr. 50 la boîte.

TRACHO-SALANTALE

Sous forme de pommade ophtalmique, tube avec embout spécial.

Indications. — Trachomes, Kératites.

Mode d'emploi. — Appliquer matin et soir la pommade sur les parties malades à l'aide de l'embout du tube. Répartir ensuite la pommade sur un léger massage des paupières.

Prix de vente : 10 francs le tube.

Echantillons et littérature sur demande :

Laboratoires SALANTALE

STRASBOURG.

SALÈNE CIBA

SALÉNAL CIBA

Analgésiques externes.

Le salène, mélange des éthers méthyl et éthylglyco-salicylique, possède à un haut degré les propriétés analgésiques du salicylate de méthyle, mais a sur ce dernier l'avantage de son absence d'odeur et de toute action irritante.

Indications. — Rhumatisme articulaire aigu ou chronique, Lumbago, Torticolis, Névrite rhumatismale, Goutte, Sciatique, etc.

Doses. — Se formule magistralement, pur ou en liniment, par 5 ou 10 gr.

Le SALÉNAL (pommade au Salène) est vendu en tubes de 30 gr. Prix : 10 fr.

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND

109-113, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.

SALICYLATE DE SOUDE CLIN

Toutes les préparations de Salicylate de Soude Clin sont à base de Salicylate de soude cristallisé, d'une pureté chimique absolue, exempt de phénols et d'acides libres.

Le dosage rigoureux, la composition toujours fixe, la stabilité l'excipient adéquat assurent l'activité et facilitent la tolérance locale ou générale.

Indications et Formes.

Salicylothérapie : Rhumatisme articulaire aigu et ses complications. Rhumatisme chronique. Arthralgies, myalgies, névralgies. Affections biliaires. Encéphalite, chorée et zona. Sclérose en plaques. Psoriasis. Affections oculaires.

Voie buccale : *Solution de salicylate de soude du Docteur Clin.* — 2 grammes par cuillerée à soupe. Excipient d'un goût agréable et permettant une tolérance parfaite.

Voie veineuse : *Solution de Salicylate de Soude Clin à 5 o/o :* Ampoules de 20 cc. (1 gr. par ampoule) de 40 cc. (2 grammes par ampoule), de 60 cc. (3 gr. par ampoule).

Solution de Salicylate de Soude Clin glucosé à 10 o/o. (Formule du docteur René Benard) : Ampoules de 10 cc. et 20 cc., boîtes de 3 ampoules.

Médication sclérosante (Méthode du Professeur Sicard) : *Solution de Salicylate de Soude Clin à 20, 30 ou 40 o/o*, en ampoules de 3 cc. Boîte de 6 ampoules.

Polysalicylates Clin (Formule du Docteur Lutembacher) :

Solution buccale — 0,75 par cuillerée à soupe.

Ampoules 10 et 20 cc. à 5 o/o.

Laboratoires CLIN, COMAR et Cie.

20, rue des Fossés Saint-Jacques — PARIS.

SALSANOS

A base de sels de soude

Citrate (50 %)

Sulfate, Phosphate, Tartrate.

Forme. — Sel granulé, effervescent, soluble et d'un goût agréable.

Propriétés thérapeutiques. — Maintient l'alcalinité du sang, empêche celle de l'urine, diminue l'acide urique et participe à son élimination, aide à la dissolution des urates et des oxalates, active la combustion des graisses.

Indications. — Artério-sclérose, Pléthorisme, Gastralgie, Arthritisme, Rhumatisme, Goutte, Coliques hépatiques et néphrétiques, Maux de tête, Troubles digestifs, Obésité et en général toutes les affections du foie et des reins.

Doses. — Une à trois cuillerées à café dans un 1/2 verre d'eau le matin à jeun.

Prix : 16 fr. 50.

Laboratoire ROBERTS & C^{ie},

5, rue de la Paix — PARIS.

Tél. : Opéra : 48-91.

SAL-SODYL

Forme. — Boîte de 30 paquets.

3 formules : $\left\{ \begin{array}{l} \text{SAL SODYL « N »} = \text{Normal.} \\ \text{SAL SODYL « S »} = \text{Sulfaté.} \\ \text{SAL SODYL « B »} = \text{Bromuré.} \end{array} \right.$

Composition. — SEL COMPLEXE anhydre, obtenu à partir de sels sodiques cristallisés Codex, à des conditions de température bien déterminées. — PHOSPHATE disodique pur. — SULFATE disodique pur. — BICARBONATE DE SOUDE sursaturé. — CITRATE trisodique.

Action. — Sal Sodyl « N » = Régulateur de la digestion gastrique, calme l'inflammation de la muqueuse, régularise les sécrétions, excite la motricité et diminue la durée du transit gastrique.

Sal Sodyl « S » = Favorise le drainage hépatique et intestinal, diminue les fermentations, décongestionne les voies biliaires.

Sal-Sodyl « B » = Sédatif alcalin indiqué dans le traitement des dyspepsies nerveuses et des troubles spasmodiques viscéraux.

Indications. — Gastrites, Gastro-entérites, Hyperchlorhydries, Troubles hépatiques avec ralentissement des fonctions intestinales. — Migraines. — Dyspepsies nerveuses et trouble spasmodique viscéral. Affections gastro-entériques de l'enfance.

Posologie. — Prendre le matin à jeun ou au début des repas un ou deux paquets, dissous dans un demi-verre d'eau.

Laboratoire Michel DELALANDE
16, rue Henri-Regnault — COURBEVOIE (Seine).

SALUBRINE PHÉNIX

Liquide et comprimés.

Composition. — Antiseptique puissant à base de formolsulfonate de soude et de thymol.

Formes pharmaceutiques. — 1° Solution incolore miscible à l'eau ; d'odeur agréable, ne tachant pas le linge. 2° Comprimés.

Indications. — Gynécologie, accouchements, pansements, hyperhydrose.

Posologie. — 1 à 2 cuillerées à soupe ou 2 à 4 comprimés par litre d'eau. (Usage externe.)

Prix : 7 francs.

Laboratoire P. MAUCHANT
14, rue de Birague — PARIS (IV^e).
à GENNEVILLIERS (Seine).

SALVATYL

Adopté par les Ministères de la Marine et des Colonies.

Prophylaxie antivénérienne individuelle.

Pommade polyvalente agissant à la fois contre le tréponème et le gonocoque.

Principe actif. — Protochlorure de mercure léger et dissociable (Voir *Gambéol*).

Mode d'emploi. — En applications dans le canal de l'urètre, sur la muqueuse balano-préputiale et les écorchures des parties génitales. A employer le plus tôt possible ; au plus tard dans les 10 heures consécutives à un contact suspect.

Présentations :

| | |
|--------------------|------------|
| Salvatyl G. M..... | 15 francs. |
| — Rech | 10 — |
| — P. M..... | 5 — |

Laboratoire du GAMBÉOL

42, rue Emile-Deschanel — COURBEVOIE (Seine).
Téléphone : Défense 17-67

SALVÉ

A base de poudre grise (Hg cum creta), 1 centigramme par comprimé et 3 centigrammes par cachet et de carbonate de bismuth. Traitement bismutho-mercuriel. Médication dissimulée.

Indications. — Hérédo-syphilis, Traitement d'entretien, Insuffisance hépatique et ses manifestations, Constipation habituelle de l'enfant, acétonémie, Dermatoses (eczéma, prurigo, strophulus), Helminthiase et plus particulièrement oxyurase.

Comprimés : avant 6 mois : 1/2 comprimé par jour.

6 mois à 1 an : 1 compr. en 2 fois.

1 an à 2 ans : 3/2 compr. par jour.

2 ans à 4 ans : 2 comprimés par jour.

4 ans à 15 ans : 3 comprimés par jour.

Adulles : 4 comprimés par jour.

Délayer les comprimés dans un peu d'eau ou de lait, avant les repas.

Cachets : Traitement arsénico-bismutho-mercuriel.

Adulles : 2 cachets par jour.

Comprimés : 13 fr.

Cachets : 15 fr.

Laboratoire RICHER, Docteur en Pharmacie
45, Faubourg Saint-Denis — 1, rue d'Enghien — PARIS

SALVEBYL**(granulé)**

Fluidifiant et excitant de la sécrétion biliaire à base de poudre grise (Hg cum creta), hyposulfite de soude et d'extraits végétaux: artichaut, boldo, romarin, etc.

1 cuillerée à café contient 0,005 de poudre grise.

Indications. — Insuffisance hépatique, Migraines, Constipation chronique, Dyspepsie, Calculs biliaires, etc..., Eczéma, urticaire, Prurigo strophulus.

Posologie. — *Enfants* : 1 cuillerée à café par jour.

Adultes : 3 cuillerées à café par jour.

Prix : 16 francs.

Laboratoires RICHER

Docteur en Pharmacie

45, Faubourg Saint-Denis — 1, rue d'Enghien,
PARIS.

SALVENASE LEGOUX

Composition :

Traitement interne.

| | | |
|---|-------------------|---|
| A. Comprimés non enrobés se désagrégeant très rapidement ; constitués de : | Extraits secs | Marron d'Inde (stabilisé) Cupressus Hamamélis Viburnum Boldo |
| | Poudre de glandes | Surrénales Thyroïdes Ovaires |

B. Granulé aromatisé soluble dans l'eau, de citrate de soude pur.

Traitement externe.

Sels pour bains { Sulfate de potasse et d'alumine.
à base de : { Hydrochlorate de soude.
{ Carbonate de soude acide.

Indications. — Affections du système veineux. Traitement complémentaire de la cure aux eaux ou à défaut son meilleur succédané. (Bagnoles de l'Orne, La Léchère).

Mode d'emploi :

Traitement interne. { 1^o matin à jeun, 1 cuillerée à café
(Prix : 15 fr.) { pleine de granulé, dissous dans un
{ demi-verre d'eau.
{ 2^o A chaque repas de midi et du soir,
{ prendre 2 à 3 comprimés.

Traitement externe. { 1 bain ou 2 par semaine dans lequel
(Prix : 3 fr. 75). { on aura fait dissoudre le contenu
{ d'une boîte Salvenase (sels pour
{ bains).

N^o d'inscription au Lab. de Contrôle :

Traitement { Comprimés 146-4.

interne. { Granulé... 146-5.

Traitement externe..... 146-6.

Laboratoires LEGOUX, frères

6, rue Louis-Blanc — LA GARENNE (Seine).

Anciennement, 10, rue de Turenne,

PARIS (IV^e).

SALYCHLORE LAVIRE

Bain de bouche.

Formule :

| | | |
|-----------------------|------|--------|
| Formoline | 0,20 | p. 100 |
| Acide salicylique.... | 1,20 | — |
| Chloral..... | 5,00 | — |

Indications :

Angines, Maux de gorge, Gingivites, Pyorrhées, et toutes affections de la bouche et des dents.

Posologie :

1 cuillerée à café dans un verre d'eau tiède.

Prix : 9 fr. 75.

Laboratoire LAVIRE

46, rue de Rome — MARSEILLE

SALYPTOL NARTY

Traitement de la Grippe, de la Coqueluche et des maladies des Voies respiratoires.

Composition. Propriétés. — Extrait balsamique aux principes actifs de l'eucalyptus et du pin maritime, Bromoforme-Codéine, Belladone d'Aconit et d'Opium, Hypnal, Excipient glycéro-balsamique sucré.

Calmant énergique de la toux, Antifébrifuge, Anti-bronchitique, Anti-grippal.

Indications. — Rhumes, Laryngite, Trachéite, Bronchites aiguës et chroniques, Affections pulmonaires, Grippe et toutes ses formes, Coqueluche.

Formes. Posologie. — *Elixir (adultes)*: 4 à 5 cuillerées à dessert par 24 heures.

Gouttes (enfants): jusqu'à 10 ans, X gouttes par jour et par année d'âge ; jusqu'à 1 an, I goutte par jour et par mois.

Elixir : 18 fr. Gouttes : 16 fr. 50.

Laboratoires Georges TINARD

134, boulevard Pereire — PARIS (XVII^e).

SALYSÉRUM

Composé cosalicylé

(Communication à l'Académie de Médecine.)

Forme. — Ampoules de 5 cc. d'acide salicylique *indolore*.

Indic. therap. — Rhumatisme aigu ou subaigu, Pleurodynies, Torticolis, Lumbagos, Rhumatisme gonococcique, Sciatique, Goutte.

Doses. — 2 à 3 ampoules chaque jour injectées au point douloureux.

Prix: 22 fr. la boîte de 5 ampoules de 5 cc.

Laboratoires DROUET et PLET
RUEIL-MALMAISON (Seine-et-Oise).

SAMBUL

Médicament végétal, *sans colchique*.

Composition. — A base d'un suc extrait des baies du Sambucus Ebulus. Désodorisé.

Indications. — Goutte ; rhumatismes ; sciatique ; névralgies ; lumbago, migraines, etc. — Antidiabétique.

Posologie. — Une cuillerée à café matin et soir, avant et à distance des repas. *N'est pas toxique* ; pas de contre-indications. Traitement à prolonger dans les cas chroniques rebelles de prime abord. Cures ininterrompues de 1 à 3 flacons.

Le flacon pour dix jours de traitement : 18 fr.

Littérature et spécimens médicaux
sur demande :

Société des Laboratoires du SAMBUL
EVREUX (Eure).

SANAFÉINE

Corps défini.

Salicylate double d'analgésine et de caféine.

Dose moyenne. — 1 cachet de 0 gr. 50 cgr.

Renouveler une demi-heure après si nécessaire.

Cas particulièrement graves. — 2 cachets pris simultanément (maximum : 6 à 8 cachets *pro die*).

Indications. — Traitement des algies rhumatismales.

Prix :

Boîte de 2 cachets : 1 fr. 75 ; 10 cachets : 8 francs ; 20 cachets : 14 francs.

Laboratoires FOURNIER Frères

7, rue Biscornet — PARIS (XII^e).

SANAS

Composition :

Extrait glycéринé concentré de foies frais de morue. Produit vitaminé, facteurs A et D, sans trace d'huile, ne contient aucune substance irradiée artificiellement.

Préparation :

Sur les lieux mêmes de la pêche, dans les laboratoires du *Sanas*, à Saint-Pierre-Miquelon (Banc de Terre-Neuve).

Formes :

- 1° Gouttes ;
- 2° Ampoules pour boisson. Spécialement indiquées pour les colonies et pays chauds.

Avantages :

Sans odeur ou saveur désagréables.

Contient sous un faible volume les principes actifs des foies frais. Se prend aussi bien l'été que l'hiver.

Indications :

Toutes celles de l'huile de foie de morue. Rachitisme, Prétuberculose, Anémie, Convalescence des maladies infectieuses, Adénopathies, Inappétence.

Posologie :

Enfants : Dose journalière : II à IV gouttes par année d'âge.

Adultes : Dose journalière : L à LX gouttes.

Mode d'emploi :

Une demi-dose journalière avant chacun des deux principaux repas, dans un peu de lait, de bière, de vin, de potage ou mélangée à un aliment quelconque.

Prix du flacon : 15 francs.

A. WELCKER et C^{ie}

72, rue du Commerce — PARIS (XV^e).

SANDOPTAL

Acide isobutyl-allyl-barbiturique.

Forme. — Comprimés dragéifiés dosés à 20 cgr. d'isobutylallylmalonylurée.

Propriétés. — Assure un sommeil tranquille et naturel, suivi d'un réveil eusthénique. Index thérapeutique élevé. Tolérance parfaite, également par les personnes âgées, les affaiblis, les convalescents.

Indications. — Toutes les insomnies.

Posologie. — Une dragée le soir avant de se coucher. Cas rebelles : 2 ou 3 dragées (maximum 4) à la fois.

Présentation. — Tubes de 10 dragées. Pour hôpitaux et cliniques : flacons de 100 et 500 dragées.

Prix. Le tube de 10 : 10 francs. Le flacon de 100 : 85 francs.

Produits SANDOZ

20, rue Vernier — PARIS (XVII^e).

SANÉDRINE

Chlorhydrate d'Ephédrine lévogyre.

Indications :

Asthme bronchique, Fièvre des foins, Hypotension, Dysménorrhée, Accidents allergiques.

Présentations :

Comprimés (tubes de 20)

Solution aqueuse à 3 0/0 Flacons de 30 cc.

Solution huileuse à 2 0/0 Flacons de 15 cc.

Posologie et mode d'emploi :

Deux à six comprimés à 25 milligr. par 24 heures, en prises espacées.

S'abstenir chez les hypertendus.

Pour l'administration par voie parentérale : ampoules de 1 cc. renfermant : Sanédrine (0 gr. 02), et Rénaléptine 0 gr. 002) — (boîtes de 10 amp.).

Pour l'usage externe : solution aqueuse de Sanédrine à 3 % (flacons de 30 cc.), solution huileuse de Sanédrine Base à 2 % (flacons de 15 cc.).

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPÉCIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

SANEX-INHALANT

Composition. — Liquide volatil antiseptique, à base d'essences aromatiques de pin sylvestre, de thym, de menthe, de camphre, de melaleuca de Gomène, d'eucalyptus, etc. en solution dans de l'acétone pure. Présenté en tube stilli-gouttes.

Avantages. — Permet de faire de très fréquentes inhalations antiseptiques sans appareil spécial ; il suffit de verser sur un mouchoir quelques gouttes de SANEX-INHALANT et de respirer fréquemment les vapeurs qui se dégagent pendant plusieurs heures. Ne tache pas le linge. Odeur agréable.

Indications. — Affections du nez, de la gorge et des bronches ; en particulier Coryza, Sinusite, Rhume des foins, Coqueluche, Asthme.

Prix : 10 francs.

Sur demande, envoi d'un spécimen à MM. les Docteurs.

Laboratoires BOISSY

15, rue Belgrand — PARIS (XX^e).

SANGUIL

Reconstituant complet.

Composition. — Association de glycéro-phosphate de soude, phosphate trical-cique, fluorure de calcium, nucléinate de manganèse, oxalate de fer, méthyl-arsinate de soude, kola totale, noix vomique totale, surrénale.

Action thérapeutique. — Stimule la cellule nerveuse. Excite la nutrition. Régénère les globules sanguins. Tonifie l'organisme. Assure la reminéralisation complète par ses fixateurs opothérapiques.

Formes :

Cachets, la boîte de 42 : 17 fr.

Granulé de goût agréable, la boîte : 14 fr.

Mode d'emploi :

Cachets : Un cachet avant chacun des trois repas.

Granulés :

Moins de 12 ans : deux cuillerées à café par jour.

De 12 à 18 ans : trois cuillerées à café.

Adultes : trois cuillerées à dessert.

A prendre au début des repas.

Laboratoires Ch. BRÉSIL

12, rue Saint-Gilles — PARIS (III^e).

Téléphone : Archives 67-05.

SANLUOL

Arsénobenzol en dragées.

Le Sanluol permet, sous une forme commode et bien tolérée, l'administration par la voie buccale de l'arsénobenzol, méthode préconisée par M. le Dr Ravaut.

Présentations : dragées de 0 gr. 10 (tubes de 20).
— de 0 gr. 05 (tubes de 20).
— de 0 gr. 02 (tubes de 30).

Indications. — Amibiase (prophylaxie et traitement). Diarrhées, Entérites.

Posologie et mode d'emploi :

Traitement : Deux à six dragées à 10 centigr. par 24 heures, par séries de 8 à 10 jours.

Prophylaxie : Une ou deux dragées par jour, une ou deux fois par semaine.

Pour la médecine infantile, le Sanluol est présenté en comprimés à 0,02 (tubes de 30).

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

SANOCRYSINE DE MOLLGAARD

Thiosulfate d'or et de sodium.

Indications. — Tuberculose pulmonaire, cutanée, ganglionnaire, etc. Asthme bronchique, Maladies rhumatismales.

Forme. — Ampoules à doses progressives de 0 gr.01 à 1 gramme.

Mode d'emploi. — En injections intraveineuses ou intramusculaires.

Posologie. — On débute par des doses faibles en augmentant progressivement selon la tolérance du malade.

OLÉO-SANOCRYSINE

Thiosulfate d'or et de sodium.

En suspension huileuse.

Indications et posologie de la Sanocryisine aqueuse

Forme. 1° En suspension à 1 p. 100.

Ampoule de 2 cc. contient 0 gr. 02 de Sanocryisine.

— 3 cc. — 0 gr. 03 —

— 5 cc. — 0 gr. 05 —

2° En suspension à 5 p. 100.

Ampoule de 2 cc. contient 0 gr. 10 de Sanocryisine.

— 3 cc. — 0 gr. 15 —

— 5 cc. — 0 gr. 25 —

3° En suspension à 10 p. 100.

Ampoule de 2 cc. contient 0 gr. 20 de Sanocryisine.

— 3 cc. — 0 gr. 30 —

— 5 cc. — 0 gr. 50 —

Mode d'emploi. — En injections intramusculaires.

Avant l'emploi, agiter l'ampoule jusqu'à ce que la suspension soit homogène.

Valentin AAGE MOLLER

149, rue du Palais-Gallien — BORDEAUX

Dépositaire pour la France :

**Jean DEDIEU, pharmacien, 39, rue Fondaudège
BORDEAUX**

SANOFORMINE

Composition. — Bicarbonates alcalins, trioxyméthylène, sulfate de cuivre, fluorure de sodium, menthol et essences aromatiques.

Forme. — Comprimés de dissolution facile et rapide dans l'eau tiède ou froide.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique, bactéricide, désodorisant puissant, astringent, décongestionnant et analgésique.

Indications thérapeutiques et posologiques. —

- 1° Toilette intime : 1 à 2 comprimés par litre ;
- 2° Métrites, leucorrhée, salpingites, etc., 2 à 3 comprimés par litre ;
- 3° Désodorisant : 12 comprimés pour un bain de pieds quotidien. — 10 comprimés par litre en lavage (plis de l'aîne, creux de l'aisselle).

Prix : 15 francs.

Laboratoires MAYOLY-SPINDLER

1, place Victor-Hugo — PARIS (XVI^e).

A BRUXELLES :

LE MARINEL, Pharmacien,

4, avenue Orban Van Volxem.

SANOGYL

Pâte antispirillaire pour prévenir et traiter les Pyorrhées alvéolaires, Gingivites, Stomatites simples, mercurielles, bismuthiques, etc.

Prix : 6 fr.

SANORAM

Antiseptique puissant, en comprimés : ne coagule pas l'albumine. Recommandé en Chirurgie générale, traitement des brûlures, soins de la bouche, toilette intime, etc.

Prix : 5 fr.,

H. VILLETTE, Pharmacien

Marques de « La Biothérapie »

5, rue Paul-Barruel — PARIS (XV^e).

Téléphone : Vaugirard 11-23.

SANOQUINOL CIBA

Antiarthritique.

A base d'Atoquinol (Cf. ce mot), d'hexaméthylène-tétramine, de chlorure de magnésium, citrate de soude et benzoate de lithine.

Médicament spécialement préparé pour les cures d'élimination uratique prolongées. Grâce à ses composants, il exerce sur l'organisme une action lixiviante caractérisée par la mobilisation lente et prolongée des dépôts uratiques, une stimulation de la fonction hépato-biliaire et de la fonction rénale, l'augmentation de la sécrétion de la bile, et une diurèse abondante, éliminatrice des déchets de l'organisme.

Indiqué dans les diverses manifestations de l'arthritisme, après les maladies infectieuses et, à titre préventif ou hygiénique, chez les sujets à complexion pléthorique, obèses, herpétiques, rhumatisants, etc.

Doses : 1 à 4 cuill. à café de granulé par jour (aux repas).

Le flacon : 15 francs.

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND.

109-113, boulevard de la Part-Dieu — LYON

SANTAL MIDY

Composition. — Essence de Santal pure obtenue par la distillation du bois de Santal citrin de Mysore, préférable au Copahu, au Cubèbe et à l'essence de térébenthine.

Forme. — Capsules.

Caractéristiques. — Pureté de l'essence et dosage élevé (0 gr. 25) par capsule.

Indications. — Blennorrhagie, Inflammation de la vessie, Néphrite suppurée, Catarrhe de la Vessie, Catarrhe vésical des vieillards, Maladie de Bright, Cystite aiguë, Coliques néphrétiques.

Doses. — Dès que la maladie est déclarée, 10 à 12 capsules le premier jour. Augmenter de 3 à 4 capsules les deuxième et troisième jours. Diminuer progressivement la dose.

Diviser les doses en quatre parties que l'on prend à distance égale et un quart d'heure avant les repas.

Prix : 18 francs.

Laboratoire de Pharmacologie Générale

D^r Ph. CHAPELLE, 8, rue Vivienne — PARIS.

SANTAL MONAL

au Bleu de Méthylène.

Forme. — Capsules.

Composition. — Chaque capsule contient :
Essences balsamiques : 0 gr. 16.

Bleu de Méthylène : 0 gr. 02.

Doses. — 6 à 10 capsules par jour.

Action. — Antigonococcique, Antiseptique, Analgésique, Diurétique. Le plus actif et le mieux toléré des produits préconisés pour le traitement des Affections des Voies Urinaires.

Particularité. — Colore les urines en bleu.

Le flacon de 50 capsules : 20 fr.

Laboratoires MONAL et C^{ie}

6, rue Bridaine — PARIS.

SANTHÉOSE

A base d'une diméthylxantine irréprochablement pure, associée selon les cas au *phosphate de soude*, à la *caféine* ou au *benzoate de lithiné*.

Forme :

Se présente en cachets en forme de cœur (dosés à 0,50 de principe actif) et existe sous 4 variétés :

- 1° **Santhéose pure** : Affections cardio-rénales, albuminurie.
- 2° **Santhéose phosphatée** : Scléroses, convalescences.
- 3° **Santhéose caféinée** : asthénie, asystolie, infections.
- 4° **Santhéose lithinée**, artériosclérose, rhumatisme, goutte.

Dose. — 1 à 4 cachets par jour.

Propriétés thérapeutiques :

Diurétique, hypotenseur, toni-cardiaque, anti-toxique.

Indications :

Toutes les affections justiciables d'un diurétique rénal direct.

Vente au public : la boîte de 24 cachets : 12 francs.

Laboratoire de la SANTHÉOSE

4, rue du Roi-de-Sicile — PARIS (IV^e).

SAPOLAN

Onguent de Naphte spécial.

Spécifique des Prurits. — Eczémas.

Psoriasis. — Lichens.

Sapocrème. — Crème de SAPOLAN. Adoucissante, antiprurigineuse. Dermites aiguës.

Prix : 11 francs.

Sapocade. — (Sapolan et Huile de Cade.) Psoriasis. Séborrhée, Sycosis. Le tube : 11 fr.

Lait de Sapolan. — Erythèmes. Le flac. : 18 fr. 50.

Lait de Soufre Sapolan. — Acné. Le flac. : 18 fr. 50.

Lait de Cèdre Sapolan. — Pityriasis et Séborrhée du cuir chevelu. Le flac. : 18 fr. 50.

Poudre de Sapolan. — Dermites aiguës.

La boîte : 11 francs.

Savon de Sapolan. — Savon surgras au Sapolan : Peaux irritables. Prix : 5 fr.

Sapobarbe.

Laboratoire du D^r R. CAVAILLÈS

29, rue Singer — PARIS (XVI^e).

Détail : Pharmacie 116, bd Haussmann et toutes pharmacies.

SARCOPTOL

Solution complexe à base de soufre colloïdal-acide-B-oxynaphtylortho-oxymétatoluilique, savons-essences.

Indications. — Séborrhée et états séborrhéiques, Epidermodermes microbiennes, Eczéma chronique et impétigineux, Prurit, Prophylaxie de la Furonculose, Parasiticide. Spécifique de la gale, qu'il guérit en une seule application sans frotte et sans bain.

Avantages. — Ne tache ni le linge ni la peau. d'une odeur agréable. Ni toxique, ni irritant, supprime instantanément les démangeaisons,

En flacons de 60 grammes : 15 fr.

— 120 — 28 fr.

Laboratoire du Sarcoptol

177, rue de Courcelles — PARIS (XVII^e).

Tél. : Étoile 29-54.

SAUBARSINOL

Collutoire au *Novarsénobenzol* (1 gr. 60 %), à l'extract fluide d'*Arnica Montana* et au *Citrate de soude*.

Indications thérapeutiques. — *Angines rouges, Angines de Vincent, Angines pseudo-membraneuses, Angines herpétiques, Gingivites, Stomatites, etc.*

Mode d'emploi. — En badigeonnages très légers sur les amygdales ou sur les gencives. En instillations nasales, III gouttes dans chaque narine, matin et soir.

Prix : 15 francs.

Laboratoires SAUBA
MONTREUIL — PARIS

SAUCHOLINE

Forme. — Granulé soluble sucré et aromatisé à la framboise.

Composition. — *Peptone pure de viande et sulfate anhydre de magnésie.*

Propriétés thérapeutiques. — Cholagogue puissant. Agit sur l'ensemble des fonctions hépatiques : biliaire, glycogénique, antitoxique. Assure la sécrétion régulière de la bile et un drainage rationnel des voies biliaires.

Indications. — *Congestion du foie et de la vésicule biliaire. Ictère. Cholécytite. Lithiase biliaire. Troubles digestifs ayant une cause hépatique. Inappétence. Nausées. Constipation par insuffisance biliaire. Urticaire. Vertiges. Migraine.*

Mode d'emploi. — Prendre la Saucholine le matin à jeun dans un peu d'eau chaude. S'étendre ensuite pendant un quart d'heure sur le côté droit.

Adultes : 1 à 3 cuillerées à café.

Enfants au-dessus de 3 ans : 1/4 à 1 cuillerée à café suivant l'âge.

Prix : 16 fr. 50.

Laboratoires SAUBA
MONTREUIL-PARIS

SAVONS A°. MOLLARD

SAVONS MOLLARD A TOUS MÉDICAMENTS

SAVONS SULFUREUX DE TOILETTE

A°. MOLLARD

SAVONS FLUIDES MOLLARD

pour les soins du cuir chevelu

(cèdre, cade, sulfureux, panama)

LÔTION A°. MOLLARD A LA PILOCARPINE

SAVON DENTIFRICE MOLLARD

POMMADE ALCALINO-SULFUREUSE MOLLARD

CRÈME SULFUREUSE DE SAVON MOLLARD

(affections squameuses du cuir chevelu)

Émile LANG et C^{ie}

2, rue du Marché-des-Blancs-Manteaux

PARIS (IV^e)

Téléphone : Archives 20-71.

SCILLARENE « SANDOZ »

(Adopté par les Hôpitaux de Paris.)

Composition. — Tous les principes actifs du bulbe de scille isolés sous forme de glucosides purs.

Forme. — Comprimés à 0 mgr. 8 de substance active, solution à 1/2000 ; ampoules pour injections intramusculaires profondes à 1 cc. dosées à 0 gr. 0005 ; suppositoires dosés à 1 mgr.

Propriétés. — Produit pur, cardiotonique et diurétique. Pas d'irritation rénale ou gastrique. Pas d'accumulation.

Indications. — 1° Remplace la digitale quand elle n'agit pas ou n'agit plus ; 2° maintient la compensation ; 3° puissant diurétique dans les néphrites, le diurétique azoturique vrai.

Posologie. — 1/2 à 2 ampoules par jour, 1 à 2 suppositoires, 1 comprimé ou XX gouttes 2 à 8 fois par jour à doses régulièrement ascendantes puis descendantes.

Prix :

Amp. : 12 fr. — Comp. : 14 fr. — Sol. : 17 fr. —
Supp. : 18 fr.

Produits SANDOZ

20, rue Vernier — PARIS (XVII^e).

SCILLITRINE

Composition. — Association de Trinitrine, Scille et Gardénal. Dragées à noyau mou contenant II gouttes de la solution alcoolique de Trinitrine à 1/100, 2 cgr d'Extrait de Scille stabilisé, 1 cgr. de Poudre de Scille stabilisée et 1 cgr. de Gardénal.

Propriétés. — Hypotenseur par la Trinitrine et le Gardénal. Diurétique et toni-cardiaque par la Scille.

Indications. — Traitement d'entretien des hypertendus. Traitement des accidents aigus de l'hypertension et des crises d'angor.

Présentation. — Boîte contenant 45 dragées.

Posologie. — Traitement d'entretien : 3 dragées par jour aux repas, pendant 15 jours *chaque mois*. Traitement des états aigus : *croquer* 3 à 4 dragées en 10 minutes.

Prix : 20 francs.

Laboratoire PERRIER

17 bis, boulevard Rochechouart — PARIS (IX^e).

Tél. : Trudaine 03-01.

SCLÉROSÉROL

Hypotenseur, Diurétique
Spécifique de l'Artériosclérose.

Composition. — Acide thyminique, Théobromine, Lactose, Extrait de Gui, Silicate de Soude.

Indications. — Hypertension sous toutes ses formes, Rétention chlorurée, Athérome, Scléroses organiques et Préscléroses.

Forme. — Comprimés dragéifiés.

Dose :

3 à 6 par jour. Avaler les comprimés avec une gorgée de liquide et sans les écraser.

Prix : 16 francs.

**Laboratoire Moderne
d'Opothérapie et Biologie Médicale**
40, rue Claire-Paulhac — TOULOUSE

SCLÉROSÉRUM

Traitement des Varices, des Hémorroïdes, des Rhinites congestives et hypertrophiques, des Epistaxis, Laryngites tuberculeuses et hydrocèles par les injections sclérosantes.

Formule. — Chlorhydrolactate double de Quinine et d'Urée, en milieu glyciné. (Employée dans les Hôpitaux.)

Indications, technique et posologie. — Demander à nos Laboratoires l'opuscule traitant ces questions et contenant quelques-unes des observations prises dans les hôpitaux de Paris.

Avantages sur les autres solutions. — 1° Le plus actif des sels employés; 2° absolument indolore pendant et après l'injection (jamais de crampe); 3° le moins réactionnel pour les tissus périvasculaires; 4° nullement escarrotique à des doses permettant des scléroses étendues et complètes; 5° sa présentation permet d'obtenir automatiquement tous les taux de solution désirables.

Traitement : Varices : 45 francs ; Hémorroïdes : 30 francs ; O.-R.-L. : 30 francs ; Hydrocèles : 30 francs.

LABORATOIRES « ANA »

18, avenue Daumesnil — PARIS (XII^e).

Tél. : Dorian 52-12.

SCUROCAÏNE

Chlorhydrate du para-aminobenzoyl-diéthylaminoéthanol.

Le moins toxique des succédanés de la cocaïne.

Solutions : en ampoules stérilisées à divers titres, additionnées ou non d'Adrénaline (Renaleptine), pour usages anesthésiques.

Anesthésie par infiltration. Anesthésie dentaire.

Société Parisienne d'Expansion Chimique
« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e)

SÉCACORNINE " ROCHE "

Tous les principes actifs de l'ergot de seigle sous une forme soluble et injectable.

Toutes les propriétés de l'ergot de seigle sans ses inconvénients.

Indications. — Hémorragies internes, utérines et autres, Myocardites infectieuses, Congestion pulmonaire, Diarrhées, Leucorrhée, Spermatorrhée, Atonie utérine, Polypes du rectum.

Posologie et mode d'emploi. — Ampoules, solution comprimés.

1 cc. ou 1 ampoule ou XL gouttes ou 4 comprimés agissent comme 4 gr. de seigle ergoté.

Doses d'urgence : 2 cc. ou LXXX gouttes ou 2 ampoules

Doses moyennes : 1/2 à 1 ampoule, XX à XL gouttes ou 1 à 2 cc. par jour.

Thérapeutique locale : 2 cc. ou 2 ampoules par jour en injections intra-utérines ou sous-muqueuses.

Enregistré au Laboratoire national de contrôle des médicaments sous les n^{os} 504-27 (ampoules), 504-29 (gouttes), 504-28 (comprimés).

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et C^{ie}
10, rue Crillon. — PARIS (IV^e).

SÉDACRINE Gouttes

A base de Sédum acre, Polygonium hydropiper et poeonia avec comme excipient :

Extrait stabilisé de marrons d'Inde et Hamamélis.

Indications. — Toutes affections du système veineux.

Mode d'emploi. — De XX à XXX gouttes avant chacun des deux repas.

Prix : 12 francs.

Laboratoire de la VARILAXINE
SURGÈRES (Charente-Inférieure).

SEDARTHRYL

Médication synergique du rhumatisme articulaire et des arthrites.

| | | | |
|--------------------------|-------------|--------------------------|----------|
| Salicylate de Sodium.. | 18 gr. 1629 | Azotate de Potasse ... | 6 gr. |
| Salicylate de Potassium. | 3 gr. 782 | Iodure de Sodium.... | 4 gr. 50 |
| Salicylate de Calcium. | 4 gr. 4392 | Antipyrine..... | 4 gr. 50 |
| Teinture de Colchique | 2 gr. | Sirop d'écorces d'o- | |
| Benzoate de Sodium... | 2 gr. | ranges amères..... | 200 gr. |
| Benzoate de Lithine... | 2 gr. | Glycérine..... | 45 gr. |
| Aspirine | 0 gr. 25 | Eau distillée q. s. p... | 310 cc. |

Flacon de 310 cc. 10 jours de traitement. Prix : 22 francs.

Particularités. — Association hypéreactive des 3 salicylates, aux diurétiques et à l'iodure de Sodium.

Emploi. — *Cas chroniques.* 3 fois par jour 2 cuillerées à café, au milieu des repas.

Cas aigus : De 8 à 12 cuillerées à café dans des tisanes bien sucrées.

Indication. — Rhumatisme articulaire aigu et surtout chronique, douleurs articulaires. Arthrites rhumatismales et tuberculeuses.

(Sirop et ampoules)

Laboratoires du PULMODYNOL

(Spécifique pulmonaire, tonique et eupnéique.)

A. GONTARD

22, rue de Nemours — PARIS.

SÉDATOSE

Tartrate borico-potassique
du Docteur André Gigon

Composition. — Tartrate borico-potassique chimiquement pur.

Forme. — Poudre desséchée.

Indications thérapeutiques. — Epilepsie.

Mode d'emploi et dose. — Cuillère-mesure dosant 50 centigr. : 6 à 10 par jour ; traitement prolongé suivant avis du médecin.

Flacon de 40 gr.

Laboratoires des Produits du Dr GIGON

A. FABRE, pharmacien

25, boulevard Beaumarchais — PARIS (IV^e).

SÉDERGINE

Synergie sédative et régulatrice du système nerveux.

Formule :

| | |
|------------------------------------|----------|
| Borotartrate de Potasse | 0 gr. 20 |
| Gardénal | 0 gr. 02 |
| Extrait fluide de passiflore | 0 gr. 06 |
| Extrait fluide de cratoegus | 0 gr. 03 |
| Extrait mou de Piscidia | 0 gr. 03 |
| Peptone polyvalente | 0 gr. 03 |

pour 1 comprimé.....

40 dragées en tube. Prix: 16 francs.

Particularités. — Gardénal et tartrate borico-potassique associés à doses efficaces aux principes végétaux et à la peptone polyvalente agissant comme antianaphylactique.

Présenté aux névropathes comme régulateur du système nerveux, avec le minimum d'explications.

Emploi. — 2 à 3 dragées par jour chez les névropathes.

6 à 8 dans l'épilepsie.

Indications. — Médication de choix des irritables, des émotifs, des anxieux, des névropathes, des intoxiqués. Insomnie. Troubles nerveux de la ménopause, des syndromes solaires et digestifs. Spasmes. Éréthisme cardiaque. Épilepsie.

Laboratoires du PLASMOCALCIUM

(Chlorure de calcium assimilable.)

J.-C. ARNAULT, SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE (Oise).

O. C. P. Toutes Drogueries et Pharmacies.

SEDLITZ CHANTEAUD

Composition. — Granulé effervescent composé de Sulfate de Magnésie parfaitement déshydraté, rendu légèrement effervescent par l'addition d'une petite quantité d'Acide tartrique et de Bicarbonate de soude.

Indications. — Dépuratif, Laxatif, Purgatif.

Doses et mode d'emploi :

Laxatif : 1 cuillerée à café.

Purgatif : 1 à 2 cuillerées à soupe.

Se prend à jeun dissous dans un peu d'eau.

Prix de vente au public : 8 fr.

Laboratoires CHANTEAUD

J. LAURIN, Pharmacien

3 et 5, rue Alexandre-Dumas
SAINT-OUEN (Seine).

SÉDOBROL « ROCHE »

Extrait de bouillon végétal concentré
achloruré et bromuré.

Tablettes. — 1 tablette = 1 gr. NaBr.

Modes d'emploi et doses. — Adultes :
1 à 5 tablettes par jour.

Enfants : 1/2 à 2 tablettes par jour, selon
l'âge.

Dans une tasse d'eau très chaude, on fait
dissoudre une ou deux tablettes de *Sédobrol*
« Roche » : on prépare ainsi instantané-
ment un bouillon particulièrement savou-
reux que l'on peut prendre à n'importe
quel moment de la journée.

Propriétés thérapeutiques. — Médica-
ment sédatif, hypnotique et calmant
donnant des résultats certains et permet-
tant d'imposer un *traitement bromuré*
intensif *dissimulé*, tout en rendant agréa-
ble le régime déchloruré.

Indications thérapeutiques. — Insom-
nies, névralgies, excitabilité, irritabilité,
gastralgies, dyspepsies, palpitations, car-
diopathies, migraines, spasmes, convul-
sions, chorée, névroses, épilepsie, etc.

Enregistré au Laboratoire national de contrôle des
médicaments sous le n° 504-31.

PRODUITS

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}

10, rue Crillon — PARIS (IV^e).

SÉDOFOLLINE

Composition et propriétés. — 1° *Folliculine* ovarienne: Dosage garanti, activité constante. — 2° Extrait ovarien spécial: Action naturellement synergique de toutes les hormones ovariennes à l'exclusion de l'hormone lutéinique. — 3° Thyroïdine (faible dose): Synergie thyro-ovarienne. — 4° Sédobenzyl (non toxique): Sédatif et antispasmodique.

Forme. — Dragées friables à enrobage soluble, dosées à raison de 12 unités physiologiques.

Indications. — Tous les troubles de la fonction ovarienne.

Dosage. — Chaque dragée est dosée à raison de 12 unités physiologiques de *Folliculine*.

Mode d'emploi. — 2 à 8 dragées par jour, loin des repas. Dose moyenne: 4 dragées par jour.

Traitement. — 8 jours de traitement, 8 jours de repos jusqu'à résultat satisfaisant. Continuer chaque mois pendant les 8 jours précédant l'époque présumée des règles.

Prix: 20 francs.

Laboratoires ODILIA

E. LACOMBE, pharmacien

42, rue du Mont-Cenis — PARIS (XVIII°).

SEDOGASTRINE

Sédatif gastrique.

Formes. — Granulé, comprimés (avec bonbonnière de poche).

Composition. — 1° *Substances neutralisantes :*

Hydroxyde de magnésium. Carbonate de calcium léger, précipité à froid.

2° *Substances modératrices de la sécrétion :*

Phosphate de sodium, Phosphate de calcium.

3° *Substance calmante et antispasmodique :*

Poudre de Ciguë à dose inoffensive, mais suffisamment active.

Propriétés thérapeutiques :

Sédation des phénomènes douloureux gastriques.

Réparation de la muqueuse de l'estomac.

Pas de constipation.

Pas d'accoutumance.

Indications. — Hypersécrétion.

Hyperacidité.

Dyspepsies douloureuses.

Spasmes.

Ulcères.

Posologie. — Après les repas et au moment des douleurs, prendre :

Granulé : 1 à 2 cuillerées à café.

Comprimés : quatre à six jusqu'à sédation.

Prix : 12 fr. 50.

Laboratoires du Docteur ZIZINE

Docteur en Médecine — Docteur en Pharmacie
Ex-interne en Pharmacie — Lauréat des
Hôpitaux. — Lauréat des Fac. de Méd. de Paris
et Bordeaux.

24 et 26, rue de Fécamp — PARIS (XII^e).

Tél. : Diderot 28-96.

SÉDOL

Association Scopolamine-Morphine.

Mode d'emploi et doses. — 1° **Ampoules** : 1 à 2 injections hypodermiques par 24 heures ;

2° **Suppositoires** : 1 à 2 « supposédol » par 24 heures.

3° **Comprimés** : 1 à 2 « pérosédol » par 24 heures.

Propriétés thérapeutiques. — Beaucoup plus actif que la morphine à dose égale.

Indications. — Phénomènes douloureux, Insomnies douloureuses, Cancers, Spasmes, Crises tabétiques, Maladie de Parkinson, Anesthésie chirurgicale, Accouchements, etc.

| | | | |
|------------------------------|---|-------------------------------|--------|
| Prix de vente au public : | { | La boîte de 12 ampoules : | 25 fr. |
| | | La boîte de 6 ampoules : | 18 fr. |
| | | La boîte de 3 suppositoires : | 9 fr. |
| | | La boîte de 10 supposédol : | 25 fr. |
| | | Le tube de 12 comprimés : | 10 fr. |
| (Pérosédol) | | | |

Le Supposédol ne fait pas partie du tableau B.

Société Générale d'Applications Thérapeutiques
THERAPLIX

R. MOREUX, Pharmacien

Ancien interne des hôpitaux

98, rue de Sèvres — PARIS (VII°).

SEDONEUROL DEHAUSSY

« Calme sans déprimer ».

Composition.

Phényl-éthyl-malonylurée, Tartrate borico-potassique, Atropine et correctifs variant suivant les comprimés.

Comprimés jaunes : Caféine 0,015.

Comprimés roses : Strychnine, 0,0002.

Médication synergique permettant un effet thérapeutique équivalent avec une dose moindre de phényl-éthyl-malonylurée. Evite l'action dépressive de ce produit grâce aux correctifs.

Pour éviter l'accoutumance à ces derniers, administrer 8 jours les comprimés jaunes ; 8 jours les comprimés roses.

Formule, posologie et indications établies d'après les travaux de Pierre Marie, Crouzon, Bouttier, Carrière, Pagniez, Sezary, etc...

Indications.

États spasmodiques. — Traitement de choix de l'*Epilepsie* dans toutes ses formes. — *Maladie de Parkinson* et *Parkinsonisme*. — *Asthme rebelle*.

États d'instabilité nerveuse. — *Insomnies rebelles*, *Anxiété*, *Instabilité des basedowiens* et *des hypertendus*, *Prurit sénile*.

Algues paroxystiques. — *Migraine, Angine de poitrine.*

Enfants et nourrissons. — Toutes les manifestations spasmodiques de l'épilepsie, du croup, des laryngites striduleuses et aiguës, toux persistante des broncho-pneumonies, coqueluche, lélanie, états convulsifs, chorées, tics, vomissements spasmodiques du nourrisson, etc.

Posologie.

Epilepsie. — Doses progressivement croissantes jusqu'à suppression des crises. Commencer par quatre comprimés chez l'adulte, deux comprimés à cinq ans.

Autres indications.

Adultes, dose moyenne entre 4 et 8 comprimés. — *Enfants*, 1/2 comprimé par année d'âge. — *Nourrissons* (tolérance parfaite), 1/2 comprimé jusqu'à six mois, un comprimé de six à douze mois en deux prises.

(Un comprimé = 2 centigrammes et demi de phényl-éthyl malonylurée.

Petit modèle : 10 francs.

Modèle moyen : 24 francs.

Laboratoire DEHAUSSY

66, rue Nationale

LILLE.

SÉDOPAVÉRINE

Sédatif Nerveux et Cardiaque.

Forme. — Comprimés.

Composition. — Chlorhydrate de Papavérine, 0,01; Phényléthylmalonylurée, 0,02; Bromhydrate de Quinine, 0,05.

Indications. — Troubles nerveux cardiaques, Tachycardie, Arythmie extra-systolique, Spasmes vasculaires, Hypertension paroxystique, Angines de poitrine et Algies cardiaques, Asthme essentiel, Toux spasmodiques et Spasmes de la glotte, Spasmes digestifs (gastriques et intestinaux), Coliques hépatiques et vésiculaires, Insomnie et Anxiété des vagotoniques, Mal de mer.

Posologie :

Adultes : 3 comprimés par jour avant les repas.

Enfants, au-dessus de 0 ans : 1 à 2 comprimés par jour.

Prix de vente au public : 16 francs.

Laboratoire PHILIPPE

122, Faubourg Saint-Honoré — PARIS.

SEDORHINOL

Médication décongestive et antiseptique des voies respiratoires supérieures.

Pommade nasale, Inhalation, Bains de gorge.

Indications. — Coryzas, rhinites, sinusites, adénoïdites, angines et amygdalites, laryngites, rhino-bronchites, otites.

Trois formes. — A) *Sedorhinol mixte*, comprend dans une même boîte :

1° Un tube de pommade nasale (canule) baume semi-liquide : adrénaline huileuse, stovaine benzoate de soude, essences aromatiques.

2° Comprimés inhalants : association d'essences de plusieurs espèces aromatiques (thym, romarin, lavande, menthe), bicarbonate et perborate de soude.

Ces comprimés solubles entièrement et progressivement en 4/5 minutes dans de l'eau à 75° permettent une inhalation et un bain de gorge, à la demande.

B) *Pommade de Sedorhinol* : seul baume nasal pour antiseptie et décongestion des fosses nasales, pré et post-opératoire.

C) *Comprimés de Sedorhinol* : Séparément employés pour inhalations, bains de gorge et de bouche (toutes affections de la muqueuse buccopharyngée).

Prix :

Comprimés : 15 francs. — Pommades : 9 francs. — Total : 18 francs.

Laboratoires A. REGAGNON et Cie

276, rue Lecourbe — PARIS (XV°).

Tél. : Vaugirard 26-30.

SÉDORMID « ROCHE »

Allylisopropylacétylcarbamide.

(Chaque comprimé est dosé à 0 gr. 25)

Propriétés :

Sédatif hypnogène doux et inoffensif,
très maniable ; ne s'accumule pas.

Indications :

Toutes les Insomnies légères de quelque
nature qu'elles soient ; Anxiété, Mé-
lancolie, Symptômes hypernerveux,
etc.

Doses et mode d'emploi :

Dose sédatif : 2 à 3 comprimés dans
la journée.

Dose hypnogène : 1 à 2 comprimés
au coucher.

Boîte de 20 comprimés.

Enregistré au Laboratoire national de contrôle des
médicaments sous le n° 504-32.

Produits

F. HOFFMANN-LA ROCHE et C^{ie}

10, rue Crillon

PARIS (IV^e).

SEDOSALYL

Granulé à base de Salicylate double de Sodium et d'Amidopyrine

Composition. — Chaque cuillerée à café contient :

| | |
|--|------|
| Salicylate double de Sodium et d'Amidopyrine | 0,50 |
| Phenylcinchoninate de Sodium | 0,15 |
| Benzoate de Lithine..... | 0,10 |
| Bicarbonate de Soude | 0,25 |
| Excipient aromatisé, q. s. | |

Granulé dans lequel le goût désagréable des salicylates est parfaitement dissimulé grâce à un excipient approprié. Aucune action sur la muqueuse stomacale par suite de la présence d'un alcalin, le bicarbonate de soude.

Indications. — Rhumatisme aigu ou chronique, Arthralgies, Névralgies, Douleurs articulaires, Diathèse urique, Infections hépatiques, Angiocholites, Goitre exophtalmique.

Doses et mode d'emploi. — *Adultes* : 2 à 4 cuillerées à café par jour dans les états chroniques ; jusqu'à 8 cuillerées dans les crises aiguës.

Enfants : 2 à 4 cuillerées à café par jour.

Nota. — Chaque cuillerée doit être délayée dans un demi-verre d'eau ou mieux dans une tasse d'infusion de frêne.

Prix au public : 16 francs.

Laboratoires TAVERNIER

32, rue de l'Ouest — PARIS.

SÉDOSINE

Solution.

**Sédatif du système neuro-végétatif.
Association végétale hyperactive.**

Dans la SÉDOSINE, l'action antispasmodique bien connue de la Jusquiame, employée à doses minimales, se trouve considérablement augmentée par la présence de la Passiflore et du Crataegus.

« Malgré sa pauvreté en éléments actifs, la Passiflore semble bien exalter l'action antispasmodique de la Jusquiame » (Henri Leclerc).

La SÉDOSINE, basée sur ces principes, agit à l'encontre des hypnotiques, par un processus de détente sans provoquer l'intoxication de la cellule nerveuse. Sa composition végétale en fait néanmoins un antispasmodique réellement actif.

Indications. — Etats spasmodiques. Excitation nerveuse. Insomnie. Neurasthénie. Psychasthénie. Mélancolie.

Posologie

Contre l'insomnie : 2 à 3 cuillerées à café prises en une seule fois avant de se coucher.

Sédatif nerveux : Dose moyenne : 1 à 3 cuillerées à café ou davantage dans le courant de la journée, suivant tolérance du malade.

La SÉDOSINE se prend en nature ou mieux dans un peu de tisane.

Prix : 16 francs.

Laboratoires LICARDY

38, boulevard Bourdon — NEUILLY-PARIS

Tél. : Maillot 17-75.

SÉDOTYOL

Pommade antiprurigineuse et anesthésique.

Pommade non toxique, absolument inoffensive, ne contenant aucun produit du genre de la cocaïne, ni des tableaux A. et B.

Indications. — Toutes les lésions épidermiques, prurigineuses ou douloureuses : prurits, urticaire, piqûres d'insectes, brûlures, éruptions, etc.

Action. — Le SÉDOTYOL calme instantanément le prurit et la douleur.

Mode d'emploi. — En larges applications loco dolenti.

Présentation :

Le tube : 12 francs.

Le 1/2 tube : 7 francs.

Laboratoires du Docteur DEBAT

60, rue de Monceau — PARIS. (VIII^e)

SEIGNET'FRUITS

Composition. — Limonade aux sels de fruits, Extraits végétaux et Eau diurétique. Goût réputé. Purge sans nausées ni coliques.

Propriétés thérapeutiques. — Purgatif et laxatif.

Indications. — Désinfection de l'estomac, du foie, de l'intestin.

Mode d'emploi :

Adultes : Purgatif. Un flacon pris le matin à jeun en une ou deux fois, à 10 minutes d'intervalle.

Enfants : 1/4 à 1/2 flacon, suivant l'âge.

Laxatif : Un verre à bordeaux au réveil ou au coucher un jour sur deux.

Prix : 6 fr. 75

Laboratoire de la SEIGNET'FRUITS

route du Moulleau — ARCACHON.

SELAMON

Composition et présentation. — Chlorure d'ammonium pur en comprimés à 50 centigrammes.

Dose et mode d'emploi. — 3 à 6 comprimés par jour au milieu des repas.

S'emploie avec succès dans tous les cas où il y a intérêt à modifier l'équilibre acide-base dans le sens de l'acidité. Médication prophylactique très active de la lithiase rénale.

Prix : 15 francs.

Etablissements T. LECLERC

Dr P. Lemeland, pharmacien.

10, rue Vignon — PARIS (IX^e).

SEL DE HUNT

Alcalin type.

Régulateur normal de l'Acidité gastrique et des Fonctions digestives.

Indications. — Dyspepsies, Gastralgies, Hyperchlorhydrie, Hyperacidité, Fermentations acides de l'Hyper et de l'Hypo-Chlorhydrie.

Forme. — Granulé friable.

Posologie. — Une à une cuillerée et demie à café dans 1/2 ou 1/4 de verre d'eau. Pour les légers malaises ne nécessitant que de petites doses, on peut à la rigueur prendre le *Sel de Hunt* à sec.

Prix au public : 9 fr. 50 le flacon.

Laboratoire ALPHONSE BRUNOT

16, rue de Boulainvilliers — PARIS.

Téléphone : Auteuil 20-21.

SEL D'EWALD

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle
des Médicaments.

Médication alcaline, sédative des douleurs d'estomac.
Le Sel d'Ewald se présente sous la forme d'un granulé assimilable, de saveur agréable, constitué par un mélange de : Citrate de soude, Kaolin, Carbonate de Bismuth, Carbonates de Chaux et Magnésie.

Le Sel d'Ewald trouve son application dans le traitement des : Gastralgies, Dyspepsies douloureuses, Hyperchlorhydrie, Fermentations acides, Ulcères de l'Estomac, Spasmes, Pyrosis, Vomissements de la grossesse.

Mode d'emploi. — Une cuillerée à café de granulé délayé dans 1/4 de verre d'eau ou de lait après les repas ou bien au moment des crises.

Le Sel d'Ewald ne contenant aucun toxique est absolument inoffensif et il ne constipe pas.

Prix : 10 francs.

BRACQUEMOND et Cie,
Docteurs en Pharmacie

105, rue de Normandie — COURBEVOIE (Seine)

SEL DIGESTIF BÉ ME CÉ

Forme. — Poudre.

Composition. — Bicarbonate de soude
Magnésie, Carbonate de chaux léger, Lactose.

Indications. — Hyperacidose gastrique
aiguë, Vomissements incoercibles.

Doses. — Une cuiller à café après chaque
repas.

Prix : 7 fr. 50.

Laboratoires Gastro-Entérologiques
ODINOT

21, rue Violet — PARIS (XV^e).
Tél. : Ségur 69-13.

SELENIOL

Description. — Complexe colloïdal électrique à base de sélénium en ampoules de 3 cmc. (4 par boîte).

Action thérapeutique. — Le Sélénol est une solution limpide de couleur brune; sous cette forme il n'est pas toxique et possède une affinité notable pour les cellules néoplasiques dont il provoque la liquéfaction, il améliore les troubles fonctionnels et relève l'état général.

Indications. — 1 à 3 ampoules par semaine en injections intramusculaires profondes ou intraveineuses, dans le traitement des affections cancéreuses, soit seul, soit associé à la Cytuline Couturieux.

Prix : 36 francs.

Laboratoires Ch. COUTURIEUX
18, avenue Hoche — PARIS.

SEL HÉPATIQUE U. N. ARQUEVAUX

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des médicaments sous le n° 439-2, en vue de la possibilité de prescription aux Assurés Sociaux.

Composition. — Complexe alcalin hypersolvant de l'acide urique.

Composition Centésimale :

| | |
|-----------------------------|---------|
| Carbonate de Lithine | 0 5286 |
| Sulfate de Potasse. | 2.6431 |
| Chlorure de Sodium | 2.0264 |
| Sulfate de Sodium..... | 24.2290 |
| Citrate de Sodium | 11.0132 |
| Bicarbonate de Sodium | 48.5462 |
| Sel de Selgnette | 11.0132 |

Forme. — Poudre blanche entièrement soluble.

Propriétés thérapeutiques. — Insuffisance hépatique. Lixiviation de l'organisme par osmose isotonique ; action désincrustante décuplée analogue à celle des stations thermales de Carlsbad, Contrexéville, Bagnoles. Dissolvant de l'acide urique, éliminateur de toxines. Laxatif. Stimulant des fonctions de l'estomac, du pancréas, du foie, des reins et de l'intestin. Régulateur du métabolisme physiologique.

Indications. — Arthritisme, Traitement des troubles dus à l'acide urique (Rhumatisme, Goutte, Gravelle, Névralgies, Lumbago, Sciatique, etc.), de l'Artério-Sclérose, des Phlébites et troubles trophiques, de la Constipation. Anti-acide. Antirhumatismal. Lithiases hépatique et rénale.

Posologie. — Une cuillerée à café rase (5 grammes) dans 200 grammes d'eau, de préférence très chaude à prendre le matin à jeun 25 jours de suite.

Le flacon : 15 fr. (pour 25 jours de traitement).
Sans impôt.

Laboratoires L. ARQUEVAUX 
Pharmacien à ETAMPES (S.-et-O.).

SELOR

**Complexe auro-médicamenteux assimilable
par voie buccale (cachets).**

SELOR N° 1.

Composition. — chlorure d'or, codéine, extrait d'aconit, poudre de belladone, terpine, composé solide contenant du bromoforme, acide acétyl-amino-oxyphénylarsinique, ergostérine irradiée, extrait de quinquina, pepsine amylacée, sels de chaux.

Propriétés et Indications. — Actif, facilement maniable, ne causant pas d'accidents.

Par sa quadruple action :

1° Spécifique ; 2° Reconstituant ; 3° Calmant de la toux ; 4° Eupeptique ;

est indispensable au traitement de toutes les maladies pulmonaires, aiguës ou chroniques, tuberculeuses ou non.

Mode d'emploi. — 3 cachets par jour ou suivant indication médicale.

Prix : 30 francs.

SELOR N° 2.

Composition. — Est celle du SELOR N° 1, mais sans calmant de la toux.

Indications. — Outre le traitement des affections pulmonaires ne nécessitant pas l'emploi de calmant de la toux, les SELOR N° 2 sont employés efficacement dans le traitement des RHUMATISMES CHRONIQUES.

Mode d'emploi. — 3 cachets par jour ou suivant indication médicale.

Prix : 28 francs.

Laboratoires des Produits L. CHAUVIN

3, rue de Vouillé — PARIS (XV°).

Tél. : Vaugirard 21-10.

SELS DE LITHINE EFFERVESCENTS

Le Perdriel.

Nature. — Sels de Lithine.

Action. — Les sels de Lithine, en opérant sur le foie, tarissent à la source même la production de l'acide urique en modifiant la nutrition troublée.

Indications. — *Carbonate*, rhumatisme, goutte, *Benzoate*, coliques néphrétiques, gravelle, coliques hépatiques, albuminurie, diabète. *Salicylate*, rhumatisme articulaire, rhumatisme chronique. *Glycérophosphate*, diathèse arthritique goutteuse, accompagnée de neurasthénie, possède en même temps les propriétés reconstituantes de l'acide glycérophosphorique. *Bromhydrate*, sédatif par le brome. Par la lithine dissout l'acide urique et les urates alcalins. *Citrate*, diathèse rhumatismale.

Posologie et mode d'emploi. — Chaque flacon de sels de Lithine est surmonté d'un bouchon-mesure qui contient 20 centigrammes de principe actif. Faire prendre dans de l'eau sucrée ou non, ou dans de la bière ou du lait.

Prix : 16 francs.

Laboratoires LE PERDRIEL
11, rue Milton — PARIS (IX^e).

SELS INTAR

Forme. — Granulé effervescent.

Composition. — Chlorure de Mg, Sulfate de Mg, Sulfate, phosphate, bicarbonate de Na, etc...

Propriétés thérapeutiques. — Stimulant des grandes fonctions organiques : Nutrition, Digestion, Sécrétion, etc.

Indications. — Rhumatismes, Obésité, Paresse intestinale.

Arthritisme et ses conséquences.

Asthénie, Dermatoses (eczéma, urticaire).

Mode d'emploi. — 1 à 2 cuillerée à café dans 1/2 verre d'eau le matin à jeun ou le soir au coucher.

Cette dose peut être augmentée suivant les indications du médecin.

Laboratoire FAURE

83, boulevard de la Villette — PARIS.

Echantillons sur demande :

Société d'Expansion thérapeutique

46, faubourg du Temple — PARIS.

SELS-MAGS

Composition. — Sulfate sec de magnésie, sulfate sec de soude, citrate monosodique, sel halogène du magnésium, phosphate de soude, etc.

Propriétés. — Favorise la sécrétion et l'excrétion de la bile, réalise le drainage des voies biliaires.

Indications. — Toutes congestions du foie et de la vésicule biliaire, jaunisse, cholécystite, angiocholécystite, dyspepsies, aérophagies, constipation, migraines, hypocondrie, vertiges, prurits, urticaire, langue sale, etc.

Posologie et mode d'emploi. — 2 comprimés le matin dans un verre d'eau chaude ou dans 1/2 verre d'eau avant le repas de midi. La dose peut être augmentée ou diminuée suivant les prédispositions individuelles.

Aucune contre-indication.

Présentation et prix. — Une boîte comprimés effervescents : 18 francs.

inscrit aux Assurances Sociales

G. LESOURD, Pharmacien

88, rue Duhesme — PARIS (XVIII^e).

SELUNIC

Sel de fruits. Sel de santé.

Composition. — Sels de soude, formant, à l'addition d'eau, un citro-tartrate de soude. Une cuillerée à café dans un verre d'eau représente environ 5 grammes de citro-tartrate de soude.

Forme. — Poudre blanche granulée très fine, sans aucun goût ni parfum et ne contenant aucun sel minéral.

Propriétés. — Régulateur simple et efficace de la Santé, son effet repose sur les propriétés bienfaisantes des fruits frais.

Indications et mode d'emploi. — **Maladies du foie et des intestins.** Une cuillerée à café dans un verre d'eau à jeun.

N. B. — Plus l'eau sera chaude, plus l'action sera rapide.

Estomac, impuretés du sang, maux de tête. — Une cuillerée à café dans un verre d'eau une demi-heure après les repas.

État bilieux, indigestion, excès de table. — Une cuillerée à dessert dans un verre d'eau en se couchant, renouvelée le matin au réveil.

Désaltérant et rafraîchissant. — Contre la soif, état fiévreux, etc... Presser une tranche de citron dans un verre d'eau et y faire couler une cuillerée à café. Boire par gorgées.

Des doses proportionnées en feront pour les enfants un moyen agréable de remédier à leurs petits maux.

Obésité. — Une cuillerée à café dans de l'eau tiède, matin et soir, combat l'embonpoint et aide à conserver au corps sa souplesse naturelle.

Comme breuvage. — Dans l'eau : en fait une boisson hygiénique et désaltérante.

Dans le vin et le cidre : une pincée combat l'excès d'acidité, et produit une boisson de table pétillante.

Présentation. — En flacons de 200 grammes : 20 fr.
Le modèle « Week-End » de 40 grammes : 6 fr.

SELUNIC, grâce à son Citrate de Soude, liquéfie le Sang.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des médicaments sous le N° 333-1.

Préparé par : Georges MIQUEL

Pharmacien de 1^{re} classe, 3, avenue Lowendal — PARIS.

SÉNEÇOL

Comprimés antidouleur.

Règles douloureuses, Névralgies, Migraines, Grippe, Rhumatismes, Sciatique et toutes douleurs.

Présentation. — Etui aluminium contenant 40 comprimés dragéifiés.

Mode d'emploi. — 4 ou 6 comprimés par jour, loin des repas, et de préférence dans une infusion chaude.

Pour les règles douloureuses, commencer le traitement dès l'apparition des premières douleurs.

Formule :

| | |
|--|-------|
| Chlorhydrate d'éthylmorphine..... | 0,001 |
| Caféine | 0,025 |
| Extrait mou de Séneçon stabilisé..... | 0,05 |
| (Travaux des D ^{rs} Murrel, Bardet, Leclerc, etc...). | |
| Pyramidon | 0,10 |
| Phénacétine..... | 0,15 |

Prix : 14 francs.

Préparé par les Etablissements GOY
23, rue Beautreillis — PARIS (IV^e).

SÉOTRAL LEISYN

Eliminateur immédiat de l'Acide Urique, des Urates et des Oxalates.

Formuler : 1 flacon **Seotral Leisyn**.

Présentation : Flacon contenant environ 6 cuillerées à café et 6 paquets pour préparer la tisane dans laquelle doit être pris le Séotral Leisyn.

Mode d'emploi : à jeun, 1 cuillerée à café toutes les deux ou trois heures dans la tisane préparée avec les paquets qui se trouvent joints au flacon, le malade étant au lit et chaudement couvert. Provoque salivation et sueurs abondantes. Le malade doit uriner et aller à la selle avant de prendre le médicament.

Indications : Crises de goutte ou de rhumatismes à l'état aigu, c'est-à-dire datant de six jours au plus.

Action : Brusque saignée urique et oxalique par la salive, la transpiration et les urines.

Pratiquement non toxique et sans action sur le cœur, cette préparation permet le plus souvent de juguler une crise de goutte ou de rhumatismes aigus en trois à six heures, avec trois ou 4 cuillerées à café du médicament.

Prévenir le malade qu'il salivera et transpirera abondamment.

Composition : Méthyle, Cupréine, Muguet, Oignon marin, faible quantité de Colchique électrolysée EVOO, donc non toxique (toxicité réduite de 90 pour 100 et accroissement considérable de son action thérapeutique), Maïs.

Aucune contre-indication. Innocuité absolue.

Echantillonnage : Le prix de revient très élevé de ce médicament ne permet pas l'échantillonnage.

Les Laboratoires LEISYN, 1 bis, rue Molitor — PARIS (16^e).

Téléphones : Auteuil 14-73 — C. C. Postaux PARIS 1075-98.

Adresse télégraphique : Laboleisyn — PARIS.

SÉPHYDINE

Composition. — La Séphydine est une solution, dans le sérum physiologique, de chlorure de zinc réagissant en milieu acide sur la formaldéhyde. Médicament non irritant jouissant de propriétés particulières vis-à-vis de la peau et des muqueuses.

Propriétés thérapeutiques. — Action antiseptique et stérilisante sur la peau et les muqueuses, action microbicide puissante sans aucune irritation. Action conservatrice de l'intégrité de la cellule épidermique par saturation des liquides humoraux et par excitation des phénomènes biologiques de défense contre l'infection. En raison de ses propriétés excitantes sur la phagocytose, la Séphydine constitue un excellent réparateur des lésions cutanées et des muqueuses, action désodorisante très grande.

Indications :

Dermatologie : Folliculites, furoncles, anthrax, panaris, phlegmons, acnés, érysipèles, ulcères variqueux et cancéreux, alopecie, pelade, sueurs fétides.

Obstétrique : Infections puerpérales.

Gynécologie : Vulvites, vaginites, métrites, cancer utérin.

Vénérologie : Blennorrhagie, chancre mou, balanite.

Stomatologie : Gingivite chronique, granulations de la bouche, angines, fétidité de l'haleine.

Oto-Rhino-Laryngologie : Otite, coryza (guérison très rapide de cette affection), laryngite, ozène, sinusites.

Posologie :

Dilution pour injections, lavages locaux, lavage du nez, lavage de l'urètre : 1 cuillerée à café par litre d'eau.

Dilution pour gargarismes, lavage des oreilles : 2 cuillerées à café par litre.

Dilution pour pansements (chancre mou) : 4 cuillerées à café par litre.

Dilution pour ulcères variqueux, anthrax, panaris, désodorisation des pieds et des aisselles : 5 cuillerées à café par litre.

Dilution pour frictions du cuir chevelu : 1 cuillerée à café de Séphydine pour 5 d'eau.

Dilution par attouchements pour piqûres d'insectes, (moustiques, guêpes, etc.) : 1 cuillerée à café de Séphydine pour 3 d'eau.

Prix : le flacon de 125 gr., 12 fr.

Laboratoire Séphyda.
CERBÈRE, pharmacien
CHABEUIL (Drôme).

SEPTICÉMINE CORTIAL

Composition. — Di-formine iodobenzo-méthylée, cristallisée, dialysable, injectable, atoxique, *indolore*. Aucune réaction locale ou générale.

Propriétés. — Antisepsie intégrale, interne et externe, diffusion extrême jusque dans le liquide céphalo-rachidien (Maloëns). Chute de la température, régulière, complète, définitive. Microbicide et antitoxinique; éliminateur hépatique et rénal.

Indications. — **Infections aiguës médicales :** Grippe, encéphalite, broncho-pneumonie, fièvre typhoïde et paratyphoïde, Entérites aiguës, Fièvres éruptives, Paludisme, Affections rhino-pharyngées.

Infections Chirurgicales : Septicémies, pyohémies, infections puerpérales. Pyélonéphrites, Appendicite, Erysipèle, Anthrax, Ostéomyélites, Péritonite tuberculeuse.

Forme. — Ampoules de 4 cc. et 10 cc.

Doses. — Septicémies à marche rapide : 10, 20 cc. et plus dans les 24 h. Septicémies à marche lente : 4 à 10 cc. dans les 24 h.

S'emploie aussi en applications locales et pulvérisations. Pure ou étendue de sérum. Urologie, Gynécologie, Suppurations, Tumeurs ouvertes. Ulcérations de l'amygdale, Rhinites.

Stomatologie : pulvérisations alvéolaires et gingivales. injections intra-gingivales, circonscrivant le foyer infectieux.

Prix :

La boîte de 8 ampoules de 4 cc. : 23 francs;
de 10 cc. : 40 francs;

la boîte de 4 ampoules de 10 cc. : la boîte
21 francs.

Laboratoires CORTIAL

7, rue de l'Armorique — PARIS

SEPTOLAN

(Phénosalyl Laffort liquide.)

Composition. — Phénol neige, Salicylate de soude, Acide benzoïque, Menthol, Thymol et Eucalyptol.

Indications et posologie. — *Angines, Laryngites, Stomatites* : en gargarismes fréquents, 1/2 cuillerée à café dans un verre d'eau bouillie très chaude.

Grippe, Bronchite, Toux : en inhalations 3 à 4 fois par jour (1 cuillerée à dessert dans un grand bol d'eau bouillante).

Plaies de toute nature : en lavages matin et soir (1 cuillerée à soupe par litre d'eau bouillie).

Extractions dentaires : en bains de bouche, 1/2 cuillerée à café dans un verre d'eau bouillie tiède.

Maladies des femmes. Toilettte intime : en injections matin et soir, avec 1 cuillerée à soupe pour 2 litres d'eau bouillie chaude.

Dentifrice journalier préventif des maladies infectieuses : X gouttes dans un demi-verre d'eau chaude.

Autorisé par les Assurances sociales.

Prix : 13 francs.

Laboratoires LAFFORT, Pharmacien

Licencié ès Sciences, Ingénieur E. C. B.

JOUE-LES-TOURS (I.-et-L.).

SÉRÉLBÉ

Sérum anti-gonococcolque

du Dr BLAIZOT

Ce sérum est le seul agent abortif sûr de la Blennorrhagie et le remède le plus spécifiquement actif à lui opposer. Il est produit sur Bovidés et préparé par immunisation intensive des animaux producteurs.

S'emploie en :

Injectons urétrales (avec un dispositif pour maintenir le sérum en place.)

Instillations oculaires adopté par l'hospice des Quinze-Vingts.

Pansements vaginaux. Injections Intra-vésicales.

Applications locales entièrement indolores et ne provoquant aucune réaction locale ni générale.

Boîtes de 3 ampoules de 10 cc. Coffrets médicaux de 25 ampoules.

La boîte de 3 ampoules. Prix : 20 francs.

Produits bactériologiques L. B. L.

18, rue Daguerre — PARIS (XIV^e).

Tél. : Ségur 61-47.

SERIFER LAURENÇON

Traitement des déficiences sanguines par le fer vitalisé rendu assimilable après absorption par des Levures vivantes.

Composition. — Ions fer et manganèse, Sérum de cheval, Hormones antianémiques de foie frais, Arsenic organique.

Indications. — Toutes déficiences sanguines, Anémies diverses, Chlorose, Lymphatisme, Etats hémorragiques, Suite d'Opérations, Paludisme.

Forme. — Délicieux granulé chocolaté.

Posologie :

Adultes : 2 ou 3 cuillerées à café par jour avant les repas.

Enfants : Demi-doses.

Prix : 18 francs.

Produits J. LAURENÇON

Pharmacien, Professeur de Chimie
et de Pharmacologie à Lyon.

Laboratoire d'Actino-Biologie

VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (Rhône).

SÉROBIOL

Forme. — Ampoules buvables de 5 cc.

Formule. — Extraits de foie, rate, Acide phosphorique, Nucléinate de manganèse, Phosphate acide de sodium, Vitamine B tirée des levures, Sérum de cheval, Sérum de mouton.

Indications. — Carence, déficiences organiques, anémies, prétuberculose, convalescences.

Posologie :

Adultes : 1 ampoule matin et soir aux repas dans un peu de liquide.

Enfants : 1 ampoule par jour.

Prix : 20 francs.

Laboratoires HOCQUETTE

191, rue du Faubourg-Saint-Antoine
PARIS

SÉRO-COMPRIMÉS

A base de sérums polyvalents antidiphtérique, streptococcique, pneumococcique, de l'Institut MERIEUX LYON.

Indications. — Traitement préventif et curatif local des angines courantes et des diverses affections de la gorge, pharyngites, rhino-pharyngites, coryzas tenaces, porteurs de germes.

Présentation. — En flacons de 40 comprimés.

Mode d'emploi. — 1 à 2 comprimés toutes les 2 heures.

SÉROLACTYL I. M.

A base de sérums polyvalents antidiphtérique, streptococcique, pneumococcique de l'Institut MERIEUX LYON, associés au lactose.

Indications. — Préventif et curatif des diverses affections microbiennes du rhino-pharynx : sinusites, rhinites, rhino-pharyngites, amygdalites, et toutes affections du carrefour laryngo-pharyngo trachéal.

Présentation. — En flacons de 8 gr. environ et en pulvérisateur.

Mode d'emploi. — 3 à 4 pulvérisations par jour.

SÉRO-COLLUTOIRE I. M.

A base de sérums polyvalents antidiphtérique, streptococcique, pneumococcique de l'Institut MERIEUX LYON, en milieu glyciné neutre.

Indications. — Prévention et traitement curatif local des affections microbiennes oto-rhino-pharyngées, coryzas, sinusites, rhinites, rhino-pharyngites, otites, amygdalites, végétations adénoïdes.

Présentation. — En flacon de 30 gr. environ.

Mode d'emploi. — 3 à 4 instillations par jour.

N. B. — Ces trois produits ne doivent pas être employés pour traiter la diphtérie en période d'état, mais seulement pour la prévention et la convalescence diphtérique.

Laboratoires des Produits biologiques I. M.

28, rue de la Quarantaine — LYON.

S. SAVIGNEUX, Pharmacien.

SERODAUSSÉ ANTITOXISENYL

(Sérum activé de taureau.)

Ce sérum contient les hormones circulantes des jeunes animaux mâles et les anticorps des poisons séniles.

Le médicament est indiqué contre l'asthénie des personnes âgées ; il améliore leur capacité de travail physique et intellectuel et produit une orientation de leur caractère vers l'optimisme.

Il s'administre tous les mois, pendant six jours consécutifs, à la dose quotidienne d'une ampoule dans un demi-verre d'eau, sucrée ou non, 30 minutes avant le petit déjeuner. Chez certains sujets, une dose de 3 ampoules, prises à raison d'une ampoule tous les deux jours, est suffisante.

Prix : la boîte de 3 ampoules : 30 francs.

SERODAUSSÉ OVARIEN

(Sérum activé de génisse.)

Ce sérum contient, comme le précédent, les hormones circulantes des jeunes animaux femelles et les anticorps des poisons de Carrel.

Il est indiqué contre l'asthénie des femmes âgées et contre les troubles de la ménopause physiologique, chirurgicale ou radiologique. Chez les femmes en état de déficit ovarien, il fait disparaître les bouffées de chaleur, les vertiges et les sueurs.

Même posologie, même mode d'emploi que le Séro-dausse Antitoxisenyl.

Prix : la boîte de 3 ampoules : 30 francs.

SERODAUSSÉ INFANTILE

(Sérum de jeune bovidé en croissance.)

Ce sérum contient les facteurs internes de la croissance. Il produit une augmentation de la taille et du poids chez les enfants dont le développement est retardé.

Il s'administre tous les mois, pendant 5 à 10 jours consécutifs, à la dose quotidienne d'une ampoule le matin à jeun, 30 minutes avant la première prise d'aliments, dans un quart de verre d'eau sucrée.

Prix : la boîte de 5 ampoules : 25 francs.

Laboratoires DAUSSE

4, rue Aubriot — PARIS (IV^e).

SÉROGYNE

Sérum de gestation recueilli sur génisses.

L'état de gestation stimule l'activité endocrinienne et accroît le taux des hormones en circulation. Le SÉROGYNE est particulièrement riche en folliculine, hypophysine, thyroxine, hormones placentaires. Recueilli sur de jeunes animaux, il possède en outre les propriétés stimulantes des sérums juvéniles.

Action physiologique :

Régularise les fonctions génitales féminines, stimule l'appareil génital mâle, stimule les glandes endocrines, relève la nutrition, revitalise.

Indications :

Aménorrhée, Dysménorrhée, Stérilité féminine, Troubles cataméniaux, Ménopause, Castration chirurgicale, Vomissements incoercibles de la grossesse.

Frigidité masculine, Impuissance, Neurasthénie génitale, Asthénie, Cinquantaine. Croissance déficiente, Aménorrhée des jeunes filles, Infantilisme génital dans les deux sexes.

Tous les états de maigreur et de dénutrition, Anémies.

Artério-sclérose, Vieillesse, Fléchissement vital.

Formes et doses :

Sirop : Une cuillerée à soupe par jour. Cure mensuelle de 6 jours (cure moyenne) ou de 12 jours (cure intensive).

Ampoules (buvables) : 1 ampoule buvable par jour. Temps de cure comme avec le sirop.

Sirop Prix : 20 francs. — *amp.* 30 francs.

Produits bactériologiques L.B.L.

18, rue Daguerre — PARIS (XIV^e).

Tél. : Ségur 61-47.

SÉROMA REY

Sérum **granulé**, activé, normal.

Composition :

100 gr. de Séroma contiennent :

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Sérum normal d'équidés..... | 90 gr. 90 |
| Calcium | 0 gr. 05 |
| Fer | 0 gr. 30 |
| Manganèse | 0 gr. 15 |

Préparation. — Sérum normal de sang d'équidés, scientifiquement traité, stérilisé sans coagulation, rendu atoxique, stabilisé par dessiccation et activé par des co-ferments minéraux.

Indications. — Surmenage, Fatigue cérébrale, Chocs moraux, Dépression, Hémorragies, Hémophilies, Hémoptysies. Dans les Affections chroniques, quelle que soit leur nature (tuberculose, cancer, paludisme, etc.), adjoint à la thérapeutique appropriée, il permet à l'organisme de résister, ainsi que dans toutes les maladies infectieuses.

Doses moyennes :

Adultes : 1 cuillerée à café de granulé deux fois par jour, un quart d'heure avant les repas.

Enfants : demi-doses.

Prix : 16 fr. 80 le flacon
(pour une dizaine de jours de traitement).

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des médicaments sous le n° 302-3.

Laboratoires REY

(Ludin) — DIJON.

Séroma contient près de son poids
de sérum activé.

SÉROSTHENYL BOUTY

Composition. — Heureuse association des agents principaux de la stimulation nerveuse et de la régénération organique : Méthylarsinate de Strychnine et glycérophosphate de soude avec un dosage de : Ampoules 1 cc. : 1 ampoule renferme 0 gr. 001 de méthylarsinate de strychnine et 0 gr. 10 de glycérophosphate de soude.

Solution — La solution à prendre par gouttes est dosée pour 20 gouttes comme une ampoule de 1 cc.

Action thérapeutique. — Tonique analeptique de fond qui permet simultanément de :

Rétablir l'équilibre du système nerveux, reconstituer l'état général, stimuler en même temps la nutrition, les combustions internes et le tonus général.

Formes. — Ampoules de 1 cc. et gouttes.

Indications. — Convalescence, surmenage, anémie, fatigues nerveuses, asthénie et neurasthénie.

Posologie. — Ampoules : une par 24 heures.

Gouttes : de 10 à 20 gouttes avant chaque repas dans un peu d'eau sucrée.

C'est une des préparations où la strychnine est la plus assimilable, car, même les sujets très sensibles à ces préparations assimilent le **Serosthenyl** sans aucun des accidents connus.

De plus, sous forme de gouttes, la posologie peut en être très souple et très progressive puisqu'on peut commencer par 2 à 5 gouttes avant chaque repas.

Prix au public : Ampoules ou gouttes : 18 francs,

Laboratoires BOUTY

3, rue de Dunkerque. — PARIS (10^e).

SÉRUM ANTI-ASTHMATIQUE de HECKEL

Composition. — Le Sérum de Heckel a pour base un extrait organique pur des glandes surrénales, stabilisé dans un liquide isotonique.

Mode d'emploi. — Au moment de la crise, une injection sous-cutanée d'une demi-ampoule ou d'une ampoule.

Action. — L'excitation du pneumo-gastrique spasme les bronches et cause la crise d'asthme. Le sérum de Heckel, en excitant le grand sympathique, annihile l'action du pneumogastrique et le spasme cesse.

Indications. — Toutes les formes d'asthme, au moment des crises. Il est contre-indiqué chez la femme au terme de sa grossesse, chez les cardiaques, les hypertendus et chez les sujets présentant un foyer de gangrène pulmonaire.

Présentation. — Sérum de Heckel pour adultes. 12 ampoules de 5 centicubes.

Prix : 22 francs.

Sérum de Heckel infantile, 12 ampoules de 2 centicubes.

Prix : 16 francs.

Voir Cytophédrine page 571.

Laboratoires pharmaceutiques CORBIERE

27, rue Desrenaudes — PARIS. — Tél. : Carnot 78-11.

SÉRUM DE JOUSSET

Provient de chevaux longuement immunisés contre les toxines du bacille tuberculeux. Combat l'infection mais non les lésions. **Traitement de choix à la période initiale**, nuisible dans la tuberculose devenue phthisie. **Convient surtout aux enfants et adolescents**. Tuberculoses aiguës ou subaiguës, hémoptysies. **Si après une semaine d'observation** la courbe de température apparaît régulière et peu oscillante on devra aborder la sérothérapie. Température irrégulière, oscillations dépassant 2° est une contre-indication formelle.

Posologie. — Injection hypodermique face antérieure de la cuisse. Environ 3 cc. par kg. du poids du sujet en 3 injections à 2 jours d'intervalle (voir notice explicative, page 8). Ne pas oublier fortes doses salicylate si arthralgies le douzième jour.

Contre-Indications. — Asthmatiques, emphysémateux.

La boîte de 1 fl. de 20 cc. Prix : 35 francs.

— — 2 fl. de 20 cc. — 68 francs.

Demandez notice explicative :

Les Laboratoires BRUNEAU et C^{ie}

17, rue de Berri — PARIS (VIII^e).

SÉRUM NEUROPSYCHIQUE

Ampoules.

Propriétés thérapeutiques. — Préparation tonique et reconstituante injectable. Contre tous les cas d'anémie, dépression nerveuse, surmenage physique intellectuel, neurasthénie.

Forme. — Ampoules injectables.

Mode d'emploi. — 1 ampoule par jour.

Formule. — Glycérophosphates composés, cérébrine et moelle.

Prix : 20 francs.

Laboratoire HOCQUETTE

191, rue du Faubourg-St-Antoine — PARIS

Tél. : Diderot 04-71.

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

Composition :

Glycérophosphate de Soude : 0 gr. 10 ;
Cacodylate de Strychnine : 1/2 milligr. ;
pour un cc. d'eau distillée.

Indications :

Dynamogénique puissant. Active la phagocytose. S'emploie dans l'adynamie et l'asthénie

Formes :

- 1° En ampoules, boîte de 12 ampoules : 16 francs.
- 2° En gouttes, prix du flacon : 14 francs.

Laboratoires FRAISSE

8, rue Jasmin, 8 — PARIS.

SÉRUM OLIVIÉRO

Sérum normal de cheval, créé en 1906

Le *Sérum normal de cheval* possède de nombreuses propriétés qui en font un agent thérapeutique de tout premier ordre. Son action est des plus manifeste dans les *Anémies*, les *Asthénies*, les *Consumptions*, les *Hémorragies*.

Son action est héroïque et nettement spécifique dans le pansement des plaies à cicatrisation rebelle, dans les *brulures*. Il se délivre sous les formes les plus variées, pour les besoins de la médecine et de la chirurgie.

- 1° En **Ampoules buvables**. — De 10 cc., une par jour ; de 2 cc., 2 à 4 par jour.

Ces ampoules contiennent du sérum pur, sans addition d'antiseptique ou de conservateur quelconque.

Prix : 20 francs.

Laboratoire de Biothérapie OLIVIÉRO

BOULOGNE-SUR-SEINE (Paris-Ouest).

Tél. : Molitor 27-06.

SÉRUMS CLIN

Les Sérums thérapeutiques Clin, antimicrobiens et antitoxiques, sont purifiés par *électro-osmose*, procédé n'altérant en rien leur efficacité et leur conférant les avantages suivants : disparition ou diminution des accidents de choc et des accidents sériques, très grande stabilité et très longue conservation. S'emploient en injections sous-cutanées, intramusculaires ou intraveineuses, ou localement.

SÉRUM CLIN ANTICOLIBACILLAIRE

(Préparé d'après la méthode du Prof. H. VINCENT.)

Indications. — Toutes les infections à colibacilles ou à association colibacillaire : Colibacillose, pyélonéphrites, appendicite aiguë et ses complications, péritonites (avec le sérum antigangréneux), fièvre urinaire, infections digestives (voie buccale), suppurations locales, abcès, périostite.

Doses. — Variables suivant le degré d'infection (de 10 à 60 cc. par jour, pendant 4 à 5 jours).

Forme. — Boîte de 1 ampoule de 10 cc.

Ce sérum existe également sous forme *non purifiée*, pour l'administration par voie buccale.

SÉRUM CLIN ANTIDIPHTÉRIQUE

Sérum antitoxique et antimicrobien purifié. Sérum concentré en unités antitoxiques, mais d'une teneur normale en protéides. Hyperimmunsation des chevaux à l'aide de toxine diphtérique et de corps microbiens provenant de diphtéries graves et malignes récentes.

Formes. — Délivré en ampoules de 10 cc., sous deux concentrations :

1^o Ampoules de 10 cc. à 1.000 U. A. par cc., soit 10.000 U. A. par ampoule.

2^o Ampoules de 10 cc. à 500 U. A. par cc., soit 5.000 U. A. par ampoule.

3^o Ampoules de 2 cc. à 1.000 U. A. par ampoule, en boîte de 2 ampoules pour usage préventif.

Posologie. — Se référer à notices plus détaillées.

SÉRUM CLIN ANTIGANGRÉNEUX

(Préparé d'après la méthode de H. VINCENT et G. STODEL.)

Sérum antigangréneux multivalent.

Indications. — Gangrène gazeuse, phlegmons, abcès gazeux, traumatisme avec gros délabrement musculaire, fractures ouvertes, appendicites graves, péritonite, gangrène pulmonaire, diabétique, etc...

Doses. — Préventives : 10 à 20 cc. ; curatives : 20, 30, 40 cc.

SÉRUM CLIN ANTISTREPTOCOCCIQUE MULTIVALENT

(Préparé d'après la méthode du Prof. H. VINCENT.)

Sérum équin hyper-immunisé contre les diverses races sélectionnées de streptocoques variés et très virulents.

Indications. — Toutes les infections graves, locales ou générales et septicémies à streptocoques.

Doses. — Variables suivant la gravité de l'infection, de 20 à 100 cc. (par voie sous-cutanée, intramusculaire ou intraveineuse).

Agir vite, fort, suffisamment longtemps.

Forme. — Boîte de 1 ampoule de 10 cc.

Laboratoires CLIN. — COMAR et Cie.

20, rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS.

SÉRUM VÉGÉTAL CUGUILLÈRE

Composition. — À base d'essence d'ail rendues indolores par un procédé spécial ne présentant aucune toxicité sur l'organisme mais ayant par contre un pouvoir bactéricide très puissant contre le bacille de Koch. Le sérum Cuguillère renferme en outre de la *myrrhe*, balsamique très puissant, et des sels de chaux d'origine végétale à l'état colloïdal et de ce fait *entièrement assimilables*.

Références scientifiques. — Le sérum a été expérimenté au château de Savignac à Saint-Denis de Piles (Gironde) en 1903 sous le haut patronage de M. le Marquis de Castellane.

Les guérisons cliniques des bovidés traités furent constatées par l'éminent vétérinaire le regretté M. Fauré et c'est à l'hôpital Bichat à Paris que le célèbre anatomopathologiste le Dr H. Martin-Roux a reconnu les guérisons sur les pièces examinées à son Laboratoire.

L'Académie de Médecine recevait en séance publique du 10 mars 1908 le compte rendu complet des travaux effectués sur le sérum jusqu'à ce jour. Depuis, le sérum employé avec le plus grand succès dans le monde entier recueille chaque jour un nombre d'adeptes de plus en plus considérable.

Indications. — Le sérum végétal du Dr Cuguillère est le traitement de choix et quasi spécifique des tuberculoses osseuses et ganglionnaires. Il guérit en quelques injections des coxalgies, des maux de Pott remontant à plusieurs années même compliqués de mauvais état général et de fistulisations. Il donne également des résultats remarquables dans toutes les formes de tuberculoses.

Posologie. — Pendant le premier mois une injection de 5 cc. par semaine puis les mois suivants 2 injections de 5 cc. par semaine. Pratiquez en plus une injection locale de 2 cc. 1/2 en tissu sain au-dessus du foyer pathologique dans les formes ostéo-articulaires et ganglionnaires. Le traitement peut être prolongé plus longtemps sans aucun danger d'accumulation.

Le sérum existe également en ampoules de 2 cc. 1/3 pour la thérapeutique infantile et en sirop (forme adjuvante mais ne pouvant constituer le fond du traitement). Renseignements complets. Littérature. Echantillons :

Laboratoire du Dr CUGUILLÈRE
17, rue des Chalets — TOULOUSE

SETI

**Ampoules jumelées de Soufre et d'Iode
en milieu magnésien.**

Propriétés thérapeutiques. — Les ampoules jumelées SETI permettent d'injecter une solution aqueuse magnésienne de Soufre et d'Iode ; c'est l'application de la méthode de Sulfoïodothérapie préconisée par André LERI et DEDET pour lutter contre le Rhumatisme chronique et ses complications — pratique, efficace et sans danger.

Indications. — Rhumatismes chroniques. Arthrites. Névralgies rebelles.

Mode d'emploi. — Le médecin dans une seringue de 5 cc. aspirera 2 cc. de chacune des solutions puis ayant fait entrer un peu d'air il agitera le liquide jusqu'à décoloration. Il fera l'injection intra-musculaire profonde du liquide incolore obtenu en suivant très exactement la technique indiquée par A. LERI et DEDET.

Laboratoires BRISSON

Dr DEDET et Cie, Pharmaciens,
Anciens internes des Hôpitaux de Paris,
157, rue Championnet — PARIS (XVIII^e).

SETIRTEM COMPRIMÉS

Traitement des Métrites.

Forme. — Comprimés effervescents, solubles instantanément dans l'eau.

Formule. — Sulfate de cuivre, sulfate de zinc, alun de potasse pur, camphre, acide picrique, naphtolate de soude, trioxy-méthylène, excipient effervescent. Q. S. pour un comprimé.

Indications. — Pertes blanches, Vaginites, Métrites, Salpingites, Soins d'hygiène.

Posologie. — 2 comprimés pour une injection de 2 litres à 40°.

Enregistré au Laboratoire national de contrôle des Médicaments sous le n° 655-8.

Prix : 18 francs.

Laboratoire BOUTROY

8, rue de Passy — PARIS (XVI^e).

SFÉOL

(Huile grise argentique Sféat)

Tolérance, activité, dosage rigoureux.

Généralités. — L'association de l'argent et du mercure additionne leurs activités respectives et fait du Sféol, dans les syphilis viscérales et nerveuses, un agent curatif incomparablement supérieur à l'huile grise.

Dosage. — Le Sféol est dosé à 40 % d'Hg, et à 20 % d'Ag. Une division de la seringue à huile grise correspond à 0,01 d'Hg. (pour l'emploi des seringues ordinaires prescrire « Sféol à 16 % »).

Posologie. — Celle de l'huile grise, c'est-à-dire en moyenne 8 à 10 piqûres de 0,08 à 0,10 de Hg. (1 injection par semaine).

Prix :

Sféol à 40 %, le flacon 5 cc. : 20 fr.

Le double flacon : 32 fr.

Sféol à 16 %, le flacon 10 cc. : 20 fr.

Echantillons et littérature :

Laboratoires SFÉAT

15, rue Catulienne — SAINT-DENIS (Seine).

SILGUINE

Composition. — Chaque comprimé contient :

0,05 Extrait sec stabilisé de gui de pommier.

0,01 Extrait sec d'aubépine.

0,10 Poudre de prêle.

0,03 Extrait de glandes endocrines mâles.

Action. — La « SILGUINE », à base de produits végétaux particulièrement assimilables, abaisse la tension artérielle, augmente la diurèse, tonifie le cœur. Elle comble le déficit des sécrétions endocrines particulièrement important au moment de la ménopause. Elle sature l'organisme de silice et empêche l'apparition de lésions athéromateuses et de l'artériosclérose.

Indications. — Tous les symptômes de l'« Automnose », hypertension artérielle, artério-sclérose, céphalées, somnolence, vertiges, bourdonnements d'oreilles, troubles oculaires, troubles de la circulation, dyspnée nocturne, dyspnée d'effort, hémorragies, hémorragies cérébrales, accidents rénaux, accidents cardiaques.

Mode d'emploi. — 1 à 2 comprimés, avant chaque repas, 20-jours par mois.

Prix : 15 francs.

Laboratoires G. REAUBOURG

2, rue Boucicaut — PARIS (XV^e)

Bureaux : 31, rue St-Georges — PARIS (IX^e)

SILICYL

Médication de base et de régime des carences siliceuses et des *états artérioscléreux*, empêchant la transformation des éléments élastiques et striés de l'endartère, c'est-à-dire la *lésion initiale* et les altérations consécutives hypertrophiques, hyperplasiques et dégénératives, avec imprégnation secondaire calcaire ou cholestérinée d'un placard athéromateux ou d'une sténose oblitérante.

Principe. — L'adrénaline ne produit plus de lésions athéromateuses chez les sujets soumis à l'action du silicate de soude (Professeur Goujet, P. M. 1911). — L'injection intraveineuse, inoffensive, abaisse la tension artérielle et ramène à la normale la viscosité sanguine. (Professeurs Sartory, Scheffler et Pélissier, *Acad. Sciences*, Août 1920.)

Composition. — Silicates de formule $\text{Si}^3 \text{O}^{12} \text{Na}^3$ et K^3 stables, solubles, purs, sans excès de base, bien tolérés et de fabrication très spéciale.

Emploi et doses. — La médication doit être prolongée, de façon tenace et persistante par périodes de 20 jours par mois.

GOUTTES : Seule préparation titrée à 25 p. 100 de SiO_2 , X à XXV gouttes aux repas, matin, midi et soir.

COMPRIMÉS : Titrés à 0,40 de sel de soude et de potasse ; 1 à 2 comprimés, au repas, 3 fois par jour.

AMPOULES : Voie intraveineuse, 1 ampoule par 48 heures (Action rapide : préscléreux, angor.).

Résultats. — Abaissement de la tension Mm et Ma. Viscosité ramenée à la normale. Elimination chlorurée. Diurèse. Action anti-athéromateuse. Hypotension. Disparition de la Dyspnée d'effort et des symptômes cérébraux. Euphorie et augmentation de la vitalité générale.

Indications. — 1° Action minéralo-tissulaire : Bacillose, Consolidation accélérée des fractures. Surdit  (lq sation). Etats  lastopatiques.

2° Art rioscl rose, Hypertension, Aortite, Ath rome aortique, Scl rose r nale, Angine de poitrine, Endart rite obl t rante progressive. Prophylaxie de l'ath rome et de l'h morrhagie c r brale, Troubles c r braux, Migraines, Vertiges, Paresse intellectuelle, Bourdonnements, etc. Otite scl reuse, Scl rose auriculaire, Troubles oculaires, Presbytie, Fatigue et Scl rose cardiaque, An mie siliceuse.

Gouttes : 20 fr. — Ampoules : 16 fr. — Comprim s : 18 fr.

Echantillons — Litt rature :

D p t, Paris : **Pharmacie P. LOISEAU**
61, Bd Malesherbes. — PARIS.

Laboratoire CAMUSET

18, rue Ernest-Roussell  — PARIS.

SILISODE

Forme. — Granulé.

Composition. — Une cuillerée à café contient :

Silicate de soude : 0 gr. 40

Benzoate de lithine : 0 gr. 10

Dose. — Une cuillerée à café avant les repas, 15 à 20 jours chaque mois.

Action. — Hypotensive, antiscléreuse.

Indications. — Hypertension sous toutes ses formes. Artério-Sclérose, Aortites. Angine de poitrine.

Prix : 16 francs.

Laboratoires MICHELS

9, rue Castex — PARIS. Tél. : Archives 45-12.

SINAHIN

Antidiabétique.

Forme. — Pilules de Semen-contrà total.

Propriétés :

Traitement sans restrictions trop sévères dans l'alimentation normale.

Formule extraite des travaux d'Avicenne (Communication Académie de Médecine, décembre 1913.)

Posologie :

Trois à quinze pilules par jour.

Prix de vente au public. La boîte, 12 francs.

Laboratoires CARTERET

15, rue d'Argenteuil — PARIS.

LE SINAPLASME

**Cataplasme sinapisé instantané
du docteur Jean Faure.**

Le premier en date. Le plus régulier.
Le moins cher.

Mode d'action. — Agit comme un cataplasme de farine de lin sinapisé et non comme un sinapisme.

Prix de la boîte de 3 sinaplasmes doubles :
5 francs.

Docteurs FAURE et DUSSUEL
Pharmaciens de 1^{re} Classe
AIX-LES-BAINS

SINAPOL

Pommade révulsive aux essences (en tubes).

Composition. — Essence de Sinapis Nigra. Teinture d'euphorbia resinifera. Eucalyptol. Goménol. Gaïacol, Menthol.

Indications. — Toutes celles des cataplasmes et enveloppements sinapisés, des sinapismes ou autres applications révulsives. Affections aiguës ou chroniques des voies respiratoires, douleurs, rhumatismes, névralgies, etc...

Posologie. — SINAPOL, 1 tube, étendre en onction *très légère*, puis recouvrir de coton cardé ou flanelle. Pour les épidermes spécialement sensibles, étendre au préalable une petite couche de vaseline puis faire l'application de SINAPOL comme il est dit plus haut.

Laboratoires DEODAX
R. RENAUD * *
ANOULD (Vosges).

SINAQUA NUTRICIA

Lait desséché vitaminé 100 % soluble.

Préparé avec le meilleur lait frais, desséché à basse température par un procédé spécial qui permet de maintenir intactes les vitamines du lait tout en faisant subir aux éléments solides de ce dernier une modification physiologique qui lui donne une digestibilité plus grande. De plus, l'ajouté d'une quantité exactement dosée de *vitamines D* confère au Sinaqua des propriétés hautement *antirachitiques*.

Analyse :

| | |
|-------------------|--------------|
| Graisse..... | 24,5 p. 100. |
| Lactose..... | 38,7 — |
| Mat. azotées..... | 25,8 — |
| Sels | 8,5 — |
| Eau | 2,5 — |

Indications. — Le Sinaqua additionné d'eau constitue pour les nourrissons un aliment idéal très digestible et d'une assimilation parfaite. Il supprime les vomissements.

Doses. — Une cuiller à soupe de poudre de lait et 9 cuillers à soupe d'eau préalablement bouillie et refroidie (dilution normale). A modifier selon les prescriptions médicales.

Nota. — A consommer sans cuisson.

« LA NUTRICIA »

142, rue Fransman — BRUXELLES (II^e).

SINASEPTIC

Sinapise-Aseptise.

Mélange de 5 essences balsamiques, d'essence de Moutarde noire, de Camphre, de Menthol et de Gaïacol en dilution huileuse.

Action sinapisante et vaso-dilatatrice.

Action antiseptique par absorption cutanée et élimination par les voies respiratoires.

Indications. — Angine, Laryngite, Bronchite aiguë ou chronique, Pneumonie, Broncho-pneumonie. Formes respiratoires de la Grippe, Congestion pulmonaire. Certaines formes de tuberculose.

Révulsion préventive post-anesthésique.

Emploi. — Appliquer au pinceau et recouvrir de ouate. Pour les enfants et les peaux sensibles diluer avec de l'huile ordinaire.

Laboratoire P. MORAND

197, avenue de Versailles — PARIS (XVI^e).

SINUSYL

Indications. — Sinusites, Coryza, Rhinites, Ozène, et toutes désinfections nasales,

Composition. — Résorcine, camphre, Myrtol, Huile d'amandes douces, Essence de violettes.

Forme et mode d'emploi. — Se fait :
En *huile* pour instillations nasales et pulvérisations.

En *huile éphédrinée* à 2 p. 100 ;

En *pommade* dans un tube spécial ;

En *rhino-capsules* pour auto-instillations.

Prix : Capsules et Huile : 12 fr.

— Pommade : 8 fr. 50.

— Huile éphédrinée : 15 fr.

Laboratoires Pierre CHATEAU

137, avenue Parmentier — PARIS (X^e).

Échantillons gratuits.

SIROP BRAHMA

Composition. — Thiocolum, benzoate de soude, codéine, dionine, aconit, belladone, grindélia.

Action. — Antiseptique puissant, régularise les sécrétions, les diminue. Calme rapidement la toux.

Indications. — Toutes les affections broncho-pulmonaires, rhumes, bronchites, grippe, laryngites, coqueluche, tuberculose au début.

Mode d'emploi. — 4 à 5 cuillerées à soupe par 24 heures, 1 heure avant ou 2 heures après manger, pur ou mieux dans de la tisane.

Prix : 11 francs.

Laboratoires G. COULLOUX

116, rue du Pont — AUXERRE (Yonne).

SIROP CASSIBOR

Sirop à base de teinture d'aconit, substances pectorales, séné, cassis et borate de soude.

Goût agréable, ne fatigue pas l'organisme, ne constipe pas.

Mode d'emploi :

Adultes : 3 à 5 cuillerées à soupe.

Enfants : 1 cuillerée à café par année d'âge.

Indications. — Prescrit contre rhumes, angines, bronchites, gripes et névralgies. C'est le sirop type pour les enfants.

On l'emploie également après les opérations chirurgicales chez les malades enrhumés.

Le flacon : Prix : 15 fr. 20.

Etablissements FUMOUZE

78, faubourg Saint-Denis — PARIS.

SIROP DE CRÉOSOTE VACHERON

Composition. — 0 gr. 15 de créosote par cuillerée à soupe.

Propriétés thérapeutiques. — Antibacillaire et antiseptique puissant des bronches et du poumon.

Avantages. — De saveur agréable, nullement caustique, très bien toléré par l'estomac. Excellent sirop pectoral.

Indications. — Rhumes de toutes natures, bronchites aiguës et chroniques, toux rebelles, catarrhes, laryngites, grippe, influenza, etc...

Mode d'emploi. — *Adultes* : 1 à 4 cuillerées à soupe par 24 heures, à prendre dans l'intervalle des repas.

Prix : 14 francs.

Produits GONNON

J. et G. GONNON, Pharmaciens

14, rue Victor-Hugo — LYON.

SIROP DE GAÏARSOL

Composition. — Méthylarsinate de Gaïacol dont la supériorité sur les cacodylates est double : tolérance absolue et assimilation parfaite.

Action thérapeutique. — 1° Calme immédiatement la toux, désinfecte les voies respiratoires, aseptise les lésions pulmonaires ou bronchiques par le GAÏACOL.

2° Stimule la résistance organique, relève l'état général, lutte contre la cachexie par l'ARSENIC ORGANIQUE.

Indications. — Contre la toux en général : rhumes négligés, bronchites (chroniques ou non), catarrhe, état pré-tuberculeux, etc...

Préventif des complications pulmonaires de grippe rougeole scarlatine, coqueluche, etc...

Posologie

Adultes : 2 à 3 cuillerées à soupe par jour.

Enfants, de 8 ans et plus : 2 à 3 cuillerées à dessert par jour.

Moins de 8 ans : selon l'âge, par cuillère ou fraction de cuillère à café.

Autres formes du Gaïarsol. — Ce produit est également préparé en : Dragées. Gouttes et Ampoules avec les mêmes indications.

Prix : *Siróp*, 13 francs; *Dragées*, 11 francs.

Laboratoires BOUTY

3, rue de Dunkerque — PARIS.

Tél. : Nord 32-52 (2 lignes).

SIROP DE GLYCÉROPHOSPHATES VACHERON

Au Gaïacol de synthèse cristallisé
et aux glycérophosphates de chaux, de soude et de potasse.

Composition. — Cette préparation contient par cuillerée à soupe :

0 gr. 15 de gaïacol de synthèse cristallisé.

0 gr. 30 de glycérophosphates.

Avantages et Propriétés thérapeutiques. — Ce sirop possède le même pouvoir antibacillaire que le sirop Vacheron au Gaïacol (*voir plus loin*), et en plus l'action reconstituante des phosphates organiques.

Indications. — Affection des voies respiratoires, chez les anémiques, les lymphatiques, les rachitiques et contre la tuberculose pulmonaire.

Mode d'emploi :

Adultes : 2 à 4 cuillerées à soupe par jour.

Enfants : 2 à 4 cuillerées à café par jour.

Prix : 15 francs.

Produits GONNON

J. et C. GONNON, Pharmaciens

14, rue Victor-Hugo — LYON

SIROP DE LA MATERNITÉ

Sirop de Cassia ac., 60 gr.; sirop de fleur de pêcher, 20 gr. ; sirop de pomme Reinette, 18 gr. ; teinture d'orange douce, 2 gr.

Dose et mode d'emploi. — Jusqu'à 2 mois 1/2 cuill. à café, au-dessus de 2 mois 1 à 2 cuill. à café.

Propriétés thérapeutiques. — Laxatif pour enfants, pouvant être donné à tout âge. Pas de coliques.

Indications. — Constipation, Embarras gastrique, Pas de contre-indications.

Prix : le flacon, 10 fr.

Dépôt : **Laboratoires H. NOGUÈS**

7, rue Galvani — PARIS.

SIROP DE LOVEL

Iodo-phosphaté tannique.

1 cuillerée à soupe contient :

| | |
|--|----------|
| Iode métalloïdique, combiné aux roses rouges..... | 0 gr. 02 |
| Extr. tannique des roses de Provins et de Ratanhia | 0 gr. 20 |
| Phosphate monocalcique cristallisé..... | 0 gr. 25 |

Posologie :

Adultes : 1 à 2 cuillerées à soupe matin et soir.

Enfants : 1 à 4 cuillerées à café par jour.

Indications. — Lymphatisme, rachitisme, carie des os, affections scrofuleuses, maladies dues à l'anémie et à la débilitation générale.

Préparation très recommandée aux enfants.

Prix : 12 francs.

Produits GONNON

14, rue Victor-Hugo — LYON

SIROP DU D^r GELINEAU

Composition :

Arsenic-Chloral-Bromuré.

Indications thérapeutiques :

Insomnie, Névralgie, Hystérie.

Posologie :

Par cuillerée à soupe :

| | |
|---------------------------|------------|
| Kbr..... | 1 gr. 50 |
| Chloral cristallisé | 1 gramme. |
| Arsenic..... | 1 milligr. |

Une à deux cuillerées à bouche le soir au coucher.

Doses supplémentaires en cas de besoin.

Littérature et échantillons sur demande :

Prix : le flacon : 15 francs.

Laboratoires J. MOUSNIER-DELERME
9, bd Carnot — BOURG-LA-REINE (Seine).

SIROP FAMEL

Antiseptique. — Lactocréosote soluble. — Cicatrisant non caustique bien toléré.

Calmant. — Codéine, Aconit.

Récalcificateur. — Lactophosphate de chaux.

Doses et mode d'emploi. — *Adultes* : 1 cuillerée à soupe le matin, avant déjeuner et une le soir, au coucher ; délayer dans infusion chaude *non sucrée*. En cas de besoin, 3^e cuillerée à midi.

Enfants : de 8 à 14 ans, par cuillerée à dessert ; de moins de 8 ans, par cuillerée ou demi-cuillerée à café, ou moins, selon l'âge, toujours dans infusion non sucrée.

Propriétés thérapeutiques. — Calmant de la toux, puissant antiseptique du poulmon.

Indications thérapeutiques. — Affections des bronches et du poulmon : bronchites chroniques, tuberculose, rhumes négligés, toux. Comme adjuvant dans la grippe, coqueluche, rougeole, scarlatine, pour écarter les dangers de complications pulmonaires.

Prix : 10 francs.

16 à 22, rue des Orteaux — PARIS (XX^e).

SIROP GIRARD

Iodo-tannique.

Iode, Tannin, Lactophosphate de chaux.

Mode d'emploi :

Adolescents : 1 cuillerée à soupe avant chaque repas.

Enfants : 1 cuillerée à dessert avant chaque repas.

Propriétés thérapeutiques :

Tonique, reconstituant, réminéralisateur, dépuratif.
Goût agréable. Assimilation parfaite. Le meilleur succédané de l'huile de Foie de Morue.

Indications :

Adénopathies, Lymphatisme, Scrofule, Engorgements ganglionnaires, Hypertrophies amygdaliennes, Végétations adénoïdes, Débilité, Rachitisme, Troubles de croissance et de formation, Toutes convalescences.

Prix : 13 francs.

Établissements SOUDAN

48, rue d'Alésia — PARIS (XIV^e).

Enregistré au Laboratoire National n° 405-3.

SIROP GRIBELL

Composition. — Baume du Canada, « *Prunus virginianus* », Aconit, Codéine, Phosphate de chaux soluble, Baume de Tolu.

Indications. — Toutes les affections des voies respiratoires.

Mode d'emploi. — *Adultes* : 4 à 5 cuillerées à bouche par jour, pur ou dans de la tisane pectorale chaude.

Le flacon : 9 francs.

PATE GRIBELL

Même composition. — Mêmes indications.

La boîte : 4 francs.

SIROP GRIBELL POUR ENFANTS

Formule spéciale ne renfermant aucun principe opiacé.

Mode d'emploi. — Jusqu'à 7 ans, 3 à 5 cuillerées à café par jour. Au-dessus de 8 ans, par cuillerée à dessert, suivant l'âge.

Le flacon : 7 francs.

Laboratoires BELIERES

19, rue Drouot — PARIS (IX^e).

SIROP LECŒUR

Rhus aromatica, Noix vomique, Belladone, Quinquina, Acide phosphorique ; Glycérophosphates calciques, magnésiques, potassiques et sodiques. Contre l'incontinence d'urine.

Se prend pur ou dilué dans un peu d'eau, avant les repas ou le coucher.

De 2 à 5 ans : 1 cuillerée à café le 1^{er} et le 2^e soir, 2 cuillerées à café les soirs suivants.

De 5 à 10 ans : 1 cuillerée à dessert les 2 premiers soirs, 2 cuillerées à dessert les soirs suivants.

Plus de 10 ans : 1 cuillerée à soupe les 2 premiers soirs, 2 cuillerées à soupe les soirs suivants.

Adultes : 1 cuillerée à soupe matin et soir pendant 2 jours, 2 cuillerées à soupe matin et soir les jours suivants.

Prix : 14 francs.

Laboratoires GAVIN
VIMOUTIERS (Orne).

SIROP MINÉRAL SULFUREUX CROSNIER

Au monosulfure de sodium inaltérable et goudron. Approbation scientifique de l'Académie de Médecine de Paris.

Indications thérapeutiques. — Succédané avantageux des eaux sulfureuses. Affections subaiguës ou chroniques des voies respiratoires, laryngites, lymphatisme, dermatoses, hydrargyrisme, bismuthisme.

Posologie :

Adultes : 1 cuillerée à soupe de sirop 2 à 3 fois par jour, 1 heure avant ou 2 heures après les repas.

Enfants : 2 à 3 cuillerées à dessert : de 7 à 14 ans ; 2 à cuillerées à café pour ceux de 2 à 6 ans.

Prix : 12 francs.

Granules minéral sulfureux Crosnier

Composition et indications thérapeutiques. — Celles du sirop.

Granules. Prix : 7 francs.

Posologie. — 2 granules = 1 cuillerée à soupe de sirop.

Laboratoires CROSNIER
44, rue de Lagny — MONTREUIL-PARIS

SIROP MIREILLE

Le plus *agréable* au goût, le plus *actif*, pour le **traitement polyvalent** des **affections de l'appareil respiratoire**.

Calmant, sédatif, hypnotique, par : le bromhydrate de codéine, l'eau de laurier-cerise, l'aconit et la belladone.

Balsamique, antiseptique, diurétique, par : la terpine et le benzoate de soude du benjoin.

Expectorant, émollient, sudorifique, par : des extraits de plantes pectorales.

Doses par 24 heures et mode d'emploi :

Adultes : 4 à 6 cuillerées à soupe.

De 10 à 16 ans : 3 à 6 cuill. à dessert.

De 2 à 10 ans : 2 à 6 cuill. à café.

Se prend à toute heure ; aucune contre-indication ; pas de toxicité ; pas d'intolérance ; pas d'accoutumance. Une cuiller à soupe prise le soir au coucher dans une infusion chaude assure un sommeil paisible.

Prix au public : 12 francs. (exempt d'impôt).

LABORATOIRES LEGENDRE et Cie.

Section D. S. — HOUILLES (S.-et-O.).

DÉPOT GÉNÉRAL

France, Colonies et Protectorats :

O. C. P. 71, rue du Temple — PARIS (III^e).

Belgique : M. Ramlot, 72, rue de l'Escaut à Bruxelles-Maritime.

SIROP MORLAS

Hérédo-syphilis des nouveau-nés et des enfants.

Tonique et spécifique discret pour les petits malades à hérédité douteuse (végétations, glandes, eczéma, convulsions, etc...).

Dose :

Jusqu'à 1 an : 1 cuillerée à café par jour.

De 1 à 3 ans : 2 cuillerées à café, etc...

Echantillons sur demande.

Prix : 15 francs.

Pharmacie MOURE

18, rue Favart — PARIS (II^e).

Dépôt général :

O. C. P., Paris et ses succursales.

SIROP NOGUÈS

Composition :

| | | |
|---|-------------------------|-------|
| Alcoolature d'aconit | } \overline{aa} | 0,030 |
| Teinture de belladone | | |
| Teinture de grindelia | | 0,075 |
| Bromoforme | | 0,016 |
| Codéine | | 0,009 |
| Benzoate de soude..... | | 0,079 |
| Sirop de Tolu, Desessartz, laurier-cerise | | Q. S. |
| pour une cuillerée à bouche. | | |

Dose et mode d'emploi. — 4 à 5 cuillerées à bouche par 24 heures.

Propriétés thérapeutiques. — Calmant de la toux, incisif, pectoral.

Indications. — Toux quinteuses, bronchites, toutes affections des bronches.

Prix : 12 francs.

Laboratoire NOGUÈS

7, rue Galvani — PARIS.

SIROP PECTORAL DU Dr PYOT

Benzoate de soude, sirop de codéine, belladone, tolu et Desessartz. Rhumes toux, bronchites, pneumonies et toutes affections des voies respiratoires chez les enfants :

Le flacon : 9 francs.

2 à 6 cuillerées à café par jour.

Laboratoires GAMBY-WISSE

Place de l'Hôtel-de-Ville

SALON-DE-PROVENCE

(Bouches-du-Rhône).

SIROP « ROCHE »

AU THIOCOL

1 cuillerée à soupe de Sirop « Roche » — 1 gr. de Thiocol « Roche ».

1 gr. de Thiocol « Roche » — 0 cgr. 52 de gaiacol cristallisé.

Doses et mode d'emploi. — *Adultes* : 2 à 4 cuillerées à soupe par jour. *Enfants* : 2 à 4 cuillerées à café selon l'âge.

Prop. thérap. — Antiseptique pulmonaire. Phagocytogène. Eupeptique. Orexique.

Indic. thérap. — Toutes les affections broncho-pulmonaires : Tuberculose, Bronchites aiguës et chroniques. Grippe. Pneumonie. Coqueluche. Scrofule. Anémie. Rachitisme. Dyspepsies. Entérites, Diarrhées, etc.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le numéro 504-51.

Produits

F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie

10, rue Crillon, — PARIS (IV^e).

SIROP SENTINI

Aux Prunes d'Ente d'Agen.

Principes actifs :

Pruneaux d'Agen. Cassia Lenitiva. Cephaelis
Ipécacuanha.

Propriétés :

Laxatif et Purgatif doux. Pas d'accoutu-
mance. Efficacité parfaite.

Dose laxative :

Bébés : Une demi à une cuillerée à café.

Enfants : Une à deux cuillerées à café.

Adultes : Une cuillerée à soupe le soir.

Dose purgative :

Le double des doses laxatives.

Prix : 12 fr. 50.

Laboratoires DOMERGUE

AGEN (Lot-et-Garonne).

SIROPS HENRY MURE

Rigoureusement dosés à 2 gr. de sel chimiquement pur
par cuillerée à potage et 0 gr. 65 par cuillerée à café
de sirop d'écorces d'oranges amères irréprochable.

Sirop HENRY MURE au Bromure de Potassium.

Maladies du Système Nerveux : Epilepsie, Hystérie,
Chorée, Névroses.

Sirop HENRY MURE au Bromure de Sodium.

Maladies de l'Estomac : Gastralgies, Crampes,
Contractures.

Sirop HENRY MURE au Bromure de Strontium.

Maladies du système nerveux sympathique : Estomac,
Reins, Intestins.

Sirop HENRY MURE Polybromuré.

Potassium, sodium, ammonium.

Action décuplée des Bromures en association.

Epilepsie, Névroses.

**Laboratoire Docteur A. VERMERSCH,
Pharmacien**

71, rue Saint-Jacques — PARIS.

SIROP TEYSSÈDRE

au Bromure de Calcium pur
Médecine du nourrisson.

Indications thérapeutiques. — Colique des nouveau-nés, Insomnies, Cris et pleurs prolongés, Crispations nerveuses, Vomissements, Diarrhée, Prurit dentaire, Accident de la première dentition, Affections convulsives, etc.

Doses. — Sommeil agité, Nervosité : 1 à 3 cuillerées à café par jour.

Dentition : 4 à 5 cuillerées à café par jour.

Convulsions (pendant les accès), 1 cuillerée à café toutes les 5 minutes.

Convulsions (après les accès), 1 cuillerée à café toutes les 3 heures.

(Se méfier des imitations).

Prix de vente au public : 5 fr. 50 le flacon.

Laboratoire TEYSSÈDRE

34, faubourg d'Angoulême — LIMOGES.

SIROP TINARDON

Iodo-tannique phosphaté

Contenant pour 100 cc. :

| | |
|------------------------------------|----------|
| Iode bi-sublimé | 0 gr. 15 |
| Extrait sec de ratanhia..... | 1 gr. 10 |
| Lactophosphate de chaux.... | 2 gr. 25 |
| Sirop d'orange. Q. S. pour 100 cc. | |

Posologie. — 2 ou 3 cuillerées à soupe suivant l'âge. (Le flacon contient environ 30 cuillerées à soupe.)

Indications. — Lymphatisme, Adénopathies, croissance difficile.

Prix : 12 fr. 50.

LABORATOIRE OBERLIN

J. TINARDON

Pharmacien de 1^{re} classe de la Faculté de Pharmacie de Paris.

17, rue Cadet — PARIS.

SIROP VACHERON

au Gaïacol de Synthèse.

Composition. — Une cuillerée à soupe contient 0 gr. 15 de gaïacol de synthèse cristallisé titrant 100 p. 100 de gaïacol absolu.

Avantages. — Le gaïacol est en solution complète et en dilution étendue, par conséquent sans action sur les fonctions digestives.

Propriétés thérapeutiques. — Calme la toux rapidement. Diminue et facilite l'expectoration. Détruit les germes morbides.

Indications. — Rhumes, Gripes, Bronchites aiguës ou chroniques, Laryngites, Catarrhe pulmonaire, Coqueluche.

Mode d'emploi. — *Adultes* : 2 à 4 cuillerées à soupe par jour dans un demi-verre de tisane, lait ou eau à prendre dans l'intervalle des repas.

Enfants : De 2 à 4 cuillerées à café par jour.

Prix : 14 francs.

Produits GONNON

J. et C. GONNON, Pharmaciens
14, rue Victor-Hugo — LYON.

SIROP VIANO

Composition et propriétés. — Le SIROP VIANO béchique remarquable et antiseptique précieux, est composé de produits nouveaux :

| | |
|--|-----------|
| Phénylglycolate de l'éther phénylglycolique de la codéine..... | 0 gr. 135 |
| Phénylglycolate d'aminophényl diméthyl pyrazolone..... | 0 gr. 80 |
| Hélénine..... | 0 gr. 09 |
| dont l'action est complétée par : | |
| Sulfogaiacolate de potassium (thiocol).... | 2 gr. |
| Bromoforme..... | 0 gr. 58 |
| Teinture de belladone..... | 1 gr. 20 |
| Teinture de droséra..... | 3 gr. 20 |
| Eau de laurier-cerise..... | 2 gr. |
| Sirop aromatique..... Q. S. p. | 100 gr. |

Le SIROP VIANO est d'une efficacité incontestée dans le traitement de la toux, mais son emploi se justifie encore davantage par les deux qualités suivantes :

Action réelle sur la cause de la toux grâce à son pouvoir antiseptique, anticongestif et expectorant.

Absence d'action secondaire sur le système nerveux, le cœur ou l'appareil digestif.

Le SIROP VIANO n'endort pas, ne constipe pas, ne produit pas d'intolérance.

Le SIROP VIANO stimule l'appétit et remonte l'état général du malade.

Indications. — Toux spasmodique, Toux avec congestion et encombrement bronchique, emphysème, dilatation des bronches, etc.

Le SIROP VIANO est particulièrement précieux dans le traitement de la tuberculose pulmonaire ; il peut être prescrit aux enfants et aux personnes âgées.

Posologie. — 3 à 5 cuillerées à soupe par jour.

Pour les enfants : de 10 à 15 ans, 3 à 5 cuillerées à dessert de 5 à 10 ans, 3 à 5 cuillerées à café par jour.

Prix : Le flacon de 225 cc. : 14 francs.

Littérature et échantillons :

Laboratoires SFÉAT

15, rue Catulienne — SAINT-DENIS (Seine).

SISTEX

**Médication opothérapique frénatrice
de l'hyperactivité ovarienne.**

Composition. — Solution alcoolique d'extrait ovarien frénateur et d'extrait mammaire ; 1 cc. (XXXV gouttes) correspond à 0,17 gr. de corps jaune et 0,5 gr. de glande mammaire fraîche.

Mode d'action. — Freine rapidement et supprime l'hyperactivité ovarienne.

Indications. — Ménorragies de la puberté, Règles trop abondantes, trop fréquentes ou prolongées, Ménorragies de la ménopause.

Posologie. — Prescrire X à XXX gouttes par jour, à prendre en 2 ou 3 fois, *loin des repas*, pendant 10 ou 20 jours par mois, suivant les cas.

Prix : le flacon : 16 francs.

Laboratoires CRINEX-UVÉ

18, rue Saint-Amand — PARIS (XV^e).

SISTOMENSINE CIBA

**Hormones ovariennes liposolubles
physiologiquement contrôlées.**

Action physiologique. — Equilibre la fonction menstruelle, limite et régularise le flux cataménial. Agit efficacement sur les douleurs dysménorrhéiques.

Indications.

- I. — Flux menstruel trop abondant, ménorragie essentielle des jeunes filles.
- II. — Règles trop fréquentes ou de trop longue durée.
- III. — Douleurs et malaises liés à un flux trop abondant.
- IV. — Troubles de la ménopause, naturelle ou chirurgicale (en association avec l'Agomensine).
Comprimés, - Ampoules.

Doses. — 3 à 6 comprimés par 24 heures, — 1 ou 2 ampoules.

Le flacon de 40 comprimés : 15 francs.

Le — de 100 — : 30 —

La boîte de 4 ampoules : 20 —

(Voir Agomensine.)

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND

109 à 113, Boulevard de la Part-Dieu. — LYON

SODERSEÏNE

Indication. — Coqueluche.

Composition. — Bismuth colloïdal obtenu par électrolyse.

Forme. — Solution sans saveur et d'une innocuité absolue (ce qui en rend l'emploi facile même chez les nourrissons).

Doses journalières :

| | |
|-------------------------------------|---------|
| <i>Enfants</i> jusqu'à 6 mois | 100 gr. |
| — de 6 mois à 2 ans | 150 gr. |
| — de 2 ans et au-dessus . | 200 gr. |

(Echelle de doses sur le flacon).

Prix du flacon de 500 gr. : 10 francs.

J. DEPRUNEAUX, Pharm. de 1^{re} classe
18, rue de Beaune et 31, rue de Verneuil
PARIS (VII^e).

SODÉSYL

Estomac-Foie-Intestin.

Préparation intégrale de la solution.

de **Bourget** { Sulfate de soude.
Phosphate de soude.
Bicarbonate de soude.

Forme. — Paquets.

Dose. — 1 paquet le matin à jeun dans 1/2 verre d'eau de Vichy tiédie au B. M.

Enfants : demi-dose adulte.

Indications. — Toutes les applications de la solution de BOURGET : insuffisance de la sécrétion biliaire, hyperchlorhydrie, insuffisance gastrique, intoxication intestinale et toutes affections du tube digestif.

Jamais d'insuccès.

Prix : 12 fr. 50.

Laboratoire du SODESYL
VIERZON (Cher).

SODISALYNE

Traitement salicylé sans ses inconvénients.

Formes :

- 1° Dragées, enrobage spécial évitant tout contact avec l'estomac.
- 2° Gouttes, bien supportées grâce à l'adjonction d'extraits végétaux.

Dosage :

- 1° Dragées, 4 dragées = 1 gr. Salicylate de soude.
- 2° Gouttes, 50 gouttes = 1 gr. Salicylate de soude.
1 cuillerée à café = 3 gr.

Indications. — Rhumatisme articulaire aigu. Infections générales, lithiase biliaire, ictère par rétention, infections urinaires, analgésie.

Posologie :

- 4 dragées : 2 à 10 fois par jour.
50 gouttes : 2 à 10 fois par jour.
Gargarisme : 50 gouttes dans un verre d'eau.
Lavage de gorge, 1 cuillerée à café dans 1 litre d'eau.

Prix du flacon : 18 fr.

Maison du Docteur PILLET

5, avenue Victoria — PARIS (IV°).

SODOGASTROL LAGOUTTE

Composition et formes. — Cachets et granulé, contenant par cachet ou par cuillerée à café :

| | |
|-------------------------|----------|
| Sulfate de soude..... | 1 gr. |
| Phosphate de soude..... | 0 gr. 50 |
| Bic. de soude..... | 0 gr. 25 |

Actions thérapeutiques. — Régularise les fonctions stomacales et intestinales, Supprime les fermentations toxiques. Décongestionne la muqueuse gastro-intestinale.

Indications. — Gastrites, Dyspepsies nerveuses, Digestions lentes, Douleurs épigastriques, Hyperchlorhydrie, Infections gastro-intestinales, Entérite muco-membraneuse, Hépatite, Obésité, Goutte, Hypertension.

Mode d'emploi. — 1 à 3 cachets ou 1 à 3 cuillerées à café de granulé, le matin à jeun à l'aide d'une infusion chaude de camomille. Cette dose peut être augmentée sans inconvénient.

Prix :

| | |
|--|-----------|
| Cachets : La boîte de 30 cachets... | 10 fr. 50 |
| — : La double boîte | 20 fr. » |
| Granulés : La boîte de 100 grammes | 9 fr. 50 |
| — : La double boîte | 18 fr. » |

Laboratoire LAGOUTTE

85, cours Albert Thomas — LYON (III°) (Rhône).

SODOLACTINE

(Estomac.)

Poudre soluble, n'agissant ni comme un alcalin, ni comme un absorbant, ni comme un isolant. De goût très agréable, la *Sodolactine* est le médicament de choix dans la plupart des affections stomacales.

La *Sodolactine* ne modifie pas le chimisme du contenu gastrique, elle *facilite physiquement l'évacuation de l'estomac*.

(Thérapeutique clinique de Martinet, p. 1125.)

Posologie :

Une mesure dans une tasse à *thé* d'infusion ou d'eau tiède.

Après les repas : Hyperchlorhydrie, Dyspepsies hypersthéniques, Aigreurs, Brûlures, Ulcérations, Affections atteignant l'orifice pylorique, Vomissements et nausées de la grossesse, Vomissements des nourrissons : (1 cuillerée à café dans un biberon de 120 cc. d'eau bouillie, faire prendre 1 à 2 cuillerées à soupe de cette solution après chaque tétée.)

Avant les repas (un quart d'heure) et le matin à jeun : Hypochlorhydrie, Dyspepsies simples, Dilatations, Atonies gastriques, Digestions laborieuses, Mal de mer.

Remarque importante. — La *Sodolactine* agissant d'une façon physique et non chimique, bien respecter la concentration indiquée : *une mesure par tasse à thé de liquide*. (A titre indicatif : une tasse à thé 120 cc. ou 8 cuillerées à soupe.)

Prix : 12 francs.

Laboratoires GERDA

163, boulevard Croix-Rousse — LYON.

SODOTHIOL

Composition :

Solution stérilisée pure, isotonique, injectable de thiosulfates alcalins.

Forme pharmaceutique :

Ampoules de 2 centicubes préparées pour injections hypodermiques ou intramusculaires.

Indications thérapeutiques majeures :

Affections hépatiques. — Coliques hépatiques, Lithiase biliaire, Angiocholite lithiasique, Cholécystite calculieuse, Cholémie simple, Ictère catarrhal ou émotif, Hépatisme de Roger Glénard.

Manifestations arthritiques. — Lithiase rénale, Coliques néphrétiques, Gravelle, Anurie calculieuse, Calculs vésicaux, Rhumatisme noueux déformant, chronique, Ankyloses fibreuses articulaires, Otosclérose, Otospongiose.

Indications thérapeutiques secondaires :

Dermatologie. — Eczémas, Acnés, Accidents cutanés récidivants ou prurigineux.

Etats congestifs chroniques des muqueuses respiratoires

Mode d'emploi :

A. *Cure d'assaut.* — 10 injections, une tous les jours.

B. *Cure de fixation.* — 10 autres injections 15 jours, puis deux mois plus tard.

C. *Cure d'entretien.* — 10 injections 6 mois, puis un an après la première série.

Dans le cas de Rhumatismes chroniques noueux ou déformants et quelques affections cutanées récidivantes, la *Cure d'assaut* comprendra 20 injections à raison d'une par jour, complétée d'une *Cure de complément A bis* après 15 jours de repos.

Le *Sodothiol* étant dépourvu de toute toxicité, son usage pourrait, s'il en était besoin, être prolongé tout le temps jugé nécessaire.

Incompatibilités :

Acides, Sels acides, Iodures.

Prescrire :

Sodothiol : 1 boîte d'ampoules.

Prix, la boîte de 10 ampoules : 20 fra. cs.

Laboratoire de MÉDECINE EXPÉRIMENTALE

1 et 3, rue de Malherbe. — BEAUVAIS (Oise). Tel. : 4-84

Echantillons et littérature médicale sur demande.

SOLARSYL

Collutoire, gargarisme à l'arseno-benzol et argent colloïdal.

Composition :

| | |
|---|------------------|
| Oxyacétylaminophénylarsinate de soude | 1,5 p. 100. |
| Argent colloïdal | 1 p. 100. |
| Extrait fluide d'hamamélis | 10 p. 100. |
| Excipient glyciné aromatisé | Q. S. P. 100 gr. |

Propriétés. — Permet la prescription d'une solution d'arsebenzo tout en assurant la stabilité et partant l'efficacité de la solution. Notre principe actif, l'oxy-acétyl-amino-phényl-arsinate de soude, composé arsenical organique, possède l'avantage d'une grande stabilité. Son association avec l'argent colloïdal et à l'extrait fluide d'hamamélis réunit au plus haut degré les avantages d'une médication bactéricide (à spécificité anti-spirillaire) analgésique et décongestive.

Indications. — Affections bucco-pharyngées, Angines, Angines de Vincent, Angines pseudo-membraneuses, pultacées, Stomatites bismuthiques, auriques, mercurielles, Noma, Gangrène buccale, Pyorrhée.

Mode d'emploi. — En gargarismes 1/4 à 1/2 cuillerée à café dans un verre d'eau tiède.

En application sur les gencives ou sur les amygdales matin et soir

Prix : 15 francs le flacon. L. N. C. M. n° 574-5.

Laboratoires MEXYL

6, rue des Dames — PARIS (XVII^e).

SOL-BI FRAISSE

Bismuth lipo-soluble.

Composition. — Solution de Campho-Carbonate de Bismuth.

Chaque ampoule de 2 centimètres cubes contient 0,08 de Bismuth métal.

Indications. — Traitement d'attaque, aussi actif que l'Arsénobenzol.

2 ampoules par semaine.

Prix : 14 francs.

Laboratoires FRAISSE

8, rue Jasmin — PARIS (XVI^e).

SOLMUTH

Solution huileuse de Campho-Carbonate
de Bismuthyle.

Indications :

Le Solmuth s'emploie en *injections intramusculaires* dans le traitement de la syphilis à toutes périodes. Tolérance parfaite ; élimination complète, sans dépôt huileux ou bismuthique intramusculaire. Activité supérieure à celle des sels insolubles de bismuth, action stérilisante aussi rapide que celle des arsenicaux en solution aqueuse.

Mode d'emploi :

2 injections intramusculaires de une ampoule de 1 cc. par semaine.

Présentation :

En boîte de 12 ampoules de 1 cc. (une ampoule contient 4 centigr. Bi-métal par cc.).

Prix de vente au public :

25 francs la boîte de 12 ampoules.

Laboratoire L. LECOQ et F. FERRAND

14, rue Gravel — LEVALLOIS (Seine).

Dépôt :

Pharmacie Générale LECOQ et FERRAND

54, Chaussée-d'Antin — PARIS.

SOLUCAMPHRE DELALANDE

Dérivé du camphre naturel, soluble dans l'eau, succédané de l'huile camphrée.

Avantages. — Injection facile et indolore. Résorption immédiate, d'où action plus vive et plus vigoureuse. Injection intraveineuse sans danger. Toxicité nulle. Le Solucamphre à base de Camphosulfonate de pipérazine a une action beaucoup plus prolongée que le camphosulfonate de soude et se rapproche à ce point de vue de l'huile camphrée.

Action physiologique. — L'action du Solucamphre rappelle en tous points celle du camphre.

Il agit sur le myocarde en renforçant les contractions et sur le pneu mogastrique en régularisant celles-ci.

Mode d'emploi :

Ampoules : 2 à 8 cc. par jour en médecine. 2 cc. en intraveineuse. 10 à 15 cc. en chirurgie.

Gouttes : 25 à 100 gouttes par jour dans un peu d'eau sucrée,

Présentation. — Boîtes de 6 ampoules de 1 cc., 2 cc., 3 cc., 5 cc. et 3 amp. de 10 cc. et gouttes.

Le Solucamphre en solution et en comprimés à prendre « per os ».

Prix : 6 ampoules de 1 cc., 10 fr. ; 6 ampoules de 2 cc., 12 fr. 75 ; 6 ampoules de 3 cc., 14 fr. 50, 6 ampoules de 5 cc., 17 fr. ; 3 ampoules de 10 cc., 17 fr. ; Gouttes, 14 fr.

Peut être prescrit aux Assurances Sociales.

SOLUCAMPHRE SPARTÉINÉ

Delalande.

Sel de Spartéine du Solucamphre en dissolution dans le Solucamphre lui-même.

Correspondant à Spartéine base : 0,035 par ampoule de 2 cc. et de 5 cc.

Avantages. — Tous les avantages du Solucamphre et de la Spartéine réunis.
Injections indolores.

Indications. — Toutes les indications de la Spartéine et du camphre.

Présentation :

| | | |
|--------------------|------------------------------------|-------|
| <i>Ampoules</i> : | Boîtes de 6 ampoules de 2 cc | 12 75 |
| — | — de 6 — de 5 cc | 20 » |
| <i>Comprimés</i> : | Tubes de 20 comprimés | 12 » |

Mode d'emploi.

Ampoules : 2 à 4 cc. en injection intramusculaire.

Comprimés : Adultes : 2 à 6 par jour ; Enfants : 1 à 2 par jour.

Peut être prescrit aux assurances sociales.

Bien prescrire *Solucamphre spartéiné* à l'exclusion de tout autre nom générique.

SOLUCAMPHRE

Associations diverses.

Solucamphre adrénaliné. — Contenant 0,001 d'adrénaline naturelle dissoute dans le Solucamphre.

Boîtes de 6 ampoules de 2cc : 16 francs.

Solucamphre caféiné. — Camphosulfonate de caféine, 0,30 correspondant à 0,189 de caféine pure.

Boîtes de 6 ampoules de 2cc. : 16 francs.

Solucamphre éphédriné. — Camphosulfonate d'éphédrine, 0,07 correspondant à 0,032 d'éphédrine pure.

Boîtes de 6 ampoules de 2 cc. : 16 francs.

Solucamphre strychniné. — Camphosulfonate de strychnine, 0,0015 correspondant à 0,00093 de strychnine base.

Boîtes de 6 ampoules de 2 cc. : 16 francs.

Solucamphre gaïacolé. — Camphosulfonate de gaïacol, 0,05 et camphosulfonate de strychnine, 0,00075 correspondant à 0,024 de gaïacol pur et à 0,0005 de strychnine base.

Boîtes de 6 ampoules de 2 cc. : 16 francs.

Solucamphre quininé. — Camphosulfonate de quinine, 0,60 correspondant à 0,418 de quinine base.

Boîtes de 6 ampoules de 2 cc. : 20 francs.

Camphosulfonate de quinine, 0,20 correspondant à 0,14 de quinine base.

Tube de 20 comprimés : 20 francs.

Solucamphre cholestériné. — Cholestérine et Lécithine, 2,50 p. 100 en suspension colloïdale dans le Solucamphre.

Boîtes de 12 ampoules de 2 cc. : 25 francs.

Boîtes de 12 ampoules de 5 cc. : 40 francs.

Laboratoire Michel DELALANDE

16, rue Henri-Regnault — COURBEVOIE
(Seine)

SOLUROL

Comprimés d'acide thyminique pur dosés à 0,25.

Propriétés. — *Elimination de l'acide urique*, par remplacement de la fonction thyminique déficiente et par apport du complément solubilisant de l'acide urique.

Indications. — Toutes les manifestations de la diathèse arthritique et de l'uricémie, goutte, rhumatisme chronique, déformant, arthroses, lithiases.

Posologie. — De 2 à 8 comprimés par jour, en 3 ou 4 prises. Aucune contre-indication. Cures prolongées.

Forme. — Flacons de 25 comprimés.

Laboratoires CLIN, COMAR et Cie

20, rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS.

SOLUTION HUILEUSE AU NESTOSYL

Anesthésie de surface par contact

Caractéristiques. — Voir à la rubrique Nestosyl.

Indications. — 1) Anesthésie des muqueuses ou des plaies : cathéters et bougies exploratrices ou dilatatrices, cystite, cautérisations, blennorrhagie, rectoscopie, changement de pansements, etc., et, d'une façon générale, tous examens et interventions superficielles d'urologie, gynécologie, oto-rhino-laryngologie, ophtalmologie, stomatologie et soins cliniques ; 2) Analgésie des Plaies, brûlures, démangeaisons, inflammations, éruptions et excoriations, soit comme médication d'urgence avant l'emploi continu de la pommade, soit comme médication à suivre, dans les cas où l'excipient huileux est plus particulièrement indiqué (certains eczémas rebelles aux pommades, douleurs de la dentition chez les enfants, dents cariées, otites, etc...).

Posologie. — Anesthésie des canaux : instiller quelques cmc. dans le canal quelques minutes avant d'introduire l'instrument enduit lui-même de solution. Anesthésie de la vessie : instiller quelques cmc. (dose généralement suffisante : 15 à 20 cmc.). Anesthésie des plaies et muqueuses : déterger et sécher la région à insensibiliser et la recouvrir de solution par badigeonnage, pulvérisation, aspersion, instillation, mèche ou compresse ; pour obtenir un effet prolongé, maintenir en contact par un pansement. Anesthésie rectale : une cuillerée à entremets introduite avec une poire suivant les besoins. Anesthésie vaginale : tampon vaginal imbibé de solution.

Prix : 15 francs.

Laboratoires du NESTOSYL.

P. BAUDE, pharmacien 72, rue Saint-Dominique — PARIS (VI^e)
Tél. : Ségur 96-46. — Adr. télégr. : Nestosyl, 27, Paris.

SOLUTION NORMET

Chirurgicale.

Composition. — Préparation à base de citrates métalliques (calcium, sodium, magnésium, fer et manganèse).

Présentations. — Ampoules de 20 cc. (boîte de 2).
Ampoules de 10 cc. (boîte de 4).

Indications. — Grandes hémorragies, métrorragies.

Mode d'emploi. — Par injections intraveineuses en solution à raison de 20 cc. de Sérum Normet dilués dans 1 litre de sérum physiologique (chlorure de sodium à 7 p. 1 000).

Prix : 20 francs la boîte.

SOLUTION NORMET

Médicale.

Composition. — Préparation à base de citrates métalliques (les mêmes que ci-dessus, mais avec une très faible proportion de manganèse).

Présentations. — Ampoules de 15 cc. (boîte de 6).
Ampoules de 5 cc. (boîte de 12).

Indications. — Anémies graves, hypotension, myocardites, hémophilie, états infectieux.

Mode d'emploi. — En injections hypodermiques, 1 à 15 cc. En goutte à goutte rectal après dilution dans du Sérum physiologique, à raison de 20 cc. par litre de sérum. En injections intraveineuses (non dilué) à raison de 1/2 à 5 cc. et plus, en surveillant la réaction du sujet.

Prix : 25 francs la boîte.

Établissements T. LECLERC

Dr P. LEMELAND, pharmacien,
10, rue Vignon — PARIS.

SOLUTION NORMET SCLÉROLYTIQUE

Composition. — Solution polycitrâtée de composition analogue à la solution Normet médicale, mais sans calcium et un peu plus riche en magnésium.

Propriétés. — La solution attaque par double décomposition les sels de chaux insolubles qui s'accumulent dans l'organisme.

Présentation. — Ampoules de 15 cc. (boîte de 6).

Indications. — La solution Normet Sclérolytique constitue actuellement le traitement le plus sûr de toutes les scléroses organiques et de l'hypertension artérielle.

Mode d'emploi. — Une ampoule (15 cc.) en injection sous-cutanée tous les deux jours, pendant un mois ou deux, puis deux fois par semaine. Abaisser les doses à 10 cc. dès que les résultats cherchés auront été obtenus. Interrompre le traitement un ou deux mois par an.

Prix : 25 francs la boîte.

Etablissements T. LECLERC

D^r P. LEMELAND, pharmacien

10, rue Vignon — PARIS (IX^e).

SOLUTION PAUTAUBERGE

Composition. — Créosote pure de hêtre, 0 gr. 10 ; Chlorhydro-phosphate de chaux, 0 gr. 50 ; par cuillerée à potage.

Action. — A l'action anticatarrhale, antiseptique et cicatrisante de la créosote, elle joint l'action tonique et récalcifiante du chlorhydro-phosphate de chaux, le plus assimilable des sels de chaux.

Grâce à sa forme de solution complète et bien diluée, elle est toujours bien supportée par l'estomac.

Indications. — Toutes les affections broncho-pulmonaires : Bronchite chronique, Toux, Grippe, Prétuberculose, Tuberculose, Coqueluche.

Posologie. — 3 à 4 cuillerées à potage par jour avant les repas pour les adultes.

2 à 3 cuillerées à dessert par jour avant les repas pour les enfants au-dessus de 5 ans.

2 à 3 cuillerées à café par jour avant les repas pour les enfants au-dessous de 5 ans.

Prix : 15 fr. le flacon de 350 cc.

Laboratoire PAUTAUBERGE

10, rue de Constantinople — PARIS (VIII^e)

SOLUTION QUINQUINA BARDET

Solution d'Extraits secs de Quinquinas.

Adoptée par le Ministère des Colonies.

Diplôme d'honneur : Exposition Internationale
Paris 1931.

Composition. — Solution, *sans sucre et sans alcool*, contenant 0 gr. 50 de principes actifs par cuillerée à soupe et titrant au minimum 10 p. 100 d'alcaloïdes totaux.

Propriétés thérapeutiques. — Teneur constante en principes actifs assurant une action rapide et fidèle. Tonique de premier ordre. Fébrifuge à forte dose.

Indications thérapeutiques. — Asthénie, Anorexie, Anémie, Convalescences ; Lymphatisme.

Pyrexies diverses, Paludisme en particulier.

Mode d'emploi et doses :

Tonique : *Adultes* : 1 cuillerée à soupe ;
Enfants : 1 à 2 cuillerées à café, au début des 2 repas principaux.

Fébrifuge : *Adultes* : 4 à 5 cuillerées à soupe ;
Enfants : 4 à 8 cuillerées à café, par 24 heures.

Se méfier des nombreuses contrefaçons et imitations.

Formuler : « SOLUTION QUINQUINA
BARDET ».

Echantillons et Littérature :

Laboratoires BARDET

fondés en 1860

76, rue de Sèvres — PARIS (VII^e).

SOLVURIC

Forme :

Granulé effervescent à base de formine et de benzopyruvate de soude et de lithine.

Indications :

Arthritisme, Goutte, Gravelle, Artério-sclérose, Antisepsie urinaire.

Doses :

2 à 4 cuillerées à café par jour dans un demi-verre d'eau.

Prix : 14 francs.

Laboratoire P. MAUCHANT
à GENNEVILLIERS (Seine)

SOMNICONES BÉRAL

Suppositoires hypnotiques, sédatifs et antipasmodiques.

Composition. — Chaque Somnicone contient :

| | |
|---|----------------------------|
| Phényl éthyl barbiturate de soude | 0 gr. 20 |
| Scopolamine..... | 1/10 ^e milligr. |
| Extrait de Valériane..... | 0 gr. 10 |

Propriétés. — Assurent un sommeil calme, tranquille et réparateur sans mauvais réveil et sans aucun trouble des fonctions digestives. Action lente et progressive. Calmants électifs des centres hypnogènes.

Indications. — Insomnies au cours des affections les plus variées, Affections aiguës, Algies de toutes natures (Sciaticque, Douleurs tabétiques, Névralgies), Excitations cérébrales, Douleurs méningées, Etats neurasthéniques, Préoccupations obsédantes, Nervosisme, Céphalées, Vomissements d'ordre central, Mal de mer, etc.

Posologie. — Un Somnicone en se couchant. Si l'effet semble insuffisant, en introduire deux ensemble ou l'un après l'autre.

Dans les affections chroniques, éviter l'accoutumance en suspendant l'emploi pendant 2 jours sur 6.

Formuler : Somnicones Béral. Une boîte.

Prix : 14 francs.

ROGER, pharmacien,
194, rue de Rivoli. — PARIS.

SOMNIFÈNE « ROCHE »

Dialcoyl-barbiturates de diéthylamine.

Le plus maniable des hypnotiques.

C. F. trav., observ., serv. des Professeurs Raviart, Abadie, Claude, Crouzon, Laignel-Lavastine, Weiss, Etienne, Anglade, Roger, Perrens, Cloëtta, Gelma, Combemale, Fredet, Cleisz, Gayet, S. Banus et des Drs Perlis, Vullien, Assoignon, Kindler, Boisnière, Jourdan,ourniac, de Teys-sieu, Hamant, Bénech, Redonnet, G. et D. Bar-det, etc., etc.

Indications thérapeutiques. — Toutes les insom-nies simples ou compliquées, Agitation, Délire, Convulsions, Troubles mentaux, Troubles ner-veux, Epilepsie, Tétanos, etc.

SOMNIFÈNE « ROCHE » Gouttes

Solution aromatisée pour atténuer la saveur spé-ciale du produit, ne pouvant être utilisée pour injections, permettant de *donner à chacun sa dose*, que l'on peut ainsi augmenter ou diminuer à volonté.

Doses habituelles. — XXX à XLV et LX gouttes (et plus) dans 1/2 verre d'eau ou de tisane, 1/2 heure avant de se coucher ou dans la nuit.

Enfants : V à X et XV gouttes (selon l'âge).

SOMNIFÈNE « ROCHE » Ampoules

Ampoules de 2 cc.

pour injections intramusculaires.

1 à 3 ampoules (Intolérance gastrique, refus du malade, agitation intense, troubles mentaux, etc.).

Ampoules de 5 cc.

pour injections endoveineuses.

Delirium tremens, Eclampsie, Tétanos, Etat de mal épileptique, etc.

Enregistré au Laboratoire national de contrôle des médicaments sous les n^{os} 504-36 (*gouttes*), 504-35 (*ampoules*).

Produits

F. HOFFMANN-LA ROCHE et C^{ie}

10, rue Crillon — PARIS (IV^e).

SOMNOTHYRIL

(Traitement de l'insomnie.)

Composition :

| | | | |
|--------------|---|------------------------|----------|
| Une pilule = | { | Diéthylmalonylurée .. | 0,20 gr. |
| | | Analgésine | 0,05 |
| | | Thyroïdine..... | 0,001 |
| | | Salicylate d'Esérine.. | 0,0002 |

Caractéristiques. — Seuil d'activité thérapeutique fort éloigné du seuil de toxicité.

Pas d'accoutumance, sommeil calme, et réveil agréable. Effet secondaire apaisant.

La diéthylmalonylurée arrive à réaliser à doses *réduites* et *atoxiques* un effet hypnotique rapide et sûr, grâce à l'action *sensibilisatrice* de l'esérine à doses minimales, qui prépare, de plus, un *état vagotonique* favorable au sommeil.

Indications thérapeutiques. — Toutes insomnies et particulièrement insomnies rebelles, Anxiété, Excitation psychique et maniaque, Cures de désintoxication. Insomnies de la Ménopause, Insomnies pré et post-opératoires.

En psychiatrie. — Action très nette chez les *mélancoliques anxieux, hypocondriaques, déprimés et psychoneurasthéniques*.

Mode d'emploi. — Avaler sans sucer, ni croquer, avec un demi-verre d'eau ou *mieux de tisane chaude* 2 heures environ après le repas.

D'une façon générale, prendre, le premier soir, une pilule. En cas d'efficacité insuffisante, porter le lendemain la dose à deux pilules *prises au même moment*.

Dans de très rares cas, il y a lieu de maintenir cette dernière dose pendant deux à trois soirs pour obtenir l'effet recherché.

Dans les cas de grande agitation (thérapeutique psychiatrique) donner trois pilules d'emblée, et essayer par la suite d'abaisser à deux et une pilule.

N. B. — Eviter l'emploi simultané de médicaments tels que la Belladone, etc..., qui peuvent contrarier l'action de l'Esérine.

Echantillons et littérature :

Laboratoires CANTIN

PALAISEAU (Seine-et-Oise — France).

SONÈNE

Son purifié.

Propriétés. — Action émolliente régulière sur l'intestin.

Indications. — Traitement végétal, préventif et curatif de la constipation.

Mode d'emploi. — Le *Sonène* se présente sous formes de cachets, de poudre et de granulés.

Dose journalière. — 1 à 3 cachets par jour, ou 1 à 3 cuillerées à café de poudre, ou 2 à 6 cuillerées à soupe de granulés.

Cachets. Prix : 13 francs.

Poudre. Prix : 15 francs.

Granulés. Prix : 14 francs.

Laboratoires de la Liposeptine

2, place des Vosges — PARIS.

SONÉRYL

Butyl-éthyl-malonylurée.

Action hypnotique très sûre, propriétés sédatives marquées, sans effets toxiques ni phénomènes d'accoutumance.

Indications. — Insomnies de toute nature, même celles qui sont provoquées par la douleur.

Posologie et mode d'emploi. — Deux comprimés à 10 cgr. le soir au coucher. Répéter cette dose dans la nuit en cas de besoin.

Dose maximum (*adultes*) : 6 comprimés par 24 heures.

SONÉRYL SODÉ

Dragées à 0,15 pour la narcose préparatoire aux anesthésies générales par l'éther (Méthode de Desplas, Launoy, Chevillon.) Ampoules unitaires de 1 gr. de poudre pour solution destinée à l'injection intraveineuse (anesthésie de base.)

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhone

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

SOPORALOSE

Principes actifs. — Chloralose et dérivés cinnamiques.

Action physiologique. — Agit comme calmant à la fois sur le système nerveux encéphalique et sur la moelle.

Aucune action sur la circulation, la respiration, la digestion.

Non toxique, élimination parfaite, pas d'accoutumance.

Action thérapeutique. — Provoque un sommeil calme exempt de rêves, avec sensation agréable au réveil. Pas de contre-indications.

Posologie. — Dose normale moyenne : 1 cachet.

Usage. — Contre toutes les insomnies par excitation quelle qu'en soit la cause, l'élément douleur excepté. Insomnies des surmenés, des nerveux, des neurasthéniques, des anxieux.

Convient remarquablement aux cardiaques, rénaux, hépatiques, dyspeptiques, artérioscléreux, vieillards, tuberculeux, affaiblis.

La boîte de 12 cachets : 12 francs.

Laboratoires POINTET & GIRARD
30, rue des Francs-Bourgeois — PARIS.

SOPORIGÈNE DELQUÉ

Composition. — Cachets de buthyl-éthyl-malonylurée, dosés à 20 centigrammes, en milieu alcalin.

Action thérapeutique. — Hypnotique, analgésique.

Avantages. — Le moins toxique des hypnotiques, ne laisse au réveil aucune sensation désagréable, procure un sommeil parfait.

Indications. — Toutes les insomnies nerveuses et douloureuses,

Mode d'emploi. — 1 à 2 cachets par jour au maximum, dans un peu d'eau, 1/2 heure avant le sommeil, à une heure de distance des repas.

Prix : 8 fr. 50 la boîte de 10 cachets.

Laboratoires J. M. RICARDOU

Décoré Docteur en pharmacie.

46, rue Pierre-Charron — PARIS.

SPARTÉINE HOUDÉ

C¹⁵ H²⁶ N².

Propriétés :

- 1° Toni-cardiaque énergique et progressif. Agit plus rapidement que la digitaline (1/2 heure après l'absorption). Régulateur du rythme cardiaque. Renforce l'impulsion systolique après l'action de la digitale. Pas d'accumulation (POUCHET). Augmente la pression moyenne (SOULA).
- 2° Action antitoxique et antitoxinique marquée (BILLARD, PERRIN et CUENOT, DUJARRIC DE LA RIVIERE).

Indications

- a. *Cardiaques* : Insuffisances cardiaques au début (dysystolie et hyposystolie). Préparation à la cure digitalique. Tonique d'entretien après celle-ci. Défaillances myocardiques des maladies infectieuses (typhoïde, diphtérie, pneumonie). Palpitations nerveuses, arythmies légères, tachycardies des cœurs irritables, angine de poitrine. Préventif des troubles cardiaques dans la rachianesthésie (RAMOND).
- b. *Générales* : Dans la diphtérie, associée au sérum ou employée seule (Mme FRONTARD). Tétanos. Cure de désintoxication des morphinomanes. Delirium tremens. Intoxications phalliniques ou par venin de vipère.

Présentation. — Granules à 2 cgr.

Posologie. — 4 à 8 granules par jour en 2 ou 4 fois loin des repas. Sans toxicité, ces doses peuvent être largement augmentées jusqu'à 15 granules et plus, le maximum étant de 50 cgr.

Laboratoires HOUDÉ

9, rue Dieu — PARIS.

SPARTO-CAMPHRE

Composition. — Solution aqueuse de campho-sulfonates de partéine (à 5 p. 100) et de sodium (à 15 p. 100), représentant 1,75 p. 100 de spartéine base.

Propriétés. — Celles du *camphre* et de la *spartéine*. Réalise une véritable synergie médicamenteuse. Les effets thérapeutiques propres du camphre et de la spartéine s'y trouvent associés et renforcés. Action immédiate et prolongée.

Indications. — Traitement d'urgence du collapsus cardiaque, des états adynamiques des maladies infectieuses, pneumonies, broncho-pneumonies, typhoïdes, gripes, etc...

Traitement préventif et curatif des accidents cardio-vasculaires des anesthésies générales, locales et de la rachianesthésie, du choc opératoire.

Indiqué également dans tous les états de déséquilibre du système nerveux vago-sympathique.

Posologie. — Injections sous-cutanées ou de préférence intramusculaires. 1 à 3 ampoules de 2 cc. par jour.

Formes. — Dragées et ampoules de 2 cc. ou de 5 cc.

Laboratoires CLIN. — COMAR et Cie.

20, rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS.

SPARTOVAL

Composition. — Isovalérianate neutre de spartéine.

Propriétés. — Toutes les propriétés cardio-régulatrices et neuro-sédatives de la spartéine, lesquelles se trouvent renforcées et dynamisées par l'acide isovalérianique.

Sédatif cardio-vasculaire par excellence. Antispasmodique et modérateur de l'excitabilité réflexe.

Indications. — Toutes les algies et tous les troubles fonctionnels des affections cardiaques et cardio-vasculaires, angors et pseudo-angors, tachycardie, arythmies, palpitations, névroses cardiaques, extra-systoles. Tous les états hyposystoliques et asystoliques au cours de l'évolution des cardiopathies, tonocardiaque d'entretien.

Posologie. — 2 à 6 pilules par jour.

Formes. — Flacon de 35 pilules dosées à 0 gr. 05.

Laboratoires CLIN, COMAR et Cie

20, rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS.

SPASMACOL

(NORMACOL ATROPINÉ)

Préparation associant le pouvoir antispasmodique de la Belladone aux propriétés émollientes et évacuantes du Normacol, mucilage parfait.

L'effet utile et maximum de l'alkaloïde est obtenu remarquablement, au point voulu, grâce :

- 1° A la forme pharmaceutique de petits grains très menus demeurant indépendants, même après gonflement, et répartis sur toute la surface du boi intestinal.
- 2° Aux propriétés émollientes du mucilage-Normacol, véhicule adéquat de l'alkaloïde.

Forme. — Granulé dragéifié en grains très menus.

Dosage. — 4/10^e de millig. d'Atropine-sulfate par cuill. à café rase.

Indications. — Toutes gastro-entéropathies avec spasmes.

Emploi. — 1 ou 2 cuill. à café aux repas ou en dehors des repas. Mettre le granulé sur la langue, puis l'avaler au moyen d'une gorgée de liquide.

Prix : 16 francs.

Laboratoire NORGAN

Pierre ALEXANDRE, Pharmacien

41, rue de Rome — PARIS (VIII^e).

Tél. : Laborde 08-00.

SPASMALGINE « ROCHE »

Antispasmodique vrai.

Composition. — 1 ampoule ou 1 comprimé ou 1 suppositoire contient :

A. 1 centigramme PANTOPON « ROCHE »
(Opium total injectable).

B. 2 centigrammes PAPAVERINE « ROCHE »
(Alcaloïde de l'opium le moins toxique, à propriétés spasmolytiques spéciales).

C. 1 milligramme ATRINAL « ROCHE »
(Ether sulf. d'atropine, sans action sur le centre para-sympathique).

Propriétés. — Les propriétés antagonistes des éléments entrant dans la composition de la *Spasmalgine* « Roche » expliquent la *toxicité atténuée* de ce médicament prouvée par l'expérimentation et la clinique.

Indications thérapeutiques. — Tous les états spasmodiques, et notamment coliques hépatiques et néphrétiques, spasmes du larynx, de l'intestin, de l'estomac, coliques, sueurs, diarrhées des tuberculeux, dysménorrhée, angine de poitrine, toux spasmodique, excitation ante et post-opératoire, accouchements laborieux, tous états d'hyperexcitation, etc.

Doses et modes d'emploi :

| | | |
|---|---|--|
| Voie buccale..... | { | Dose moyenne : 1 à 2 comprimés par jour. |
| | | Dose forte : 2 à 4 comprimés par jour. |
| Voie hypodermique ou intramusculaire. | { | Dose moyenne : 1 à 2 ampoules par jour. |
| | | Dose forte : 2 à 4 ampoules par jour. |
| Voie rectale | { | Dose moyenne : 1 à 2 suppositoires par jour. |
| | | Dose forte : 2 à 4 suppositoires par jour. |

Enregistré au Laboratoire national de contrôle des médicaments sous les n^{os} 504-38 (comprimés), 504-37 (ampoules).

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et C^{ie}
10, rue Crillon — PARIS (IV^e).

SPASMALONE

Composition. — Allylisopropylmalonylurée (anti-spasmodique et analgésique).

Diméthylaminoantipyrine (analgésique classique).

Crataegus (sédatif du système nerveux cardiaque et vasculaire).

Médicament du spasme par excellence. Sédatif du système nerveux. Analgésique puissant et rapide.

Indications. — *Tous les spasmes* : Laryngite striduleuse-spasme de la glotte, de l'œsophage, Hoquet, Crampes d'estomac, Coliques de toute nature, Règles douloureuses, Coliques du post-partum, etc., etc., Palpitations, Eréthysme cardiaque, Angine de poitrine. *Toutes les algies.*

Présentation. — Le Spasmalone est présenté sous forme de solution concentrée aromatisée, qui se prend dans de l'eau sucrée.

Posologie. — Une à 4 cuillerées à café par jour (1/2 doses pour les enfants). Ces doses peuvent être augmentées et même doublées sans inconvénients.

Dans les crises très douloureuses, donner 2 cuillerées à café en une fois.

Prix : 16 francs.

Laboratoires du MALONE

ANCENIS (Loire-Inférieure).

SPASMINE JOLLY

Rigoureusement atoxique.

Combinaison physiologique stabilisée de
Valériane fraîche et Aubépine.

Odeur et saveur agréables.

Le plus actif des Hypnotiques doux.

Forme. — Elixir dosé à 0 gr. 10 de chaque substance par cuillerée à café.

Doses et mode d'emploi. — 4 à 6 cuillerées à café par 24 heures ; 1/2 dose pour les enfants.

Propriétés thérapeutiques. — Antispasmodique, hypnotique et hypotenseur, régulateur cardiaque.

Indications. — Névropathies et Cardiopathies.

Prix du flacon : 12 francs.

Echantillons et littérature :

Laboratoire JOLLY

1, rue Christine — PARIS (VI^e).

Tél. : Danton 49-39. — L. N. C. M. 40-1

SPASMONEURAL

Sédatif nerveux utilisant de faibles doses de Phényléthylmalonylurée renforcées par des antispasmodiques végétaux (Formule Méglin modifiée.)

Composition :

| | |
|------------------------------|-------|
| Phényléthylmalonylurée | 0,02 |
| Extrait de Belladone..... | 0,001 |
| Extrait de Jusquiame..... | 0,02 |
| Extrait de Valériane..... | 0,06 |

pour une dragée argentée friable.

Indications :

Spasmes viscéraux, musculaires et vasculaires. Palpitations, Angors, Gastronévroses, Toux nerveuses, Dyspnées spasmodiques (asthme, laryngite striduleuse). Tremblements, Artériospasmes, Migraines, Vertiges, Mal de mer.

Nervosisme, Anxiété, Angoisses, Insomnies, Prurits, Neurotonies de la menstruation et de la ménopause.

Syndromes convulsifs, Spasmophilie, Chorée, Tics, Mal comitial.

Posologie :

Enfants : 2 à 10 ans, 1 à 3 par 24 heures (à écraser dans la confiture).

Adultes : 1 à 8 par 24 heures (avalier avec une infusion).

Prix du flacon (50 dragées) : 16 francs.

Laboratoire du SPASMONEURAL

Jean LE COULANT, Pharmacien.

239, cours de l'Yser — BORDEAUX.

SPASMORYL

(Communication à la Société de Thérapeutique).

Traitement des Spasmes digestifs et des complications mécaniques et spasmodiques de la lithiase hépato-rénale.

Formule. — Chlorure de calcium suractivé et fixable par le thiosulfate de magnésium en milieu marin.

Présentation. — 1° Intraveineux. — 2° Intramusculaire.

Indications :

Spasmes digestifs, œsophagiens, gastriques, pyloriques, duodénaux, coliques et leurs complications : dysphagie, régurgitations, atonie et dilatation gastrique, gastrites hypochlorhydriques, lenteur des digestions, renvois, vomissements, hoquet, spasmes pyloriques, colites, entéro-colites, coli-bacillose, constipation sapsmodique.

° Accidents spasmodiques et mécaniques de la lithiase hépato-rénale : Coliques vésiculaires, coliques hépatiques. Cholécystites chroniques, coliques néphrétiques, calculs et spasmes vésicaux, Prostatites.

Posologie :

Intraveine uses : 2 injections par semaine (pousser très lentement).

° Intramusculaires : 1 injection profonde tous les 2 jours.

Prix : Intraveineuses 30 francs.

Intramusculaires 25 francs.

Laboratoires "ANA"

18, avenue Daumesnil — PARIS (XII^e). Tél. : Dorian 52-12.

SPASMOSÉDINE

Antispasmodique — Sédatif nerveux.
(*Thérapeutique cardio-vasculaire.*)

Composition :

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Phényléthylmalonylurée | 0 gr. 015 |
| Bromhydrate de quinine..... | 0 gr. 05 |
| Extrait de Cratægus stabilisé... | 0 gr. 05 |
| Excipient q. s. pour 1 comprimé | <i>glutinisé.</i> |

Présentation :

Comprimés glutinisés.

Indications et posologie :

a) *Palpitations, extrasystoles, instabilité cardiaque.*

1 à 2 comprimés au début de chacun des deux principaux repas (10 jours par mois).

b) *Tous les troubles fonctionnels consécutifs aux spasmes vasculaires de l'hypertension (céphalée, bourdonnements d'oreilles, éblouissements, vertiges, etc.).*

1 à 2 comprimés au début de chacun des deux principaux repas (10 à 15 jours par mois.)

c) *Angine de poitrine et algies précordiales.*

1 à 3 comprimés au début de chacun des deux principaux repas (pendant 10 à 15 jours par mois).

Avaler avec un peu d'eau, sans sucer ni croquer.

Laboratoires DEGLAUDE

Médicaments cardiaques spécialisés.

Digibaïne, Cardibaïne, Théoxanthine, etc.

15, boulevard Pasteur — PARIS (XV^e).

Tél. : Suffren 79-59.

Belgique : Agent général : **L. Prunières**

19, rue Louis-Hap — BRUXELLES.

SPASNEUROL

Sédatif du système nerveux.

Présentation. — Comprimés dragéifiés.

Composition :

| | |
|-----------------------------|-------|
| Ext. m. de Cratægeus..... | 0,03 |
| — — Passiflore | 0,02 |
| — — Ballotte..... | 0,01 |
| — — Genêt | 0,005 |
| Intrait de Valériane..... | 0,02 |
| Bromhydrate de quinine..... | 0,01 |
| Gardénal..... | 0,01 |
| Théobromine | 0,03 |

Indications. — 1° Le Nervosisme sous toutes ses formes, émotivité, Névrose d'angoisse, Pithiatisme.

2° Etats spasmodiques (spasmes de la gorge, de l'œsophage, de l'intestin, de l'estomac, spasmes des artères, migraine ophtalmique, etc.).

3° Insomnies nerveuses, agitation nocturne, instabilité des adolescents.

Posologie. — Deux comprimés matin et soir avant les repas ; à répéter après dix jours de repos.

Prix : 18 francs.

Laboratoires VISCONTI

64, boulevard Barbès — PARIS (XVIII^e).

SPÉCIFIQUE BEJEAN

La préparation antigoutteuse et antirhumatismale la plus efficace et la plus inoffensive. Elle réussit dans les cas où les autres médicaments ont échoué.

Composition. — Contient comme principes actifs : 1 gr. de teinture de colchique et 0 gr. 20 d'iodure de potassium par cuillerée à café.

Indications. — Goutte aiguë ou chronique, Rhumatismes, Sciatique, Névralgies et, en général, toutes les manifestations douloureuses ou fluxionnaires se portant sur les articulations, les muscles et les viscères et qui soient d'origine goutteuse et rhumatismale.

Doses. — *Cas aigus* : 3 cuillerées à café par jour, dans une infusion de feuilles de frêne ou un peu d'eau sucrée, jusqu'à sédation de la douleur.

Cas chroniques : 1 ou 2 cuillerées à café par jour pendant une semaine sur deux ou pendant douze jours.

Pour les enfants et les vieillards, les doses ci-dessus devront être réduites de moitié.

La médication devra être suspendue en cas de diarrhée ou autres troubles intestinaux.

Prix : 36 francs.

Dépôt général :

30, rue des Francs-Bourgeois — PARIS

SPECTROL

Sérothérapie spécifique des anémies.

Composition. — Sérum frais hémopoïétique de cheval, prélevé sur des animaux mis en état de rénovation sanguine par saignées préalables, contenant les hémopoïétines spécifiques du Professeur Carnot (*Ac. des Sc.*, 1906). Ce sérum n'est pas inactivé par tyndalisation, ses substances minimales sont intactes.

Propriétés thérapeutiques. — 1° Agent d'Hémopoïèse (Hémopoïétines de Carnot) ;
2° Agent de Leucopoïèse et de Phagocytose (opsonines) ;
3° Action tonique générale du sérum de cheval ;
4° Agent d'Hémostase générale (Traitement prophylactique des interventions sanglantes).

Indications. — Toutes anémies, hémophilie, états hémorragipares, convalescences, déficiences organiques, tuberculose, infections et toxi-infections, cure pré-opératoire dans les interventions chirurgicales sanglantes. Pas d'accidents sériques ou infectieux.

Mode d'emploi. Posologie. — Sirop agréable à prendre.

Une cuillerée à potage le matin à jeun, dans un demi-verre d'eau froide ou tiède (jamais chaude).

Une à deux cuillerées à potage dans un demi-verre d'eau avant les deux principaux repas.

Le sérum pris dans ces conditions est rapidement évacué dans le duodénum et ne se peptonise pas.

Prix : 18 francs.

LANCOSME

71, avenue Victor-Emmanuel-III
PARIS (VIII^e).

SPICANOL

Composition centésimale:

Menthol : 0 gr. 50. — Acide formique : 1 gr. — Salicylate de benzyle : 5 gr. — Ess. térébenthine. — Ess. lavandula spica, CH Cl³, à 10 gr. — Excipient spécial : 63 gr. 50.

Topique liquide, limpide, incolore, ne tachant pas le linge, dépourvu d'odeur désagréable.

Indications. — 1° Douleurs rhumatismales et névralgiques, lumbago, sciatique, torticolis, points de côté, névrites : 1 à 3 frictions par jour (pour les enfants et les épidermes sensibles, étendre de son volume d'eau-de-vie ou d'huile).

2° Piqûres de moustiques et autres insectes : en frictions légères.

3° Contusions, foulures, époques douloureuses, coliques hépatiques. 1 cuiller à soupe par verre d'eau tiède pour compresses humides.

4° Rhumes de cerveau, enrrouement, sinusites : 40 à 50 gouttes (un tiers de cuiller à café), par bol d'eau bouillante, en inhalations, 2 à 3 fois par jour.

5° Affections pulmonaires post-grippales ou autres ; frictions de tout le thorax matin et soir.

Ne pas employer pur en compresses (vésication possible).

Prix : 12 francs le flacon de 120 cc.

Laboratoires de l'UMACETYL SPICANOL

54, rue de Sablonville, 1, rue de l'Ouest. — NEUILLY-PARIS.

G. DURAND, Pharmacien de 1^{re} classe.

Ex-interne des Hôpit. de Paris. Ex-Pharmac. de l'Hôpit. Marit. de Berck

SPIROCHTAN

Bismuthique hydrosoluble indolore à faible dose, associé au Mercure (catalyseur) et à l'Arsenic (antianémiant).

Formule :

| | |
|--|-----------|
| Pentanoldioate méthylate de bismuth .. | 32 mgr. |
| Arséniate de l'élément P. A. (Hg.) | 0 mgr. 36 |
| Anhydride arsénieux | 0 mgr. 36 |
| Sel ammoniac | 3 mgr. 3 |
| Eau distillée | 1 cc. |

Ampoule de 1 cc.

Posologie. — Traitement d'attaque : 1 cc. tous les jours. Traitement d'entretien : 1 cc. tous les 4, 5 ou 6 jours.

Avantages. — Cette synergie métallique exalte l'activité du Bismuth grâce à l'action catalytique du mercure, ce qui permet une thérapeutique antiseptique intensive et peu toxique avec de petites doses de Bi. Enfin, l'anémie bismuthique est compensée par l'arsenic agissant ici comme tonique.

La boîte de 10 ampoules : 20 francs.

Concentration spéciale pour enfants, au 1/5 de la dose pour adultes.

La boîte de 10 ampoules : 16 francs.

Laboratoires pharmaceutiques L.-G. TORAUDE
22, rue de la Sorbonne — PARIS (V°).

SPIROGYL

Onguent gingival à base d'Antivirus fuso-spirochétique.

Pour le traitement des stomatites, gingivites rebelles, pyorrhées alvéolaires graves.

A employer 3 fois par jour en massage des gencives.

Prix : le tube : 9 francs.

H. VILLETTE, Pharmacien

Marque de la Biothérapie

5, rue Paul-Barruel — PARIS (XV^e).

Tél. : Vaugirard 11-23.

SPLÉNARMONE

Composition. — Réunit en une préparation facile à prendre l'hormone anti-anémique du foie, l'hormone splénique et les acides aminés (1 ampoule ingérable de 10 cc. correspond à foie frais de veau, 50 gr.; rate fraîche, 50 gr.; acides aminés exprimés en glycocolle : 0 gr. 50.)

Propriétés thérapeutiques. — Le foie et la rate agissent en puissante synergie pour régénérer la formule sanguine et augmenter la teneur en hémoglobine du sang. Les acides aminés reconstituent les réserves azotées tissulaires et exercent une action excito-sécrétoire sur les sucs digestifs.

Indications. — Energique reconstituant, indiqué dans toutes les anémies, la tuberculose, les états consomptifs, anémiques, anorexiques, toutes les déficiences du métabolisme basal. *Adultes* : 1 à 2 ampoules par jour. *Enfants* : 1 ampoule, dans un peu d'eau tiède ou de bouillon non salé.

Prix. La boîte de 12 : 60 francs. — La boîte de 6 : 35 francs.

Les Établissements BYLA

26, avenue de l'Observatoire — PARIS

SPLÉNIQUE (Extrait) **du Docteur BAYLE.**

L'Académie de Médecine a décerné en 1931 le prix Boggio au docteur Bayle, pour ses travaux cliniques et expérimentaux sur l'action de la rate dans la tuberculose.

Tuberculose, Anémies, Déficiences organiques (**Voir Colloïdogénine**).

Maladies infectieuses (**Voir Polyvaline**).

Ces produits, préparés selon les indications de l'initiateur de la méthode, permettent d'appliquer l'opothérapie splénique avec le maximum de résultats.

Laboratoires CHAIX

8 et 10, rue Alphonse Bertillon
(ancienne rue de l'Orne) — PARIS.

SPLÉNOCRISINE

Solutions injectables de Rate désalbuminée à haute concentration.

Splénocrisine 15
(15 grammes rate par ampoule).

Splénocrisine 30
(30 grammes rate par ampoule).

Splénocrisine 60
(60 grammes rate par ampoule).

Dermatoses prurigineuses. Voir Opothérapie Fournier (Endocrisines).

Prix : la boîte de 5 ampoules :
de 15 grammes : 20 francs.

de 30 gr. : 30 francs. — de 60 gr. : 45 francs.

Laboratoires FOURNIER Frères
7, rue Biscornet — PARIS (XII^e).

SPLÉNOMANGANOL

Propriétés thérapeutiques. — Réparateur puissant, reconstituant, reminéralisateur physiologique.

Indications. — Convalescences difficiles, grosseur, allaitement, amaigrissement, rachitisme, bacilloses pulmonaires et osseuses, anémie, neurasthénie.

Formule. — Extrait de vitamine B, fluorure de calcium, extrait de rate, nucléinate de manganèse, os frais pulvérisé, surrénale, foie, moelle osseuse rouge, céréaline, arseniate de strychnine 1/2 milligr.

Forme. — Comprimés dragéifiés.

Dose et mode d'emploi. — Deux à trois comprimés à chacun des deux principaux repas.

Prix : 21 francs.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 403-4.

Laboratoires HOCQUETTE

191, rue du Faubourg-Saint-Antoine — PARIS.

SPLÉNYL

(Vitaminé.)

Composition. — Le SPLÉNYL est un reconstituant général à base de : rate, foie, muqueuse gastrique, surrénale, acides aminés et vitamines B : sa formule, rigoureusement étudiée, en fait une médication réellement active et que son prix de vente très bas rend accessible à tous les malades.

Indications thérapeutiques. — Le SPLÉNYL est le type du reconstituant général, indiqué dans toutes les Anémies, Convalescences, la Tuberculose, l'Epuisement, l'Amaigrissement, les Maladies par carence, etc...

Présentation et posologie. — Le SPLÉNYL est vendu sous deux formes : en ampoules *ingérables* de SPLÉNYL de 5 cc. (boîtes de 6, 12 et 30 ampoules) et *Sirop de Splényl* (flacon de 190 cc.).

Adultes : 2 à 4 ampoules ou 2 à 4 cuillerées à soupe de sirop par jour.

Enfants : 1 à 2 ampoules ou 1 à 2 cuillerées à soupe de sirop par jour.

Prix :

Sirop : 18 francs.

Ampoules. Boîtes de 6 : 11 francs ; boîte de 12 : 21 francs ; boîte de 30 : 48 francs.

Les Établissements BYLA

26, avenue de l'Observatoire — PARIS.

SPYROLIDES

Composition. — Comprimés gynécologiques à base de bleu de méthylène, méthylbenzénols, tanin, perborate de sodium (oxygène naissant).

Présentation. — Dernier mot de la science pharmaceutique en matière de comprimés gynécologiques. Emploi commode et discret ; dissolution complète et instantanée ; ni caustiques, ni irritants, ni toxiques. Désodorisants, décongestionnants, antiseptiques. Ne tachent pas. Parfum agréable.

Propriétés thérapeutiques. — Au contact de l'eau, les *Spyrolides* produisent instantanément un vif dégagement d'oxygène, donnant une solution puissamment bactéricide, dont l'emploi, même prolongé, n'irrite jamais les muqueuses, favorisant au contraire leur rapide régénération et assurant la défense de leur vitalité.

Mode d'emploi. — Un ou 2 comprimés par litre, pour l'injection quotidienne ou biquotidienne de propreté et d'hygiène.

A titre curatif : 2 à 3 comprimés par litre, en cas de leucorrhée, métrites, vaginites, salpingites, etc..., ou après l'accouchement.

L'eau *Spyrolidée* par 1 ou 2 comprimés désodorise complètement la peau (transpiration excessive des aisselles, des pieds, etc.).

Prescrire : *Spyrolides* : 1 tube (faire suivre du nombre d'injections quotidiennes et du nombre de comprimés à employer).

Tube de 28 comprimés : Prix : 8 fr. 95.

Echantillons et littérature :

Laboratoires du D^r NARODETZKI
19, boulevard Bonne-Nouvelle — PARIS

STAL-KOSAL

« La poudre qui calme »
Coréïne bismuthée.

Pansement gastro-intestinal.

Poudre et tablettes.

Formule. — Coréïne, mucilage pur, et carbonate de bismuth, chimiquement pur, associés au kaolin et au Co^3Ca .

Indications. — Toutes les Gastrites et toutes les Colites. Toutes les inflammations du Cœcum.

Mode d'emploi :

Poudre : Une cuillerée à soupe *bien délayée* dans un demi-verre d'eau légèrement tiède, le matin au lit et à jeun. Une deuxième cuillerée à soupe le soir, une heure avant le dîner.

Et une cuillerée à dessert au moment des douleurs.

Tablettes : dès l'apparition des douleurs, prendre 2 tablettes. Si après quelques minutes les douleurs persistent, prendre une demi-tablette de 5 en 5 minutes jusqu'à sédation.

Prix : 20 francs.

Admis aux Assurances Sociales.

Laboratoires A. DANIEL-BRUNET

62, Bd Jean-Jaurès — BOULOGNE-SUR-SEINE

Tél. : Auteuil 11-86. — Paris-Ouest.

STALYSINE

Vaccin curatif antistaphylococcique

Indications. — Furunculose, anthrax, acné, et toutes affections d'origine staphylococcique.

Double supériorité : Action directe sur le microbe, pas de réaction fébrile.

Formes :

Buccale, *la plus pratique* (10 ampoules de 3 cc.).

Une ampoule le matin à jeun dans un peu de liquide non sucré.

Injectable, *la plus rapide et la plus sûre*
une ampoule de 1 cc. par jour.

Filtrat, pour applications sur les foyers ouverts (6 ampoules de 3 cc.).

Prix : 10 ampoules 25 fr. — 5 ampoules 13 fr.
Pour cliniques et hôpitaux : boîtes de 50 ampoules.

Laboratoires du D^r P. ASTIER

41, 42, 43 à 47, rue du Docteur-Blanche, PARIS

STANION

Description. — Etain colloïdal en capsules et en ampoules.

Capsules : contiennent 0 gr. 05 d'étain colloïdal avec enrobage glutinisé (50 capsules par flacon)

Ampoules : contiennent 3 cc. de solution isotonique d'étain colloïdal électrique (4 ampoules par boîte).

Action thérapeutique. — L'étain colloïdal s'emploie dans le traitement de toutes les staphylococcies où il permet d'obtenir la régression de l'œdème, suppression de l'inflammation et de la douleur, retour à la température normale, assèchement des foyers, expulsion aisée des bourbillons ; les récidives sont évitées.

Indications. — 1 à 2 ampoules par jour dans le traitement des staphylococcies, soit au voisinage de l'abcès, soit dans la fesse.

Capsules : 4 à 10 par jour dans le traitement des furonculoses, folliculites, anthrax, phlegmons, panaris, abcès tubéreux, pyodermites, sycosis, septicémies staphylococciques.

Prix : Ampoules : 30 francs. Capsules : 25 francs.

Laboratoires CH. COUTURIEUX

18, avenue Hoche — PARIS

STANNOBARDANE HENRY

L'*Étain* sous forme de *Peptonate* produit les effets suivants :

- 1° Soulage la douleur dès le début du traitement ;
- 2° Arrête la marche de l'inflammation, fluidifie le pus et fait résorber le bourbillon sans qu'il soit besoin d'exercer une pression.
- 3° Produit rapidement la guérison ;
- 4° Empêche la formation de nouveaux foyers.

Il existe deux préparations à base de *Peptonate d'étain* :

- 1 Le **Stanno-Bardane Henry** (*Peptonate d'étain* + Extrait de Bardane stabilisée) ;
Le *Stanno-Bardane Henry* est présenté sous deux formes :

A. *Stanno-Bardane-gouttes* (LX gouttes répondant à 0 gr. 01 d'étain pur).

Doses. — LX gouttes à 1 cuillerée à café 3 fois par jour dans un liquide. Le flacon : 16 fr. 50. Traitement : 5 jours.

B. *Stanno-Bardane-pilules* (chaque pilule répondant à 0 gr. 015 d'étain pur).

Doses. — 3 pilules par jour. Le flacon : 19 francs pour un traitement de 15 jours.

- 2° Le **Peptonate d'Étain Henry** (solution sans Extrait de Bardane permettant un traitement interne et externe. Dosage en étain pur : 0 gr. 015 par XX gouttes).

Doses. — De XX à XL gouttes 3 fois par jour. Le flacon : 18 francs pour 10 jours.

En *lavages*, employer 1 cuillerée à café pour 100 gr. d'eau distillée, l'eau ordinaire provoquant un précipité.

Laboratoires HENRY

39, rue de Sclessin — LIÈGE.

STANNOXYL

Oxyde d'étain et étain métallique
absolument purs.

Indications. — Furonculose et toutes affections à staphylocoques, acné, anthrax, abcès du sein chez les nourrices, etc.

Formes. — Pour l'usage *interne* : comprimés, cachets, ampoules. — Pour l'usage *externe* : liquide, pommade.

Avantages. — Traitement **pratique, rapide et définitif** : l'ingestion quotidienne de 4 à 8 comprimés fait disparaître l'inflammation et les douleurs et arrête l'évolution de la maladie.

Prix : Tube de 80 comp. : 15 francs.

— Boîte de 20 cachets : 17 fr. 50.

— Boîte de 8 amp. : 22 francs.

Laboratoires ROBERT et CARRIERE
37, rue de Bourgogne — PARIS

STAPHYLAGONE

Vaccin antistaphylococcique, antitoxique et antimicrobien composé de :

Corps microbiens + lysat + anatoxine.

Indications. — Vaccination pré-opératoire et traitement de toutes les suppurations et *infections rebelles* à Staphylocoques. Zona.

Posologie. — Une injection sous-cutanée tous les deux ou trois jours, de 1/2 à 2 cc. progressivement.

Les 6 ampoules. Prix : 30 francs.

Littérature et échantillons :

Produits Biologiques CARRION

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré — PARIS
Tél. : Anjou 36-45 (2 lignes).

STAPHYLASE

du Docteur DOYEN.

Solution concentrée des principes actifs des levures de bière et de vin.

Indications. — Acné, Furunculose, Anthrax, Ostéomyélite, Impétigo, Angines, Bronchites, Pneumonies, Gripes, Coryza, Stomatites, Dyspepsie, Entérites.

Doses. — *Adultes* : 4 à 12 cuillerées à soupe par jour. *Enfants* : 1 à 4 cuillerées à café par jour.

Associée à l'iodure de potassium et au bromure de potassium, la Staphylase a la propriété d'annihiler les effets secondaires de ces produits.

Prix : 20 francs.

Laboratoires LEBEAULT
BESINS et C^{ie} pharmaciens
5, rue Bourg-l'Abbé — PARIS (III^e)

STAPHYLOCIDE AUDRAS

Tablettes sucrées parfumées à la menthe, dosées à 0 gr. 25 d'Étain-Oxyde d'étain plus purs et plus solubles que les produits commerciaux, parce que « Étain d'électrolyse ».

— Croquer 2 à 4 tablettes par jour, aux repas de préférence.

— Contre furunculose, acné, orgelets, phlegmon, abcès divers et toutes infections staphylococciques.

Enfants et adultes : pas de contre-indication.

NOTA. — Préparation particulièrement *pratique, absorbable, efficace*, à cause de sa forme de tablettes, nécessitant une longue trituration et division des principes actifs avec le sucre, et leur assurant en outre une fine émulsion par la salive. L'étain arrive ainsi à l'estomac dans l'état idéal pour une absorption rapide et totale.

La boîte (10 à 20 jours) : **12 fr.** toutes pharmacies.

Demander échantillon à :

Laboratoire du STAPHYLOCIDE AUDRAS
112, rue de Gerland — LYON.

STAPHYLO-COCCINE FRAQUET

Extrait protoplasmique de la levure de bière isolé de sa membrane cellulaire. La levure est ainsi de digestion plus facile, d'action plus prompte à doses moindres.

Propriétés thérapeutiques. — Agent de la phagocytose. Abaisse la glycémie.

Indications. — Furunculose, Anthrax, Angine, Maladies infectieuses, Dermatoses. Diabète, Acidose.

Doses et mode d'emploi.

Adultes : 2 à 5 cuillers à soupe par jour.

— : 4 à 10 comprimés —

Enfants : Moitié de ces doses ou moins suivant l'âge.

Prix au public :

Solution, Comprimés : 15 fr.

Autorisé par les Assurances Sociales.

Laboratoire des Produits SCIENTIA

D^r E. PERRAUDIN, pharmacien

21, rue Chaptal — PARIS.

STAPHYLOTHANOL

Hydroxyde de Bismuth radifère.

Indications thérapeutiques. — Toutes les staphylococcies : Furoncles, Anthrax, Abscess tubéreux de l'aisselle, Ostéomyélites, Ostéites, etc.

Se recommande dans les cas rebelles à toute autre médication.

Posologie et Présentation :

Adultes : 1 ampoule de 2 cc. tous les 3 jours ou 1 suppositoire tous les 2 jours.

Boîte de 6 ampoules..... 18 fr.

Boîte de 10 suppositoires..... 15 fr.

Enfants : 1 ampoule de 1 cc. tous les 3 jours ou 1 suppositoire tous les 2 jours.

Boîte de 6 ampoules..... 13 fr.

Boîte de 10 suppositoires..... 12 fr.

Laboratoire G. FERMÉ

55, boulevard de Strasbourg — PARIS (X^e).

R. C. Seine 143-981.

STAPHYLO-VACLYDUN

Lysats vaccins du Docteur Duchon.

Composition. — Lysat de Staphylocoques.

Indications. — Furunculose, Anthrax, Abscess et lymphangites du sein, Pleurésies purulentes à Staphylocoques, Staphylococcémies.

STREPTO-VACLYDUN

Composition. — Lysat de Streptocoques hémolytiques.

Indications. — Erysipèle, Lymphangites, Pleurésies purulentes à streptocoques, grandes infections à Streptocoques.

Posologie. — Les lysats vaccins s'emploient à la dose de 1/2 cc. pour la première injection, les suivantes 1 cc. tous les jours jusqu'à apyrexie, puis tous les deux jours. Mêmes doses pour enfants et adultes.

Présentation. — En boîte de 6 ampoules de 1 cc.
Prix : 25 francs.

Laboratoire Pharmaceutique CORBIERE

27, rue Desrenaudes — PARIS (XVII^e).

Tél. : Carnot 78-11.

STAPROLYSAT

Vaccin neurotrope.

Indications. — Tous les accidents du système nerveux central ou périphérique auquel on attribue une origine infectieuse.

Névrites, Polynévrites, Névralgies, Névrauxites, Radiculites, Myélites, Encéphalites et ses séquelles, Sclérose en plaque, Tabès, Parkinson, Herpès, Zona.

Composition. — Autolysat neurotrope de *Staphylococcus* et de *B. Prodigiosus*.

Forme. — Ampoules de 1 cc. à doses progressivement croissantes divisées en quatre séries.

Série I. — 6 ampoules numérotées de Dose 1 à Dose 6, dosées de 0 cc. 02 à 0 cc. 75 d'autolysat neurotrope.

Série II. — 6 ampoules semblables, dosées à 0 cc. 1, d'autolysat neurotrope.

Série III. — 6 ampoules semblables, dosées 0 cc. 2 d'autolysat neurotrope.

Série P. — 6 ampoules semblables, dosées à 0 cc. 1 d'autolysat renforcé par 5 milliards de corps microbiens pyocyaniques.

Mode d'emploi. — Une injection intramusculaire tous les 2 ou 3 jours. Injecter en tous cas sans arrêt les 3 premières séries et au besoin la série P.

Dans les cas aigus, difficiles ou rebelles, on choisira entre les injections intramusculaires de série P (sans passer par les premières séries) ou les injections intraveineuses de séries I et II. Associer le traitement iodé. (Nous demander renseignements.)

Les trois premières séries sont totalement indolores et apyrétiques. La série P employée dès le début provoque une réaction fébrile légère (38° à 39°).

Prix :

Les trois premières séries : 30 francs l'une.

Série P : 35 francs.

Nota. — En prescrivant, bien spécifier la série demandée et rappeler :

Laboratoires pharmaceutiques L.-G. TORAUDE

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V°).

STAVAFER

(Ancienne dénomination **STOVAFER.**)

Granulé

Médication reconstituante à base de Stovarsol, Fer, Mg, Soude, Chaux, Manganèse. 1 cuillerée à café contient 0,05 de Stovarsol.

Indications. — Asthénie, Anorexie, Anémie, Maladies infectieuses et parasitaires.

Mode d'emploi. — *Enfants*, à partir de 3 ans : 2 cuillerées à café par jour.

Adultes : 3 cuillerées à café par jour.

Prix de vente : 20 francs.

Laboratoires RICHER

Docteur en pharmacie

45, Faubourg Saint-Denis-1, rue d'Enghien
PARIS.

STÉRAMINE

Crème antiseptique hydro-soluble.

Composition. — Crème onctueuse stéaro-sodique contenant 1 p. 100 de Clonazone Daufresne, libérant lentement dans la plaie de l'hypochlorite naissant.

Indications. — Plaies récentes ou infectées, brûlures, engelures, ulcères variqueux.

Mode d'emploi. — Appliquer une fois par jour une couche de 2 à 3 millimètres d'épaisseur et recouvrir d'un pansement sec.

Avantages. — Action antiseptique prolongée, pansement propre et sans odeur, cicatrisation rapide.

Prix : 5 fr. le tube.

Echantillons médicaux sur demande.

Laboratoire

des **ANTISEPTIQUES CHLORÈS**

42, rue Thiers — LE HAVRE.

STÉROBI

Composé bismuthique liposoluble à employer comme traitement de la syphilis à toutes ses périodes.

Composition et propriétés. — Le Stérobi est un bismuthostérol dosé à 0 gr. 06 de Bismuth-métal par ampoule de 4 cc. (travaux de M. Auger, prof. de Chimie analytique à la Sorbonne). C'est le seul composé unissant au bismuth un dérivé du cholestérol, ce qui lui confère, entre autres avantages, une affinité élective pour le tissu nerveux, une puissance tréponémicide renforcée, une action anti-anémique compensatrice, et une résorption intégrale *rigoureusement* indolore. (Thèses de Marcovici et de Guyon. — Travaux de Cailleret, Leroy, Carteaud, Fuchs, etc).

Posologie. — 1 à 2 injections intramusculaires par semaine.

Totaliser 12 injections par série.

Présentation et prix :

La boîte de 6 ampoules de 4 cc. : 20 fr.

La boîte de 12 — — : 32 fr.

Thérapeutique infantile. — Ampoules de 1 cc. dosées à 0 gr. 015 de Bi. Le Stérobi est le seul bismuth liposoluble utilisable commodément chez l'enfant grâce à ce dosage.

Prix : La boîte de 12 ampoules de 1 cc. : 22 fr.

Littérature et échantillons :

Laboratoires SFÉAT

15, rue Catulienne — St-DENIS (Seine).

STÉROGYL

Solution huileuse de Vitamine D cristallisée, chimiquement pure : substance inaltérable dénuée de toute toxicité et dont l'action est constante.

Propriétés thérapeutiques. — Puissant antirachitique, le STÉROGYL est le traitement de toutes les décalcifications. La Vitamine D est la seule partie agissante de l'huile de foie de morue qu'elle remplace dans toutes ses indications.

Indications thérapeutiques. — Tous les états rachitiques, tous les troubles du métabolisme du calcium, toutes les déperditions en chaux et en phosphates ; les états ganglionnaires, les anémies pré-tuberculeuses, post-infectieuses et gravidiques, la carie dentaire. Facilite la consolidation des fractures.

Présentation. — Flacon de 10 cc. contenant 5 mgr. de Vitamine D (X gouttes = 0 gr. 002).

La faible quantité d'huile administrée à chaque prise n'est pas susceptible de provoquer le moindre trouble digestif, même chez les nourrissons les plus fragiles.

Posologie. — Jusqu'à 1 an : X gouttes par jour ; de 1 à 10 ans : X à XX gouttes ; au delà de 10 ans et chez l'adulte : XX à XXX gouttes.

Prix au public, le flacon : 15 francs.

Laboratoires du Docteur ROUSSEL
89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI^e).

STHÉNOLÉINE

HUILE OPTHÉRAPIQUE
TONIQUE ET ANTISEPTIQUE
INJECTABLE

CHOLESTÉRINÉE ET GOMÉNOLÉE

IRRADIÉE AUX RAYONS ULTRA-VIOLETS

POUR LA MISE EN ÉTAT DE DÉFENSE DE TOUT
ORGANISME DÉFICIENT

CONTRE LES GRANDES INFECTIONS

Méthode d'immunisation artificielle préventive et curative
par voie intramusculaire.

— PRÉSENTATION —

PRÉSENTÉE SOUS FORME D'AMPOULES DE 2 C.C.

— COMPOSITION —

| | | | |
|----------------------------|-----------|-----------------------|----------|
| Cholestérine pure. | 0 gr. 02 | Goménol | 0 gr. 03 |
| Lipoïde de Rate. | 0 gr. 02 | Camphre du Japon. . . | 0 gr. 03 |
| Lipoïde de Bile | 0 gr. 001 | Eucalyptol | 0 gr. 01 |
| pour 1 c. c. | | | |

Excipient : Huile d'olive surfine, chimiquement épurée,
lavée à l'alcool et stérilisée.

— INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES —

Toutes déchéances organiques

Anémies, Chlorose, Lymphatisme, Scrofule, Arriération,
Amaigrissements, Prétuberculose, Déminéralisations.

Toutes maladies infectieuses

Grippe, Fièvre typhoïde, Paludisme, Rhumatisme, Pleurésies,
Tuberculose confirmée, Pneumonie.

RARES CONTRE-INDICATIONS

— MODE D'EMPLOI ET DOSES —

La " Sthénoléine " s'injecte dans les muscles de la région fessière
suivant la technique habituelle.

Doses moyennes pour 48 heures en une seule fois

ADULTES : Une ampoule de 2 c. c.

| | | |
|-------------|---------|-------------|
| ADOLESCENTS | ENFANTS | NOURRISSONS |
| 1 c. c. 1/2 | 1 c. c. | 1/2 c. c. |

tous les 2 jours

jusqu'à concurrence de 10 injections consécutives

Plusieurs séries de 10 injections s'imposent parfois avec ou sans
interruption entre chaque série.

Pour la durée du traitement, se conformer aux indications
du Médecin.

— PRIX DE VENTE IMPOSÉ —

L'étui de 10 Ampoules de 2 c. c. (Modèle unique) : 25 fr.

LABORATOIRES DU DOCTEUR L. DELALBRE

PRODUITS PHARMACEUTIQUES SPÉCIALISÉS

Opothérapie - Colloïdothérapie micellaire - Phytothérapie

DÉPOT GÉNÉRAL

2, R. CLAUDE MATRAT - 188Y-LES-MOULINEAUX (Seine)

Fabrication Française.

Téléph. : MICHELET 24-11.

G. R. LANG, Pharmacien de 1^{re} classe.

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

STHÉNOXAL

Médication réparatrice et reconstituante, en comprimés dragéifiés. Fer et Arsenic organiques, Kola ; Strychnos.

Indications. — Syndromes d'hypovitalité générale. Insuffisances, appauvrissements et affaiblissements organiques. Grossesse, allaitement, vieillesse. Anémies, chlorose, hérédité. Déchéances progressives. Convalescences. Intoxications et toxi-infections.

Emploi et doses :

Adultes : 3 comprimés par jour au total, aux repas ; avaler sans croquer.

Vieillards : 2 comprimés par jour.

Enfants : A partir de 6 ans : 1 comprimé par jour ; de 10 à 15 ans : 1 ou 2 comprimés par jour ; de 15 à 18 ans : 2 comprimés par jour.

Prix : 17 francs.

Echantillons grandeur normale sur demande :

Laboratoire d'Hygiène et Thérapeutique appliquées

47, rue Bokanowski — ASNIÈRES (Seine).

STILLARGOL

Solution de protéinate d'argent convenable, aux concentrations de 1, 2, 5, 10 p. 100.

Antiseptique puissant, ne donnant pas sur le linge de taches indélébiles comme le nitrate d'argent. Son emploi, qui a été étendu aux cas les plus variés de la pratique médicale et chirurgicale, ne donne des résultats satisfaisants que si le protéinate d'argent est très pur.

Présentation. — En flacons compte-gouttes M.S. à pointe mousse. D'où les avantages suivants :

1° *Commodité* : Point n'est besoin de couper les pointes du flacon.

2° *Sécurité* : Aucun risque de blesser le patient par les petites aspérités résultant d'une ouverture défectueuse de la pointe.

Usages. — *Oculistique* : Désinfection de l'œil, quelques gouttes, 2 ou 3 fois par jour de STILLARGOL à 2, 5, 10 p. 100, suivant les cas.

Obstétrique : Désinfection des yeux du nouveau-né, avec 2 gouttes de STILLARGOL à 1 ou 2 p. 100.

Rhino-pharyngologie : Coryza, Rhinites, Sinusites, etc., STILLARGOL à 1, 2 ou 5 p. 100.

Affections de l'oreille : STILLARGOL à 5 ou 10 p. 100.

Pédiatrie : Désinfection nasale, oculaire et auriculaire.

Prix : 1%, 2% : 12 francs. — Prix : 5%, 10% : 13 francs.

Laboratoires MAYOLY-SPINDLER

1, place Victor-Hugo — PARIS (XVI^e).

LE MARINEL, pharmacien.

4, avenue Orban Van Volxem — BRUXELLES.

STIMYL

Présentation :

| STIMYL „ M ", p ^r une dragée | | STIMYL „ F ", p ^r une dragée | |
|---|--------|---|--------|
| Nucléinate de Mn | 0,05 | Nucléinate de Mn | 0,05 |
| Fluorure de Mg | 0,01 | Fluorure de Mg | 0,01 |
| Phosphure de Zn | 0,0025 | Phosphure de Zn | 0,0025 |
| Chlorhy. d'Yohimbine | 0,0025 | Chlorhy. d'Yohimbine | 0,0025 |
| Extrait de Noix Vomique. | 0,005 | Extrait de Noix Vomique. | 0,005 |
| — de Damiana | 0,05 | — de Damiana | 0,05 |
| — de Kola stabilisée. | 0,10 | — de Kola stabilisée. | 0,10 |
| Antéro-hypophysine | 0,01 | Antéro-hypophysine | 0,01 |
| Cortico-surrénine | 0,02 | Cortico-surrénine | 0,02 |
| Thyroidine | 0,01 | Thyroidine | 0,01 |
| Extrait testiculaire stand. | 0,15 | Extrait ovarien stand | 0,15 |

Indications. — Asthénie physique ou cérébrale, dépression morale, sénilité précoce, neurasthénie sexuelle, impuissance masculine, frigidesité féminine, ménopause.

Posologie et mode d'emploi :

- Tonique neuro-musculaire* : 2 dragées par jour 1/2 heure avant les repas pendant un mois.
 - Aphrodisiaque* : 3 dragées par jour pendant 4 ou 5 jours consécutifs.
- L'étui de 24 dragées : 24 francs.

Laboratoires FALQUE
BESANÇON.

STOMAROL

Estomac de porc desséché et délipoidé
(Méthode de Castle.)

Composition. — Le Stomarol est un Extrait d'estomac de porc desséché et délipoidé selon un procédé spécial qui permet de conserver intégralement au produit les ferments résolutifs de la viande tels qu'ils se trouvent dans un estomac normal.

Présentation. — Forme poudre, insoluble, sans mauvais goût, dont :

30 gr. représentent 250 gr. estomac frais de porc.

Indications. — Le Stomarol est recommandé dans tous les cas d'insuffisance gastrique et particulièrement dans l'anémie pernicieuse accompagnée d'achylie.

Posologie :

Adultes : 20 à 30 grammes par jour (2 à 3 cuillerées à soupe).

Enfants : 10 à 15 grammes par jour (2 à 3 cuillerées à dessert).

Mode d'emploi. — A prendre au début des repas délayé dans : potage, lait, purée de légumes, confiture, etc.

Prix : 30 francs.

Laboratoire Albert ROLLAND
4, rue Platon — PARIS (XV^e).

STOMÉOL-VICHY

Poudre-Cure alcaline.

Composition. — Papaine, Kaolin, Carbonate de Chaux, Magnésie, Phosphate de Chaux, Sel de Vichy, Ess. de Menthe.

Indications. — Le meilleur saturant des Hyperacidités gastriques. Digère les albuminoïdes. Agit aussi bien en milieu acide que neutre ou alcalin.

Posologie. — 1 cuillerée à café dans un peu d'eau, après les repas ou au moment des douleurs.

Prix du flacon : 15 francs.

Laboratoire CHEVILLON

99, rue de Paris — MASSY (Seine-et-Oise).

STOMOBROL

Sédatif et Curatif puissants des Gastropathies, Troubles dyspeptiques douloureux.

Propriétés thérapeutiques. — Pansement véritable de la muqueuse gastrique par le Kaolin.

Antiseptique : par le Carbonate de bismuth.

Absorbant : par le Carbonate de chaux léger et la Magnésie hydratée.

Sédatif : par le bromure de sodium, la belladone, la codéine.

Musculoprotéique : par la noix vomique qui rétablit les contractions normales de l'estomac rendues indolores par la belladone.

Reconstituant : par le phosphate tricalcique et la strychnine (noix vomique) dans les états dépressifs consécutifs aux gastropathies.

Indications. — Dyspepsies, hypersthénies, gastralgies, pyrosis, ulcères, aérophagies, anorexies d'origine digestive. Entérites aiguës et chroniques.

Présentation et mode d'emploi. — Poudre : 1 à 2 cuillerées à café délayées dans un peu d'eau après les repas ou au moment des douleurs.

Cachets : 2 à 4 par jour, après les repas ou au moment des douleurs avec une infusion chaude de préférence.

Littérature et échantillons sur demande.

Prix : 15 francs.

Laboratoires CLAVERIE

4, avenue de Brazza — ROMAINVILLE (Seine).

STOMOPHILE

RÉGULATEUR ÉNERGIQUE DES FONCTIONS
STOMACALES
(Alcalin-Antiferment.)

Forme. — Paquets de saturation.

Composition. — Alcalins (sodium, calcium, magnésium). Bismuth (professeur Hayem).

Indications. — Dyspepsie, Gastralgie, Gastrites aiguë et chronique. Hyperchlorhydrie, Hypersthénie, Pyrosis, Ulcère.

(Supprime, dans de nombreux cas, l'atonie intestinale.)

Posologie. — Un paquet délayé dans un peu d'eau, à la fin ou 1 heure après les principaux repas.

Dans les crises aiguës, prendre supplémentairement 1 ou 2 paquets dans le courant de la journée.

INNOCUITÉ ABSOLUE

Littérature et échantillon gratuit à MM. les Docteurs pour leurs essais cliniques.

Prix : 12 francs.

Peut être prescrit aux Assurés Sociaux.

Laboratoires DORANTOWICZ
17 bis, avenue Parmentier — PARIS

STOMOXYGÈNE

Troubles gastro-intestinaux. Constipation. Fétidité de l'haleine, insuffisance hépatique.

Composition. — Peroxyde de magnésie, chimiquement pur, extraits biliaires, émodine et belladone (Travaux de Tschirch).

Forme. — Comprimés dragéifiés.

| | | | | | |
|---|---|--|-------------|---|-------------------------|
| Double réaction en milieu stomacal. | { | Dégagement d'O. | } Naissant. | { | Action antiseptique. |
| | | Production de chlorure de magnésium. | | | } Naissant. |

Propriétés thérapeutiques. — Action antifermentescible désinfectante antiseptique, anti-colibacillaire. Effets toniques et cytophylactiques des sels halogènes magnésiens. Laxatif puissant, sans accoutumance.

Indications. — Toutes les dyspepsies. Constipation sous toutes ses formes. Fétidité de l'haleine. Toutes les fermentations. Rééducation intestinale, colites, entérocrites, etc... et toutes les manifestations colibacillaires.

Mode d'emploi. — 1 à 2 pastilles avant chaque repas. Littérature et échantillons.

Prix : 12 francs.

Société Française d'Extension Bio-Chimique
2 bis, rue du Chevalier-de-la-Barre — SAINT-QUENTIN (Aisne)

STOPRAL

Analgésique, sédatif, antipyrétique, régulateur nerveux. Strictement atoxique. Formule établie pour adultes seulement.

Comprimés à avaler, ou à déliter dans l'eau auparavant.

Indications. — Douleurs de la goutte, de l'arthritisme.

Névralgies.

Règles douloureuses, spasmes douloureux.

Fièvre, malaises généraux, grippe, maladies fébriles.

Migraines, céphalées, coryza.

Le STOPRAL ne provoque aucune fatigue des voies digestives,

Exerce sur le cœur une action tonique.

Agit rapidement.

Ne présente pas de contre-indication

Doses. — Pour adultes seulement :

Un comprimé dans 1/2 verre d'eau au moment de la douleur, à n'importe quel moment de la journée. Un second comprimé peut être utile quelques heures après le premier, un troisième est rarement utile et constitue la dose maxima.

Prix : 12 francs.

Echantillon grandeur normale sur demande.

Laboratoire d'Hygiène et Thérapeutique appliquées

47, rue Bokanowski — ASNIÈRES (Seine).

STOVAÏNE

Chlorhydrate de diméthyl-amino-benzoyl-pentanol.

Anesthésique local moins toxique que la cocaïne. Vaso-constricteur et antiseptique. Pas d'accoutumance.

Indications :

Toutes les applications médicales et chirurgicales de la cocaïne.

Posologie et mode d'emploi :

Solution à 0,50 et à 1 p. 100 (Anesthésie locale), solution à 10 p. 100 (Rachi-anesthésie), Pastilles à 2 milligrammes (Affections de la bouche et du pharynx).

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« **SPÉCIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

STOVAR SOL

Acide 4 oxy - 3 acétylamino - phényl - 1 arsinique,
Forte teneur en arsenic (27,2 p. 100). S'administre par la
voie buccale.

Indications. — Traitement des diarrhées toxi-infectieuses, cryptogénétiques, parasitaires et des tuberculeux. Amibiase, Lambliose, Helminthiases, Spirochètoses intestinales, Syphilis, Pian.

Posologie et mode d'emploi :

Comprimés à 25 cgr., (flacon de 28) 5 cgr. (flacon de 70)
et 1 cgr. (flacon de 200).

Doses moyennes. — *Adultes* : 50 cgr. à 1 gr. par 24 heures. *Enfants* : 1 à 2 cgr. par 24 heures et par kilogramme de poids.

Le *Stovarsol sodique*, soluble, convient aux injections hypodermiques (paralysie générale).

Société Parisienne d'Expansion Chimique
« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône.
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

STOVÉDRINE

Pommade nasale atoxique.

Solution pour pulvérisations.

Effet puissant. Pas d'accoutumance.

Elle comprend deux principes essentiels :

La Stovocaïne (Chlorhydrate d'Amyléine).

L'Éphédrine (Chlorhydrate).

| | | | |
|----------|---|-------------------|----------|
| Formules | { | <i>Pommade :</i> | |
| | | Stovocaïne..... | 6 p. 100 |
| | | Éphédrine..... | 5 p. 100 |
| | { | <i>Solution :</i> | |
| | | Stovocaïne..... | 5 p. 100 |
| | | Éphédrine..... | 5 p. 100 |
| | | Chloretone..... | 1 p. 100 |

L'originalité de la formule de la STOVÉDRINE réside dans l'association de la Stovocaïne et de l'Éphédrine employés à un taux de concentration suffisant pour combattre efficacement :

- 1^o *Affections aiguës* : Coryza, Sinusite, Céphalée, Obstruction nasale.
- 2^o *Affections chroniques* : Asthme, Rhume des foins.

Posologie. — *Pommade* : Introduire gros comme un pois dans chaque narine. Masser pour répartir la pommade.

Solution pour pulvérisations : Pulvériser à une ou deux reprises, 3 fois par jour, dans chaque narine la solution de Stovédrine.

Prix : Pommade : 12 francs.

Solution avec pulvérisateur : 20 francs.

Solution (flacon rechange) : 14 francs.

Laboratoires LICARDY

38, boulevard Bourdon

NEUILLY-PARIS. — Tél. : Maillot 17-75.

STOVOLÉINE

Baume nasal aseptique, vaso-constricteur, anesthésique, non toxique, non caustique.

Composition. — Acide borique porphyrisé, Stovaine, Solution d'Adrénaline à 1/1000, Essence de Géranium rosat, vaseline et huile de vaseline stérilisées.

Propriétés. — Lubrifie, décongestionne et lénifie la muqueuse nasale.

Indications. — Effet incontestable et rapide dans tous les cas de rhinite aiguë spasmodique. Souveraine dans le coryza chez l'adulte et chez l'enfant. Aucune contre-indication.

Mode d'emploi. — Après avoir mouché de l'une et l'autre narine alternativement, 3 fois par jour gros comme un petit pois par chaque narine.

Présentation. — Tube d'étain pur avec olive nasale.

Prix : 8 francs.

L. N. C. 314-36

Laboratoires ECHEMAN

26, rue des Moines — PARIS (XVII^e).

STREPTODERME

N'est pas une pommade-vaccin.

Traitement des Streptococcies et Staphylococcies cutanées.

Formule :

| | | | |
|--------------------------|----------|--------------------------|--------|
| Résorcine..... | 0 gr. 40 | Oxyde de zinc .. | 10 gr. |
| Acide Salicylique..... | 0 gr. 40 | Talc..... | 20 gr. |
| Oxyde jaune... | 4 gr. | Excipient gras | |
| Ichtyol (du Tyrol) | 8 gr. | inaltérable. | |
| | | Q. S. p. 100 gr. | |
| | | ENLEVABLE A L'EAU | |

Indications. — Impétigo, Eczéma impétiginé, Dermopépidermites strepto-staphylococciques, Parakératoses, Eczématides microbiennes, Intertrigo, Lichenification infectieuse, Dishydrose streptococcique et même mycosique, Ulcère de jambe, Furoncles, etc.

Contre-indication. — Ne pas associer le streptoderme à une médication iodée externe (formation de bi-iodure de mercure).

Prix : 10 francs.

Pharmacie MARCEAU

7, avenue Marceau — PARIS (XVI^e).

STROPHANTINE CATILLON

Forme : GRANULES DE CATILLON

à 0,0001 de Strophantine cristallisée
extraite du Strophantus Gratus.

Synonyme : **Ouabaïne.**

Indications. — Affections mitrales, Dyspnée, Oppression, Œdèmes, Asystolie, Cardiopathies des enfants et vieillards, Lésions cardiaco-aortiques. Artériosclérose avec ou sans néphrites.

Posologie. — 2 à 4 granules par jour, comme tonique du cœur.

Le flacon : 10 francs.

STROPHANTUS CATILLON

Forme : GRANULES DE CATILLON

à 0,001 Extrait titré de Strophantus.

Indications. — Asystolie, Oppression, Dyspnée, Œdèmes, Affections mitrales, Cardiopathies enfants et vieillards.

Posologie. — 2 à 4 granules par jour, comme tonique du cœur, *diurétique*.

En cas urgent, on peut donner 10 à 20 granules pour forcer la diurèse.

Le flacon : 10 francs.

Prix de l'Académie de médecine.

Laboratoire CATILLON

3, Boulevard Saint-Martin — PARIS.

STRYCHNAL LONGUET

Toutes indications de la strychnine.

Dérivé synthétique de la strychnine, de toxicité dix fois moindre.

Affections médullaires et névritiques. — Asthénie. — Neurasthénie. — Tuberculose. — Maladies infectieuses. — Convalescence. — Anémie.

Doses. — Par jour :

2 à 4 granules de 0 gr. 01 ctgr. de Strychnal.
1 à 2 ampoules de 0 gr. 01 ctgr. de Strychnal par cm³.

Le flacon de 50 granules : 14 fr.

La boîte de 12 ampoules : 18 fr.

Laboratoires LONGUET

34, rue Sedaine — PARIS (XI^e).

STRYCHNARSITOL ROBIN

Injectable.

Glycérophosphate de soude, acide nucléinique et méthylarsinate de strychnine.

Ampoules injectables de 2 cc.

Dose et mode d'emploi.

Une injection Hypodermique de 2 cc.
par 24 heures.

Prix : 18 francs.

Laboratoires ROBIN

13, rue de Poissy — PARIS.

STRYCHNOTONINE

Composition. — Une dragée =
0 gr. 003 méthylarsinate de calcium.
0 gr. 0005 chlorhydrate de strychnine.

Actions. — Tonique général et nervin, accélérateur de la nutrition, léger stomachique.

Indications. — Asthénie nerveuse, neurasthénie essentielle, psychasthénie, pithiatisme, mélancolie, anémies, convalescences, énurésies nocturnes infantiles.

Posologie. — 1 à 3 dragées 3 fois par jour avant les repas.

Présentation et prix. — Flacons de 75 comprimés dragéifiés : 17 francs.

Laboratoire R. L. MATHIVAT

66, rue de la Pompe — PARIS (XVI^e).

Tél. : Trocadéro 32-91.

STUPHO

Antidiarrhéique non toxique.

Composition. — Lactate de Chaux, Extrait de Salicaire, Benzonaphtol.

Aux propriétés antidiarrhéiques de la salicaire signalées par d'éminents thérapeutes (de ROUVILLE, CAMPARDOU, DUFOUR) s'associe l'action remarquable du Lactate de chaux dans toute diarrhée ou dysenterie.

La présentation en comprimés ou granulés en permet l'administration aisée aux enfants les plus jeunes, la solution du granulé dans l'eau donnant instantanément une préparation vanillée très agréable au goût.

Mode d'emploi. — *Comprimés* : 2 à 6 par 24 heures pour l'adulte ; 1 à 4 par 24 heures pour l'enfant, à délayer dans 1/4 de verre d'eau sucrée tiède.

Granulé : 1 à 4 cuillerées à bouche pour l'adulte.
1 à 3 cuillerées à dessert pour l'enfant,
1 à 4 cuillerées à café pour le bébé.

à croquer ou dissous dans un peu d'eau tiède.

Prix : *Granulé*, 12 fr. *Comprimés*, 7 fr.

LABORATOIRE DU MAINGUY

M. BASSIN, docteur en pharmacie — BONDY (Seine).

Echantillons sur demande.

SUCRE EDULCOR

dit le Sucre des Diabétiques.

Très ancienne préparation, très connue, recommandée aux Diabétiques par tout le Corps Médical. Une pastille suffit pour sucrer une tasse de café, thé, grog, etc...

Prix : la petite boîte : 5 fr. 50.

La grande boîte : 20 francs.

LITHARSYNE

Indications. — Traitement du diabète et de l'arthritisme par le Chlorhydro-Méthylarsinate de Lithine.

Posologie. — *Solution* : 1 cuillerée à soupe avant les repas de midi et du soir.

Gouttes : XXV gouttes avant les repas de midi et du soir dans un peu d'eau.

Comprimés : 6 par jour (3 avant chaque repas).

Prix : 12 francs.

Echantillons gratuits à Messieurs les Docteurs.

Laboratoires E. FERRÉ

19, rue Grégoire-de-Tours — PARIS (VI^e).

SUFROLAX

Régulateur physiologique des fonctions biliaires et intestinales.

Présentation. — Comprimés.

Composition. — Soufre actif. Opothérapie biliaire et pancréatique. Erepsine. Ferments lactiques, charbon activé. Extraits de laminaria et Rhamnus frangula.

Avantages. — Médication soufrée nouvelle. Antitoxique. Rééduque sans accoutumance.

Indications. — Affections hépatiques et biliaires. Dermatoses. Arthritisme, Hypertension, Constipation.

Posologie. — 1 à 6 comprimés par jour suivant avis du médecin, au début des repas, ou le soir au coucher.

Prix : 10 francs.

Laboratoires CROSNIER

44, rue de Lagny — MONTREUIL-PARIS

SULFA

Ampoules Sulfa de 10 cmo.

Monosulfure de sodium inaltérable, Soufre colloïdal (S. non oxydé).

Emploi. — Verser une ampoule dans 1 litre d'eau bouillie pour obtenir 1 litre d'eau sulfureuse artificielle type eau sulfurée de Cauterets.

Boisson, etc... (comme eau sulfureuse naturelle) gargarismes, inhalations, pulvérisations, lavage de sinus.

Avantages. — Pas d'oxydation par le transport, grande activité.

Indications. — Toutes applications O. R. L., pulvérisations, etc... et traitements sulfureux des voies respiratoires.

En méd. gén. : Bronchites chroniques, Peau, Oxyurose (lavements), etc...

Boîte de 10 ampoules : 20 fr.

Tablettes Sulfa.

Gargarisme sec Sulfo, M. boraté, cocaïné.

La boîte : 5 fr.

Société PYRNE

M. LAFITTE, pharmacien

CAUTERETS (Hautes-Pyrénées.)

SULFAN

Forme. — Pastilles à sucer lentement.

Composition. — Monosulfure de sodium, Borate de soude, Extrait d'Erysimum, Teinture d'Aconit, sucre et réglisse.

Propriétés. — Type par excellence du gargarisme sec fondé sur l'action élective du soufre, de ses vapeurs et de ses dérivés sur les muqueuses et les ganglions des voies respiratoires. Agent essentiel de métabolisme.

Indications. — Toutes les affections aiguës et chroniques du rhino-pharynx, du pharynx, du larynx, de la trachée et des grosses bronches. Tous états infectieux ou toxi-infectieux.

Posologie. — 2 à 5 pastilles par jour.

Prix : le tube de 24 comprimés : 8 francs.

Echantillons et littérature :

Laboratoire DALAYEUN, pharmacien

15, rue de Paris — SANNOIS (Seine-et-Oise).

Tél. : 19.

SULFARSÉNOL

Adopté par les Hôpitaux.

Dioxydiaminoarsénobenzène diméthylène sulfite de soude. Teneur en arsenic : 20 p. 100.

Injections (au choix du médecin) : Intraveineuses, sous-cutanées, intramusculaires.

Indications. — Syphilis, Hérédo-Syphilis, Paludisme, Pian, Infection puerpérale, Blennorrhagie, Erysipèle, Athrepsie, Anorexie des nourrissons, Goître endémique, Angine de Vincent, Dermatoses chroniques, Zona, Pyorrhée alvéolaire, Interventions chirurgicales.

Doses :

| A | B | C | D | E | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|---------|-----|----|----|----|----|-------|----|
| 5 milgr. | 1 ctgr. | 1,5 | 2 | 3 | 6 | 12 | 18 | 24 |
| 5 6 | 7 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| 30 36 | 42 48 | 54 | 60 | 72 | 84 | 96 | ctgr. | |

Voir *Arsénos-Solvant*.

Laboratoires de Biochimie Médicale
Ch. DESGREZ, Docteur en pharmacie
 19-21, rue Van-Loo — PARIS (XVI^e).
 Téléphone : Auteuil 26-62 et 04-30.

SULFARSIODE

Composition et dosage :

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Iode | 0 gr. 006 par cc. |
| Arsenic | 0 gr. 002 — |
| Soufre allylique | 0 gr. 004 — |
| 1 cc. représente 42 gouttes. | |

Indications :

Troubles ganglionnaires et lymphatiques, adénite, affections cutanées, asthme, arthritisme, engelures, accidents spécifiques héréditaires ou acquis.

Posologie :

Bébé, selon l'âge, VI à XII gouttes par jour.

Adolescents — X à XX — —

Adultes — XV à XXX — —

A prendre en 2 fois dans un peu d'eau sucrée au milieu des repas.

Forme et prix : Gouttes : 16 fr. le flacon.

Préparé par le D^r ROGER, Pharmacien.

Echantillons et vente en gros :

H. PERRIN-BRUNO,

4, rue Désirée — LYON.

J. MURARD, Pharmacien.

SULFEX

Traitement synergique.

Séborrhées, Acnés, Folliculites.

Forme. — Lotion.

Composition. — Soufre colloïdal, Ether sulfurique, Borate de soude, Teinture de benjoin, Camphre en émulsion.

Indications. — Kérose, Acnés, Eczématides, Comédons, Séborrhée, Folliculites.

Posologie. — Tamponner les parties malades le soir avant de se coucher.

Nota. — Dans les cas rebelles, ajouter au traitement externe le traitement interne suivant : *prendre deux fois par jour une mesure de SULFEX POUDRE dans un peu d'eau avant les repas.* (Chaque boîte de poudre est accompagnée d'une mesure.)

Prix :

Lotion : 15 francs.

Poudre : 16 francs.

Laboratoire du SULFEX

42, rue des Grandes-Arcades — STRASBOURG

SULFHYDRAL CHANTEAUD

Composition. — Granules contenant chacun 1 cgr. de Sulfure de Calcium pur. Au contact des liquides organiques dégage de l'hydrogène sulfuré naissant.

Présentation. — Boîtes de 10 tubes contenant chacun 20 granules.

Indications. — Antiseptique très actif des voies aériennes et digestives. Angine, Grippe, Rhume, Rougeole, Scarlatine, etc.

Mode d'emploi, doses. — Sans danger. Non toxique. On peut sucer les granules ou les dissoudre dans une eau plus ou moins chaude pour gargarisme ou boisson.

Enfants : Jusqu'à 5 granules par jour.

Adultes : Jusqu'à 12 ou 15 granules par jour.

Prix de vente : 9 fr. 90.

Laboratoires CHANTEAUD

J. LAURIN, Pharmacien.

3 et 5, rue Alexandre Dumas
SAINT-OUEN (Seine).

SULFOBYL

Forme. — Dragées glutinisées

Composition :

| | |
|---------------------------|-------|
| Soufre colloïdal..... | 0,02 |
| Extrait de bile | 0,05 |
| Extrait de foie | 0,05 |
| Entérokinase | 0,02 |
| Extrait de pancréas | 0,02 |
| Urotropine | 0,05 |
| Aloïne | 0,005 |

Par dragée.

Action thérapeutique :

Excite la sécrétion biliaire et la fonction antitoxique, assure la digestion parfaite des différents aliments, combat les infections intestinales et la constipation, évite le choc hématoclasique de Vidal.

Indications :

Insuffisances du foie et de l'appareil digestif, constipation, auto-intoxication intestinale, arthritisme, dermatoses, etc.

Mode d'emploi :

Adultes : 2 dragées après chaque repas avec un peu d'eau.

Enfants : 1 dragée.

Avaler sans croquer. — Prix : 10 francs.

Laboratoire LAFARGE

6, boulevard Arago — PARIS.

SULFOCRÈME LILESS

Composition. — Crème non grasse, contenant 20 p. 100 de Soufre précipité, desséchant et formant poudre adhérente à la peau.

Indications. — Séborrhée, acné.

Mode d'emploi. — Appliquer la crème à la toilette du soir, en massant la peau à chaque apport, pour favoriser sa pénétration ; les couches peuvent être légères dans les cas bénins et épaisses dans les cas rebelles.

La peau se nettoie avec des tampons d'ouate imbibés d'eau chaude ou par simple lavage.

Le jour, une couche légère reste invisible sous un soupçon de poudre de riz.

Prix : 7 francs.

Laboratoires FISCH et Cie
4, rue d'Illzach — MULHOUSE

Agence à PARIS :
104, faubourg Poissonnière (X^e).
Tél. : Lamartine 92-52.

SULFODERMOL FLAHAUT

Composition. — Hyposulfites benzoïnés chimiquement purs.

Forme. — Cachets.

Indications. — Eczémas, États séborrhéiques, et dermatoses associées, Acné, Pityriasis, Psoriasis, Alopécies, Furunculose, Impetigo, Sycosis, Urticaire, Troubles de la Nutrition soufrée des rhumatisants chroniques.

Mode d'emploi. — Un cachet avec un 1/2 verre d'eau avant chacun des trois repas.

Laboratoire FLAHAUT
74, rue Monge — PARIS (V^e).

SULFOÏDOL ROBIN

Soufre colloïdal.

Granulé. Ampoules, Pommades.

Doses et mode d'emploi. — Granulé : 2 cuillers-mesures 2 fois par jour. Chaque cuiller contenant 10 centigr. de soufre colloïdal. — Injectable : 1 injection par jour dans les cas graves, Dans les cas ordinaires, 1 injection tous les 2 ou 3 jours.

Indications. — Troubles de la nutrition sulfurée. Pharyngites chroniques. Bronchites chroniques. Antisepsie de l'intestin. Rhumatismes aigus et chroniques. Arthritismes. Syphilis.

Prix : *Granulé* : 16 fr. — *Ampoules* : 18 fr.
— *Pommade* : 1/15, 2/15 : 14 fr. ; 11 fr.

Laboratoires ROBIN

13, rue de Poissy — PARIS.

SULFOLAX

Laxatif doux, toni-hépatique, antitoxique,

Composition. — Soufre de l'Ichthyol, Extraits biliaires, Artichaut, Boldo, Combretum, Evonyme verte, Cascara, Agar-Agar.

Posologie. — 1 ou 2 comprimés au repas du soir.

Indications. — Constipation, Insuffisance hépatique, Auto-intoxications et tendances toxémiques, Manifestations du Neuro-Arthritisme.

Innocuité absolue, Aucun toxique, Aucun drastique. Pas d'accoutumance.

Prix du flacon de 60 comprimés : 12 francs.

Laboratoires du VAGOSEDYL

20 et 22, rue des Martyrs — PARIS (IX^e).

G. COUSSINET, Pharmacien.

Licencié ès Sciences.

SULFOSINE « LEO »

Suspension huileuse de soufre à 1 et 2 p. 100.

(Huile soufrée stérilisée.)

Indications. — Paralyse générale. Syphilis nerveuse et autres affections syphilitiques ou non du système nerveux central, telles que la démence précoce, la Schizophrénie, l'Encéphalite épidémique chronique, etc...

Forme. — Deux dosages :

1° Faible : Ampoules de 1, 2, 5 et 10 cc. à 1 p. 100 de soufre.

2° Fort : Ampoules de 1, 2, 5 et 10 cc. à 2 p. 100 de soufre.

Deux séries : 1° Une boîte de 10 ampoules de 10 cc. 2° Une boîte de 10 ampoules assorties : 2 de 1 cc. ; 3 de 5 cc. ; 5 de 10 cc.

Sulfosine anesthésique à 1 et 2 p. 100.

Néo-sulfosine en solution huileuse à 1/2 p. 100.

Mode d'emploi. — En injections intramusculaires.

Posologie. — Pour la solution à 1 p. 100 la dose initiale dans le premier traitement est de 1 à 2 cc. ; on augmente ordinairement chaque dose de 1 cc. jusqu'à 8 à 10 cc. La dose de début pour la solution à 2 p. 100 est également de 1 à 2 cc., mais la dose maxima n'atteint que 3 à 5 cc.

Valentin AAGE MOLLER

149, rue du Palais-Gallien — BORDEAUX

Dépôt pour la France :

Jean DEDIEU

39, rue Fondaudège — BORDEAUX

SULFO-THIORINE

Soufre-Hyposulfite de Soude agréable au goût

1° Affections des voies respiratoires (subaiguës ou chroniques)
Tous les catarrhes muqueux ou purulents du nez, de la gorge et des bronches.

Ozène, adénoïtes et amygdalites subaiguës ou chroniques. Pharyngites et laryngites traînantes. Trachéobronchites récidivantes. Dilatation des bronches. Expectorations tenaces (La Sulfo-Thiorine fluidifie, puis assèche les sécrétions). Bronchites persistantes des gazés. Tuberculose pulmonaire torpide non fébrile.

La cure de SULFO-THIORINE prépare et complète la cure thermique par les eaux sulfureuses ; en cas d'impossibilité de faire la cure aux sources thermales, elle peut à la rigueur y suppléer.

2° Auto-intoxication intestinale chronique et des affections qui en découlent :

Accidents anaphylactiques, aigé, eczéma, urticaire, etc.)

Laxatif léger. — Désinfectant sûr.

3° Maladies par ralentissement de la nutrition.

Arthritisme, goutte, rhumatisme chronique, etc...

4° Adjuvant indispensable des traitements par les sels d'or de mercure, de bismuth, d'arsenic.

Renforce leur action. — Empêche les phénomènes d'intoxication.

Posologie

Adultes : 1 ou 2 cuillerées à café 3 fois par jour au début des repas, à croquer ou à délayer dans un peu d'eau (diminuer la dose en cas de diarrhée très abondante).

Enfants : 1 à 3 cuillerées à café par jour suivant l'âge.

Prix : 12 fr. 50

Laboratoire de la Sulfo-Thiorine

39, rue Fondaudège, BORDEAUX

SULFOXYL

(Hydrogène sulfuré à l'état naissant.)

Quatre formes. — Pastilles, granulés, comprimés inhalants, ampoules.

Propriétés. — Médication sulfureuse active régulière, pouvant être réalisée partout et à toute époque de l'année.

Action. — Particulièrement antitoxique.

Indications. — Rhinites, Pharyngites, Angines, Laryngites, Gripes, Trachéites, Asthme, Bronchite, Coqueluche, etc... Rhumatisme, Lymphatisme, Affections de la peau et du sang.

Posologie, Mode d'emploi et Prix :

Pastilles : Etats aigus : 4 à 10 pastilles par jour ; états chroniques : 2 à 5 pastilles par jour, *enfants* 1 à 2 pastilles par jour. Prix : 14 francs.

Granulés : 4 à 9 cuillerées à café par jour suivant l'âge. Prix : 14 francs.

Comprimés inhalants : de 1 à 3 comprimés par verre d'eau. Prix : 14 francs.

Ampoules : 1 ampoule dans un litre à base à raison d'un demi-verre matin et soir. Prix : 25 francs.

Laboratoires J. BRESSIER

Docteur en Pharmacie

102, rue Vincent — MARSEILLE.

Concessionnaires :

Les Laboratoires NOVALIS

OULLINS (Rhône).

SULFUR CONCENTRÉ DAX

Soufre colloïdal par voie buccale.

Composition. — Soufre colloïdal, 1 gr. 50 pour une ampoule de 10 cc.

Posologie. — Diluer l'ampoule dans 250 cc. d'eau (1/4 de litre). De la dilution : 2 à 3 cuillerées à soupe au coucher. C'est donc une AMPOULE SEMAINE.

Avantages. — Etat colloïdal, véritable pseudo-solution conservant les mouvements browniens. Pas de mauvaise odeur sensible.

Indications. — *Arthritisme :* Rhumatisme aigu et chronique, lumbago, Dermatoses (eczéma, acné), Bronchite emphysemateuse, catarrhe. — *Oto-rhino-laryngologie :* faire 4 ou 5 inhalations avec une ampoule diluée, y associer le traitement par voie buccale. — *Adjuvant du traitement syphilitique* (Hg As Bi) doubler les doses : 5 à 6 cuillerées à soupe par jour.

Prix au public : 18 francs la boîte de 3 ampoules semaines.

Laboratoire MORELLET, Pharmacien.

Ex-Interne des Hôpitaux de Paris

BAGNOLES-DE-L'ORNE.

SULFUREUX POUILLET

Approuvé par l'Académie de Médecine.

MÉDICATION SULFUREUSE A DOMICILE

Le *Sulfureux Pouillet* pour boisson est une poudre sulfureuse amorphe créée par M. Pouillet, l'éminent professeur de Chimie.

Mode d'action. — Au contact de l'eau, formation de Monosulfures de sodium et de calcium à l'état naissant

Indications thérapeutiques. — Les propriétés sont celles des eaux minérales sulfureuses naturelles prises à la source.

Son action est merveilleuse dans les Rhumes au moment de l'expectoration, Catarrhes pulmonaires ou Bronchites, Affections du Larynx, Granulations de la Gorge, Pharyngites, **Extinctions de voix**, Catarrhes nasopharyngiens, dans l'Ozène et autres maladies du nez et de la gorge, les Diathèses arthritiques, herpétiques, rhumatismales et en lavements contre les oxyures.

Enfin l'effet curatif est surprenant dans la plupart des Eczémas, dans l'Acné et en général dans toutes les affections de la peau.

Le *Sulfureux Pouillet* s'emploie en boisson, en bains et en comprimés inhalants. Il est des plus efficaces en *inhalations* et pulvérisations.

Mode d'emploi :

- 1° *Boisson* : 1 mesure pour un verre d'eau ou de lait tiède, le matin à jeun ou matin et soir.
- 2° *Pour oxyures* : 1 lavement 5 jours de suite, faire une seconde cure au bout de 10 jours.
- 3° *Pour inhalations* : 1 mesure ou mieux 1 ou 2 comprimés dans un verre d'eau très chaude.
- 4° *Pour pulvérisations* : se servir d'un pulvérisateur Waast ou autre pour solutions aqueuses.

SULFUREUX POUILLET

pour bains et lotions.

Un flacon pour un bain d'adulte.

Un demi-flacon pour un bain d'enfant.

1 cuillerée à café pour 2 litres d'eau (pour lotions).

Prix :

Boisson : 12 francs.

Bain : 6 francs.

Comprimés inhalants : 12 fr. 50.

Laboratoire POMPANON

62 rue du Cardinal-Lemoine — PARIS (V°).

SULFURION

Description. — Complexe colloïdal isotonique, non toxique et indolore, à base de soufre, en ampoules de 3 cc. (4 ampoules par boîte).

Action thérapeutique. — Le Sulfurion libère les ankyloses dans le rhumatisme chronique, diminue les nodosités, permet le retour au fonctionnement des articulations et remédie à l'insuffisance sulfurée. En même temps les phénomènes douloureux disparaissent et le retour à la santé s'établit.

Indications. — 1 ampoule de 3 cc. tous les 2 ou 3 jours, dans toutes les formes de rhumatisme aigu ou chronique, simple, fibreux, osseux, partiel, blennorragique, et dans toutes les insuffisances sulfurées, goutte, acné, pharyngites chroniques, etc.

Prix : 30 francs.

Laboratoires Ch. COUTURIEUX

18, avenue Hoche — PARIS.

SULFURYL MONAL

Formes :

Médicamenteuses. — Trois formes : pastilles, granulés comprimés inhalants.

Hygiéniques. — Deux formes : bain, savon.

Usage interne. — Pastilles et granulé agréables à sucer ou à croquer.

Usage externe. — Comprimés inhalants pour inhalations humages, gargarismes, pulvérisations, etc.

Hygiène. — Bain tonique inodore ; savon, soins de la peau, dermatoses.

Composition. — Synthèse des eaux minérales sulfureuses.

Doses :

Usage interne. — Croquer ou sucer 2 à 6 pastilles par jour ; croquer ou prendre délayé dans un peu d'eau de 1 à 3 cuillerées à café de granulé 4 fois par jour, (forme recommandée pour les enfants).

Usage externe. — Un comprimé dans un récipient d'eau, chaude chaque 4 minutes.

Hygiène. — Un paquet bain SULFURYL MONAL, pour un bain d'adulte et 1/2 paquet pour un bain d'enfant. Savon de SULFURYL MONAL pour la toilette des peaux délicates.

Propriétés. — Permet d'instituer d'une façon active partout et en toute saison, la médication sulfureuse interne et externe.

Action. — Antiseptique et antitoxique, stimule les échanges.

Indications. — Affections de la gorge et des voies respiratoires, Grippe, Coqueluche, Lymphatisme, Rhumatismes, Syphilis, Maladies de la peau, Etats infectieux et post-infectieux.

Prix :

| | | |
|--------------------------------|-----------|----------|
| Sulfuryl Monal. Pastilles..... | le tube | : 12 fr. |
| — Granulé..... | la boîte | : 12 » |
| — Comprimés inhalants | le flacon | : 12 » |
| — Bains (sans odeur). | la boîte | 6 » |
| — Savon..... | le pain | 6 » |

Laboratoires MONAL et Cie,

6, rue Bridaine — PARIS

SULF-Y

Composition. — Fénugrec et soufre.

Forme. — Granulé sucré et anisé.

Indications. — Amaigrissement, affections chroniques du poumon (toux opiniâtre, bronchites chroniques, bronchites suspectes, prébacillose, bacillose) et de l'intestin (entérite bacillaire, entérites chroniques, infections intestinales).

Mode d'emploi. — 3 cuillerées à café par jour avant les repas.

Prix : 12 francs.

M. SALAVERT

SAINTE-FOY-LA-GRANDE (Gironde).

SULPHIUM

(Comprimés.)

Complexe de Soufre et d'Hyposulfites.

Propriétés thérapeutiques. — Le SULPHIUM permet de faire à domicile et à peu de frais la cure soufrée interne et la cure de désensibilisation.

Indications. — Affections chroniques des voies respiratoires, Rhumatismes chroniques, Dermatoses, Désintoxications métalliques.

Mode d'emploi. — Prendre de 4 à 8 comprimés par jour, de préférence aux repas.

Laboratoires BRISSON

Dr DEDET ET Cie, Pharmaciens.
Anciens Internes des Hôpitaux de Paris.
157, rue Championnet — PARIS (XVIII^e).

SUNALCOL

(Teinture de SUNOXOL).

Solution alcool-acétonique de Chlorhydrate de 8-Oxyquinoléine.

Propriétés. — Puissant antiseptique dépourvu de toute toxicité, stimulant des moyens de défense de l'organisme, ne coagulant pas les albuminoïdes. Très pénétrant et mouillant.

Supplante la Teinture d'Iode dans tous ses emplois antiseptiques et antimycosiques.

Indications. — Désinfection de la peau. Assainissement des plaies souillées, traumatiques et opératoires. Traitement des dermites cocciennes, des dermatomycoses et des levurides.

Présentation. — Solution alcool-Acétonique à 2 p. 100
Flacons de 25 cc. : 7 francs.
Flacons de 125 cc. : 25 francs.
Flacons de 500 cc. : 80 francs.

Posologie. — Emploi à l'état pur en badigeonnages et seulement en applications externes.

Établissements KUHLMANN

Produits RAL. Spécialités.

145, boulevard Haussmann — PARIS (VIII^e).

SUNOXOL

Sulfate neutre d'O-Oxyquinoléine.

Propriétés. — Antiseptique, ni irritant, ni caustique, dépourvu de toute toxicité, ne coagulant pas les albuminoïdes. Stimulant des moyens de défense de l'organisme.

Indications. — Antisepsie générale et dermatologie, otorhino-laryngologie, Ophtalmologie, Urologie, Oxyurose, Gynécologie et Obstétrique.

Présentation. — *Solution hydroglycérinée à 33 o/o.*

Flacons de 25 cc. Prix : 15 francs

Flacons de 125 cc. Prix : 48 francs

Flacons de 500 cc. Prix : 180 francs.

10 gouttes dans un verre d'eau ou le contenu de la mesure jointe à tout flacon (2 cc. 5) et versé dans un litre d'eau, donne instantanément une solution à 1/1000.

Ovules au Sunoxol. — 0 gr. 20 de Sunoxol pour un ovule.

Boîtes de 6 ovules. — Prix : 15 francs.

Pansements au Sunoxol. — Gaze imprégnée d'une solution à 10 o/o de Sunoxol sur sparadrap adhésif à l'oxyde de zinc.

La pochette. Prix : 12 francs

Mode d'emploi et Posologie. — Badigeonnage des plaies infectées et ulcérées, affection de la matrice, attouchements de la gorge avec la solution concentrée à l'état pur.

Instillations urétrales et vésicales avec la solution à 1/100 et 1/200. Gargarisme irrigations rhinopharyngiennes, lavage des plaies complexes, instillations nasales, bains d'yeux, injections vaginales, lavements avec la solution à 1/1000.

Asepsie générale, soins intimes avec la solution à 1/2000.

Etablissements KUHLMANN. Produits RAL-SPECIALITÉS.

145, boulevard Haussmann — PARIS (8^e).

SUPPARGYRES

du Docteur FAUCHER

Traitement de la Syphilis acquise ou héréditaire. récente ou ancienne. Méthode simple sous forme discrète, *voie recto-portale (voie rectale)*, active et sans inconvénient à tous les âges et dans tous les états (grossesse, fatigue, voyage, etc.).

Forme. — Adultes. — Suppositoires à 0.04 cgr. de Hg. vif préparé mécaniquement à froid pour obtenir une division absolue. Nourrissons : 0,01 cgr. et enfants de 1 à 10 ou 11 ans : 0,02 cgr.

Dose. — 1 le soir en se couchant. Suivre le traitement 30 à 40 jours, repos de 8 ou 10 jours ou davantage et recommencer.

Nota. — Hg. vif *est et reste* supérieur à tous les sels, toujours instables. Le seul anti-syphilitique *indiscutable et indiscuté*. Sa véritable voie d'absorption est la *voie rectale* parce que tous les capillaires de l'intestin vont au foie qui vitalise et rend Hg. actif. On mélange à une solution d'arséno benzol des tréponèmes vivants : *Ils vivent*. Mais si l'on ajoute au mélange une trace d'**EXTRAIT de FOIE**, les tréponèmes sont *foudroyés*. **Peuvent être prescrits comme désinfectants ou hepatogènes.**

(Expériences de Levaditi.)

Prix :

Adultes : 14 francs. — Enfants : 12 francs. — Nourrissons : 12 francs.

Laboratoire du Docteur TISSOT

34, boulevard de Clichy — PARIS

SUPPOALGOS LAGOUTTE

Composition :

| | |
|-------------------------|-------|
| Dionine | 0,03 |
| Ext. de Belladone..... | 0,025 |
| Ext. de Jusquiame..... | 0,025 |
| Ext. de Piscidia..... | 0,025 |
| Pyramidon..... | 0,25 |
| Phénacétine..... | 0,25 |
| Citrate de théine | 0,10 |

Actions thérapeutiques. — Spécifique de l'élément douleur, agissant rapidement.

Antispasmodiques, Hypnotiques, Analgésiques, Sédatifs.

Indications. — Névralgies, Douleurs rhumatismales, Douleurs utérines, Spécifique des règles douloureuses, Coliques néphrétiques et hépatiques, Insomnies causées par la douleur.

Mode d'emploi. — 2 à 3 suppositoires par 24 heures
Prix de la boîte de 6 suppositoires : 12 francs.

Laboratoire LAGOUTTE

85, cours Albert Thomas — LYON (III^e).

SUPPO-GYNALS

Analgésique sédatif, local et général.

FORME. — Suppositoires.

Composition. — Antipyrine, chlorhydrate de morphine, extraits de belladone, de jusquiame et de sénéçon, beurre de cacao.

Propriétés thérapeutiques. — Calment instantanément les douleurs qui précèdent les règles et, en général, celles qui ont pour siège les organes pelviens, les règles douloureuses, contractions utérines, hémorroïdes, fistules, etc...

Mode d'emploi. — Dès le début des douleurs, introduire dans l'anus un **Suppo-Gynal**. Dix minutes après, deuxième suppositoire. (Il est bon d'employer les suppo-gynals dès le début des douleurs. Plus on tarde, moins l'effet est sûr.)

Prix : 12 francs.

Laboratoires LEES

Directeur : **Docteur Pierre Ralland.**

Dépôt : 127 Boulevard Saint-Michel, Paris (5^e).

SUPPOPIRINE

Suppositoires à l'aspirine.

(Pureté absolument garantie.)

Propriétés thérapeutiques. — Analgésique, antithermique.

Supprime les inconvénients dus à l'absorption de l'aspirine par voie buccale.

Combat en même temps la constipation nuisible dans tous les états fébriles.

Présentation :

Adultes : 0 gr. 50 et 1 gr. d'aspirine par suppositoire.

Enfants : 0 gr. 25 et 0 gr. 50 d'aspirine par suppositoire.

Posologie. — 1 à 3 suppositoires ou plus par jour selon avis médical.

Pour les enfants au-dessous de 5 ans, ne pas employer sans avis médical préalable.

Prix : 12 francs.

Laboratoires SECLO

A. PANHELEUX, Pharmacien.

6, rue Mathilde — COURBEVOIE.

SUPPOSITOIRES A L'ESCULÉOL

Contre les hémorroïdes.

Adrénaline, stovaïne, extrait de marron d'Inde et d'Hamamelis, Euproctol.

Avantages. — Analgésiques, antiseptiques, décongestionnants.

Ne provoquent aucun choc local et atténuent rapidement les douleurs.

Mode d'emploi. — Un suppositoire matin et soir et après chaque garde-robe pendant les crises. Pour les chroniques, un suppositoire par jour.

Prix : 12 fr.

Peut être prescrit aux Assurances Sociales.

MICHEL DELALANDE

16, rue Henri-Regnault
COURBEVOIE (Seine).

SUPPOSITOIRES ALMINE LOUVEAU

Composition pour 100 v. :

| | |
|------------------------------------|----------|
| Intrait de Marron d'Inde | 1 gr. |
| Dithymol bi-iodé | 2 gr. |
| Gaïacol-Phénol-Menthol ââ . . | 0 gr. 20 |
| Camphre Japon | 1 gr. 40 |
| Salicylate Bismuth | 5 gr. |
| Oxyde pur de Zinc | 30 gr. |
| Excipient spécial. Q. S. p | 100 gr. |

Propriétés. — Décongestifs et résolutifs remarquables. Action rapide, soulagement immédiat.

Indications. — Hémorroïdes externes et internes.

Posologie et mode d'emploi. — Un suppositoire chaque soir au coucher jusqu'à résultat satisfaisant.

Prix : 15 francs.

Laboratoire A. LOUVEAU

Pharmacien de 1^{re} classe

78, boulevard des Batignolles — PARIS (XVII^e).

SUPPOSITOIRES AU NESTOSYL

Anesthésie superficielle par contact.

Caractéristiques. — Voir à la rubrique *Nestosyl*.

Indications. — Suppression rapide de la douleur, antiseptie et décongestion, dans : Hémorroïdes internes, Prurit anal, Fistules, Fissure, Constipation douloureuse, Plaies anales ou rectales, Prostatite, Cystite, Ténésme, Douleurs du bas-ventre, Douleurs post-opératoires, Douleurs de l'accouchement, Règles douloureuses, Coliques néphrétiques, etc.

Posologie. — Renouveler l'introduction d'un suppositoire chaque fois que le besoin s'en fait sentir. Si l'affection est à la fois interne et externe, employer en outre à l'extérieur la *Pommade au Nestosyl*.

Dans les pays tropicaux où le suppositoire est inutilisable, y substituer la *Solution huileuse* introduite avec une poire.

Prix : 15 francs.

Laboratoires du NESTOSYL

P. BAUDE, pharmacien.

72, rue Saint-Dominique. — PARIS (VII^e).

Tél. : Ségur 96-46 — Adr. télégr. : Nestosyl 27-Paris.

SUPPOSITOIRES CHAUMEL

Suppositoires à la Glycérine solidifiée, pour adultes et pour enfants.

Mode d'emploi. — Mouiller légèrement le suppositoire, en le trempant dans l'eau chaude, puis l'introduire dans l'anus par la pointe. Lorsqu'il est complètement enfoncé, le pousser profondément avec le doigt, jusqu'à ce qu'on ne sente plus le contact du suppositoire.

Indications. — Prescrits contre la constipation chez l'adulte et chez l'enfant.

Les Suppositoires Chaumel à la glycérine solidifiée se préparent également aux principaux médicaments, pour leur administration par la voie rectale.

Prix : Adultes, 9 fr. 85 ; Enfants, 7 fr. 50.

Établissements FUMOUCHE

78, faubourg Saint-Denis — PARIS

SUPPOSITOIRES CORBIÈRE

Composition. — A base d'Arsénobenzol.

Mode d'emploi. — Un suppositoire chaque soir après une selle spontanée ou provoquée par un lavement évacuateur.

Continuer le traitement 24 jours, cesser deux semaines et reprendre une nouvelle série.

Indications. — Syphilis à toutes les périodes. Syphilis viscérale.

Hérédo-Syphilis. — Angine de Vincent. — Dysenteries amibiennes.

Présentation. — Chaque boîte contient 6 suppositoires et ne porte aucune indication de nature à gêner le secret professionnel.

Suppositoires pour adultes à 0 gr. 10 d'arsénobenzol.

Prix : 18 francs.

Suppositoires pour enfants, à 0 gr. 03 id.

Prix : 16 francs.

Suppositoires pour nourrissons, à 0 gr. 01. id.

Prix : 15 francs.

Laboratoires pharmaceutiques CORBIÈRE

27, rue Desrenaudes — PARIS. — Tél. : Carnot 78-11.

SUPPOSITOIRES HYMEL

Traitement mercuriel d'entretien dissimulé.

2 Titrages :

Adultes : 0,06 Onguent napolitain, soit 0,03 Hg. métal.

Enfants et Nourrissons : 0,03 Onguent napolitain, soit 0,015 Hg. métal.

Originalité. — Préparés entièrement à froid, ce qui assure une exacte répartition de mercure dans le produit fini. Aussi ils sont très *bien tolérés*, ne causant ni ténésme, ni diarrhées, ni coliques.

Présentation dissimulée. — Sans indication de maladies, ni de nature de produit actif.

Posologie. — Un le soir au coucher, pendant 20 jours de suite.

Prescription. — De préférence, intercaler une période de 20 jours d'Elixir Hymel entre deux périodes de suppositoires Hymel.

Prix : 12 francs.

Laboratoires A. DUTEIL

90, avenue de Saint-Ouen — PARIS.

SUPPOSITOIRES LOGEAIS

Composition :

| | |
|-------------------------------|-------|
| Extrait d'Hamamélis..... | 0,33 |
| Sulfoichtyolate de soude..... | 0,33 |
| Beurre de cacao | Q. S. |

Indications. — Hémorroïdes internes et rectite concomitante, Prostatites.

Propriétés :

ATOXIQUES : Ni stupéfiant, ni adrénaline.

ANALGÉSQUES : Décongestion rapide et durable de la média-veineuse.

ASTRINGENTS : Action tonique et régénératrice de la fibre lisse.

ANTISEPTIQUES : Action élective de l'huile sulfitée sur la muqueuse rectale.

Mode d'emploi. — Introduire matin et soir, après lavage, un suppositoire Logeais par le petit bout pour ne pas augmenter l'irritation locale.

Prix au public : 13 fr. 75.

Laboratoires Emile LOGEAIS

24, rue de Silly — BOULOGNE-SUR-SEINE

Tél. : Auteuil 40-15 et 40-16.

SUPPOSITOIRES MIDY

(Adrénostyptique.)

| | |
|---|-------------|
| Adrénaline..... | 0 gr. 00015 |
| Stovaïne | 0 gr. 025 |
| Anesthésine | 0 gr. 025 |
| Extrait de Marron d'Inde frais stabilisé..... | 0 gr. 05 |
| Extrait d'Hamamélis..... | 0 gr. 01 |

Pour un suppositoire.

Dose et mode d'emploi. — Introduire 1 ou 2 suppositoires par jour, aux instants les plus propices, soit le matin 1 heure avant d'aller à la selle, c'est-à-dire avant le moment où l'expulsion des matières fécales refoule et congestionne les hémorroïdes ; soit le soir en se couchant, lorsque les hémorroïdes sont douloureuses, congestionnées par la fatigue et la station verticale.

N.-B. — Action d'autant plus active qu'un lavement évacuant (de 100 gr.) à une température de 45°, aura précédé l'introduction de SUPPOSITOIRES MIDY.

Propriétés thérapeutiques. — Décongestionnants, Astringents, Anesthésiques, Calmants, Antiseptiques.

Indications. — Traitement rationnel des hémorroïdes externes et internes.

Prix : 13 francs.

Laboratoires MIDY

67, avenue de Wagram — PARIS (XVII^e).

SUPPOSITOIRES PACHAUT

**Huile de Palma Christi, Glycérine,
Beurre de cacao.**

Traitement de la CONSTIPATION

S'introduisent par la grosse extrémité. Leur forme bi-conique spéciale permet, sous l'effet des contractions du sphincter, une ascension dans le rectum.

Présentation :

- 1^o Boîte de 12 suppositoires pour *adultes*.
2^o Boîte de 12 suppositoires pour *enfants*.

Prix :

Adultes : 10 francs. — Enfants : 7 fr. 50.

Laboratoires PACHAUT

130, boulevard Haussmann — PARIS
Téléph. : Lab. 16-72

SUPPOSITOIRES PEPET

(Beurre de Cacao — Glycérine)
pour Bébés, pour Garçonnetts,
pour Adultes.

CONSTIPATION. HEMORROÏDES

La boîte : 12 fr. 50.

La 1/2 boîte : 7 fr. 50.

Henry ROGIER

Docteur en Pharmacie
56, boulevard Péreire
PARIS.

SUPPOSITOIRES PYRAX

Médication sédatrice et antithermique de choix dans toutes les maladies de l'Enfance. Action diurétique, tonique, désinfectante, (Quinine, Aspirine, Caféine).

Deux dosages. — Bébés jusqu'à 3 ans.
Enfants au-dessus de 3 ans.

Présentation. — 3 étuis de 2 suppositoires par boîte.

Emploi. — 1 à 3 par jour.

Toutes Pharmacies, la boîte bébé : 7 fr. 50.

La boîte enfants : 9 francs.

Enregistré au Laboratoire National de contrôle des médicaments sous les N^{os} 155-4 et 155-5.

Echantillons :

 **Laboratoire CHAVIALLE**

70, Grande-Rue — SÈVRES (S.-et-O.).

SUPPOSITOIRES ROCAV

Médication mercurielle active et d'un emploi particulièrement commode.

Les suppositoires ROCAV ne provoquent pas d'épreintes. Leur forme particulière facilite l'introduction et surtout la pénétration profonde dans le rectum, condition optima d'absorption du médicament.

Dosage. — *Adultes* : 0,05 Hg vif. *Enfants* : 0,025 Hg vif.

Indications. — Traitement d'usage. Syphilis hépatiques, Syphilis du tube digestif.

Mode d'emploi. — Un suppositoire tous les deux jours le soir en se couchant.

Prix : *Adultes* : 20 francs. *Enfants* : 18 francs.

NOTA. — Le conditionnement de ce produit ne porte aucune indication concernant sa composition ou son emploi thérapeutique.

Pharmacie ROGÉ-CAVAILLES

M. LACHARTRE, Docteur en Pharmacie
Successeur

116, boulevard Haussmann — PARIS (VIII^e).

SUPPOSITOIRES SFÉAT

Traitement dissimulé de la Syphilis par l'huile grise argentique.

Généralités. — A côté de l'huile grise argentique injectable, les Laboratoires SFÉAT préparent des suppositoires à l'amalgame d'argent présentés à la vente sans aucune indication révélatrice.

Ces suppositoires possèdent sur les produits habituellement employés les avantages suivants :

Grande activité, la combinaison de l'argent avec le mercure ayant pour effet de renforcer la puissance de cet élément.

Tolérance remarquable due à l'extrême ténuité des particules métalliques mélangées à l'excipient et à la constance de la composition.

Mode d'emploi et posologie. — 1 suppositoire chaque soir pendant 10 à 20 jours.

Deux dosages :

Suppositoires « Adultes » à 0 gr. 05 Hg et 0,025 d'Ag.

Suppositoires « Enfants » à 0 gr. 02 Hg et 0,01 d'Ag.

Prix :

SUPPOSITOIRES SFÉAT adultes. La boîte de 12 : 20 fr.

SUPPOSITOIRES SFÉAT enfants. La boîte de 12 : 16 fr.

Echantillons et littérature :

Laboratoires SFÉAT

15, rue Catulienne — SAINT-DENIS (Seine).

SUR-BI-CAL

Formule du D^r Martin du Thell.

Forme. — Cachets.

Composition. — Phosphate bicalcique, 0 gr. 50 ;
Solution d'adrénaline au millième, 1 goutte pour
1 cachet.

Propriétés. — Particulièrement assimilable en raison de sa solubilité dans tous les acides faibles y compris les acides de fermentation.

Indications. — Toutes les indications des phosphates de chaux.

Mode d'emploi. — *Adultes* : 2 cachets par jour au milieu des repas.

Enfants : 1 cachet par jour.

On peut aussi délayer le contenu du cachet dans un peu d'eau ou de lait.

Prix : 14 fr. 85.

Laboratoires LACOMBE et Cie

42, rue du Mont-Cenis — PARIS (XVIII^e)

SURPARINE

Spasmolytique de choix.

Composition :

1 comprimé = Perparine..... 0 gr. 04
Novatropine..... 0 gr. 0015

Même dosage pour 2 cc. de solution injectable ;
1 ampoule en renferme 2 cc. 2.

Mode d'action et avantages. — L'Antispasmodique par excellence. La perparine, d'effets comparables à ceux de la papavérine, est trois fois moins toxique pour une activité triple. Sans action sur le système nerveux central, ne déterminant pas d'accoutumance, d'effet prolongé, sans réaction atonique secondaire, administrable par voie buccale. La novatropine, pour une toxicité 50 fois moindre, produit l'effet total de l'atropine.

Indications. — Tous les spasmes : spasmes du pylore et du cardia, vomissements, crises gastro-intestinales du tabès, ulcus gastroduodéal, spasme de la glotte, spasme du sphincter vésical, métrorragies, dysménorrhées, ictère catarrhal, cholélithiases, coliques néphrétiques, pyélites, cystites, angiospasmes, angor pectoris, petits signes du brightisme : bourdonnements d'oreilles, etc...

Référence. — Communication à l'Académie de Médecine, 19 décembre 1933.

Posologie :

- a. 1 à 2 comprimés 3 fois par jour.
 - b. 2 à 3 ampoules par jour en injections sous-cutanées ou intramusculaires.
 - c. 1/2 à 1 ampoule en intraveineuse.
- Ces doses peuvent être dépassées sans crainte.

Présentation et prix :

Tubes de 20 comprimés : 17 francs.

Boîtes de 5 ampoules de 2 cc. : 22 francs.

Laboratoires R.-L. MATHIVAT

66, rue de la Pompe — PARIS (XVI^e).

Tél. : Trocadéro 32-91.

SURRASTHÉNINE

Composition. — La Surrasthénine est à base d'Exo-Surrénine Byla, de quinine, de nucléinates, d'hypophosphites et de glycérophosphates, dont les propriétés toniques et reconstituantes sont universellement connues.

Indications thérapeutiques. — La Surrasthénine, médicament stimulant et tonique par excellence, est le véritable spécifique de *toutes les asthénies*, et notamment de l'asthénie post-grippale.

Posologie. — De goût très agréable, la Surrasthénine se prend dans un peu d'eau, *au milieu des repas du matin et de midi*, à la dose de 2 ou 3 cuillerées à dessert par jour pour les adultes, et de 2 cuillerées à café pour les enfants.

Prix : 20 francs.

Les Établissements BYLA

26, avenue de l'Observatoire — PARIS.

SURYALI

Granulé effervescent agréable. Se dissout dans peu de liquide.

Formule :

| | |
|---------------------------|---------------|
| Tartrate sodique | 30 gr. |
| Sulfate sodique..... | 10 gr. |
| Bicarbonate sodique | 16 gr. |
| Acide tartrique..... | 18 gr. |
| Edulcorant..... | q. p. 100 gr. |

Indications. — Purgatif. Laxatif. *Merveilleux apéritif*, selon les doses.

Toutes affections du foie et du tube digestif. Diurétique.

Mode d'emploi :

Purgatif : 1 à 2 cuillerées à soupe le matin à jeun.

Laxatif : 2 à 4 cuillerées à café le matin à jeun.

Apéritif : 1 cuillerée à café à jeun, 1/4 d'heure avant les repas, ou demi-cuillerée à café à jeun, 1/4 d'heure avant les repas.

Pour les enfants : dose plus faible selon l'âge.

BLOUIN, Pharmacien

50, rue de Turenne.

Dépôt général : **DARRASSE Frères**,
13, rue Pavé — PARIS.

SYLCASE

Silicium, Calcium.

Formule du Docteur **CRETIN**.

Rachitisme, Décalcifications, Croissance, Fractures, Carie dentaire, Allaitement, Evite l'hypertension.

Présentation. — Comprimés, granulés, poudre, ampoules injectables.

Posologie. — 1 à 5 comprimés ou cuillers à café par jour suivant l'âge, 1 ampoule par jour.

Prix :

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Comprimés | 15 fr. |
| Granulé-poudre, grand modèle | 20 — |
| Granulé-poudre, petit modèle | 10 — |
| Injectable, 6 ampoules de 3 cc. ... | 45 — |

Littérature et échantillons :

Laboratoires GRYSA,

7, rue Saint-André — LE MANS (Sarthe).

SYMPATHOCRINE

Médication Sympathico-régulatrice Elixir.

Formule :

| | |
|--|------|
| Ethylphénylmalonylurée..... | 0,20 |
| Extrait fluide de Passiflore..... | 2,00 |
| Alcoolé de Cratægus..... | 2,00 |
| Teinture de Jusquiame..... | 0,80 |
| Thyroïde (extrait glycérimé)..... | 0,02 |
| Ovaires (— —)..... | 1,00 |
| Surrénales (— —)..... | 0,10 |
| Excipient et parfum Q. S. pour 100 cc. | |

Indications. — Troubles de la tonicité nerveuse, Etats anxieux, Emotivité, Troubles circulatoires, Palpitations, Vertiges, Rééducation du Sommeil.

Emploi. — 1 à 2 cuillerées à café au moment du coucher.

Prix : 16 francs.

Laboratoires UNIS-SPES

14, rue Demarquay — PARIS (X^e).

SYMPATHORIANE

Troubles du Vago-Sympathique à prédominance sympathique.

| | | | |
|-------------------------|---|------------------------------------|--------------|
| Formule : | { | Salicylate d'ésérine | 1/10 de mgr. |
| | | Lobe postérieur d'hypophyse | 0,002 |
| | | Camphre monobromé..... | 0,10 |
| | | Glycérophosphate de Manganèse..... | 0,02 |
| | | Valérianate de Zinc..... | 0,025 |
| | | Extrait de Basilic..... | 0,01 |
| | | Extrait de Ballote | 0,01 |
| | | Extrait de Passiflore | 0,03 |
| | | Poudre de Guarana | 0,015 |
| | | Poudre de Fénugrec désodorisé..... | 0,03 |
| | | Poudre de Jusquiame | 0,015 |
| Par comprimé dragéifié. | | | |

Indications. — SYMPATHICOTONIE, Hyperémotivité, Hyperactivité, Hyperesthésie, Fausse angoisse, Agitation, Tremblements, Sommeil capricieux, Spasmes, Instabilité des fonctions gastro-intestinales, Douleurs épigastriques, précordiales, neurotonie à prédominance sympathique.

Posologie. — 4 comprimés en moyenne, 8 au plus par jour.

Prix : 18 francs.

Pour les Vagotoniques, voir : VAGORIANE.

Enregistré Laboratoire Contrôle des Médicaments sous le N° 988-1.

Laboratoire FOSSET

21, Grande Rue — MONTFERMEIL (Seine-et-Oise).

SYMPATHYL

Chantereau.

La première synergie médicamenteuse constituant, non pas seulement un sédatif, mais un régulateur complet des dystonies organo-végétatives.

Forme. — Comprimés.

Indications principales. — Emotivité, Irritabilité, Anxiété, Eréthisme cardiaque, Angor, Spasmes, Asthmes, Troubles thyroïdiens, Séquelles d'hystérectomie et d'ovariotomie, Syndromes solaires.

Composition :

| | |
|----------------------------------|------|
| Extrait spécial de crataegus.... | 0,06 |
| Extrait de boldo..... | 0,01 |
| Phénylméthylmalonylurée | 0,01 |
| Hexaméthylènetétramine | 0,06 |
| Peptone polyvalente..... | 0,03 |

Pour 1 comprimé.

Posologie. — 3 à 8 comprimés par jour, de préférence avant les repas.

Prix: 16 francs.

Laboratoires du Sympathyl

26 bis, rue Dombasle — PARIS (XV^e).

SYNCRINES CHOAY

Nature. — Associations opothérapiques correspondant aux principaux syndromes glandulaires.

Formes pharmaceutiques et posologie :

Cachets et Comprimés, en tubes hermétiques : 2 à 4 par jour.

Ampoules injectables, désalbuminées, stérilisées : 1 cc. tous les 2 jours.

Nomenclature des principales formules :

- 1..... Pluriglandulaire F.
- 1 *bis.*.. Pluriglandulaire M.
- 2..... Surréno-Hypophysaire.
- 3..... Thyro-Surréno-Hypophysaire.
- 3 *bis.*.. Thyro-Surréno-Ovarienne.
- 4..... Thyro-Ovarienne.
- 4 *bis.*.. Surréno-Ovarienne.
- 5..... Thyro-Orchitique.
- 6..... Hypophyso-Orchitique.
- 6 *bis.*.. Hypophyso-Ovarienne.
- 7..... Thyro-Hypophyso-Ovarienne.
- 8..... Pluriglandulaire digestive.
Peptosthénine (Voir ce mot).
- 9..... Surréno-Hypophyso-Ovarienne.
- 10..... Placento-Mammaire.
- 11..... Ovaro-Mammaire.
- 12..... Spléno-Médullaire.

Prix :

De 15 à 25 fr. la boîte de 24 à 30 cachets ou comprimés, suivant formule.

De 15 à 20 fr. la boîte de 6 amp. selon formule.

Laboratoire CHOAY

48, av. Théophile-Gautier — PARIS (XVI^e).

Téléphone : Auteuil 44-09 et 44-10.

SYNTHALINE B

Marque déposée.

Médicament antidiabétique « per os ».

Dichlorhydrate de dodécaméthylène de guanidine.

Forme. — Flacons de 60 dragées à 0 gr. 005.

Indications. — Cas légers et moyens du diabète sucré.

Contre-indications. — Coma ou état pré-comateux, ainsi que diabète grave et avancé du jeune âge.

La *Synthaline* se complète avec l'Insuline et peut être employée concurremment soit pour diminuer les piqûres, soit pour renforcer l'action de l'Insuline.

Prix : 30 francs (exempt d'impôt)

Laboratoires CRUET

13, rue Miollis — PARIS (XV^e).

SYNTROPAN « ROCHE »

Phosphate de l'ester-3-diéthylamino-2,
2-diméthyl-propylique de l'acide tropique.

Action thérapeutique :

Antispasmodique puissant d'action qualitativement voisine de celle de l'Atropine, mais plus élective sur les spasmes du tube digestif, des voies biliaires et des voies urinaires ainsi que sur les douleurs menstruelles et permettant le traitement intensif de la maladie de Parkinson.

Aux doses thérapeutiques, pas d'action sur la pupille (mydriase), sur la sécrétion salivaire et sur la pression sanguine.

Indications thérapeutiques :

Spasmes de l'estomac, spasmes du pylore et du cœur, constipations spasmodiques, coliques, dysménorrhée spasmodique, ulcères de l'estomac et du duodénum, cholécystite, cholélithiase, néphrolithiase, coliques néphrétiques, ténésme vésical, etc...

Doses et mode d'emploi :

Comprimés, Ampoules, Suppositoires.

1 comprimé = 2 cgr.

1 à 4 par jour selon les cas.

1 ampoule d'un cc = 1 cgr.

1 à 3 par jour selon les cas.

1 suppositoire = 3 cgr.

1 à 2 par jour selon les cas.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous les numéros 504-66 (comprimés), 504-68 (ampoules), 504-69 (suppositoires).

**Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE
& Cie.**

10, rue Crillon — PARIS (IV^e).

SYPHONÉOL

Pilules de protoiodure Hg, arrhénal,
Fer, Quinquina.

Propriétés thérapeutiques. — Cure d'entretien de la syphilis, Anémie, Asthénie, Action régulatrice sur le métabolisme. Cure préventive des néoplasmes (théorie de Pfeiffert). Paludisme. Ulcères variqueux.

Posologie. — 1, 2 ou 3 pilules par jour 1 heure avant le repas, midi et soir.

Prix : 15 francs.

Pharmacie BAUDE
ST-AUBERT (Nord).

TABLETTES PERROUD

La « Tablette Perroud » est certainement la forme la plus pratique, la plus agréable, la plus efficace d'administration du Bismuth. A sa pureté, sa division, son adhérence, elle joint l'agrément : le goût n'est pas offusqué, les reflexes fâcheux évités. Par un procédé spécial, de petites quantités de sucre et de Cacao diastasé favorisent l'adhérence.

Composition. — 50 gr. de corps crépissant par tablette de 10 bâtons contenant chacun 5 gr.

Doses. — Plus fortes elles seront, plus rapides les résultats. — *Minimum* : dans l'*Hyperchlorhydrie*, 2 bâtons avant chaque repas ; dans l'*Ulcère*, 4 bâtons le matin à jeun ; dans les *Colites*, 1 à 4 bâtons par jour. — Contre les *Oxyures*, médicament puissant (le prospectus indique les doses suivant l'âge). — Dans toutes les gastropathies : *Gastrite*, *Gastralgie*, *Hypersécrétion*, dans les *fermentations intestinales*, à petites doses seule ou associée, la « Tablette Perroud » rendra toujours de réels services.

Prix : 16 francs.

Laboratoire PERROUD

3, rue Sébastien-Gryphe — LYON
(anciennement, 7, rue des Archers)

TABLETTES ZEVA

Formule. — Extrait stabilisé d'ovaire. Extraits secs d'hydrastis, hamamélis, viburnum, bourdaine, kola. Excipient spécial.

(Aucune incompatibilité comme avec les mélanges d'extraits fluides et de teintures.)

Présentation. — Tablettes de 1 gr. équivalentes à 0 gr.03 d'extrait ovarien et environ XL gouttes du mélange d'extraits fluides. Goût agréable. Conservation parfaite.

Posologie. — 1 à 4 par jour, 15 à 20 jours par mois. (Aucune contre-indication.)

Indications. — Dysménorrhée, Aménorrhée, Ménopause, Suites d'ovariotomie, Varices, Phlébites, Hémorroïdes.

Prix : 15 francs.

Laboratoire H. CLUZEL

60, cours Emile-Zola — LYON-VILLEURBANNE
Médaille d'Or Strasbourg 1927.

TABUROL MONAL

Dynamogène, Hématopoiétique, Leucocytogène.

Trois formes. — Ampoules, Dragées, Gouttes.

Composition. — Hémoglobine, manganèse, strychnine, fluor, méthylarsinate, glycérophosphate, acide nucléinique. Dans les ampoules, pas hémoglobine.

Doses. — 4 à 6 dragées par jour aux repas. Avaler sans croquer. — XV à XX gouttes avant les repas. — 1 ampoule chaque jour.

Action. — Stimule la nutrition cellulaire.
Restaure les déficiences nerveuses.
Reminéralise l'organisme.

Indications. — Etats anémiques, convalescences, troubles palustres, dépression nerveuse.
La boîte de 10 ampoules : 15 francs.
Le flacon de 50 dragées : 12 francs.
Le flacon de gouttes : 12 francs.

Laboratoires MONAL et C^{ie}
6, rue Bridaine — PARIS.

TACHYGASTRINE DUCLOY

Accélérateur physiologique des sécrétions gastriques totales.

Forme. — Liquide.

Composition. — Acide fumaro-protocétrarique-Albumoses-chlorures de sodium-magnésium-calcium.

Propriétés thérapeutiques. — *Eupeptique complet excitant : des nerfs* gustatifs et sécrétoires par l'acide fumaro-protocétrarique amer et anti-nauséeux ; de la *sécrétion acide* par les alcalins choisis ; de la *sécrétion pepsique* par l'albumose.

Indications. — **Toutes les Insuffisances sécrétoires de l'estomac :**

Primitives : Dyspepsies et gastrites qui s'accompagnent d'hypo-pepsie ou d'apepsie, d'hypochlorhydrie ou d'anachlorhydrie, d'achylie, atonie gastrique — cancer de l'estomac.

Secondaires : Intoxication cancéreuse quelle que soit la localisation du néoplasme ; — dyspepsie et anorexie des tuberculeux, des chloroanémiques, des névropathes, des enfants débilités ou rachitiques, des femmes enceintes, des brightiques anorexiques, des convalescents, des nourrices ; *diarrhées gastrogènes* des achyliques, des gastro-entérostomisés, des nourrissons ; — anorexie et dyspepsie des nourrissons ; — anaphylaxies.

Contre-Indication. — Hyperchlorhydries et hypersécrétions.

Posologie :

Adultes : 2 à 4 cuill. à café par jour. On peut aller jusqu'à 6 cuill. à café par jour.

Prendre le médicament *dix minutes avant les repas* matin, midi et soir ou midi et soir seulement ; dans une demitasse à thé (50 à 60 cm.) d'eau bien chaude ou mieux de bouillon de viande ou de légumes non salé.

La cure peut être continuée plusieurs mois ou renouvelée sans inconvénients.

Nourrissons : V gouttes 2 à 3 minutes avant chaque tétée dans une cuillerée à café d'eau.

Enfants : De 5 à 12 ans accomplis ; VIII gouttes par année d'âge, 5 minutes avant les repas principaux.

A partir de 12 ans : comme chez l'adulte.

Prix : 20 francs.

Laboratoires DUCLOY et Cie
ARQUES (Pas-de-Calais).

TÆNIFUGE BARDET

Médaille d'Or, Strasbourg 1924.

Composition. — Préparation liquide à base d'Aspidium Filix Mas, obtenue par un procédé mécanique à l'état colloïdal, lui conférant un maximum d'activité.

Indications. — Médication anthelminthique complète : Taenias, Ascarides, Oxyures, Ankylostomes, Tricocéphales et tous parasites intestinaux.

Présentation. — Dans la même boîte se trouvent : a) Le Taenifuge proprement dit ; b) Le Purgatif.

Posologie. — **Tænias.** — La veille, alimentation lactée. Absorber à jeun en 2 fois à 20 minutes d'intervalle le Taenifuge aux doses suivantes :

Adultes : la totalité du contenu du flacon ;

Adolescents de 15 à 20 ans : 8 à 10 cuillerées à café.

Enfants de 10 à 15 ans : 6 à 8 cuillerées à café.

Enfants de 3 à 10 ans : 2 à 6 cuillerées à café.

Une heure après, prendre le Purgatif mélangé à une infusion tiède, aux doses respectives suivantes : contenu du flacon, 4 à 5, 3 à 4, 1 à 3 cuillerées à café.

Tous les autres vers. — Pendant 4 à 5 jours consécutifs, donner le Tænifuge le matin à jeun aux doses suivantes :

Adultes : 1 cuillerée à soupe ;

Adolescents de 12 à 20 ans : 1 cuillerée à dessert ;

Enfants de 3 à 12 ans : 1 à 2 cuillerées à café.

Le 5^e ou 6^e jour, administrer le Purgatif à jeun, aux doses ci-dessus. Renouveler le traitement, plusieurs fois s'il y a lieu, à intervalle de 10 jours maximum;

Formuler : « TÆNIFUGE BARDET ».

Echantillon et Littérature détaillée;

Laboratoires BARDET

76, rue de Sèvres — PARIS (VII^e).

TAENIFUGE CASTEL

Cachets

Composition :

Cachet Rose (Laxatif).

| | | | |
|-------------------------|----------|------------------------|----------|
| Cascara sagrada pulv... | 0 gr. 30 | Scamonnée résine pulv. | 0 gr. 20 |
| Podophylline..... | | | 0 gr. 02 |

Pour 1 Cachet.

Cachets Gris (Taenifuges).

| | | | |
|-----------------------|----------|----------------------|----------|
| Filicine pulv. | 2 gr. 50 | Calomel chimiquement | |
| Oxyde stanneux pur .. | 2 gr. | pur..... | 0 gr. 30 |
| Etain pulv. pur..... | 2 gr. | Thymol..... | 0 gr. 10 |
| | | Aspidium pulv | 2 gr. |

Pour 9 Cachets.

Indications. — Destruction et expulsion des taenias de toute espèce.

Présentation. — Tube aluminium contenant 1 cachet rose (laxatif) et 9 cachets gris (Taenifuges).

Mode d'emploi (*Adultes* seulement). — Après un repas du soir peu abondant, prendre le cachet rose avec une infusion. Dès le lendemain matin, l'effet laxatif étant obtenu, absorber de 10 minutes en 10 minutes chacun des 9 cachets gris avec un peu de café, d'eau ou d'infusion. Ne prendre aucun purgatif huileux ni aucun aliment avant le repas de midi qui sera normal.

Prix : 15 francs.

Laboratoires CASTEL 1, place Bouquerie — NIMES

A. CASTEL, Pharm. Ingénieur-Chimiste, Licencié ès Sciences.

TÆNIFUGE DU D^r JACQUÈME

Composition. — Liquide en capsules à base d'Aspidium Filix Mas et de Podophyllin en solution huileuse chloroformée par procédé spécial.

Indications. — Expulsion radicale du tænia.

Avantages — Aucune toxicité. Absorption de 4 capsules seulement pour adultes. Enfants, petites capsules spéciales dont le nombre varie de 3 à 12 ans. Indiquer l'âge.

Mode d'emploi. — Au repas du soir prendre seulement un demi-litre de lait sucré, le lendemain matin avaler les capsules avec un demi-verre d'eau.

Effet : deux heures au maximum.

Prix : 21 fr. 20, impôt compris.

Laboratoires CHIARINI

68, rue du Roi-René

AIX-EN-PROVENCE.

TÆNIFUGE FRANÇAIS DU D^r E. DUHOURCAU

Composition. — Extrait chloroformo-huileux de Fougère mâle des Pyrénées, comprenant le purgatif. Présenté en capsules.

Indications. — Ankylostomiase, Teniasis, Parasites intestinaux.

Caractéristiques. — Pas de traitement préalable, pas de diète, pas de purgatif, pas d'arrêt du travail, absorption particulièrement simple, *non toxique*.

Mode d'emploi. — Absorption de capsules le matin à jeun, en 10 minutes, avec *aussi peu de liquide que possible*. Action au bout d'une heure ou deux. Si malaise ou nausées, absorption d'un peu de café ou de thé.

Doses. — *Adultes* : 12 capsules. *Enfants* au-dessous de 12 ans : autant de capsules que d'années d'âge et une en plus.

Prix : 12 fr. 50.

N° d'inscription au Laboratoire de Contrôle : 146-2.

Laboratoires du D^r E. DUHOURCAU

6, rue Louis-Blanc — LA GARENNE (Seine).
Anciennement : 10, rue de Turenne — PARIS (IV^e).

TÆNIFUGE KIRN

En capsules

*à base de filicine, principe actif de la fougère mâle
dissous dans son huile grasse.*

Tænifuge le plus actif, ne présentant pas les dangereux inconvénients des ténicides, comme la pelletièreine.
(Travaux de thèse de Kirn et Schmidt).

Capsules Kirn. — Capsules à l'extrait vert éthéré de fougère mâle, mais caractérisées par ce fait unique que le titre du principe actif, la filicine, est toujours stable et uniforme ; sans calomel.

Mode d'emploi. — 1° Avant-veille, purgation ; 2° la veille, diète presque absolue (lait) ; 3° le matin à jeun l'absorption de 5 en 5 minutes, des 12 capsules du flacon avec un peu de sirop d'éther ou un grog, suivie à nouveau d'une légère purgation.

Résultat certain si ces indications sont scrupuleusement observées.

Enfants : Capsulines Kirn, spécialement dosées.

Médication sans similaires.

Prix : *Adultes* : 20 francs. — *Enfants* : 15 francs.

Admis aux Assurances Sociales.

Laboratoires A. DANIEL-BRUNET

62, Bd Jean-Jaurès — BOULOGNE-SUR-SEINE

Tel. : Auteuil 11-86. — Paris-Ouest.

TAMAR INDIEN GRILLON

Laxatif végétal doux et agréable.

Présentation. — Bonbons chocolatés à la pulpe de tamarin et au sené; ne renferme aucun produit chimique, n'irrite pas l'intestin.

Recommandé aux femmes et aux enfants.

Doses. — Un bonbon le soir en se couchant.

Enfants: Un bonbon ou 1/2 bonbon en prenant le repas du soir.

Ce produit peut être prescrit aux bénéficiaires des Assurances sociales.

Prix : Boîte de 12 bonbons : 9 francs.

Société du TAMAR INDIEN GRILLON

13, rue Pavée — PARIS (IV^e).

TAMARINE

Délicieuse confiture laxative à base de Casse muette et de Tamarin, infaillible dans tous les cas de constipation et de stases intestinales.

Posologie :

Enfants au-dessus de 5 ans : 1/2 cuillerée à café.

Adultes : 1/2 à 1 cuillerée à café à la fin du repas du soir.

Prix : 12 fr. 50.

Laboratoire de la TAMARINE

4, route de Médoc

Le Bouscat près Bordeaux.

TAMPOL « ROCHE »

Pansement gynécologique idéal.

Le *Tampol « Roche »* est constitué par un ovule derrière lequel est comprimée une certaine quantité de laine aseptique, non absorbante, contenue dans une capsule de gélatine et portant à son extrémité un cordonnet.

Mode d'emploi. — Plonger pendant 3 à 4 secondes environ le *Tampol « Roche »* dans de l'eau bouillie à peine tiède, puis, la malade ayant pris la position gynécologique, introduire ce pansement jusqu'au fond du vagin et le maintenir en place quelques minutes. Au bout de ce temps, la dissolution de la gélatine s'est effectuée, la laine s'est développée en tous sens : le *tamponnement vaginal est parfait*.

N.-B. — Il ne faut jamais se servir pour l'introduction du *Tampol « Roche »* d'huile ou de corps gras qui empêchent la dissolution de la capsule de gélatine. Enregistré au Laboratoire national de contrôle des médicaments sous le n° 504-43.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et C^{ie}
10, rue Crillon — PARIS (IV^e).

TANNO-CALCINE

Médication reminéralisante.

Gluconate de Ca, Phosphate de Ca. Extrait hépatique, Tannin purifié.

2 formules :

TANNO-CALCINE A contenant 0,05
de Tannin lavé à l'alcool et purifié.

TANNO-CALCINE B contenant 0,15
de Tannin lavé à l'alcool et purifié.

Indications. — Convalescence, Grippe, Surmenage, Tuberculose, Croissance, Lymphatisme, Adénopathie.

2 cachets par jour.

Prix : *cachets A.* 9 francs; *cachets B.* 10 francs.

Laboratoires A. DANIEL-BRUNET

62, Bd J.-Jaurès. — BOULOGNE-s-SEINE

Tél. : Auteuil 11-86. — Paris-Ouest.

TANNURGYL
du Docteur LE TANNEUR
Sel de Vanadium chloré.

Tonique général puissant avec modification humorale profonde.

Indications. — Phosphaturie. Calciurie, Déminéralisation générale, Dépression chez les anxieux.

Posologie :

Adultes : 60 à 100 gouttes à chacun des 2 repas.

Enfants : demi-dose.

Nourrissons : 1/4 de dose dans le biberon.

Prix. Grand flacon : 22 francs.

Petit flacon : 14 francs.

Renseignements médicaux :

Docteur LE TANNEUR

87, avenue Borriglione — NICE

(Voir **NÉO-TANNURGYL**)

TAPO

Ferments lactiques.

Spécifiques des affections gastro-intestinales.

Forme. — Cultures liquides.

Composition. — Excipient : Bouillon de Viande peptoné. Principe actif : Ferments lactiques sélectionnés.

Propriétés thérapeutiques. — Au point de vue curatif, le **Tapo** modifie rapidement le terrain infecté, augmente la résistance du malade en apportant une aide indispensable à la leucocytose organique et détruit les conséquences de l'infection.

Au point de vue préventif, le **Tapo** met l'organisme en état de non réceptivité tant par la résistance qu'il augmente que par la destruction des microorganismes qui assiègent l'individu continuellement.

Indications. — Gastrites, Entérites, Entérocolites, Intoxications alimentaires, Diarrhées chroniques, Dysenteries, Insuffisance hépatique, Appendicite chronique, Néphrites coli-bacillaires, Albuminurie, Impétigo, Eczéma, Furunculose, Pyodermites, enfin dans toutes les maladies fébriles aiguës (Grippe, Fièvres typhoïde et para-typhoïde) *comme agent anti-infectieux.*

Posologie. — De 1 à 2 flacons-ampoules par 24 heures (ou plus dans les cas d'infections marquées) pur ou dans un peu d'eau. Le traitement est de trois boîtes, on peut le continuer comme préventif en cas de récurrence.

Le **Tapo** est d'une conservation indéfinie ; ne s'altère pas sous l'action de la chaleur et du froid : c'est donc le produit d'élection pour les colonies et les pays chauds.

Prix de vente au public : 20 francs.

Laboratoires MADYL

14, rue de Miromesnil — PARIS.

Téléphone : Anjou 16-55.

TARTRATE BORICO- POTASSIQUE PACHAUT

Tubes dosés de tartrate borico-potassique pur
à faire dissoudre au moment de l'emploi.

Conservation parfaite.

Indications. — Epilepsie, troubles névropathiques.

Présentation. — En boîtes de 30 tubes dosés à :
0 gr. 50, 1 gr., 2 gr., 3 gr., 4 gr., 5 gr., 6 gr.

Posologie. — Dose moyenne : 4 à 5 gr. par jour
pour les adultes. Dépourvu de toute toxicité,
doit être pris chaque jour sans interruption jus-
qu'à guérison.

Mode d'emploi. — Faire dissoudre le contenu
d'un tube dans un verre d'eau, à prendre en
2 ou 3 fois dans les 24 heures.

Laboratoires PACHAUT

130, boulevard Haussmann — PARIS.

Téléph. : Lab. 16-72

TAXOL

Composition :

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Poudre de muqueuse intestinale..... | 0 gr. 05 |
| Extrait biliaire..... | 0 gr. 10 |
| Agar-Agar..... | 0 gr. 05 |
| Ferments lactiques..... | 0 gr. 05 |

Pour un comprimé.

Forme. — En comprimés de 0 gr. 35.

Propriétés thérapeutiques. — Régulateur phy-
siologique de l'intestin. Aucune accoutumance.

Indications. — Constipation, Entérite chronique,
Entérocolite, Dermatoses.

Doses et mode d'emploi. — De 1 à 6 comprimés
par jour. Commencer le traitement par deux
comprimés après un des repas, ou au coucher.
Augmenter ou diminuer la dose suivant l'effet
produit. Avaler sans mâcher.

Prix de vente au public : 12 francs.

Laboratoires « LOBICA »

46, avenue des Ternes — PARIS (XVII°).

TEBEPHAGUINE FORNET

Vaccin buccal antituberculeux.

Principe actif. — Bacilles de Koch isolés des affections tuberculeuses les plus diverses ; dégraissés par le procédé FORNET, breveté en France et retenu par l'Institut Pasteur.

Indications. — Tuberculose pulmonaire, ganglionnaire, osseuse et autres.

Posologie. — 1 à 3 pilules par jour.

Propriétés thérapeutiques. — Après une réaction locale et générale, légère diminution et disparition de la fièvre, des sueurs, de la Toux, des Douleurs et de la Faiblesse. Augmentation du poids et des forces. Amélioration de l'appétit, du sommeil et de l'état général.

Prix : 36 francs.

Vente et Echantillonnage :

Laboratoire de Microbiologie

23, rue du Caire — PARIS (II^e).

Gutenberg. 03-45.

TÉCARINE

Homocatélnate de sodium. — **Diurétique déchlorurant.**

Présente sur la théobromine l'avantage de ne pas provoquer de troubles gastriques ni de céphalée.

Présentations : Comprimés (tubes de 10).

Solution injectable : boîtes de 5 ampoules.

Indications :

Toutes les indications de la Théobromine.

Posologie et mode d'emploi :

Voie buccale : 1 à 3 comprimés à 25 centigr. par 24 heures.

Voie hypodermique ou intramusculaire :

1 à 3 ampoules de 2 cc. par 24 heures.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

TÉGÉOL

Antiprurigineux kératoplastique.

Composition. — Pommade répondant à la formule suivante :

| | |
|--|--------------------------|
| Macération huileuse de fleurs de genêt.. | 1 gr. |
| Ochtyosulfate d'ammoniaque | 1 gr. |
| Oxyde de zinc..... | 5 gr. |
| Vaseline | } Q. S. pour..... 30 gr. |
| Lanoline | |

Action thérapeutique. — Antiseptique, analgésique, vaso-constricteur, anti-prurigineux, cicatrisant, kératoplastique.

Indications. — Toutes les Dermatoses, Eczémas, amorphe, vésiculeux, séborrhéique, suintant chronique, Erythèmes, Impétigo, Dartres, Furunculose.

Tous les prurits, Ulcère variqueux, Plaies atones, Brûlures, Gerçures des seins, Engelures, etc.

Mode d'emploi. — En applications locales avec ou sans pansements suivant les cas.

Prix : 12 francs.

Produits PASSEUR

11, rue de Clichy — PARIS. (Tél. : Trinité 23-84.)

TENSÉDINE

HYPOTENSEUR

(Régulateur du tonus artériel.)

Composition. — Tartrate borico-potassique (sédatif antispasmodique). Diméthylxanthine (diurétique, toni-cardiaque). Éther nitreux de glycérine (vasodilatateur).

Indications. — Hypertension artérielle et ses troubles fonctionnels. Troubles vaso-moteurs et spasmes vasculaires : l'Artério-sclérose, Aortites, Artérites, Maladie de Raynaud, Troubles de la circulation périphérique, Troubles de la ménopause.

Forme et posologie. — Comprimés friables, à absorber directement ou délayés dans un peu d'eau.

Dose moyenne : 2 comprimés au début de chacun des trois repas.

Dose d'entretien : 3 comprimés par jour, une semaine sur deux.

Prix : 15 francs.

Émile MONAL

Docteur en Pharmacie

6 bis, rue Bridaine — PARIS (XVII^e).

Tél. : Marcadet 11-22.

TENSOL-LAURENCON

Composition. — Association synergique de médicaments hypotenseurs (cholatate de soude, Silicate de soude, Iode organique). Sédatifs antispasmodiques (dérivés barbituriques, Benzoate de Benzyle) Tonicardiaque, diurétique (Spartéine, Carbonate de Lithine).

Présentation et doses. — Médication par voie buccale, 4 à 6 comprimés par jour, 12 jours consécutifs, plusieurs mois de suite.

Indications. — Artério-sclérose, Hypertension, Arthritisme, Asthme, et tous les accidents secondaires qui en découlent, d'origine artérielle, cardiaque, cervicale, rénale, nerveuse et pulmonaire.

L'étui de 48 comprimés : 15 francs.

Produits J. LAURENCON

VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (Rhône).

TENSORYL - D

Médication hypotensive.

Composition. — Complexe végéto-minéral à base d'éléments hypotenseurs et régulateurs de l'appareil cardio-vasculaire, présenté en pilules glutinisées renfermant :

| | | |
|------------------------------|-----------|--|
| Silicate de soude..... | 0,10 | |
| Nitrite de soude..... | } aa 0,05 | |
| Poudre de scille | | |
| Extrait stab. Crataegus..... | } aa 0,03 | |
| — — Gui | | |
| — — Muguet..... | | |

Indications. — Hypertension en général, Spasmes artériels, Angine de poitrine, Artério-sclérose et ses complications.

Emploi. — Une ou deux pilules avant chacun des trois repas pendant 10 jours par mois.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 27-3.

Prix : 15 fr. l'étui de 60 pilules.

Laboratoires DESCOURAUX

52, boulevard du Temple — PARIS

DESCOURAUX et Fils, Pharmaciens,
Docteur en Pharmacie.

TERCODAL

Traitement symptomatique des Toux, Bronchite, Catarrhe, Asthme, Emphysème.

Formule :

| | |
|-----------------------|-------|
| Ephédrine | 0,003 |
| Terpine | 0,10 |
| Aconit (Extrait)..... | 0,001 |
| Dionine..... | 0,003 |

Posologie :

Adultes : Avaler sans croquer 6 à 8 comprimés par jour.

Enfants : à partir de 6 ans : 2 à 3 comprimés par jour.

Prix : 12 francs.

Forme sirop : 15 francs.

Laboratoires UNIS-SPÈS

14, rue Demarquay — PARIS.

TÉRÉBHINE

Spécifique des suppurations et des septicémies localisées.

(Enregistrée au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments).

Principe actif. — Essence de térébenthine parfaitement rectifiée, donnant par simple addition avec l'eau, une émulsion régulière, à grains très fins.

Forme. — Liquide. S'emploie en émulsions de 0,5 à 10 p. 100 dans de l'eau stérilisée ou bouillie.

Propriétés thérapeutiques. — Leucocytogène très actif, la TÉRÉBHINE exerce un puissant drainage leucocytaire et augmente la phagocytose. Tarit les suppurations les plus rebelles. Action plus nette et plus rapide que celle des antiseptiques communs.

Désodorisant de premier ordre.

Fluidifie l'expectoration. Guérit les catarrhes.

Applications internes :

Antiseptiques des voies respiratoires et des voies urinaires. Anticatarrhal et antidiarrhéique.

Prendre en gouttes dans du lait chaud, ou infusions sucrées.

Applications externes :

Obstétrique : Infection puerpérale (injections intra-utérines).

Gynécologie : Leucorrhées, suppurations post-opératoires et post-abortum (injections et tamponnements).

Urologie : Urétrite chronique sans gonocoques (injections urétrovésicales).

Chirurgie : Toutes suppurations à strepto, staphylo, pneumo... Plaies infectées, gangréneuses. Abscesses. Anthrax, Ostéites. Ostéomyélites (compresses, mèches, pansements).

O. R. L. : Fistules, Pyorrhées, Suppurations post-opératoires (lavages sous pression, mèches, gargarismes, lavages de bouche, instillations, etc.). Ozène (traitement symptomatique par lavages de nez).

Flacon grand modèle (310 cc.) : 30 francs.

Flacon petit modèle (60 cc.) : 12 fr. 50.

P. PLANCHE

Pharmacien de 1^{re} classe

1, boulevard de la Madeleine — MARSEILLE

TERKAL MONAL

Forme. — Dragées.

Composition. — Carbonate de gaiacol terpino-codéiné associé au fluorure de calcium nucléiné et aux extraits de plantes béchiques.

Dose. — Quatre à six dragées par jour entre les repas. Avaler sans croquer.

Action. — Calmantes, Expectorantes, Curatives, Reminéralisatrices.

Indications. — Toux, Bronchites, Affections broncho-pulmonaires.

Le flacon de 30 dragées : 10 francs.

Laboratoires MONAL et C^{ie}

6, rue Bridaine — PARIS.

TEROZONE

Térébenthine thérapeutique.

Composition. — Térébenthine riche en ozone.

Propriétés thérapeutiques. — Stimulant des fonctions glandulaires, modificateur des muqueuses bronchiques et urinaires, dissolvant des calculs biliaires, générateur d'énergie.

Formes. — Trois formes.

TEROZONE T pour usage interne.

Indications. — 1° Affections respiratoires chroniques quelles qu'elles soient.

2° Diathèse arthritique dans toutes ses manifestations.

3° Affections génito-urinaires.

4° Aux troubles des glandes endocrines.

Mode d'emploi. — Tâter la susceptibilité stomacale de chaque malade en commençant par de petites quantités.

Prendre dans un peu d'eau froide sans sucre, immédiatement avant les deux principaux repas, le premier jour, V gouttes, augmenter d'une goutte par jour et par repas, jusqu'à XXX gouttes, puis redescendre d'une goutte par jour et par repas jusqu'à V gouttes. Se reposer 10 jours, puis recommencer de la même façon, jusqu'à résultat.

Prix : 16 francs.

TEROZONE U, pour usage externe.

En frictions, massages, fumigations.

Indications. — 1° Toutes les affections pulmonaires, aiguës ou chroniques.

2° Toutes les affections arthritiques.

3° Les périviscérites, les épiploïtes, les congestions utérines, les annexites (méthode de la compresse).

Mode d'emploi. — Les *frictions* et *massages* doivent être légers et d'une durée maxima de cinq minutes. Recouvrir ensuite d'une gutta-percha et d'un bandage.

Pour les *fumigations*, 1 cuillerée à café dans un bol d'eau bouillante. En cas de cervicite ou de périviscérite, imprégner une compresse et l'appliquer sur la peau.

Prix : 15 francs.

TEROZONE G.

Spécialement préparée pour l'usage **gynécologique, urologique et usage externe**, lavage des plaies.

Mode d'emploi. — 1 cuillerée à bouche par litre d'eau tiède à 30°. Dans l'urétrite gonococcique faire de grands lavages avec 2 litres d'eau bouillie tiède additionnée d'une cuillerée à soupe de TEROZONE G matin et soir.

Prix : 20 francs.

Laboratoire Ch. BOUVELOT

Ancien interne des Hôpitaux de Paris,

Docteur en Pharmacie,

Ancien professeur de Chimie

62, rue d'Antibes — CANNES.

TERPINE GONNON

Présentation et composition. — *Elixir* : Terpene et sirop de Tolu (1 verre à liqueur — 0 gr. 20 de terpene).

Granulé : Terpene, Phosphate de codéine, Aconit, Tolu, Polygala, Erysimum et gaïacosulfonate de potassium.

Pilules : Terpene, 0 gr. 10 ; Codéine, 0 gr. 005 ; Benzoate de soude, 0 gr. 15.

Pâte : Terpene, aconit, benzoate de soude, Tolu, Terpinol.

Pastilles : Terpene 0 gr. 05 et Tolu.

Propriétés thérapeutiques. — Augmente et fluidifie la sécrétion bronchique.

Posologie :

Elixir : 2 à 4 verres à liqueur par jour 20 fr.

Granulé : 5 à 6 cuillerées à café par jour 12 fr.

Pilules : 4 à 6 pilules par jour 8 fr.

Pâtes : 15 à 20 morceaux par jour..... 4 fr. 50

Pastilles : 8 à 10 pastilles par jour 4 fr. 50

Indications. — Toux, rhumes, catarrhes, bronchites, emphysème. Employée aussi avec succès contre les maladies des voies urinaires et contre les affections du système nerveux.

Produits GONNON

14, rue Victor-Hugo — LYON.

TERPINE GRANULÉE BARON

Composition. — Terpene pure et benzoate de soude.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique des voies respiratoires, facilite l'expectoration et tarit les sécrétions bronchiques ; diurétique et antiseptique urinaire.

Indications. — Rhinites, Laryngo-Trachéites, bronchites aiguës, subaiguës, chroniques ; Catarrhe bronchitique des emphysémateux ; Bronchorrée ; Dilatation des bronches ; Coqueluche ; Cystites ; Infections urinaires, etc...

Doses. — 2 à 4 cuillerées mesures par jour. *Enfants* : demi-dose.

Prix : 11 francs.

Laboratoire FLAHAUT

74, rue Monge — PARIS (V°).

TERPOXYL INTERNE

du Docteur Barinque.

Liquide générateur d'oxygène à l'état naissant
au-dessus de 35° C.

Composition. — Solution alcoolique faible de Terpènes peroxydés. Oxygène actif : 0 gr. 0096 pour 100 gr.

Propriétés. — Anti-thermique, anti-toxique, tonique et stimulant.

Indications. — Toutes dépressions ; choc hémoclasique ou autres ; Pneumonie (régression fébrile en 24 heures). Toutes maladies infectieuses.

Posologie. — *Fièvre intense* : XV gouttes toutes les heures dans 1/4 verre d'eau sucrée ; espacer avec la régression fébrile.

Tonique : XV gouttes, quatre fois par jour.

Prix du flacon : 12 fr.

TERPOXYL EXTERNE

du Docteur Barinque.

Cède son oxygène à l'état naissant au-dessus de 35° C.
Cicatrisant rapide. — Atoxique. — Non caustique.

Composition. — Solution alcoolique faible de terpènes et sesquiterpènes peroxydés. Oxygène actif : 0 gr. 0384 pour 100 gr.

Propriétés. — Désinfectant et désodorisant parfait pour toutes plaies, même cancéreuses, cicatrisant rapide.

Indications. — Plaies, Ulcères variqueux, Gerçures des seins, Blennorrhagies, Affections de la peau, de la gorge, Angines, Coryzas, Otites, Mastoïdites, Sinusites, etc...

Posologie. — En solution de concentration croissante depuis 1/10 de Terpoxyll externe pour 9/10 d'eau bouillie ou distillée jusqu'à 1/2 ou pur suivant la sensibilité de la muqueuse traitée.

Prix du flacon : 16 fr.

OVULES au TERPOXYL

du Docteur Barinque.

Antiseptiques - Cicatrisants - Non caustiques.

Indications. — Leucorrhée, Métrites, Salpingites, etc.

Prix de la boîte : 14 fr.

Echantillons et littérature :

Laboratoire JOLLY

1, rue Christine — PARIS (VI^e).

Tél. Danton 49-39. — L. N. C. M. 40-2-3-4

TÉTRANITROL ROUSSEL

Composition.

Comprimés de Tétranitrates d'Erythrol à 1, 2, 5 mmgr. et 1 centigramme.

Indications :

Hypertension : **Angine de poitrine, asthme cardiaque, œdème pulmonaire.**

Doses et mode d'emploi :

Laisser fondre les comprimés sur la langue (de 1 à 15 mmgr. par 24 heures).

Comp. à 1-2-5 mmgr. et 1 centgr.

Prix : 10 fr.-12 fr. 50-15 fr.-20 francs.

Pharmacie ROUSSEL

10, rue Washington — PARIS (VIII^e).

THAOLAXINE

(Laxatif-régime.)

Combinaison d'agar-agar et d'extrait de rhamnées. Paillettes, cachets, comprimés, granulé.

Doses et mode d'emploi. — Paillettes, 1 à 4 cuillerées à café à chaque repas ; cachets, 1 à 4 cachets à chaque repas ; comprimés, 2 à 8 comprimés à chaque repas ; granulé, 1 à 2 cuillerées à café à chaque repas (spécialement préparé pour les enfants).

Propriétés thérapeutiques. — Exonérateur de l'intestin, agit en augmentant le volume et l'hydratation des fèces.

Indications. — Spécifique de la constipation habituelle.

Prix : 12 francs.

Thaolaxine paillettes : la boîte triple dose : 27 francs.

**Laboratoires DURET et RÉMY
et du Docteur Pierre ROLLAND**

ASNIERES (Seine).

THEBAIL

(Opium essentiel.)

Propriétés. — Le *Thébaïl* (opium essentiel), qui exclut de sa composition les alcaloïdes convulsivants et stupéfiants de l'opium et qui n'en conserve que les alcaloïdes soporifiques et calmants, donne la puissance maxima de l'opium, avec toutes les efficacités pacificatrices que l'on attend de ce précieux agent. Enfin son activité physiologique est rigoureusement dosée *in vivo*.

Formes thérapeutiques. — Le *Thébaïl* est présenté sous 2 formes :

1° En ampoules isovisqueuses indolores dosant par cc. :

| | |
|-------------------------------|--------|
| Thébaïl | 2 cgr. |
| équivalent à { morphine | 1 — |
| { extrait d'opium | 5 — |

2° En suppositoires dosant :

| | |
|---------------|--------|
| Thébaïl | 2 cgr. |
|---------------|--------|

Posologie pour les adultes :

| | | |
|--------------------|----------------------|---------------|
| Ampoules..... | 1 à 2 par 24 heures. | Prix : 20 fr. |
| Suppositoires..... | 1 — — | — 15 fr. |

Dépôt : **Laboratoires NOGUÈS**

7, rue Galvani — PARIS

LE THÉ D'ORANGER

Joseph Nègre

Le plus simple des digestifs, le seul calmant naturel en une infusion délicieuse.

Composition. — Produit absolument pur composé exclusivement de pétales de fleurs d'oranger soigneusement triés et séchés par un procédé spécial tenu secret.

Formes. — 3 modèles de paquetages.

N° 0 (pour 25 tasses).

N° 1 (pour 50 tasses).

N° 2 (pour 100 tasses).

Indications. — Facilite la digestion en exerçant une action sédative sur les terminaisons nerveuses de la muqueuse stomacale.

Combat avec succès l'insomnie des nerveux, des convalescents, des surmenés intellectuels, des vieillards, des digestifs (hyperchlorhydriques et gros mangeurs).

Calmé l'agitation des enfants et des nourrissons.

Mode d'emploi :

1° En infusion chaude. 2° En infusion froide. Une cuillerée à café pour une théière (1 tasse) d'eau bouillante, laisser infuser pendant 5 à 10 minutes ; sucrer à volonté.

Prix : Public : n° 0, 10 francs ; n° 1, 18 francs ; n° 2, 34 francs.

Médical : n° 0, 7 francs ; n° 1 12 fr. 60 ; n° 2, 23 fr. 80.

Littérature et échantillons sur demande.

« **LE THÉ D'ORANGER Joseph Nègre** »

18, rue Louis-Blanc — CANNES (Alpes-Maritimes).

THÉINOL

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments, sous le N° 363-9.

Forme. — Elixir.

Composition. — Théine en combinaison salicylique, Salicylate d'Antipyrine.

Propriétés pharmacodynamiques. — Euphorique. — *Antidépresseur*. — Analgésique. — Régulateur des fonctions nerveuses. — Tonique circulatoire.

Indications. — Migraines. — Névralgies. — Douleurs rhumatoïdes. — Crises gastro-intestinales. — Dysménorrhées.

Mode d'emploi. — Deux cuillerées à dessert à une heure d'intervalle l'une de l'autre.
Le flacon : 14 fr. (en France).

Laboratoires A. BAILLY

15, rue de Rome — PARIS (VIII^e).

THÉISINE DUBAT

Granulé de Théobromine et Extrait de maïs.

Propriétés thérapeutiques. — Diurétique idéal dans les affections du cœur et des reins. Action certaine, constante, durable ; toxicité nulle ; pas de céphalées, pas d'intolérance. *Granulé* de goût agréable préféré aux cachets et aux solutions par les enfants et les vieillards.

Indications. — Toutes celles de la théobromine, insuffisance cardiaque, endocardite, myocardite, fléchissement du cœur dans l'artériosclérose, affections cardiorénales, mal de Bright, albuminurie, néphrite, maladies infectieuses et tous les cas d'insuffisance urinaire.

Doses. — 2 à 8 cuillerées à café par jour.

Cuillerée à café = $\begin{cases} 0 \text{ gr. } 25 \text{ théobromine pure.} \\ 0 \text{ gr. } 05 \text{ extrait de maïs.} \\ 0 \text{ gr. } 05 \text{ phosphate de soude.} \end{cases}$

Prix : 14 francs.

Echantillons sur demande

LABORATOIRE DU D^r DUBAT

80, rue du Faubourg-Saint-Denis — PARIS

THEMSALINE

Composition. — La Themsaline préparée d'après les travaux du Dr Jentzer, de Genève (Voir *Traitement biologique des infections*, Masson, éditeur), est un mélange fractionné et rectifié d'essences, de résine élémi, de baume du Pérou et de thymol.

Propriétés. — Agit comme antiseptique, antitoxique, analgésique, sédatif, leucogène et tonique. Attaque l'infection *étiologiquement* et non symptomatiquement comme tous les narcotiques.

Indications. — *Toutes les infections aiguës* : grippe et infections pyogènes, érysipèle, angines, annexites, septicémies, anthrax, phlegmons, péritonites, fistules d'origine infectieuse, plaies infectées. *Contre-indications* : éviter les doses fortes dans la pneumonie, la broncho-pneumonie, les néphrites.

Mode d'emploi. — En injections intraveineuses, pratiquées *très lentement* (durée 10 minutes environ), avec une seringue à tuberculine et, de préférence, avec l'aiguille spéciale Jentzer : 6/10 cc. chez l'adulte et 3/10 cc. chez l'enfant. Une injection par jour, jusqu'à guérison ou apyrexie.

Prix :

6 ampoules avec aiguille spéciale : 45 francs.

6 ampoules sans aiguille : 35 francs.

Aiguille spéciale Jentzer, seule : 10 francs.

Laboratoire ZYMA

9, place Félix-Faure — PARIS (XV^e).

Tél. : Vaugirard 28-83.

THÉOBROMINE INVAR

Produit soumis au **contrôle physiologique** le plus rigoureux ; donne les plus sûres garanties de *pureté chimique* et d'*activité constante*.

Action. — Diurétique puissant.

Indications. — Néphrites, cardiopathies, artériosclérose, arthritisme.

Formes. — Pure, caféinée, lithinée, phosphatée, en boîtes de 24 cachets à 0,50.

Prix au public : 12 fr.

Pharmacie Centrale de France

7, rue de Jouy — PARIS (IV^e).

THÉOBROMOSE DUMESNIL

Théobrominate de lithium cristallisé.

Prop. théér. — Possède les propriétés toni-cardiaques et diurétiques de la théobromine, mais est dépourvue des inconvénients de celle-ci ; son activité se manifeste à des doses 5 fois moindres. Elle agit quand la théobromine est inefficace et provoque l'excrétion de l'urée et des chlorures.

Indications. — Les effets cardio-toniques et vaso-dilatateurs de la Théobromose, en outre de son action diurétique énergique, font de ce produit associé ou non à la Digitaline la base de la thérapeutique cardio-rénale. Elle est indiquée dans l'urémie, l'uricémie, l'artério-sclérose, la sclérose cardio-rénale, les œdèmes d'origine cardiaque ou rénale, etc.

Formes. — 1^o Solution. Dose : 1 à 4 cuillerées à soupe par jour dans un peu d'eau sucrée. — Une cuillerée contient 0,25 cgr. de théobrominate de lithium.

2^o Gouttes. (Exportation). — Dose : 1 cuiller-mesure ou LX gouttes, une à quatre fois par jour. — LX gouttes ou une cuiller-mesure contiennent 0,25 gr. de théobrominate de lithium.

3^o Comprimés. — Dose : 2 à 8 par jour. — 2 comprimés contiennent 0,25 cgr. de théobrominate de lithium.

Enregistrée au Laboratoire National de Contrôle sous les nos 1-5 et 1-7.

Prix : 20 francs.

Laboratoires DUMESNIL
10, rue du Plâtre — PARIS.

THÉOBRYL « ROCHE »

(Théobromine injectable).

Indications, Contre-indications, Action thérapeutique de la Théobromine, mais plus maniable, plus actif et à doses moindres. (Voir les travaux des Professeurs Pouchet, Rémond, E. Duhot, des Docteurs Jouisse, Richard St-Yves, Bénech, Ségard, Vigoureux, Colombiès, Crampon, etc.).

Toujours très bien toléré par les adultes, les vieillards et les enfants.

THÉOBRYL « ROCHE » AMPOULES

Chaque ampoule = 2 cc.

Cette forme est indiquée quand il y a intolérance gastrique ou susceptibilité du malade et chaque fois qu'il faut agir vite et imposer un traitement intensif.

ADULTES : dose moyenne utile, 1/2 ampoule 2 à 3 fois par jour.

THÉOBRYL « ROCHE » GOUTTES

Cette forme permet de continuer et de prolonger l'action obtenue par les injections ou de réaliser un *traitement d'entretien* toujours parfaitement supporté. Chaque dose doit être prise dans un verre d'eau sucrée ou aromatisée, ou bien dans une tasse de tisane de queues de cerises, orge et chiendent, stigmates de maïs, etc., à n'importe quel moment de la journée, de préférence une demi-heure avant ou après les repas.

Adultes : dose moyenne utile, X gouttes 4 à 8 fois par jour.

Enfants : III gouttes 2 à 6 fois par jour.

Enregistré au Laboratoire national de contrôle des médicaments sous les n^{os} 504-44 (ampoules) 504-45 (gouttes).

Produits

F. HOFFMANN-LA ROCHE et C^{le}

10, rue Crillon — PARIS (IV^e).

THÉOCALCIODE

Composition. — Association de Théobrominate de Lithium, Salicylate de Chaux, Iode combiné (peptones).

Comprimés contenant :

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Théobrominate de Lithium..... | 0 gr. 15 |
| Salicylate de Chaux..... | 0 gr. 25 |
| Iode combiné..... | 0 gr. 002 |

Indications. — Diurétique idéal des néphrites avec rétention sèche et des grands œdèmes cardiaques. Médicament de fond de la Dyspnée cardiaque, de l'Asthme, des Scléroses organiques, de l'Obésité, des Hyperthyroïdiens, des Etats endocriniens complexes.

Présentation. — Boîte contenant 40 Comprimés.

Posologie. — Six à huit Comprimés par jour comme diurétique. Quatre à six Comprimés par jour, aux repas, dix jours de suite, chaque mois, pour les affections chroniques.

Prix : 20 francs.

Laboratoire PERRIER

17 bis, boulevard Rochechouart — PARIS (IX^e).

Tél. : Trudaine 03-01.

THÉOSALVOSE

Composition. — Cachets de Théobromine chimiquement pure, extraite du cacao.

Propriétés. — Diurétique d'une innocuité complète, d'un pouvoir remarquable, d'une fidélité constante.

Indications. — Artériosclérose, Affections cardiaques et rénales. Albuminurie, Intoxications, Urémie, Uricémie, Goutte, Gravelle, Rhumatismes, Hydropisie, Maladies infectieuses, Scarlatine.

Moded'emploi. — 2 à 4 cachets dosés à 0 gr. 50 ou 4 à 8 cachets dosés à 0 gr. 25 par jour.

Formes. — Théosalvose pure, digitalique, strophantique, spartéinée, scillitique, barbiturique, caféinée, phosphatée, lithinée.

Prix : 15 francs et 17 fr. 50.

Laboratoires André GUILLAUMIN

13, rue du Cherche-Midi — PARIS.

THÉOVADIL

DIURÉTIQUE CONSTANT VASO-DILATATEUR

Composition. — Diméthylxanthine rigoureusement pure ne provoquant ni nausées, ni céphalée, en comprimés dosés à 0 gr. 25.

Indications. — Affections cardiaques et rénales, Albumine, Artériosclérose, Urémie, Uricémie.

Mode d'emploi. — De 2 à 12 comprimés en 24 heures délités dans un peu d'eau et répartis en 2 ou 3 doses.

Dose moyenne : 3 comprimés matin et soir.

Laboratoires du THÉOVADIL
85, rue des Morillons — PARIS (XV^e).

THÉOVÉRINE LALEUF

(Dragées)

Composition. — Chaque dragée contient très exactement :

| | |
|------------------------------|------|
| Théobromine pure | 0,15 |
| Papavérine chlorhydrate..... | 0,01 |

Propriétés et Indications thérapeutiques. — Antispasmodique et hypotenseur remarquable. Grâce à son action vaso-régulatrice et dilatatrice, la THÉOVÉRINE rétablit une circulation normale et évite le retour des crises angineuses.

La THÉOVÉRINE présente une action favorable à l'augmentation de la Diurèse.

Spécialement indiquée dans :

Angine de poitrine (traitement préventif).

Artério-sclérose.

Insuffisance aortique.

C'est le médicament par excellence des *Cardio-Rénaux*.

Doses et Mode d'emploi. — De 3 à 6 dragées par jour, suivant les indications du médecin traitant. Maximum : 10 dragées par 24 heures.

Etui de 60 dragées : 20 francs.

Laboratoires LALEUF
51, rue Nicolò — PARIS (XVI^e).

THÉOXANTHINE

Association Théobromine crist. pure-Phosphate disodique
en comprimés *glutinisés*.

Le complexe Théobromine-Phosphate disodique (THÉOXANTHINE) constitue la forme de choix pour l'administration de la Théobromine. Mais cette combinaison assez instable est en partie dissociée par l'acidité du suc gastrique. Pour obvier à cet inconvénient, nous avons préparé la THÉOXANTHINE sous forme de comprimés glutinisés. L'enrobage du gluten se désagrègeant seulement dans le duodénum, libère le principe actif en milieu alcalin où l'association Théobromine-Phosphate disodique est beaucoup plus stable. On obtient ainsi une absorption lente et continue de la Théobromine au cours de la traversée intestinale. Il en résulte une activité sensiblement accrue et une tolérance parfaite.

Composition : { Théobromine cristallisée pure..... 0 gr. 25
 Phosphate disodique..... 0 gr. 10
 Excipient Q. S. pour 1 comprimé glutinisé.

Indications. — Toutes celles de la Théobromine. Activité plus grande à dose moindre. Tolérance parfaite.

Posologie. — 2 à 8 comprimés par jour.

Echantillons et littérature :

Laboratoires DEGLAUDE

15, boulevard Pasteur — PARIS. XV^e — Tél. : Suffren 79-59.

Belgique :

Agent général : L. PRUNIÈRES

19, rue Louis-Hap — BRUXELLES.

THERMOCÉDONE

Analgésique et antithermique.

Le **Thermocédone**, en gouttes et en suppositoires, constitue un traitement d'attaque et d'entretien de toutes les algies et de toutes les fièvres.

Le **Thermocédone** est plus actif que les cachets d'antipyrine et pyramidon, et sans aucune action néfaste sur le système gastro-intestinal. Il convient aux enfants, aux adultes, aux vieillards et aux estomacs les plus délicats.

Composition des suppositoires Thermocédone :

| | | |
|--------------------------------|---------|-------------|
| Chlohydrate d'amyléine..... | 1 cgr. | |
| Analgésine..... | 75 cgr. | Excipient : |
| Diméthyl amino antipyrine..... | 25 cgr. | Q. S. |
| Extrait de jusquiame stab..... | 2 cgr. | |

Composition des gouttes Thermocédone :

| | | |
|---------------------|-------|-------------|
| Analgésine..... | 6 gr. | Excipient : |
| Diméthyl amino..... | 4 gr. | Q. S. |

Posologie :

Suppositoires : **Adultes** : 1 à 2 par jour.

Enfants : à partir de 13 ans : 1 par jour.

Gouttes : **Enfants** : 10 à 12 par jour et par année d'âge.

Adultes : 120 à 240 par jour.

Sur prescription médicale seulement.

Prix au public. Suppositoires : Boîte de 5 : 9 fr. 50. Boîte de 10 : 15 fr. 50

Gouttes : le flacon avec compte-gouttes : 15 fr. 50.

Laboratoire PERICHON

11, rue Lepic, 11 — PARIS (XVIII^e).

THIGÉNOL « ROCHE »

Solution aqueuse d'oléo-sulfonate de sodium, ni toxique, ni caustique, sans odeur désagréable et ne laissant pas de taches indélébiles sur le linge.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique, analgésique, kératoplastique, décongestionnant et puissamment résolutif.

Indications thérapeutiques. — Dermatologie, Otorhino-laryngologie, Ophtalmologie, Médecine générale, Erysipèle, Brûlures, Fissures, Rhumatismes, etc.

Thigénol « Roche » pur ou en solution glycinée (10 à 15 p. 100) en applications externes.

Toutes les affections gynécologiques :

Thigénol « Roche » pur ou en solution glycinée (10 à 15 p. 100).

Ovules « Roche » au *Thigénol* à 30 p. 100 (voir page spéciale).

Tampol « Roche » pansement gynécologique idéal (voir page spéciale).

Enregistré au Laboratoire national de contrôle des médicaments sous les n^{os} 504-46 (*liquide*), 504-47 (*ovules*), 504-42 (*tampol*).

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et C^{ie}
10, rue Crillon — PARIS (IV^e).

THIOCITRAN THEVENOT

Granulé soluble.

Soufre — Magnésium.

Composition. — Citrate de chaux, hyposulfite de magnésium, sulfate de magnésie, oxyde de magnésie, peptone et amidon soluble.

Propriétés. — Cholagogue et antianaphylactique, Régulateur des Fonctions gastro-intestinales, Dépuratif, Tonique.

Indications. — Affections du foie et des voies biliaires. Troubles digestifs, Constipation, anaphylaxie, dermatoses, urticaires, arthritisme.

Mode d'emploi. — 1 à 3 cuillerées à café par jour, soit à jeun le matin, soit 1/2 heure avant chaque repas. *Enfants* : 1/2 dose.

Prix de la boîte de 125 gr. : 18 francs.

Laboratoire THEVENOT — DIJON.

THIOLCOL « ROCHE »

Dérivé du gaiacol, inodore, ni toxique, ni caustique, soluble dans l'eau.

1 gr. de Thiocol « Roche » = 0,52 ctgr. de gaiacol cristallisé.

Doses et mode d'emploi :

SIROP « ROCHE » au Thiocol.

(1 cuill. à soupe = 1 gr. Thiocol « Roche »)

Adultes : 2 à 4 cuill. à soupe par jour.

Enfants : 2 à 4 cuill. à café, selon l'âge.

CACHETS « ROCHE » de Thiocol.

(1 cachet = 0,50 ctgr. Thiocol « Roche »)

2 à 6 cachets par jour

COMPRIMÉS « ROCHE » de Thiocol.

(1 comprimé = 0,50 ctgr. Thiocol « Roche »)

2 à 6 comprimés par jour.

Propriétés thérapeutiques :

Antiseptique pulmonaire, Phagocytogène, Eupeptique, Orexique.

Indications thérapeutiques :

Toutes les affections broncho-pulmonaires, Tuberculose, Bronchites aiguës et chroniques, Grippe, Pneumonie, Coqueluche, Scrofule, Anémie, Rachitisme, Dyspepsies, Entérites, Diarrhées, etc.

Enregistré au Laboratoire national de contrôle des médicaments sous les n^{os} 504-50 (*poudre*), 504-51 (*sirop*), 504-48 (*cachets*), 504-49 (*ccmprimés*).

Produits

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}

10, rue Crillon — PARIS (IV^e).

THIONAPHTE

Composition. — Le premier « soufre soluble » (combinaison électrolytique sous pression à l'autoclave).

Propriétés. — Antiprurigineux, Calmant.

Indications. — Eczéma, Sycosis, Psoriasis, Impetigo.

Contre indications. — Eczéma suintant
Ulcère variqueux.

Forme liquide.

Ne contient aucun corps gras.

Prix : P. M., 12 fr. — G. M., 25 fr.

Traitement Interne. — Dépuratif Santa.

P. LACHAISE, Docteur en Pharmacie.
TULLE (Corrèze).

THIOPHYL

Indications. — Traitement interne de la *furunculose* et de *toutes les dermatoses à staphylocoques* : acné, anthrax, orgelets, panaris, abcès de l'aiselle et du sein.

Posologie. — 3 à 9 pilules par jour en doses régulières et progressives (voir prospectus.)

Composition. — Sulfures complexes, ions calcium et charbon activé.

Propriétés. — Disparition rapide de la douleur et généralement régression des phénomènes inflammatoires dès le 3^e jour.

Le flacon de 100 pilules : 20 francs.

Echantillons gratuits :

Laboratoires G. BEYTOUT

12, boulevard Saint-Martin — PARIS (X^e).

Tél. : Nord 76-85.

THIORINE

(Voir Sulfo-Thiorine).

THIOSÉDAL EX-THIOSÉDOL

Sédatif de la toux.

Antisepsie de l'appareil respiratoire.

Composition :

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Sulfogaïacolate de Potassium | |
| (THIOCOL) | 0 gr. 10 |
| Dionine (1/2 cgr.) | 0 gr. 005 |
| Extrait mou de jusquiame..... | 0 gr. 01 |
| Pour 1 comprimé dragéifié n° 40. | |

Prix : 14 francs.

Posologie :

4 à 8 comprimés par jour.

Laboratoires M. BORNE

79, rue de Paris — SAINT-DENIS (Seine).

THIOSOTE LAMBIOTTE FRÈRES

Sirop concentré à base de sulfo-créosotate de potassium et de teintures de Lobélie et de Drosera.

Propriétés thérapeutiques. — Bactéricide, dynamogène, sclérogène, modificateur des échanges respiratoires.

Indications. — Affections des voies respiratoires.

Mode d'emploi :

Adultes : 4 cuillerées à dessert par jour.

Enfants : A partir de 3 ans (4 cuillerées à café par jour), à prendre de préférence comme édulcorant d'une boisson chaude (lait, tisane, etc.).

Nourrissons : XXV à L gouttes par jour selon l'âge par prise de V à X gouttes mélangées au lait.

Prix : 15 francs.

Littérature et Echantillons :

Produits LAMBIOTTE FRÈRES

20, rue Dumont-d'Urville — PARIS.

124, avenue Rogier — BRUXELLES.

THIO-TERPINE DALIN

Médication des voies respiratoires.

Composition. — Sulfogaïacolate de potasse associé à la terpine avec benzoate de soude et codéine.

Présentation et doses :

Cachets : 2 à 3 cachets par jour (un cachet = 0,20 sulfog. potasse, 0,10 terpine, 0,007 codéine).

Elixir : 2 à 3 cuillerées à soupe par jour (une cuillerée = 0,20 sulfog. potasse, 0,10 terpine, 0,007 codéine).

Granulés : 2 à 4 cuillerées à café par jour (une cuillerée à café = 0,10 sulfog. potasse, 0,05 terpine).

La forme *Granulée* ne contient pas de codéine.

Indications thérapeutiques. — Toutes les affections des voies respiratoires. Antisepsie broncho-pulmonaire. Tuberculose. Laryngites. Asthme. Coqueluche, etc...

Prix :

Cachets, Granulés, 12 francs. — *Elixir*, 15 francs.

Laboratoires DALIN

R. BOITAS et C^{ie}

1, rue de la Martinière — LYON.

THORIX (THORIUM X RHEMDA)

En injection hebdomadaire intramusculaire indolore.

Ses indications. Sa posologie.

Rhumatisme sous toutes ses formes, Goutte, Sciaticque, Psoriasis : 8 à 10 piqûres consécutives à raison d'une par semaine, activité augmentant progressivement de 100 à 300 microgrammes, par 50 microgrammes, ne pas dépasser l'activité 300.

Leucémie, Lymphadénie, Fibromes, Tumeurs, Néoplasmes : 5 piqûres consécutives, à raison d'une par semaine. 2 à 400, 1 à 450, 2 à 500 microgrammes.

Psychoses : 3 piqûres hebdomadaires : 500, 600, 700 microgrammes. Ampoule préparatoire : 250 microgrammes.

| Prix de vente au public : | Paris et Banlieue. | Province. |
|---------------------------|-----------------------|-----------|
| 25 micros..... | 5 » | 6 » |
| 50 — | 10 » | 12 » |
| 75 — | 15 » | 18 » |
| 100 — | 20 » | 24 » |
| 150 — | 22 50 | 27 » |
| 200 — | 30 » | 36 » |
| 250 — | 37 50 | 45 » |
| 300 — | 45 » | 54 » |
| 400 — | 60 » | 72 » |
| 450 — | 67 50 | 81 » |
| 500 — | 75 » | 90 » |
| 600 — | 90 » | 108 » |
| 700 — | 105 » | 126 » |
| 1 000 — | 150 » | 180 » |

Remise au Corps médical : 30 %.

Droit fixe par ampoule : 5 francs.

Le THORIX se prépare une fois par semaine il est donc indispensable de passer les commandes à notre Usine (51, rue d'Alsace, à Courbevoie. Tél. : Wagram 58-89) le lundi au plus tard.

Les ampoules sont livrées le mercredi à Paris et banlieue et le jeudi en Province. Toutes les doses sont exprimées en microgrammes de Bromure de Radium.

Laboratoires RHEMDA

Fondés en 1914

S. MOGAN, Pharmacien

17, rue d'Hauteville — PARIS (X^e).

THOROXYL

Antiseptique intestinal - antidiarrhéique
non constipant.

Pharmacologie. — A base de terres rares, bactéricide et favorisant l'action des sucs digestifs.

Indications. — Tous les états diarrhéiques du nourrisson, de l'enfant et de l'adulte. Tous les syndromes infectieux à point de départ intestinal (colibacillurie, etc.).

Posologie. — Aucune contre-indication. Aucune toxicité. 6 à 10 comprimés pour l'adulte ; 2 à 6 comprimés pour l'enfant et le nourrisson.

Prix au public : 12 francs.

Laboratoires du D^r LAURENT-GÉRARD

Docteur ès sciences.

Ancien chef de Laboratoire à la Faculté de Médecine
de Paris.

40, rue de Bellechasse — PARIS.

Tél. : Littré 97-95.

THYRÉNINE GRÉMY

Principes actifs totaux de la glande thyroïde.

Produit rigoureusement dosé, toujours identique à lui-même ; conserve indéfiniment ses propriétés, renferme tous les principes actifs du corps thyroïde ; exclusivement thyroïdien, sans parathyroïdes.

Indications thérapeutiques. — Tous les cas d'insuffisance thyroïdienne, myxœdème de l'enfant, de l'adulte et post-opératoire, signes nerveux, respiratoires, cutanés, menstruels, etc...

Formes pharmaceutiques :

- 1° Pilules dosées à 2 cgr. de principes actifs. Correspondant à 0 gr. 20 de glande fraîche.
- 2° Tablettes pour enfants, dosées à un cgr. de principes actifs correspondant à 0 gr. 10 de glande fraîche.
- 3° Gouttes : X gouttes équivalent à 1 pilule, soit 0 gr. 20 de glande fraîche.
- 4° Ampoules : 1 cc. correspond à 0 gr. 60 de glande fraîche.

Laboratoires G. GRÉMY

14, rue de Clichy — PARIS.

THYROCRÉINE GREMY

Médication polyvalente thyro-ovarienne.

Principes actifs totaux purifiés et stabilisés des organes suivants pris à l'état frais :

Corps jaune de l'ovaire 0 gr. 20

Glande thyroïde 0 gr. 05

2 à 6 pilules par jour pendant 20 jours.

Indications thérapeutiques. — Insuffisance ovarienne et insuffisance thyroïdienne associées. — Eveil des fonctions ovariennes au moment de la puberté. — Myxœdème fruste. — Basedow de la Ménopause. *Obésité* de la ménopause.

Rhumatisme chronique déformant de la ménopause.

Laboratoires G. GRÉMY

14, rue de Clichy — PARIS.

THYROXINE « ROCHE »

Thyroxine synthétique préparée suivant les données de Harington et Barger.

Ampoules: (boîtes de 6) une ampoule de 1 cc. = 1 milligr. de thyroxine.

Comprimés (flacons de 30): un comprimé = 1/2 milligr. de thyroxine.

Solution (flacons de 15 cc.): 1 cc. 2 milligr. de thyroxine.

Indications :

Obésité générale, Myxœdèmes, Goitre, Cachexie strumiprive, Troubles de la croissance et du développement, Oligurie.

Modes d'emploi et doses :

Voie buccale : 1 à 2 comprimés ou X à XV gouttes par jour et plus.

Voie intramusculaire : 1/2 à 1 ampoule par jour et plus.

Les injections peuvent être aussi endoveineuses et même sous-cutanées, celles-ci déterminant une légère sensation de tension qui disparaît rapidement.

Enregistré au Laboratoire national de contrôle des médicaments sous les n^{os} 504-52 (*ampoules*), 504-53 (*comprimés*), 504-57 (*solution*).

Produits

F. HOFFMANN-LA ROCHE et C^{ie}
10, rue Crillon — PARIS (IV^e).

TILIANE

Extrait fluide stabilisé et dé mucilaginé du liber de *Tilia Sylvestris*, correspondant à son poids de la plante desséchée.

Indications. — Lithiase vésico-rénale : COLIQUE NEPHRETIQUE, GRAVELLE.
Rhumatisme aiguë ou chronique : SCIATIQUE, LUMBAGO, GOUTTE.

Posologie et mode d'action :

- 1° Période aiguë : 3 cuillerées à soupe par jour, chacune dans un grand verre d'eau, loin des repas, pendant 2 jours consécutifs. *La crise est enrayée dans les 48 heures maximum.*
 - 2° Traitement d'entretien : 3 cuillerées à soupe dans la journée, répétées 2 fois par mois. A cette dose *moyenne*, ce traitement régulier met *définitivement* le malade à l'abri de crises nouvelles sans régime spécial.
- Nouveau produit, exclusivement végétal, d'action immédiate. Innocuité absolue, pas de contre-indication.

Prix au public : 16 fr. 50

Préparateur :

Léon LACAZE

Pharmacien

AMELIE-LES-BAINS (Pyrénées Orientales).

TIODINE COGNET

$C^2S N^2H^{12}I$

Propriétés. — Réalise l'Association *Iode-soufre*. Médicament organo-iodique soufré. Pas d'iodisme. Pas de contre-indications. **L'Antisléreux.**

Composition. — Combinaison cristallisée, soluble dans l'eau, de l'iode (47 %) avec la thiosinamine.

Indications. — Toutes celles de l'iode et du soufre, ensemble ou séparément. **Toutes scléroses.** Hypertension. **Rhumatisme chronique.** Tabès. Scléroses médullaires. Asthme. Emphysème. Syphilis. Obésité, etc.

Formes et posologie. — Pilules (Tiodine : 0 gr. 05 par pilule). *Adultes* : 2 à 5 par jour. *Enfants* : 2 par jour. Ampoules (Tiodine 0 gr. 20), 1 tous les 2 jours (voie intramusculaire, sous-cutanée ou intraveineuse).

Prix au public : Pilules — Le flacon : 13 fr.

Ampoules — La boîte : 15 fr.

Laboratoires des Produits COGNET

Armingeat et C^{ie}

43 rue de Saintonge — PARIS (III^e).

TISANE HÉPATIQUE LAHAYE

Médication phytothérapique des affections du foie par un mélange de plantes sélectionnées et aromatiques.

Composition et action :

Cholérétique, grâce à la présence de boldo, de romarin et de menthe.

Cholagogue, par l'adjonction de bourdaine en faible quantité.

Diurétique, par l'action bien connue de l'Uva-Ursi.

Infusion très parfumée et agréable au goût. Chaque tasse d'infusion peut être additionnée de sucre ou de glycérine.

Indications. — Insuffisances hépatique et biliaire. Jaunisse. Lithiase biliaire. Fièvre bilieuse hématurique. Entéro-colite muco-membraneuse. Constipation opiniâtre. Migraines. Dermatoses par dyshépatie. Cirrhose. Calculs.

Doses et mode d'emploi. — 1 pincée de plantes pour une tasse d'infusion. 3 à 4 tasses par jour selon les cas.

Prix au public : 5 fr. 50.

Laboratoire J.-B. LAHAYE

145, rue des Bourguignons — BOIS-COLOMBES.

TOCHLORINE

Para-toluène-sulfo-chloramide sodée.

Action antiseptique durable, par mise en liberté progressive d'hypochlorite de soude (principe de la solution de Dakin).

Présentations : Flacons de 20 et de 100 gr. de Poudre pour préparation extemporanée des solutions.

Indications :

Antisepsie (chirurgie générale et spécialités).
Purification des eaux de boisson.

Posologie :

Chirurgie générale : Solution aqueuse à 2 p. 100.

Urologie : Solut. de 0,10 à 0,50 p. 100.

Gynécologie : Sol. de 0,5 à 2 p. 100.

Stomatologie : Solut. à 1 p. 100.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon. — PARIS (VIII^e).

TONAX

**Tonique général (sans strychnine).
Comprimés dragéifiés, demi-friables.**

Composition :

| | |
|------------------------------|----------|
| Méthylarsinate de soude..... | 0 gr. 02 |
| Carbonate de manganèse..... | 0 gr. 05 |
| Phosphate de chaux..... | 0 gr. 20 |
| Phosphate de magnésie..... | 0 gr. 10 |

Posologie. — Pour 1 comprimé.

Adultes : 2 à 3 par jour.

Enfants : 1/2 à 2 par jour suivant âge.

Le comprimé peut s'avaler, se mastiquer, ou s'écraser en poudre.

Indications. — Toutes les fatigues, Convalescences, Asthénies, Dyspepsies nerveuses, Amaigrissement, Pertes d'appétit, Etats prétuberculeux, Tuberculeux.

Prix : 16 francs.

Durée de la boîte : 20 à 30 jours.

A. LYONS, Pharmacien
30, rue Monge — PARIS (V^e).

TONICARDINE GONNON

Composition :

| | Par granule. |
|-----------------------------|--------------|
| Adonidine | 0 gr. 002 |
| Convallamarine..... | 0 gr. 02 |
| Extrait de Strophantus..... | 0 gr. 001 |
| Extrait de Scille..... | 0 gr. 004 |

Propriétés thérapeutiques.

Tonifie le muscle cardiaque et les artères, active la circulation sanguine et la diurèse sans élever la pression artérielle.

Indications :

Artério-sclérose, néphrites, hydropisies, angine de poitrine, myocardites infectieuses et toutes les cardiopathies asystoliques.

Avantages :

Dosage régulier. Effets thérapeutiques absolument certains et constants. Pas d'accumulation. Pas d'accoutumance. Ne provoque pas l'insomnie comme la caféine, ni la céphalée comme la théobromine.

Médicament de choix dans les intervalles du traitement digitalique et dans le cas où la digitale est nuisible et impuissante, lorsque le myocarde faiblit et que l'imperméabilité rénale augmente.

Posologie :

2, puis 3 ou 4 granules par jour loin des repas.

Prix : 18 francs.

Produits GONNON

14, rue Victor-Hugo — LYON.

TONIKÉINE CHEVRETIN

Sérum neuro-tonique.

Ampoules contenant chacune :

| | |
|---|--------|
| Sulfate de strychnine..... | 1 mgr. |
| Cacodylate de soude | 0,05 |
| Glycérophosph. soude (Codex 1908) | 0,20 |
| Eau de mer diluée..... | 5 cc. |

Propriétés thérapeutiques. — Possède les propriétés stimulantes de l'eau de mer auxquelles s'ajoutent celles des autres éléments dont l'action tonique et reconstituante est bien connue.

Indications. — *Etats de dépression nerveuse et organique, Convalescences, Neurasthénie, Entérites, Tuberculose.*

6 ampoules de 5 cc. Prix : 14 francs.

12 ampoules de 5 cc. Prix : 22 francs.

Laboratoires L. LEMATTE et G. BOINOT

52, rue La Bruyère — PARIS.

Télégr. Chevrematte-90-Paris.

TONIQUE GONNON

Aux Phosphoglycérates de soude, chaux et potasse.

Propriétés thérapeutiques. — Assimilation parfaite et certaine du phosphore, stimulant de l'appareil nerveux, il accélère la nutrition de tous les organes.

Indications. — Anémie, convalescence, neurasthénie, grossesse, médication infantile par excellence.

Forme et Posologie :

Vin et sirop : 2 à 4 cuill. à soupe par jour (1 cuill. = 0 gr. 20 de phosphoglycérates associés).

Granulé : 2 à 4 cuill. à café par jour (1 cuill. = 0 gr. 20 de phosphoglycérates associés).

Demi-dose pour les enfants.

Prix :

Vin et Sirop : 12 francs.

Granulé : 9 francs.

Produits GONNON

14, rue Victor-Hugo — LYON.

TONIQUE « ROCHE »

Reconstituant des forces physiques et stimulant de l'activité cérébrale.

Goût très agréable. Efficacité certaine.

Propriétés thérapeutiques :

Propriétés classiques de ses constituants : Acide phosphorique, Arsyène, Strychnine, Kola, complétées et renforcées par un catalyseur de choix : le Manganèse.

Indications :

Tous surmenages, Asthénies, Neurasthénie, Anémies, Prétuberculose, Convalescences, Adénopathies, etc.

Mode d'emploi et doses :

Adultes : 2 à 4 cuillerées à café par jour dans un liquide quelconque.

Enfants (de 8 à 15 ans) : demi-doses.

Enregistré au Laboratoire national de contrôle des médicaments sous le n° 504-54.

Produits

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}

10, rue Crillon — PARIS (IV^e).

TONIVEININE

Médication spécifique des affections veineuses.

Composition. — Association de *Sylibum marianum*, galbules de *Cupressus*, *Echinops viscosus*.

Avantages. — Effets stimulants sur les fibres lisses des veines, vaso-constricteurs et hémostatiques.

Légère excitation de la sécrétion biliaire.

Action générale sur la circulation veineuse.

Indications. — Varices, Phlébites, Troubles de la puberté et de la ménopause, Hémorroïdes.

Posologie. — XX à XLV gouttes matin et soir ; X gouttes dans la grossesse.

Dès que les symptômes pénibles sont amendés, le Docteur prescrira les doses diminuées 20 jours par mois.

Prix : 10 francs.

Laboratoires BLANCHOT

15, avenue du Parc-Montsouris — PARIS (XIV^e).

Echantillons et littérature sur demande.

TONUCLYL

Elixir toni-reconstituant

à l'acide nucléinique strychnophospharsiné et à la kola.

Composition :

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Arrhénal | 0,01 |
| Acide nucléinique | 0,05 |
| Phosphate de soude desséché | 0,05 |
| Gouttes amères de Baumé | 0,05 |
| Extrait fluide de kola | 0,25 |
| Alcoolat de Garus | 0,50 |
| Elixir au vin de Grenache doré..... | Q. S. pour 15 cc. |

Propriétés. — Stimulant énergétique très apéritif, possédant une saveur des plus agréables.

Indications. — Fatigue, Anémie, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Inappétence, Tuberculose, Cachexie, Amaigrissement, Lymphatisme, Scrofule.

Posologie :

Enfants : 1 à cuillerées à café par jour dans un peu d'eau.

Adolescents : 2 à 3 cuillerées à dessert par jour.

Adultes : 2 à 3 cuillerées à soupe par jour.

Présentation soignée en flacon de 250 cc. au prix de 15 francs.

Laboratoires MEUNIER, Pharmacien,

Lauréat 1^{er} prix de la Faculté de Montpellier
MONTMARAULT (Allier).

TONUDOL

Comprimés, granulé, injectable.

Nucléarsinate de manganèse associé aux hypophosphites de chaux et de fer.

Dose et mode d'emploi. — 2 comprimés, 1 mesure ou cuillerée à café de *granulé* avant chaque repas.

Injectable : 1 ampoule de 1 cc. tous les jours ou tous les 2 jours en injection intramusculaire profonde.

Indications. — Reconstituant de l'organisme indiqué dans les Surmenages, les Troubles de la Nutrition et de la Croissance, la Chlorose et l'Anémie.

Fortifie sans provoquer d'excitation.

Prix. Ampoules : 18 francs. — Comprimés : 14 francs
Granulé : 15 francs.

Laboratoires LICARDY

38, boulevard Bourdon — NEUILLY-PARIS.

Téléphone : Maillot 17-75.

TOTAL-TONIC

Le plus complet et le plus énergique
des Reconstituants.

Forme. — Elixir.

Action. — Immédiate sur les systèmes nerveux, osseux, musculaire, glandulaire et sur le plasma sanguin.

Indications. — Toutes défaillances de l'organisme, Amaigrissement, Asthénie, Anorexie, Anémies, convalescences, maladies de la nutrition, bronchites chroniques et prébacillose, neurasthénie, etc.

Composition. — Chaque cuiller à soupe contient :

| | |
|----------------------------------|--------|
| Fer (citrate ammoniacal)..... | 0.05 |
| Manganèse (sulfate)..... | 0.0375 |
| Phosphate de soude..... | 0.50 |
| Acide phosphorique officinal.... | 0.25 |
| Méthylarsinate de soude..... | 0.015 |
| Extrait de quinquina..... | 0.25 |
| Teinture de noix vomique..... | 0.25 |
| Teinture de coca..... | 1.25 |
| Extrait fluide de kola..... | 0.32 |

Le TOTAL-TONIC réalise une association nouvelle, complète, et moderne des éléments indispensables à l'organisme défaillant.

Mode d'emploi. — *Adultes* : Une cuiller à soupe avant le repas de midi et du soir dans un peu d'eau, de vin ou de lait.

Adolescents (14 à 18 ans) : Une cuiller à dessert aux mêmes heures et de la même façon.

Enfants (au-dessus de 10 ans seulement) : Une cuiller à café dans un peu d'eau ou de lait avant le repas de midi et du soir pendant 12 jours ; arrêter 5 jours et terminer le flacon aux mêmes doses.

Prix : 16 francs.

Laboratoires B. O. L.

M. BERGER

29, faubourg de Bourgogne — ORLÉANS.

Dépôt général : Office commercial pharmaceutique, 71, rue du Temple, PARIS (III^e) — et ses succursales.



TOT'HAMÉLIS

Chantereau.

Composition. — Hamamélis administré en nature, avec la totalité des principes actifs de la plante *fraîche* stabilisée.

Propriétés thérapeutiques. — Médication de base de l'insuffisance veineuse. Tonique de la fibre lisse et modificateur de la viscosité sanguine.

Indications. — Stases veineuses, Varices, Hémorroïdes. Etats congestifs, Hypertension.

Posologie. — *Comprimés* : 6 par jour, aux repas. *Cachets* : 2 par jour, aux repas. *Suppositoires* (Hémorroïdes) : 1 à 2 par 24 heures.

Prix :

Comprimés, Cachets : 12 fr. 75

Suppositoires : 15 francs.

Laboratoires CHANTEREAU

26 bis, rue Dombasle — PARIS (XV^e).

TOURANOL

Composition. — Dionine, Pyramidon, Terpene, Benzoate de soude, Sulfogaïacolate de K, extraits de Grindelia, Aconit, Belladone, Ipéca.

Propriétés. — Sédatif, Expectorant, Modificateur des sécrétions, Antispasmodique, Asepsie des voies respiratoires.

Posologie. — *Adultes* : 4 à 6 comprimés par jour.
De 12 à 16 ans : 2 à 3 comprimés par jour.

Indications. — Trachéobronchites aiguës, Bronchites chroniques, Toux spasmodiques, Broncho-pneumonie.

Prix : 13 fr. 50.

Laboratoires P. BASUYAUX

94, rue Pasteur — FONTENAY-SOUS-BOIS
(Seine).

Echantillons sur demande :

Société d'Expansion Thérapeutique,
46, Faubourg du Temple — PARIS (XI^e).

TOURANYL

Composition. — Dionine, Sulfogaïacolate K, Benzoate Na, Extrait Marubbe, Amidopyrine, Grindelia, Aconit, Bromoforme.

Adultes : 4 à 6 comprimés par jour.

12 à 16 ans : 2 à 3 comprimés par jour.

Prix : 10 francs (10 à 15 jours de traitement).

Propriétés. — Sédatif, Expectorant, Modificateur des sécrétions, Antispasmodique, Asepsie des voies respiratoires.

Indications. — Trachéobronchites aiguës, Bronchites chroniques, Toux spasmodiques, Bronchopneumonie, Emphysème.

Laboratoire P. BASUYAUX

94, rue Pasteur
FONTENAY-S.-BOIS (Seine).



TRAPHÉINE

Indications. — Puissant tonique : action rapide dans tous les cas de convalescence, anémies, pré-tuberculose, états précancéreux.

Forme. — Poudre agréable au goût, à diluer dans un demi-verre d'eau.

Composition. — Association synergique : Acide phosphorique-Kola caféinée, en milieu marin, y compris chlorure de magnésium.

Posologie :

Adultes : Deux fois par jour avant les principaux repas, une cuillerée à soupe dans un verre d'eau ordinaire.

Enfants : Deux cuillerées à café de la même façon, suivant avis du médecin.

Aucune contre-indication.

Laboratoires S. I. O. A.

R. MICHY, Pharm.

13, rue Beudant — PARIS (XVII^e).
Wagram 75-75.

TRÉPARSINYL

**Syphilis et toutes Spirochétoses,
Amibiases et Protozooses intestinales.**

Composition :

| | |
|---|-------|
| Acide acétyloxyaminophénylarsinique | 0,10 |
| Proto-chlorure d'hydrargyre dissoc..... | 0,01 |
| Sous-carbonate de bismuth..... | 0,15 |
| Amidon, talc, dextrine..... | Q. S. |

Pour un comprimé.

Indications. — Syphilis à toutes périodes, Amibiase. Troubles intestinaux dus aux protozoaires.

Posologie et mode d'emploi. — Syphilis :

- 1^o *Traitement d'attaque :* 1^{er} jour 3 à 4 comprimés ; 2^e jour, 4 à 5 ; 3^e jour, 5 à 8. Repos les autres jours. Reprise la semaine suivante. Pendant 6 semaines, continuation du traitement à la même cadence. 2 ou 4 séries de traitement par an.
- 2^o *Traitement complémentaire :* 2 à 3 comprimés par jour aux repas pendant 3 semaines consécutives. Repos 8 à 10 jours. Reprise du traitement pendant une période d'égale durée. Continuer ensuite à raison d'un mois de traitement sur deux.

Affections intestinales :

2 à 6 comprimés par 24 heures aux repas.

Présentation et prix. — 24 francs la boîte de 24 comprimés.

Laboratoires FALQUE — BESANÇON.

TRÉPARSOL

Acide formyl-méta-amino-
para oxyphénylarsinique.

Indications :

Syphilis, à tous les âges (nourrissons, enfants, adultes), et à toutes les périodes de la maladie (Hérédo-Syphilis, Syphilis primaire, secondaire, tertiaire, Para-Syphilis).

Dysenterie amibienne. Le Tréparsol est un véritable spécifique de cette affection, qu'il guérit en détruisant les Amibes et les Kystes amibiens.

Protozooses intestinales, Diarrhée des Tuberculeux, entéro-colites diverses (d'origine parasitaire ou infectieuse).

Pian et toutes Spirochétoses : Angine fusospirillaire de Vincent, etc.

Présentation :

Tubes de 30 comprimés dosés à 0,25
(dosage adultes). Prix : 22 fr.

Tubes de 40 comprimés dosés à 0,10
(dosage enfants). Prix : 13 fr. 20.

Tubes de 60 comprimés dosés à 0,02
(dosage nourrissons). Prix : 11 fr.

Posologie :

Adultes : 1 à 4 comprimés par jour.

Enfants : 0,01 à 0,02 cg. par an et par kilog.

Mode d'emploi :

Traitement *discontinu* (3 à 4 jours consécutifs par semaine), et *progressif* (commencer par des doses faibles et augmenter de semaine en semaine).

Dépôt : Pharmacie Générale
LECOQ et FERRAND.

54, rue de la Chaussée-d'Antin — PARIS.

Laboratoire

L. LECOQ et F. FERRAND

14, rue Gravel — LEVALLOIS (Seine).



TRÉPHONYL

(L'Hépatothérapie associée à la Sérothérapie et aux Tréphones embryonnaires.)

Composition. — Extrait de foie fœtal, Suc embryonnaire, Sérum hémopoïétique.

Mode d'action. — Par l'extrait hépatique fœtal et le sérum hémopoïétique, constitue la médication de choix de toutes les Anémies même les plus graves.

Par les Tréphones du suc embryonnaire, accélère la croissance et assure la régénération des tissus.

Indications. — Toutes les Anémies, même les plus graves. Toutes les déficiences organiques : convalescences difficiles ; retards dans le développement ou la croissance chez les enfants.

Présentation. — Boîte de 6 flacons-ampoules de 10 cc. Boîte de 10 flacons-ampoules de 5 cc. Flacon de sirop de 300 gr.

Posologie. — 1 à 2 flacons-ampoules par jour par voie buccale ou 1 à 2 cuill. de sirop.

Prix : 18 francs.

Laboratoires du Dr ROUSSEL
97, rue de Vaugrard — PARIS (VI^e).

TRÉPOBIUR

Préparation hydrosoluble associant l'uranium et le bismuth. Action curative comparable à celle des arsénobenzènes. L'uranium, par sa radioactivité spécifique et ses propriétés antitoxiniques, double la puissance tréponémicide du Bismuth et diminue d'autant sa toxicité.

Indications. — Toutes les manifestations de la syphilis, particulièrement les accidents évolutifs où, grâce à sa solubilité et à sa rapidité d'élimination, le Trépobiur donne les mêmes résultats que les arsenicaux.

Posologie :

3 à 5 injections intramusculaires par semaine. Totaliser 12 à 16 injections par série.

L'injection de Trépobiur est indolore.

Présentation et Prix :

La boîte de 6 ampoules de 4 cc..... 18 fr.
— de 12 — — — 30 fr.

(Aucune indication révélatrice dans leur présentation.)

Thérapeutique infantile. — Ampoules de 1 cc. dosées à 0 gr. 01 de bi-métal.

Prix :

La boîte de 12 ampoules de 1 cc..... 20 fr.

Echantillons et littérature :

Laboratoires SFÉAT

15, rue Catulienne — SAINT-DENIS (Seine).

TRÉPOL

Traitement bismuthique de la syphilis. Médication intramusculaire en ampoules stérilisées (3 cc.).

Spirillicide à base de tartrate basique de bismuth renfermant environ 80 p. 100 de Bi en suspension huileuse.

Adopté par l'Assistance publique et le Ministère de l'Hygiène.

La boîte de 12 ampoules : 36 fr. ; de 6 : 20 fr.

Pour tous renseignements sur le mode d'emploi, la technique et la littérature de cette préparation, s'adresser aux

Laboratoires pharmaceutiques

L.-G. TORAUDE, O. , O. I. .

Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.
Lauréat de l'Institut et de l'Académie de Médecine.

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V^e).

TRIBROMURE GIGON

Composition. — Bromure triple de potassium, sodium et ammonium.

Forme. — Poudre desséchée par préparation spéciale.

Indications thérapeutiques. — États nerveux, Psychoses, Hyperexcitabilité, Insomnies, Épilepsie.

Mode d'emploi et doses. — Cuillère-mesure dosant 1 gr. : 2 à 12 par jour. suivant avis du médecin.

Flacons pM., mM., gM.

Laboratoire des Produits du D^r GIGON

A. FABRE, pharmacien

25, boulevard Beaumarchais — PARIS (IV^e).

TRICALCINE

A base de sels calciques rendus assimilables, phosphates tribasiques, carbonates et autres sels de chaux et de magnésie nécessaires à l'organisme.

Propriétés thérapeutiques. — Recalcification de l'organisme (Formule et théorie de Ferrier-Sergent).

Indications. — Tuberculoses pulmonaire, osseuse, péritonite tuberculeuse, Rachitisme, Lymphatisme, Scrofulose, Grossesse, Allaitement, Troubles de la dentition, Fractures.

Doses et mode d'emploi. — Tricalcine pure.

Adultes :

Poudre : 1 cuiller mesure.

Cachets : 1 cachet.

Comprimés : 1 comprimé.

Granulés : 2 cuillers mesure.

Tablettes chocolat : 2 tablettes.

Tricalcine adrénalinée : 1 cachet.

— méthylarsinée : 1 cachet.

— fluorée : 1 cachet.

Tricalcine Irradiée : 1 cachet ou 1 cuillerée à café de granulés.

Tricalcine injectable : 1 ampoule, par jour : pendant 12 jours.

Avant
ou
pendant
chacun
des trois
repas.

Tricalcine Opothérapique (1) : 2 drag. ou 2 cuillers à café de granulés aux 3 repas.

Enfants : moitié de ces doses

Prix au public : poudre, granulés, cachets, chocolat : 14 fr. ; comprimés : 12 fr. ; Méthylarsinée, adrénalinée, fluorée et opothérapique : 16 fr.

(1) La formule de la Tricalcine opothérapique a été établie d'après les travaux les plus récents des auteurs français et étrangers sur le métabolisme du calcium. Cette formule d'association pluriglandulaire est composée des meilleurs fixants endocriniens du calcium, Association Parathyroïdes, Surrénales, Thymus, Foie, Rate, Moelle osseuse.)

Autorisé par les Assurances sociales.

Laboratoire des Produits **SCIENTIA**

D^r E. PERRAUDIN, pharmacien

21, rue Chaptal — PARIS.

TRIDIGESTINE DALLOZ

Composition. — Les trois ferments digestifs essentiels à leur maximum d'activité physiologique sous une forme qui assure l'intégrité complète de leur pouvoir digestif.

Forme. — Granulé.

Indications. — Dyspepsies par insuffisance sécrétoire.

Dose. — 1 à 2 cuillerées à café après les repas.

Le flacon : 12 fr. 50

Laboratoire DALLOZ

13, boulevard de la Chapelle — PARIS (X^e).

TRIDYNOL

Médicament composé leucopoiétique puissant. Employé contre les tuberculoses.

Mode d'action. — Dans la tuberculose, augmentation des globules blancs et spécialement des lymphocytes.

L'autolysat des globules blancs est bactéricide par ses oxydases et lipases. Dissolution des cires bacillaires par les lipases. Exp. de Fiessinger.

Agglutination des bacilles qui prennent des formes d'involution et de souffrance, puis diminuent de nombre et disparaissent souvent après 6, 8, 10 mois.

Ce traitement est activé et exalté par la Diathermie transpulmonaire qui, employée seule, est inutile.

Diathermie transpulmonaire 1 500 à 2 000 milliampères, trois séances par semaine une demi-heure. 20 à 30 séances consécutives.

Parfois momentanément dépression et fatigue vers le dixième ou quinzième jour.

En général, augmentation de la toux et des crachats qui deviennent souvent très abondants, purulents, puis muqueux et enfin disparaissent.

Contre-indication absolue : l'*Albuminurie*.

La Diathermie ne provoque pas d'Hémoptysie (professeur d'Arsonval).

Réaction thermique variable, souvent défervescence après un temps variable.

En dehors de la tuberculose, s'emploie aussi avec succès dans les maladies infectieuses, salpingites, entérites, suppurations, cachexies.

Résultats. — Malgré toute la prudence de rigueur en cette matière, on peut dire que les résultats sont très bons au premier et deuxième degré. Variable au troisième degré, tout dépendant de l'état général.

Administration à doses fractionnées pour éviter le choc.

Pilules : 5 par jour en moyenne, 8 h., 10 h., 12 h., 3 h., 7 h., sans s'occuper des repas.

Cette médication est très efficace à doses réduites chez les enfants, combinée avec les rayons ultra-violet (sans diathermie).

Pour renseignements s'adresser :

Pharmacie JOURNET

18-20, rue Vavin — PARIS (VI^e).

TRIGLANDINE

Composition et forme. — Dragées, Ampoules de 1 cc. et 3 cc, Thyroïde, Hypophyse, Ovaire (glandes totales desséchées sous vide profond à basse température).

Propriétés thérapeutiques. — Entraîne régulièrement le redressement du système endocrinien dans son ensemble, par l'administration des 3 glandes nobles, thyroïde, hypophyse, ovaire.
Régulateur du cœur périphérique.

Indications. — SYNDROMES ENDOCRINIENS SPECIAUX de la femme : Stérilité, Trouble de l'appareil génital, Hypertension de la Ménopause et des dysendocriniens, rhumatismes endocriniens ; ASTHÉNIES ENDOCRINIENNES FEMININES ; Troubles de circulation.

Posologie. — 1 à 3 dragées par jour pendant 10 jours par mois environ ; 1 ampoule de 1 ou 3 cc. par jour, suivant le cas.

Prix : Ampoules 1 cc., 18 francs ; 3 cc., 25 francs.

Dragées, 25 francs.

Laboratoires BOUTY

3, rue de Dunkerque — PARIS.

Tél. : Nord 32-52 (2 lignes).

TRILUËS

Le moins toxique des arsenicaux *trivalents* employés en syphilithérapie, présenté *en solution toute préparée*, injectable par voie intramusculaire et intraveineuse.

Composition. — Le TRILUËS est le diéthylène imino-glucylarsénophényl amine mono-méthylène sulfoxylate de sodium, composé contenant 22,5 p. 100 d'arsenic métallique. (Travaux de M. Auger, professeur de chimie analytique à la Sorbonne.) Son avantage réside dans le fait que sa molécule est asymétrique et se désintègre en deux temps. Cette libération freinée de l'As explique sa *remarquable tolérance* en même temps qu'elle permet une imprégnation plus durable de l'organisme après chaque injection. Travaux du prof^r Robin, de J. Buttner-Thierry, de A. Carteau, etc.)

Présentation. — Deux formes :

| | | |
|-----------------|---|---|
| Intraveineux | { | en ampoules de 5 cc. |
| Intramusculaire | | en solution préparée d' <i>avance</i> . |

Indications :

- 1° *Syphilis* : traitement d'assaut, traitements mixtes, traitement de consolidation et cures abortives.
- 2° Fièvres récurrentes, Paludisme, Pian, Fièvre typhoïde, Spirochétoses, Trypanosomiasés, Kala-azar, Pyorrhée alvéolaire, Angine de Vincent.

Posologie. — La molécule de TRILUËS étant lourde, les doses croissent de 0,22 en 0,22, les ampoules sont délivrées selon les 6 concentrations suivantes :

| I | II | III | IV | V | VI |
|------|------|------|------|------|------|
| 0,22 | 0,44 | 0,66 | 0,88 | 1,10 | 1,32 |

Correspondant à 0,15, 0,30, 0,45, 0,60, 0,75, 0,90 d'Arsénobenzène.

Spécifier : endoveineux ou intramusculaire.

Traitement d'attaque. — Commencer par 0,44, puis 0,88 et arriver vite à 1,32. La grande marge de sécurité apportée par le TRILUES permet une thérapeutique particulièrement énergique.

Traitement d'entretien. — Suivre la gradation des doses. Totaliser pour une série 0 gr. 15 de TRILUES par kilogramme de poids du malade.

Prix (boîte de 1 ampoule) : 4, 6, 8, 10, 12, 14 fr. selon la dose.

Littérature et échantillons:

Laboratoires SFÉAT

15, rue Catulienne — SAINT-DENIS (Seine).

TRINITRINE CAFÉINÉE DUBOIS

(Dragées blanches à noyau Mou).

Composition. — Chaque dragée est rigoureusement dosée à :

Trinitrine au centième II gouttes (3 centigr.).
Caféine 2 centigrammes.

Propriétés et indications thérapeutiques. — *Vasodilatateur puissant à diffusion instantanée et action immédiate*, ne provoquant aucun phénomène réactionnel. Médicament de choix de l'*Angine de Poitrine*, l'*Asthme Cardiaque*, l'*Œdème Pulmonaire*.

Mode d'emploi. — Ces dragées doivent être *croquées* : leur noyau mou facilite leur absorption rapide et permet d'obtenir la diffusion instantanée des principes actifs et par là même une action immédiate.

Croquer une, deux ou trois dragées (à quelques minutes d'intervalle), au moment des accès. Dose maxima : 10 dragées par 24 heures.

Etui de 60 dragées : 15 francs.

Laboratoires LALEUF

51, rue Nicolo — PARIS (XVI^e).

TRINITRINE-PAPAVÉRINE LALEUF

(Dragées roses à Noyau Mou.)

Composition. — Chaque dragée est rigoureusement dosée à :

Trinitrine au centième..... II gouttes (3 centigr.).
Chlte Papavérine 5 milligrammes.

Propriétés et indications thérapeutiques. — Association synergique hypotensive et analgésique, à diffusion instantanée et action immédiate, ne provoquant aucun phénomène réactionnel.

Spécialement indiquée dans : *Angine de Poitrine*, *Asthme cardiaque* et *pulmonaire*, *Aortites*, *Artérites*, *Urémie*.

Mode d'emploi. — Ces dragées doivent être *croquées* : leur noyau mou facilite leur absorption rapide et permet d'obtenir la diffusion instantanée des principes actifs et par là même une action immédiate.

Croquer une, deux ou trois dragées (à quelques minutes d'intervalle) au moment ou en prévision des accès. Dose maxima : 10 dragées par 24 heures.

Etui de 60 dragées : 20 francs.

Laboratoires LALEUF

51, rue Nicolo — PARIS (XVI^e).

TRINITRINE ROUSSEL

Composition :

Comprimés n^{os} I, II, III correspondant à I, II ou III gouttes de la solution au 1/100^e.

Indications.

Hypertension : Crises douloureuses des aortiques, angine de poitrine, asthme cardiaque.

Doses et mode d'emploi :

Au moment des crises, laisser fondre sur la langue un comprimé. (Deux à 6 par 24 heures.)

Prix : 8-9-10 francs.

Pharmacie ROUSSEL

10, rue Washington — PARIS (VIII^e).

TRINIVÉRINE

Angine de poitrine

Dragées vertes à noyau mou.

Composition. — Trinitrine au centième (vaso-dilatateur) II gouttes. Chlorhydrate de papavérine (antispasmodique), 0,005. Caféine (tonicardiaque vaso-dilatateur des coronaires), 0,06.

Indications. — Angine de poitrine, Cardialgie des aortiques, des hypertendus, Crises vasculaires (Pal), Angiospasme des artérites, de l'hypertension (éclipses), Asthme cardiaque.

Mode d'emploi. — Croquer une dragée pour prévenir ou calmer l'accès. Si nécessaire croquer 2 ou 3 comprimés à quelques minutes d'intervalle. Ne pas dépasser 10 dragées par 24 heures.

Prix : 15 francs.

Émile MONAL

Docteur en Pharmacie

6 bis, rue Bridaine — PARIS (XVII^e).

Tél : Marcadet 11-22

TRIPYORIL

Pâte dentifrice antispirillaire à base de Pentaluès, de Résorcine, de Fluorure de Calcium et d'Hydroxyde de Magnésium.

Propriétés. — Action préventive et curative puissante n'exerçant aucun effet secondaire nuisible sur la gencive ou sur la dent.

Indications. — Prophylaxie et traitement de la carie, de la pyorrhée et des stomatites.

Présentation et prix :

Tube de 30 gr. environ : 5 francs.

Littérature et échantillon :

Laboratoires SFÉAT

15, rue Catulienne — SAINT-DENIS (Seine).

TRIRADOL

Association d'iode organique, de menthol de camphre et d'éléments radioactifs.

Indications. — Adénopathies cervicales et trachéo-bronchiques. Affections pulmonaires chroniques. Toute tuberculose pulmonaire et pleurale à évolution lente et à lésion limitée. Toute tuberculose chirurgicale.

Contre-indications. — Tuberculose évolutive rapide, néphrite, insuffisance hépatique, etc.

Posologie. — 1 ampoule par jour ou 2 à 6 globules pendant 15 jours par mois.

Boîte de 10 ampoules : 20 francs.

Flacon de 60 capsules : 20 francs.

Laboratoire G. FERMÉ

55, boulevard de Strasbourg — PARIS (X^e).

TRISALYL

Indications. — Traitement de rhumatisme articulaire aigu et de toutes ses complications (maladie rhumatismale).

Composition. — Salicylates chimiquement purs de : Sodium, Potassium, Calcium, associés dans les proportions physiologiques du Sérum de Ringer-Loocke.

Propriétés. — Le TRISALYL réalise l'association salicylée iso-ionique au sang, permettant l'emploi massif, continu, sans contre-indications ni intolérance du Salicylate.

Formes :

Voie buccale : Solution dosée à 1 gr. 50 par cuillerée à soupe.

Prix : 20 francs (250 cc.).

Voie veineuse : Ampoules de 10 cc. à 0 gr. 50 par ampoule.

Prix : 20 francs (8 ampoules).

Posologie :

Voie buccale : à partir de 3 cuillerées à soupe, monter à 6 cuillerées *pro die*.

Voie veineuse : d'abord 1 ampoule, puis 2, puis 3 par injection intraveineuse ; 2 injections par 24 heures.

J. OLIVE, Pharmacien.

14, rue des Minimes — PARIS (III^e).

Arch. 03-94.

TRISEPTINE

Granulé de charbon animal uroforminé, citraté, pepto-magnésié, de goût très agréable.

Admise dans les Hôpitaux. Adoptée par les Ministères de la Marine. et des Colonies après expérimentation.

Propriétés Thérapeutiques. — Excellent antiseptique des voies digestives, biliaires et urinaires, cholérétique et cholagogue, absorbant des gaz et des toxines, désensibilisant, diurétique, prévient la formation des calculs biliaires.

Originalité. — Emploi du citrate de soude qui fait passer le sulfate de magnésie à l'état de citrate non irritant et qui, se transformant en carbonate dans l'organisme et associé aux benzoates de lithine et de soude, fluidifie la bile et les sécrétions, facilite la solution biliaire du cholestérol et modifie le PH biliaire dans le sens de l'alcalinité, ce qui aide à la stérilisation du milieu.

Produit d'une innocuité parfaite ayant à la fois une action antiseptique, cholérétique, cholagogue, absorbante, désensibilisante et diurétique.

Indications. — Auto-intoxication et auto-infection intestinales avec leurs innombrables conséquences ; infections des voies digestives, biliaires et urinaires (cholécystite, colibacillose, entérite, cystite, furunculose, etc...), lithiase biliaire.

Posologie habituelle :

Adultes : 1 à 4 cuillerées à café par jour.

Enfants : 1/2 à 2 cuillerées à café par jour, suivant l'âge. Une heure environ avant les repas ou le matin à jeun et le soir en se couchant. Croquer et boire un peu d'eau aussitôt après ou délayer dans un peu d'eau.

Laboratoires G. LAMBERT *, Docteur en Pharmacie
6, rue de Longchamp, 6 — VICHY (Allier)

TUBÉROL

TUBÉROL (pur).

Forme. — Liquide.

Composition. — Association complexe d'Essences balsamiques pures.

Indications. — Toutes affections des poumons, broncho-pneumonies, bronchites purulentes, coqueluche, tuberculose, etc.

Mode d'emploi. — En enveloppements thoraciques : avec gaze hydrophile imbibée et en inhalations.

Prix : le flacon, 24 fr. 50 et 14 fr. 50.

TUBÉROL (onguent).

Composition. — Tubérol + Excipient adhésif.

Indications. — Fin de broncho-pneumonie, bronchite légère, coqueluche, engorgements ganglionnaires.

Mode d'emploi. — En onctions de la poitrine ou des ganglions. Recouvrir de papier brouillard.

Prix : 11 fr. 90.

TUBÉROL (Oléo).

Forme. — Solution huileuse.

Composition. — Tubérol + Huile stérilisée.

Indications. — Affections naso-pharyngées, oreillons, coqueluche, grippe, rhumes, etc.

Mode d'emploi. — En pulvérisations et instillations nasales. Badigeonnage dans oreillons, coqueluche, scarlatine.

Prix : 11 fr. 90.

TUBÉROL (Injectable).

Forme. — Ampoules.

Composition. — Tubérol + Benzoate de Benzyl + Huile d'Olive stérilisée éthéro-camphrée.

Indications. — Complément intensif du Tubérol dans bronchites fétides, pneumonies, coqueluche, tuberculose.

Mode d'emploi. — 1 à 6 ampoules par jour suivant gravité.

Prix : ampoules de 5 cc., : 25 fr. 50 ; 2 cc. : 22 francs.

TUBÉROL (Sirop).

Composition. — Tubérol + véhicule.

Indications. — Antiseptique des voies respiratoires. Calme la toux.

Mode d'emploi. — Adultes : 3 à 4 cuillerées à soupe par jour.

Enfants 3 à 4 cuillerées à café.

Prix : 15 francs.

Laboratoires E. BOUTEILLE

23, rue des Moines — PARIS (XVII^e).

Tél. : Marcadet 04-02.

TUBES BLACHE

Toutes formules en pommades pour l'Ophtalmologie à partir de 7 fr. 25.

Liste des principales préparations :

Adréno-éphédrine, Aminothionine Westermann, Analgo-contractine, Analgo-mydratine, Argovyl, Cadmio-zinc, Camphocuire, Chaulmocuprine, Chlorhydratine, Colorants composés, Compositol, Contractine, Dioptrrol, Ichto-zinc, Iodure alcalinocalcique, Kinargol, Mydratine, Nitrate d'argent, Organo-bismuth, Oxy-arsine Hg, Oxyde Hg, Paléocaline, Phocéol, Thiosulfol cuprique, Thiosulfol hydrargyrique, Zircotanyl, etc.

TUBES CHAUVIN

Toutes formules en pommades pour l'Oto-Rhinologie et pour la Dermatologie.

Série Rhino pour le nez, à partir de 11 fr. 50.

Série Oto pour les oreilles, à partir de 12 fr.

Série Dermo pour la peau, à partir de 12 fr.

AUTRES SPÉCIALITÉS DES ÉTABLISSEMENTS ALFRED CHAUVIN

Acoégénol, 20 fr. ; Acoégénol éphédriné, 25 fr. ; Acoégénol opothérapique, 25 fr. ; Atropophédrine, 10 fr. ; Crème au Collohitol, 12 fr. ; Ergophédrine, 20 fr. ; Gouttes Chauvin à l'Audisclérocure, 25 fr. ; Gouttes Chauvin à la Sclérocure, 18 fr. ; Laborol, 14 fr. ; Laborol phosphoré, 16 fr. ; Lactoscoparine, 25 fr. ; Paratyl, 20 fr. ; Pré-Paratyl, 16 fr. ; Phocéol interne, 20 fr. ; Sirop de Sozopectone éphédriné, 25 fr. ; Dépuratif Chauvin (aux hyposulfites), 16 fr.

Établissements Alfred CHAUVIN

AUBENAS  (Ardèche).

TUBES DU D^r GUIRAUD

Ex-Pharmacien des Hôpitaux de Bordeaux
(Anciennement tubes DAVIEL).

POMMADES OPHTALMIQUES

munis d'une canule spéciale permettant l'introduction directe de la pommade dans l'oeil.

TOUTES FORMULES

Spécialement recommandées : Pommades à l'aristol, à l'oxyde jaune orangé et à l'atropine. Obtenues par dissolution préalable de la substance active et évaporation du solvant, ce qui assure un état de division extrême et une puissance d'action considérable.

Prix : 9 et 10 francs.

Echantillons sur demande.

Laboratoire SPES GUIRAUD

10, impasse Milord — PARIS (XVIII^e).

Téléph. : Marcadet 37-98.

TUBES OPHTALMOLOGIQUES FERLUX

1^o Tubes RATIO

Tubes Hydrargyl, Aseptoforme, Halocalcine, Bléphargyl, Mydriatique de Montpellier, Myotique de Montpellier, Tracholéol.

2^o Tubes Ferlux classiques.

Huile de Chaulmoogra, Chaulmoogra-Butelline.

Oxyde de mercure orangé, 1, 2, 3, 4 et 5 p. 100

— jaune, 1, 2, 3, 4 et 5 p. 100.

Iodoforme, Calomel, Précipité blanc, Ethyl-hydrocupréine (optochin), (I Na + CaCl²), Ichtyol-oxyde de zinc, Thigénol-oxyde de zinc, etc., etc.

Produits Orhino :

Pour Otorhinolaryngologie.

Prix moyen : 10 francs.

Laboratoires RHINOPHTA

G. Bousquet, Docteur en Pharmacie — ALBI.

TUBES STRANA

Pommades ophtalmiques
en tube breveté.

| | | |
|---|----|----|
| Argyrol 5 %, 10 % : Conjonctivites aiguës . | 11 | » |
| Atropine 0,5 %, 1 % : Mydriatiques | 9 | 75 |
| Bleu de méthylène 0,5 %, 1 % : Antiseptique sédatif | 11 | » |
| Calomel 5 % : Antiseptique résorbant | 9 | 75 |
| Dionine 2% : Lymphagogue, analgésique . | 12 | » |
| — 5 % : — — — . | 14 | » |
| Eserine 1 % : Myotique | 14 | » |
| Ichtyol 5 % : Blépharites | 9 | 75 |
| Ichtyol-Zinc : Blépharo-Conjonctivites | 11 | » |
| Iode-Calcium : Cataractes | 11 | » |
| Mydriatique puissant | 14 | » |
| Myotique puissant | 14 | » |
| Noviforme 5 %, 10 % : Antiseptiques | 12 | » |
| Optochine hydrochl. Zimmer 2 % : Infections pneumococciques | 14 | » |
| Oxyde jaune de mercure 1%, 2%, 3%, 5% | 9 | 75 |
| Oxyde jaune de mercure 0,2; Atropine 0,05 | 12 | » |
| Oxyde de zinc 5 % : Blépharo-Conjonctivites | 9 | 75 |
| Pilocarpine 2 % : Myotique | 11 | » |
| Précipité blanc 1 %, 2 %, 5 % | 9 | 75 |
| Rouge écarlate 5 % : Cicatrisant | 11 | » |
| Sulfate de zinc 0,025 ; Larocaine 0,1 : Conjonctivites à faible sécrétion | 12 | » |
| Targesine 5 % : Infections gonococciques et diplobacillaires | 12 | » |
| Xéroforme 5 % : Antiseptique puissant . . . | 11 | » |

Laboratoires SALANTALE

STRASBOURG

TULLE GRAS LUMIÈRE

Pansement indolore de toutes plaies
(des plus bénignes aux plus graves).
Double la vitesse de cicatrisation.

Il peut être prescrit aux accidentés du travail.

Constitution. — Carrés de tulle imprégnés d'une composition grasse à base de baume du Pérou, qui lui communique des propriétés désodorisantes, kératoplastiques (activation considérable de la cicatrisation).

Propriétés. — Evite l'adhérence des pièces de pansement aux plaies. Se détache aisément sans provoquer de douleur ni d'hémorragie, évite l'arrachement des bourgeons, respecte leur tissu fragile et supprime totalement la douleur du décollement des compresses, douleur souvent intolérable chez les amputés ou les grands brûlés, par exemple.

Le Tulle gras Lumière permet d'abréger la durée de la cicatrisation dans des limites très importantes.

Présentation. — Le Tulle gras Lumière est présenté en carrés de dimensions fixes :

| | | |
|--|-------------------------|-------------------|
| 0 ^m 10 x 0 ^m 10. | Boîte de 10 compresses. | Prix : 15 francs. |
| 0 ^m 10 x 0 ^m 10. | — 20 — | — 22 francs. |
| 0 ^m 10 x 0 ^m 10. | — 30 — | — 27 francs. |
| 0 ^m 22 x 0 ^m 22. | — 30 — | — 110 francs. |

Ces carrés de tulle que l'on applique directement sur les plaies sont superposés dans une boîte, métallique, séparés les uns des autres par des carrés de papier. Le tout est ensuite stérilisé à l'autoclave à 120°.

Mode d'emploi. — Placer un carré de Tulle gras sur la plaie, appliquer par-dessus le pansement stérilisé.

LABORATOIRES LUMIÈRE

45, rue Villon — LYON.

TULLE ROSE BESLIER

Pansement gras.

Constitué par un carré de 13×13 imprégné d'un mélange plastique à base de Microcidine, Baume du Pérou, Huile essentielle de Verveine, Thym, Niaouli, Pélargonium.

Le Tulle Rose Beslier est un cicatrisant énergique : il permet le renouvellement indolore des pansements sans arrachements des bourgeons charnus, sans hémorragies.

Il assure des cicatrices souples, sur les brûlures plaies par vésication, ulcères variqueux, plaies atones, plaies infectées, phlegmons, abcès, etc...

Le Tulle Rose Beslier est livré en boîtes de 10 carrés de 13×13.

Prix : 7 francs la boîte.

M. COQUELU, Pharmacien-Fabricant

DIGOIN (S.-et.-L.).

UCLARSYL

Novarsenobenzol Codex. Voie intraveineuse.

Dioxydiaminoarsenobenzène, monométhylène. Sulfoxylate de soude, rigoureusement pur instantanément soluble. Ne provoque pas de choc.

Indications. — Syphilis à toutes les périodes : Traitement d'attaque et d'entretien.

Présentation. — Poudre d'un jaune très clair en ampoules scellées sous vide.

Doses unitaires de 15 à 90 cgr. par fractions successives de 15 cegr.

Prix au public : suivant dose, de 3 fr. 90 à 15 fr. 60.

Usines Chimiques des Laboratoires Français
89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI^e).

Dépositaire :

Laboratoire et Pharmacie A. MILLET
5, rue Ambroise-Thomas — PARIS (IX^e).
Tél. : Provence 58-43.

ULCÉOBALNÉINE

Poudre spéciale pour bains de jambe antivariqueux.

Alcalino-sodique-silicatée.

Par leur action sédative sur l'élément nerveux les bains à l'Ulcéobalnéine :

Calment les douleurs variqueuses, arrêtent l'évolution des varices et en diminuent le volume ; font résorber l'œdème et l'empâtement ; guérissent les congestions variqueuses et périphlébitiques.

Un bain de jambe de 30 minutes à 36° tous les jours pendant 24 jours.

Une boîte pour 4 bains de jambe.

Prix : 6 fr. 75.

Laboratoire SÉVIGNÉ
76, rue des Rondeaux — PARIS (XX^e)

ULCÉOPLAQUE - ULCÉOBANDE

Pansement de marche.

Cicatrisation certaine des *Plaies aux jambes*, des *plaies atones* et des *Ulcères variqueux*, même anciens et trophonévrotiques, sans interrompre ni le travail ni la marche.

Pansement souple et spongieux préparé avec des poudres aseptiques émulsionnées. C'est un merveilleux générateur de la cellule, un stimulant de sa vitalité. **Résultats surprenants.**

Boîte de 6 pansements pour 20 ou 24 jours.

Deux dimensions :

Ulcéoplaque n° 1 5/6 centim. Ulcéoplaque n° 2 7/9 centim.

Formuler : Une boîte Ulcéoplaque n° 1 ou n° 2.

Prix : 24 ou 36 francs.

1 Ulcéobande. Prix : 30 francs.

ULCÉOSINE

Sulfo-citrate de soude et pipérazine formino-bicarbonaté, arsénio-lithiné.

Action antitoxique et hypotensive.

Indiquée dans l'artério-sclérose, l'hypertension artérielle, les troubles hépatiques, les varices, les congestions variqueuses et phlébitiques, les plaies atones, les ulcères variqueux, le rhumatisme chronique, l'hyperglycémie, le diabète.

1 cuillerée à café par jour dans un verre d'eau chaude ou froide, pendant 15 jours consécutifs.

Prix : 10 francs.

Laboratoire SÉVIGNÉ

76, rue des Rondeaux — PARIS (XX^e)

ULCÉOSOL-POMMADE

Oxyde de zinc, Cuivre salicylé, Silicate de magnésie et excipient spécial.

Guérison rapide de l'Eczéma variqueux sec, Irritation de la peau, Prurigo.

Prix : 10 francs.

ULCÉOSOL-POUDRE

Oxyde de zinc bismuthé, Acide salicylique, Silicate de magnésie.

Poudre siccative, guérit rapidement l'eczéma variqueux suintant, les excoriations eczémateuses superficielles.

Prix : 10 francs.

Laboratoire SÉVIGNÉ

76, rue des Rondeaux — PARIS (XX^e)

ULCÉRINE BERGER

Composition. — Pommade stérilisée aux principes actifs suivants : populine, salicine, pectine, acide benzoïque, acide gallique, associés au Baume du Pérou.

Propriétés. — Astringent. Suppression de la douleur et du prurit. Cicatrisation rapide de l'ulcération par bourgeonnement.

Indications. — Toutes les plaies atones : *ulcères variqueux*, radiodermites et également ulcérations chroniques, brûlures anciennes, engelures, escarres.

Mode d'emploi. — Nettoyage de la plaie à l'eau bouillie, ou si elle est infectée avec de l'eau oxygénée au 1/3. Une fois la plaie désinfectée, appliquer la pommade étendue sur une compresse stérilisée. Maintenir par une bande. Pansement tous les deux jours ou une ou deux fois par jour, si les sécrétions sont abondantes. (En cas de difficulté pour faire sortir la pommade, chauffer légèrement le tube).

Historique. — Présentée à la Société de Dermatologie par le Dr Gastou, chef du Laboratoire Central de l'Hôpital Saint-Louis, l'Ulcérine Berger a été admise dans les hôpitaux de Paris à la suite des rapports médicaux fournis par MM. les Drs Brocq et Balzer, médecins des Hôpitaux, Rieffel, chirurgien des Hôpitaux, etc...

Prix. Le tube : 16 francs.

Le demi-tube : 9 francs.

Laboratoires P. NADAUD

**Docteur en Pharmacie, Licencié
ès-Sciences.**

31, boulevard de la Villette — PARIS (X^e).

ULCÉROPHILE NOSAN

Traitement ambulatoire des Ulcères variqueux.

Présentation et composition. — Bande de 0 m. 13 × 10 mètres imprégnée aseptiquement par un procédé spécial d'une pâte gélatino-amidonnée (pâte de Unna modifiée) constituant, après application, un appareil de contention parfait.

Action. — Décongestionnant, cicatrisant, on obtient par ce pansement un bas à varices semi-rigide moulé sur le membre et ne pouvant se distendre ; provoque par la marche un léger massage qui a pour résultat la résorption rapide du liquide séreux infiltré et le dégonflement du membre. Rétablissement de la circulation veineuse, meilleure nutrition des tissus qui retrouvent toute leur vitalité et enfin la cicatrisation des lésions.

Indications. — Toutes les plaies atones des membres inférieurs et particulièrement des Ulcères variqueux même les plus anciens, sans tendance à la cicatrisation. Plaies traumatiques à cicatrisation lente, phlébites, varices douloureuses, eczémas, brûlures à épidermisation difficile.

Mode d'emploi. — Plonger la boîte contenant la bande dans un récipient d'eau assez profond (bouillotte) et porter à l'ébullition jusqu'à ramollissement complet (15 à 20 minutes). Appliquer la bande directement sur la peau à la façon d'une bande molletière en évitant les renversés.

Prix au public : 25 fr. la bande.

Pharmacie MAYAUD

6 ter, rue Voltaire

LA GARENNE-COLOMBES (Seine).

ULMACETYL

Composition par cachet.

Colchique (sem.) 0,03. Caféine, 0,04 Benzoate Na 0,08, Acide acétylsalicyl., Gentiane ââ, 0,20. Carb. de Li., 0,05. Ulmaire (fl.), Sureau (fl.), buchu (flles), NO 3K ââ, 0 10.

Indications. — Toutes les affections rhumatismales, goutte, sciatique, lumbago, torticolis, névralgies, zona, arthritisme.

Posologie :

En crise : 2 à 6 et même 10 cachets par 24 heures, de préférence 10 à 15 minutes avant chaque repas. Chaque cachet étant absorbé avec un verre d'eau ou de tisane diurétique.

En période calme, comme traitement curatif : 1 cachet midi et soir pendant 21 jours.

Prix : 16 fr. la boîte de 20 cachets de 1 gr.

Laboratoires de l'ULMACETYL et du SPICANOL
54, rue de Sablonville, 1, rue de l'Ouest
NEUILLY-PARIS

G. DURAND, Pharmacien de 1^{re} classe.

Ex-Interne des Hôpitaux de Paris,
ex-Pharmacien de l'Hôpital Maritime de Berck.

ULMARÈNE GIGON

Composition. — Ethers salicyliques liquides d'odeur faible.

Indications thérapeutiques. — Analgésique local, antirhumatismal externe. Spécifique contre les rhumatismes, les névralgies.

Formes. — 1° Ulmarène flacons de 30, 60, 125 cc. (pM, mM, gM) ; pour la vente ou pour les préparations magistrales (liniment, pommade) :

2° Ulmarol Gigon (liniment) ;

3° Baume du docteur Gigon, en tube.

Mode d'emploi. — Onctions suivies d'enveloppements.

Laboratoire des Produits du Dr GIGON

A. FABRE, pharmacien

25, boulevard Beaumarchais — PARIS (IV^e).

ULTRAFORMINE

B. et S.

Urotropine avec association de Benzoate de soude (B) ou de Salicylate de soude (S).

Composition. — Comprimés de 0,50 d'Urotropine et comprimés de 0,50 de Salicylate de soude ou de Benzoate, présentés en deux tubes différents dans la même boîte.

Propriétés. — Antiseptique urinaire, biliaire et général. L'association de Benzoate ou de Salicylate augmente fortement les propriétés diurétiques.

Indications. — Toutes infections générales, urinaires, Affections hépatiques, Affections rhumatismales (Ultraformine S).

Dose moyenne. — 2 ou 3 fois par jour 2 comprimés (un de chaque tube) dans un grand verre d'eau.

Laboratoire SAUZE

60, rue Jean-Jaurès. — FIRMINY (Loire).

ULTRA-LEVURE

Levure ultra-haute (37°) de H. Boulard.

Composition. — 120 à 150 millions de globules de levure par ampoule de 3 cc. 5 dans un milieu isotonique où la levure reste vivante pendant plus de 5 ans.

Propriétés. — Température d'activité et de reproduction optimum correspondant à la température physiologique de l'intestin. Élimine les ferments pathogènes par concurrence vitale. Passe dans la circulation et se retrouve dans les urines.

Ne produit qu'une acidité insignifiante.

Facilite les phénomènes d'assimilation et de désassimilation — tonique par les diastases et les vitamines produites en grande abondance (principalement vitamine B). Action spéciale sur les dermatoses par la vitamine B.

Indications. — *Infections intestinales*, états aigus et chroniques, diarrhées infantiles (se prend dans du lait), diarrhées et dysenteries amibiennes ou bacillaires, entérites, furonculoses et dermatoses *colibacilloses intestinales et urinaires* (résultats très rapides).

Mode d'emploi. — Livrée en boîte de 12 ampoules de 3 cc. 5. *Dose normale* : 1 ampoule par jour dans un peu d'eau sucrée; *dans les cas aigus* : 1 ampoule deux fois par jour; *dose d'entretien* : 2 ampoules par semaine.

La Boîte de 12 ampoules : 22 fr. 50

Laboratoire des Ultra-Levures : L. G. TORAUDE O. ✱. O. I. ✱
 Dr en pharmacie de l'Université de Paris, Lauréat de l'Institut et de l'Académie de Médecine. Membre de la Société de Pharmacie de Paris.
 22, rue de la Sorbonne — PARIS (V°).

ULTRAVITAMINE 4

Les Quatre Vitamines A. B. C. D. (cholestérol ergostérinique irradié) associées à des éléments minéraux : Phosphore, Manganèse, Calcium, en combinaison avec des produits opothérapiques : Moelles et Poudre d'Os frais.

Indications. — Déminéralisation. Rachitisme. Toutes Carences et Convalescences. Dépression nerveuse. Fatigue musculaire. Allaitement. Pré-tuberculose. Puissant Dynamogène. Recalcifiant intégral.

Forme. — Délicieux granulé bicolore.

Posologie. — La même pour enfants et adultes : 1 cuillerée à café de granulé sec ou dissous dans un peu d'eau froide, 1/2 heure avant les 2 ou 3 principaux repas.

Prix : 16 fr. 50.

Produits J. LAURENÇON

Pharmacien, Professeur de Chimie
et de Pharmacologie à Lyon.

Laboratoire d'Actino-Biologie

VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (Rhône).

URALYSOL

Propriétés thérapeutiques. — Traitement de la diathèse rhumatismale. Agent de dissolution et d'élimination de l'acide urique.

Indications. — Arthritisme, Rhumatismes, Goutte. Coliques néphrétiques et hépatiques, Urétrites. Cystites.

Forme. — Granulés.

Formule. — Acide thyminique, Hexaméthylène-tétramine. Lysidine, anhydro-méthylène-citrate d'hexaméthylénététramine, Sels de lithine.

Mode d'emploi. — 1 cuillerée à café, matin et soir dans un verre d'eau.

Prix de vente au public : 14 francs.

Laboratoires LOBICA

46, avenue des Ternes — PARIS (XVII^e).

URASEPTINE ROGIER

A base de Hexaméthylènetétramine et son citrate, Diéthylènediamine, Benzoate de soude et de lithine, etc.

Granulé soluble dosé à 0 gr. 50 de substance active par cuill. à café.

Dose. — 3 à 6 cuill. à café par jour.

Propriétés. — Antiseptique urinaire et biliaire par excellence. Dissout et chasse l'acide urique.

Le flacon : 12 fr. 50.

Henry ROGIER, docteur en pharmacie
56, boulevard Pereire — PARIS.

URAZINE

Citro-salicylate de pipérazine.

Dissolvant de l'acide urique. Action analgésique et antiseptique. Innocuité absolue.

Indications :

Goutte, Gravelle, Rhumatisme.

Posologie et mode d'emploi :

Comprimés à 30 centigr. : trois ou quatre par jour, au moment des repas (tubes de 20 comprimés).

Granulés effervescents : une cuillerée à café dans un demi-verre d'eau, aux deux principaux repas (flacons de 100 gr.).

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

UR-CLAR

Antiseptique urinaire.

UR-CLAR BLEU

Composition. — Bleu de Méthylène, Citraminoxypène, Poudre d'hamamélis.

Propriétés. — Antiseptique et analgésique des voies urinaires et du tube digestif.

Indications. — Toutes les infections urinaires et en particulier les colibacilluries, la tuberculose rénale et vésicale et la blennorragie.

Prix : 20 francs.

UR-CLAR BLANC

Composition. — Santalol citraminoxypène, poudre d'hamamélis.

Propriétés. — Antiseptique et balsamique des voies urinaires.

Indications. — La blennorragie et ses complications.

Doses. — 9 à 12 capsules par jour.

Prix : 20 francs.

Laboratoire Central Maubeuge,

M. A. ROUX, Pharmacien

58, rue de Maubeuge — PARIS.

URÉOL CHANTEAUD

Composition. — Granulé contenant par cuillerée à café :

| | |
|------------------------------|----------|
| Hexaméthylène tétramine..... | 0 gr. 40 |
| Benzoate de soude | 0 gr. 30 |
| Benzoate de lithine | 0 gr. 10 |

Indications :

Désinfectant très actif des voies urinaires et biliaires.
Manifestations arthritiques, gouteuses, suppurations rénales des voies urinaires.

Doses et mode d'emploi :

1 cuillerée à café 2 fois par jour que l'on fait dissoudre dans un peu d'eau.

Prix de vente : 9 fr. 90.

Laboratoires CHANTEAUD

J. LAURIN, Pharmacien.

3 et 5, rue Alexandre-Dumas
SAINT-OUEN (Seine).

URIBILINE

Traitement des infections hépato-rénales.

Présentation. — Granulé.

Aux extraits d'artichauts, de boldo et formine.

Stimulants reconnus de la cellule hépatique et rénale.

Un fait incontesté domine la pathologie infectieuse de ces deux organes : la Colibacillose.

L'URIBILINE y est employé avec succès, et dans toute infection et tout encombrement des glandes hépatiques et rénales : Congestions, Cirrhoses, Cholémie, Cholécystites, Coliques néphrétiques, Néphrites, Dysurie, Anurie.

Rend les plus grands services dans toutes les affections où il est nécessaire d'assurer l'intégrité des voies entéro-hépto-rénales.

Formule. — Formine, 5 gr. ; Salicylate de Soude, 5 gr. ; Bicarbonate de Soude, 2 gr. ; Extrait de Boldo, 1 gr. ; Extrait d'Artichaut, 1 gr. ; Extrait de Rhamnus, 0 gr. 50 ; Excipient, Q. S. pour 100 gr. de granulé.

Posologie. — 3 ou 4 cuillerées à café par jour, entre les repas dans un liquide chaud.

Prix : 16 francs.

Laboratoires REBOUL
PONT-SAINT-MAXENCE (Oise).

URICLARINE

(Comprimés.)

Antiseptique entéro-rénal.

Propriétés thérapeutiques. — Combat l'infection urinaire au lieu même où elle naît : dans le tube digestif. L'Uriclarine, dans laquelle le chlorure d'ammonium renforce l'action du salicylate de phénile et de l'urotropine, est le médicament des affections réno-vésicales.

Indications. — Maladies infectieuses des Voies Urinaires, Cystites, Pyélites, Colibacillurie, Blennorrhagie.

Mode d'emploi. — Avaler sans croquer 6 à 8 comprimés par jour de préférence aux repas.

Laboratoires BRISSON

Dr DEDET et Cie, Pharmaciens

Anciens Internes des Hôpitaux de Paris.

157, rue Championnet — PARIS (XVIII^e).

URIFLUINE

Succinate de lithine.

Dissout l'acide urique, augmente la quantité des urines, empêche les coliques néphrétiques. Action anti-rhumatismale dans la Cellulite et le Rhumatisme chronique.

La boîte de comprimés ou pilules : 12 francs
prix public.

La boîte de 10 ampoules : 13 fr. 50
prix public.

Laboratoires STENE

2, place des Vosges — PARIS (IV^e)

URISANINE

Composition. — Benzoate d'hexaméthylène-tétramine dissous dans un excipient à base végétale (plantes balsamiques et buchu) auquel a été incorporé l'extrait de stigmates de maïs.

Dosage. — Une cuillerée à café = 0 gr. 75 de Benzoate d'hexaméthylène-tétramine + 0 gr. 25 d'extrait de stigmates de maïs dissous dans 4 gr. d'excipient végétal balsamique.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique urinaire et biliaire complet ; balsamique et diurétique ; dissolvant phosphatique, urique et uratique ; éliminant sûr et rapide.

Indications. — Toutes affections des voies urinaires et biliaires, maladies infectieuses (typhoïde, scarlatine, grippe), comme préventif de l'infection vésico-rénale.

Mode d'emploi. — Se prend dilué dans 1/2 verre d'eau naturelle ou gazeuse.

Adultes : 1 à 4 cuillerées à café par jour.

Enfants : par 1/2 cuillerée à café suivant l'âge.

Prix : 13 fr. 50.

Laboratoires LONGUET

34, rue Sedaine — PARIS.

UROBUCCOL MALMANCHE

Composition :

| | |
|--|-------------|
| Formine (uroformine, urotropine) . . . | 25 centigr. |
| Benzoate de soude | 20 — |
| — de lithine | 10 — |
| Sirop de buchu | 2 grammes. |
| — de maïs | 2 — |
| — de térébenthine | 2 — |

par cuillerée à café.

Forme. — Liquide sirupeuse.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique des voies urinaires et des voies biliaires, antiseptique général, balsamique et diurétique puissant. Dissolvant phosphatique, urique et uratique.

Indications. — Pyélites, Pyélonéphrites, Cystites, Urétrites, Prostatite, Blennorrhagie, Uricémie, Goutte, Lithiase rénale, Coliques hépatiques.

Posologie. — 2 à 3 cuillerées à café par jour. pur ou dans une infusion.

Prix au public : 12 francs.

Laboratoire MALMANCHE

Pharmacien. Docteur ès sciences.

101, avenue Paul-Doumer.

RUEIL-MALMAISON (Seine-et-Oise).

UROCLASE

Antiurique vrai.

Préventif et curatif. Non toxique.

Définition et composition centésimale.

Bioxyde de Silicium (0,25) à l'état colloïdal, uni par adsorption au Carbonate de K (0,025) et au Chlorure de Na (0,19) dispersés en milieu aqueux par un procédé spécial.

Mode d'action.

Corrige progressivement le métabolisme vicié de la cellule vivante, rétablit l'équilibre acido-basique rompu vers l'alcalose, redresse jusqu'à la normale le pH humoral. La précipitation de l'acide urique dans l'organisme devient ainsi impossible. Il est donc aussi bien préventif des accidents à venir que curatif des accidents en cours, et de toxicité rigoureusement nulle.

Agit à la manière d'un ferment, suivant les lois de la physiochimie des colloïdes, et, par conséquent, de la matière vivante.

Indications :

Tous les états uricémiques dans toutes leurs manifestations.

Emploi et Doses.

V à X gouttes le matin à jeun dans un peu d'eau. Cures régulières et successives de 10 jours, séparées par repos de 10 jours.

UROCLASE " M " (modifié)

A micelles colloïdales plus petites contre les Uricémies mixtes et Pseudo-Uricémies. Mêmes doses et mode d'emploi.

Prix : 20 francs.

Pierre ALEXANDRE, Pharmacien.

41, rue de Rome — PARIS (VIII^e).

Tél. : Laborde 08-00.

UROFLUX

Forme. — Granulé effervescent.

Composition. — Benzoate de lithium, 1 gr. Benzoate de sodium, 1 gr. Hexaméthylène tétramine, 3 gr. Pipérazine, 0 gr. 50. Excipient effervescent au citron Q. S. pour 100 gr.

Propriétés pharmacodynamiques. — Diurétique, antiseptique des voies urinaires et biliaires, régulateur de l'activité hépatique, dissolvant de l'acide urique.

Indications. — **Affections urinaires** (urétrites, cystites, prostatites). — **Manifestations arthritiques** (goutte, gravelle, coliques hépatiques et néphrétiques).

Mode d'emploi. — Une cuillerée à café dissoute dans un verre d'eau 2 à 3 fois par jour entre les repas.

Prix : 12 fr. 50.

Laboratoire de L'UROFLUX

21, rue Feydeau — PARIS (II^e).

UROFORMINE GOBEY

Hexaméthylène tétramine chimiquement pure. Cristaux solubles dans l'eau.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique sanguin pouvant être utilisé contre toutes les infections.

Indications. — Fièvres infectieuses, Grippe, Encéphalites, Complications broncho-pulmonaires, etc. Rhumatismes, Infections des voies biliaires et urinaires, etc.

Présentation :

Boîte de 50 comprimés simples à 0,50.
 — 50 — effervescents à 0,25.
 — 12 ampoules de 2 cc. à 0,25.
 — 6 — de 5 cc. à 0,25.

Posologie :

2 à 4 comprimés simples par jour.

4 à 8 comprimés effervescents par jour. (Dans un grand verre d'eau.)

Prix au public :

La boîte de 50 comprimés à 0,50 : 12 fr. 50.

La boîte de comprimés effervescents : 12 fr. 50.

Laboratoires du Docteur ROUSSEL

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI^e).

UROIODINE

Composition. — L'Uroïdine ou Iodoéthylate d'hexaméthylènetétramine est une combinaison organique contenant 42 p. 100 d'iode rigoureusement titré, associée à un sel de lithine.

Propriétés physiques et chimiques. — Solution dialysable, se décompose lentement, est diffusée dans tout l'organisme, s'élimine dans l'urine sous forme d'iodure alcalin, ce qui indique une destruction complète de la molécule organique. Pas d'accumulation.

Propriétés physiologiques. — Grâce à sa molécule iodée, l'Uroïdine est un excitateur puissant des fonctions lymphoïdes, déterminant une hyperleucocytose intense, un fixateur d'oxygène, stimulant les échanges nutritifs de l'organisme.

Grâce à l'heureuse combinaison Iodo-Formine, l'Uroïdine constitue un agent anti-infectieux particulièrement énergique. Enfin grâce à l'association Formine-Lithine, l'Uroïdine est un diurétique très actif et un excellent dissolvant de l'acide urique et des urates.

Indications. — Toutes affections glandulaires : adénites, adénopathies, végétations adénoïdes, scrofulides, etc... Maladies de la nutrition : toutes manifestations des diathèses. Urique : goutte, gravelle, calculs, etc. Arthritique : rhumatismes chroniques et déformants. Tuberculoses localisées : osseuses et ganglionnaires, Tertiarisme, Scléroses, Asthme, Emphysème, etc... (Voir page 2). Toutes maladies infectieuses du système nerveux.

Formes et Posologie. — Ampoules de 3 cc. 3/4. Comprimés kératinisés de 0 gr. 50. Chez l'enfant au-dessous de 15 ans, 1/2 à 1 ampoule par jour. Chez l'adulte, 1 à 3 ampoules par jour simultanément et de préférence en injection intraveineuse (bien tolérées sans réaction locale, ni choc hémoclasique, résorption parfaite). Comprimés : 1 à 2 comprimés suivant l'âge chez l'enfant ; 6 à 8 comprimés chez l'adulte. Contenant 42,5 % d'iode, ces comprimés remplacent avantageusement les iodopeptones qui n'ont que 17 % d'iode et sont mieux tolérés grâce à leur enrobage gluténisé. Chaque comprimé correspond à 48 gouttes de teinture d'iode. Chaque ampoule à 148 1/2 gouttes.

Prix :

Ampoules : 27 francs. — Comprimés : 24 francs.

Laboratoire de l'UROIODINE

7, rue Jules-César, PARIS (XII^e).

Tél. : Diderot 16-94.

UROL**(Liquide)**

Composition. — Urotropine, Extraits de stigmate de maïs, de chiendent et d'uva-ursi.

Indications. — Toutes affections du foie, du rein et de la vessie. Anti-infectieux de la grippe, des septicémies, etc.

Mode d'emploi. — 2 cuillerées à café par jour. Une cuillerée à café contient 0 gr. 50 d'urotropine.

Le flacon : 12 francs.

Échantillons et littérature :

Laboratoire NEUVILLE

239, Faubourg St-Honoré — PARIS.

UROMÉTINE
LAMBIOTTE FRÈRES

Hexaméthylènetétramine pure.

Formes. — Comprimés, Ampoules, Cristaux.

Propriétés thérapeutiques. — Puissant antiseptique interne, antitoxique, antiuricémique.

Indications. — Toutes infections urinaires, intestinales et biliaires, toutes maladies infectieuses, toutes manifestations de la diathèse urique.

Mode d'emploi. — 1° Comprimés de 0 gr. 50 à faire dissoudre dans l'eau et à prendre matin, midi et soir : 6 à 8 dans les cas aigus, 3 à 4 dans les cas chroniques ; 2° Ampoules de 2 cc. et 5 cc. dosées à 0 gr. 25 par cc. pour injections intramusculaires ou mieux intraveineuses ; 3° Cristaux pour prescriptions magistrales.

Ampoules : Prix : 16 francs. — **Comprimés :** 14 francs.

Littératures et Échantillons :

Produits LAMBIOTTE FRÈRES

20, rue Dumont-d'Urville — PARIS (XVI°).
124, avenue Rogier — BRUXELLES.

UROMETYHL

Cachets — Dragées.

Association stable : Urotropine chimiquement pure, Salol, Citrate d'urotropine, Bleu de Méthylène.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique interne, particulièrement énergique et anti-infectieux par excellence. Aucune intolérance. Pas de contre-indications.

Indications. — Antisepsie générale, Maladies infectieuses, Infections urinaires et biliaires, Diathèse urique, Diathèse arthritique.

Mode d'emploi :

Cachets : 3 à 6 par jour au début des repas.

Dragées : 6 à 9 par jour au début des repas.

Prix. — Cachets : 20 francs. — Dragées : 16 francs.

Littérature et échantillons :

Laboratoires de l'UROMETHYL

J. BRESSIER, Docteur en Pharmacie
102, rue Vincent — MARSEILLE

Concessionnaires :

Les Laboratoires NOVALIS
OULLINS (Rhône).

UROMIL

Composition. — Association d'éther phényl-cinchonique, pipérazine, hexaméthylène tétramine.

Forme. — Granulé de goût agréable, effervescent, instantanément soluble dans l'eau.

Action. — Mobilise, dissout, élimine l'acide urique. Par ses éléments phosphoriques, empêche la formation de purines endogènes, génératrices d'acide urique.

Par son phosphate disodique, entrave la précipitation de l'acide urique au niveau du rein et de la vessie.

Possède une activité double de celle des pipérazines granulées et est toujours bien toléré.

Indications. — Diathèse urique, goutte, rhumatisme chronique, lithiase hépatique et rénale.

Mode d'emploi. — 2 à 4 cuillerées à café par jour, chacune dans un verre d'eau.

Laboratoires UROMIL

L. BELIERES, docteur en pharmacie.
19, rue Drouot — PARIS (IX^e).

UROPHÉNYL

Composition. — Acide phénylquinolique carbonique et hexaméthylène tétramine recristallisée.

Action. — La puissance de l'acide phénylquinolique carbonique pour l'élimination de l'acide urique, sans ses inconvénients (ictère) par association en heureuse proportion avec l'urotropine recristallisée.

Indications. — Goutte et rhumatisme.

Mode d'emploi. — 2 à 6 cachets par jour avant les repas, dans un grand verre d'eau alcaline.

Prix : 18 francs.

Laboratoires CROUY
Docteur en Pharmacie.
VERNON (Eure).

UROPHILE

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments, sous le N° 363-10.

Forme. — Granulé effervescent.

Composition. — Lithine en combinaison benzoïque, Hexaméthylène tétramine, Acide Thyminique.

Propriétés pharmacodynamiques. — Uricolytique, Diurétique, Régulateur de l'activité hépatique, Antiseptique des voies urinaires et biliaires.

Indications. — Diathèse arthritique. — Goutte aiguë et chronique. — Gravelle urique. — Lithiase biliaire. — Rhumatismes. — Cystites.

Mode d'emploi. — Une cuillerée à café dans un peu d'eau, deux fois par jour, entre les repas.

L'étui : 14 francs. (En France.)

Laboratoires A. BAILLY
15, rue de Rome — PARIS (VIII^e).

UROQUINOL

Antiseptique urinaire et biliaire.

Action :

- 1° Mobilisatrice par le Phénylcinchoninate de Soude.
- 2° Cholagogue par l'extrait d'artichaut.
- 3° Antivisqueux par le citrate trisodique.
- 4° Empêche la formation des purines et entrave la précipitation de l'acide urique par son phosphate de soude.

Formule :

| | |
|------------------------------------|------|
| Phénylcinchoninate de soude | 1 |
| Urotropine | 3 |
| Tartrate pipérazine | 1 |
| Phosphate de soude pulvérisé | 1 |
| Citrate trisodique | 2 |
| Extrait mou artichaut repris | 0,50 |

Pour 100 grammes.

Posologie. — 2 à 3 cuillerées à café par jour, dans un verre d'eau, pris le matin à jeun et avant les repas.

Dans les crises aiguës : 4 à 5 cuillerées à café par jour.

Présentation. — Granulé soluble.

Prix : 16 fr. 50.

Laboratoires DEXO

23, rue Danton — PARIS-LEVALLOIS

UROSALYL

Association stable de l'Urotropine et du Salol.

Composition :

Hexaméthylène tétramine. 0 gr. 40.
 Salol..... 0 gr. 50.
 Excipient neutre..... Q.S. pour 1 cachet.

Propriétés thérapeutiques. — Puissant antiseptique des infections urinaires, biliaires, intestinales. Il donne d'excellents résultats dans les urétrites, prostatites, cystites purulentes, pyurie ; prophylaxie de la fièvre typhoïde et toutes les maladies infectieuses.

Présentation. — En boîtes de 24 et de 60 cachets. (*Sous tubes de verre paraffinés*).

Doses. — 2 à 3 cachets par jour, au début des repas.

Prix de vente: G. M., 20 fr.; P. M., 10 francs.

UROSALYL MÉTHYLÉ

(Bande bleue.)

Réservé aux malades qui présentent de l'intolérance vésicale pour l'Urotropine.

Formule : Salol, 0 gr. 65 ; Bleu de méthylène chimiquement pur, 0,03 ; Excipient neutre, Q. S. pour 1 cachet.

Même présentation, mêmes indications, mêmes doses et mêmes prix que l'Urosalyl simple.

Enregistrés au laboratoire national de contrôle des médicaments sous les n^{os} 300-1 et 300-2.

(Peuvent être prescrits aux assurés sociaux)

Clément GARDIOL

Pharmacien de 1^{re} classe
 de la Faculté de Montpellier

6, rue Félix-Pyat — MARSEILLE.

Échantillons. — Littérature sur demande.

UROSAN DUFAYARD

Forme. — Comprimé à faire dissoudre.

Composition. — Benzo-camphorate d'urotropine et extrait de styles de maïs.

Indications. — Antiseptique, urinaire et biliaire. *Médicament de choix* pour le traitement des Cystites, Prostatites, Urétrites, Pyélites, Pyélonéphrites de la Grippe, Fièvre typhoïde, Diathèse urique, Rhumatismes, Goutte, Gravelle, Calculs, Phosphaturie.

2 à 6 comprimés par jour, dissous dans l'eau.

Echantillons sur demande.

Prix : 14 francs.

Laboratoires DUFAYARD

12, rue des Saints-Pères — PARIS.

URO-TISAN

Comprimés diurétiques.

Composition exclusivement végétale. — Extraits des plantes *réellement* diurétiques.

Indications. — Infections des Voies urinaires et manifestations de l'arthritisme ; urines troubles, phosphatiques ou uratiques.

Aucune contre-indication.

Propriétés thérapeutiques — Augmentation de la diurèse, clarification des urines, sédation des phénomènes de dysurie et décongestion pelvienne.

Mode d'emploi. — Mettre 1 comprimé dans 1 litre d'eau ; on obtient, par dissolution rapide, 1 litre de boisson, agréable au goût, à boire dans les 24 heures, dans l'intervalle des repas.

Prix de vente au public : 18 francs,

J. FABRE, Docteur en Pharmacie

Licencié ès sciences.

112, rue des Pyrénées — PARIS (XX^e).

UROZEA

Antiseptique hépato-urinaire.

Propriétés thérapeutiques. — Puissant dissolvant de l'acide urique.

Indications. — Maladies infectieuses, syndrome entéro-rénal, lithiases biliaire et rénale, goutte, rhumatisme chronique.

Forme. — Granulé effervescent agréable au goût.

Formule. — Héxaméthylène tétramine, benzoate de lithine, salicylate de lithine, carbonate de lithine, citrate héxaméthylène tétramine, théobromine, benzoate soude, scille, pipérazine. Ext. de stig. de maïs, ext. uva ursi, ext. chiendent.

Dose et mode d'emploi. — 3 à 6 cuillerées à café par jour.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 653-3.

Prix : 20 francs.

Laboratoire LOBRY

6, rue Parrot — PARIS (XII^e).

UTÉRO-STREPTINE

Vaccin polyvalent spécialement mis au point pour la Prophylaxie et le Traitement des Infections Puerpérales ainsi que pour la préparation des donneurs de sang pour Immuno-Transfusions.

Posologie. — Vaccination préventive : une injection sous-cutanée tous les 6 à 8 jours aux doses progressives de 1/4 de cc. à 1 cc (une série de 4 injections au 7^e mois de la grossesse).

Les 4 ampoules : 30 francs.

Produits Biologiques CARRION

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré
PARIS

Tél. : Anjou 36-45 (2 lignes).

UTERSAN

Décongestif Utéro-ovarien.

Composition. — Extrait mammaire, Extrait placentaire, Anémone pulsatille, Bourge à Pasteur, Cimicifuga, Hamamélis, Hydrastis, Marron d'Inde, Viburnum, Sépia.

Posologie. — 6 dragées par jour, 10 à 20 jours par mois. Cesser pendant les règles.

Indications. — Traitement « per os » des états congestifs, inflammatoires, douloureux et des hyperplasies de l'appareil utéro-ovarien. Métrites. Salpingites. Prolapsus, Rétroversions. Fibromes, Métrorragies et Leucorrhées. Suites de couches.

Prix de l'étui de 60 dragées argentées : 18 francs.

Laboratoire du VAGOSEDYL

20 et 22, rue des Martyrs — PARIS (IX^e).

G. COUSSINET, Pharmacien.

Licencié ès Sciences.

UVARGOL

Argent colloïdal activé par la lumière.

Première utilisation en thérapeutique de l'action des rayons lumineux sur l'argent. (On connaît la sensibilité particulière de l'argent à la lumière : photographie).

Cette action a pour effet :

- 1° D'augmenter très fortement le pouvoir bactéricide de l'argent colloïdal, d'où pour action égale dose *extrêmement réduite*.
- 2° De fournir un produit d'action absolument constante.

L'Uvargol se fait sous forme :

- 1° *De Dragées*, pour adultes : 6 à 8 par jour, à prendre avant les repas. Contiennent 1 cgr. de principe actif.
- 2° *De Comprimés*. — *Enfants et nourrissons* : 3 à 5 par jour, à faire dissoudre dans de l'eau ou du lait et à prendre en 2 fois avant chacun des principaux repas, ou avant les tétées. Contiennent 1 cgr. de principe actif.
- 3° — *D'Ovules* contenant 5 cgr. de principe actif
Un tous les jours ou tous les 2 jours.
- 4° — *Pommade* à 5 % pour pansements et onctions.

Indications :

- 1° *Dragées ou comprimés* : toutes les maladies infectieuses de l'intestin ou des voies urinaires : Entérites, Diarrhées (et particulièrement diarrhées infantiles), fièvre typhoïde, grippe infectieuse, cystite, pyélo-néphrite à colibacilles, syndrome entéro-rénal, etc...
- 2° *Ovules* : Traitement des affections de la femme : Métrites, salpingites, vaginites.
- 3° *Pommade* : Pansement de toutes plaies, Brûlures Hémorroïdes, Sinusites, etc.

Prix :

Dragées : 20 francs. — Comprimés : 18 francs. —
Ovules : 18 francs. — Pommade : 12 francs.

Laboratoires de l'UVARGOL

G. MARTINIE

62, avenue Philippe-Auguste — PARIS (XI^e).
Services commerciaux, 37, avenue de l'Echo —
SAINT-MAUR (Seine.) R. C. 440.107.
Télé. : Roquette 86-84 ; Gravelle 04-32.

UVÉ

(Gouttes)

Composition. — Solution aqueuse de Phosphate de Chaux, Chlorures de Manganèse, de Magnésie et de Fer, Acide phosphorique, stabilisés.

Ni Arsenic, ni Strychnine.

Mode d'action. — Reminéralisent, reconstituent, désintoxiquent.

Indications. — Toutes les **ANOREXIES** (nourrissons, enfants, adultes) dont elles sont le *véritable spécifique*, Convalescences post-infectieuses, Asthénies, Surmenage, **DÉCALCIFICATIONS**, etc.

Posologie. — *Adultes* : XL à LXXX gouttes. *Enfants* : XX à XL gouttes, en une ou deux fois, dans un peu d'eau simple ou de préférence bicarbonatée.

Nourrissons : I goutte par mois d'âge de 1 à 6 mois, I goutte et demie par mois de 6 à 12 mois, dans le lait des tétées.

Prix : Le flacon : 9 fr. 80 ; grand modèle : 18 fr.

Laboratoires CRINEX-UVÉ

18, rue Saint-Amand — PARIS (XV^e).

UVÉOLINE

Pommade antiseptique aux essences aromatiques, longuement irradiée par les Rayons Ultra-Violets.

Indications. — Pyodermites, Plaies atones, Ulcères variqueux, Furonculose.

Mode d'action. — Agit par les essences végétales, l'hydroxyde de magnésium, le peroxyde de zinc, le bismuth, le calomel.

Mode d'emploi. — En onctions ; en compresses imprégnées ; incorporée à la paraffine dans les brûlures.

Prix du tube de 40 gr. : 10 francs.

Ovules à l'Uvéoline.

Traitement de toutes les lésions utéro-vaginales.

Prix de la boîte de 6 ovules : 15 francs.

Laboratoire de l'UVÉOLINE

Pharmacie AMBARD

CARCES (Var).

UVÉPHORINE

Spécifique de toutes les carences de l'organisme.

Composition. — Association de l'Ergostérine irradiée ou Vitamine D à la Phytosphosphine (Inosito-hexaphosphate de chaux et de Magnésie).

Propriétés. — A pour buts bien définis : La fixation du calcium dans l'organisme, et l'apport de phosphore à un organisme qui s'en trouve insuffisamment pourvu. Possède un grand pouvoir reminéralisateur et reconstituant.

Indications. — Rachitisme, Déminéralisation, Faiblesse générale, Anémie, Surmenage, Croissance Accidentés de carie dentaire, Troubles de l'ossification Grossesse, Allaitement.

Doses. — *Adultes* : 2 cachets par jour, aux repas ou 2 cuillerées à café de *granulé*.

Enfants : 1 à 2 cachets par jour ou 1 à 2 cuillerées à café de *granulé*.

Prix : Cachets (boîte de 24) : 15 fr. — Granulé : 16 fr. 50.

Laboratoire E. HAUTDIDIER

37, rue Galilée — PARIS (XVI^e).

UVÉSTÉROL

Vitamine D cristallisée.

Vitamines A B C + Facteur de croissance.

Composition

Emulsion non huileuse contenant par cc. (XXXV gouttes) : Vitamine D cristallisée, 6 000 unités antirachitiques ; Cholestérol, 5 mgr. ; Extrait de levure de bière vitaminé, 1 mgr. 3.

Mode d'action

Fixe chaux et phosphore, Active la croissance, Antitoxique, bactéricide, hématopoïétique.

Avantages :

Remplace intégralement l'huile de foie de morue, parce qu'il unit à l'action exclusivement antirachitique de la Vitamine D (Lesné, Clément, Simon) les activités de croissance, antitoxique et antianémique, de la Cholestérine.

Aucune toxicité, aucune contre-indication.

Parfaitement toléré même par les fébricitants.

Indications :

Croissances difficiles ou retardées, Lymphatisme, Prétuberculose.

Rachitisme, tétanie, décalcifications.

Toutes tuberculoses (osseuses, séreuses, ganglionnaires, pulmonaires).

Conservation :

Garde intacte son activité, même au bout d'un an.

Posologie :

Adultes : XL à CX gouttes. *Enfants* : XV à LX gouttes, soit pures, soit diluées dans une boisson lactée, une eau alcaline, du jus d'orange.

Chez le *nourrisson sain* (action préventive) : VII à XL gouttes.

Chez le *nourrisson rachitique* : XXX à LX gouttes.

Prix : Le flacon : 10 fr. 50 ; grand modèle : 18 fr. 50.

Laboratoires CRINEX-UVÉ

18, rue Saint-Amand — PARIS (XV^e).

VACCIN ANTI-ASTHMATIQUE

du Professeur MINET

Le traitement vaccinal de l'asthme et des affections pulmonaires présente sur les nombreuses médications utilisées jusqu'à ce jour l'avantage de s'adresser non pas à un symptôme, tel que la toux ou l'oppression, mais à une des causes les plus évidentes de l'entretien des affections, à savoir la pullulation microbienne à l'intérieur des voies respiratoires.

Indications. — Asthme, Emphysème, Catarrhe. Infections secondaires de la Tuberculose pulmonaire.

Mode d'emploi. — L'injection doit être faite dans le tissu cellulaire sous-cutané ; le point d'élection est la région dorsale, vers la base du thorax. Chez l'adulte, on peut injecter sans inconvénient le contenu d'une ampoule de 1 cc. 1/2. Les injections doivent être répétées tous les deux jours. Entre la 5^e et la 6^e injection, il est recommandé d'interrompre durant 6 jours et de reprendre le traitement dans les mêmes conditions. Chez l'enfant, le vaccin est aussi bien supporté que chez l'adulte, à la dose de 1/4 de cc. entre 1 et 3 ans ; à 1/3 de cc. de 3 à 7 ans ; à 1/2 cc. de 7 à 12 ans.

La boîte de 10 ampoules : 35 francs (prix au public).

VACCIN ANTI-PNEUMONIQUE

du Professeur MINET

« A la suite de l'injection de ce Vaccin, on assiste à une modification « véritablement impressionnante du tableau classique de la pneumonie. »

Indications. — Pneumonie, broncho-pneumonie des enfants et des vieillards.

Mode d'emploi. — Le point d'élection est incontestablement la région sus-épineuse. Chez l'adulte, il faut injecter d'emblée le contenu d'une ampoule soit 1 cc. et répéter l'injection toutes les 24 heures. Dans les cas graves, la dose peut être portée dès le deuxième jour, à deux ampoules en une seule injection. Si le cœur et les reins sont déjà touchés par l'infection, il y a lieu de commencer à la dose de 1/2 cc. Chez l'enfant, il y a lieu de réduire la dose à 1/4 de cc. entre 1 à 3 ans ; 1/3 de cc. de 3 à 7 ans ; à 1/2 cc. de 7 à 12 ans.

La boîte de 5 ampoules. Prix au public : 35 francs.

VACCIN ANTI-GRIPPAL

du Professeur MINET

Traitement de la grippe et de toutes les complications pulmonaires et suppuratives : otites, sinusites, etc., congestion grippale.

Enraye immédiatement toutes gripes légères ou graves dans leur évolution et évite ainsi leurs complications.

Mode d'emploi. — Voir « Vaccin Anti-Pneumonique ».

La boîte de 5 ampoules. Prix au public : 35 francs

Produits « STÉNÉ »

2, place des Vosges — PARIS (IV^e.)

VACCIN DEMONCHY

anti-gonococcique

Le vaccin Demonchy, grâce à sa richesse en corps microbiens (25 milliards de germes au cc.), donne d'excellents résultats non seulement dans les urétrites aiguës et subaiguës, mais aussi dans les complications de la blennorrhagie.

Présentation :

Ampoules de 1 cc.

Posologie :

Pratiquer une série de 8 à 10 injections de vaccin à doses progressivement croissantes ($\frac{1}{4}$ de cc., $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, 1, 1 $\frac{1}{2}$, 2 cc.) en s'abstenant rigoureusement de tout traitement local.

Technique des injections :

Les injections doivent être faites en plein tissu cellulaire sous-cutané, entre la crête iliaque et les dernières côtes.

Les injections se font tous les deux jours. Pour éviter toute réaction du derme, ne pas utiliser pour l'injection l'aiguille qui a servi à prendre le vaccin dans l'ampoule. Lorsque la vaccination est effectuée en se conformant à cette technique, l'action du vaccin se manifeste par *une rapide amélioration et après la huitième injection, il suffit, pour obtenir la guérison, de quelques lavages.*

Prix de vente au public : 20 francs.

**Société Générale
d'Applications Thérapeutiques**

THERAPLIX

R. MOREUX, Pharmacien

Ancien interne des hôpitaux

98, rue de Sèvres — PARIS (VII^e).

VACCIN DE WEILL ET DUFOUT

Composition. — Pneumocoques, Entérocoques, Staphylocoques, Tétragènes.

Indications :

1° *Préventif* : Bronchites profondes ou épidémiques. — Broncho-pneumonies post-opératoires.

2° *Curatif* : Broncho-pneumonies de l'enfant et de l'adulte. — Pneumonies.

Avantages. — Aucune contre-indication. — Aucune réaction.

Posologie :

Nourrissons : $\frac{1}{3}$ de cc. ; puis $\frac{1}{2}$ cc. ; puis 1 cc. *Adultes* : 1 cc.

Prix :

3 amp. : 28 fr. 50. — 6 amp. : 42 francs.

Laboratoires ROBERT et CARRIERE
37, rue de Bourgogne — PARIS.

VACCINOTHÉRAPIE ATOXIQUE CÉPÈDE

Hyperleucocytose et phagocytose spécifique exaltée.
Médication causale naturelle.

A PRESCRIRE PAR N^{os} ou PAR LETTRES SYMBOLIQUES

Innocuité absolue.

| | |
|--|---------|
| 1. Vaccin Ac. Sa (acne)..... | Cépède. |
| 2. Vaccin Bg. Pf. S. P. E. S. Ca (coqueluche et complications)..... | Cépède. |
| 3. Vaccin C. (colibacillaire)..... | Cépède. |
| 4. Vaccin C. E. (coli-entérococcique)..... | Cépède. |
| 5. Vaccin C. E. S. (diarrhée)..... | Cépède. |
| 6. Vaccin C. S. E. S. (entérite et entérocolite)..... | Cépède. |
| 7. Vaccin E. (entérococcie)..... | Cépède. |
| 8. Vaccin E. S..... | Cépède. |
| 9. Vaccin E. Sa..... | Cépède. |
| 10. Vaccin G. (gonococcie)..... | Cépède. |
| 11. Vaccin G. S. E. S. (blennorrhagie)..... | Cépède. |
| 12. Vaccin G. C. S. E. S. (affections blennorrhagiques de l'homme et de la femme)..... | Cépède. |
| 13. Vaccin G. C. S. E. S. Psd..... | Cépède. |
| 14. Vaccin Mo (Morax) (conjonctivite aiguë)..... | Cépède. |
| 15. Vaccin Mo. Sa. (Morax-Staphylo) (conjonctivite mixte)..... | Cépède. |
| 16. Vaccin Mo. P. Sa. (Morax-Pneumo-Staphylo) (conjonctivite mixte)..... | Cépède. |
| 17. Vaccin P. E. S. (pneumonie)..... | Cépède. |
| 18. Vaccin Pb. S. P. E. S. Ca..... | Cépède. |
| 19. Vaccin Pb. S. P. E. S. Ca. Py (Otitite, sinusites).... | Cépède. |
| 20. Vaccin Pf. S. P. E. S. Ca. (grippe et complications)..... | Cépède. |
| 21. Vaccin Pf. Pb. S. P. E. S. Ca. (Asthme)..... | Cépède. |
| 22. Vaccin S (érysipèle)..... | Cépède. |
| 23. Vaccin S. Sa (peau-ostéomyélite)..... | Cépède. |
| 24. Vaccin S. E. S. (puerperalité, abcès chauds, phlébites)..... | Cépède. |
| 25. Vaccin S. P. E. S (100 millions)..... | Cépède. |
| 26. Vaccin S. P. E. S (400 millions)..... | Cépède. |
| 27. Vaccin S. P. E. S. Ca. (catarrhe)..... | Cépède. |
| 28. Vaccin S. P. E. S. Ca. 100..... | Cépède. |
| 29. Vaccin S. P. E. S. Ca. Pz. (Ozène)..... | Cépède. |
| 30. Vaccin Sa (furoncles)..... | Cépède. |

Tous curovaccins atoxiques sur demande
de MM. les médecins

La caractéristique de la méthode Cépède réside dans la suppression totale de la phase vaccinale négative. Dans les curovaccins Cépède ci-dessus (désignés par les initiales des microbes servant à leur préparation) les toxines microbiennes sont toujours éliminées ou anéanties. L'injection sous-cutanée n'entraîne aucune réaction ni aucun phénomène morbide général ou local surajouté.

La boîte de 10 ampoules : 30 francs au public.

Institut de Biologie appliquée

57, 59, 60, rue Mathurin-Régnier et 47, rue Bague
PARIS (XV^e) — Téléph. : Ségur 11-40

Adresse télégraphique : Ibacépède — PARIS

Dans toutes les pharmacies.

Adoptée par les Hôpitaux.

VACCINS

(Bruschettini).

2 vaccins sont préparés selon la méthode très originale et très personnelle du professeur BRUSCHETTINI, de Gênes, par les

Laboratoires FOURNIER Frères.

7, rue Biscornet — PARIS.

- 1° Un vaccin Antipyogène polymicrobien polyvalent s'appliquant à toutes les infections dues aux pyogènes communs. Son absence à peu près totale de réactions, tant générales que locales ou focales, en fait le type de vaccin d'urgence.
- 2° Un vaccin Antigonococcique avec ses applications spécifiques.

Posologie.

Ces 2 vaccins s'emploient à une dose moyenne d'une ampoule par jour et il est particulièrement recommandé de répéter les injections dans les cas graves. Cette posologie leur est particulière.

Sur demande il est envoyé littératures et échantillons ainsi qu'une trousse de vaccinothérapie d'urgence : trousse métallique contenant seringue, aiguilles et ampoules.

Prix : 26 francs.

Laboratoires FOURNIER Frères

7, rue Biscornet — PARIS.

VACCINS ATOXIQUES STABILISÉS

Stock-vaccins constitués par des émulsions de cultures traitées par le fluorure de sodium, injectables par la voie sous-cutanée ou intramusculaire; composition polyvalente.

Nomenclature et Indications :

Néo-Dmègon : Antigonococcique (voir p. 1048).

Néo-Dmesta : Antistaphylococcique.

Néo-Dmètys : Anticoquelucheux (voir p. 1048).

Aplexil : Préventif des complications pulmonaires de la Grippe et des Fièvres éruptives.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

VACCINS BACTÉRIENS I. O. D.

(Procédés RANQUE et SENEZ)

Prophylaxie — Vaccinothérapie.

VACCIN : Antityphoïdique.

— Antistaphylococcique.

— Polyvalents.

— Pneumo-streptococcique.

— Anticoquelucheux.

— Antigonococcique.

— Antistreptococcique.

— Anticolibacillaire.

— Antimélitococcique.

Injectables en injections sous-cutanées.

Vaccin-Pansements non injectables.

Pyophylaxines, Hémophylaxines, Entérophyloxiné.

Prix : 20 francs.

Dépositaires généraux :

Éts DEFFINS, 40, faubourg Poissonnière — PARIS.

LABORATOIRE de BIOLOGIE MÉDICALE

16, rue Dragon — MARSEILLE.

HAMELIN, 16 ter, rue Burdeau — ALGER.

AVIGNON et **HAYAT**, 9, rue Malta-Srira — TUNIS.

Pour littérature et échantillons :

16, rue Dragon — MARSEILLE.

VACCINS CLIN

Stocks-vaccins, lysés et détoxiqués, d'une concentration élevée en espèces microbiennes judicieusement choisies et fréquemment renouvelées.

Constitution constante, tolérance parfaite, conservation illimitée.

Formes : Vaccins injectables, en ampoules de 1 cc. de concentration microbienne.

Vaccin Clin antistaphylococcique.

Vaccin Clin antigonococcique. — N° 1 monomicrobien. — n° 2 polymicrobien, (gonocoques, staphylocoques, pseudo-diphtériques, friedlander, microcoques, entérocoques).

Vaccin Clin anticolibacillaire. — 3 concentrations. 1-2-3 milliards. (B. de Bordex. Gengou).

Pneumo-broncho-vaccin Clin. — *Adultes, Enfants.* (Pneumocoques, Friedlander, Pfeiffer, streptocoques, staphylocoques, entérocoques.

Coli-entéro-vaccin Clin. — Injectable, Buccal.

Vaccin Clin antistreptococcique.

Vaccin Clin pré-opératoire antipyrétique (streptocoques, staphylocoques, colibacilles, entérocoques, pyocyaniques).

PYOVARGOL

(Pommade colloïdo-vaccin Clin argentique antipyrétique)

Vaccin pour usage local, constitué par une émulsion microbienne (streptocoques, staphylocoques, microcoques, colibacilles, pyocyaniques) ayant fixé par absorption une certaine quantité de micelles argentiques.

L'action curative spécifique du vaccin se trouve renforcée par les colloïdes.

Indications. — Plaies infectées. suppurations localisées, furoncles, anthrax, abcès, panaris, pyodermites, dermatoses infectées.

Forme. — Tube de 35 grammes.

Laboratoires CLIN, COMAR et Cie.

20, rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS

VACCINS IVAGO

Procédé de Goldenberg.

(Injectables.)

Avantages. — La vaccinothérapie telle que la comprend Goldenberg est basée sur les acquisitions biologiques récentes du rôle de la peau dans la défense de l'organisme tout entier.

Ces vaccins, grâce à leur méthode spéciale de préparation, ne donnent *aucune réaction*. Ils sont injectés par gouttes (I à VI gouttes) *dans la peau*.

Nomenclature. — Vaccins « A » (antigrippal), « B » (antipyorrhéique), « D » (antistaphylococcique), « G » (antigonococcique), « M » (gynécologique), « P » (anti-pyogène), « R » (antiozéneux), « U » (anticolibacillaire)

VACCINS IVAGO BUVABLES

Ivago-Coll. — Pyélite, Pyélonéphrite, Cystite, Colibacillose.

Ivago-Sta. — Furunculose, Anthrax, Absès, Sycosis, Acné, etc.

Ivago-Pyo. Septicémie et toutes infections causées par les pyogènes communs.

Présentation. — En boîtes de 10 ampoules de 2 cc. chacune.

Posologie. — 2 ampoules par jour pour les adultes et 1 en deux fois pour les enfants. A prendre une heure avant les repas dans un demi-verre d'eau.

Prix : 25 francs.

GELÉES-VACCINS IVAGO PAR PANSEMENTS

Gelée-Vaccin Ivago « B ». — Infections bucco-dentaires Pyorrhée alvéolaire, absès, etc...

Gelée-Vaccin Ivago « D ». — Infections staphylococciques : Furunculose, Anthrax, Sycosis, Acné, etc...

Gelée-Vaccin Ivago « P ». — Infections causées par les pyogènes communs.

Gelée-Vaccin Ivago « M ». — Gynécologique : Métrites, Salpingites, Leucorrhées, etc...

Ovules-Vaccins Ivago. — Métrites, Salpingites, Leucorrhées, etc...

Pâte dentifrice immunisante bleue IVAGO. — Pyorrhée alvéolaire, gingivite, absès etc. Prix : Le grand tube : 7 fr. 50. Le petit tube : 4 fr. 90.

Laboratoires IVAGO

17, rue de Provence — PARIS (IX^e). — Tél. : Prov. 76-18.

L. BELIERES, Docteur en Pharmacie.

VACCINS-RONCHÈSE AMPHO-VACCINS

Lysat bactérien, ou filtrats de cultures, et bactéries entières.

Avantages. — L'association lysat microbien et microbes entiers détermine *rapidement* la formation d'antitoxines et provoque des phénomènes de défense contre l'infection (agglutination puis neutralisation de l'élément infectant), aboutissant à l'état d'immunité. Par leur double composition, les Ampho-Vaccins constituent un perfectionnement remarquable de la vaccinothérapie.

AMPHO-VACCINS INJECTABLES

Par cc. : lysat de 2 milliards de germes et 200 millions de germes entiers stérilisés et stabilisés.

Anti-infectieux. — *Staphylocoques, Streptocoques, Pneumocoques, Colibacilles, Entérocoques, Bacilles pyocyaniques.*

Toutes infections générales ou locales. Vaccin général des affections thermiques même avant le diagnostic précis. Vaccination pré-opératoire.

Antistaphylococcique. — *Staphylocoques.*

Furoncles, Anthrax, Ostéomyélites, Impétigo, Acné, Folliculites, Staphylococcémies.

Intestinal. — *Colibacilles, Entérocoques, Proteus, Bacillus bifidus, Bacilles pyocyaniques.*

Tous états intestinaux aigus ou chroniques.

Pulmonaire. — *Pneumocoques, Pneumobacilles, Streptocoques, Staphylocoques, Entérocoques, Micrococcus catarrhalis, Cocco-bacilles de Pfeiffer.*

Pneumonie, Broncho-pneumonie, Bronchites, Grippe, certains Asthmes, Sinusites, Otites, Conjonctivites.

Urinaire. — *Colibacilles, Entérocoques, Staphylocoques.*

Toutes infections de l'appareil urinaire.

Posologie :

| | | | |
|----------|---|-----------------------------------|-----------------------------|
| Adultes. | { | 1 ^{re} injection | 1/4 de cc. |
| | | 2 ^e — | 1/2 cc. |
| | | 3 ^e inject. et suiv... | 1 cc. |
| Enfants. | { | 1 ^{re} injection | 1/8 de cc. (II gttes) |
| | | 2 ^e — | 1/4 de cc. |
| | | 3 ^e inject. et suiv... | 1/3 ou 1/2 cc. selon l'âge. |

Injectons journalières pour les doses d'essai, tous les 2 ou 3 jours pour les suivantes. Injections sous-cutanées ou intramusculaires. L'injection intraveineuse est possible si elle est jugée nécessaire. Délivrés en boîtes de 6 ampoules de 1 cc. 5.

Prix : 25 francs.

AMPHO-VACCINS A INGÉRER

Par cc. : lysat de 1 milliard de germes et 1 milliard de germes entiers stérilisés et stabilisés.

Ampho-quintivaccin. — Bacilles de Bordet et Gengou et germes entrant dans la composition de l'ampho-vaccin pulmonaire à ingérer.

Traitement efficace de la coqueluche et de ses complications.

Anti-infectieux. — *Staphylocoques, Streptocoques, Pneumocoques, Colibacilles, Entérocoques, Bacilles pyocyaniques.*

Toutes infections générales ou locales, Dermatoses, Vaccination pré- ou post-opératoire.

Antistaphylococcique. — *Staphylocoques.*

Furoncles, Anthrax, Ostéomyélites, Impétigo, Acné, Folliculites, Staphylococcémies.

Antityphoïdique T. A. B. — *Bacilles d'Eberth, Bacilles para A et B, Colibacilles, Entérocoques, Proteus, Bacilles pyocyaniques.*

Agent curatif remarquable des infections typhiques et para-typhiques et, grâce à l'association microbienne étendue, des affections générales indéterminées d'origine intestinale.

Intestinal. — *Colibacilles, Entérocoques, Proteus, Bacillus bifidus, Bacilles pyocyaniques.*

Auto-intoxications d'origine intestinale, Entérites, Appendicites, Cholécystites, Syndrome entéro-rénal, certains Rhumatismes, Insuffisance hépatique, Préparation des malades avant les interventions abdominales, préparation aux Accouchements.

Pulmonaire. — *Pneumocoques, Pneumobacilles, Streptocoques, Staphylocoques, Entérocoques, Micrococcus catarrhalis, Cocco-bacilles de Pfeiffer, Bacilles pyocyaniques.*

Grippe, Bronchite, Pneumonie, Broncho-pneumonie, certains Asthmes, Sinusites, Otites, Conjonctivites

Urinaire. — *Colibacilles, Entérocoques, Staphylocoques.*

Toutes infections de l'appareil urinaire.

AMPHO-VACCINS A INGÉRER

Posologie habituelle :

Adultes et adolescents : 2 à 3 ampoules par jour, de préférence loin des repas.

Enfants : 1 à 2 ampoules par jour.

La posologie du *Vaccin intestinal* varie selon qu'il s'agit d'un cas aigu ou chronique ; elle est la suivante :

Cas aigus : 1 ampoule le matin à jeun, 1 le soir en se couchant, pour les *adultes* ; 1 ampoule par jour en 2 fois, pour les *enfants*.

Cas chroniques et auto-intoxications : Pour *adultes et enfants d'âge moyen* : 1 ampoule par jour le matin pendant 8 jours, puis 1 ampoule tous les 3 ou 4 jours.

Présentation :

L'Ampho-Vaccin à ingérer intestinal est délivré en boîtes de 8 ampoules de 5 cc.

Prix : 25 francs.

et en coffrets de 24 ampoules : 65 francs.

50 ampoules : 120 francs.

Les autres Ampho-Vaccins à ingérer sont présentés en boîtes de 10 ampoules de 2 cc.

Prix : 25 francs.

AMPHO-VACCINS PANSEMENTS

Filtrats de cultures additionnés par cent. cube de un milliard de germes entiers stérilisés et stabilisés.

Antipyogène. — *Staphylocoques, Streptocoques, Colibacilles, Entérocoques, Bacilles pyocyaniques.*

Furoncles, Anthrax, Abscess, Dermatoses infectieuses, Interventions abdominales, Curettages, Cancers du col.

Mode d'emploi. — Mettre sur la plaie une compresse imbibée de vaccin. Un à deux pansements par jour. *Pour les cavités* : Imbiber une mèche de vaccin-pansement et l'introduire dans la cavité à traiter.

Trois présentations :

Boîtes de 3 ampoules de 10 cc. Prix : 15 francs.

Coffrets de 12 ampoules de 10 cc. Prix : 40 francs.

Ampho-Vaccin antipyogène pour petits pansements en boîtes de 10 ampoules de 2 cc. Prix : 15 francs.

Rhino-pharyngien. — *Pneumocoques, Pneumobacilles, Entérocoques, Streptocoques, Micrococcus catarrhalis, Cocco-bacilles de Pfeiffer, Staphylocoques.*

Affections du nez, du pharynx, des oreilles, de la mastoïde, de la conjonctive. Traitement abortif du coryza. Rhino-prophylaxie de la grippe. Présenté en ampoules qui se transforment en appareil d'instillation par l'adjonction d'une tétine livrée avec les ampoules.

Posologie. — 3 à 4 instillations par jour, ou encore des pulvérisations dans la journée, et 2 instillations, 1 le matin, 1 le soir.

Délivré en boîtes de 6 ampoules de 2 cc. auto-instillables. Prix : 20 francs.
et coffrets de 20 ampoules. Prix : 45 francs

Ampho-Tablettes (Comprimés à base d'ampho-vaccin rhino-pharyngien). Voir page 282.

Pyo-Amphogel (Gelée molle à base d'Ampho-Vaccin pansement antipyogène). Voir page 1275.

Laboratoires des Ampho-Vaccins.

A.-D. RONCHESE, Docteur en pharmacie,

Laboratoires : 5, rue Rothschild — NICE.

Services Commerciaux : 7, rue Poncet — NICE

Dépot à PARIS : 62, rue Charlot.

VACCINS " STÉNÉ "

Vaccin antifuronculeux « Sténé ». — Traitement de la furonculose et des affections à staphylocoques. (En injections sous-cutanées, ampoules de 1 cc. — en comprimés.)

La boîte de 5 ampoules. Prix public : 20 francs.

La boîte de comprimés. Prix public : 12 francs.

Bouillon-vaccin antifuronculeux « Sténé », pour pansements.

La boîte de 5 ampoules. Prix public : 20 francs.

Vaccin anti-coryza « Sténé » polyvalent. — Traitement des Coryzas aigu et chronique, des pharyngites, angines, rhinites et de l'ozène.

Le tube. Prix public : 8 francs.

Ovules-Vaccin « Sténé ». — Métrites, Salpingo, ovarites, pertes blanches.

La boîte. Prix public : 18 francs.

Vaccin « opératoire » Sténé. — Préventif des complications infectieuses post-opératoires. En ampoules de 1 cc. pour injections sous-cutanées.

Bouillon-Vaccin « opératoire » Sténé. — Pour pansements.

Vaccin antipyrogène Sténé. — Pour le traitement des plaies. Préventif et curatif de l'infection des plaies de toutes natures.

En ampoules de 1 cc. pour injections sous-cutanées.

En Bouillon-Vaccin pour pansements.

Vaccin Antistaphylococcolique « Sténé »

Bouillon-Vaccin Antistaphylococcolique « Sténé ».

En ampoules de 1 cc. pour injections sous-cutanées.

En bouillon-vaccin pour pansements.

Produits « STÉNÉ »

2, place des Vosges — PARIS (IV^e).

Téléph. : Archives 46-47. Adr. télégr. ; Sténé 21 Paris.

VACCINS « VIRULTRA »

VACCINS-INJECTABLES

Sans chocs. Sans réactions. Voie sous-cutanée.

- 1° **Anti-pyogène chirurgical.** — Pré et post-opératoire.
Prix de 6 ampoules 2 cc. — Prix public : 30 francs.
- 2° **Anti-pyogène général.** — Furonculose, Plaies, affections cutanées.
Toutes septicémies.
Boîtes de 6 ampoules 2 cc. — Prix public : 30 francs.
Boîtes de 3 ampoules 2 cc. — Prix public : 18 francs.
- 3° **Broncho-vaccin.** — Grippe. Broncho-pneumonies, toutes affections.
broncho-pulmonaires.
Boîtes de 6 ampoules 2 cc. — Prix public : 30 francs.
Boîtes de 3 ampoules 2 cc. — Prix public : 18 francs.
- 4° **Gynécologique.** — Métrites, Salpingites, Fièvre puerpérale, etc.
Boîtes de 6 ampoules 2 cc. — Prix public : 30 francs.
- 5° **Oto-rhino-laryngologique.** — Rhinites, Sinusites, Otites, Mastoïdites et toutes affections de l'appareil O. R. L.
Boîtes de 6 ampoules 2 cc. — Prix public : 30 francs.
- 6° **Uro-vaccin.** — Toutes affections gonococciques.
Boîtes de 6 ampoules 2 cc. — Prix public : 30 francs.

VACCINS-PANSEMENTS

Par contact. Indolores. Atoxiques. Polyvalents.

- 1° **Anti-pyogène chirurgical.** — Pré et post-opératoire. Préparation du champ opératoire.
Boîtes de 3 ampoules 20 cc. Prix public : 30 francs.
- 2° **Anti-pyogène général.** — Plaies, Affections cutanées, Furoncles, Brûlures, Phlegmons, Panaris, Eczémas, etc.
Boîtes de 6 ampoules 10 cc. — Prix public : 30 francs.
Boîtes de 3 ampoules 10 cc. — Prix public : 20 francs.
- 3° **Gynécologique.** — Métrites, Salpingites, Fièvre puerpérale, etc.
Boîtes de 6 ampoules 20 cc. — Prix public : 40 francs.
Boîtes de 3 ampoules 20 cc. — Prix public : 30 francs.
- 4° **Ophthalmologique.** — Ophtalmie purulente du nouveau-né et toutes affections oculaires suppurées.
Boîtes de 12 ampoules 2 cc. — Prix public : 30 francs.
Boîtes de 6 ampoules 2 cc. — Prix public : 20 francs.
- 5° **Oto-rhino-laryngologique.** — Coryzas, Laryngites, Mastoïdites, Otites, Rhinites, Rhumes des foins, Sinusites, etc.
Boîtes de 6 ampoules 5 cc. — Prix public : 28 francs.
Boîtes de 6 ampoules 2 cc. — Prix public : 20 francs.
- 6° **Uro-vaccin.** — Toutes affections de l'appareil génital de l'homme et de la femme dues au gonocoque.
H pour hommes. Boîtes de 10 ampoules 5 cc. — Prix public : 30 francs.
F pour femmes. Boîtes de 10 ampoules 10 cc. — Prix public : 40 francs.
- 7° **Ultrouvules.** — Pour pansement de l'appareil génital féminin pour toutes affections microbiennes.
Boîtes 6 ultrouvules. — Prix public : 25 francs.

G. TAUPIN, Pharmacien de 1^{re} classe.

Dépôt général pour la France : O. C. P.

Laboratoires « VIRULTRA »

LAUNAY-SERQUIGNY (Eure).

Tél. : 19 à Serquigny.

VACCIPHAGES

Association d'un Vaccin et d'un bactériophage.

Présentation. — 12 ampoules pour injections sous-cutanées, 4 de bactériophage, 8 de vaccin, à employer en se conformant strictement aux indications contenues dans chaque boîte.

Avantages. — Les résultats obtenus avec l'association d'un vaccin bactériophage et d'un vaccin se sont montrés de beaucoup supérieurs à ceux observés en employant séparément l'une ou l'autre de ces thérapeutiques. En outre, leur mode de fabrication fait que les vaccins des VACCIPHAGES sont égaux aux auto-vaccins.

I. VACCIPHAGE anticolibacillaire.

Indications : Infections à colibacilles : Pyélites, Pyélonéphrites, Cystites, Colibacilluries, Syndrome entéro-rénal, etc...

II. VACCIPHAGE anti-staphylococcique.

Indications : Toutes les infections staphylococciques : furoncles, anthrax, abcès, sycosis, orgelet, panaris, ostéomyélite, suppurations, septicémies, etc...

Prix : 40 francs la boîte de l'un ou l'autre VACCIPHAGE.

Laboratoires DOUETTEAU Frères

20, faubourg Saint-Honoré — PARIS (VIII^e).

VACLYDUN

Lysats vaccins du Docteur Louis Duchon.

Adoptés par les Hôpitaux de Paris.

Le Vaclydun est un vaccin d'un type entièrement nouveau. Il est obtenu par un procédé exclusivement biologique. Utilisation des propriétés du bacille pyocyanique qui lyse les germes, neutralise leurs toxines (en particulier, la toxine diphtérique), ce qui permet sa stérilisation par filtration sur bougie serrée. Il est donc un « vaccin vivant ».

Voir : Broncho-Vaclydun ; Coli-Vaclydun ; Entéro-Vaclydun ; Gynéco-Vaclydun ; Gono-Vaclydun ; Pyo-Vaclydun ; Rhino, Staphylo et Strepto-Vaclydun.

VACLYDERM

Composition. — Le Vaclyderm est le Pyo-Vaclydun incorporé à un corps gras.

Indications. — Réalise une vaccinothérapie cutanée locale. Toutes les Dermites, Furonculose, Anthrax, Impétigo, Folliculites, Erysipèle, etc.

Mode d'emploi. — En applications locales, 2 à 3 fois par jour. Peut être associé à la vaccination profonde.

Le tube : 18 francs.

Laboratoires CORBIERE

27, rue Desrenaudes — PARIS

Tél. : Carnot 78-11. — Télégr. : Pantuto 74 Paris.

VAGORIANE

Troubles du Vago-Sympathique à prédominance Vagale,

Formule :

| | | | |
|----------------------------|-------|---------------------------|--------|
| Lobe antérieur d'hypo- | | Extrait de Crataegus..... | 0,01 |
| physe | 0,01 | — Valériane..... | 0,015 |
| Camphre monobromé ... | 0,05 | — Boldo..... | 0,015 |
| Diéthylmalonylurée | 0,05 | — Guarana | 0,015 |
| Chlorure de Magnésium.. | 0,05 | — Jusquiame ... | 0,0075 |
| Extrait de Passiflore..... | 0,025 | — Marron d'Inde. | 0,005 |
| — Ballote..... | 0,01 | — Belladone | 0,005 |
| — Combretum .. | 0,01 | | |

Par comprimé dragéifié.

Indications. — VAGOTONIE, dépression, vertiges, anxiété, insomnies ou mauvais sommeil, torpeur et inquiétude, désordres psychiques frustes, douleurs erratiques variées, céphalées frontales et occipitales, état nauséux, auto-intoxication, spasmes, anabolisme, perturbations circulatoires, désordres mensuels chez la femme et dysgénésie chez l'homme.

Posologie. — 4 comprimés en moyenne, 8 au plus par jour.

Prix : 16 fr. 50.

Pour les Sympathicotoniques, voir : SYMPATHORIANE.

Enregistré Laboratoire Contrôle des Médicaments sous le n° 988-2.

Laboratoire FOSSET

21, Grande Rue — MONTFERMEIL (Seine-et-Oise).

VAGOSEDYL

Sédatif du vague.

| | |
|---|-------------------|
| Phényléthyl-Malonylurée | } aa 0 gr. 017 |
| Extrait de Jusquiame titré en alcaloïdes.... | |
| Extrait de Valériane fraîche et stabilisée | |
| Oxyde de zinc préparé par voie humide | |

VAGOSEDYL réalise une formule de Méglin améliorée.

Doses moyennes. — 2 à 4 comprimés par jour.

Indications principales. — Hypervagotonie, Spasmodophilie, Algies et Spasmes viscéraux, Entéronévroses, Gastronévroses, Aérophagie, Mal de Mer, Troubles réflexes des ptoses, Malaises en rapport avec la Menstruation, la Grossesse, la Ménopause, Symptômes subjectifs du Cœur, Artériospasme, Dyspnées spasmodiques, Angoisses, Nervosisme, Mélancolie anxieuse, Neurasthénie, Excitation psychique, Troubles du Sommeil.

Prix du flacon : 16 francs.

Laboratoire du VAGOSEDYL

20 et 22 rue des Martyrs — PARIS (IX°).

G. COUSSINET, Pharmacien.

Licencié ès Sciences.

VAGOSTABYL

Monin

A base de Marjolaine.

Comptes rendus Société de Biologie, tome CXV-3.
Stabilise le Vague. Equilibre le Sympathique.

NI toxique. NI barbiturique.

Formule :

| | |
|--|-----------|
| Oléo-saccharure de Marjolaine au 20 ^e | 0 gr. 10 |
| Lactate de Calcium | 0 gr. 10 |
| Cimicifugine..... | 0 gr. 005 |
| Hyposulfite de sodium..... | 0 gr. 01 |

Médicament héroïque des Insomnies, Céphalées,
Troubles dits nerveux, Douleurs sinusales, même
rebelles aux autres traitements.

Posologie. — 2 à 12 dragées par jour et par doses
croissantes.

Commencer par 2 dragées ; formes gchroniques.
Commencer par 4 dragées ; formes aiuës.

Laboratoires MONIN

49, rue de Maubeuge — PARIS (IX^e).

VAGOTONINE

(Hormone du parasymphathique.)

Composition. — Hormone pancréatique différente de l'insuline. Essen-
tiellement régulatrice du système organo-végétatif.

Indications. — *Hypertension artérielle* : la baisse de tension se manifeste
1/2 heure à 2 heures après l'injection, s'accentue pendant 6 à 12 heures,
se prolonge 24 et même 48 heures et n'est jamais suivie d'hypertension
réactionnelle. — *Diabète* : la VAGOTONINE permet la diminution
des injections d'insuline et l'enrichissement du régime en hydrates de
carbone. La VAGOTONINE est indiquée également dans l'hyper-
sympathicotomie, etc...

Posologie moyenne. — Une ampoule par jour, séries de 15 à 20 inec-
tions sous-cutanées.

Deux présentations. — Boîtes de 5 ampoules à 0 gr. 02 et boîtes de
1 ampoule-test à 0,02 pour essayer le traitement chez les hyperten-
dus. Tous les hypertendus ne réagissent pas, en effet, à la Vagotonine,
mais, quand ils en sont justiciables, la baisse de tension se manifeste
dès la première injection.

Prix :

La boîte de 1 ampoule : 10 francs.

La boîte de 5 ampoules : 50 francs.

Les Établissements BYLA

26, avenue de l'Observatoire — PARIS.

VALBORNINE ROGIER

(Iso-Valérianate de Bornyle Bromé.)

Perles. — 3 à 6 par jour avant les repas ;
ou, pour l'insomnie, 2 perles le soir, deux
heures après un léger repas.

Propriétés. — Antispasmodique énergique
et puissant sédatif du système nerveux,
régulateur de la circulation et de la respi-
ration.

N. B. — La Valbornine n'est pas un sopori-
fique. Le sommeil n'est régularisé qu'au
bout de quelques jours par sédation du
système nerveux.

Le flacon : 10 fr.

Henry ROGIER

Docteur en pharmacie

56, boulevard Péreire. — PARIS

VALBROL

Essai de rajeunissement de la Formule de Meglin.

Composition :

| | |
|---|-------|
| Extrait alcoolique de valériane <i>stabilisée</i> | 0 04 |
| Extrait alcoolique de jusquiame..... | 0 005 |
| Extrait de datura..... | 0 005 |
| Extrait alcoolique de passiflore..... | 0 03 |
| K Br | 0 05 |
| Extrait alcoolique de cratœgus | 0 03 |

pour une dragée de 0 gr. 16.

40 dragées par étui — Prix en France : 12 fr.

Propriétés : Activité due à la valériane stabilisée et à l'association jus-
quiame-passiflore, beaucoup moins toxique que la jusquiame employée
seule, aux doses thérapeutiques (H. Leclerc). Le cratœgus agit syner-
giquement.

Indications. — Etats nerveux : angoisse, mélancolie, anxiété. Insom-
nie, quelle qu'en soit l'origine : surmenage, éthylisme, affections car-
diaques ou vasculaires, digestives, génitales.

Posologie : Etats nerveux : 1 à 2 dragées par jour.

Insomnie : 1 à 3 dragées le soir au coucher.

A avaler sans croquer avec une boisson chaude.

Laboratoires MAYOLY-SPINDLER

1, place Victor-Hugo — PARIS (XVI^e).

A Bruxelles : LE MARINEL, pharm., 4, avenue Orban Van Volxem.

VALEDYL

Propriétés thérapeutiques. — Traitement phytothérapique des névropathes, cardiopathes.

Indications. — Insomnies, vertiges, neurasthénie, états spasmodiques, états névropathiques, troubles cardiaques.

Formule. — Extraits stabilisés de valériane, de Passiflore, de cratægus, acide diacétylbarbiturique sodique, alcoolature de ballote, teinture de gelsénium.

Forme. — Le Valedyl est présenté sous forme de liquide sirupeux sans aucune odeur.

Mode d'emploi. — En cas de troubles nerveux ou cardiaques, 1 cuillerée à café avant les 3 repas. En cas d'insomnie, 1 à 4 cuillerées à café le soir au coucher.

Prix : 16 francs.

Laboratoire HOCQUETTE

191, rue du Faubourg-Saint-Antoine — PARIS.

Téléphone : Diderot 04-71.

VALENAL NOVALIS

Composition. — Valériane extr. 0,045 ; Cratægus extrait, 0,015 ; Saule blanc extr., 0,015 ; Passiflore extrait, 0,016 ; Hamamélis extrait, 0,01 ; Gardénal, 0,005 pour une dragée.

Produit joignant à toute une série d'extraits végétaux l'action antispasmodique et hypotensive du gardénal à petite dose ; ce n'est pas une révolution, mais une association logique bien dosée, active et sans danger.

Indications. — Déséquilibre du sympathique, Insomnies, Agitations nerveuses, Etat nerveux de la ménopause, Hypertension (surtout spasmodique), etc..

Dose. — De 1 à 4 dragées par jour. Cette dose peut être largement dépassée.

Prix : 15 francs.

Concessionnaires : Les Laboratoires NOVALIS
OULLINS (Rhône).

VALÉRIANATE GRIGNON

à odeur dissimulée.

Composition. — Contient tous les principes actifs de la plante fraîche.

Forme. — Liquide de goût agréable, l'odeur de valériane étant absolument masquée.

Propriétés thérapeutiques. — Antinerveux, antispasmodique.

Dose et mode d'emploi. — 2 à 3 cuillerées à café par jour.

Prix : 10 francs.

Pharmacie GRIGNON

2, rue Duphot — PARIS.

VALÉRIANATE PIERLOT

Liquide ou en capsules.

RÊTÉ TOUJOURS ET MALGRÉ TOUT

l'unique préparation efficace et inoffensive, résumant tous les principes sédatifs et névrosthéniques de la valériane officinale.

Neurotrope, actif, sédatif, inoffensif, il rétablit toujours l'équilibre du système nerveux en supprimant l'excitabilité morbide des neurones.

Posologie :

1 à 2 cuillerées à café dans un peu d'eau sucrée ou non, le soir avant de se coucher et le matin à jeun.

Prix : 16 francs.

H. RIVIER

Pharmacien de 1^{re} classe

26 et 28, rue Saint-Claude — PARIS.

Tél. : Archives 01-01.

VALÉRIANE BYLA

(Sédatif régulateur du système nerveux.)

Renferme tout le suc inaltérable de la *plante fraîche et vivante, stabilisé* et concentré. Ne contient ni acide valérianique libre, ni ammoniacque combinée.

Propriétés thérapeutiques. — Stimulant des centres nerveux supérieurs affaiblis, dépresseur de l'excitabilité réflexe exagérée. Anti-épileptique, antispasmodique, analgésique, hypnotique.

Indications. — Névroses, hystéries, épilepsie, insomnies nerveuses, névralgies, neurasthénie, troubles de la ménopause, convulsions des enfants, palpitations, tachycardie, etc.

Mode d'emploi. — 3 cuillerées à café par jour.

Prix : 16 francs.

Les Établissements BYLA

26, avenue de l'Observatoire — PARIS.

VALÉRIANE GMET

Composition. — Extrait total obtenu exclusivement à l'aide de racines de valériane sans adjonction d'acide valérianique ou d'autres produits de synthèse. Sans alcool.

Propriétés. — Puissant toni-sédatif du système nerveux central et périphérique.

Odeur conservée (indice de son activité), mais *goût peu prononcé*. Bien acceptée par les femmes et les enfants.

Indications. — Tous les états d'excitation et de dépression nerveuse. Névroses, Insomnie, Épilepsie. Chorée, Nervosisme, Convulsions, Terreurs nocturnes, Cauchemars. Dans la neurasthénie, lui adjoindre le *Composé Gmet*. (Voir page 531).

Posologie. — 1 à 2 cuillerées à café avant les repas.

Prix : 18 francs.

Laboratoire GMET

27, faubourg Montmartre — PARIS (IX^e).

VALÉRIANE PACHAUT

Préparation liquide contenant les principes actifs de la valériane fraîche sans addition d'aucun hypnotique ou stupéfiant.

Indications. — Névroses, états spasmodiques, insomnies.

Posologie. — 1 à 4 cuillerées à café par jour.

La Valériane liquide PACHAUT est inodore et d'une saveur agréable.

Prix : 14 francs.

Laboratoires PACHAUT

130, Bd Haussmann — PARIS.

Téléph. : Laborde 16-72

VALÉRIANOSE GIGON

Composition. — Extrait de valériane fraîche stabilisée et pepsine.

Forme. — Pilules glutinisées.

Indications thérapeutiques. — Sédatif du système nerveux, Antispasmodique, Antinévralgique.

Mode d'emploi et doses. — 4 à 6 pilules par jour. Solubilité dans l'intestin.

PEPTO-VALÉRIANE

Solution sans odeur d'extrait de valériane fraîche stabilisée et pepsine.

De 2 à 4 cuillerées à café par 24 heures.

Laboratoire des Produits du Dr GIGON

A. FABRE, pharmacien

25, boulevard Beaumarchais — PARIS (IV^e).

VALÉRINODOR MALMANCHE

Composition. — Préparation liquide sirupeuse contenant par cuillerée à café : 0 gr. 05 d'extrait sec de Valériane stabilisée, 0 gr. 50 d'extrait fluide de Passiflora incarnata, 0 gr. 15 de Véronal sodique.

Propriétés thérapeutiques. — Puissant sédatif du système nerveux central. Tolérance parfaite. Sommeil calme sans nausées au réveil.

Indications. — Insomnies, Palpitations, Spasmes musculaires, Excitation psychique, Angoisse, Chorée, Convulsions, Toux nerveuse.

Posologie. — 2 à 3 cuillerées à café par jour, pur ou dans une infusion de tilleul.

Prix au public : 14 francs.

Laboratoire MALMANCHE

Pharmacien, Docteur ès sciences

101, avenue Paul-Doumer.

RUEIL-MALMAISON (Seine-et-Oise).

VALÉRIUM PAUL THIBAUT

Dragées de Valérianate de Cérium, sans odeur, de P. Thibault, licencié ès sciences physiques, ancien président de la Société de pharmacie de Paris. Le meilleur sédatif régulateur du système nerveux. Action particulièrement élective sur le grand sympathique.

Indications. — Troubles gastriques d'origine névropathique, Dyspepsies nerveuses, Vomissements chroniques, Vomissements incoercibles de la Grossesse, Insomnies, Névralgies, Neurasthénie, Mal de Mer, Hoquet.

Posologie. — Prescrire 2 dragées le matin et 2 dragées dans le milieu de la journée. Dans les affections chroniques, prescrire, si possible, 2 dragées 2 à 3 heures avant les troubles. Continuer le traitement 10 à 12 jours. Cesser 2 à 3 jours et reprendre.

Les dragées de Valérium P. Thibault sont dosées à 0,05 de principe actif.

Prix : 15 francs.


Établissements SOUDAN

48, rue d'Alsia — PARIS (XIV^e)

Enregistré au Laboratoire National n° 128-10.

VALÉROBROMINE LEGRAND

Composition. — Éthers-Sels de l'Acide α Bromovalérianique



Avantages. — La VALÉROBROMINE LEGRAND (*brome organique*) offre, par rapport aux bromures (*brome minéral*), des avantages de même ordre que les Cacodylates et les Glycérophosphates (*arsenic et phosphore organiques*), par rapport aux arseniates et aux phosphates (*arsenic et phosphore minéraux*). Elle possède, contrairement au valérianate d'ammoniaque, une régularité d'action constante, et sa toxicité, quatre fois moindre que celle de ce produit, est nulle aux doses usitées. Effets plus nets et plus durables que les bromures et les valériانات, sans avoir à redouter, quelles que soient la durée du traitement et les doses employées, les inconvénients trop connus de ces produits.

Indications. — Toutes les névroses : Épilepsie, Insomnies nerveuses, Hystérie, Migraines, Vertiges, Coqueluche, Neurasthénie, Troubles mentaux de la ménopause, etc.

Formes. — *Liquide* : 0,50 de bromovalérianate de soude par cuillerée à café, 2 à 6 cuillerées à café par jour. — *Capsules* : 0,25 de bromovalérianate de magnésie par capsule enrobée de gluten, *ne se dissolvant que dans l'intestin*. 4 à 12 capsules par jour.

Ce produit peut être prescrit aux bénéficiaires des Assurances sociales.

Prix : 18 francs.

DARRASSE

13, rue Pavée — PARIS (IV^e).

VALÉROMENTHOL

Préparation à base de *suc frais de valériane*
combiné à l'éther mentholique
de l'acide valérianique.

Propriétés thérapeutiques. — Tous les avantages des bromures sans aucun de leurs inconvénients. Calmant par excellence. Antispasmodique sûr. Antidote de la douleur, des troubles nerveux et des états pathologiques de la neurasthénie.

Indications thérapeutiques. — Neurasthénie, Hystérie, Insomnie, toutes affections nerveuses.

Mode d'emploi. — 3 à 5 cuillerées à café par jour dans un peu d'eau ou d'infusion.

Prix au public : 14 francs.

Laboratoire du VALÉROMENTHOL

10, rue Poncelet — PARIS.

Tél. : Wagram 37-58.

VALÉRONAL

Solution ou comprimés.

Sédatif puissant et inoffensif
des troubles nerveux, Psychopathies.

Hypnotique doux sans odeur.

Antispasmodique.

Par cuillerée à café ou par comprimé.

Véronal sodique très pur..... 0 gr. 15

Extrait physiologique de Valériane fraîche
par plasmolyse 5 cc.

Dose sédativ. — 1 cuillerée à café ou 1 comprimé
2 à 3 fois par jour.

Dose hypnotique. — 1 cuillerée à café ou 1 comprimé avant le dernier repas et 2 ou 3 au coucher dans infusion.

Pas de contre-indication.

Prix : Solution : 16 francs.

Comprimés : 16 francs.

Peut être prescrit aux Assurés Sociaux.

Laboratoire BERGER

14, rue des Pyramides — PARIS.

VALÉROTHÉINE

Principes actifs. — Valérianates de
Caféine et de Théobromine.

Indications. — Toutes dyspnées,
Asthme, Emphysème, Toux, Bron-
chites chroniques, Affections car-
diaques, Insomnies, Névralgies, Règles
douloureuses.

Présentation. — Capsules.

Doses médicamenteuses. — 2 à 6 par
jour, par deux à la fois de préférence,
matin ou soir ou matin et soir.

La boîte de 30 capsules : 18 francs.

Laboratoires DOMERGUE

AGEN (Lot-et-Garonne).

VAL'OVARINE FARMA

Déficiences ovariennes, Névroses, Etats spasmodiques, Malaises.

Composition. — Association pluriglandulaire d'*ovaire intégral* et d'une infime proportion de *thyroïdine* avec l'extrait physiologique, déchlorophyllé, dégraissé et concentré de *valériane fraîche stabilisée*.

Pour un cachet : Ovarine intégrale 175 milligrammes.
 Thyroïdine..... 5 —
 Extrait de valériane fraîche... 150 —

Avantages. — **Cachets** roses très petits. — Odeur agréable. — **Conservation garantie par procédé spécial.** — Présentation soignée. — Tolérance parfaite. — Assimilation facile.

Les composants opothérapiques, obtenus d'après une technique tout à fait nouvelle rendent leur efficacité thérapeutique maximum ; l'extrait ovarien contient absolument toutes les hormones. *La rapidité d'extraction de ces produits permet en outre d'affirmer qu'aucune fermentation n'a été possible au cours de leur fabrication. Les ovaires en particulier sont garantis de premier choix et prélevés sur des animaux jeunes.*

L'extrait physiologique de valériane préparé par une méthode brevetée très récente est désormais le médicament valérianique le plus actif.

PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES. — Insuffisances ovariennes
 Nervosisme.

Hypotenseur. — Modérateur de l'excitabilité réflexe. — Antispasmodique et sédatif du système nerveux central. — Analgésique. — Hypnotique.

Rendement maximum de l'action névrosthénique de la **valériane**.

INDICATIONS. — Infantilisme génital. — Troubles de la croissance. — Menstrues rares, peu abondantes, douloureuses. — Coliques utérines. — Troubles de la grossesse, de la sécrétion lactée. — Castration ovarienne. — Obésité glandulaire.

Tous états accompagnés de troubles nerveux. — Inquiétude de la Puberté. — Troubles divers de la Ménopause. — Chorée. — Cauchemars. — Neurasthénie. — Etats hystériques. — Insomnies nerveuses. — Epilepsie menstruelle. — Palpitations. — Tachycardie.

POSOLOGIE. — Sauf indication spéciale du médecin traitant, la cure moyenne de VAL'OVARINE doit être faite chaque mois à raison d'une boîte de cachets à prendre au cours des dix jours qui précèdent les règles. (Un au milieu de chaque grand repas, soit deux par jour.) Reprendre alors la VAL'OVARINE pendant une nouvelle période de dix jours et ainsi de suite. (*Traitement à suivre également en cas d'obésité.*)

Pour obtenir un effet certain et durable, on continuera ce traitement pendant 3 à 4 mois consécutifs.

Les femmes ayant subi l'ablation des ovaires ou qui ont passé l'âge critique choisiront de préférence pour suivre un traitement de dix jours de VAL'OVARINE une période où elles constatent soit du nervosisme, soit de l'insomnie, soit une sensation de pesanteur.

Prix : 20 francs.

Laboratoire des Spécialités FARMA
VAL'OVARINE

64, rue d'Orsel — PARIS (XVIII^e). — Tél. Nord 00-09.

O. C. P. — C. N. P. F. et toutes les Pharmacies.

VALOVOSAN

Régulateur de la fonction ovarienne
et sédatif nervin.

Composition. — Un comprimé = 40 unités-souris internationales d'hormone sexuelle femelle, 0 gr. 40 de poudre d'ovaires frais, 0 gr. 15 de bromisovalérylurée.

Indications. — Troubles psychiques de la puberté et de la ménopause, psycho-névroses génitales féminines, frigidité, dysménorrhées, aménorrhées accidentelles, troubles nerveux sous la dépendance de l'hypo-ovarie, vomissements de la grossesse.

Posologie. — 1 à 2 comprimés 3 fois par jour.

Présentation et prix. — Flacon de 40 comprimés dragéifiés : 19 fr. 50.

Laboratoires R. L. MATHIVAT

66, rue de la Pompe — PARIS (XVI^e).

Tél. : Trocadéro 32-91.

VALTHÈNE

(Gouttes)

Antispasmodique puissant.

Indications. — Toux laryngées, coqueluche, asthme, toux rebelles des tuberculeux.

Composition. — Alcoolature d'Alium Cepa, Teinture de Drosera, Teinture de Cochenille.

Ne contient aucun toxique. Goût agréable.

Posologie. — *Doses moyennes* à prendre dans une petite quantité d'eau sucrée et à répéter 4 à 5 fois par jour.

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Enfants au-dessous d'un an... | V à X gouttes. |
| — de 1 an à 5 ans | X à XX — |
| — au dessus de 5 ans.... | XX à XL — |
| Adultes | L à LX — |

Flacon de 30 cc. Prix : 11 fr. 50 (exempt d'impôt).

Laboratoire de la VALTHÈNE

A. VALAT

166, rue de la Roquette — Paris (XI).

Tél. : Roquette. 25-47.

VANADARSINE GUILLAUMIN

GOUTTES

Composition. — Solution d'arséniate de Vanadium au centième.

Propriétés. — Puissant stimulant de l'appétit, sans aucune action néfaste sur l'estomac et les intestins. Augmente le taux de l'hémoglobine, le poids et les forces. Sous son influence le teint redevient frais.

Indications. — S'emploie avec succès dans la pré-tuberculose et la tuberculose, la chorée, le rachitisme des enfants, les états anémiques, chlorotiques, dans la neurasthénie, les dépressions nerveuses, le surmenage, le paludisme, les leucémies et les convalescences.

Mode d'emploi. — La *Vanadarsine* s'administre aux mêmes doses que la liqueur de Fowler: dose moyenne, X gouttes dans un peu d'eau avant les 2 principaux repas.

Prix : 12 francs.

VANADARSINE GUILLAUMIN

AMPOULES

(Sérum Vanadarsiné.)

Composition. — Ampoules contenant 0 gr. 002 arséniate de vanadium par cent. cube..

Propriétés. — Solution très stable, indolore, parfaitement tolérée en injections hypodermiques. Reconstituant globulaire sanguin de premier ordre, oxydant énergique, excite l'appétit, augmente le poids et les forces et stimule les combustions organiques.

Indications. — Chlorose, anémie, pré-tuberculose, tuberculose, chorée, rachitisme, paludisme, syphilis, asthénic, leucémies, neurasthénie, surmenage, convalescence, anorexie.

Mode d'emploi. — *Adultes* : Injecter 1 à 3 cent. cubes par jour ou tous les deux jours.

Enfants : Injecter selon l'âge.

Faire une vingtaine d'injections. Après 8 à 10 jours de repos recommencer le traitement si nécessaire.

Se prescrit en ampoules de 1 cc. (prix 15 fr.), et de 3 cc. (dose forte) (prix 20 fr.).

Laboratoires ANDRÉ GUILLAUMIN

13, rue du Cherche-Midi — PARIS.

VANUCLÉOL LACROIX

Soluté leucosthénique.

Composition. — Nucléophosphate de Vanadium strychnarsiné.

Propriétés. — Oxydant par le Vanadium. Leucosthénique par les Nucléines. Tonique par l'arsénostrychnine.

Indications. — Neurasthénie, Athénie, Surmenages, suite de grippe, Convalescences, Anémies.

Formes pharmaceutiques. — 1° *Ampoules indolo-*res de 2 cc. en boîtes de 12. Trois séries d'injections avec repos intercalaire de huit jours.

La boîte de 12 ampoules de 2 cc. : 18 fr.

2° *Gouttes* : X à XX gouttes au milieu des deux principaux repas.

Le flacon de gouttes : 12 francs.

Peut être prescrit aux Assurances sociales.

Echantillon sur demande.

Laboratoires LACROIX

V. MEROBIAN et Fils, Successeurs

37, rue Pajol — PARIS (XVIII^e).

VARILAXINE

Groupe cinq laxatifs différents : Rhubarbe, Cascara, Podophyllin, Rhamnus, Tamarin, mais d'action équivalente.

Chaque boîte renferme 5 tubes, numérotés de 1 à 5.

Doses et mode d'emploi. — Avaler, sans les croquer, deux Comprimés avant le repas du soir, en alternant du n° 1 au n° 5, pour reprendre au n° 1 le sixième jour, et continuer la variation.

Propriétés thérapeutiques. — Action laxative toujours identique. — Jamais d'accoutumance ni d'irritation. — Tolérance parfaite. — Innocuité absolue.

Prix : 10 francs la boîte.

Laboratoire de la VARILAXINE
SURGÈRES (Charente-Inférieure).

VARIPHILE

Forme. — Pilules dragéifiées.

Composition. — Extrait de cupressus, 0,04 ; Extrait d'Hamamélis, 0,04 ; Extrait d'oesculus, 0,04 ; Poudre d'ovaire, 0,004 ; Poudre de surrénale, 0,004 ; Poudre de thyroïde, 0,004 pour une pilule.

Propriétés pharmacodynamiques. — Tonifie les vaisseaux, fluidifie le sang et active la circulation générale par une association médicamenteuse synergique d'extraits de glandes endocrines et d'extraits de plantes aux propriétés vaso-constrictives et hémostatiques.

Indications. — **Affections veineuses** (varices, hémorroïdes, varicocèle, phlébites).

Troubles circulatoires (accidents de la puberté et de la ménopause).

Mode d'emploi. — 2 pilules à chacun des 2 principaux repas pendant 3 à 4 semaines, arrêter une semaine et reprendre ainsi de suite.

Prix : 15 francs la boîte.

Laboratoire de L'UROFLUX

21, rue Feydeau — PARIS (II^e).

VARISCLÉRINE

(Ampoules)

**préparées selon les indications du
Professeur Sicard**

**Injectons sclérosantes intravariqueuses,
sans accidents, sans succès.**

Varisclérine A: Salicyl de soude.

Varisclérine B: Quinine.

Prix de la boîte de 12 : 30 fr.

Prix spéciaux au corps médical.

Laboratoire Angelini

61, rue de Seine — PARIS.

Tél. : Danton 92-73.

VASCUROL

(Dragées)

Traitement de l'hypertension et des troubles de la ménopause.

Composition. — Gui, cratægus, formine iodée, scille, pyrole, extraits laxatifs et opothérapiques.

Indications. — Hypertension, Presclérose et Artério-sclérose. Troubles de la ménopause. Varices. Hémorroïdes. Obésité.

Mode d'emploi. — 2 dragées au début de chacun des deux principaux repas.

Prix : 20 francs.

Laboratoire P. GUÉRIN

MEULAN (Seine-et-Oise).

VASOLAXINE

Huile de vaseline pure.

Dose :

Adultes : 1 cuillerée à soupe en se levant à jeun et le soir en se couchant.

Enfants : 1 cuillerée à café.

Aromatiser, si jugé nécessaire, avec menthe, citron, cognac, etc.

Indications :

Constipation, Entérites. Appendicites chroniques, Hémorroïdes.

Le flacon : 12 francs.

Laboratoires FOURNIER Frères

7, rue Biscornet — PARIS (XII^e).

VASO-NEURINE

Extrait de Jaborandi et Chlorure de magnésium.
Forme. — Gouttes.

Indications thérapeutiques.

Troubles circulatoires : Troubles des règles et Méno-
 pause, Congestions broncho-pulmonaires, Hémop-
 tysies, Vertiges, Bourdonnements d'oreilles.

Troubles glandulaires : Congestion thyroïdienne,
 ovarienne, pancréatique ; Troubles sécrétoires,
 salivaires et cutanés. Sécrétion lactée.

Troubles sensitivo-moteurs : Arythmie, Tachycardie,
 Névralgisme facial, Névro-dermites.

Mode d'emploi. — VIII à XV gouttes, 2 à 3 fois
 par jour dans un peu d'eau, en commençant par
 la dose la plus faible.

Après les repas, matin, midi et soir.

Prix de vente au public : 16 francs le flacon.

Laboratoire de Pathologie Générale de Paris
 5, rue François-Ponsard — PARIS (XVI^e).

Tél : Auteuil 35-25.

VASONITRYL

Médication hypotensive.

Combinaison de Théobrominate de Calcium et de Nitrite
 de Calcium. Dragées à enrobage spécial contenant
 chacune 20 cgr. du complexe ci-dessus.

Indications. — Hypertension artérielle sous toutes ses
 formes, Angine de poitrine, Aortite, Artériosclérose,
 Spasmes vasculaires périphériques, claudication inter-
 mittente, sensation de doigt mort, migraines.

Action thérapeutique. — Vaso-dilatation périphérique.
 Diminution des spasmes vasculaires. Action cardioto-
 nique légère et diurétique. Tolérance parfaite.

Mode d'emploi. — 1 ou 2 dragées de Vasonitryl 3 fois
 par jour de préférence avant les repas. Avaler avec un
 peu d'eau sans croquer. Quand il s'agit de traitements
 de longue durée, y intercaler des repos de quelques
 jours.

Le tube de 20 dragées : 12 fr. 50.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des
 Médicaments sous le n° 150-3.

Prière d'adresser toutes demandes de renseignements et
 d'échantillons aux :

Laboratoires SUBSTANTIA
F. GUILLEMOTEAU, Pharmacien,
 13, rue Pagès — SURESNES (Seine).

VASO-RHINOL

Simple et mentholé.

Forme. — Solution huileuse.

Composition. — 1° (V. R. simple) : Oxyde de Terpilène, Résorcine, Camphre, Linalol; Para-amido benzoate d'éthyle, Terpènes purifiés, Huile olive stérilisée.

2° (V. R. Mentholé) : Même formule plus menthol.

Indications. — 1° V. R. simple : Infections du Nez, du Pharynx, du Larynx et des Oreilles.

2° V. R. mentholé : Troubles sécrétoires, état congestif du Rhino-Pharynx, des Fosses nasales et du Sinus.

Doses. — X gouttes ou plus selon les cas, 2 à 4 fois par jour en position couchée.

Prix : 12 fr. 50.

Laboratoire des VASO-RHINOL

20 bis, rue Gravelotte — TOULOUSE

VASO-RHINOL ADRÉNALINÉ

Forme. — Pommade pour enfants et adultes.


Composition. — 1° Pommade pour enfants : Solution d'Adrénaline au millième, Eucalyptol, Résorcine, Pétroléine ;

Prix : 8 fr. 50.

2° Pommade pour adultes : Solution d'Adrénaline au millième, Eucalyptol, Résorcine, Novocaïne, Pétroléine.

Prix : 9 francs.

Indications. — Infections du Rhino-Pharynx, Etat catarrhal, Troubles Vaso-Moteurs.

Doses. — Gros comme un pois dans chaque narine, deux à trois fois par jour. 

Laboratoires des VASO-RHINOL

20 bis, rue Gravelotte — TOULOUSE

V. A. V.

Technique du Dr Vaudremer.

Propriétés thérapeutiques. — Antitoxiques et curatives qui permettent d'éviter parfois les interventions chirurgicales, l'hospitalisation et les immobilisations prolongées.

Indications thérapeutiques. — Adénites, Ostéites, Arthrites bacillaires, Péritonites, Bacilloses rénales, Lésions oculaires, Granulomes annulaires, Pityriasis, certains Psoriasis, Lupus, etc., associés ou non aux lésions pulmonaires.

Forme et mode d'emploi. — Emulsion forte pour les tuberculoses chirurgicales (injectable). Emulsion faible pour les tuberculoses chirurgicales et pulmonaires associées (injectable).

Emulsion 3 souches pour les tuberculoses pulmonaires (à ingérer).

Prix au public : 60 francs.

Laboratoire ELOCINE

51, rue du Ranelagh — PARIS (XVI^e).

Téléph. Auteuil. 84-18.

VÉGANINE

Le médicament à action renforcée.

Analgésique — Antipyrétique — Antigrippe.

Comprimés d'un procédé de fabrication nouveau, assurant une désagrégation immédiate.

Composition :

| | | |
|-------------------------|-----------|-----------------|
| Phosphate de Codéine .. | 0 gr. 010 | } par comprimé. |
| Acide acétylsalicylique | 0 gr. 250 | |
| Phénacétine..... | 0 gr. 250 | |

Action thérapeutique et indications :

La Véganine, composée d'après la théorie de l'association médicamenteuse, possède tous les avantages de chacun de ses composants, sans en avoir les inconvénients isolés :

Sédatif puissant par la Codéine.

Analgésique par l'Acide Acétylsalicylique.

Analgésique et antithermique par la Phénacétine.

Elle constitue un excellent agent thérapeutique à utiliser dans les maladies par refroidissement, courbatures fébriles, grippe et sa toux réflexe, rhumatismes, névralgies, céphalées, douleurs dentaires, également utile en neurologie (états anxieux).

Sa double action, synergique d'activité et diminutive de toxicité, permettra d'atteindre le résultat recherché avec des doses faibles et sans phénomène d'intolérance.

Doses et Mode d'Emploi :

1 à 6 comprimés par 24 heures, à prendre de préférence avec café ou thé.

Deux Modèles :

Le tube de 10 comprimés : 6 francs.

Le tube de 20 comprimés : 10 francs.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 150-1.

Prière d'adresser toutes demandes de renseignements et d'échantillons aux :

Laboratoires SUBSTANTIA

F. Guillemoteau, pharmacien

13, rue Pagès — SURESNES.

Dépôt pour la Belgique : le Congo belge et le grand Duché de Luxembourg :

Laboratoires SUBSTANTIA S. A.

53, rue du Poinçon — BRUXELLES

VÉGÉLACT

Aliment végétolacté au Soja « Soyolk »

1 gr. de VEGELACT = 3 calories 70.

Composition pour 100 gr. : CRÈME DE RIZ — Soja "SOYOLK" — Lait sec — Sucre a. a. 94 gr.

Malt sec, 4 gr. NaCl 1 gr. Glycéroph. Mg, Ca, 1 gr.

VITAMINE C cristallisée : 3 mgr. = 6 c. c. de jus de citron. (ACIDE ASCORBIQUE LEVOGYRE).

Propriétés. — Aliment complet, équilibré, non carencé du REGIME LACTÉ RESTREINT.

Indications. — Intolérance au lait. — Digestion médiocre des graisses. TROUBLES DYSPEPTIQUES, Eczéma infantile. Tétanie.

Mode d'emploi. — Le VEGELACT délayé au 1/5 dans de l'eau est l'équivalent calorique du lait de vache et se donne aux mêmes doses en biberons ou bouillies (se prépare comme toutes les farines maltées).

Prix : La boîte de 350 gr. : 13 francs. La boîte de 1 kilo : 32 francs.

Pharmacie MARCEAU

7, avenue Marceau — PARIS (XVI^e).

VÉGÉPHOS

Composition. — Phosphore organique, *extrait de l'embryon de blé.*

Propriétés. — Recalcifiant supérieur aux phosphates de chaux, directement assimilable. Agent phosphoré, contribue à la formation du squelette, du noyau cellulaire, de la substance nerveuse.

Indications. — Anémie, Chlorose, Lymphatisme, Tuberculose, Rachitisme, Déminéralisation.

Utile dans : convalescence, grossesse, allaitement.

Formes. — Cachets à 0,60 : boîtes de 20. — Granulé à 12 p. 100. — Poudre.

Mode d'emploi. — 1 ou 2 cachets par jour ; 1 à 2 cuillerées à café de granulé par jour ; dose moyenne, poudre 0 gr. 60 à 1 gr. 20 en une ou deux fois.

Cachets : au public : 11 fr.

Granulé : — : 13 fr.

Pharmacie Centrale de France

7, rue de Jouy — Paris (IV^e).

VEGUVA

Composition. — Aliment hydrocarboné riche en vitamines A, B, C, renferme, à l'état de poudre impalpable, la totalité des substances azotées, des sels minéraux et de la cellulose des épinards, carottes et tomates.

Forme. — Poudre.

Indications. — *Nourrissons* : anorexie, arrêt de croissance, troubles du développement, troubles nutritifs aigus et chroniques, alimentation de transition pour passer du régime lacté au régime mixte.

Adultes : Régime achloruré, alcalose.

Doses. — *Nourrissons* (après 5 mois) : une mesure répartie dans les biberons de la journée.

Adultes : deux à trois mesures à répéter plusieurs fois dans la journée.

Délayer le Véguva à l'aide d'un liquide bouilli et refroidi (lait, eau, bouillon), puis l'incorporer à l'alimentation déjà prête.

Ne pas faire cuire.

Pour la poudre de légumes frais voir également : CAROTTASE.

Prix : 17 francs.

Laboratoires WANDER
CHAMPIGNY-SUR-MARNE.

VEINALGOL

Spécifique de la maladie veineuse.
Régulateur de la circulation sanguine.

Présentation. — Comprimés dragéifiés.

Composition :

| | |
|---------------------------------|-------|
| Extrait s. d'Hamamélis..... | 0,02 |
| Int. de Marron d'Inde..... | 0,02 |
| Ext. m. de Viburnum | 0,01 |
| — — Sèneçon..... | 0,01 |
| — — Genêt | 0,005 |
| — — Cupressus | 0,005 |
| — — Stigmate de maïs | 0,01 |
| Rhamnus Frangula Pulvérisé..... | 0,02 |
| Extrait de Thyroïde..... | 0,005 |
| — Hypophyse (lobe post.) | 0,002 |

Indications. — La maladie veineuse dans toutes ses manifestations (dilatations et stases, varices, hémorroïdes, suites de phlébites et douleurs qui les accompagnent).

Troubles de la circulation générale.

Congestions pelviennes et troubles des fonctions génitales de la femme.

Posologie. — Deux comprimés matin et soir avant le repas, par période de 10 jours.

Prix : 18 francs.

Laboratoires VISCONTI
64, boulevard Barbès — PARIS (XVIII^e).

VEINOGENE

Ovoïdes à base d'extrait de genêt, hydrastis, hamamélis, viburnum, marron d'Inde, iodure, bromure, phényléthylmalonylurée.

Circulation veineuse, Troubles de la puberté et de la ménopause, Etats congestifs, Phlébites, Hémorroïdes, Ulcères.

Posologie :

2 à 6 ovoïdes par jour avant les repas.

Prix : 16 francs.

Dépôt général :

Laboratoires UNIS-SPÈS

14, rue Demarquay — PARIS (X^e).

VEINOPOSINE

Régénérateur du système artério-veineux.

Composition. — Surrénales, Hypophyse, Ovotest, Thyroïde, Extrait d'Hamamélis, Cratœgus, Œsculus, Viburnum, Valériane.

Indications. — Congestion sanguine sous toutes formes, Varices, Phlébites, Hémorroïdes, Vapeurs, Migraines, Troubles ovariens de la Puberté et de la Ménopause.

Formes. — Pilules et gouttes.

Dose :

Pilules : 4 à 6 par jour aux repas.

Gouttes : X à XXX deux fois par jour aux principaux repas.

Prix : *Pilules* et *gouttes* : 12 francs.

Laboratoire Moderne

d'Opothérapie et Biologie Médicale

40, rue Claire-Paulhac — TOULOUSE.

VEÏNOSÉRUM

Indications. — Retour d'âge, Varices, Phlébites, Œdèmes, Hémorroïdes, et tous états congestifs.

1° *Forme gouttes* : Formule très active à base d'extraits de plantes *stabilisées* par procédé spécial (capsicum, gui, marron d'Inde, hamamélis, rhamnées).

Doses : XX gouttes matin et soir, 15 jours par mois. — 15 fr.

2° *Forme liqueur*, à base de citrates alcalins, urotropine et extraits de rhamnées.

Doses : 1 cuill. à soupe matin et soir, 15 jours par mois. — 12 fr.

Laboratoires ABADIE-TANZI

3, Place Intérieure Saint-Michel
TOULOUSE.

VEINOSINE

Traitement spécifique complet des affections veineuses.

Comprimés à base de : Hamamélis virginica, Marron d'Inde, Citrate de soude, Glandes thyroïde et hypophyse.

Indications. — Hyposphyxie, Phlébites aiguës et chroniques, Insuffisance valvulaire de la saphène, Varices, Varices de la grossesse, Pseudo-varices par troubles des glandes à sécrétions internes, Hémorroïdes, Troubles de la vie génitale chez la femme, Puberté, Ménopause.

Doses. — Trois comprimés avant les repas de midi et du soir.

Prix : 14 francs.

Laboratoires LEBEAULT

Besins et C^{ie}, pharmaciens.

5, rue Bourg-l'Abbé — PARIS (III^e).

VEINOTROPE

Propriétés thérapeutiques. — Traitement des troubles veineux.

Indications. — Varices, Varicosités, Hémorroïdes, Ulcères variqueux, Troubles de la ménopause et de la puberté.

Composition :

A. — VEINOTROPE M.

(Usage masculin, comprimés roses.)

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Poudre de Para-thyroïde | 0,001 |
| Poudre orchitique | 0,035 |
| Poudre de surrénales | 0,005 |
| Poudre de pancréas | 0,100 |
| Poudre d'hypophyse (lobe post.) | 0,001 |
| Poudre de noix vomique..... | 0,005 |
| Extrait d'hamamélis virginica | 0,010 |
| Extrait de marron d'Inde..... | 0,005 |

Pour un comprimé.

B. — VEINOTROPE F.

(Usage féminin, comprimés violets.)

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Poudre de para-thyroïde..... | 0,001 |
| Poudre d'ovaires | 0,035 |
| Poudre de surrénales | 0,005 |
| Poudre de pancréas | 0,100 |
| Poudre d'hypophyse (lobe post.) | 0,001 |
| Poudre de noix vomique..... | 0,005 |
| Extrait d'hamamélis virginica | 0,010 |
| Extrait de marron d'Inde..... | 0,005 |

Pour un comprimé.

Mode d'emploi. — 2 comprimés au lever et 2 comprimés au coucher, ou suivant prescription médicale ; 3 semaines de traitement, 1 semaine de repos.

Formule F. — Interrompre pendant la période menstruelle.

Prix de vente au public : 18 francs.

VEINOTROPE POUDRE

Ulcères variqueux et plaies en général.

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Extrait embryonnaire..... | 1 gr. |
| Protéoses hypotensives du pancréas.. | 3 — |
| Calomel | 4 — |
| Talc stérile, Q. S. pour | 100 — |

Mode d'emploi. — Poudrer, après lavage au sérum physiologique et recouvrir de gaze stérile.

Prix de vente au public : 22 francs.

Laboratoires LOBICA

46 avenue des Ternes — PARIS (XVII^e).

BANDE DE CRÊPE VELPEAU

Bande de tissu élastique sans caoutchouc.

La meilleure des bandes de crêpe : **Légère, douce, extensible, chaude, lavable.**

Filet bleu à utiliser lorsque la chaleur n'est pas nécessaire.

Plaies, Varices, Efforts. Prix marqués 5 cm. : 5 fr. 50 ; 7 cm. : 7 fr. 25 ; 10 cm. : 9 fr. 75.

Filet rouge. — Plus riche en laine. A utiliser lorsque la chaleur est nécessaire **Douleurs, Rhumatismes.** 5 cm. : 6 fr. 75 ; 7 cm. : 9 fr. ; 10 cm. : 13 fr. ; 15 cm. : 18 fr.

Ceintures de 20 et 30 cm. (25 et 40 fr.) pour **Grossesse et Opérations.**

Bande rose sans filet. Même qualité que la bande filet rouge. Spécialement créée pour l'usage féminin. Pratiquement invisible sous les bas fins.

5 cm. : 7 fr. 10 ; 7 cm. : 9 fr. 50 ; 10 cm. : 13 fr. 60.

Toutes les bandes de crêpe ne sont pas des bandes de crêpe **Velpeau.** Exiger la marque **Velpeau.**

PHARMACIE CENTRALE DE FRANCE

7, rue de Jouy — PARIS

VÉRALGINE

Spécifique contre l'élément douleur.

Sédatif et analgésique à action ultra-rapide et prolongée.

Association moléculaire d'analgésiques vrais (Phénétine, Amidopyrine) à action élective sur les centres corticaux de la douleur avec le Sonéryl dérivé barbiturique, étudié par MM. les Professeurs Carnot et Tiffeneau, agissant sur les pseudo-centres de Sherington. Cette association renforce et, selon l'expression de Burgi, potentialise l'action curative de chaque constituant, procurant ainsi une rapidité et une durée d'action remarquables avec des doses très faibles et sans aucune intolérance ni réaction cutanée.

Indications. — Tous cas justiciables de la morphine, toutes douleurs, Céphalées, Névralgies, Coliques néphrétiques ou hépatiques, Goutte, Névrites, Rhumatismes, Zona, Sciatique, Migraines des hypertendus, Dysménorrhées, etc., et en art dentaire : Périostite, Pulpite, Interventions, Extractions, Fraisages, etc...

Les comprimés portent un trait de division permettant de fractionner les doses.

Posologie. — Adultes : 1 à 2 comprimés ou cachets.

Enfants : 1/4 ou 1/2 comprimé.

Ces doses peuvent être répétées 2 à 3 fois par 24 heures.

Comprimés : 8 francs. Cachets : 6 francs.

Laboratoire du MAINGUY

M. BASSIN, Docteur en pharmacie à BONDY (Seine).

Échantillons sur demande.

VÉRIANE BURIAT

Composition. — Préparation liquide contenant par cuillerée à café : 0 gr. 12 d'amide barbiturique diéthyle et 1 gramme de Valériane fraîche et INODORE.

Indications. — Hypnotique fidèle, inodore et sédatif du système nerveux central parfaitement toléré par les estomacs délicats. Sommeil calme, réveil normal.

Posologie :

Adultes. — Comme sédatif : 2 à 5 cuillerées à café, espacées dans les 24 heures. Comme hypnotique : 2 à 5 cuillerées à café 3 heures avant le moment du sommeil dans une infusion ou eau sucrée.

Enfants. — XXV gouttes par 24 heures et par année d'âge, soit espacées, soit avant le moment du sommeil suivant les cas.

Forme « Comprimés ».

Un comprimé = une cuillère à café.

Prix : 14 francs.

Laboratoire BURIAT

25, rue Copernic — PARIS (XVI^e).

VERMIFUGE CORNET

Composition. — Macération dans un liquide hydro-alcoolique de plantes anthelminthiques (semen-contra, mousse de corse, fougère mâle, etc.) de produits médicamenteux et d'huiles essentielles.

Forme. — Liquide, de conservation indéfinie.

Indications thérapeutiques. — Destruction de tous les vers intestinaux (ascarides, oxyures, trichocéphales).

Doses et mode d'emploi :

Jusqu'à 1 an 1/2 cuillère à café.

De 1 à 8 ans 1 — —

De 8 à 15 ans 2 — —

Adultes 1 à soupe.

Le matin à jeun dans un peu d'eau sucrée, ces doses doivent être données régulièrement tous les huit jours.

Prix : 6 francs.

Échantillons sur demande.

Laboratoires SERRE

7, place Pey-Berland — BORDEAUX.

VERMIRÈNE AUDIBERT

Macération de semen-contrà d'Alep de chœnopodium anthelmenthicum et de pyrethrum anthemis, présentée sous forme de sirop aromatisé à la vanille.

Agréablement accepté par enfants et adultes.

Ne nécessite ni diète, ni régime et n'offre pas les inconvénients de la Santonine.

Chaque cuillerée à café renferme 42 mgr. 5 de semen-contrà, 50 mgr. de pyrethrum anthemis et 2 mgr. 5 d'essence de chœnopodium.

Posologie :

Enfants de 1 à 5 ans : Une cuillerée à café le matin à jeun pendant 3 jours consécutifs.

Enfants de 5 à 10 ans : Une cuillerée à dessert.

Adultes : Une à deux cuillerées à soupe.

En cas de crise aiguë, doubler les doses.

Prix : 8 francs.

M. AUDIBERT, Docteur en Pharmacie.

Cinq-Cantons — BAYONNE.

VERNIS A LA DIACHUSINE

Arsénicale.

Traitement externe des Néoplasmes, Cancroïdes, Cancer épithélial de la face.

Le Vernis à la Diachusine arsénicale s'adresse aux cancroïdes en général, surtout aux petits cancroïdes de la face.

Mode d'emploi. — On commence à déterger l'ulcération cancroïdale de ses croûtes à l'aide de compresses humides, puis on pratique l'assèchement exact à l'aide d'un tampon d'ouate hydrophile. Cela fait, à l'aide d'un pinceau, on recouvre de vernis à la Diachusine arsenicale la surface ulcérée, de façon qu'il dépasse et recouvre largement ses bords ordinairement épaissis. Il n'y a plus rien à faire alors, qu'attendre que la croûte formée se détache spontanément, ce qui arrive généralement du quinzième au vingtième jour. Une palpation minutieuse permet alors de s'assurer qu'il ne reste aucune induration suspecte, auquel cas on devrait recourir à une nouvelle application de vernis.

Prix : 15 francs le flacon.

Laboratoires A. LEJEUNE

142, rue de Picpus — PARIS (XII^e).

VERONIDIA

Solution de diéthylmalonylurée associée à l'extrait de *Passiflora incarnata* dans un véhicule synergique et agréable au goût. Chaque cuill. à soupe de solution ou chaque comprimé renferme 0 gr. 25 de principe actif.

Propriétés thérapeutiques. — Sédatif idéal de l'hyperexcitabilité nerveuse dans toutes ses manifestations : Névroses diverses, Palpitations. Phobies. Insomnies. Névrose d'angoisse, mal de mer, bourdonnements

Dose. — 2 cuill. à café comme antispasmodique dans le courant de la journée. — 1 à 2 cuill. à soupe ou comprimés comme hypnotique, le soir au coucher.

Prix de vente au public : 18 fr. (solution). Le tube de comprimés : 14 fr. 50.

Société Générale d'Applications Thérapeutiques
THERAPLIX

R. MOREUX, Pharmacien
Ancien interne des hôpitaux
98, rue de Sèvres — PARIS (VII^e).

VERRULYSE

Composition. — A base de glycérophosphates (phosphate Vital) de chaux, fer, manganèse, magnésie lourde et légère, hydrofluosilicate de soude, charbon végétal et quinquina.

Formes. — Poudre légèrement comprimée en petits cachets.

Boîtes de 80 cachets constituant le traitement complet, suffisant dans la plupart des cas.

Dose et mode d'emploi. — *Pour les enfants de plus de 8 ans et les adultes :*
2 cachets par jour pendant 40 jours, au début des repas.

Pour les enfants de moins de 8 ans : 1 cachet tous les jours.

Pour les enfants, et même pour les adultes, dans les cas rebelles, pour augmenter l'assimilation, ouvrir le cachet et prendre la poudre délayée dans un peu de potage, purée, compote, etc., la poudre ne communiquant aucun goût désagréable.

Propriétés :

1° *Effet local :* La 2° ou la 3° semaine, les verrues prennent une teinte rosée au pourtour ou deviennent le siège d'une légère démangeaison. Elles s'éliminent ou se résorbent dans le mois qui suit le traitement. Dans le cas contraire, reprendre celui-ci à dose double.

2° *Effet général :* Reconstituant. Amélioration très nette, chez les enfants, de l'entrain, de l'appétit, du teint, des fonctions intestinales.

Indications. — Traitement spécifique des verrues et autres papillomes (larynx, organes génitaux, etc.).

Exerce une action favorable contre d'autres productions épidermiques pour lesquelles nous invitons le médecin à formuler VERRULYSE sous le vocable FORMULE JACQUEMAIRE n° 60.

Aucune contre-indication. Après l'emploi d'une première boîte, le traitement peut être prolongé et même renforcé sans inconvénient dans les cas exceptionnels où cela est nécessaire (jusqu'à 6 cachets par jour dans les cas de verrues rebelles ou de tumeurs malignes).

Prix public. La boîte de 80 cachets : 16 francs.

Formule Jacquemaire n° 60. — Cette formule, peu différente de celle de VERRULYSE, a l'avantage de pouvoir être prescrite comme un formule magistrale. Elle ne porte sur la boîte aucune indication garde ainsi le secret du diagnostic. (Se reporter à FORMULE JACQUEMAIRE n° 60).

J. BONTHOUX, Pharmacien.

**Laboratoires FLUXINE,
VILLEFRANCHE (Rhône).**

VERTICURINE

Composition. — Silicate de soude, colloïdal.

Action. — Hypotensive-antiathéromateuse, déchlorurante, ramène les viscosités à la normale, fait disparaître les symptômes cérébraux.

Indications. — Artério-sclérose, Angine de poitrine, Troubles cérébraux, Otite scléreuse, Hypertension, Aortite, Bourdonnements, Sclérose cardiaque, Pré-sclérose, Vertiges, Ménopause.

Formes et doses. — 1° *Liquide*: chaque cuillerée à soupe représente 1 gr. de silicate assimilable. Dose: 1 cuillerée à soupe aux deux principaux repas; 2° *Comprimés*: chaque comprimé renferme 0 gr. 50 de silicate assimilable. Dose: 2 comprimés à chacun des principaux repas.

Nous recommandons de préférence la solution dorénavant préparée sans goût désagréable.

Verticurine, liquide: le flacon, 18 francs.

Verticurine, comprimés: le flacon, 14 francs.

Laboratoire L. GRIAS, Pharmacien de 1^{re} classe.

47, rue Féry — CORBEIL (S.-et-O.)

VÉRYL

Indications. — Syphilis à toutes ses périodes. Toutes indications du cyanure de mercure.

Composition. — Nitrilo-méthylène, aminate de mercure (dérivé organique aminé à noyau de cyanure de mercure).

Posologie. — 1/2 cc. le 1^{er} jour, 2/3 le 2^e jour, puis 1 cc. les jours suivants.

Propriétés. — Le Véryl présente sur le cyanure de mercure les avantages suivants: plus actif, moins toxique, jamais d'intolérance. Injections intraveineuses ou intramusculaires indolores.

La boîte de 20 ampoules de 1 cc.: 20 francs.

Echantillons gratuits.

Laboratoires G. BEYTOUT

12, boulevard Saint-Martin — PARIS (X^e)

Tél.: Nord 76-85.

VÉSICATOIRE ROSE BESLIER

Au Cantharidate de Soude.

Le Vésicatoire Rose Beslier à base de Cantharidate de Soude, produit chimique stable défini, pur, aseptique, offre au médecin l'avantage de mettre à sa disposition un **Vésicatoire aseptique, indolore, fidèle, et sans toxicité pour l'appareil rénal.**

Indications. — Bronchites, pleurésies, pleurites, pneumonie, réactions douloureuses des tuberculeux, péritonite, hydarthrose, arthrite, névralgies, sciatique, etc

Présentation. — Pour éviter toute manipulation, toute substitution, le **Vésicatoire Rose Beslier** est délivré exclusivement en pochettes unitaires contenant un carré de 10×10.

Prix : la pochette : 5 francs.

Chaque carré, mis sous pochette à l'usine, parvient ainsi sans souillures sur l'épiderme du malade.

M. COQUELU, Pharmacien-Fabricant
DIGOIN.

VICHY-PURGATIF

Association de l'Eau alcaline naturelle de Vichy avec les Sulfates de Soude et de Magnésie (75 gr. par 1/2 litre).

Recommandé dans tous les états inflammatoires de l'intestin, dans l'obésité, les maladies du foie, de l'estomac, le manque d'appétit.

Dose purgative : prendre le 1/3, la moitié, les 3/4 ou même la bouteille entière, suivant l'âge ou la constitution de la personne.

Dose laxative : Un verre à bordeaux ou un demi-verre le matin à jeun.

Toutes pharmacies, 4 fr. la bouteille.

Administration :

7, rue Galvani — PARIS.

Exploitation :

111, rue du Maréchal-Pétain — VICHY.

VIGOSTÉROL

Irradié.

Composition. — Ergostérine activée par les rayons ultra-violets. Nucléinate de manganèse, Phosphate tricalcique d'origine végétale, Extrait de glandes surrénales.

Indications. — Le rachitisme de l'enfant et de l'adulte, l'Ostéomalacie et la déminéralisation des femmes enceintes et fatiguées par l'allaitement. Les dystrophies et la débilité de l'enfance. Toutes les infections déminéralisantes et en premier lieu la tuberculose non congestive et les tuberculoses locales, les convalescences et la grippe.

Mode d'emploi :

2 cuillerées, à café 3 fois par jour, pour les adultes ;
1 cuillerée à café 2 fois par jour, de 7 ans à 15 ans ;
1 cuillerée à café 2 fois par jour, de 2 ans à 7 ans.

Prix : 16 francs.

Laboratoires BRICHARD et Fils
BAR-LE-DUC (Meuse).

VIN ANTI-DIABÉTIQUE TALON

Composition. — A base de quinium associé à des toniques et arsenicaux. Médication complémentaire de l'insuline.

Indications. — Diabète et ses conséquences. Revitalise les tissus, arrête la déminéralisation, empêche la formation du sucre.

Dose. — 1 verre à liqueur avant les 2 principaux repas.

Prix. La bouteille : 16 fr. 80.

Laboratoire du Dr TALON

153, boulevard Montparnasse — PARIS

Tél. : Danton 57-07.

VIN DE BAUDON

Antimonio-phosphaté.

Composition. — Contient le phosphate de chaux sous une forme non acide, éminemment assimilable. Cette assimilation se trouve exaltée par la présence de l'antimoine qui forme avec le phosphate une véritable combinaison organique et qui agit lui-même par ses vertus propres, comme excitant et régulateur du bon fonctionnement de l'appareil digestif.

Avantages. — Son goût agréable le fait accepter avec plaisir par les malades.

Indications thérapeutiques. — Affaiblissement général, anémie, lymphatisme, rachitisme, scrofule, croissance, suppurations prolongées, maladies des os, grossesse, allaitement, etc.

Posologie. — Un verre à madère pour les adultes et un verre à liqueur pour les enfants à prendre au moment des repas ; on peut en prendre selon les cas jusqu'à 4 ou 5 par jour.

Prix : 18 francs.

Laboratoire VAUDIN et GUILLAUMIN

Docteurs en Pharmacie, 12, rue Charles-V — PARIS.

VIN DE BUGEAUD

Toni-nutritif.

Malaga vieux. Quinquina. Cacao.

Indications :

Faiblesse générale, Anémie,
Surmenage, États consomptifs, Diabète,
Convalescence des maladies aiguës,
Anémie palustre, etc.

Dose :

Un verre à madère aux deux principaux repas.

Prix : 17 francs.

Laboratoires LEBEAULT

Besins et C^{ie}, pharmaciens.

5, rue Bourg-l'Abbé — PARIS (III^e).

VIN DE CARNÉOSE

Vin supertonique.

Composition. — Quina-cola-coca, lactophosphate, condurango, plasma musculaire.

Propriétés thérapeutiques. — Supertoni-nutritif rapide et sûr. Ne fatigue pas l'estomac.

Posologie. — *Adultes* : 1 verre à madère 3 fois par jour avant les repas.

Enfants : demi-dose.

Prix :

Le litre : 24 francs.

Le demi-litre : 15 francs.

**USINES ET LABORATOIRES
DU BLOSSET
MOULINS-SUR-YÈVRE (Cher).**

VIN DE CHASSAING

à la pepsine et à la diastase.

S'emploie dans toutes les affections stomacales provenant d'une insuffisance de digestion, à la dose d'un ou deux verres à liqueur immédiatement après le repas.

CHASSAING, LE COQ et C^{ie}

1, Quai Aulagnier

ASNIÈRES (Seine)

La Commission a été chargée de :

- 1. Étudier les besoins de la région
- 2. Établir un plan d'urgence
- 3. Mettre en œuvre les mesures nécessaires

La Commission a tenu sa première séance le 15 mars 1961.

Le Président de la Commission est M. [Nom]

La Commission a été constituée par arrêté du Préfet de la région de Paris le 15 mars 1961.

Le Secrétaire de la Commission est M. [Nom]

Le Président de la Commission est M. [Nom]

Le Secrétaire de la Commission est M. [Nom]

VIN DE VIAL

ET SIROP DU VIN DE VIAL

Composition analogue. — Lacto-phosphate de Chaux, Ecorce de Quinquina, Substances extractives de la Viande.

Propriétés thérapeutiques. — A base de substances indispensables à la formation et à la nutrition du plasma, de la fibre musculaire, de la cellule nerveuse et du système osseux. Ces produits peuvent être considérés comme le type complet de la médication fortifiante et tonique. Sous leur influence, on constate une forte amélioration de l'appétit, une augmentation du poids, la coloration du visage réapparaît. Le malade, d'abord défaillant, ressent vite un « mieux » sensible.

Cliniquement, ces signes sont confirmés par une augmentation du nombre des globules rouges, une hyper-tonicité du système nerveux, une fixation intense de la chaux, ainsi qu'une notable amélioration du métabolisme basal.

Avantages. — Le *Vin de VIAL* peut être administré à tous les individus (à l'exception des albuminuriques, maladies de peau et contre-indications de l'emploi de l'alcool). De goût particulièrement agréable, il est accepté par les malades les plus délicats et les plus difficiles. Le sirop est particulièrement réservé aux enfants et aux malades qui ne peuvent utiliser un produit alcoolique.

Indications. — Chez l'enfant, le sirop du Vin de VIAL est tout spécialement indiqué pendant la période de croissance. Il apporte à l'organisme les éléments toniques et les minéraux nécessaires. Chez les lymphatiques, il aide puissamment à la défense de l'organisme.

Chez les petits rachitiques, il favorise la fixation de la chaux et la formation du squelette.

Chez les jeunes gens, le Vin de VIAL est d'un grand secours dans les anémies, il améliore le terrain et défend les pré-tuberculeux.

Chez les vieillards, il lutte avantageusement contre la dépression et la dé-phosphatisation.

Chez les femmes enceintes et les nourrices, il facilite les apports nécessaires à la formation du squelette fœtal et à la lactation.

Chez les convalescents (de maladies infectieuses, ou interventions chirurgicales), chez les amaigris, les épuisés, et en général dans tous les états de misère physiologique, il contribue à rétablir l'équilibre des forces et assure un retour rapide à la normale.

Mode d'emploi. — *Sauf avis contraire du médecin*, 1 verre à liqueur avant chaque repas pour adultes, et 1 cuillerée à bouche pour enfants. — Pur ou dilué dans un peu d'eau.

Prix : 19 fr. 10

Laboratoires H. VIAL, Pharmacien

36, Place Bellecour — LYON.

VIN GIRARD

Iodo-tannique phosphaté.

Nature. — Le VIN GIRARD est la meilleure formule des préparations iodo-tanniques phosphatées consacrées par l'usage. Un verre à madère de VIN GIRARD contient :

| | |
|------------------------------|-----------|
| Iode..... | 0 gr. 075 |
| Tannin | 0 gr. 50 |
| Lactophosphate de chaux | 0 gr. 75 |

Mode d'emploi. — 1 ou 2 verres à madère par jour pour une grande personne ; 1/2 dose pour enfant.

Propriétés thérapeutiques. — Tonique, reconstituant, augmente la phagocytose.

Indications. — Adénopathies, Lymphatisme, Scrofule, Tuberculose apyrétique, toutes convalescences, en particulier infectieuses et grippales.

Prix : 17 francs.

Établissements SOUDAN

48, rue d'Alésia, — PARIS (XIV^e).

Euregistré au Laboratoire National n° 405-2.

VIN « LUX GAILLAC » MOUSSEUX

(Cuvées réservées, méthode champenoise)

Irradié par les rayons Ultra-Violets.

Procédés des docteurs Loubat, Durand, Muller, Popovitch.

Tonique — Stimulant.

S'emploie dans tous les états de fatigue cérébrale et physique, les anémies, le diabète, etc... Il convient tout spécialement aux convalescents d'affections chirurgicales ou médicales. Il stimule toutes les fonctions de défense organique. Il est indiqué dans le mal de mer et les vomissements.

Vente exclusive par caisse de 12 bout. à 180 francs la caisse doux, demi-sec, brut.

Établissements du Docteur DURAND
6, avenue Foch — GAILLAC (Tarn).

VIN RAIMOA TONIC

Composition. — Champagne. Chlorure de magnésium, 0,80 par bouteille. Stimulants digestifs aromatiques divers.

Indications. — Mal de mer. Vomissements même dénommés incoercibles. Atonie générale; notamment d'origine digestive. Surmenage physique ou intellectuel. Cancer.

Mode d'emploi :

Enfants : De 2 cuillerées à café à 2 verres à madère en 24 heures.

Adultes : Comme stimulant, 2 flûtes en 24 heures ; comme excitant, jusqu'à une demi-bouteille par 24 heures.

Laboratoire des Produits Raimoa

COLLIGNON-SAVERS

264, boulevard Voltaire — PARIS.

Téléph. : Diderot 54-96.

VIOFORME CIBA

Antiseptique chloro-iodé pulvérulent.
(Iodochloroxyquinoléine).

Succédané de l'iodoforme, inodore, non irritant ; — antiseptique et kératoplastique.

Indications. — Plaies atones, ulcères variqueux, eczémas, escarres, brûlures.

Doses. — En poudre, 2 à 3 gr. pour une application. Pommade de 2 à 10 p. 100.
Se formule magistralement, ou :

Boîte poudreuse : 12 francs.

Ovules au Vioforme. — Antiseptiques, analgésiques, décongestionnants, désodorisants, résolutifs : métrites, vaginites, etc.

La boîte de 6 : 13 francs.

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND
109-113, Boulevard de la part-Dieu — LYON

VIOPHAN

Acide phénylcinchoninique de synthèse spéciale :
fabrication entièrement française.

Propriétés. — 1^o *Non toxique* : Le chien supporte plus de 2 gr. par kilo de poids ; à l'autopsie, foie et reins magnifiques, ne présentant pas de signes de dégénérescence, ni d'inflammation.

2^o Mobilisateur et éliminateur spécifique de l'acide urique et des insolubles après modification interne profonde empêchant l'irritation des muqueuses de l'appareil urinaire et permettant une *miction indolore*.

3^o Antithermique, Antinévralgique, Antiphlogistique, Anticholestérinhémique.

Indications. — Goutte aiguë et chronique, Sciatique, Rhumatisme articulaire aigu et chronique. Névralgies rebelles, Lumbagos, Artériosclérose, Arthritisme.

Posologie. — 2 à 10 comprimés ou cachets par 24 heures, au repas. Boissons abondantes. Cure intermittente.

Présentation : 20 cachets ou comprimés 1 gr. 40. Prix 15 fr.
Viophan injectable : (associé à l'iodum de Na).

5 ampoules : Prix 25 fr.

Laboratoire National de Contrôle, 196-1 et 2.

Laboratoire du Viophan

81 et 83, rue de Lille. — ROUBAIX.

VIOSTEN

Composition. — Lipoides irradiés, Phosphatides (glycéroponosphate de choline), Ether benzylocinnamique, Vitamines.

Comprimés. — Granulé. — Injections de 1 cc.

Indications. — Anémies, Asthénies, Convalescences, Tuberculoses, Rachitisme.

Chez les nourrissons et les déficients digestifs employer la **Zymatine irradiée** (Zymatine + Nucléinate de Ca + Ergostérol irradié).

Doses. — *Enfants* : Au-dessous d'un an : 1 cc. tous les 4 jours. — 1 comprimé par jour, pendant les repas. 1/2 cuillerée à café de granulé par jour avant le repas principal.

De 1 à 3 ans : 1 cc. tous les 3 jours. — 2 comprimés par jour, pendant les repas. — 1 cuillerée à café de granulé par jour.

De 3 à 7 ans : 1 cc. tous les 2 jours. — 4 comprimés par jour, pendant les repas. — 2 cuillerées à café de granulé par jour avant les repas.

Au-dessus de 7 ans : 1 cc. tous les jours. — 6 comprimés par jour pendant les repas. — 3 cuillerées à café de granulé par jour avant les repas.

Adultes : 1 à 2 cc. par jour. — 6 comprimés par jour pendant les repas. — 3 cuillerées à café de granulé par jour avant les repas.

Prix : Comprimés, 15 fr. — Ampoules, 20 fr. — Granulé, 15 fr.

LABORATOIRES LESCENE

PARIS, 58, rue de Vouillé. — LIVAROT (Calvados).

Téléph. : Vaugirard 08-19.

VIOXYL MOUNEYRAT

**Puissant accélérateur
de la nutrition générale.**

Indications. — Asthénies diverses, Cachexies, Convalescences, Maladies consomptives, Anémie, Chloro-anémie, Lymphatisme, Scrofule, Tuberculose, Neurasthénie, Asthme, Diabète.

Formes. — Elixir et Granulé.

Posologie. — *Adultes* : Débuter par 2 cuillerées à café par jour, une le matin, une le soir, soit au moment, soit dans l'intervalle des repas. Au bout de 3 ou 4 jours, porter cette dose à 3 cuillerées à café par jour.

Enfants : 1 à 2 cuillerées à café par jour, suivant l'âge.

Prix : Élixir : 15 francs. — Granulés : 15 francs.

Établissements MOUNEYRAT

12, rue du Chemin-Vert

VILLENEUVE-LA-GARENNE (Seine).

VIRADÈNE

Synergie de glandes génitales, composé phosphorique, phytothérapique, extrait de noix vomique, nucléinate de manganèse, extrait de maté.

Indications. — Dépression nerveuse chez l'homme, affaiblissement des facultés, neurasthénie, sinistrose, surmenage, sénilité prématurée, difficultés de l'acte génésique, frigidité, troubles de la puberté, convalescences difficiles, etc...

Doses. — 4 dragées par jour en moyenne.

Laboratoires du FEMINADÈNE

120, rue Lecourbe — PARIS (XV^e).

VIRMONAL « PIAM »

A base de phosphore organique.

Forme et dosage. — Comprimés contenant 0 gr. 0033 de phosphore organique.

Posologie. — 3 à 6 comprimés à la fois, 3 fois par jour, avant les repas. Ces doses peuvent être augmentées, le VIRMONAL ne renfermant ni alcaloïdes ni substances toxiques.

Indications. — Neurasthénie, Hystérie, Hypochondrie, Faiblesse nerveuse, Tics, Épilepsie, Insomnie, Surmenage.

Prix. — Le flacon de 90 comprimés : 25 francs

Echantillons et vente en gros :

H. PERRIN et BRUNO

4, rue Désirée — LYON.

J. MURARD, Pharmacien.

VISCO-SÉRUM

Visco-sérum injectable reproduit exactement la formule minérale du plasma sanguin : $\frac{K+Na}{Ca+Mg} = 30; \frac{K}{Ca} = 2.$

Stimulation du système nerveux, de l'appareil cardio-vasculaire et des organes hématopoïétiques.

Indications. — Tous les états asthéniques. Les affections chroniques déprimantes. Convalescences. Neurasthénies, Surmenages. Débilité physiologique. Pré-sénilité.

Posologie. — Une ampoule de 5 cc. tous les jours; voie sous-cutanée ou intramusculaire.

Visco-sérum buvable. — Complète l'action du Visco-Sérum injectable, mais peut également être administré isolément.

Solution phosphorique acide radioactive. Fer, manganèse, zinc.

Catalyseur des métabolismes, fait l'appoint des carences minérales, ramène à la normale l'acidité humorale.

Indications. — Les déminéralisations, les anémies quelles que soient leurs causes. Tous les états asthéniques avec hypoacidité urinaire. Tous les états de dénutrition.

Posologie. — 2 ampoules buvables de 3 cc. par jour, 10 à 20 jours.

Présentation. — Boîte de 10 ampoules injectables de 5 cc. : 18 francs.
Boîte de 10 ampoules buvables de 3 cc. : 18 francs.

Laboratoire G. FERME

55, boulevard de Strasbourg — PARIS (X^e).

VISCOVEINE

Gouttes.

XL gouttes —

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Citrate de soude | 0,10 |
| Extrait stab. de marron d'Inde | 0,10 |
| Extrait stab. fluide de gui..... | 0,02 |
| Extrait stab fluide de monésia | 0,05 |
| Bourse à Pasteur..... | 0,05 |
| Extraits fluides Hamamélis, Viburnum | } 5a 0,10 |
| Cupressus..... | |

En solution glycinée.

Propriétés. — Tonique vasculaire et puissant sédatif utérin.

Indications. — Tous états variqueux, Hémorroïdes, Ulcères variqueux, Aménorrhée, Dysménorrhée, Métrorragies, Règles douloureuses, Troubles de la Ménopause.

Mode d'emploi. — XXX à XL gouttes avant les deux principaux repas.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 988-3.

Prix : 15 francs.

Laboratoire FOSSET

21, Grande-Rue — MONTFERMEIL (Seine-et-Oise),

VISCUM ZYMA

Composition. — Dialysé de baies, feuilles et tiges de Gui blanc, obtenu selon le procédé original du Prof. GOLAZ.

Propriétés. — Le *Viscum Zyma* abaisse la pression sanguine, agit comme tonique du cœur et favorise l'élimination des chlorures et de l'urée.

Indications. — *Convient dans tous les états morbides associés à l'hypertension* : artériosclérose, urémie, albuminurie de la grossesse ; est également indiqué dans certains cas d'épilepsie.

Mode d'emploi. — S'emploie à la dose de XX à XXX gouttes, diluées dans un peu d'eau, avant les repas (2 à 3 fois par jour).

Laboratoires « ZYMA »

9, place Félix Faure — PARIS (XV^e).

Tél. : Vaugirard 28-83.

VITACALCINE

« Moncour »

Complexe opothérapique irradié.

Composition. — Vitamines, Lipoïdes et Cholestérine du foie et de la moelle rouge des os frais, ainsi que les éléments minéraux de ces derniers.

Les mordants physiques (radiations ultra-violettes), endocriniens (parathyroïde et surrénale) et minéraux (nucléinate de manganèse) en assurent la fixation.

Indications. — Toutes maladies déminéralisantes et hyposthénisantes telles que : Prébacillose, Bacillose, Cachexie, Rachitisme, Décalfications dentaires et osseuses, Neurasthénie, etc.

Posologie. — *Adultes* : 2 à 8 comprimés par jour.

Enfants : 1 à 4, suivant l'âge.

Le traitement sera prolongé aussi longtemps que nécessaire, la Vitacalcine n'étant pas toxique.

Laboratoire « MONCOUR »

49, avenue Victor-Hugo — BOULOGNE (Seine).

Téléphone : Molitor 08-47.

VITACHOLINE

**Rééducateur des fonctions entéro-hépatiques.
Puissant tonique du foie.**

Composition. — VITAMINE A. Sulfate de Magnésie, Extrait d'Artichaut, Lacto-sérum, (ou Ferments lact. pour les dragées.).

Propriétés. — L'apport en VITAMINE A, qui s'accumule dans le foie, permet d'obtenir une *action tonifiante et anti-infectieuse* considérable de la cellule hépatique. Active la sécrétion et l'excrétion biliaires. Régularise les fonctions intestinales et aseptise le tube digestif. Diurétique.

Indications. — Congestion du foie et de la vésicule, Lithiase, Ictère, Cholécystite chronique, Cholémie, Insuffisance. Constipation, Entérococolite, Urticaire. Prurit, Eczéma chronique, Acné chronique, Asthénie et fatigue générale.

Présentation. — Granulé, Dragées. Prix : 15 francs.

Mode d'emploi. — *Drainage biliaire* : 1 à 3 c. à café de granulé à jeun avec 1/2 verre d'eau chaude, ou 2 à 6 dragées.

Cure d'entretien : 1 c. à café de granulé ou 2 dragées, 20 minutes avant les repas.

LABO-VITA

190, boulevard Haussmann — PARIS.

VITACRINES

Associations hormono-vitaminiques.

Deux formules : Vitacrine M (Masculin) et Vitacrine F (Féminin).

Composition. — Hormones génitales principales et accessoires, Lobe antérieur d'Hypophyse, Corps thyroïde, Surrénale, Vitamine E.

Propriétés thérapeutiques. — Reconstituant pluri-glandulaire et médication endocrinienne d'appoint.

Mode de présentation. — Comprimés dragéifiés.

Indications. — Asthénie, Convalescence, Surmenage, Fatigue physique et intellectuelle. Puberté, Déficiences glandulaires de la ménopause.

Posologie. — 4 à 6 comprimés par jour.

Prix : 18 francs.

Laboratoire DEFFARGE

Docteur en pharmacie

2, rue Lauzac — BORDEAUX

VITACUROL SAVARE

Huile d'olive, pure, naturelle, sélectionnée.

SURACTIVÉE

100 unités VITAMINE A par cuillerée à café.

Cholagogue. — Cholérétique. — Laxatif doux. —
Anti-infectieux. — Nutritif. — Catalyseur
d'oxydation.

Le *Contrôle biologique* en garantit la haute teneur en VITAMINE A et assure la constance de son action à doses réduites. L'apport en VITAMINE A, qui s'accumule dans le foie, permet d'obtenir une action tonifiante considérable de la cellule hépatique.

Le *contrôle chimique* en garantit la très faible acidité et surtout la richesse la plus élevée en glycérides de l'acide oléique, d'où : efficacité accrue, et digestibilité parfaite.

Indications. — Lithiases, Ictères, Cholécystites, Constipation chronique, Hyperchlorhydrie.

Posologie. — 1 à 3 cuillerées à dessert le matin à jeun.

Prix : 15 francs.

LABO-VITA

190, boulevard Haussmann — PARIS.

VITADONE

Vitamines A et D.

Composition. — Association des vitamines A et D physiologiquement titrées. AMPOULES INJECTABLES de 5 cc. titrées à 6 000 unités A et 12.000 unités D par ampoule. (Boîtes de 6 ampoules, solution huileuse.

Propriétés thérapeutiques. — La VITADONE agit puissamment contre la tuberculose pulmonaire, par sa vitamine D qui calcifie les lésions tuberculeuses et par sa vitamine A anti-infectieuse et protectrice des épithéliums (notamment épithélium des voies respiratoires).

Indications et posologie. — Dans la tuberculose pulmonaire, 2 injections intra-musculaires par semaine ; cures de 10 semaines, séparées par des périodes de repos de 15 jours.

La VITADONE, qui se fait aussi en GOUTTES (20 à 60 gouttes et davantage, par jour) et en CHOCOLATES (2 à 4 par jour en moyenne) peut remplacer dans toutes ses indications, l'huile de foie de morue dont elle contient tous les principes actifs. Elle est, en somme, une huile de foie de morue synthétique et hyperconcentrée.

Prix :

Ampoules : 25 fr. — Solution : 18 fr. — Chocolats : 20 fr.

Les Établissements BYLA

26, avenue de l'Observatoire — PARIS.

VITAGLYC

Nature. — Vitamines B1, B2, B3.

Caractéristiques. — Poudre légère, sans odeur, particulièrement concentrée en vitamines, d'une teneur constante et à incorporer aux aliments liquides.

Propriétés et Indications. — Les vitamines B jouent un rôle très important dans l'utilisation des glucides. L'emploi du VITAGLYC s'étend donc à tous les états d'amaigrissement qu'elle qu'en soit la cause. D'autre part, il active le métabolisme hydrocarboné et permet d'augmenter sans inconvénient la ration des hydrates de carbone.

Dans le diabète, le VITAGLYC peut être employé seul ou associé à l'Insuline suivant la gravité du cas.

Médication lente, mais progressive.

Posologie. — *Adultes* : 1 paquet par jour à prendre en 2 fois. *Enfants* au-dessus de 5 ans : 1/2 paquet par jour. *Nourrissons* : 1/4 de paquet cuit quelques minutes dans un peu de lait ; bouillie à répartir dans les biberons de la journée.

Prix : 24 francs la boîte.

Laboratoire de l'ENDOPANCRINE
48, rue de la Procession — PARIS (XV^e).

VITAMINE D CORTIAL

Vitamine D cristallisée.

Composition. — Vitamine D cristallisée incorporée au chocolat. Pastilles dosées à 4 centièmes, de vitamine cristallisée pure.

Indications. — Spécifique de toutes les formes du rachitisme.

Curatif. — Chez l'enfant : retard de croissance, déformations osseuses, retard de la dentition, carie dentaire, troubles scorbutiques.

Chez le nourrisson : accidents convulsifs, tétanie, décalcification.

Chez l'adulte : pré-tuberculose, grossesse, allaitement, consolidation des fractures, ostéomalacie.

Préventif. — Enfants prématurés ou de constitution faible, pour prévenir les troubles rachitiques, dans les convalescences de maladies infectieuses.

Avantages. — Dosage précis, pureté de la vitamine D, conservation indéfinie, absorption agréable pour les enfants.

Mode d'emploi et doses. — Au-dessous d'un an, 1/2 pastille chaque matin. — Jusqu'à 10 ans : 1/2 pastille matin et soir. — Au-dessus : de 1 à 2 pastilles par 24 heures.

Pour les nourrissons, faire fondre la pastille dans du lait tiède.

Prix : le tube de 20 tablettes (20 à 40 jours de traitement) : 19 francs.

Laboratoires CORTIAL
7, rue de l'Armorique — PARIS.

VITAMINOL

POUDRE (malté), GRANULÉ, COMPRIMÉS.

Composition. — Amino-acides nobles (tryptophane, histidine, etc...) et vitamines B.

Propriétés thérapeutiques. — Apporte à l'organisme, des facteurs de croissance et d'équilibre, *complète la ration alimentaire*, favorise l'assimilation des hydrates de carbone chez les diabétiques, permettant l'enrichissement du régime en hydrates de carbone, en même temps que la diminution ou même la suppression des injections d'Insuline.

Indications et posologie. — **Granulé :** *Adultes :* tous les sous-alimentés, dyspeptiques au régime des pâtes, convalescents, etc... 2 à 3 cuillerées à soupe par jour, à croquer ou dans du lait chaud sucré.

Enfants : en période de croissance : 2 à 3 cuillerées à dessert.

Poudre : pour le maltage des bouillies, une cuillerée à café par bouillie de 100 gr.

Comprimés : (vitamine B pure, sans amino-acides, 20 unités internationales de vitamine B par comprimé) dans le diabète, 2 à 4 comprimés par jour.

Prix :

Granulé : 15 fr. — Poudre : 15 fr. — Comprimés : 15 fr.

Les Établissements BYLA

26, avenue de l'Observatoire — PARIS.

VITAMORRHUINE

Composition. — Principes actifs de l'huile de foie de morue (vitamines A et D) associés au phosphore et au calcium sous forme de granulés au cacao.

Une cuillerée à café de Vitamorrhaine équivaut à une cuillerée à soupe d'huile de foie de morue type. Préparation vérifiée au point de vue de son activité biologique.

Indications. — Rachitisme, Scrofule, Débilité, Lymphatisme, Tuberculose.

Doses. — *Enfants :* de 3 mois à 1 an ; 1 cuillerée à café par jour (dans du lait) ; de 1 à 5 ans : 2 cuillerées à café par jour ; de plus de 5 ans : 3 cuillerées à café par jour. *Adultes :* 4 cuillerées à café par jour.

Pharmacie Centrale de Belgique. S. A.

12, rue du Téléphone — BRUXELLES.

VITAMYL

Vitamines A. B. et C. en extrait concentré.
Une cuillerée à café à chaque repas.

Prix public : 16 francs le flacon.

VITAMYL IRRADIÉ

Solution et Dragées.

Vitamines A. B. C. et D. en solution huileuse, finement émulsionnée. Une cuillerée à café ou 2 dragées à chacun des 3 repas.

Une cuillerée à café renferme 2 200 unités antirachitiques internationales, 1 dragée renferme 1 000 unités antirachitiques internationales.

Prix public :

Le flacon de solution grand modèle : 18 francs.

— — — petit modèle : 12 francs.

Le flacon de 40 dragées : 16 francs.

VITAMYL IRRADIÉ CHLOROPHYLLÉ

Ampoules buvables.

Chlorophylle pure associée aux vitamines A. B. C. et D.

1 à 3 ampoules buvables par jour.

Chaque ampoule contient 10 cgr. de Chlorophylle et 2 500 unités antirachitiques internationales.

Prix public :

La boîte de 10 ampoules de 3 cc. : 20 francs.

Indications. — Toutes les indications du traitement de carence. Tous les cas de déminéralisation. Les différentes formes de ce produit sont aromatisées et d'un goût agréable.

Laboratoires des Produits AMIDO

A. BEAUGONIN, Pharmacien.

4, place des Vosges — PARIS (IV^e).

VITARGYL

Composition et propriétés. — Protéose argentique dosée à 20 p. 100 d'argent. Très soluble dans l'eau. La solution de Vitargyl est neutre, ne précipite pas par les chlorures en solutions isotoniques aux liquides de l'organisme, ne coagule pas l'albumine. Possède un pouvoir microbicide énergique.

Action thérapeutique. — Sédatif et décongestif externe. Son action non corrosive, parfaitement indolore, ses propriétés excitantes sur les éléments réparateurs des tissus en font l'antiseptique de choix pour toutes les muqueuses.

Application. — Traitements abortifs et curatifs de toutes les affections des yeux, du nez, de la gorge et de celles des muqueuses des voies génito-urinaires.

Pour les besoins de : oto-rhino-laryngologie, ophtalmologie, urologie, gynécologie, est présenté sous forme pure et en préparations (flacon compte-gouttes, ampoules, crayons, ovules, suppositoires).

Le flacon compte-gouttes. 12 francs.

Laboratoires POINTET & GIRARD

30, rue des Francs-Bourgeois — PARIS

VITÈNE

Médication vitaminée, phosphorée.

Composition. — Gouttes :

| | |
|------------------------------|------------------|
| Phosphatides cérébraux | 0 gr. 025 |
| Vitamine A | 200 unités-ra's. |
| — D | 400 — |
| Huile d'olive | Q. S. par 1 cc. |

Capsules :

| | |
|------------------------------|------------------|
| Phosphatides cérébraux | 0 gr. 025 |
| Vitamine A | 100 unités-ra's. |
| — D | 100 — |
| Huile d'olive | Q. S. |

Propriétés. — Le Vitène possède un pouvoir de croissance et anti-anémique remarquable. Agent anti-infectieux et antirachitique puissant, il est aussi fixateur de calcium.

Indications. — Chez l'enfant : Troubles de croissance, Rachitisme, Anémie. — Chez l'Adulte : Convalescence, Surmenage, Lésions bactériennes. — Chez la femme enceinte : Pare aux perturbations du métabolisme du calcium. — A tous les âges : Agent anti-infectieux.

Mode d'emploi. — Nourrissons : X gouttes matin et soir. — Enfants : XX gouttes matin et soir. — Adultes : 2 capsules à midi et le soir au début des repas.

Prix : 20 francs.

Laboratoire A. GUILLAUMIN et A. GÉRARD

Docteurs en pharmacie

12, rue Charles-V — PARIS

VIVOLÉOL

Huile de foie de morue sélectionnée, non irradiée, garantie active et riche en vitamines :

(Vitamines antirachitiques et de croissance.)
(Contrôle biologique rigoureux).

Forme. — Liquide.

Indications :

Troubles de la croissance, de l'ossification, de la dentition, Etats de dénutrition, Lymphatisme, Convalescences.

Posologie :

Enfants — Nourrissons :

XV à XXX gouttes par jour, jusqu'à 1/2 cuillerée à café.

Jusqu'à 3 ans :

1/2 à 1 cuillerée à café.

Au-dessus de 3 ans :

1 à 2 cuillerées à café suivant l'âge.

Adultes :

1 cuillerée à soupe par jour.

(Peut être pris à toute époque de l'année).

N.-B. — Le Vivoléol a été la première huile de foie de morue contrôlée biologiquement.

Prix : 15 francs.

Laboratoires du Docteur ZIZINE

Docteur en Médecine — Docteur en Pharmacie.
Ex-Interne en Pharmacie — Lauréat des
Hôpitaux. — Lauréat des Fac. de Méd. de Paris
et Bordeaux.

24 et 26, rue de Fécamp — PARIS (XII^e).

Tél. : Diderot 28-96.

VOCALDOP

Thérapeutique laryngologique.

- 1° La *poudre Vocaldop* réunit en une seule prescription une *inhalation* et un *gargarisme*.

Une cuillerée à café de *poudre Vocaldop*
 + H²O = Inhalation (respiration nasale).
 + chaude = Gargarisme (bain buccal).
 Inhalation sans alcool. Thèse de Doctorat.

Prix : 8 fr. 95.

- 2° Le *cachet Vocaldop* représente une synergie médicamenteuse adaptée aux trois qualités de la voix parlée et chantée : timbre, puissance, résistance.

Prix : 10 fr. 10.

Indications. — Enrouement, Surmenage vocal, Pharyngite, Laryngite.

Prescriptions. — Deux inhalations par jour, 2 à 3 cachets par jour pendant 15 jours.

LABORATOIRE LARYNGOLOGIQUE
 222, faubourg Saint-Martin — PARIS (X^e).

VOKA

Apporte la solution rationnelle au problème si souvent discuté de l'action du café sur l'organisme.

VOKA

En remplaçant 25 à 30 p. 100 de la dose habituelle de café dans le filtre, ramène la caféine au taux normal et respecte la dose tonique.

Le café au **VOKA** n'énerve pas et, même pris le soir, n'empêche pas de dormir.

Le **VOKA** protège le cœur et les nerfs, mais conserve intacts au café ses propriétés toniques remarquables.

Echantillon et littérature sur demande adressée au Dépôt Général :

VOKA

11, rue Antoine-Bourdelle — PARIS (XV^e).

VULCAPIL

Lotion ininflammable au soufre dissous pour le cuir chevelu.

Propriétés thérapeutiques. — Le VULCAPIL rend aisé, agréable et sans danger le traitement de la Séborrhée et des Alopécies ; il apporte au cuir chevelu le soufre nécessaire à sa kératinisation et le débarrasse de ses sécrétions anormales et des desquamations de pellicules.

Indications. — Affections du cuir chevelu ; Alopécies, Séborrhées.

Mode d'emploi. — Tous les matins faire une friction suivie d'un léger massage du cuir chevelu.

Laboratoires BRISSON

D^r DEDET et Cie, Pharmaciens.

Anciens internes des Hôpitaux de Paris,
157, rue Championnet — PARIS (XVIII^e).

VULCASE

(Comprimés).

Laxatif-cholagogue.

Soufre assimilable. Opothérapie biliaire.

Propriétés thérapeutiques. — Combat la constipation par action directe sur le foie, n'irrite pas l'intestin, ne provoque pas d'accoutumance.

Indications. — CONSTIPATION. Affections du FOIE et de l'Intestin. Dermatoses. Arthritisme.

Mode d'emploi. — Prendre de 1 à 4 comprimés par jour, soit le matin à jeun, soit vers 17 heures.

Laboratoires BRISSON

D^r DEDET et C^{ie}, Pharmaciens

Anciens Internes des Hôpitaux de Paris.
157, rue Championnet — PARIS (XVIII^e).

VULNÉRINE DU D^r BERGEN

Principes actifs. — Camphre associé au Phénol, Naphtol, Ether éthylpyramido-benzoïque, oxyde de zinc, etc...

Forme. — Emplâtre semi-fluide en tube d'étain de 50 cc.

Indications. — Ulcères variqueux, plaies atones, Brûlures, Eczémas, Cancroïdes, Lupus, Erysipèle, Engélures, Impétigo, Cancers ulcérés inopérables, etc.

Pansement précieux :

La VULNERINE calme, déterge, stérilise, épidermise toutes les plaies sans adhérer, sans macérer, sans intoxiquer. Les brûlures sont calmées instantanément et guérissent sans laisser de cicatrices.

Mode d'emploi. — 1 ou 2 applications par jour avec le papier à pansement qui accompagne chaque tube de VULNERINE ou avec de la gaze hydrophile purifiée.

Prix du tube : 12 francs.

Laboratoire DUCOQ

LANGAIS (L.-et-L.).

R. C. Chinon 2059.

LA YAOURTINE

Culture sèche des ferments du Yaourt.

Composition. — Ferments bulgares sélectionnés, protégés, par un enrobage spécial, de l'action oxydante de l'air et de l'humidité (Procédé Nestlé).

Formes. — Dragées et granulé.

Propriétés thérapeutiques. — Spécifique de l'auto-intoxication intestinale et de ses répercussions cutanées, rénales et hépatiques.

Posologie.

Nourrissons. — 1 à 2 cuillerées à café par jour.
Yaourtine granulée.

Enfants et Adultes. — Cas aigus : 2 à 4 cuillerées par jour Yaourtine granulée. Cas chroniques : 10 à 12 dragées par jour.

A prendre à jeun avec lait bouilli, 1 heure avant le repas.

Prix : Dragées, 9 fr. 50 — Granulés, 12 francs.

L.-J. MOUNIER, Pharmacien de 1^{re} classe
18, place de Laborde — PARIS (VIII^e).

Tél. : Laborde 18-20.

YO-ANDROL

Tonique général hormono-vitaminique.

Traitement spécifique des asthénies.

Composition :

Vitamine E, Orchilipoïdes, Antéro-Hypophysine, Cortico-Surrénine, etc...

Indications :

Asthénies, Hypotonies, Asthénie génitale masculine, Opothérapie complémentaire chez la femme.

Dose :

9 pilules par jour, augmenter jusqu'à 12 si cela est nécessaire.

Note. — *Nous préparons aussi une forme sans yohimbine. Veuillez, dans ce cas, prescrire : Yo-Androl sans Yohimbine.*

Prix : 25 francs.

Homologue féminin : Yo-Gynine.

(Lipoïdes et Vitastérines ovariens, Antéro-hypophysine, Vitamine E, etc.).

Laboratoire ISCOVESCO

107, rue des Dames — PARIS (XVII^e).

Tél. : Wagram 07-90.

Adr. tél. : Lipoïdes Paris 54.

YOHIMBINE VICARIO

**Comprimés de Chlorhydrate d'Yohimbine
à 5 mmgr.**

L'YOHIMBINE est un tonique du centre médullaire génito-spinal ; il donne les meilleurs résultats dans l'impuissance quelle qu'en soit l'origine (psychique, paralytique, insuffisance de la glande interstitielle du testicule, etc...)

Dose moyenne. — 3 comprimés par jour, 1 après chaque repas. Le comprimé s'avale comme une pilule ; une gorgée d'eau est prise ensuite.

Dose maxima. — 9 comprimés par jour. Cette dose, qui ne convient qu'à des cas exceptionnellement rebelles, est généralement inutile.

Le tube de 15 comprimés : 4 fr.

La boîte de 60 comprimés : 15 fr.

Laboratoires VICARIO

17, boulevard Haussmann — PARIS (IX^e).

YPTOR

Bougies solubles sans radium pour le traitement local et la prévention des urétrites.

Nature. — Bougies, à base de vitellinate double d'argent et de cuivre, acide urique, excipient non gras.

Antiseptiques, détersives, Antiphlogistiques, Calmantes.

Les bougies YPTOR sont délivrées en tubes scellés et stérilisées dans un milieu lubrifiant, facilitant leur introduction dans l'urètre.

Applications

1° *A titre préventif :*

Après tout rapprochement suspect, uriner, introduire la bougie rotatoire et maintenir en place à l'aide d'un tampon de coton coiffé d'un préservatif.

2° *A titre curatif :*

Une bougie tous les jours précédée ou non d'un lavage au permanganate.

Ne pas uriner pendant les 4 heures suivant l'application du pansement.

Deux longueurs :

Courtes..... 7 cm. Longues..... 15 cm.

Sauf indication particulière du médecin traitant il est exclusivement délivré des bougies courtes.

Pour les longues, BIEN SPÉCIFIER :

BOUGIES LONGUES

Prix de la boîte de 10 bougies courtes : 32 francs.

— — — 5 — — : 17 —

— — — 10 — — longues : 35 —

— — — 5 — — : 18 —

Pour l'urètre féminin, nous conseillons de couper la bougie YPTOR ordinaire de 7 centim. à la longueur voulue.

Laboratoires Pharmaceutiques

L.-G. TORAUDE

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V^e).

ZOMINE

du professeur CH. RICHEL.

Plasma musculaire de bœuf sec et total.

Stimulant de la nutrition en même temps qu'aliment riche en vitamines et facilement assimilable, la Zomine provoque une véritable *régénération musculaire*.

Doses :

| | | |
|-------------|---|------------------------------------|
| 1 gramme | { | 1/2 cuillerée à café de 2 à 4 ans. |
| par | { | 1 — — 4 à 6 — |
| année d'âge | { | 1 — 1/2 — 6 à 8 — |
| ou | { | 2 cuillerées — 8 à 12 — |

Enfants : La Zomine donne aux enfants *anémiques* ou en *période de croissance* les *vitamines* et la ration élevée d'*albuminoïdes* dont ils ont besoin. (Voir : *Orthozomine*).

Adultes : La Zomine est un *aliment médicament* recommandé dans toutes les *anémies*, *convalescences*, *états de grossesse* et *d'allaitement*.

Dose : 2 à 4 cuillerées à café par jour.

Prétuberculose et Tuberculose : Dans les premières périodes de la tuberculose, la Zomine provoque une augmentation de poids des malades traités en même temps qu'une amélioration de l'état général.

Dose : 4 à 6 cuillerées à café (ou 2 cuillerées à soupe) par jour.

La Zomine étant très légère, il faut remplir largement les cuillers sans se contenter d'affleurer les bords comme avec un liquide.

La Zomine doit se prendre dans des aliments tièdes ou froids.

| | | | |
|----------------------|---|---------------------------------|--------|
| Zomine intégrale. | { | Le petit flacon..... | 23 fr. |
| | { | Le grand flacon..... | 45 — |
| | { | La boîte de 4 grands flacons... | 170 — |

Zomine sucrée : en paillettes dosées à 50 p. 100 de Zomine intégrale.

Doses : double des doses de Zomine intégrale.

Le flacon : 25 fr. : La boîte de 4 flacons : 95 fr.
(Voir *Orthozomine*).

Laboratoires LONQUET

34, rue Sedaine — PARIS.

ZOOCYTINE

Composition. — Acides aminés, Acide nucléinique, Lécithine extraite des laitances de poissons. Albumoses de foie et de rate. Catalyseurs minéraux, Vitamines A et D extraites de l'huile de foie de morue.

Indications. — Nouvelle médication tonique vitaminée. Action préventive et curative. Tous les cas de déficience passagère ou chronique de l'état général. Maladies par carence. Rachitisme. Prétuberculose. Diabète. Anémie. Convalescence.

Posologie :

Adultes : *Granulé* : 1 à 6 cuillerées à café au début des repas, dans un peu d'eau.

Suppositoires : 1 à 2 et même 3 suppositoires par jour.

Enfants : *Granulé* : jusqu'à 8 ans, 1/4 de dose, de 8 à 16 ans, 1/2 dose.

Suppositoires : 1 suppositoire par jour.

Prix : 18 francs.

Laboratoires DURET et RÉMY
et du Docteur Pierre Rolland — ASNIERES (Seine).

ZYMATINE LESCÈNE

Poudre lactosée.

Composition. — Ferments, Galactozymases, Alcalinité titrée, Carbonate de Mg., Phosphate de Na et de Mg., Bicarbonate de Na., Lactose.

Propriétés. — Déconstrictant, Cholagogue alcalin, Maternise le lait de vache, Fluidifie le caséum, le peptonifie. Reminéralise. Empêche les fermentations intestinales.

Indications. — *Enfants* : Constipation, Vomissements, Gastro-entérite, Intolérance lactée, Maladies de la nutrition, Dermatoses, Hépatisme. *Adultes* : Constipation, Vomissements, Hyperchlorhydrie, Ulcères de l'estomac, Affections hépatiques.

Doses. — *Enfants* : 2 à 6 mesures par jour dans lait (biberons), eau, bouillies (Eviter température supérieure à 50°). Dans la *constipation*, on peut augmenter les doses sans danger jusqu'à effet.

Adultes : 1 à 2 cuillerées à café dans un demi-verre d'eau avant le repas, 2 à 3 fois par jour.

Constipation. — 1 cuillerée à café 3 ou 4 fois par jour. Avant les repas.

Prix au public : 12 francs.

ZYMATINE IRRADIÉE

Poudre lactosée.

Composition. — Zymatine, Vitamines, Nucléinate de Ca.

Indications. — Anémies, Rachitisme, Prétuberculose, Dénutrition, Déminéralisation, Médication hépato-digestive et reminéralisante associées.

Doses : *Enfants.*

Jusqu'à 6 mois : 1 mesure matin et soir.

— 1 an : — — midi et soir.

Au-dessus de 1 an : 2 mesures matin et soir.

On peut augmenter les doses sans danger :

Adultes : 1 à 2 cuillerées à café 2 à 3 fois par jour.

Prix au public : 10 fr. et 18 fr.

Laboratoires LESCÈNE

PARIS, 58, rue de Vouillé. — LIVAROT (Calvados).

Téléph. : Vaugirard 08-19.

ZYMOGASTRINE KERVAN

Auxiliaire puissant des fonctions digestives.

Forme. — Poudre.

Composition. — Mélange légèrement effervescent de sels alcalins associés à des ferments digestifs.

Mode d'emploi :

A. *Adultes.* — Le matin à jeun : une cuillerée à café délayée dans un demi-verre d'eau.

Dans la journée : une cuillerée à café, soit : une demi-heure avant les deux repas (nausées, fringales, aigreurs, pyrosis), soit : une heure après les repas (comme saturant de l'acidité gastrique primitive ou secondaire).

B. *Nourrissons.* — Une pincée dans un peu d'eau bouillie avant chaque prise d'aliments.

Indications. — Tous états nauséux, états vésiculaires, mal biliaire, dyspepsies de tous ordres. Grossesses nauséuses, vomissements des nourrissons.

Sans contre-indications.

Prix de vente au public : 12 fr.

Laboratoire KERVAN

6, boulevard Arago. — PARIS (XIII^e).

3^e Partie

NOMENCLATURE NOMINALE DES SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES MÉDICALES

**avec les adresses de leurs
Fabricants**

Les noms des produits précédés d'un astérisque figurent dans la 2^e partie du présent ouvrage avec leurs compositions, propriétés thérapeutiques, indications et posologies,

ACTIVITE PHARMACEUTIQUES
MEDICALES

A

- Abactériol** 54, bd Jacqmain, Bruxelles.
***Absuric** 19, rue Drouot, Paris.
Acaïol Lab. LAMO, 26 et 28, rue Paul-
 de-Kock, Paris (XIX^e).
***Acatar** BEAUXIS-LAGRAVE, 74, quai
 Jemmapes, Paris.
***Acécoline-Acecolex** Labor. L. LEMATTE &
 G. BOINOT, 52, r. La
 Bruyère, Paris.
***Acépilline** 74, rue Monge, Paris.
***Acésine Guillaumin** 13, r. Cherche-Midi, Paris (VI^e).
Acétosulfol Huerre 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
***Acétylarsan** SPECIA, 21, rue Jean-Goujon,
 Paris.
Acide oléique P. Thi- 48, rue d'Alésia, Paris.
bault (Voir : Oléocidase.)
Acidural Dupraz 41, r. Etienne-Marcel, Paris.
Acimyl Monimart 23, r. Grand-Cerf, Meaux.
Acitophosan Merminod Merminod, 49, r. Paradis, Paris.
***Acobella** 191, fg St-Antoine, Paris.
***Acodros** BOUVELOT, 62, r. d'An-
 tibes, Cannes (A.-M.).
***Acoégénol** CHAUVIN, Aubenas (Ardèche).
***Acolitol** LANCOSME, 71, av. Victor-
 Emmanuel-III, Paris.
***Acridia** LERSAM, 92, bd Murat, Paris.
Acticalcine 109, rue de Sèvres, Paris.
Actine 60, r. Vieux-Pont-de-Sèvres,
 Billancourt.
Actinophore 84, av. de Saint-Mandé, Paris.
***Actiphos** PROCHIMAL, 10, r. de Flo-
 rence, Paris.
Actipyrine 9, r. Victor-Letalle Paris.
***Adénoseptyl** 50, rue de Turenne, Paris.
***Adipolysine** 2, r. Claude-Matrat, Issy-les-
 Moulineaux.
Adolan 45, r. du Marché, Neuilly.
Adolol D^r LALAURIE, Cuxac-d'Aude.
Adolose Legrand 2, r. des Trois-Frères, Paris.
***Adonal Vicario** 17, bd Haussmann, Paris.
***Adonidine Clin** 20, r. des Fossés-St-Jacques,
 Paris.
***Adoverne Roche** 10, r. Crillon Paris.
***Adral** Lab. ROBERT & CARRIÈRE
 37, r. de Bourgogne, Paris.
Adrénal Vincent 14, av. Mac-Mahon, Paris.
Adrénaline Byla 26, av. Observatoire, Paris.

- *Adrénaline Carrion**
Adrénaline Clin 54, faub. Saint-Honoré, Paris.
 20, r. des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
- *Adrénaline Invar** 7, rue de Jouy, Paris.
***Adrénaline Sauba** Montreuil-Paris.
***Adrénargol** 102, r. Vincent, Marseille.
***Adrénine Mialhe** 8, r. Favart, Paris.
***Adrénocalcine** L. ADAM, à Granville (Manche).
***Adrénol Total (voir** 194, rue de Rivoli, Paris.
Lipoides) ISCOVESCO, 107, r. des Dames, Paris.
Adrénoléine FALVY, 40, r. des Acacias, Paris.
- Adrénophyséine** 14, r. de Clichy, Paris.
Adrénopituine Byla 26, av. Observatoire, Paris.
***Adrépatine Laleuf** 51, rue Nicolo, Paris (XVI^e).
***Adréphédrine Béral** 194, rue de Rivoli, Paris.
Adrialgine 9, r. de la Perle, Paris.
Adrianine 9, r. de la Perle, Paris.
***Aérocid** MIALHE, 8, rue Favart, Paris.
***Aérophagyl** 12, bd St-Martin, Paris.
***Aesculase** MICHELON, 20, bd Heurte-
 loup, Tours.
- *Æthone** 9, r. Boissonnade, Paris.
Afatyl Lab. ISCOVESCO, 107, r. des
 Dames, Paris.
- Agamétol** Lab. SALLE, 4, r. Elzévir,
 Paris.
- Agar du D^r Gigon** 25, bd Beaumarchais, Paris.
***Agarase** RÉAUBOURG, 2, r. Boucicaut,
 Paris.
- Agarham** CATOR, r. Huguerie, Bordeaux.
Agaricine Clauss GILBERT, 6, r. du Laos, Paris.
***Agarol** 53, r. du Poinçon, Bruxelles.
Agaryl Fournier 7, r. Biscornet, Paris.
Agesulf MERMINOD, 49, r. du Paradis,
 Paris.
- Aglo** 21, r. Cacheux, Boulogne-sur-
 Seine.
- Aglucol** PATRICE, à Vichy.
***Agobyl** FOUCHERE, Rive-de-Gier
 (Loire).
- *Agocholine Zizine** 24-26, r. de Fécamp, Paris.
***Agomensine Ciba** 109-113, bd de la Part-Dieu,
 Lyon.
- Agonol Cognet** 43, r. de Saintonge, Paris.
Agosthénine GIRARD, 3, pl. de l'Hôtel-de-
 Ville, Vienne (Isère).
- Agoxyl** LETTRY, 69, rue de Sèvres,
 Paris.
- *Agozymase** 71, av. République, Champigny
 (Seine).
- *Aigue d'Or** 53 bis, bd de la Liberté, Lille.
Aimaquinase Société Régionale de l'Ouest, à
 Rennes.
- Aimhepar** PETIT, 29, r. Jean-Perréal,
 Lyon.

- *Airoglyce
 Akésol Musi
 *Albuol Leisyn
 *Albuplast Vigier
 *Alcacyl Wander
 Alcaderma
 *Alcalinose
 Alcaloïdes seuls et
 combinés
 *Alcamfétol
 Alcasodine
 Aldhylène
 Aldine
 Aldogène Carteret
 Aldor
 *Alepsal Genévrier
 Alfane
 Algaliment
 Algalopol
 *Algane
 Algarine Nyrdhal
 Algarol
 *Algatan
 Algbiogyl
 Algécrine
 Algilaxine
 Algional
 *Algocratine Lancosme
 Algodigestine
 Algolane Poulenc
 *Algonal
 *Algophagine
 Algoplast
 *Algor
 *Algosédine
 Algosédol
 *Algostérine Oliviero
 Algovitine
 *Alibourine
 Alimavèna
 Alimentine Mory
 Aliment Mono
 *Aliment Tinardon
 55, r. Chabrol, Paris.
 Sarlat (Dordogne).
 1 bis, r. Molitor, Paris.
 9, r. de la Gare, Levallois-Perret.
 151 bis, rte de Joinville, Cham-
 pigny (Seine).
 47, r. de la Boule-d'Or, Romilly
 (Aube).
 27, r. Desrenaudes, Paris.
 Labor. DULCIS, place Clichy,
 Monte-Carlo.
 Lab. DOR, 17 bis, av. Parmen-
 tier, Paris.
 GLORY, 38 bis, bd Beaumar-
 chais, Paris.
 74, r. de Rome, Marseille.
 37, r. de la Fédération, Paris.
 15, r. d'Argenteuil, Paris.
 39, r. de la Gare, Bondy (Seine).
 45, r. du Marché, Neuilly (Seine).
 GERAUDEL, 3, r. Watteau,
 Courbevoie.
 47, r. Colbert, Tours.
 132, rue de Turenne, Paris.
 145, r. Saussure, Paris.
 12, r. de la République, Puteaux.
 6, r. des Dames, Paris.
 3-9, r. des Alouettes, Nanterre
 (Seine).
 Lab. Paul Fontanier, Moulins-
 sur-Yèvre (Cher).
 Villefranche-sur-Saône (Rhône).
 Lab. P. Fontanier, Moulins-sur-
 Yèvre (Cher).
 id.
 71, av. V.-Emmanuel-III, Paris.
 PONCET, à Limoges.
 21, r. Jean-Goujon, Paris.
 14, rue Demarquay, Paris.
 UNIS-SPES, 14, r. Demarquay,
 Paris.
 FOURNIER, Dijon.
 137, Grande-Rue, Roubaix.
 DORDIN, 58, Grande Rue
 Harnes (Pas-de-Calais).
 27, r. Georges-Teissier, Saint-
 Etienne (Loire).
 62, bd Jean-Jaurès, Boulogne-
 sur-Seine.
 P. FONTANIER, Moulins-s.-
 Yèvre (Cher).
 Lab. B. E. A., Belfort.
 Bourg-la-Reine (Seine).
 OPTIMA, Gde-Rue au Bois,
 Bruxelles.
 7, r. de Sèze, Paris.
 17, r. Cadet, Paris.

- Allcock's Porous Plaster** 5, r. de la Paix, Paris.
- *Allergantyl Miluc** 37, r. Raspail, Ivry.
- *Alliocardia** BERGER, 14, r. des Pyramides, Paris.
- *Allisatine Sandoz** 20, r. Vernier, Paris.
- Allium Coirre** 5, bd Montparnasse, Paris.
- *Allocaïne Lumière** 45, r. Villon, Lyon.
- *Allochrysine Lumière** id.
- *Allonal Roche** 10, r. Crillon, Paris.
- *Allophaquina** 3, r. Watteau, Courbevoie.
- *Aloïne Houdé** 9, r. Dieu, Paris.
- *Aloplastine** 19, av. d'Orléans, Paris.
- *Aloysine Gouzène** 139, r. de Paris, Pantin.
- *Alsodine** Lab. B. C. L., 29, faub. de Bourgogne, Orléans.
- Althine** 3, r. Barbette, Paris.
- Altsara** 151, r. St-Maur, Paris.
- *Alucol Wander** 151 bis, rte de Joinville, Champigny (Seine).
- *Alunozal** SPECIA, 21, r. Jean-Goujon, Paris.
- *Alzine** 9, av. Jean-Jaurès, Lyon.
- Amalariol** JARMON, 4, pl. de la Gare, Tunis.
- Amandol** 5, av. des Tilleuls, Paris.
- *Amborhinol** 276, r. Lecourbe, Paris.
- Ambrine** 48, bd La-Tour-Maubourg, Paris.
- *Amibiasine** 69, r. de Wattignies, Paris.
- Amicraïgol** AMICROS, 177, r. de Courcelles, Paris.
- *Amidal** 4, pl. des Vosges, Paris.
- Amidon Planche** 2, r. Volney, Paris.
- *Aminoléine** 72, r. de Bagneux, Montrouge.
- *Amino-Sel Byla** 26, av. de l'Observatoire, Paris.
- *Amiphène** CARRON, 69, r. St-Cloud, Clamart (Seine).
- Amipyrine** 113, bd Voltaire, Paris.
- Ampélamine** 7, r. de l'Arbre-Sec, Lyon.
- Ampelodine Bernhard** 11, r. Lafayette, Paris.
- Ampho-Pulvérisateur Ronchèse** 6, r. Rothschild, Nice.
- *Amphosthène** 132, av. Victor-Hugo, Paris.
- *Ampho-Tablettes Ronchèse** 6, r. Rothschild, Nice.
- *Amphotonyl** LERSAM, 92, bd Murat, Paris.
- *Ampho-vaccins de Ronchèse** 6, r. Rothschild, Nice (A.-M.).
- *Ampolases-opolases** 163, r. de Flandre, Paris.
- Ampoules de benzoate et bi-iodure Hg. Vigier** VIGIER, 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
- Ampoules bi-iodure Hg. Midy** 4, r. du Colonel-Moll, Paris.
- *Ampoules Boissy** SOUDAN, 48, r. d'Alésia, Paris.
- *Ampoules Boissy d'Iodure de Potassium** 15, r. Belgrand, Paris.

| | |
|---|--|
| Ampoules Cantonnet | BELIERES, 19, r. Drouot, Paris. |
| Ampoules Churchill | 12, r. Castiglione, Paris. |
| Ampoules de Digalène | HOFFMANN LA ROCHE, & C ^{ie} 10, r. Crillon, Paris. |
| Ampoules Dubé | 177, r. de Courcelles, Paris. |
| Ampoules Egralène | 157, r. Championnet, Paris. |
| Ampoules Brisson | |
| Ampoules « Gay-Lussac » | 1, r. de la Martinière, Lyon. |
| Ampoule huile soufrée | 157, r. Championnet, Paris. |
| Ampoules Brisson | |
| * Ampoules de Pantopon | HOFFMANN LA ROCHE & C ^{ie} |
| « Roche » | 10, r. Crillon, Paris. |
| * Ampoules névros-théniques Dausse | 4, r. Aubriot, Paris. |
| * Ampoules de Spasmalgine Roche | 10, r. Crillon, Paris. |
| Ampoules Optima | Gde-Rue au Bois, Bruxelles. |
| Ampoules Pinceaux | 37, r. de Bourgogne, Paris. |
| * Ampoules Reipar | DRAPIER, à Lucquy (Ard.). |
| Ampoules Romon | 6, r. Bridaine, Paris. |
| Ampoules Sulfa | Cauterets (Htes-Pyrénées). |
| Ampoules Suracti-vantes Leisyn | 1 bis, r. Molitor, Paris. |
| Ampoules Sigmuth | BRISSON, 157, r. Championnet, Paris. |
| Ampoules d'Uriage | 15, Champs-Élysées, Paris. |
| Ampoules V.-E. Doumer | BOMEL à Annonay (Ardèche). |
| * Amunine | BYLA, 26, av. de l'Observatoire, Paris |
| * Amybdine | 22, Cité Trévise, Paris (IX ^e). |
| Amyliodine | 163, r. de Flandre, Paris. |
| Amylobromine | id. |
| * Amylodiastase Thépénier | 12, r. Clapeyron, Paris. |
| * Anacamphre | 37, r. de Bourgogne, Paris. |
| * Anacidase | MEUNIER, Auxerre (Yonne). |
| * Anaclasine Ranson | 121, av. Gambetta, Paris. |
| Anadiposine | FLAHAUT, 74 r. Monge, Paris. |
| * Analgénine | 17, r. Cadet, Paris. |
| AnalGINE dentaire | FANDRE, 4, fg Stanislas, Nancy. |
| Analgol | D ^r LALAUURIE, Cuxac-d'Aude. |
| * Anapeptone Vassal | 28, r. Hôpital-Militaire, Lille. |
| Anaphylène | Lab. HYGIO-DONTIS, Croissy-sur-Seine (S.-et-O.). |
| * Anaquintine Lescène | à Livarot (Calvados) et 58, r. de Vouillé, Paris. |
| Anasectol | DEBRUERES, 66, r. de Paris, Poissy (S.-et-O.). |
| Anatoxine diphtérique | Institut Pasteur, 22 rue Dutot, Paris. |
| * Anaural | Lab. LAMAR, pl. Forbin, Aix (B.-du-Rh.). |
| * Anaxeryl | BAILLY, 15, r. de Rome, Paris |

- Androbion Netter**
***Androcalcion**
Androcrinol
Andropolycrinol
***Androsthérol**
***Androstine Ciba**
Andryl Vicario
***Anégrine Rivier.**
***Anéo Leisyn**
Anestile Bengué
Aneuvryl
***Anexol**
***Angiolympe**
***Angiosedine**
Angiosthénine
***Angioxyl**
***Angitan**
Anhémor
***Aniodol**
***Anoïde**
Anorexyl
Anoxyne
Anozyl
Antacidyl
***Antalgol Dalloz**
Antalgyl
***Antasthène**
Antasthme Gibrand
***Antélobine Byla**
***Anthema**
***Anthracalcine**
***Anthraseptol**
Anthraxone
***Antialgos Christiaens**
Anti-asthmatiques du
D^r Cléry
Antiasthmatique du
D^r Hallay
 100, bd Sébastopol, Paris.
CORTIAL, 7, r. del'Armorique,
 Paris.
 Lab. ISCOVESCO, 107, r. des
 Dames, Paris.
 Lab. ISCOVESCO, 107, r. des
 Dames, Paris.
DEBAT, 60, r. de Monceau,
 Paris.
 109-113, bd de la Part-Dieu,
 Lyon.
 17, bd Haussmann, Paris.
 26-28, r. St-Claude, Paris.
 1 bis, r. Molitor, Paris.
 47, r. Blanche, Paris.
 71, r. du Fort, Aubervilliers.
DROUET & PLET à Rueil-
 Malmaison (Seine-et-Oise).
 4 bis, r. Hébert, Courbevoie.
CORTOT, 36, r. des Archives,
 Paris.
 5, av. de Tilleuls, Paris.
 97, r. de Vaugirard, Paris.
VINCENT, 14, av. Mac-Mahon,
 Paris.
LANCOSME, 71, av. Victor-
 Emmanuel, Paris.
 3-9, r. des Alouettes, Nanterre
 (Seine).
 116, bd Haussmann, Paris.
 36, r. des Francs-Bourgeois,
 Paris.
GUERET, 23, r. des Cordeliers,
 Meung-sur-Loire (Loiret).
D. DEROZIER, 24, r. Jardel,
 Bordeaux.
DURET & RÉMY, à Asnières
 (Seine).
 13, bd La Chapelle, Paris.
MOITY-CHAUZEIX, Neuilly-
 sur-Seine.
 54, fg St-Honoré, Paris.
 199, av. Victor-Hugo, Auber-
 villiers.
 26, av. de l'Observatoire, Paris
SPECIA, 21, r. Jean-Goujon,
 Paris.
SAUBA, Montreuil.
BAUDE, Saint-Aubert (Nord).
 23, r. du Caire, Paris.
 r. du Ch.-de-Mars, à Reims.
 Lab. du D^r CLÉRY, 53, bd
 St-Martin, Paris.
 36, r. Eugène Carrière, Paris.

- *Antiasthme Bengalais** FAGARD, 44, r. d'Aguesseau, Boulogne-sur-Seine.
- *Antiasthmine** 66, r. Nationale, Lille.
- Anticalculose** HUGON, 208, av. Michel-Bizot, Paris.
- *Antibilieux Fuzor** 46, r. Pierre Charron, Paris.
- Antidiabétique Midy** 67, av. de Wagram, Paris.
- *Antidiabétique Monavon** 14, r. Victor-Hugo, Lyon.
- *Antidiabétique Requis** 171, av. Félix-Faure, Lyon.
- Antidolor** 6, r. de Belleville, Paris.
- *Antidouleur Barbessou** Marmande (Lot-et-Garonne).
- Antiépileptique de Liège** 48, r. Claude-Lorrain, Lille.
- Antifébra** 132, r. de Turenne, Paris.
- Antifluor** 26, r. des Petits-Champs, Paris.
- *Antifuronculeux** DOMERGUE, Agen (L.-et-G.).
- Antigastralgique** MIDY & C^{ie}, 67, av. de Wagram, Paris.
- Winckler** DEPRUNEAUX, 18, r. de Beaune, Paris.
- Antigel** 1, pl. Lucien-Herr, Paris.
- *Antigénines** 62, r. Marengo, St-Étienne.
- Antiglaire Forézen** CASTELLANE, Morteau (Doubs).
- Antiglairol** 26, r. des Petits-Champs, Paris.
- Antigonol** 42, r. des Martyrs, Paris.
- *Antigrippal Demay** MIDY & C^{ie}, 67, av. de Wagram, Paris.
- *Antigrippine Midy** 5, r. de la Paix, Paris.
- Antikamnia** 41, bd Haussmann, Paris.
- Antimucose Marian** SALAVERT, Ste-Foy-la-Grande (Gironde).
- *Antinéase** COUTURIEUX, 18, av. Hoche, Paris.
- Antipaludique** 45, rue Villon, Lyon.
- Antipaludique Lumière** CAPIN, Roquefort (Landes).
- *Antiphi** 11, r. du Petit-Parc, St-Maur (Seine).
- *Antiphlogistine** 126, r. de la Pompe, Paris.
- Antiphlogosine** Union chimique Belge, 61, av. Louise, Bruxelles.
- Antiphymase Meurice** 111 bis, r. de Turenne, Paris.
- Antiphymique Vadam** 7, av. des Sources, Nice.
- *Antipiol** 14, r. Gravel, Levallois (Seine).
- Antipsorine** 121, av. de St-Ouen, Paris.
- Antipur** 11, r. Milton, Paris.
- Antipyrine effervescente Le Perdriel** 21, r. Jean-Goujon, Paris.
- Antipyrine U. R.** 19, r. Drouot, Paris.
- *Antirrhoïde Bélières** CHAMBON, pl. Francheville, Périgueux.
- *Antisciatique** C. BARON, aux Sables-d'Olonne (Vendée).
- Antiseptinol** 58, r. de Maubeuge, Paris.
- Antiseptique Nenita** 30, bd Raimbaldi, Nice.
- *Antispasmyl**

- *Antiurique** de Con- 5, av. Victoria, Paris.
tréxeville
- *Antivirus** La Biothérapie, 5, r. Paul-Barruel, Paris.
- Antixénol** 74, r. de Lourmel, Paris (XV^e).
Antodyne Poulenc 21, r. Jean-Goujon, Paris.
- *Antonal** Lab. CARESMEL, 2, q. Paul-Bert, Tours.
- Anuline** 10, r. de l'Union, Clichy.
- *Anurique** Duplex- DREYER-DUFER, Villiers-sur-Marne.
- *Anusol** Lab. du D^r MIALHE, 8, r. Favart, Paris.
- Anytal** Brisson 167, r. Championnet, Paris.
- Anxiol** FALVY, 40, r. des Acacias, Paris.
- *Anxiosédine** 74, fg d'Ambrail, Épinal.
- Anytal** Brisson 157, r. Championnet, Paris.
- Apaludol** AUCLAIR, à Aigurande (Indre).
- *Aphloïne** 61, av. Philippe-Auguste, Paris (XI^e).
- *Aphosal** 48 bis, av. Mozart, Paris.
- Apioline** Chapoteau 8, r. Vivienne, Paris.
- Aplexil** 21, r. Jean-Goujon, Paris.
- Apocynine** du D^r Des- LALEUF, 20, r. du Laos, champs Paris.
- Appetonyl** 27, r. Georges-Teissier, St-Étienne (Loire).
- *Appetyl** 37, av. de la République, Paris.
- Apyrexine** Lab. OPTIMA, 78, Gde-Rue-aux-Bois, Bruxelles.
- Aprol** Vigier 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
- Apsophol** 40, r. des Carmes, Orléans.
- Apyrexine** Optima OPTIMA, 78 Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
- Aquasoluble** 16, r. Ficatier, Courbevoie.
- *Aquintol** Lab. du D^r MIALHE, 8, r. Favart, Paris.
- Arachise** Lab. BÉLIERES, 19, r. Drouot, Paris.
- *Arapal** La Biothérapie, 5, r. Paul-Barruel, Paris.
- *Arcanan** CRUET, 13, r. Miollis, Paris.
- Archésine** Trouette- 15, r. des Immeubles-Indus-Perret triels, Paris.
- *Arcica** 84, r. Rochechouart, Paris.
- *Ardogène** 9, r. du Temple, Enghien (Seine-et-Oise).
- Argent colloïdal élec-** MARONNEAU-MOREL, 156, r. trique des Fauvelles, Courbevoie.
- Argent colloïdal** Nyr- 12, r. de la République, Puteaux-dhal
- *Argion** BÉLIERES, 19, r. Drouot, Paris.
- Argolion** 18, av. Hoche, Paris.
- Argolène** Labor. DULCIS, pl. Clichy, Monte-Carlo.
- *Argybil** LANCOSME, 71, av. V.-Emma-nuel-III, Paris.

- *Argycuprol
- Argyrophédrine
- *Arhémapectine Gallior
- *Arhéol Astier
- *Arhine Lambiotte Fr.
- *Aristargol
- Aristoplast
- Armosine
- Aromalt
- Aromoka R. U. F. É.
- *Arquéritol
- Arrhéнал Adrian
- Arrhéналитine Bureau
- Arrhéниques Clin
- Arrhéномartiol Clin
- Arrhéно-Splénine
- *Arrhénuclène Bergevin
- Arrow-root
- Arsallyl
- *Arsaminol Clin
- Arsébényl Meurico
- *Arsécrinol
- Arsenic Organique
- Glasser
- *Arséniode
- Arsenion
- *Arsénobenzènes Clin
- Arsénobenzol Billon
- Arseno-fer Henry
- *Arsénogéyl
- *Arsénomyl
- *Arsénos-Solvant
- Arsétonyl
- Arsiodyle
- Arsiquinine Lemaitre
- Arsi-quinoforme
- *Arsi-Strychnal Longuet
- Arsoplasmine
- Arsycodyle Leprince
- *Arsylène Roche
- Arsynal Legrand
- Arsysérum
- *Artérase
- 4 bis, r. Hébert, Courbevoie.
- 79, r. de la Roquette, Paris.
- 38, bd Montparnasse, Paris.
- 45, r. du D^r Blanche, Paris.
- 20, r. Dumont-d'Urville, Paris (XVI^e).
- 8, r. du Petit-Musc, Paris.
- VIGIER, 9, r. de la Gare, Levallois (Seine).
- ROUX, 58, r. de Maubeuge, Paris.
- KARCHER, 139, r. des Pyrénées, Paris.
- 54-56, av. République, Paris.
- LESURE, 70, r. du Bac, Paris.
- 9, r. de la Perle, Paris.
- 86, bd Port-Royal, Paris.
- 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
- 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
- 6, r. Mathilde, Courbevoie.
- à Châteaudun (Eure-et-Loir).
- BLOCH, Tomblaine, près Nancy (M.-et-M.)
- 11, square Marie-Louise, Bruxelles.
- 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
- Union Chimique Belge, 61, av. Louise, Bruxelles.
- 92, bd Murat, Paris.
- COIRRE, 5, bd Montparnasse, Paris.
- BURIAT, 25, r. Copernic, Paris.
- 18, av. Hoche, Paris.
- CLIN, 20, r. des Fossés-St-Jacques, Paris.
- 21, r. Jean-Goujon, Paris.
- 39, r. Sclessin, Liège.
- RAVAUD, 6, pl. de Breteuil, Paris.
- MOUNEYRAT, Villeneuve-la-Garenne.
- 19-21, r. Van-Loo, Paris.
- CALMEL-DOMERGUE, 20 bis, r. Gravelotte, Toulouse.
- CHASSAIGNE, Ruffec (Charente).
- 12, r. Vavin, Paris.
- 37, r. Pajol, Paris.
- 34, r. Sedaine, Paris.
- 52, r. La Bruyère, Paris.
- 62, r. de la Tour, Paris.
- 10, r. Crillon, Paris.
- GREMY, 14, r. de Clichy, Paris.
- 46, r. de Rome, Marseille.
- GILBERT, 6, r. du Laos, Paris.

- *Arterion Vincardi**
***Artérioveinine**
 Arthridol
***Arthrila**
 Arthri-sel
 Arthritose
 Arthrol
 Artobyl
Artoradine
***Arvensyl**
 Arzonil
***Ascéine**
***Asciatine**
 Asclérogénol
 Asclérosol
***Ascoléine Rivier**
 Aseborhal
***Aséphéine**
 Aseptampoules
 mesnil
 Aseptène
Aseptobiline
***Aseptone**
***Aseptopoudre**
 Aseptoradol
***Aseptorhine**
***Aseptovules**
 Asepturine
 Asepturol
 Asm
 Aspiphan
 Aspirine Lafran
 Aspirine U. R.
 Aspirine Vicario
 Asquirol Poulenc
***Astasol Douetteau**
 Astéine Biron
 Asthmacidine
 Asthmalène
 Asthmapepton
- VIGUIER**, 14, av. George-Clemenceau, Nice.
 121, av. St-Ouen, Paris.
D^r FRAYSSE, 21, r. de Neuilly, Nanterre.
LYONS, 30, r. Monge, Paris.
 22, rue Morère, Paris.
 La Biomarine, à Dieppe (S.-Inf.).
 11, r. Lafayette, Paris.
DAGONNOT, pl. de l'Hôtel-de-Ville, Cannes (A.-M.).
 Lab. de Radiumthérapie, 25, r. Vaneau, Paris.
GERDA, 163, bd Croix-Rousse, Lyon.
 143, Gde-Rue Guillotière, Lyon.
CIBA, 109-113, bd de la Part-Dieu, Lyon.
 21, r. Jean-Goujon, Paris.
 3, pl. Intérieure St-Michel, Toulouse.
 4, r. Désirée Lyon.
 26, r. St-Claude, Paris.
 25, r. de Tocqueville, Paris.
 20, r. des Fossés-St-Jacques, Paris.
 10, r. du Plâtre, Paris.
COUDERT, 116, av. Ledru-Rollin, Paris.
SCHMIDT, 71, r. Ste-Anne, Paris.
 Lab. MOULIN, 50, r. de République, Puteaux (Seine).
 46, r. de Rome, Marseille.
 Etabl. LABORADIUM, 33, r. St-Jacques, Paris.
 21, r. Feydeau, Paris.
 46, r. de Rome, Marseille.
 30, r. St-Jacques, Namur (Belgique).
 86, bd Port-Royal, Paris.
THORAL, Le Mont-Dore (Puy-de-Dôme).
 26, r. Ste-Claire, Mulhouse.
 8, r. de Prague, Paris.
 21, r. Jean-Goujon, Paris.
 17, bd Haussmann, Paris.
 21, r. Jean-Goujon, Paris.
 20, fg St-Honoré, Paris.
 10, r. Lafayette, Grenoble.
OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
 3, r. de Vouillé, Paris.
 22, bd Circulaire d'Epina, Gennevilliers (Seine).

- Asthmaphédrine** Lab. OPTIMA, 78, Gde-Rue-aux-Bois, Bruxelles.
- *Asthmasédrine** Lab. H. SCHÉHADÉ, 17, r. Chomel, Paris (VII^e).
3, r. du Pont, Epinal.
- Asthmatyl** BERTHON à Dornes (Nièvre).
- *Asthmo-Actine** 3, r. de Vouillé, Paris (XV^e).
- Asthmolène** HOFSTETTER, 6, r. des Cigognes, Strasbourg.
- Athsmolysin** 88, av. J.-B.-Clement, Boulogne-sur-Seine.
- Asthmor** PHILIPPE, Paimpol (C.-du-N.).
- Asthmosine** ROUSSELET, 9, bd de la République, Noisy-le-Sec (Seine).
- Asthmyl** 2, r. Lesdiguères, Paris.
- Asthmylose** 171, av. Félix-Faure, Lyon.
- Asuorol** 126, r. de la Pompe, Paris.
- Atemnol** DORANTOWICZ, 17 bis, av. Parmentier, Paris.
- Atensyl** Lab. JONIDS, Dijon (Côte-d'Or).
- *Athérolysine** 5, pl. Miremont, Vienne (Isère).
- Atihal** MARONNEAU-MOREL, 156, r. des Fauvelles, Courbevoie.
- Atlasantol** id.
- Atolysan** 9, av. Jean-Jaurès, Lyon.
- *Atomine** 13, r. Miollis, Paris (XV^e).
- *Atophan Cruet** Lab. CRUET, 13, r. Miollis, Paris (XV^e).
- *Atophanyl** 19, av. d'Orléans, Paris (XIV^e).
- Atoplastine** 109-113, bd de la Part-Dieu, Lyon.
- *Atoquinol Ciba** 21, r. Jean-Goujon, Paris.
- Atoxyl Pouienc** JOOSS, Montreuil (Seine).
- Atrabiline Gory** CHAUVIN, Aubenas (Ardèche).
- Atropophédrine** 35, r. de Paris, Chichy.
- *Atura** VAILLANT, 19, r. Jacob, Paris.
- *Audigénine** 21, r. Heydeau, Paris.
- Auriculbne** 18, av. Hoche, Paris.
- Aurion** 57, r. Edgar-Quinet, Nantes.
- Autogénol** 28, r. Monge, Dijon.
- Auto Inhalation Legras** 89, r. du Cherche-Midi, Paris.
- Auxergyl** 18, av. Hoche, Paris.
- Avanazol** GOUIN, 20, r. des Écoles, Paris.
- Avantol** 11, r. Lepic, Paris.
- Avistyl** Thévenot, 21, r. des Roses, à Dijon.
- *Azigol** 46, av. des Ternes, Paris.
- *Azotyl** 18, av. Hoche, Paris.
- *Azufrol** PARET, 22, r. Guibal, Marseille.
- *Azym**

B

- *Babeurre Dardelet** Bonnard (Yonne) Tél. : 4, et
 58, fg Poissonnière, Paris.
***Babeurre Guigoz** 19, r. J.-J.-Rousseau, Paris.
***Babeurre Laya** Verme de « La Faye ». Marlihes
 (Loire).
 Babeurre Lactella à Tourcoing.
***Babeurre sec Nestlé** 6, av. César-Caire, Paris (VIII^e).
 « Élédon »
 Babeurre Nutricia 1, bd St-Martin. Paris.
 Babutyrose 59, bd Gambetta, Tourcoing.
 Baby-Bala BRICHARD et fils, Bar-le-
 Duc (Meuse).
 Baby-Ossine Billy-Montigny (Pas-de-Calais).
 Bacilacrine 50, r. de la République, Pu-
 teaux.
 Bacilactine 50, r. de la République, Puteaux
 (Seine).
***Bacillactine Nutricia** 142, r. Fransman, Bruxelles.
***Backérine** 4, pl. des Vosges, Paris.
***Bacté-Coli-Phage** 37, r. de Bourgogne, Paris.
***Bacté-Dysentéri-Phage** id.
***Bacté-Intesti-Phage** id.
***Bacté-Phages** id.
***Bacté-Pyo-Phage** id.
 Bactériophages Leclerc 10, r. Vignon, Paris.
***Bacté Rhino-Phage** 37, r. de Bourgogne, Paris.
***Bacté-Ricyl** 72, r. du Commerce, Paris (XV^e).
***Bacté-Staphy-Phage** 37, rue de Bourgogne, Paris.
***Bactioxyme** 15, rue d'Argenteuil, Paris.
***Bains Bagnorradioactif** 55, r. du Centre, Pantin.
 Bains Brimox Lab. BRIMONT, 74, r. Blanche,
 Paris.
 Bains carbogazeux de Royat Royat (Puy-de-Dôme).
***Bains carbogazeux Wolo** 4, r. d'Illzach, Mulhouse.
***Bain Carré** LANCOSME, 71, av. Victo-
 Emmanuel-III, Paris.
***Bain Flévar** 22, r. de la Sorbonne, Paris.
 Bain de Royan Varech Labor. Marin, Pontallac (Ch.-
 Inf.).
***Bain Salvia** av. Émile Zola, 139, Paris.
 Bains médicamenteux D^r FAYES, 199, r. St-Denis,
 Paris.
 Bakolyse 122, r. Cherche-Midi, Paris.
***Baldisedan** 133, r. Lecourbe, Paris.
***Ballotyl** 113, bd Voltaire, Paris.

- *Balmig 127, bd. St-Michel, Paris.
- Balnacid 49, r. Paradis, Paris.
- *Balnéradol LABORADIUM, 33, r. Saint-Jacques, Paris.
- Balsamiode 19, c. Morand, Lyon.
- *Balsamol Lesclène à Livarot (Caivados) et 58, r. de Vouillé, Paris.
- Balsamorhinol Lab. Fides, 14, r. de la Comète, Paris.
- Balsaniodol 10 r. Washington, Paris.
- Balsapector 15, r. Catulienne, St-Denis (Seine).
- *Balsoforme SPECIA, 21, r. Jean-Goujon, Paris.
- Balsofumine Lab. Deboudaud, 22, r. Turbigo, Paris.
- Balsorhine id.
- Balsorhinol id.
- *Bandes crêpe Néo- 71, fg St-Martin, Paris.
- plastex
- Bandes ulcérophiles 6 ter, r. Voltaire, La Garenne-Colombes.
- Nozan
- Banikol 26, r. de Gonesse, Aulnay (S.-et-O.).
- Bardane stabilisée 4, r. Aubriot, Paris (IV^e).
- Dausse
- Bardanyl 4, imp. de Béarn, Paris.
- Barèges Fagard 44, r. d'Aguessau, Boulogne-sur-Seine.
- Barkyl 30, r. Bobillot, Paris.
- Baromyl Sté française d'Extension Bio-Chimique, St-Quentin.
- *Basedowine GALLIER, 38, bd Montparnasse, Paris.
- *Baume Adol L. GIROUD, 78, c. de la Liberté, Lyon.
- Baume Agerca 30, r. Bobillot, Paris.
- Baume Apard 27, bd de Courtais, Montluçon (Allier).
- *Baume Aroma 1, pl. Victor-Hugo, Paris.
- *Baume Bengué 16, r. Ballu, Paris.
- Baume Bernhard 11, r. Lafayette, Paris.
- *Baume D^r Baissade Saint-Loup, près Marseille (Bouches-du-Rhône).
- Baume D^r Blancard 114, av. Jean-Jaurès, Paris.
- Baume Bocglin 26, r. Ste-Claire, Mulhouse.
- Baume Dalet 24, av. Mathurin Moreau, Paris.
- Baume Darneol HUBERT, Romorantin (L.-et-C.)
- *Baume Daynoc LEJEUNE, 142, rue de Picpus, Paris.
- *Baume Delacour 56, bd Péreire, Paris.
- Baume de Dentition 32, fg Montmartre, Paris.
- Baume de la Faculté 3, pl. Int. St-Michel, Toulouse.
- Baume Dolora 50, r. de la République, Pu-teaux.
- *Baume Durst ROUTIER, 20, r. St-Lazare Paris.

- Baume Fuba**
Baume du Dr Gigon
Baume Iki
Baume Kamol
***Baume Lartigol**
Baume Lorol
Baume Marta
***Baume de la Maternité**
Baume Merveilleux

Baume Oco
***Baume Panthésine « Sandoz »**
Baume Felévine
Baume de Port-Royal

Baume Py
Baume des Pyrénées
***Baume Rhodia**

***Baume Robernard**

Baume Saihel
Baume Saint-Antoine
Baume Saint-Roch
***Baume Selenia**

***Baume du Dr Serin de Gaillac**
***Baume Suelta**

Baume Tanex

Baume Tetyl

Baume Victor

Baume Zénopal
***Baumix**

***Baumolacpinine**
***Béatol**
Béarnyl
Beef Lavoisier
***Beef Lavoix**
***Belcarmine**
***Belhémine**

***Belladenal Sandoz**
Belladone Dausse
***Bellafoline Sandoz**
***Bellergal Sandoz**
Bemax

Bémecé
Benedictus (Produits)
- 37, r. des Lois, Toulouse.
 25, bd Beaumarchais, Paris.
 MERCIER, Fécamp (S.-Inf.).
 6, r. Mathide, Courbevoie.
 78, fg Saint-Denis, Paris.
 ZEDAIRE, à Grenoble.
 BONNAURE, à Alès (Gard).
 7, r. Galvani, Paris.

 RAVAUD, 6, pl. de Breteuil, Paris.
 87, r. Lafayette, Paris.
 20, r. Vernier, Paris.

 16, r. Barbette, Paris.
 MOREL, 2, av. Gambetta, Choisy-le-Roi.
 58, bd Richard-Wallace, Puteaux.
 Chalet du Rêve, Bayonne.
 SPECIA, 21, r. Jean-Goujon, Paris.
 Phar. Moderne, r. Victor-Hugo, Mauléon-Soule (B.-Pyrénées).
 70, Grand'Rue, Sèvres.
 38, r. Soult, Tarbes (H.-P.).
 place Forbin Aix-en-Provence
 DAVID & ses fils, 49, r. de Bitché, Courbevoie.
 Marmande (L.-et-G.).

 16, r. Henri-Regnault, Courbevoie.
 DEBRUERES, 66, r. de Paris, Poissy (S.-et-O.).
 7, r. Guillaume-Budé, Montgeron.
 PELAUD & BAYLE, La Courtine (Creuse).
 Miribel (Ain).
 Ph. DELAPRÉE, Mortagne (Vendée).
 4, r. d'Illzach, Mulhouse.
 46, av. des Terres, Paris.
 à Salies de Béarn.
 Moulins-sur-Yèvre (Cher).
 5, av. Victoria, Paris.
 33, Gde-Rue, Besançon.
 Lab. de Sérothérapie, 3, impasse Adam, Boulogne-s.-Seine.
 20, r. Vernier, Paris.
 4, r. Aubriot, Paris (IV^e).
 20, r. Vernier, Paris.
 20, r. Vernier, Paris.
 4^{ter}, r. Barbès, Courbevoie (Seine).
 21, r. Violet, Paris.
 74, r. Lamarck, Paris.

- *Bensamine 74, quai Jemmapes, Paris.
- Benzhermyl 36, q. Fulchiron, Lyon.
- Benzoate Le Perdriel 11, r. Milton, Paris.
- Benzoate de Naphal FRAUDIN, 4, av. Desfeux, Boulogne-sur-Seine.
- *Benzo-Bismuth Millot 177, r. de Courcelles. Paris.
- Benzobromine HERAULT, 14, pl. de l'Hôtel-de-Ville, Beauvais.
- Benzocalyptol 213, r. St-Honoré, Paris.
- *Benzocarbène FOUCHERE, Rive-de-Gier (Loire).
- *Benzoflorine Julien 105, r. de Rennes, Paris.
- Benzo-Gynœstryl Lab. du Dr ROUSSEL, 89, r. du Cherche-Midi, Paris.
- *Benzo - iodhydrine 36, r. de Paris, Colombes (Seine).
- Bruel 38, r. Albouy, Paris.
- Benzolactine 10, r. du Parc-Royal, Paris.
- Benzo-Lactol 2, r. du Champ-de-Mars, Reims.
- Benzo phosphine Christiaens 4, r. Alexandre-III, Dunkerque.
- *Benzoquinol 9, r. Boissonade, Paris.
- Benzo-Ringyl 50, r. de la République, Puteaux.
- Benzothymol 37, r. de Bourgogne, Paris.
- *Benzoyanyl Lab. DOR, 17 bis, av. Parmentier, Paris.
- *Benzylcalcium 37, r. Galilée, Paris.
- *Benzylol 61, av. Louise, Bruxelles.
- Berkendyl 199, r. St-Denis, Paris.
- Béryline du Dr Fayès Rennes (Ille-et-Vilaine).
- Bestol du Dr Lavoué 67, av. de Wagram, Paris.
- *Bétul-Ol Midy 6, r. Balainvilliers, Clermont-Fd.
- Bexinine Amblard 13, r. Beudant, Paris.
- Bexoforme MARONNEAU-MOREL, 156, r. des Fauvelles, Courbevoie.
- Bi-98 Lab. chimie physiologique, 37, r. Tivoli, Bordeaux.
- Bianterol Lab. ORRILLARD, 245, r. de Vaugirard, Paris.
- Biarsol 1, pl. Lucien-Herr, Paris.
- *Biazan 17, bd Haussmann, Paris.
- Bibromure de Hg Vi-cario 52, r. de Flandre, Paris.
- *Bi-Citrol Marinier 276, r. Lecourbe, Paris.
- Bicollyre 77, rte d'Orléans, Montrouge.
- Bière Fanta (nourrices) 98, r. J.-Mailotte, La Madeleine (Nord).
- Bifermments lactiques Lab. SEVIGNE, 76, r. des Rondeaux, Paris.
- stables 54, r. de Paris, Charenton.
- Bigara BOMEL, à Annonay (Ardèche).
- Bigynol 12, r. de Nice, Paris.
- Bi-Iodural Novat 20 bis, r. Gravelotte, Toulouse.
- Bi-iodure Cros 4, r. du Colonel-Moll, Paris.
- Bi-iodures Domergue 98, r. de Sèvres, Paris.
- Bi-iodure Midy 85, av. de Neuilly, Neuilly-s/S.
- Bi-iodure Souffron
- *Bikréol

- *Bilaxyl
 Bilentéric
 Bilexabol
 *Biléyl Fournier
 *Biliase Raby
 *Biliboldo
 7, r. des Petits-Carreaux, Paris.
 112, r. de Gerland, Lyon.
 156, r. des Fauvelles, Courbevoie.
 7, r. Biscornet, Paris.
 à Asnières (Seine).
 Lab. LAMAR, pl. Forbin, Aix
 (B.-du-R.).
 *Bilifluine
 Lab. STENE, 2, pl. des Vosges,
 Paris.
 Bili-Magnétol
 M. A. ROUX, 58, r. de Maubeuge,
 Paris.
 *Biliogastrine Chevillon
 CHEVILLON, 99, r. de Paris,
 Massy (S.-et-O.).
 Biliol Bouty
 3, r. Dunkerque, Paris.
 Biliose Vichy
 PATRICE à Vichy.
 Bilirhéine
 41, r. Etienne-Marcel, Paris.
 *Bilivaccin
 La Biothérapie, 5, r. Paul-
 Barruel, Paris.
 id.
 *Bilivaccin Anticoliba-
 cillaire
 *Billabstine
 BASUYAUX, 94, r. Pasteur,
 Fontenay-sous-Bois (Seine)
 Billeros
 33, r. Rennequin, Paris.
 Billirgyl
 30, r. Miromesnil, Paris.
 Bilolive
 GILBERT, 6, r. du Laos, Paris.
 Biminéral Reynaud
 DURAND, à Aigues-Mortes.
 Binol Roger
 177, bd St-Germain, Paris.
 *Binoxol
 145, bd Haussmann, Paris.
 Biocalcino
 AUGIER, 2-4, r. des Lom-
 bards, Paris.
 Biocalcium
 66, r. Nationale, Lille.
 *Biocalcos e
 LEMATTE & BOINOT, 52, r.
 Labruyère, Paris.
 Biocalmine
 DEHAUSSY, 66, r. Nationale,
 Lille.
 *Biocatalyseur Rolland
 85, r. Victor-Hugo, Levallois-
 Perret.
 *Biocéane
 62, boul. J.-Jaurès, Boulogne-
 s.-Seine.
 *Biocholir e
 ROBERT et CARRIERE, 37, r.
 de Bourgogne, Paris.
 Biocrine
 122, fg St-Honoré, Paris.
 Bioderma
 Gonneville-la-Mallet (S.-Inf.).
 Biodermyl Mon 1
 6, r. Bridaine, Paris.
 Bi-iodural Novat
 Annonay (Ardèche).
 *Biodynamine
 17, r. Cadet, Paris.
 *Biodynol
 FOUCHERE, Rive-de-Gier
 (Loire).
 Bi-iodure de mercure
 67, avenue de Wagram Paris.
 indolore Midy
 Bioforcil
 1, r. des Augustins, Perpignan.
 *Bioentérase
 69, r. de Wattignies, Paris.
 Biogastrine
 1, bd Henri-IV, Paris.
 *Biogénol Demasles
 Vienne (Isère).
 Biogésine Rochard
 à Lorient.
 *Biolactyl Fournier
 7, r. Biscornet, Paris.

- *Biolax**
Biomagnésium
***Biomucine**
***Bionéol**
Bionergy
Bionine
Bionucléine
***Biopausine**
***Biophorine Girard**
Biophosphine
***Biophylactine M.-G.**
Biophytol
Bioplasmyl

***Bioplastine Sersono**
Biopulmol

Biorénine
***Bio-Sel**
Biosérine
***Biosine le Perdriel**
Biotose Ciba

***Biotrignon**
***Biovigorine**

Biovital

Bioxyl
Biozol
Biquinyl Meurice

Bircol Mauchant

Bi-Ricin
***Bisalcylate**

Bisaly

Biskalose

Biscamph
Biscops Fraudin
Biscopaks Clin
Biscottes Delft
Biscottes Grégoire
Biscottes et Biscuits
Nutricia
Biscottes Rabiet
Bisermol

***Bis-Hyd**

***Bis-ka-ma**

Bismétine Clin
- ADLER, 36, r. des Francs-Bourgeois, Paris.**
20, fg St-Honoré, Paris.
37, r. de Bourgogne, Paris.
14, r. de Périgueux, Angoulême.
16, r. St-Gilles, Paris.
LECRONIER, Domfront (Orne).
4, imp. de Béarn, Paris.
32, r. de l'Ouest, Paris.
48, r. d'Alésia, Paris.
DEPOUILLY, Le Creusot.
116, av. Berthelot, Vienne (Isère).
90, av. des Ternes, Paris.
LE DAVAY, 2, r. Notre-Dame, Guingamp (Côtes-du-Nord).
25, r. Dagorno, Paris (XII^e).
Lab. Termes, Miramont de Guyenne (Lot-et-Garonne).
12, r. Pavée, Paris.
5, r. Diderot, Nice.
63, cours Victor-Hugo, Lyon.
11, r. Milton, Paris.
109-113, bd de la Part-Dieu, Lyon.
22, r. Perceval, Paris.
4, r. du Médoc, Le Bouscat, près Bordeaux.
Lab. DEXO, 23, r. Danton, Paris-Levallois.
Hussigny (M.-et-M.).
25, r. Drouot, Paris.
Union Chimique Belge, 61, av. Louise, Bruxelles.
22, bd Circulaire d'Epinay, Gennevilliers (Seine).
72, route de Châtillon, Malakoff.
Lab. du Gastrocarbone, St-Louis (B.-du-R.).
JONIDS, 9, bd Sévigné, Dijon (Côte-d'Or).
HOSSELOPP GRANDADAM, ph^{ie}, Buhl (Bas-Rhin).
5, r. Lefebvre, Paris.
4, av. Desfeux, Boul.-sur-Seine.
20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
45, r. Grange-aux-Belles, Paris.
24, r. du Bois, Clichy (Seine).
142, r. Fransman, Bruxelles.

55, ch. d'Antin, Paris.
VIGIER, 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
45, r. du Marché, Neuilly-Paris.
DURET et REMY, Asnières (Seine).
20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.

Bismhydral*Bismint*****Bismokaol****Bismucarbonate****Bismupaine*****Bismusodine****Bismutartrol*****Bismuth B3*****Bismuth (Crème de)****Bismuth Adler*****Bismuth Desleaux*****Bismuthion****Bismuth léger Adrian*****Bismuthoidol Robin****Bismuth Perroud*****Bismuth Tulasne****Bismuth 25****Bismuthyl « Maurice »****Bisquina****Bissine****Bissol****Bistan*****Bivatol****Bivigor****Blagny (gouttes, dragées, sirop)****Blastéase****Blécao Jacquemaire*****Blédine Jacquemaire*****Blennopiat****Blennoradine*****Blennosine****Blennotoxyl****Bléomaltine****Bleusantal*****Blocs Vécrr****Blokao****Blutetine*****Bluyt****Bokanol****Bolcitol****Boldagar*****Boldine Houdé****Boldine Verne****LANCOSME, 71, av. Victor-Emmanuel-III, Paris.****2, r. Paradis, Paris.****23, r. Danton, Paris-Levallois.****7, Petite Place, Douai.****194, r. de Rivoli, Paris.****3, r. Royet, Lyon-Caluire.****RAVAUD, 6, pl. de Breteuil, Paris.****BORNET, 5 bd des Brotteaux, Lyon.****12, r. de Buci, Paris.****36, r. des Francs-Bourgeois, Paris.****71, av. V.-Emmanuel-III, Paris.****18, av. Hoche, Paris (XVI^e).****9, r. de la Perle, Paris.****13, r. de Poissy, Paris.****7, r. des Archers, Lyon.****48, bd des Batignolles, Paris.****OPTIMA, Grande-Rue au Bois, Bruxelles.****61, av. Louise, Bruxelles.****7, r. Guillaume-Budé, Montgeron.****DECAUD, St-Hilaire-des-Loges (Vendée).****7, r. Guillaume-Budé, Montgeron.****DUCATTE, 31, r. Francs-Bourgeois, Paris.****Lab. du D^r Roussel, 89, r. du Cherche-Midi, Paris.****SCOTT, 38, r. du Mont-Thabor, Paris.****21 r. de la République, Forges-les-Eaux.****21, pl. des Vosges, Paris.****à Villefranche (Rhône).****à Villefranche (Rhône).****GIROUD, 78, c. de la Liberté, Lyon.****Radiumthérapie, 25, r. Vaneau, Paris.****23, r. du Caire, Paris.****172, r. d'Alésia, Paris.****AXAREL, 15, r. Catulienne, St-Denis (Seine).****DUC, 24, av. Mac-Mahon, Paris.****3, imp. Adam, Boulogne-Billancourt.****BLOCH, à Tomblaine (M.-et-M.).
MEILLER, Dumières (Haute-Loire).****6, av. Mirabeau, Nice.****156, r. des Fauvelles, Courbevoie.****88, r. Duhesme, Paris.****239, fg St-Honoré, Paris.****9, r. Dieu, Paris.****13, r. Docteur-Mazet, Grenoble.**

- Boldo-Basma**
Boldo-Biline
***Boldobyl**
***Boldocrinol**
Boldo Glucine Chapc-
teaut
***Boldo-Gmet**
***Boldoine Eparvier**
***Boldolactic Lagoutte**
Boldolactol
***Boldorhéine**
***Boldo-Verne**
***Boléase Monal**
***Bolène**
Bonbons Lucas (Ver-
micifuges)
Bonbons vermifuges
Royer
***Boréol**
***Boricine Meissonnier**
Bornyval
Boro-borax Vigier
Borocalcy! Thévenot
Boroseptine
***Borosodine Lumière**
***Borostyrol**
Borotropine Sevin
Bouchons Radioactifs
Emania
Boues Radioactives
Emana
Boues Radioactives de
Pistyan - les - Bains
(Tchécoslovaquie).
Boues radioactives
Rhemda
Bougies Américaines
Bougies Chaumel
Bougies coricides Der-
mopode
Bougies Franklin
Bougies radioactives
Rhemda
Bougies Raynal
Bouillon Vaccin opéra-
toire Sténé
***Boules Quiès**
Bouragar
- 9, pl. Félix-Faure, Paris.
 DUCLOY et Cie, Arques (P.-de-
 Calais).
 SAUBA, Montreuil (Seine).
 Lab. JAMMES, 86, r. Michel-
 Ange, Paris.
 8, r. Vivienne, Paris.
 27, fg Montmartre, Paris.
 26, Grande-Rue St-Clair, Lyon.
 85, cours Albert-Thomas, Lyon.
 A. SALLES, 11, bd de Stras-
 bourg, Paris (X^e).
 D^r CHAPELLE, 8, r. Vivienne,
 Paris.
 à Grenoble (Isère).
 6, r. Bridaine, Paris.
 46, r. Pierre Charron, Paris.
 JOUBERT & SIBASSIÉ,
 Nantes.
 LAUMONNIER, 225, r. St-Mar-
 tin, Paris.
 21, r. Feydeau, Paris.
 LOGEAI, 22 bis, r. de Silly,
 Boulogne-sur-Seine.
 2, r. des Lions, Paris.
 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris
 21, r. des Roses, Dijon.
 20 bis, r. Sergent-Godefroy,
 Montreuil-sous-Bois.
 45, r. Villon Lyon,
 MAYOLY, 1, pl. Victor-Hugo,
 Paris.
 2 bis, r. Chevallier-de-la-Barre,
 St-Quentin.
 14, r. de la Pépinière, Paris.
 14, r. de la Pépinière, Paris.
 45, r. du Marché, Neuilly.
 17, r. d'Hauteville, Paris.
 LOGEAI, 24, r. de Silly,
 Boulogne-sur-Seine.
 78, fg St-Denis, Paris.
 22, r. St-Pierre, Evreux.
 100, bd Sébastopol, Paris.
 17, r. d'Hauteville, Paris.
 12, r. de Nice, Paris.
 2, pl. des Vosges, Paris.
 47, bd Victor, Paris (XV^e).
 BONNAURE, à Alès (Gard).

| | |
|--------------------------------|--|
| Bourgène Blanc | CELLIER, 8, r. de Loge, Montpellier. |
| Boustrol | FUMOUBE, 78, fg St-Denis, Paris. |
| Bouteilles Radioactives | 14, r. de la Pépinière, Paris. |
| Emana | Bourg-la-Reine (Seine). |
| Bovavèna | Lab. de la Carnine Lefrancq, |
| Bov'Bilic | 32, r. de Metz, Romainville (Seine). |
| Bov'Cardiac | id. |
| Bov'Hépatie | id. |
| Bovstrol | id. |
| *Bradygastrine | DUCLOY et C ^{ie} , Arques (P.-de Calais). |
| Brévanyl | 15, q. de Bourbon, Paris. |
| Brodynol | FAUCHÈRE, 44 bis, r. du Mouillon, Rive-de-Gier (Loire) |
| *Bromadyl Vicario | 17, bd Haussmann, Paris. |
| Bromalbin Adrian | 9, r. de la Perle, Paris. |
| *Broméine Montagu | 49, bd Port-Royal, Paris. |
| Bromhydrate Le Per- | 11, r. Milton, Paris. |
| driel | |
| Bromhyl P. Peyre | 42, av. de Breteuil, Paris. |
| *Bromiase | 18, av. Hoche, Paris. |
| Bromidia | 5, r. de la Paix, Paris |
| Bromidine Henry | 39, r. Sclessin, Liège. |
| Bromocarbène | LEURQUIN, 50-52, r. Pierre-Légrand, Lille. |
| Bromocarpine Rocher | 32, r. Grenelle, Paris. |
| Bromoderme | 8, av. Walkanaer, Nice. |
| *Bromo-Garnal | 13, r. Boinod, Paris (XVIII ^e). |
| Bromogastrine | 4, imp. de Béarn, Paris. |
| *Bromogénol Pépin. | à Courbevoie (Seine). |
| *Bromomaïsine | 48, r. d'Alésia, Paris. |
| *Bromone Robin | 13, r. de Poissy, Paris. |
| Bromopirine | PATRICE, à Vichy. |
| Bromostrontium | MERMINOD, 49, r. du Paradis, Paris. |
| Bromovaleron Henry | 39, r. Sclessin, Liège. |
| *Bromovose | Lab. MADYL, 14, r. Miro-mesnil, Paris. |
| *Bromure de calcium | D ^r VERMERSCH, 71 r. St-Jacques Paris. |
| Bromure de camphre | 20, r. Bosses-St-Jacques, Paris. |
| Clin | |
| Bromure d'éthyle | OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles. |
| Bromure Laroze | 2, r. des Lions, Paris. |
| Bromures Pachaut | 130, bd Haussmann, Paris. |
| Bromure de sodium du | 25, bd Beaumarchais, Paris. |
| D^r Gigon | |
| Bromures Souffron | 98, r. de Sèvres, Paris. |
| Bronchasmine | THORAL, Le Mont-Dore (Puy-de-Dôme). |
| Bronchitol | H. SALLE, 4, r. Elzévir, Paris. |
| Bronchitol | 39, r. de Sclessin, Liège (Belgique). |

- Cachets Canol
 * Cachets du D^r Bovéil
 Cachets C. A. S.
 Cachets Céli
 Cachets Charvoz
 Cachets Cy-troène
 Cachets Dellé
 Cachets Dolozymes
 Cachets digestifs Carbowil
 Cachets digestifs du D^r Bern
 Cachets digestifs Gydé
 Cachets du D^r Faivre
 Cachets Gau
 Cachets Hériol
 * Cachets Kapytan
 Cachets Laxa
 Cachets Louix
 Cachets Merveilleux
 Cachets opothérapiques Byla
 * Cachets Pachaut
 Cachets parégoriques
 Cachets Phebor
 Cachets Phydès
 Cachets Prodiges
 Cachets Pyrana
 Cachets Rava
 Cachets Réal
 Cachets réparateurs
 * Cachets Roche de Thiocol
 Cachets de Roux
 * Cachets Spévin
 Cachet Urby
 * Cachets Van-Sol
 Cacodylate Vigier
 * Cacodyle Gonnon
 Cacodyle Mars
 * Cacodyline Jammes
 Cacocylo Phosphate vital Jacquemaître
 Cacospermine
 Cacticardine D^r Conrau
- 39, r. de l'Arbalète, Paris.
 1, r. Lassalle, Lyon.
 49, r. de Metz, Nancy.
 LANDES, à Gramat (Lot).
 3, chem. du Vallon, Lyon-Caluire (Rhône).
 Lab. de l'Adour, 38, r. Soult, Tarbes.
 LENAOUR, à Quimperlé (Finistère).
 SAUBA, Montreuil, Paris.
 13, r. St-Agricol, Avignon.
 3, pl. Intérieure St-Michel, Toulouse.
 4, cours Tolstol, Lyon.
 à Lyon.
 87, r. de la République, St-Mandé (Seine).
 THÉVENIN, Feurs (Loire).
 76, r. de Sèvres, Paris.
 AUGIER, 2, r. des Lombards, Paris.
 GIROUD, 78, cours de la Liberté, Lyon.
 Usine du Blosset, Moulins-sur-Yèvre (Cher).
 26, av. de l'Observatoire, Paris.
 130, bd Haussmann, Paris.
 BERNHARD, 11, r. Lafayette, Paris.
 64, r. des Tournelles, Paris.
 Miribel (Ain).
 12, r. Grande, Evreux.
 26, ch. de la Madeleine, Nantes.
 4, ch. de la Muette, Paris.
 62, r. Petits-Champs, Paris.
 HÉRIN, 98, r. Jeanne-Maillotte, La Madeleine.
 HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}, 10, r. Crillon, Paris.
 56, r. des Minimes, Marseille.
 CHAUVIN, 3, r. de Vouillé, Paris (XV^e).
 P. DORDIN, Harnes (P.-de-C.).
 18, r. du Maréchal-Foch, Versailles.
 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
 14, r. Victor-Hugo, Lyon.
 21, r. Alsace-Lorraine, Lyon.
 86, r. Michel-Ange, Paris.
 à Villefranche (Rhône).
 Lab. Sasse, 78, bd Beaumarchais, Paris.
 à Caudebec (Seine-Inférieure).

- *Cador
CadmioI zinc
Cæcaline Gagnière
Cafacétyl-Codéine
- *Cafédrine
Caféine Houdé
Caféine Invar
Calcéose Boillo
- *Calcibronat Sandoz
Calciclo
Calcifixine Bureau
Calcigénie
- *Calcigénol
- *Calcigénol irradié
- *Calciline
*Calcional
Calci-Ostéline
Calciphorine
Calciphose
- Calcitanol
- *Calcisthénine
Calcitrine
*Calcium Francalcion
*Calcium Sandoz
*Calcvitam
Calco-céril
- *Calcoléol
- *Calcomagnésie
Calco magnésol
Calcophore
Calcothéobromine
- *Calcozymase
*Calmaby
*Calmag. Na.
- *Calmant Meunier
Calmel
*Calmocardine Lagoutte
Calmogastrol
Calmigorge
Calmitine
- *Calmosuppos
Calogyre
Calomel R. B. Lagrave
- 10, r. Vignon, Paris.
Labor. DULCIS, pl. Clichy,
Monte-Carlo.
à Clermont-Ferrand.
BŒGLIN, 26, r. Ste-Claire,
Mulhouse.
SAUBA, Montreuil (Seine).
9, r. Dieu, Paris.
7, r. de Jouy, Paris.
9, r. St-Paul, Paris.
20, r. Vernier, Paris.
4, imp. de Béarn, Paris.
86, bd Port-Royal, Paris.
90, bd St-Denis, Courbevoie
(Seine).
PINARD, 90, bd St-Denis,
Courbevoie (Seine).
90, bd St-Denis, Courbevoie
(Seine).
21, r. Violet, Paris.
LEMATTE & BOINOT, 52, r.
La Bruyère, Paris.
46, r. Claude-Lorrain, Lille.
74, r. de la Jonquière, Paris.
BERGER, 14, r. des Pyramides
Paris.
7, r. des Petits-Carreux, Paris.
MAIRE, 171, r. de Belleville,
Paris.
DIGNE fils à Fréjus (Var).
20, r. des Écoles, Paris.
20, r. Vernier, Paris.
r. de Moulleau, Arcachon.
16, r. Ste-Croix-de-la-Breton-
nerie, Paris.
Produits SCIENTIA, 21, r.
Chaptal, Paris.
47, r. Bokanowski, Asnières.
52, bd Diderot, Paris.
6, r. Raoul-Berton, Bagnolet.
49, r. de Paradis, Paris.
3, r. Fernand-Widal, Paris.
84, r. Rochechouart, Paris.
SUBSTANTIA, 13, r. Pagès,
Suresnes.
r. du Commerce, Montmarault
(Allier).
34, r. Thiers; Gray (Hte-Saône).
85, cours Albert-Thomas, Lyon.
132, av. Victor-Hugo, Paris.
à Thury-Harcourt (Calvados).
BILLEBAUD, Paray-le-Monial
(S.-et-L.).
BOIVERT, La Mothe-St-
Heraie (Deux-Sèvres).
IMBERT, à Toulon (Var).
74, quai de Jemmapes, Paris.

- Calomel Vicario**
*** Calox**
Calsédine
Camphemol
Camphex
*** Camphocalyptol**
*** Camphodausse**
Camphoral Aguetant
Camphoran
*** Campho - Spartéine**
Dubois
*** Camphostyl**
*** Camphro-Salyl Fraisse**
*** Camphydryl Robin**
*** Camphydryl strychno-**
spartéiné Robin
*** Canol**
*** Cantéine Bouteille**
Caoglands
*** Caparlem**
Capillairal
Capsellase
Capsol
Capsoléol
Capsorhinol
Capsovules Diptlos
Capsules Bonnefond
Capsules Bruel
Capsules Cédro-Mé-
thyle
Capsules Cognet
*** Capsules Dartois**
Capsules de Gonosan
Capsules d'Euviscol
Capsules Dieu
Capsules Enos
*** Capsules et sirop Préga**
Capsules Goubaux
*** Capsules grises Ca-**
banes
Capsules Gurgol
*** Capsules Haarlem**
Bardet
Capsules d'Hojasol
Capsules d'Ichtyol Vi-
gier
Capsules Franklin
- 17, bd Haussmann, Paris.
 5, r. de la Paix, Paris.
 GERDA, 163, bd. Croix-Rousse,
 Lyon.
 1, pl. Morand, Lyon.
 59, bd Lefebvre, Paris.
 ECHEMAN, 26, r. des Moines,
 Paris.
 4, r. Aubriot, Paris (IV^e).
 36, q. Fulchiron, Lyon.
 59, bd Lefebvre, Paris.
 16, bd Pereire, Paris.
 LACROIX, 37, r. Pajol, Paris.
 8, r. Jasmin, Paris.
 13, r. de Poissy, Paris.
 id.
 39, r. de l'Arbalète.
 23, r. des Moines, Paris.
 10, r. Poncelet, Paris.
 Lab. Lorrain de Pr. Synthé-
 tiques Purs, Etain (Meuse).
 ARQUEVAUX, Etampes (S.-
 et-O.).
 13, pl. Delille, Clermont-Ferrand.
 74, r. Blanche, Paris.
 Lab. ANINAT, à Nîmes (Gard).
 17, r. Chomel, Paris.
 18, r. Pierre-Curie, Paris.
 49, bd Port-Royal, Paris.
 36, r. de Paris, Colombes (Seine).
 55, r. de Chabrol, Paris.
 43, r. de Saintonge, Paris.
 6, r. Abel, Paris.
 2, r. des Lions, Paris.
 44, r. d'Aguesseau, Boulogne-
 s.-Seine.
 2, r. Marché des Blancs-Man-
 teaux, Paris.
 Lab. BAPAUME, 85, av. de
 Neuilly, Neuilly-sur-Seine.
 DEHAUSSY, 66, r. Nationale,
 Lille.
 2, r. du Champ-de-Mars, Reims.
 17, r. Cadet, Paris.
 JEHAN & BRERA à Montau-
 ban (Lot-et-Garonne).
 76, r. de Sèvres, Paris.
 19, r. Ferdin.-Duval, Paris.
 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
 100, bd Sébastopol, Paris.

- *Capsules Joret et Homolle 165, r. St-Honoré, Paris.
 *Capsules Kuchner HINGLAIS, Épernay (Marne).
 Capsules de Morrhuine Puy Grenoble (Isère).
 *Capsules Noguès 7, rue Galvani, Paris.
 Capsules Ovigéniques 50, r. de la République, Puteaux.
 Capsules Pneumal 172, r. d'Alésia, Paris.
 Capsules Raquin 78, fg St-Denis, Paris.
 Capsules salolées LACROIX, 31, r. Philippe-de-Girard, Paris.
 Capsules Sérafon 9, r. de la Perle, Paris.
 Capsules de sulfate de quinine 8, r. Vivienne, Paris.
 Capsules Taetzel 2, r. Lesdiguères, Paris.
 Capsules Therpinol 14, r. Victor-Hugo, Lyon.
 Capsules Vigier 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.
 *Carb Lab. MARCEAU, 7, av. Marceau Paris.
 *Carbagol Marinier 52, r. de Flandre, Paris.
 Carbaïne Clin 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
 Carbalcaloïdes MONTAGU, 49, bd Port-Royal, Paris.
 Carbalga id.
 *Carbargyre 7, av. Marceau, Paris.
 Carbarseno 49, bd Port-Royal, Paris.
 *Carbatropine id.
 Carbémétine id.
 Carbeserine id.
 *Carbobel 12, r. du Téléphone, Bruxelles.
 Carbocarpine 49, bd Port-Royal, Paris.
 *Carbocitril 64, bd Barbès, Paris.
 *Carbo-Combrosmol 59, r. Boissière, Paris (XVI^e).
 *Carbofixine 34, r. Sedaine, Paris.
 Carboiodine 132, r. de Turenne, Paris.
 *Carboiodure Fraudin 4, av. Desfeux, Billancourt (Seine).
 *Carbolactyl 19, r. de Fleurus, Paris.
 *Carbolin MIDY, 67, av. de Wagram, Paris.
 Carbomagnésol Lab. ASCO, 63, r. de Charonne, Paris.
 Carbométine 229, c. Gambetta, Lyon.
 *Carbomucil 41, r. de Rome, Paris.
 Carbonal 14, r. Cantin, Courbevoie.
 *Carbonate de Bismuth 3, r. Sébastien-Gryphe, Lyon.
 *Carbonate de Chaux 71, av. Victor-Emmanuel-III, Paris.
 Lancosme
 Carbonate de Lithine 11, r. Milton, Paris.
 Le Perdriel
 *Carbonésie 12, bd St-Martin, Paris.
 *Carbophos NOË, St-Amand-les-Eaux.
 Carborexyl 57, r. Pierre-Corneille, Lyon.
 *Carbos Lab. E. MILLET, Rambouillet (Seine-et-Oise).
 *Carbosanis 49, bd Port-Royal, Paris.

- Carboseptyl**
 * **Carbotrignon**
Carbozon
 * **Cardialgine Dubois**
Cardialisine
 94, r. Michelet, Alger.
 * **Cardibaine**
Cardiobromine
 Lorthioir, 22, r. Perceval, Paris.
Cardiocrinol
 33, r. Pelleport, Paris.
Cardiobromine Reboul
 16, bd Péreire, Paris.
 * **Cardion Vincardi**
 Lab. HY, 61, av. de Cholsy, Paris.
 * **Cardiosthénine**
 15, bd Pasteur, Paris.
Cardiostreptine
Cardiotonic
Cardiotonine
 REBOUL, Pont-Saint-Maxence, (Oise)
Cardiotonine
 Lab. ISCOVESCO, 107, r. des Dames, Paris.
Cardisédine
 * **Carditone**
 Pont-Ste-Maxence (Oise).
Cardyl
 14, av. Georges-Clemenceau, Nice
Carminase
 D^r CHAPELLE, 8, r. Vivienne, Paris.
Carnéose D^r Spès
 54, fg. St-Honoré, Paris.
 * **Carnine Lefrancq**
Carnix Robert
Carnofer
 GREMY, 14, r. Clichy, Paris.
 * **Carottase**
Carypaine
 * **Casaldyl**
Cascara Alexandre
 * **Cascara Eparvier**
Cascara Henry
 COUDERT, 116, av. Ledru-Rollin, Paris.
 * **Cascara Midy**
 * **Cascarine Leprince**
Caseoline Girard
 * **Caséone Fabre**
 OPTIMA, 78, Grande-Rue au Bois, Bruxelles.
Cassitol
 * **Castanol**
 * **Catalgine**
 * **Catalyl Mg.**
Cataplasme et boue radioactive de Bistyan
 * **Cataplasme du D^r Le-lièvre**
 MILAN, 7, r. Bonald, Lyon.
 LOBICA, 46, av. des Ternes, Paris.
 SPECIA, 21, r. Jean-Goujon, Paris.
 Produits FAYÈS, 199, r. St-Denis, Paris.
 Usine du Blosset, Moulins-sur-Yèvre (Cher).
 32, av. de Metz, Romainville (Seine).
 62, r. Marengo, St-Étienne.
 EON, 3, r. des Rouairies, Dinan (C.-du-N.).
 151 bis, route de Joinville, Champigny (Seine).
 57, av. Jean-Jaurès, St-Fons.
 89, r. du Cherche-Midi, Paris.
 41, r. de Rome Paris.
 26, Gde rue St-Clair, Lyon.
 HENRY, r. de Sclessin, Liège (Belgique).
 67, av. de Wagram, Paris.
 62, r. de la Tour, Paris.
 48, r. d'Alésia, Paris.
 33, r. de la Haie-Cog, Aubervilliers (Seine).
 22, bd Circulaire d'Epina, Gennevilliers (Seine).
 9, pl. Municipale, Tulle (Corrèze)
 98, r. de Sèvres, Paris.
 10, r. de la Mairie, Ivry (Seine).
 GENEVRIER, 145, r. du Marché, Neuilly.
 12, av. Grande-Armée, Paris (XVII^e).

- Cataplasme Electrique** 46, r. Dauphine, Paris.
Morgin
Cataplasme Optima Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
Catarasmine THORAL, Le Mont-Dore (Puy de-Dôme).
Catéchiode Martinet 16, r. Petit-Musc, Paris.
***Catéményl** Dr G. LALAUERIE, à Cuxac-d'Aude (Aude).
Cathartine EON, 3, r. des Rouairies, Dinan (C.-du-N.).
Cathiode Brisson 157, r. Championnet, Paris.
***Causyth** BOISSY, 15, r. de Belgrand, Paris.
***C. B. K.** 15, r. Catulienne, St-Denis.
Cedrel Bel DUC, 24, av. Mac-Mahon, Paris.
Cédrocadinol Vigier 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris (X°).
Cédro-Méthyle PIALOUX, 55, r. de Chabrol, Paris.
Cèdre bleu P. HARDY, 42, bd St-Marcel, Paris.
Cedrosan BREANT, 11, r. de Clichy, Paris.
***Cellona** 4, r. d'Ilizac Mulhouse.
Cemopansements La Cellophane, Bezons (S.-et-O.).
Cellules Paret 22, r. Guibal, Marseille.
***Cellu-Son** AUBRY, 62, r. Erlanger, Paris.
Cemag Dr LALAUERIE, Cuxac-d'Aude.
Centrosorum Grosjean 36, r. de Malte, Paris.
Cephmail 17, r. de Berri, Paris (VIII°).
Cephœmétine 49, r. Maleret, Bordeaux.
Cerdesol 18, r. Favart, Paris.
***Céréales-Bébé** FAVRICHON, à St-Symphorien-de-Lay (Loire).
***Céréales granulées** FAVRICHON, à St-Symphorien-de-Lay (Loire).
Céréaline Tullivet 52, r. de Poissy, St-Germain-en-Laye.
Céréalose Lab. ASTIER, 45, r. du Docteur-Blanche, Paris.
***Cérébrine Fournier** 147, bd Montparnasse, Paris.
Cérébrinol 74, quai Jemmapes, Paris.
Cérébrocrinol Lab. ISCOVESCO, 107, r. des Dames, Paris.
***Cérébroïl** Leisyn 1 bis, r. Molitor, Paris.
***Cérébrolipase** 17, r. Soufflot, Paris.
***Cérébrosthénine** Dalin 49, quai St-Vincent, Lyon.
Cérédine Loudenot 106, av. du Roule, Neuilly-sur-Seine.
Céréol Gigon 25, bd Beaumarchais, Paris.
***Céréossine** DEHAUSSY, 66, r. Nationale, Lille.
Cérévisine 8, r. Vivienne, Paris.
Cérinil 16, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris.
Cériomine id.
Cersomine 18, r. Favart, Paris.
Cervol 19, r. de Fleurus, Paris.

- Cetamol**
***Cethocal**
***Cétrarose Gigon**
Charbenzo Lafran
***Charbon fraudin**
***Charbon Tissot**
Chardyl Meurice
Chatel-Biase
Chaulmorhuat Po-
marel
***Chéloïdine**
***Chenanthol**
***Chéralys comprimés**
***Chlocchi**
***Chlomag**
Chlorakin
Chloral anisé Iida
***Chloral bromuré Du-**
bois
Chloral-Geranie
Chloralgal
***Chloralosane**
***Chloramine**
Chloraseptine
***Chloréthyle Bengué**
Chlorhydropeptine
***Chlorhydrol**
***Chlorical**
***Chloridia**
Chlorinol
***Chlormagnésium Fisch**
Chlorobacilline
***Chlorobyl**
***Chloro-Calcion**
Chloroforme anesthé-
sique
Chloroforme amp.
Chloroforme Lam -
biotte Irères
Chloroma
***Chloro-Magnesion**
Chloro magnésium
Henry
Chloropeptase
***Chlorophylle du Dr Da-**
vid
Chlorostomalise
Chlorosulfol Vigier
- 15, r. d'Argenteuil, Paris.
 6, r. Abel, Paris (XII^e).
 25, bd Beaumarchais, Paris (IV^e).
 8, r. de Prague, Paris.
 4, av. Descaux, Billancourt
 (Seine).
 34, bd de Clichy, Paris.
 61, av. Louise, Bruxelles.
MIRATON, Châtel-Guyon.
 21, r. Marbeuf, Paris.
DORANTOWICZ, 17 bis, av.
Parmentier, Paris.
HINGLAIS, à Eprenay.
 12, r. des Sts-Pères, Paris.
L. ADAM, Granville (Manche).
 71, r. St-Jacques, Paris.
 37, r. de Bourgogne, Paris.
 17, r. du Bouloi, Paris.
DURIEZ, 20, pl. des Vosges,
Paris.
GROSJEAN, 36, r. de Malte,
Paris.
 8, r. de la Paroisse, Versailles.
KUHLMANN, 145, bd Hauss-
mann, Paris.
FREYSSINGE, 6, r. Abel, Paris.
OPTIMA, Gde-Rue au Bois,
Bruxelles.
 16, r. Ballu, Paris.
Dr COIRRE, 5, bd Montpar-
nasse, Paris.
FOUCHÉ, 2, bd Pershing, Paris.
Lab. SAUBA, Montreuil, Paris.
Produits Danec'h 64, r. des
Tournelles, Paris.
 40, r. des Acacias, Paris.
 4, r. d'Ilzsch, Mulhouse.
TULIVET, St-Germain-en-Laye.
 46, av. des Ternes, Paris.
MICHEL, 9, r. Castex, Paris.
USINES DU RHONE, 21, r.
Jean-Goujon, Paris.
OPTIMA, Grande-Rue au Bois,
Bruxelles.
 20, r. Dumont-d'Urville, Paris.
 4, imp. de Béarn, Paris.
 52, bd du Temple, Paris.
HENRY, 39, r. de Sclessin,
Liège (Belgique).
NOË, 14, r. Thiers, St-Amand-
les-Eaux.
 5, r. Claude-Decaen, Paris.
BEDEIL, Lavelanet (Ariège)
 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris

- Chloro T. B. X.** S. G. I. P., 73, r. Gal-Sarrail, Le Havre.
- *Chlorumagène** 42, r. Mont-Genis, Paris.
- *Chlorure ammonium** BRÉANT, 11, r. de Clichy, Paris.
- Chlorurol** PIALOUX, 55, r. de Chabrol, Paris.
- Chlory-choline** 22, r. Morère, Paris.
- Chocolate Milk C. G** Sté des Spécialités diététiques et pharmac. (Cow et Gate), 22, r. des Belles-Feuilles, Paris.
- Chocolat au lait Nutricia** 142, r. Fransman, Bruxelles.
- *Ghocolagol** REBOUL, Pt-Ste-Maxence (Oise)
- Cholagon** 48, bd des Batignolles, Paris.
- *Cholcystine** VINCENT, 14, av. Mac-Mahon, Paris.
- *Choléfluine** LECONTE, 7, r. des Petits-Carreux, Paris.
- Cholégastrol** 74, r. Lourmel, Paris.
- *Choléine Camus** DARRASSE, r. St-Maurice, Nanterre (Seine).
- *Choléine lactique** DARRASSE, r. St-Maurice, Nanterre (Seine).
- Choléitoires Byla** 26, av. de l'Observatoire, Paris.
- *Cholélyse Carbou** 8, r. Jean-du-Bellay, Paris
- Choléoboldine Thévenot** 21, r. des Roses, Dijon.
- *Choléo-Combretol** 37, r. de la Fédération, Paris.
- *Choléokinase** DURET & RÉMY, Asnières (Seine)
- *Choléolactol Daguin** 7-13, r. Bobillot, St-Maur (Seine).
- *Choléolax** R. COLAS, 133, r. Lecourbe, Paris.
- *Choléopeptine** 24, rue des Plantes, Paris.
- *Cholépan** 34, r. Sedaine, Paris.
- *Cholérène** 7, av. Marceau, Paris.
- *Cholergine** 62, bd Jean-Jaurès, Boulogne-sur-Seine.
- Cholestéroidine** 52, r. La Bruyère, Paris.
- Choline Roche** 21, pl. des Vosges, Paris.
- Cholotonon** 49, r. Paradis, Paris.
- Cholotoxine** CHAUMONT-CAZALS, à Vichy (Allier).
- *Chophytol** ROSA, 1 pl. Champerret, Paris.
- Christolax** 151 bis, rte de Joinville, Champigny.
- Chromo - Thermo - Therapie** 12, av. du Maine, Paris.
- *Chrysemine** 15, r. d'Argenteuil, Paris.
- Chymosine Fisch** 4, r. d'Illzach, Mulhouse.
- *Cibalgine** Lab. CIBA, 109-113, bd de la Part-Dieu, Lyon.
- Cibrol** 37, r. Gaudot-de-Mauroy, Paris.
- Cicabi** 2, bd Pershing, Paris.
- Cicatryl** 21, r. Chaptal, Paris.
- Cidrase** 18, av. Hoche, Paris.
- G^d Cidre Bol régime** M. LANGLOIS, La Cressonnière, Pont-l'Évêque.

- Cigares Gicquel**
Cigarettes anti-asthm.
Cigarettes du D^r Cléry
Cigarettes Espic
Cigarettes Indiennes
 Grimault
Cigarettes Salva
Cigarettes Schulze
Cigarettes Zani
Cimalvol
***Cimarsényl**
Cimatoxyl
***Cimatryl**
***Cinalose**
***Cinéyl**
CinnolipolChaulmoogré
***Cinnozyl Cin**
 Cinol
***Cipromarol**
Ciproveinol
Circogénol
***Citralin**
Citrarose du D^r Gigon
Citrase
Citraspirinc
Citrate de Lithine Le
 Perdriel
***Citrocarbine**
Citrocholine
***Citrofluyal**
***Citrolargol**
***Citropaine**
Citropeptol
***Citrophos**
Citrosalol
***Citrosodine**
Citro-thymol
Citrovaniille
***Clearol**
Clinax
Clinogyne
***Clhemine Longuet**
***Clonazone Daufresne**
 Cloranol
***Clupéyl**
***Coagulène Ciba**
- Produits DANNÉCH, 64, r. des**
 Tournelles, Paris.
ESCOUFLAIRE, Baisieux (N.).
 18, r. de Maubeuge, Paris.
 20, r. St-Lazare, Paris.
 8, r. Vivienne, Paris.
Lab. Central de France, r. de
 Châteaudun, Rennes.
 44, 1. d'Aguesseau, Boulogne-
 sur-Seine.
 52, r. de Poissy, St-Germain-
 en-Laye. (Voir Poudre).
 3. bd Beaumarchais, Paris.
MEYNARD, 68, av. de Nor-
 mandie, Colombes.
 6, r. du Bois, Nanterre.
 4, pl. Royale, Nantes.
TAVERNIER, 32 r. de l'Ouest,
 Paris.
 7, r. St-André, Le Mans (Sarthe).
 74, quai de Jemmapes, Paris.
 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
Lab. IMMUNOS, av. des
 Sources, Nice.
 12, r. de la République, Puteaux.
 18, r. de Beaune, Paris.
 2, pl. République, St-Ouen.
 10, imp. Milord, Paris.
 25, Ld Beaumarchais, Paris.
 37, r. de Bourgogne, Paris.
 22, bd Sébastopol, Paris.
 11, r. Milton, Paris.
WARIN, 4, ch. de la Muette,
 Paris.
 49, r. du Loing, Montargis
 (Loiret).
 4, ch. de la Muette, Paris.
LEBEAULT, 5, r. Bourg-l'Abbé,
 Paris (III^e).
 304, r. St-Jacques, Paris.
 80, r. du Rocher, Paris.
NOË, St-Amand-les-Eaux.
 57 bis, av. Motte-Picquet, Paris.
 34, r. Sedaine, Paris.
 49, r. de Bitché, Courbevoie.
LENOIR, 5, r. Ste-Isaure, Paris.
 194, r. Rivoli, Paris.
 12, sq. Delambre, Paris (XIV^e).
 69, av. du Maine, Paris.
 34, r. Sedaine, Paris.
 42, r. Thiers, Le Havre.
 58, r. Miromesnil, Paris.
Pharmacie PANIER, à Malo-
 les-Bains.
 113, bd de la Part-Dieu, Lyon.

- *Coaltar Le Beuf
- *Coalt Derma
- Cobratoxine
- *Cocaine Midy
- Coccidal Grémy
- Codarsyl
- *Codéphryl
- *Codérax
- *Codobromyl
- *Codocol
- *Codoforme Bottu
- Colargyl
- Colarsé
- *Colarsénol
- Colchicine
- Colchiflor Vial
- *Colchi-Sal Midy
- Colhépatyl
- Coliflorine Carrion
- *Colisel
- *Colitique
- *Coli-Vaclydun
- Collargol
- Colleodin Leo
- Collo-Bacilline
- Collobiasés Dausse
- Collohirtol
- Colloïdes Amicros
- Colloïdes Clin
- *Colloïdine
- *Colloïdogénine
- *Colloïl Leisyn
- *Collo-iode Dubois
- Colloïxols
- Collophérine Bap
- Collosol Pépin
- Collothiol
- Colluborine
- Collubleu
- *Collunovar
- *Comutare V.-E. Doumer
- Collybor
- *Collyres Chibret
- Collyres Stéryl
- Collyres des Alpes Vicoario
- Collyres stérilisés Clin
- Coloplastre
- *Colpophile
- 11, r. Milton, Paris.
- 30, bd Raimbaldi, Nice.
- 87, r. Denfert-Rochereau, Paris.
- 67, av. de Wagram, Paris.
- 14, r. de Clichy, Paris.
- DUBOIS, 16, bd Pereire, Paris.
- 40, r. des Carmes, Orléans.
- COIRIER, 69, av. du Maine, Paris.
- SAUBA, Montreuil (Seine).
- 20, r. des Martyrs, Paris.
- 115, r. N.-D.-des Champs, Paris.
- 49, r. de Bitché, Courbevoie.
- 49, r. Thiers, Boulogne-s.-Mer.
- CARLIER, St-Florentin (Yonne)
- HOUDÉ, 9, r. Dieu, Paris.
- 8, r. Vivienne, Paris.
- 67, av. de Wagram, Paris.
- 50, fg Poissonnière, Paris.
- CARRION, 54, r. du Fg-St-Honoré, Paris.
- LAROZE, 54, r. de Paris, Charenton (Seine).
- 41 à 47, r. du Dr-Blanche, Paris.
- 27, r. Desrenaudes, Paris.
- 67, av. de Wagram, Paris.
- 11, square Marie-Louise, Bruxelles.
- 11, r. Mansart, Paris.
- 4, r. Aubriot, Paris.
- CHAUVIN, Aubenas (Ardèche).
- 9, bd Edgard-Quinet, Paris.
- 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
- 51, r. Nicolo, Paris (XVI^e).
- 8 et 10, r. Alp.-Bertillon, Paris (XV^e).
- 1 bis, r. Molitor, Paris.
- 16, bd Pereire, Paris.
- 49, r. de Paradis, Paris.
- 4, r. de l'Alma, Asnières.
- 116, bd Haussmann, Paris.
- 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
- 223, r. St-Martin, Paris.
- 11, r. Lepic Paris
- 23, r. Danton, Paris-Levallois.
- BOMEL, Annonay (Ardèche).
- ADLER, 36, r. des Francs-Bourgeois, Paris.
- 5, r. St-Herem, Clermont-Ferrand.
- 94, r. Michelet, Alger.
- 17, bd Haussmann, Paris.
- 21, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
- 29, r. Singer, Paris.
- 45, fg Saint-Denis, Paris.

| | |
|---|---|
| Coluval | 5, r. de la Paix, Paris. |
| Combrétine Boquillon | 12, r. de Nice, Paris. |
| Combrosmol | 59, r. Boissière, Paris (XVI ^e). |
| *Comitioi | GRORICHARD, 12, pl. de la Révolution, Besançon. |
| Complexes colloïdaux | Etabl. MERMINOD, 49, r. de Paradis, Paris. |
| D ^r Riquoir | HUCKEL, à Héricourt (Haute-Saône) |
| Complexextraits | 27, fg Montmartre, Paris. |
| *Composé Gmet | COQUELU, Digoïn (Saône-et-Loire). |
| *Compressif Beslier | GENÉVRIER, 45, r. du Marché, Neuilly. |
| Comprimés Adolan | 9, r. de la Perle, Paris. |
| Comprimés Adrian | LAPEYRE, Neuvic-sur-l'Isle (Dordogne). |
| Comprimés Alla | 178, r. Montmartre, Paris. |
| Comprimés Anta | ROBERT & CARRIERE, 37, r. de Bourgogne, Paris. |
| Comprimés Aqua Pura | DURET & RÉMY, Asnières (Seine). |
| *Comprimés d'Alibour | MILLIET, Rambouillet (S.-et-O.). |
| Comprimés de Calomel | id. |
| Comprimés de carbonate de chaux | 4, av. Desfeux, Billancourt (Seine). |
| Comprimés de Charbon Fraudin | 12, r. des Saints-Pères, Paris. |
| Comprimés Chéralys | 19, r. d'Aubagne, Marseille. |
| Comprimés de Gibert | 42, r. Émile Deschanel, Courbevoie (Seine). |
| *Comprimés de Protogambier | LAMBERT, pl. du Châtelet, Orléans. |
| *Comprimés Galac | OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles. |
| Comprimés Garga | 13, r. Cherche-Midi, Paris. |
| *Comprimés Guillaumin | 49, r. de Paradis, Paris. |
| Comprimés gynécologiques Merminod | 2, r. des Cordeliers, Meung-sur-Loire. |
| *Comprimés Kléos | S. G. I. P., 73, r. G ^{al} -Sarrail, Le Havre. |
| Comprimés Maver | 177, r. de Courcelles, Paris. |
| Comprimés Néothorium Millot | 35, r. de la Bourse, Lyon. |
| Comprimés Neyret | Lab. CANTIN, Palaiseau (S.-et-O.). |
| *Comprimés Nican | 1, r. Lassalle, à Lyon. |
| *Comprimés Pantolaxine du D ^r Boveil | JARMON, 4, pl. de la Gare, Tunis. |
| Comprimés Pausis | COUPAT, Ussel (Corrèze). |
| Comprimés du Prof. Pénières | 80, fg St-Denis, Paris. |
| Comprimés Rhinol | |

- * Comprimés Roche de THOFFMANN LA ROCHE, 10,
 Thiocol r. Crillon, Paris.
 Comprimés Roy 81, bd Suchet, Paris.
 Comprimés Salvé Lab. RICHER, 7, av. Marceau,
 Paris.
 Comprimés Urbé LAFFARGUE, Barsac (Gironde)
 * Comprimés vaginaux 1 bis, r. Molitor, Paris.
 Leisyn
 * Comprimés Vichy- G. PRUNIER & C^{ie}, 4, r. de
 Etat la Coutellerie, Paris.
 Conarsynol 12, pl. Puget, Toulon.
 Condurango Gmet 27, fg Montmartre, Paris.
 Condurango granulé 45, r. du Docteur-Blanche, Paris.
 Astier
 Conhydrargol 12, pl. Puget, Toulon.
 Conjonctol Lab. des Etabl. SALLE, 4, r.
 Elzévir, Paris.
 Convallamarine DEGLAUDE, 6, r. d'Assas, Paris.
 Coprase 77, bd de Grenelle, Paris.
 * Coprex 39, r. de Clichy, Paris.
 Coqluplaste COQUELU, Digoïn (S.-et-L.).
 Coqueluchyl 3, r. du Pont, à Epinal.
 * Coramine Lab. CIBA, 109-113, bd de la
 Part-Dieu, Lyon.
 * Coréline 62, bd Jean-Jaurès, Boulogne-
 sur-Seine.
 * Corizol 24, pl. des Vosges, Paris.
 Corpogénine J. EBON, Chorost (Cher)
 Corps Thyroïde Mon- 49, av. Victor-Hugo, Boulogne-
 cour sur-Seine
 * Cortiode 7, r. de l'Armorique, Paris.
 Corylase 105 r. de Rennes, Paris.
 * Coryphédrine SPECIA, 21, r. Jean-Goujon,
 Paris.
 Coryza-Ouate 14, av. de Paris, Biarritz.
 Cosmargyre THÉVENOT, 21, r. des Roses,
 Dijon.
 Crataguiode 36, r. des Francs-Bourgeois,
 Paris.
 Cratægine 46, r. d la Barrière, Elbeuf.
 Cratægol 14, r. Eug.-Delacroix, Paris.
 Cratægus Bocquillon 10, r. du Bac, Paris.
 * Cratægus Gmet 27, fg Montmartre, Paris.
 Cratoegniodé 36, r. des Francs-Bourgeois,
 Paris.
 * Crayons Antifissure DOMERGUE, Agen (L.-et-G.).
 Crayon à la chrysar- 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
 bine Vigier
 Crayons Chaumel 78, fg St-Denis, Paris.
 Crayons néothorium 177, r. de Courcelles, Paris.
 Millot
 Crayon Thermosan 30, r. Singer, Paris.
 Créacalcine 3, pl. Jussieu, Paris.
 * Créagenol Corbière 27, r. Desrenaudes, Paris.
 Créatine Aubert D^r AUBERT, 3, pl. Jussieu,
 Paris (V^e).

- Créatonine** D^r FAUBERT, 3 pl. Jussieu, Paris.
- * **Crédone Dehaussy** 66, r. Nationale, Lille.
- Crémasepta** D^r LALAUERIE, Cuxac-d'Aude.
- * **Crème de Bismuth** 12, r. de Bucl, Paris.
- Quesneville** (Voir Bismuth.)
- * **Crème de Bi-chlor.** 12, r. de Bucl, Paris.
- magnésienne** (Voir Bismuth.)
- Crème de lainine Vi-** 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
- gier**
- Crème de Lait Nutricia** Bruxelles.
- Crème de Lygie** FLUOSALYL BEAUCOUR-
- Crème de Nujol** DON, 43, av. Kléber, Paris.
- Crème de quinine Sa-** 98, r. de Sèvres, Paris.
- polan** 29 r. Singer, Paris.
- Crème Graziana** 15 r. Catullienne, St-Denis.
- Crème Probios anti-** 1, av. Pasteur, Paris.
- pyogène**
- * **Crème résolutive du** 29, r. Singer, Paris.
- D^r Rap**
- Crémo-plastol Dumes-** 10, r. du Plâtre, Paris.
- nil**
- * **Créoformine** 18, r. de Jouvence, Dijon.
- Créogarlic** 15, av. Parmentier, Ivry.
- Créoline Pearson** J. MIDY, 41, r. de Courbevole, La Garenne (Seine).
- * **Créosal Dubois** 51, r. Nicolo, Paris (XVI^e).
- * **Créositoires** JOLLY, 1, r. Christine, Paris.
- * **Créosoforme** Lam- 20, r. Dumont-d'Urville, Pa-
- biotte Frères** ris (XVI^e).
- Créosote soluble Va-** 14, r. Victor-Hugo, Lyon.
- cheron**
- * **Créo-suppo-camphre** REBOUL, Pont-Ste-Maxence (Oise).
- * **Crêpe Velpeau** 7, r. de Jouy, Paris. (Voir Vel-
- Crescogénol** 18, r. Ferdinand-Flocon, Paris.
- Crescol** 98, r. de Sèvres, Paris.
- * **Crésentyl** 1, pl. Lucien-Harr, Paris.
- * **Crésopirine** 2, pl. des Vosges, Paris.
- * **Crésotanol** 2, pl. des Vosges, Paris.
- Crésyl Jeyes** 35, r. de Fr.-Bourgeois, Paris.
- * **Crinex** 18, r. St-Amand, Paris.
- * **Crinhémol** Lab. DEMASLES, Vienne (Isère).
- Crinocalcine** HATIER, à St-Etienne.
- * **Crinocardine** 51, r. Nicolo, Paris (XVI^e).
- Crino-Menstryl** 7, r. Biscornet, Paris.
- * **Crino-Sérum** MOURE, 18, r. Favart, Paris
- * **Crinosthényl** FOURNIER, 7, r. Biscornet, Paris.
- Crinothéine** 48, r. de la Procession, Paris.
- * **Crisalbine** SPECIA, 21, r. Jean-Goujon, Paris.
- Cristolax** 151 bis, route de Joinville, Champigny (Seine).
- Croquettes Marida** 1, Jardin-Anglais, Le Raincy.

- *Crussol
- *Cryogénine Lumière
- *Cryptargol Lumière
- *Crypthermol
- *Crypthiol
- Cryptos**
- Cryptosote Néda
- *Crysiodal
- Crystol
- Cupranéo Leisyn
- Cupranine Léger
- Cuprase-Ducatte
- *Cupremone
- Cupressus Dausse
- Cuprifer
- Cuprinol
- Cuprion
- Cuprocithine
- Cupro-Salyl
- Curalgine
- Curaluès D^r Lafay
- Curandra
- Curatif Ygra
- Curatyl Laennec
- *Curatine Brunot
- Curatoxine
- Curgol Vicario
- *Curiodé
- Curiosan
- Curocalcine
- *Curogène
- *Curoraisin
- Curovaccin satoxiqnes
- Cépède (Voir Vaccinothérapie)
- *Curoxyure
- *Cuscutine Foulon
- Cutidermine
- Custodine
- Cutiphile
- Cutiplate
- Cyanargyre
- Cyanauroi du D^r Gigon
- *Cyanhermine
- Cyanhermyl Dalin
- Cyanure indolore Ercé
- Cynarine Estébe
- MONIN, 49, r. de Maubeuge, Paris.
- 45, r. Villon, Lyon.
- 45, r. Villon, Lyon.
- 66, r. Nationale, Lille.
- RENARD, 35, rue de Paris, Clichy (Seine).
- 4, av. Maurice-Berteaux, Poissy (Seine-et-Oise).
- 134, cours de Verdun, Bordeaux.
- La Biothérapie, 5, r. Paul-Barruel, Paris.
- 8, r. Vivienne, Paris.
- 1 bis, r. Molitor, Paris.
- 2, bd de Russie, Vichy.
- 191, r. St-Honoré, Paris.
- GOUIN, 20, r. des Écoles, Paris
- 4, r. Aubriot, Paris (IV^e).
- à La Ferté-Macé (Orne).
- Labor. DULCIS, pl. Clichy, Monte-Carlo.
- 18, av. Hoche, Paris.
- GREMY, 14, r. Clichy, Paris.
- 12, r. de Buci, Paris.
- P. FONTANIER, Moulins-sur-Yèvre (Cher).
- LECOQ & FERRAND, 54, ch. d'Antin, Paris.
- 71 fg St-Honoré, Paris (VIII^e).
- 34, r. Thiers, Gray (Hte-Saône).
- COUDERT, 116, av. Ledru-Rollin, Paris.
- 23, r. des Ecoiffes, Paris.
- 114, r. du Temple, Paris.
- 17, bd Haussmann, Paris.
- 17 bis, av. Parmentier, Paris.
- 156, r. Fauvelles, Courbevoie.
- 11, bd de Strasbourg, Paris.
- 145, r. Yves-Le-Coz, Versailles.
- 32, r. Marius-Aufan, Levallois-Perret.
- 60, r. Mathurin-Régnier, Paris.
- Lab. B. E. A., Belfort.
- 20, fg Poissonnière, Paris.
- 10, av. de Wagram, Paris.
- 45, r. d'Aix, Marseille.
- BRUNEAU, 17, r. de Berri, Paris.
- id.
- GUILLAUMIN, 13, r. du Cherche-Midi, Paris.
- 25, bd Beaumarchais, Paris.
- 37, r. de la Fédération, Paris.
- 1, r. de la Martinière, Lyon.
- 37, r. de Bourgogne, Paris.
- à Villefranche-du-Lauragais.

- Cynhépatil**
- * **Cynurol Rosa**
Cypridol
Cyprol
- * **Cyproveinol**
Cystitol
Cystocure
- Cystopurine**
- * **Cytobiase**
- * **Cyto-choline Corbière**
- * **Cytomagnésium**
- * **Cyto-Manganol**
- * **Cytopan**
Cytophédrettes
- * **Cytophédrine**
Cytoplasmine Ducatte
Cytopulmase
- Cytosal**
- * **Cyto-Serum Corbière**
- * **Cyto-Sirop**
- Cytostrychnine**
Cytotropines
- Cytuline**
- BENDERITTER, Vendôme**
 (Loir-et-Cher).
 1, pl. Porte-Champerret, Paris.
 8, r. Vivienne, Paris.
JANELLE, ph^{ica}, Sens (Yonne)
 18, r. de Beaune, Paris.
 57, r. du Cherche-Midi, Paris.
CALMELS, Hauterive (Haute-Garonne)
 49, r. Paradis, Paris.
 24, r. de Charenton, Paris.
 27, r. Desrenaudes, Paris.
 62, bd J.-Jaurès, Boulogne-sur-Seine.
CORBIÈRE, 27, r. Desrenaudes, Paris.
 54, r. de Paris, Charenton.
 27, r. Desrenaudes, Paris.
 27, r. Desrenaudes, Paris.
 8, pl. de la Madeleine, Paris.
 21, Grande-Rue, Monfermeil (S.-et-O.).
 54, r. St-Blaise, Paris (XX^e).
 27, r. Desrenaudes, Paris.
CABASSON, 183, r. de Rome, Marseille.
 27, r. Desrenaudes, Paris.
FOURNIER (Fr.), 7, r. Biscornet, Paris.
 18, av. Hoche, Paris.

D

- Daturasolène**
- * **Décholestrol**
- Déclonal**
- * **Decorpa**
- * **Delbiase**
Delbosel
- * **Delcaine Roques**
- * **Demalgon**
- Déméteros**
Denisia Brisson
- * **Denisoline Brissac**
- Dentoline**
- 2, pl. du Théâtre-Français, Paris.
LEDENT, Pharm. Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais).
SPECIA, 21, r. Jean-Goujon, Paris.
 41, r. de Rome Paris.
 8, r. Vivienne, Paris.
 8, r. Vivienne, Paris.
 36, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris
MATHIVAT, 66, r. de la Pompe, Paris (XVI^e).
 163, r. de Flandre, Paris.
 157, r. Championnet, Paris.
 id.
 46, r. Pierre-Charron, Paris.

| | |
|----------------------------------|--|
| Dentoryl | 3, r. Ch.-Gounod, St-Raphaël. |
| Dentoxyl | HAUTDIDIER, 37, r. Galilée, Paris. |
| Dépuratif Berry | Usine du Blosset, Moulins-sur-Yèvre (Cher). |
| Dépuratif Dubreuil | 172, r. Alésia, Paris. |
| Dépuratif Dumesnil | 10, r. du Plâtre, Paris. |
| Dépuratif Fuba | 37, r. des Lois, Toulouse. |
| Dépuratif Kromelinck | 19, r. Drouot, Paris. |
| Dépuratif Nox | 14, r. Demarquay, Paris. |
| *Dépuratif Rob-Lechaux | 49, r. de Maubeuge, Paris. |
| Dépuratif Santa | 9, place Municipale, Tulle (Corrèze). |
| Dépuratif Saint-Michel n° 1 et 2 | 46, r. des Fuures, Bordeaux. |
| Dépuratine | 50, r. de la République, Puteaux. |
| *Dépuriode | ANGELINI, 61, r. de Seine, Paris. |
| Dépurlaxyl | 229, cours Gambetta, Lyon. |
| Dercusan | Lab. Sasse, 78, bd Beaumarchais, Paris. |
| *Dermacide Porcher | 35, r. des Blancs-Manteaux, Paris. |
| Dermadésine | 41, r. St-Pierre, Caen. |
| Dermajic | R. MONIMART, 23, r. du Grand-Cerf, Meaux. |
| Dermal Hanbro | Lab. Central de France, 1, r. de Châteaudun, Rennes. |
| Dermaline Corbière | 27, r. Desrenaudes, Paris. |
| Dermaline Demeulenaere | KERFYSER, 4, r. Alexandre III, Dunkerque. |
| Dermathorium Rhemda | 17, r. Hauteville, Paris. |
| Dermatyol | L. GODART, Andenne (Belgique). |
| Derméon | 3, r. des Rouairies, Dinan (C.-du-N.). |
| Dermoschistol | LECRONIER, Domfront (Orne). |
| Dermodiol | 20 bis, r. Gravelotte, Toulouse. |
| *Dermodulcis | 85, cours Albert-Thomas, Lyon. |
| *Dermofagine | 15, pl. Godefroy-de-Bouillon, Boulogne-sur-Mer. |
| Dermogène | 10, r. de l'Union, Cligny. |
| Dermolène | 158, Promenade de la Corniche, Marseille. |
| Dermophène | 9, bd Malesherbes, Paris. |
| *Dermoplastol | 10, r. du Plâtre, Paris. |
| Dermopode | Evreux (Eure). |
| *Dermoradol | Établ. LABORADIUM, 33, r. St-Jacques, Paris. |
| *Dermo-rhinhistol | 2, r. Claude-Matrat, Issy-les-Moulineaux, Paris. |
| *Dermosplénine | 14, r. des Minimes, Paris. |
| Dermosufrol | 6, r. Chanoinesse, Paris. |
| Dermotyol | Le Naour, Quimperlé (Finistère). |
| *Désensibilysine | BÉLIERES, 19, r. Drouot, Paris. |

- Desitin**
- ***Détensyl**
Détergine
Dexogyne
 ***Dextrosol**
Diabesia
Diabétalim
 ***Diabetifuge**
 ***Diabétosan**
Diabetuline
- Diachusine**
- ***Diadermine**
 ***Diagnothorine**
- ***Dialacétine Ciba**
- ***Dial Ciba**
- ***Dialine**
- ***Dialyl Brunot**
Dialyses Golaz
Diapirine
Diardyscol
 ***Diasclérol**
 ***Diasés**
Diasténine Gremy
 ***Diastogène**
- ***Diasto-Pepsine Riche-**
pin
Diathermie
- ***Dicaliode**
 ***Dicodéine Lafran**
 ***Dical Ciba**
- ***Diéménal**
 ***Diénol**
 ***Digalène Roche**
 ***Digastrine**
Digeryl
Digestif Capmartin
- Digestif Dal**
 ***Digestif Harvey**
- Digestif Henry**
Digestif Maulin
Digestif Pinel
 ***Digestonic**
- ***Digibaïne Deglaude**
- Etabl. MERMINOD, 49, r. de Paradis, Paris.**
 8, av. Walkanaer, Nice.
D^r BOURDEAU, à Parthenay.
DEXO, 23, r. Danton, Levallois.
 29, r. de Berri, Paris.
 50, r. de la République, Puteaux.
 61, r. Vandamme, Paris.
 21, r. Chaptal, Paris.
 48, r. d'Alésia, Paris.
V. CHARRET-TOMASI, St-
Just-sur-Loire (Loire).
 142, r. de Picpus, Paris.
 (Voir Vernis à la Diachusine.)
 60, r. E. Dolet, Malakoff (Seine).
SPECIA, 21, r. Jean-Goujon,
Paris.
 109-113, bd de la Part-Dieu,
 Lyon.
 109-113, bd de la Part-Dieu,
 Lyon.
C. I. P., 128, r. Vieille-du-Tem-
ple, Paris.
 16, r. Boulainvilliers, Paris.
 4, r. Bellart, Paris.
 2, pl des Vosges, Paris.
 86, bd Port-Royal, Paris.
 26, r. Norvins, Paris.
 77, r. Miromesnil, Paris.
 14, r. de Clichy, Paris.
DEHAUSSY, 66, r. Nationale,
Lille.
Lab. D^r TISSOT, 34, bd de
Clichy, Paris.
La Verrerie Scientifique, 12, av.
du Maine, Paris.
 1, pl. Victor-Hugo, Paris.
 8, r. de Prague, Paris.
 109-113, bd de la Part-Dieu,
 Lyon.
 18, r. de Beaune, Paris.
 18, r. de Beaune, Paris.
 10, r. Crillon, Paris.
 11, r. St-Agricol, Avignon.
 137, av. Parmentier, Paris.
 2, r. Marché-des-Blancs-Man-
 teaux, Paris.
 36, r. de Verdi, Nice.
 101, av. Paul-Doumer, Rueil
 (S.-et-O.).
 39, r. Sclessin, Liège.
 50, r. de la République, Puteaux.
 à Bonnelles (Seine-et-Oise).
Produits Scientia, 21, r. Chaptal,
Paris.
 15, bd. Pasteur, Paris.

- Digicardine** Lab. IMMUNOS, av. des Sources, Nice.
- *Digifoline Ciba** 109-113, bd de la Part-Dieu, Lyon.
- *Digi-Lanatine** 8, r. Favart, Paris.
- *Digilanide « Sandoz »** 20, r. Vernier, Paris.
- *Digimialbaine** 8, r. Favart, Paris.
- *Digistabiline** P. C. B., 12, r. du Téléphone, Bruxelles.
- Digitale Dausse** 4, r. Aubriot, Paris.
- Digitale Ecalte** 98, r. de Sèvres, Paris.
- Digitoline Homolle & Quévenne** 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris
- Digitale Labelonye** 21, r. Chaptal, Paris.
- *Digitaline cristallisée du Dr Mialhe** 8, r. Favart, Paris.
- *Digitaline Invar** 7, r. de Jouy, Paris.
- *Digitaline de Nativelle** 27, r. de la Procession, Paris.
- Digitalis Purpurea** OPTIMA, Grande-Rue au Bois, Bruxelles.
- Dimétol Vicario** 17, bd Haussmann, Paris.
- Dimol** Bois-Colombes (Seine).
- Diocol** 3, pl. Int. St-Michel, Toulouse.
- Duodotorme Taine** 5, r. de la Perle, Paris.
- *Diiodotyrosine** 10, r. Crillon, Paris.
- *Dinitra** 5, r. Claude-Decaen, Paris.
- Dionol** FLEURY, Arcachon (Gironde).
- *Dioradin** 37, r. de la Fédération, Paris.
- *Dioséine Prunier** 1, quai Aulagnier, Asnières.
- Dippol** 87, r. Denfert-Rochereau, Paris.
- Dismenine Henry** 39, r. Sclessin, Liège.
- Disménol** SAUTER, Bellegarde (Ain).
- *Dismine Favrot** Lab. H. FERRÉ, 6, r. Dombasle, Paris.
- *Disolurane** 132, av. Victor-Hugo, Paris.
- *Disonyl** ROUSSEL, 97, r. Vaugirard, Paris.
- Disurol** 42, r. des Martyrs, Paris.
- Disuryl** 23, r. des Moines, Paris.
- Bitagel** 89, rue du Cherche-Midi, Paris.
- Dithioléine** 157, r. Championnet, Paris.
- Diumnal** TORAUDE, 22, r. de la Sorbonne, Paris.
- Diurédausse** 4, r. Aubriot, Paris (IV^e).
- Diuregan** 11, square Marie-Louise, Bruxelles.
- Diurégine** CHARRET-TOMASI, St-Just-sur-Loire (Loire).
- *Diurène** 15, r. d'Argenteuil, Paris.
- Diuréol** COUDERT, 116, av. Ledru-Rollin, Paris.
- *Diuréphédrine** THORAL, Le Mont-Dore (Puy-de-Dôme).
- Diurésinol** 1, r. des Augustins, Perpignan.
- Diurétique Couturieux** 18, av. Hoche, Paris.
- *Diurétique Gmet** 27, fg Montmartre, Paris.

- Dyuril**
 *Diurobromine
 *Diurocalcine Gros
 Diurocalcine iodurée
 *Diurocardine
 *Diurocystine
 Di-Uroïodine
 Diurotonine
 Dmégon (Néo)
 *Dmelcos
 Dmesta (Néo)
 Dmetys (Néo)
 *Doloma
 *Dolophos
 Dolosol
 *Dolysine Rochereau
 *Donagol
 *Do-Sa-No-Sal
 Dosarter
 Dosotol
 *Dosurine (Trousses)
 Doxa
 Dozéol Deglaude
 *Dragécalcion
 Dragées Adrian
 Dragées anticatar-
 rhales du Dr E. Du-
 hourcau
 *Dragées Bengué
 Dragées Blagny
 Dragées Bondonneau
 Dragées Calm
 Dragées Carbonel
 Dragées de Charbon
 Fraudin
 Dragées de fer Cognet
 Dragées de fer Rabu-
 teau
 Dragées gargarisme
 de Luchon
 Dragées de Mastho-
 phile Annic
 Dragées Demazières
 Dragées de Prasion
 *Dragées de Royat
 Dragées d'iodurine
 Dragées Dubourg
- 15, pl. Godefroy-de-Bouillon,
 Boulogne-sur-Mer.
 9, av. Jean-Jaurès, Lyon.
 13, pl. Delille, Clermont-Fer-
 rand.
 id.
 9, av. Jean-Jaurès, Lyon.
 9, av. Jean-Jaurès, Lyon.
 45, bd Lafayette, Calais.
 JARMON, 4, pl. de la Gare,
 Tunis.
 SPECIA, 21, r. Jean-Goujon,
 Paris.
 id.
 id.
 id.
 29, pl. Bossuet, Dijon.
 COLMANT, à Caudry (Nord).
 FOIRET, à Montargis (Loiret).
 Salbris (L.-et-Ch.).
 THOMAS, à Péronne (Somme).
 42, r. du Mont-Cenis, Paris.
 156, rue des Fauvelles, Courbe-
 voie.
 54, r. de Paris, Charenton.
 16, r. Charlemagne, Paris.
 JARMON, r. pl. de la Gare,
 Tunis.
 6, r. d'Assas, Paris.
 DUC, 24, avenue Mac-Mahon,
 Paris.
 9 et 11, r. de la Perle, Paris.
 6, r. Louis-Blanc, La Garenne-
 Colombes.
 16, r. Ballu, Paris.
 Paméla, Forges-les-Eaux.
 49, r. de Bitche, Courbevoie.
 98, r. Jeanne-Maillotte, La
 Madeleine (Nord).
 15, r. d'Argenteuil, Paris.
 4, av. Desfeux, Billancourt
 (Seine).
 43, r. de Saintonge, Paris.
 COMAR & C^{ie}, 20, r. des
 Fossés-St-Jacques, Paris.
 SAUBA, Montreuil, Paris.
 Montbron (Charente).
 131, r. de Vaugirard, Paris.
 14, r. Eug.-Delacroix, Paris.
 26, av. de Royat, Chamallières
 (P.-de-Dôme).
 OPTIMA, Gde-Rue au Bois,
 Bruxelles.
 43, r. de Saintonge, Paris.

- Dragées Efgé** 40, av. Secrétan, Paris.
***Dragées Elkin** DEPRUNEAUX, 18, r. de Beaune, Paris.
***Dragées Gélinaeu** MOUSNIER, 9, bd Carnot, Bourg-la-Reine.
***Dragées ferro-ergotées** MANNET, Loudun (Vienne).
Dragées Fernel 76, bd Haussmann, Paris.
Dragées Gesta 43, av. la République, Paris.
Dragées Gmet 27, fg Montmartre, Paris.
Dragées Grimaud La Courtine (Creuse).
***Dragées Hecquet** 49, bd Port-Royal, Paris.
Dragées hépatiques OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
Dragées Japat 252, fg St-Martin, Paris.
***Dragées Lebrun toni-cardiaques** 155, bd Magenta, Paris (9°).
***Dragées Lumeval** 52, bd du Temple, Paris.
Dragées menthol-bo-rax, cocaïne OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
***Dragées Névrosthé-niques « Yse »** 65, r. Louis-Blanc, Paris.
Dragées Northon CACHAT, Evian-les-Bains (Haute-Savoie).
Dragées Nyrdhal 12, r. de la République, Puteaux.
Dragées Pautauberge 10, r. de Constantinople, Paris.
Dragées Phlébos 229, cours Gambetta, Lyon.
Dragées pulmonaires 49, r. de Metz, Nancy.
Giry
Dragées St-André - Mayniel 85, r. Turbigo, Paris.
Dragées Sédo-car-diaques Pélissier 33, av. de Villiers, Paris.
Dragées Séranti R. St-Maurice, Nanterre (Seine).
Dragées Somedo à Meudon (Seine-et-Oise).
Dragées Tasch 4, r. d'Ilzsch, Mulhouse.
Dragées Vityl 62, r. Marengo, Saint-Etienne.
Drainobil 74, qual Jemmapes, Paris.
***Drainochol** 12, sq. Delambre, Paris (XIV°).
Drosédéine 6, r. de Belleville, Paris.
Droserine Merminod 49, r. de Paradis, Paris.
***Dryco (Lait sec)** 5, r. St-Roch, Paris.
Dulcilax Lab. TINARD, 134, bd Péreire, Paris (XVII°).
Duodénase 12, r. de Nice, Paris.
Dusart (sirop, solution) 8, r. Vivienne, Paris.
Dymozyl 40, r. des Carmes, Orléans.
Dynabiose 6, r. d'Alsace, Grenoble.
Dynamocalcine CHAVIALLE, Sèvres (S.-et-O.).
Dynamoferol PIALOUX, 55, r. de Chabrol, Paris.
Dynergyl Féminy COUDERT, 116, av. Ledru-Rollin, Paris.
Dynos 4, imp. de Béarn, Paris.
***Dynosthène** CABASSON, 183, r. de Rome, Marseille.
Dyspepsia 15, pl. Godefroy-de-Bouillon, Boulogne-sur-Mer.

***Dyspeptine Hepp**
 Dyspeptol
 Dyspneinhal

***Dysthène**
 Dysurol
 Dyuril

Le Chesnay (Seine-et-Oise).
 PATRICE, Vichy.
 38, r. du 11-Novembre, Clermont-
 Ferrand.
 47, r. Bokanowski, Asnières.
 37, r. de Bourgogne.
 15, pl. Godefroy-de-Bouillon
 Boulogne-sur-Mer.

E

Eatan
Eau de Charrier
Eaux de Chaul-Guyon
Eau de Lorraine

Eau d'Enghien
Eau Sova
Ebanyl
Ectobiase Bonnay

***Eczéda**

***Ecxémacrème Boissy**
 Eczémacur e
 Eczém Efa
 Eczémine
***Eczosec**

***Edistol**
Edo-vaccins

Edricamphre
 Edulcora.

***Efryl**
Égidol
Egralene

Eitreb-embrocation

***Ektal**

***Ektogan**
***Ektophanol**
***Elastoplaste**
***Elatine Bozin**

***Elbon Ciba**

34, r. Vignon, Paris.
 Laprugne (Allier).
 6, sq. de l'Opéra, Paris.
 OPTIMA, Gde-Rue au Bois,
 Bruxelles.
 10, r. Caumartin, Paris.
 3, r. Volney, Paris.
 59, r. Nollet, Paris.
 112, Grande-Rue, Nogent-sur-
 Marne (Seine).
 35, r. des Blancs-Manteaux,
 Paris.
 15, r. Belgrand, Paris.
 121, av. St-Ouen, Paris.
 Lab. EFA, Carentan (Manche).
 33, Gde-Rue, Besançon.
 35, r. des Blancs-Manteaux,
 Paris.
 40, r. des Carmes, Orléans.
 SPECIA, 21, r. Jean-Goujon.
 Paris.
 40, r. des Acacias, Paris.
 PATRICE, à Vichy.
 98, r. de Sèvres, Paris.
 74, r. Blanche, Paris.
 P. BRISSON & C^{ie}, 157, r.
 Championnet, Paris.
 OPTIMA, Grande-Rue au Bois.
 Bruxelles.
 SEGUIN 7, r. St-Isaure, Paris,
 (XVIII^e).
 12, r. Lamartine, Paris.
 19-21, r. Van-Loe, Paris.
 4, r. d'Illzach, Mulhouse.
 44, r. d'Aguesseau, Boulogne-
 sur-Seine.
 109-113, bd de la Part-Dieu,
 Lyon.

- Electralgine**
***Electrargo** Clin
Electrauro Clin
***Electrocuprol**
Electro Hg
Electromanganol
Electromartiol
Electropalladiol
Electro-platinol
Electro-Rhodiol
***Electrosélénium**
***Eledon**
- Eleodermine**
***Elgine Julien**
***Elixir Bonjean**
- Elixir Bryol**
Elixir de Catéchiodé
Elixir de Pepto-Car-
dine
***Elixir Déret**
- Elixir digestif de pep-**
sine Grimault
Elixir Duchamp
***Elixir Ducro**
***Elixir du Dr Mialhe**
Elixir Duret
Elixir Dussaud
***Elixir eupeptique Tisy**
- Elixir eupnéique Mar-**
tin Mazade
Elixir de fer Kœnig
***Elixir ferro ergoté**
Elixir Fleig
Elixir Gabail
Elixir Gelm
Elixir Glassér
Elixir Glover
***Elixir Godfrin**
- *Elixir Grez**
Elixir Hela
Elixir hépatique Henry
Elixir Houde
***Elixir Hymel**
- *Elixir iodépuratif Pé-**
pin
Elixir Mannet à l'Io-
dure de Potassium
Elixir Mannet à l'Io-
dure de Sodium
Elixir Mannet au Salol
Elixir Mariani
- Vierzon (Cher).**
20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
id.
COMAR & C^{ie}, id.
COMAR & C^{ie}, id.
COMAR & C^{ie}, id.
COMAR & C^{ie}, id.
COMAR & C^{ie}, id.
COMAR & C^{ie}, id.
COMAR & C^{ie}, id.
Soc. NESTLÉ, 6, av. César-
Caire, Paris.
38, r. Soult, Tarbes (H.-P.).
105, r. de Rennes, Paris.
FAURE & DUSSUEL, Aix-les-
Bains.
97, av. Ledru-Rollin, Paris.
16, r. du Petit-Musc, Paris.
5, av. des Tilleuls, Paris.
- COMAR & C^{ie}, 20, r. des**
Fossés-St-Jacques, Paris.
8, r. Vivienne, Paris.
16, r. Rocroy, Paris.
20, pl. des Vosges, Paris.
8, r. Favart, Paris.
12, r. de Nice, Paris.
52, r. de Rome, Marseille.
VAUDIN & GUILLAUMIN,
12, r. Charles-V, Paris.
St-Raphaël (Var).
37, av. Marceau, Paris.
MANNET, Loudun (Vienne).
18, r. Ferdinand-Flocon, Paris.
5, r. Lefebvre, Paris.
Dr LALAUURIE, Cuxac-d'Aude.
à Turkeim (Haut-Mhin).
13, r. de Minimes, Paris.
6, r. de Paris, Joinville-le-
Pont.
49, r. Maubeuge, Paris.
77, bd de Grenelle, Paris.
39, r. Sclessin, Liège.
9, r. Dieu, Paris.
DUTEIL, 90, av. de St-Ouen,
Paris.
116, bd Haussmann, Paris.
Loudun (Vienne).
Loudun (Vienne).
Loudun (Vienne).
41, bd Haussmann, Paris.

- Elixir Morlas**
Elixir Percy
- Elixir polybromuré Baudry**
Elixir polybromuré Yvon
 ***Elixir Spark**
 ***Elixir Spes**
Elixir supertonique Stella
Elixir du Dr Thermes
- ***Elixir thiogalacolé Arquevaux**
Elixir tribromuré Mannet
Elixir vermifuge Allvers
Elixir vermifuge Chiarini
Elixir Virenque
Elixir de Virginie Nyr-dhal
Elixir Vital Quentin
 ***Elkin Dragées et Granulés**
Elzévir Dentition
Emapirine Toraude
Embrocation Richer
Embrocation Roche
Embrocation Salas
Embrocation Siamoise
Embryonine du Dr Barré
Emencyl
 ***Emerson's Bromo-Seltzer**
Emétinol Viel
Emollian
 ***Emgé Lumière**
 ***Emplâtres R. Cavallès**
Emplâtre Duret
Emulsion Bonnefond
- Emulsion Marchais**
Encytol
Endocalcase
Endocrisines Fournier
Endodermol
- ***Endo-Ovarina**
 ***Endopancrine**
 ***Endothymusine**
Endoxène
 ***Endoxidine**
Energésines
- MOURE, 18, r. Favart, Paris.**
M. AUBANÈL, Pointe-Rouge, Marseille.
8, r. Vivienne, Paris.
5, r. de la Feuillade, Paris.
19, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
10, imp. Milord, Paris.
Usine du Blosset, Moulins-sur-Yèvre (Cher).
Produits Dannec'h, 64, r. des Tournelles, Paris.
Etampes (Seine-et-Oise).
Loudun (Vienne).
DOMERGUE, Agen (L.-et-G.)
Aix-en-Provence.
131, r. Vaugirard, Paris.
12, r. de la République, Puteaux.
MOUSNIER, à Sceaux.
DEPRUNEAUX, 18, r. de Beaune, Paris.
H. SALLÉ, 4, r. Elzévir, Paris.
22, r. de la Sorbonne, Paris.
45, fg Saint-Denis, Paris.
5, r. de la Paix, Paris.
132, r. de Turenne, Paris.
M. MARTIN, Cloyes (E.-et-L.).
HAMEL, 10, pl. Thiers, Le Mans.
163, r. St-Denis, Paris.
62, av. Champs-Élysées, Paris
7, r. St-Yves, Rennes.
r. Faidherbe, Lille.
45, r. Villon, Lyon.
29, r. Singer, Paris.
61, r. de Vaugirard, Paris.
MONTAGU, 49, bd Port-Royal, Paris.
11, pl. Castellane, Marseille.
23, r. de Douai, Lille.
74, r. des Jacobins, Amiens.
7, r. Biscornet, Paris.
42, av. de Draveil, Vigneux-sur-Seine (S.-et-O.).
25, r. Dagorno, Paris.
48, r. de la Procession, Paris.
48, r. de la Procession, Paris.
37, r. de Bourgogne, Paris.
25, r. Dagorno, Paris.
276, r. Lecourbe, Paris.

| | |
|--------------------------------------|--|
| Energétènes végétaux | 26, av. de l'Observatoire, Paris. |
| Byla | |
| Energetyl | 137, av. Parmentier, Paris. |
| *Energine Iodée de Berck | 21, r. St-Leu, Amiens. |
| *Energine Phosphorée de Berck | 21, r. St-Leu, Amiens. |
| Energinose D'Frayssé | 21, r. de Neuilly, Nanterre. |
| *Enésol Clin | 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris. |
| Engeluroi | 22, r. de Vienne, Paris. |
| *Eniode Lefebvre | 2, r. Duphot, Paris. |
| Ennego | 37, r. de Bourgogne, Paris. |
| Eno's Fruit Salt | 4 ^{ter} , r. Barbès, Courbevoie. |
| Entalva | LUMIERE, 45, r. Villon, Lyon. |
| Entelactol | 24, bd Sébastopol, Paris. |
| Enteralthine | 3, r. Barbette, Paris (III ^e). |
| Entérgol | 68, Chaussée-d'Antin, Paris. |
| Entéricure | BRISSON, 157, r. Championnet, Paris. |
| *Enteriode | 39, r. de Clichy, Paris. |
| Entérisane | 112, r. de Gerland, Lyon. |
| *Entéro-Antigènes | 31, r. des Francs-Bourgeois, Paris |
| *Enterobyl Dehaussy | 66, r. Nationale, Lille. |
| Entérochir | LECLERC, 10, r. Vignon, Paris. |
| Entérococcène | CARRION, 54, r. du Fg-St-Honoré, Paris. |
| *Entérofagos | 7, av. des Sources, Nice. |
| *Entéroformine | 141, r. de Paris, Angoulême, Charente. |
| *Entérohépatine | 77, bd de Grenelle, Paris. |
| *Entéromucine | 37, r. de Bourgogne, Paris. |
| *Entéropansement | 24, r. de Fécamp, Paris. |
| Enteropraxines Abry | 14, r. Gravel, Levallois-Perret. |
| Entéroseptyl | 78, bd Beaumarchais, Paris. |
| *Entérovaccin Lumière | 45, r. Villon, Lyon. |
| *Entéro-Vaclydun | 27, r. Desrenaudes, Paris. |
| *Entéroxin Leclerc | 10, r. Vignon, Paris. |
| Entérozinc | JARMON, 4, pl. de la Gare, Tunis. |
| Entérozone | 56, bd Pereire, Paris. |
| Entérozyme | 52, r. Labruyère, Paris. |
| *Entéryl | FALQUE, Besançon. |
| *Enzypan | ALEXANDRE, 41, r. de Rome, Paris. |
| Eparseno | 21, r. Jean-Goujon, Paris. |
| Ephargol | GUY SIMON, 44, r. d'Inkermann, Lille. |
| *Ephédermine | 194, r. de Rivoli, Paris. |
| *Ephédraféine | id. |
| *Ephédrampoules | id. |
| *Ephédrasmine | Le Mont-Dore (Puy-de-Dôme). |
| Ephédrine Béral | 194, r. de Rivoli, Paris. |
| *Ephédrine Houdé | 9, r. Dieu, Paris. |
| Ephédrine Proba | FALVY, 40, r. des Acacias, Paris. |
| *Ephédrisol | 194, r. de Rivoli, Paris. |

- *Ephedrocamphre** 16, r Henri-Regnault, Courbevoie (Seine).
***Ephédrocure** 82-84, r. de Belleville, Paris.
***Ephédroides Béral** 194, r. de Rivoli, Paris.
Ephédrol 24, bd J.-Jaurès, Boulogne-sur-Seine.
***Ephédrolénol** 24, bd Jean-Jaurès, Boulogne-sur-Seine.
***Ephédromel** 194, r de Rivoli, Paris.
***Ephédro-rhinol** 20 bis r. Gravelotte, Toulouse.
***Ephéiodine Béral** 194, r. de Rivoli, Paris.
***Ephétropine Béral** 194, rue de Rivoli, Paris.
Epholéine 40, r. des Acacias, Paris.
***Epical** LAMBERT, 6, r. de Longchamp, Vichy.
Epidosine Grémy 14 r. de Clichy, Paris.
Epimesthol 33, r. Vaugirard, Paris.
Epoqualine François 16, c. Gambetta, Lyon.
***Equisétol** 59, r. Boissière, Paris.
***Eranol** 45, r. de l'Echiquier, Paris.
Eranyl SANSON, Mer (Loir-et-Cher).
Erbamil 105, bd Malesherbes, Paris.
***Erцерhinol** 37, r. de Bourgogne, Paris.
***Ergépatine** St-Just-en-Chaussée (Oise).
***Ergocoline** 32, r. de l'Ouest, Paris.
Ergophédrine CHAUVIN, Aubenas (Ardèche).
***Ergorone** SPECIA, 21, r. Jean-Goujon, Paris.
***Ergostol Violet** REBOUL, Pont-Sainte-Maxence (Oise).
Ergot de seigle Dausse 4, r. Aubriot, Paris.
Ergotine Bonjean 99, r. d'Aboukir, Paris.
***Ergotine Lamante** M. PARIS, 1, r. Lassalle, Lyon.
Ergotine Yvon 5, r. Lafeuillade, Paris.
Ergotinine Tanret 10, r. du Commandant-Rivière, Paris.
Ergotinine Byla 26, av. de l'Observatoire, Paris.
Erystypticum Roche 10, r. Crillon, Paris.
***Erythéma** 200, Gde-Rue, Maisons-Alfort (Seine).
***Erythra** 5, r. Claude-Decaen, Paris.
Erythroluès LECOQ & FERRAND, 14, r. Gravel, Levallois-Perret.
Erséol Prunier 6, r. de la Tacherie, Paris.
Esanofèle Bisleri 25, r. Dagorno, Paris.
***Esculéol** 16, r. Henri-Regnault, Courbevoie.
Eska 76, r. Orfila, Paris.
Essence Algérienne pl. de l'Entonnoir, Berck-Plage.
Essence Landaise 3, pl. Int. St-Michel, Toulouse.
Essence Japonaise MAUGER, 79, r. Legendre, Paris.
***Essoforme** SIMON, 44, r. Inkermann, Lille.
Etain Amicros 177, r. de Courcelles, Paris.
Etainazyl Lab. HY, 61, av. de Choisy, Paris.

- Ether amyvalérianique** G. BRUEL, 36, r. de Paris, Colombes (Seine).
- Ether anesthésique** SPÉCIA, 21, r. Jean-Goujon, Paris.
- Ether pour narcose** OPTIMA, Grande-Rue au Bois, Bruxelles.
- Ethervalérianique Vial** 8, r. Vivienne, Paris.
- Ethoforme** 18, r. de Jouvence, Dijon.
- *Ethyl-Pneumine Lersam** 92, bd Murat, Paris.
- Etoléase** CHAUVIN, Aubenas (Ardèche).
- Eubiol** 116, av. Ledru-Rollin, Paris.
- Eucalcine** 20 bis, r. Gravelotte, Toulouse.
- Eucalcium** 50, bd de Paris, Marseille.
- Eucalinhal** 98, r. J.-Maillette, La Madeleine.
- Eucalyptéol Anthoine** 8, r. Vivienne, Paris.
- *Eucalyptine Lebrun** 155, boul. Magenta, Paris.
- Euchol** Bagnoles-de-l'Orne.
- Eucortone** SCOTT, fg St-Honoré, Paris.
- Eudermyl** 4, imp. de Béarn, Paris.
- Eudigérase** 112, r. de Gerland, Lyon.
- Eudynol** 4, r. Désirée, Lyon.
- Euterine** 20, r. Vieille-du-Temple, Paris.
- *Eufosyl** 132, av. Victor-Hugo, Paris.
- *Eugaline** r. Albert-1^{er}, Beaumont-sur-Oise.
- *Eugastrol** Lab. BOUTROY, 8, r. de Passy, Paris.
- Eugéine Prunier** 6, r. de la Tacherie, Paris.
- *Euglyma** 7, r. des Petits-Carreaux, Paris.
- *Eugynol Grandval** 12 et 14, r. Féry, Reims.
- Eukénol Clément** 7, pas. Thionville-Paris.
- Eukinase Carrion** 54, fg St-Honoré, Paris.
- *Eumictine Leprince** 62, r. de la Tour, Paris.
- *Euonymine P. Thibault** 48, r. d'Alésia, Paris.
- Eupatorine** Lab. d'Allopathie générale, Brignais (Rhône).
- *Eupaveryl** PACHAUT, 130, bd Haussmann, Paris.
- Eupectoral** ARQUEVAUX, Etampes (S.-et-Oise).
- *Eupeptique Monavon** 14, r. Victor-Hugo, Lyon.
- *Euphon** 1, pl. Victor-Hugo, Paris.
- Euphonol Aguetant** 36, quai Fulchiron, Lyon.
- Euphorine, D^r Chaboud** FAURE et DUSSUEL, à Aix-les-Bains.
- Eupnorol Loudenot** 106, av. du Roule, Neuilly-sur-Seine.
- *Euphoryl** 18, av. Daumesnil, Paris.
- Euphrénine Bastia** 1, pl. Carnot, Lyon.
- *Euphysol** 22 bis, av. de St-Cloud, Versailles.
- *Euphytose** Lab. MADYL, 14, r. de Miromesnil, Paris.
- Euplasmol** VALENTIN, 79, rue de Wazemmes, Lille.
- Eupnéol** THÉVENOT, 21, r. des Roses, Dijon.

- *Eupnine Vernade
 *Eupnogénol
 *Eupnol
 Eupnoléine
 Eupnophédrol
 [Eurectol
 Eurexine
 Eurhéine
 Eurhéose
 Euronol
 Eurythmine Dethan
 *Euskine
 *Eusomnine Bélières
 Eutectyl
 *Eutensyl Grémy
 Eutonon
 Evatmine Carrion
 *Evine
 *Evobiline
 *Evolaxine
 *Evonyl
 Excytol
 *Exhépa
 *Exobol
 Exol Cognet
 Exolysés Byla
 *Exonérol
 Extensoplast
 Extrait de céréales
 Adrian
 *Extrait de Malt Français Déjardin
 Extrait de Malt Grütli
 Extrait du D^r Rap
 *Extrait Hamyd
 Extraits injectables
 Choay
 Extrait Juvinium
 Extraits Moncour
 Extraits totaux Choay
- r. St-Maurice, Nanterre (Seine).
 116, av. Berthelot, Vienne
 (Isère).
 26, r. des Moines, Paris (XVII^e).
 id.
 id.
 PERROCHON, 57, r. Origet,
 Tours.
 D^r-PETIT, 11, r. des Postes,
 Angoulême.
 7, pas. Thionville, Paris.
 COUDERT, 116, av. Ledru-
 Rollin, Paris.
 15, r. d'Argenteuil, Paris.
 11, r. Al-de-Neuville, Paris.
 45, fg St-Denis, Paris.
 19, r. Drouot, Paris.
 108, r. du Maréchal-Pétain,
 Vichy.
 14, r. de Clichy, Paris.
 49, r. Paradis, Paris.
 54, fg St-Honoré, Paris.
 16, r. Barbette, Paris.
 LAFFORT, Joué-lès-Tours (I.-
 et-L.).
 Lab. du D^r LAURENT,
 GÉRARD, 40, r. de Belle-
 chasse, Paris.
 BONTHOUX, Villefranche-sur-
 Saône
 MARTINET, 16, r. du Petit-
 Musc, Paris.
 39, r. Fondaudège, Bordeaux.
 12, r. du Chemin-Vert, Villc-
 neuve-la-Garenne (Seine).
 43, r. de Saintonge, Paris.
 26, av. Observatoire, Paris.
 8, r. de Passy, Paris.
 VIGIER, 9, r. de la Gare, Le-
 vallois (Seine).
 9 et 11, r. de la Perle, Paris.
 10, r. Parent-de-Rozan, Pa-
 ris (XVI^e) (Voir Malt.)
 139, av. de Verdun, Issy-les-
 Moulineaux.
 29, r. Singer, Paris.
 GMET, 27, fg Montmartre,
 Paris.
 48, av. Théophile-Gautier, Paris.
 2, pl. de la Duchesse-Anne,
 Nantes.
 49, av. Victor-Hugo, Boulogne-
 sur-Seine.
 48, av. Théophile-Gautier, Paris.

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Extrait surrénal Mieu- rice | 61, av. Louise, Bruxelles. |
| Extrait de Yogourth Ilgaz | 13, r. Nouvelle, Charenton. |

F

| | |
|--|---|
| Facmine Longuet | 34, r. Sedaine, Paris. |
| *Fanerval | 42, r. Mont-Cenis, Paris. |
| *Fango Fisch et C ^{ie} | 4, r. d'Illzach, Mulhouse. |
| Fantine Adoue | à Pauillac (Gironde). |
| Fantyl Manseau | à Margaux (Gironde). |
| Farine alimentaire Suckine | 12, av. Steph.-Mallarmé, Paris, et 16, r. Berthelot, Le Havre. |
| Farines Benedictus | 74, r. Lamarck, Paris. |
| Farines de céréales : légumes et fruits | BLOCH, Tomblaine, près Nancy (M.-et-M.). |
| Farine de malt Heude- bert | 85, r. de Saint-Germain, Nan- terre. |
| *Farines de régime Bloch | à Tomblaine, près Nancy. |
| *Farine de Soja « Soyolk » | 7, av. Marceau, Paris. |
| Farines Favrichon | à St-Symphorien-de-Lay (Loire). |
| Farine lactée Heude- bert | 85, r. de St-Germain, Nanterre. |
| Farine lactée Larousse | 99, Cours Balguerie, Bordeaux. |
| Farine lactée Nestlé | 6, av. Portalis, Paris. |
| Farine lactée diastasée Salvy | 4, r. Lambrechts, Courbevoie. |
| Farines Maltées Favri- chon | St-Symphorien-de-Lay (Loire). |
| Farines Maltées Jam- met | 47, r. Miromesnil, Paris. |
| Farine maltée Vial | 8, r. Vivienne, Paris. |
| Farine Mont-Blanc | Rumilly (Haute-Savoie). |
| Farines Nutricia | 142, r. Fransman, Bruxelles. |
| Farré-Cure | 29, r. Mogador, Paris. |
| Febrifuge Couturieux | 18, av. Hoche, Paris. |
| Fébrifuge | MOLIERE, à Constantine. |
| Fébril | 67, r. de Paris, Charenton-le- Pont (Seine). |
| Fébriline | 4, fg Stanislas, Nancy. |
| *Féculyse Heudebert | 85, r. Saint-Germain, Nanterre (Seine). |
| *Félamine Sandoz | 20, r. Vernier, Paris. |
| Félargent | 21, r. Jean-Goujon. |
| Félicol | 10, r. Vignon, Paris. |
| Felsol | pl. Homme-de-Fer, Strasbourg. |
| *Féminadène | 120, r. Lecourbe, Paris. |

- Feminoglandol**
Féminose
***Fénucalcium**
***Fénucine**
***Fenugrène**
***Fénurobur**
- Fer Amicros**
Fer-Arsenic
- Férarsényl**
- Fer Bravais**
Fer Girard
Fer Henry
Fer injectable Roussel
***Fer intraveineux**
Fraisse
Fériode Byla
Fer-ion
Fer Jaquemaire
***Fer Larcade**
Fer Leras
Fer Manganèse Amicros
- *Ferments lactiques**
Fabre
Ferment pur de raisins
- Fermentérol Milan**
Fermentéryl
Ferment Boss
- Ferments immuno-lactiques**
Ferment lactique Van Lier
***Ferment pur de raisin Jacquemin**
Ferment pur de raisin Médicoferment
Ferments organiques Zévor
- *Fer-Ovarine Vitalis**
Feroxal Buisson
Fer Quévenne
Fer Rabuteau
Ferrocalbiose
Ferrocalcine
Ferrocalcose
***Ferrocodile et Ferrico-dile Leprince**
Ferrocol
Ferrofyl
Ferroneurol
- 156, r. des Fauvelles, Courbevoie.
 7, r. Coq-Héron, Paris.
 191, fg St-Antoine, Paris.
 pl. du Châtelet, Orléans.
 2, pl. des Vosges, Paris.
ABARNOU, 72, av. Thiers, Le Mans.
 177, r. de Courcelles, Paris.
AUCHER, La Ferté-Macé (Orne).
 7, r. Guillaume-Budé, Montgeron.
 16, r. de Rocroy, Paris.
 8, r. Vivienne, Paris.
 39, r. Sclessin, Liège.
MOUSNIER, à Sceaux.
 8, r. Jasmin, Paris.
 26, av. l'Observatoire, Paris.
 18, av. Hoche, Paris.
 à Villefranche (Rhône).
 23, r. Beautreillis, Paris.
 8, r. Vivienne, Paris.
 9, bd Edgard-Quinet, Paris.
 33, r. de la Hale-Coq, Aubervilliers (Seine).
Lab. G. CESAR et **B. BOSS**,
 10, r. de la Viotte, Besançon (Doubs).
 15, r. d'Argenteuil, Paris.
 40, r. des Acacias, Paris.
Lab. G. CESAR & **B. BOSS**,
 Besançon (Doubs).
 8, av. des Sources, Nice.
 30, r. St-Jacques, Namur (Belgique).
 à Malzéville-Nancy (M.-et-M.).
 10, r. de la Viotte, Besançon.
COIRRE, 5, bd Montparnasse, Paris.
 38, bd de Charonne, Paris.
 98, r. de Sèvres, Paris.
 26, r. Petit, St-Denis.
 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
ROUSSY, Viroflay (S.-et-O.).
GUÉRIN, Meulan (S.-et-O.).
 71, r. du Fort, Aubervilliers.
 62, r. de la Tour, Paris.
 132, r. de Turenne, Paris.
 3, bd Beaumarchais, Paris.
TERMES, à Miramont-de-Guyenne (Lot-et-G.).

- Ferropeptone**
***Ferrophytine Ciba**
Ferroplasma
***Ferroxyline**
Ferrygene Carrau
***Ferydal**
Fibrinine
Fibrogénine
Fidulax Warin
Figadol Vivien
Filhosa
Filtrat Inosepta
***Fixase**
***Fixase Irradiée**
Fixine Gremy
Fixocalcine
Fixococcine Corbière
Fixogène Loudenot
***Flavurool**
***Flétase**
Flocons d'avoine Nutricia
Floravenc
Floréases
***Florhamélis**
Florhépatine
Florisana
Florosine
***Fludiose**
Fluène
Fluenzyl
***Fluérase**
Fluidbos
Fluidol
***Fluobyl**
***Fluocholine**
***Fluodyle**
Fluoformol Gonin
***Fluoganèse**
***Fluokol**
Fluol
Fluoram
Fluoridia
***Fluosalyl**
- 17, r. Cadet, Paris.
 109-113, bd de la Part-Dieu, Lyon.
 VIVIEN, 6, r. Abbeville, Paris.
 26, Gde-rue St-Clair, Lyon.
 34, bd de Clichy, Paris.
 ROY, 29, av. Charras, Clermont-Ferrand.
 37, r. de Bourgogne, Paris.
 Lab. Hygiodontis, Croissy-sur-Seine (Seine-et-Oise).
 4, chaussée de la Muette, Paris.
 62, r. du Cardinal-Lemoine, Paris.
 133, r. Lecourbe, Paris.
 60, r. de Monceau, Paris.
 PARET, 22, r. Guibal, Marseille.
 id.
 34, r. Sedaine, Paris.
 27, r. Desrenaudes, Paris.
 106, av. du Roule, Neuilly-sur-Seine.
 STÈNE, 2, pl. des Vosges, Paris.
 SPÉCIA, 21, r. J.-Goujon, Paris.
 142, r. Fransman, Bruxelles.
 MORTIER & C^{ie}, Bordeaux.
 20, fg Poissonnière, Paris.
 CAVY à Montluçon (Allier).
 45, fg St-Denis, Paris.
 26, av. des Klauwaerts, Bruxelles.
 BADEL, 58-60, r. des Moulins, Valence (Drôme).
 TÉTARD, à Beauvais.
 LANDRIN, 12, r. de la République, Puteaux.
 1, pl. Victor-Hugo, Paris.
 FOUCHERE, Rive-de-Gier, (Loire).
 24, c. Lafayette, Lyon.
 22 bis, r. de Silly, Boulogne-s.-Seine.
 38, bd Bourdon, Neuilly-Paris.
 50, r. de Turenne, Paris.
 10, r. Pierre-Ducreux, Paris.
 60, r. Saussure, Paris.
 46, r. de Rome, Marseille.
 LAFFORT, Joué-les-Tours (I.-et-L.).
 43, av. Kléber, Paris.
 17, r. du Bouloi, Paris.
 50, r. de Lille, Tourcoing.
 BEAUGOURDON, 43, av. Kléber, Paris.

- Flusan**
***Fluveinose Mauchant**
Fluxhémio
***Fluxine (gouttes)**
Fœnugol
Foie - Endocrisines
Fournier
***Fokienyl**
***Follestrine**
***Follicormone buccale**
***Folliculine Choay**
***Folliculine Crinex**
***Folliculine cristallisée**
Roussel
***Folilobine**
Folliovarine Laleuf
***Fondants de Soufre**
Dausse
Forcéase
***Forcival**
Fordynol
***Foriod**
Formadermine
Formagol Bouty
Formétine
Formine Adrian
Formint
Formitrol Wander
Formobenzyl
***Formocarbine**
***Formocarbos**
***Formocholine**
***Formocitrine**
Formogastrine
Formoline
Formojectine
Formo-Vaccins
***Formule Jacquemaire**
60
Formyl
***Fornose**
- 132, r. de Turenne, Paris.
 22, bd Circulaire d'Epina y,
 Gennevilliers (Seine).
 112, r. de Gerland, Lyon.
 J. BONTHOUX, Villefranche-
 sur-Saône.
 88, r. Duhesme, Paris.
 7, r. Biscornet, Paris.
 94, r. Pasteur, Fontenay-sous-
 Bois (Seine).
 GRÉMY, 14, r. de Clichy, Paris.
 HINGLAIS, 30, r. de Miro-
 mesnil, Paris.
 48, Av. Théophile-Gautier, Paris.
 18, r. St-Amand, Paris.
 89, r. Cherche-Midi, Paris
 FRAYSSE, 21, r. de Neuilly,
 Nanterre.
 51, r. Nicolo, Paris (XVI^e).
 4, r. Aubriot, Paris (IV^e).
 GILBERT, 6, r. du Laos, Paris.
 6, r. Bridaine, Paris.
 13, r. du Général-Foy, St-
 Etienne.
 SPÉCIA, 21, r. Jean-Goujon,
 Paris.
 SPÉCIA, 21, r. Jean-Goujon.
 Paris.
 3, r. Dunkerque. Paris.
 OPTIMA, Gde-Rue au Bois,
 Bruxelles.
 9, r. de la Perle, Paris.
 MERMINOD, 49, r. de Paradis,
 Paris.
 151 bis, r. de Joinville, Cham-
 pigny.
 DEHAUSSY, 66, r. Nationale,
 Lille.
 TÉTARD, à Beauvais.
 MILLET, à Rambouillet.
 ADLER, 36, r. des Francs-
 Bourgeois, Paris.
 37, av. Jules-Coutant, Ivry-s.-
 Seine.
 21, r. Alsace-Lorraine. Lyon.
 r. de la Loge, Montpellier.
 112, r. de Gerland, Lyon.
 LUCINIA, 154 bis, r. Breteuil,
 Marseille.
 Villefranche (Rhône).
 23, r. Valéry-Meunier, Pau.
 Lab. CHAVIALLE, 70, Gde-
 Rue, Sèvres (S.-et-O.).

| | |
|--------------------------|--|
| Fortal | Lab. SÉVIGNÉ, 76, r. des Rondeaux, Paris. |
| Fortiane | BONNAFÉ, Milhau (Aveyron). |
| *Fortossan Ciba | 109-113, bd de la Part-Dieu, Lyon. |
| Forvital | BRICHARD & FILS, Bar-leDuc (Meuse). |
| *Forxol | BAILLY, 15-17, r. de Rome, Paris. |
| *Fosfomagnyl | 12, r. de Castiglione, Paris. |
| *Fosfoxyl Carron | 69, r. de St-Cloud, Clamart (Seine). |
| Fostrychnol Chante-reau | 8, r. de Constantinople, Paris. |
| *Fosyls Carron | 69, r. St-Cloud, Clamart (Seine). |
| Fraikola | 4, r. des Carmes, Paris. |
| *Francalcion | 20, r. des Ecoles, Paris. |
| *Francoplaste Kraus | 37, r. Godot-de-Mauroy, Paris. |
| Frangoléine | à Aigurande (Indre). |
| Frangulose Flach | 6, r. de la Cossonnerie, Paris. |
| *Freinix | 98, r. de Sèvres, Paris. |
| Freinolutéine | 2, r. des Deux-Ponts, Paris. |
| *Freinospasmyl Le-prince | 62, r. de la Tour, Paris. |
| *Frenasma | 71, r. St-Blaise, Paris. |
| Frène Gmet | 27, fg Montmartre, Paris. |
| Frialine Grémy | 14, r. de Clichy, Paris. |
| Fructines Vichy | 49, av. Wagram, Paris. |
| *Frugeolines Vichy | 1 et 3, r. Lafloque, Vichy. |
| Fruits de Régime Tilloy | J. MIDY, 41, r. de Courbevoie. La Garenne (Seine). |
| Fucobiline Prothière | 55, r. Auguste-Comte, Lyon. |
| *Fucoglycine | 11, r. Milton, Paris. |
| Fucoiodine | 132, r. de Turenne, Paris. |
| Fucophosphine | COUGET, à Olonzac (Hérault). |
| *Fucosine Prothière | 55, r. Auguste-Comte, Lyon. |
| Fuculose | 223, r. St-Martin, Paris. |
| *Fucus Gmet | 27, fg Montmartre, Paris. |
| *Fucusol | 2, pl. des Vosges, Paris. |
| Fumigator Gonin | 60, r. Saussure, Paris. |
| Furcol | 47, r. Carnot, Versailles (S.-et-O.). |
| Furonculase | 24, av. Mathurin-Moreau, Paris. |
| Furonculine | COUGET, à Olonzac (Hérault). |
| Furol | 5, r. Chauveau-Lagarde, Paris. |
| Furoplast | VIGIER, 9, r. de la Gare, Levallois (Seine). |
| Furosyl | 156, r. des Fauvelles, Courbevoie. |
| Fusol | 154 bis, r. de Breteuil, Marseille. |

G

- Gabiol**
Gadéinol
Gadilène Vasseur
Gadiodine Labesse
***Gaduamine**
***Gaduase**
Gaduine algovitinée
Gaïacalcine Latour
***Gaïacamphre**
Gaïacodil Godard
Gaïacolphosphaté
Pautauberge
Gaïacomalt
Gaïacophosphal Clin
Gaïarsénan Ducatte
Gaïarsol Bouty
***Galabactéine**
Galactésia
Galactina
Galactogènes Jolivet
***Galactogil**
Galactose
Galazène
***Galform**
Galliasec
Galliodine
***Gambéol**
***GamétoxyI**
Gamostyl
***Ganderma**
- Sté française d'Extension Bio-Chimique, St-Quentin.**
6, bd Arago, Paris.
114, r. Faidherbe, Boulogne-s.-Mer.
36, r. des Lices, Angers.
RENARD, 35, r. de Paris, Clichy (Seine).
Lab. SERVIER, 25, r. E.-Vignat Orléans.
P. FONTANIER, Moulins-sur-Yèvre (Cher).
17, pl. des Vosges, Paris.
PLAGNOL, 18, r. Maréchal-Foch, Versailles.
13, r. Chernovitz, Paris.
165, r. St-Denis, Courbevoie.
U. C. E. P., 5, r. Labroque, Strasbourg.
20, r. des Fossés-St-Jacques, Paris.
191, r. St-Honoré, Paris.
3, r. de Dunkerque, Paris.
154 bis, r. Breteuil, Marseille.
AXAREL, 15, r. Catulienne, St-Denis.
68, r. Phalsbourg, Le Havre.
140, fg St-Honoré, Paris.
PROGIL, 77, r. Miromesnil, Paris.
30, r. des Francs-Bourgeois, Paris.
15, q. Bourbon, Paris.
20, r. Dumont-d'Urville, Paris (XVI^e).
CH. GERVAIS, 11, r. de Prony, Paris.
71, r. Ste-Anne, Paris.
42, r. Emile-Deschanel, Courbevoie.
SFEAT, 15, r. Catulienne, St-Denis.
156, r. des Fauvelles, Courbevoie.
42, r. Emile-Deschanel, Courbevoie.

- Gangliosaa**
 * **Gardenal** 2, allées Spach, Strasbourg.
SPÉCIA, 21, r. Jean-Goujon.
 Paris.
- * **Garéphédrine**
Gargarial **THORAL**, Le Mont-Dore.
 Usine du Blosset, Moulins-sur-
 Yèvre (Cher).
- * **Gargarisme du Mont-Dore** **SOULAS**, Surgères (Ch.-Inf.).
- Garsedol**
 * **Gastéose** **SIMON**, 44, r. Inkermann, Lille.
 14, r. Demarquay, Paris.
- Gasterinas**
Gastérine Frémont 77, bd de Grenelle, Paris.
 à Vichy (Allier).
- Gastérodyn** 137, fg St-Antoine, Paris (II^e).
Gastérol 37, r. Galilée, Paris.
- Gastérophiline** **AMBLARD**, r. Balainvilliers,
 Clermont-Ferrand.
- * **Gastias** 14, r. Demarquay, Paris.
- Gasto-Entérol** 132, av. Victor-Hugo, Paris.
- * **Gastrépatine** Lab. B. C. L., 29, fg de Bour-
 gogne, Orléans.
- * **Gastrhéma** 71, r. Saint-Blaise, Paris (XX^e).
Gastrhépase **CELLIER**, Saint-Uzé (Drôme).
Gastria **MARATON**, Châtel - Guyon,
 (Puy-de-Dôme.)
- * **Gastricino du Dr Du-** 6, r. Louis-Blanc, La Garenne-
 hourcau Colombes (Seine).
Gastrobiase 2, pl. des Vosges, Paris.
- * **Gastrocalcine** 17, r. Cadet, Paris.
- * **Gastrocaol** **BENDERITTER**, à Vendôme
 (Loir-et-Cher).
- * **Gastrocarbone** Saint-Louis (B.-du-Rhône).
- * **Gastroclean** **ADLER**, 36, r. des Francs-
 Bourgeois, Paris.
- Gastrodium** 51, r. de Paris, Pierrefitte (Seine).
- * **Gastroluès** 15, r. Catulienne, St-Denis.
- * **Gastronaldine** 58, r. de Maubeuge Paris.
- * **Gastropansement** **D^r ZIZINE**, 24-26, r. de Fécamp,
 Paris.
- Gastropeptyl** 40, r. des Acacias, Paris.
- Gastrophiline** 53, bd de Verdun, Fontenay-
 sous-Bois.
- Gastrosalvine** **P. FONTANIER**, Moulins-sur-
 Yèvre (Cher).
- Gastrosédase** 41, r. de Rome, Paris.
- * **Gastro-Sodine** 21, r. Violet, Paris.
- Gastrosic Léo** 11, square Marie-Louise, Bru-
 xelles.
- Gastrotherib** **LA BIOTHÉRAPIE**, 5, r. Paul-
 Barruel, Paris.
- * **Gastrozymase Bouty** 3, r. de Dunkerque, Paris.
- Gastryl** 108, r. Maréchal-Pétain, Vichy.
- * **Gatercodéine** **DOMERGUE**, Agen (L.-et-G.).
- * **Gatran** **LECOCQ** et **FERRAND**, 14, r.
 Gravel, Levallois-Perret.
- * **Gaurol** 30, r. Armand-Sylvestre, Cour-
 bevoie.
- Gayacolchine** 40, r. Bienfaisance, Paris.

- Gaze Anadhère**
Gaze Néolée
Gelagar
Gelax
Gelée antidiarrhéique
 Lumière
Gelées Vaccins Gol-
denberg
Gélicrème Dumesnil
 * **Gélicurine**
 * **Gélobarine**
Géloboldine
Gélocalcase
Gélocalcine
Gelodelbiase
 * **Gélogastrine**
Gelok
Gélo-Pansement Byla
Gélo-Pansements gas-
tro-intestinaux
 * **Gélor**
 * **Gélotanin**
Gélotube 29
Gelsémium Dausse
 * **Génacide**
 * **Génatropine**
 * **Génécarmine**
Génergosine
 * **Génésérine**
Genêt Gmet
 * **Genhyoscyamine**
 * **Génisténal**
Génocuroil
Génolactine
 * **Génomorphine**
 * **Génoscopolamine**
 * **Genosthéniques**
 * **Génostrychnine**
Genovital
Génox
 * **Géo-baryum**
Géodyl
Géraldine
- CAVAILLES, 29, r. Singer,**
 Paris.
 115, r. N.-D. des Champs, Paris.
 S. G. I. P., 73, r. G^{al}-Sarrail,
 Le Havre.
 137, av. Parmentier, Paris.
 45, r. Villon, Lyon.
- IVAGO, 17, r. de Provence,**
 Paris.
 10, r. du Plâtre, Paris.
AUDIBERT, Cinq-Cantons, à
 Bayonne.
SPÉCIA, 21, r. Jean-Goujon,
 Paris.
 4, imp. de Béarn, Paris.
 8, r. Vivienne, Paris.
 121, av. de St-Ouen, Paris.
 Lab. Pharmacologie Générale,
 8, r. Vivienne, Paris.
LICARDY, 38, bd Bourdon;
 Neuilly-sur-Seine.
LEURQUIN, 50-52, r. Pierre-
 Legrand, Lille.
 26, av. Observatoire, Paris.
 8, av. de Grammont, Tours.
 63, r. Faisanderie, Paris.
 Lab. CHOAY, 48, av. Théc-
 phile-Gautier, Paris.
 49, r. de Bitche, Courbevoie
 (Seine).
 4, r. Aubriot, Paris (IV^e).
MONTAGU, 49, bd Port-Royal,
 Paris.
 4, pl. des Vosges, Paris.
 33, G^{de}-Rue, Besançon.
 Lab. JONIDS, Dijon (Côte-
 d'Or).
 Lab. AMIDO, 4, pl. des Vosges,
 Paris.
 27, ig Montmartre, Paris.
 4, pl. des Vosges, Paris.
 20, r. des Fossés St-Jacques,
 Paris.
 10, r. Maubeuge, Paris.
 3, bd Courcelles, Paris.
 4, pl. des Vosges, Paris.
 4, pl. des Vosges, Paris.
 id.
 id.
 3, r. Dulong, Paris.
 82-84, rue de Belleville, Paris.
 Savigny-sur-Orge (S.-et-O.).
 J. ROBERT, 39, r. de Bour-
 gogne, Paris.
 121, av. de St-Ouen, Paris.

- *Geranine** 12, av. de la Grande-Armée, Paris.
Geraseptol 12, r. Vavin, Paris.
Gercecure AMBLARD, r. Balainvilliers, Clermont-Ferrand.
Gercérine Eon EON, 3, r. des Rouairies, Dinan (C.-du.-N.).
Gerdabyl GERDA, 163, bd Croix-Rousse, Lyon.
Germex 42 85, r. du Canal, Roanne.
Germocalcine 29, r. de Metz, Toulouse.
Germoclasine 7, r. Guillaume-Budé, Montgeron.
***Germose** LEBEAULT, 5, r. Bourg-l'Abbé, Paris.
Germosine Lumière 45, r. Villon, Lyon.
Germyl 9, r. Petitot, Dijon.
***Gérol Testart** Chalais (Charente).
Gesto Serum Sté d'Elevage et Produits biologiques, St-Philibert (Côte-d'Or).
Girasiol Dumesnil 10, r. du Plâtre, Paris.
Givrinol 14, r. d'Auge, Caen.
Gladyl 66, r. Nationale, Lille.
***Glandex phoscalcique** 58, r. de Maubeuge, Paris.
***Glandimbine Lafran** 8, r. de Prague, Paris.
***Glandocalcyl** 40, r. Claire-Paulhac, Toulouse.
Glaucotitane 16, r. de la Tour, Paris.
Glaucuroil 74, r. Blanche, Paris.
Glaxo RISSA, 46, r. Claude-Lorrain, Lille.
***Glésol** 18, av. Hoche, Paris.
Globabyl KERFYSER, r. Alexandre-III, Dunkerque.
Globépal BOUTY, 3, r. de Dunkerque, Paris.
***Globexine** SCIENTIA, 21, r. Chaptal, Paris.
Globugénol Lab. COMTOS, Feschés-le-Châtel (Doubs).
Globular 1, place Daveil, Marseille.
Globules Hébert à St-Lô (Manche).
***Globules Fumouze** 78, fg St-Denis, Paris.
Globules Laincar LANCOSME, 71, av. Victor-Emmanuel-III, Paris.
***Globules Romon** MONAL & C^{ie}, 6, r. Bridaine, Paris.
Globules Secrétan J. LOGEAIS, 22 bis, r. de Silly, Boulogne-sur-Seine.
***Gloma (Malt Wander)** 151 bis, rte de Joinville, Champigny (Seine).
***Glottyl** 85 bis, r. du Ranelagh, Paris.
***Gloxines** 6 bis, r. Campagne-Première Paris.
Glucalcium R. X. ROUX, 58, r. de Maubeuge, Paris.
Glucoflavine route Nationale, Wattignies (Nord).

- *Glucolactol
 Gluconate de calcium Sandoz
 Gluconyl
 Gluphosol
 Glutaspirine
 Glutéokina
 Glutinettes d'Aspirine
 Glycalcion
 Glycérine créosotée phosphatée Catillon
 Glycéro-bromurine
 *Glycéro Gloma
 Glycéro-iodurine
 Glycéro-ovarine
 *Glycérophosphate Dal-loz
 Glycérophosphates Le Perdriel
 Glycérométhylarsénié
 Glycérophosphates de chaux granulé Girard
 Glycérophosphates effervescents
 Glycérophosphates Freyssinge
 Glycérophosphates Jacquemaire
 *Glycérophosphate Robin
 Glycéro-Thyroidine
 Glycéro-Tribromurine
 Glycogène
 Glycobl
 *Glycocarpine
 Glycogène Clin
 Glycojasol
 *Glyco-lactimase
 *Glyco. M.
 Glyco-phénique du Dr Déclat
 Glycophosphates granulés Astier
 *Glyco-Thymoline
 *Glyctone phosphatée Charrière
 *Glykolaine Robin
 Glyphosphor
 *Gmet (Extraits)
- BAILLY, 15, r. de Rome, Paris.
 SANDOZ, 20, Vernier, Paris.
 88, r. Duhesme, Paris.
 5, r. Lefebvre, Paris.
 MERMINOD, 49, r. de Paradis, Paris.
 MAZURE, 3, r. de Vouillé, Paris.
 14, r. des Pyramides, Paris.
 21, r. Feydeau, Paris.
 3, bd St-Martin, Paris.
 OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
 151 bis, r. Joinville, Champigny (Seine).
 OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
 13, bd de la Chapelle, Paris.
 11, r. Milton, Paris.
 6, r. Dombasle, Paris.
 48, r. d'Alésia, Paris.
 LE PERDRIEL, 11, r. Milton, Paris.
 6, r. Abel, Paris.
 à Villefranche (Rhône).
 13, r. de Poissy Paris.
 OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
 OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
 8, r. Vivienne, Paris.
 4, pl. des Vosges, Paris.
 DALIN, 49, q. St-Vincent, Lyon.
 20, r. des Fossés-St-Jacques, Paris.
 19, r. Ferdinand-Duval, Paris.
 18, av. Hoche, Paris.
 3, av. Lowendal, Paris.
 6, r. de la Tacherie, Paris.
 45, r. Docteur-Blanche, Paris.
 5 bis, r. des Haudriettes, Paris.
 ARQUEVAUX, à Etampes (Seine-et-Oise).
 13, r. de Poissy, Paris.
 56, Chemin de Combe-Blanche, Lyon.
 27, fg Montmartre, Paris.

- Gobérol**
- *Gobillettes Hypnos**
Golarsyl Meurice
- *Gomenol**
Gometer
- Gometyl**
Gomhydrine
- *Gonacrine**
- *Gonagone**
- *Gonarthri Vaclydun**
Gonéine (Capsules)
- Gonocure**
- *Gono-Vaclydun**
Gonoyatrène
Gonuro A et B
Gorgéine
Gorgex
- *Gosiérine Dalloz**
Gossyl
Gossypiol Maurin
- Goudrinhal**
Goudroline
- Goudron Le Beuf**
Goudron Freyssinge
Gouttes amères de
Baumé
- Gouttes antirhumastimales Wagner**
- Gouttes Antispasmodiques Dausse**
- Gouttes Arsénosténiques Dausse**
- Gouttes Blagny**
- *Gouttes Bronchophiles**
André
- Gouttes calciques Zanit**
- Gouttes Chauvin**
- *Gouttes Daynoc**
- Gouttes d'Yzeurol**
Gouttes Efigé
- *Gouttes Eryl**
Gouttes Esurine
Gouttes Gydé
- *Gouttes Fluvia**
Gouttes halogènes du
D^r Bern
- Gouttes Him**
- CHARMAISON**, 26, av. de
Royat, Clermont-Ferrand.
Chabeuil (Drôme).
61, av. Louise, Bruxelles.
48, r. des Petites-Ecuries, Paris.
ROBERT et CARRIERE, 37, r.
de Bourgogne, Paris.
id.
82-84, r. de Belleville, Paris.
SPÉCIA, 21, r. Jean-Goujon,
Paris.
CARRION, 54, fg St-Honoré-
Paris.
27, r. Desrenaudes, Paris.
A. GUILLAUMIN, 13, r.
Cherche-Midi, Paris.
SAUBA, Montreuil.
27, r. Desrenaudes, Paris.
26, r. Vauquelin, Paris.
20 bis, r. Gravelotte, Toulouse.
FOIRET, à Montargis (Loiret).
33, Grande-Rue, Besançon.
13, bd la Chapelle, Paris.
4, imp. de Béarn, Paris.
Lab. de l'HORMOCRINOL,
17, r. de la Glacière, à la Ga-
renne-Colombes (Seine).
98, r. J.-Maillotte, La Madeleine.
POINTET et GIRARD, 30, r.
des Francs-Bourgeois, Paris.
11, r. Milton, Paris.
6, r. Abel, Paris.
D^r GIGON, 25, bd Beaumar-
chais, Paris.
107, av. de la Reine, Boulogne-
sur-Seine.
4, r. Aubriot, Paris (IV^e).
4, r. Aubriot, Paris (IV^e)
Pamela, Forges-les-Eaux (S.-I.).
58-60, r. des Moulins, Valence
(Drôme).
3, pl. Intérieure St-Michel, Tou-
louse.
Aubenas (Ardèche).
LEJEUNE, 142, r. de Picpus,
Paris.
26, av. de Tourville, Paris.
40, av. Secrétan, Paris.
102, r. Vincent, Marseille.
D^r R. PETIT, Angoulême.
4, cours Tolstoï, Lyon.
7, av. Marceau, Paris.
3, pl. Intérieure St-Michel,
Toulouse.
37, r. de Bourgogne, Paris.

- *Gouttes hypotensives Fraisse
 Gouttes iodopeptiques Narud
 *Gouttes Leconte
 *Gouttes Linober
 *Gouttes livoniennes
 Gouttes Lo-Lo Tsé Isberg
 *Gouttes Magalo
 *Gouttes Malone
 Gouttes Milko
 *Gouttes Narkay
 *Gouttes Nican
 *Gouttes Païdophiles du D^r Guiraud (Voir Iodarsénic Guiraud)
 Gouttes P. A. S.
 Gouttes Pectiques du D^r Albert
 Gouttes Pectosérum
 Gouttes Perettes
 *Gouttes Phosphosténiques Dausse
 *Gouttes Pilka
 Gouttes Reynaud
 Gouttes Sap
 Gouttes Scandinaves
 Gouttes Schmit anti-convulsives
 Gouttes Sclérocure
 *Gouttes de Séru
 Gouttes Vigor
 Goyl Meurice
 *Grains céphalgifuges
 *Grains de Vals
 Grains d'Evian
 Grains Gelm
 *Grains d'Éphédrine
 Grains du D^r Jehan-Meyer
 Grains Miraton
 Grains de santé du D^r Franck
 Gramalt
 *Granions de Fouard
 *Granoxyl
 Granulé Bravais
 *Granulé Cabasson
- FRAISSE, 8, r. Jasmin, Paris.
 38, r. N.-D.-de-Nazareth, Paris.
 7, r. des Petits-Carreux, Paris
 17, r. Cadet, Paris.
 61, av. Philippe-Auguste, Paris (II^e).
 F. BOUVIER, 31, bd de la Villette, Paris
 Etabl. GOY, 23, r. Beautreillis, Paris.
 VINCENT, à Ancenis (L.-Inf.).
 CLUZEL, 60, c. E.-Zola, Lyon.
 SAUBA, Montreuil (Seine).
 CANTIN, à Palaiseau (S.-et-O.).
 10, imp. Milord, Paris.
 GOUIN, 30, r. des Écoles, Paris.
 37, r. des Lois, Toulouse.
 3, pl. Intérieure St-Michel, Toulouse.
 42, av. de Breteuil, Paris.
 4, r. Aubriot, Paris (IV^e)
 Lab. ZYMA, 4, r. Bellart, Paris.
 D U R A N D, Aigues-Mortes (Gard).
 83, r. des Martyrs, Paris.
 D^r H. PHILIPPE, 14, r. du Palais-Grillet, Lyon.
 G. Vilas à Châlons-sur-Marne.
 CHAUVIN, Aubenas (Ardèche).
 69, r. de Sèvres, Paris.
 26, ch. de la Madeleine, Nantes.
 61, av. Louise, Bruxelles.
 2, r. Claude-Matrat, Issy-les-Moulineaux.
 7, r. Galvani, Paris.
 PERROCHON, 57, r. Origet, Tours.
 D^r LALAUERIE, Cuxac-d'Aude.
 194, r. de Rivoli, Paris.
 34, r. St-Martin, Château-du-Loir (Sarthe).
 48, r. d'Alésia, Paris.
 59, r. Nollet, Paris.
 CHASSAIGNE, Ruffec (Ch.-I.).
 61, r. Gaston-Lauriau, Montreuil (Seine).
 16, r. du Petit-Musc, Paris.
 3, r. Mogador, Paris.
 183, r. de Rome, Marseille.

- Granulé calmafrenkel LEMATTE, 52, r. La Bruyère, Paris.
- Granulé du Dr Mous-saud H. RIVIER, 26, r. St-Claude, Paris.
- *Granulé Edges 59, r. Boissière, Paris.
- Granules Elkin 18, r. de Beaune, Paris.
- Granulé Girard 48, r. d'Alésia, Paris.
- Granulé Sabel 20 bis, r. Sergent-Godefroy, Montreuil-sous-Bois.
- Granules 3 cachets Dr COIRRE, 5, bd Montparnasse, Paris.
- Granules d'Aloïne OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
- Granules de Boldine id.
- *Granules Chanteaud 3 et 5, r. Alex.-Dumas, St-Ouen (Seine).
- Granules Chevrier 21, fg Montmartre, Paris.
- Granules Colchicine OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
- Granules Crosnier 6, r. Chanoinesse, Paris.
- Granules de Digitaline OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
- Granules Homolle & Quévenne 14, r. des Beaux-Arts, Paris.
- Granules Houdé 9, r. Dieu, Paris.
- Granules Hydrastinine OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
- Granules Hyosciamine id.
- Granulé de Panphosphates 119 bis, av. Chemin-de-Fer, Rueil (S.-et-O.).
- *Granules Pantofort du Dr Boveil 1, r. Lassalle, à Lyon.
- Granules du Dr Papillaud GIGON, 25, bd Beaumarchais, Paris.
- Granules Spartéine id.
- Granulé pulmonaire 49, r. de Metz, Nancy.
- Giry 3, r. Watteau, Courbevoie.
- Granulé dépuratif Künckel 17, r. Cadet, Paris.
- Granulé Tinardon 11, r. Lafayette, Paris.
- *Granules des Vosges 98, r. de Sèvres, Paris.
- Grassyl 97, r. de Vaugirard, Paris.
- *Gravidostyl 61, av. Louise, Bruxelles.
- Graumanyl Meurice 28, r. de Seine, Paris.
- *Gravural 19, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
- Gripodal 23, r. du Caire,
- Grippol 4, av. Brazza, Romainville (Seine).
- Grog antigrip Labo-rome 8, r. Vivienne, Paris.
- Guarana Grimault 71, av. de la République, Cham-pigny (Seine).
- Guérysipèle Lab. PEPIN & LEBOUCC, Courbevoie (Seine).
- *Guéthural 26, av. Observatoire, Paris.
- *Gui Byla 27, fg Montmartre, Paris.
- *Gui Gmet 19, r. J.-J.-Rousseau, Paris.

- Guilyl**
 * **Guimelinde**
 * **Guipsine Leprince**
 * **Guitose**
Gunose
 * **Guttoléol**

Gutturyl
Gynaicéol
Gynalthine
 * **Gynarsol**
Gynaseptone
 * **Gyneco-Vaclydun**
Gynéose
 * **Gynergène**

Gynévrine
 * **Gynocalcion**

Gynocrinol

Gynocure
 * **Gynoestryl**

Gynoglandine
Gynonyporphysol

Gynoluteol
Gynolysats
Gynométine
Gynopausine
Gynophiline
Gynophyl Reboul
Gynopolycrinol

Gynosol
Gynoster
- 4, imp. de Béarn, Paris.
 Ancenis (Loire-Inf.).
 62, r. de la Tour, Paris.
 4, r. Désirée, Lyon.
 D^r LALAUURIE, Cuxac-d'Aude.
 MAIRE, 171, r. de Belleville,
 Paris.
 58, r. de Maubeuge, Paris.
 17, r. Cadet, Paris.
 3, r. Barbette, Paris (III^e).
 16, r. du Petit-Musc, Paris.
 BRÉANT, 11, r. de Clichy, Paris.
 27, r. Desrenaudes, Paris.
 14, r. des Pyramides, Paris.
 Etabl. SANDOZ, 20, r. Vernier,
 Paris.
 4, imp. de Béarn, Paris.
 Lab. CORTIAL, 7, r. de l'Armo-
 rique, Paris.
 Lab. ISCOVESCO, 107, r. des
 Dames, Paris.
 DEBROCK, 22, r. de Paris,
 Houilles (S.-et-Oise).
 ROUSSEL, 89, r. du Cherche-
 Midi, Paris.
 69, av. du Maine, Paris.
 Lab. ISCOVESCO, 107, r. des
 Dames, Paris.
 id.
 4, imp. de Béarn, Paris.
 45, fg St-Denis, Paris.
 42, du Mont-Cenis, Paris.
 DOUARD, Uzel (C.-du-N.).
 Pont-Ste-Maxence.
 Lab. ISCOVESCO, 107, r. des
 Dames, Paris.
 FARMA, 64, r. d'Orsel, Paris.
 133, r. Lecourbe, Paris.

H

- Haemaboeo**
Halocure
Hamamélidine
 * **Hamacitro**
 * **Hamaméline Roya**
- BAILLY, 15-17 r. de Rome,
 Paris.
 2 bis, r. du Chevalier-de-la-Barre,
 St-Quentin (Aisne).
 J. LOGEAIS, à Boulogne-sur-
 Seine.
 47, bd St-Michel, Paris.
 41, r. de Rome, Paris.

- *Hamaméliode 17, r. Cadet, Paris.
- Hamamélis Dausse 4, r. Aubriot, Paris.
- *Hamamélis Gmet 27, fg Montmartre, Paris.
- *Hamamélis Grandval 12-14, r. Féry, à Reims.
- Hansénol 116, bd Haussmann, Paris.
- *Hectargyre Naline à Villeneuve-la-Garenne.
- *Hectine Naline id.
- Hectiode CANONNE, bd Sébastopol, Paris.
- Hedopeptol 34, r. Montgallet, Paris.
- Helbine 94, r. Michelet, Alger.
- Hélénine du D^r Korab Lab. CHAPES, Chambois (Orne)
- Heliatol (poudre, pom- 4, pl. Royale, Nantes.
- made)
- Hélieurone BYLA, 26, av. de l'Observa-
toire, Paris.
- Héliosodine 249, r. de Vaugirard, Paris.
- Héliostérine LAROZE, 54, rue de Paris, Cha-
renton (Seine).
- Hélital 15, pl. Nationale, Dieppe.
- Helmazil 7, av. Marceau, Paris.
- Helminthose 132, r. de Turenne, Paris.
- Helminthyl 14, r. Gravel, Levallois-Perret.
- Hémabéol 72, av. Kléber, Paris.
- Hémabione MOURGUES, chemin Neuf,
Ganges (Hérault).
- *Hémagène Tailleur SEVENET, 10, r. Le Chapelais,
Paris.
- *Hémagénine Giraud pl. de l'Eglise, Argenteuil.
- Hémaldine BILLEBAUD, Paray-le-Monial
(Saône-et-Loire).
- Hémarsyl du D^r Roux CAILLAU, à Argentat (Corrèze).
- Hématéol 81, r. Le Corrège, Bruxelles.
- *Hématoéthylroïdine 54, Fg St-Honoré, Paris.
- Hematogénine DEMASLES, Vienne (Isère).
- Hématogenol 37, r. Galilée, Paris.
- *Hémato-iodine 2, pl. des Vosges, Paris.
- Hématopan 263, r. Lecourbe, Paris.
- Hématoquina Tran- 7, r. Guillaume-Budé, Mont-
toul geron.
- Hémaxol Lab. JONIDS, Dijon.
- *Hémoantitoxine Sofos 4, r. Désirée, Lyon.
- Hemobiose M. AUBANEL, Pointe-Rouge,
Marseille.
- *Hémocalcine FERCOCQ, St-Maur (Seine).
- *Hémocalciopectine BOUDIER, 37, r. de Bour-
gogne, Paris.
- Hémocléan 36, r. des Francs-Bourgeois,
Paris.
- Hémocléine Lafay 54, ch. d'Antin, Paris.
- *Hémo - Cyto Labor. CORBIERE, 27, r.
Corbière Desrenaudes, Paris.
- Hémodrome LANCOSME, 71, av. Victor-
Emmanuel-III, Paris.
- *Hémoductyl LICARDY, 38, boul. Bour-
don, Paris-Neully.
- *Hemofer LOBRY, 6, r. Parrot, Paris.

- Hemoferrine**
Hémofixine
***Hémofluidol**
Hémogénase
***Hémogénol Dausse**
Hémogényl Godart
Hémoglobine Bovel
Hémoglobine Dalloz
***Hémoglobine Des-chiens**
Hémoglobine Star
Hémoglobine Van Lier
Hémoglyne Thuau
Hémo-Hépatext
***Hemoluol**
Hémoneurol Cognet
***Hémopanbiline**
***Hémopausine**
Hémopectal
***Hémo-Phagostyl**
***Hémophiline Planche**
Hémophytol
***Hémoplasme Lurnière**
***Hémoplasmine**
Hémopoïne
Hemoradol
***Hémorroïdine**
 (Pommade.Gouttes.)
Suppositoires
***Hémosamine (Utéramine)**
Hémosédine
Hemoserosan
Hémosine
Hémossérum
***Hémostatique Coudert**
***Hémostatique Goy**
***Hémostérine irradiée**
***Hémostra Roche**
***Hémostyl**
***Hémotal**
Hémotonine
Hémo-Tonikéine
Hémovarine
***Hémoveine**
***Hémoviris**
 (cachets, élixir)
- OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.**
 4, r. Beaurepaire, Paris.
 Lab. LÉONARDON, Arcachon.
 à Courpière (Puy-de-Dôme).
 4, r. Aubriot, Paris (IV^e).
 Andenne (Belgique).
 101, av. Mozart, Paris.
 13, bd de la Chapelle, Paris.
 9, r. Paul-Baudry, Paris (VIII^e).
 2, r. Marché-des-Blancs-Man-teaux, Paris.
 30, r. St-Jacques, Namur.
 22, fg St-Michel, Angers.
TAILLANDIER, 107, av. Jean-Jaurès, Paris.
 6, r. Dombasle, Paris.
 43, r. de Saintonge, Paris.
 Annonay (Ardèche).
 16, r. du Petit-Musc, Paris.
 A. FALVY, 40, r. des Aca-cias, Paris.
 A. PARIS, 4, r. La Motte-Picquet, Paris.
 2, r. Volney, Paris.
BEDEIL, Lavelanet (Ariège).
 45, r. Villon, Lyon.
 30, r. St-Jacques, Namur.
 D^r SCHOLL, à Gembloux, Belgique.
 25, r. Vaneau, Paris.
 4, r. Alexandre-III, à Dun-kerque.
 9, pl. Félix-Faure, Paris.
 19, r. de Fleurus, Paris.
TORAUDE, 22, r. de la Sor-bonne, Paris.
 89, bd Sébastopol, Paris.
JARMON, 4, pl. de la Gare, Tunis.
 116, av. Ledru-Rollin, Paris.
 23, r. Beautreillis, Paris.
 366, av. Thiers, Bordeaux.
 10, r. Crillon, Paris.
 97, r. de Vaugirard, Paris.
UNIS-SPES, 14, r. Demarquay, Paris.
 98, r. de Sèvres, Paris.
 52, r. La Bruyère, Paris.
ADLER, 36, r. des Francs-Bourgeois, Paris.
BRICHARD, à Bar-le-Duc.
 54, r. de Sablonville, Neuilly-sur-Seine.

- Hémozol
Hémynne
- *Hemypnal
Henrick's bill
Hényl
Hépabyl
*Hépacrine
Hepacuirol
*Hépadrainase
Hépagastroi
Hépaglycérol
*Hépagyl
*Hépalomel Védé
Hépanème
*Hépapeptine
*Hépaphos
Héparadénine
Héparbiline
Héparcyl
Héparène
*Héparfer
*Héparmone Byla
Hépascol
Hépasodyl
*Hépatergol
*Hépathemo
*Hépatie Efa
Hépatine Bouty
*Hépatine Gad
Hépatismine
Hépatobyl
Hépatocrinol
Hépatodianose
*Hépatodiase
Hépatofomine
Hépatogastrine
Hépatogènes Charvoz
- 12, boul. Saint-Martin, Paris.
13, r. de la République, Yzeure-Moulins (Allier).
109-113, bd de la Part-Dieu, Lyon.
VERGELOT, 163, r. de Flandre, Paris.
31, av. Foch, La Garenne-Colombes.
TORAUDE, 22, r. de la Sorbonne, Paris.
DEBAT, 60, r. de Monceau, Paris.
10, r. de Maubeuge, Paris.
16, r. du Petit Musc, Paris.
33, av. de Villiers, Paris.
CARRION, 54, r. du Fg-St-Honoré, Paris.
97, r. de Vaugirard, Paris.
2, pl. Gambetta, Paris.
54 fg St-Honoré, Paris (VIII^e).
DEBAT, 60, r. de Monceau, Paris.
4, r. Platon, Paris (XV^e).
OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
id.
23, r. du Caire, Paris.
30, r. Denis-Papin, Blois.
PELLISSIER, 33, av. de Villiers, Paris.
26, av. de l'Observatoire, Paris.
70, cours Alsace-Lorraine, Bordeaux.
9, r. Laloy, Chaumont.
Cousin, r. Albert I^{er}, Beaumont-sur-Oise.
9, r. Paul-Baudry, Paris.
rue du Château, Carentan (Manche).
3, r. Dunkerque, Paris.
OLIVIERO, 62, bd J.-Jaurès, Boulogne-sur-Seine.
29, r. de Liège, Paris.
62, bd Jean-Jaurès, Boulogne-sur-Seine.
Lab. ISCOVESCO, 107, r. des Dames, Paris.
30, r. des Francs-Bourgeois, Paris.
UNIS-SPES, 14, r. Demarquay, Paris.
26, av. de Royat, Clermont-Ferrand.
4, chaussée de la Muette, Paris.
3, chem. du Vallon, Lyon-Caluire.

- Hépatolax**
Hépatomagnésion
 ***Hépatomanganol**
Hepatoseptyl
Hépat-Sérine
 ***Hépatosodine**
Hépatotanic
 ***Hépatozyl**
 ***Hépatrol**
Héracléine
Héracléol
 ***Hergénol**
Hermarsinol
Hermomuthol
 ***Hermophényl**
Hermostyrum
Héroïne Vicario
 ***Hespéridausse**
Hétérolysine
Héxachol
 ***Hexafel**
Hexaformine
Hexalithine
Hexaranol
Hexarubrine
 ***Héxorcène**
 ***Hexotal**
Hippo-Carnis
Hippoplasine du D^r Gran
 ***Hipposarcine Roy**
 ***Hirudinase**
Histocalcine
 ***Histogénol Naline**
Hojasol
Holaseptine
Holocalcine
 ***Holos Deschiens**
 ***Holosplénine**
 ***Holovarine**
Holuryl
 ***Hopogan**
Hopoganase
Hordeomaitine
Hordose
- 83, bd de la Villette, Paris.
 57, r. Pierre Corneille, Lyon.
 11, pl. Louis-XII, Blois.
 108, r. Maréchal-Pétain, Vichy.
 22, r. Guillaume-le-Conquérant, Caen.
 DURET & RÉMY, Asnières (S.).
 14, r. de Clichy, Paris.
 40, r. Claire-Paulhac, Toulouse.
 4, r. Platon, Paris (XV^e).
 COUTURIEUX, 18, av. Hoche, Paris.
 Lab. des Etabl. SALLE, 4, r. Elzévir, Paris.
 GROS, 13, pl. Delille, Clermont-Ferrand.
 66, r. Nationale, Lille.
 66, r. Nationale, Lille.
 45, r. Villon, Lyon.
 WARIN, 4, chaussée de la Muette, Paris.
 17 bd Haussmann, Paris.
 4, r. Aubriot, Paris.
 62, bd J.-Jaurès, Boulogne-sur-Seine.
 26, r. Sainte-Claire, Mulhouse.
 47, r. Bokanowski, Asnières.
 123, pl. Beauvoisine, Rouen.
 REBOUL, Pont-Ste-Maxence.
 88, r. Duhesme, Paris.
 20 bis, rue Gravelotte, Toulouse.
 SPÉCIA, 21, r. Jean-Goujon, Paris.
 18, r. Ernest-Rousselle, Paris.
 LE GALLO, à Auray (Morbihan).
 BYLA, 26, av. de l'Observatoire, Paris.
 56, ch. Combe-Blanche, Lyon.
 18, av. Daumesnil, Paris.
 83, bd de la Villette, Paris.
 à Villeneuve-la-Garenne.
 19, r. Ferdinand-Duval, Paris.
 5, Grande-Rue, Cannes.
 15, pl. Godefroy-de-Bouillon (Boulogne-sur-Mer).
 9, r. Paul-Baudry, Paris.
 48, r. de la Procession, Paris.
 48, r. de la Procession, Paris.
 A. FALVY, 40, r. des Aca-cias, Paris.
 12, r. Lamartine, Paris.
 12-18, r. Lamartine, Paris.
 10, r. Richelieu, Paris.
 31, r. des Pierres, Bruges (Belgique).

- *Hormantoxone** 5, r. de la Paix, Paris.
***Hormobiline** 17 bis, av. Parmentier, Paris.
***Hormocline** LEMATTE & BOINOT, 52, r. La Bruyère, Paris.
***Hormocrinol F et M** JAMMES, 17, r. de la Glacière, la Garenne-Colombes.
Hormodausse 4, r. Aubriot, Paris.
Hormolaxine 16, r. du Petit-Musc, Paris.
Hormolutéine 2, rue des Deux-Ponts, Paris.
Hormotensyl 20 bis, r. du Sergent-Godefroy, Montreuil-sous-Bois.
Hormotone DÉGÈCÉ, 7, rue Princesse, Paris.
***Hormovarine Byla** 26, av. Observatoire, Paris.
***Hormovitol** 16, r. du Petit Musc, Paris.
***Hormuclases** 89, r. du Cherche-Midi, Paris.
Hordénine Lauth 9, r. du 4-Septembre, Paris.
Horsine 4, r. St-Anastase, Paris.
***Hova (Tablettes)** ZYMA, 9, pl. Félix-Faure, Paris.
Huile au Calomel Dumesnil 10, r. du Plâtre, Paris.
***Huilaixine** 15, r. de Rome, Paris.
Huile Boris 14, r. de Birague, Paris.
***Huile Crolas** 56, ch. Combe-Blanche, Lyon.
***Huile de foie de morue médicinale suractivée** RHONE-POULENC, 21, rue Jean-Goujon, Paris.
Huile de génévrier Vial 8, r. Vivienne, Paris.
***Huile Gallina** 4, r. Candolle, Paris.
Huile grise Duret 12, r. de Nice, Paris.
***Huile grise Ercé** 37, r. de Bourgogne, Paris.
Huile grise stérilisée VIGIER, 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
Huile de Hogg 13, r. Paul-Baudry, Paris.
***Huile iodée Finikoff** 21, r. Chaptal, Paris.
Huile Parlax 65, rue Douy-Delcupe, à Montreuil (Seine).
Huiles Cholestérinées Dausse 4, r. Aubriot, Paris (IV^e).
***Humoro Stabiline** 2, r. Claude-Matrat, Issy-les-Moulineaux.
Hycal DURET & RÉMY, Asnières (Seine).
***Hydralin** 37, r. de la Fédération, Paris.
Hydramélis 33, Gde-Rue, Besançon.
Hydrargyrettes HUBERT, Romorantin (L.-et-Cher).
Hydrargyrion 18, av. Hoche, Paris.
Hydrariode à La Ferté-Macé (Orne).
***Hydrastine Houdé** 9, r. Dieu, Paris.
Hydrastis Dausse 4, r. Aubriot, Paris.
***Hydrastis Gmet** 27, faub. Montmartre, Paris.
Hydrastol 222, fg St-Martin, Paris.
Hydrocamphre 88, r. Duhesme, Paris.
Hydroclonazone Lab. des Antiseptiques Chlorés, 42, r. Thiers, Le Havre.
Hydrocotyle 21, r. Chaptal, Paris.

| | | |
|--|-----|---|
| Hydrogemmine gasse | La- | 4, chaussée de la Muette, Paris. |
| *Hydrorrhéol | | CORDIER, 222, fg St-Martin, Paris. |
| *Hydroxydase | | 10, rue Blanche, Paris. |
| Hygiénane | | 172, rue d'Alésia, Paris. |
| *Hygiodine | | 5, av. Victoria, Paris. |
| *HyoI | | 109, r. de Sèvres, Paris. |
| *Hyoscyamine Houdé | | 9, r. Dieu, Paris. |
| *Hypalène | | 15, r. des Champs, Asnières. |
| Hypercytol | | MATRAY, à Aubière (Puy- de-Dôme). |
| Hypergal Grémy | | 14, r. de Clichy, Paris. |
| Hypericia | | 3, r. Rodier, Paris. |
| Hypericoil | | id. |
| Hyperityol | | 3, r. Rodier, Paris. |
| Hypérol | | 49, r. Paradis, Paris. |
| *Hypersan | | P. C. B., 12, r. du Téléphone, Bruxelles. |
| Hyperstyl | | Etabl. H. O. E., 239, r. Nationale, Villefranche - en - Beaujolais (Rhône). |
| Hypnase Vergelct | | 163, r. de Flandre, Paris. |
| Hypneural Cos | | 99, r. d'Aboukir, Paris. |
| Hypnosédine | | 11, ch. de la Muette, Paris. |
| Hypnovel | | 132, av. Victor-Hugo, Paris. |
| Hypochlorine | | l'Antiseptique, 48, r. de Londres, Paris. |
| Hypochloryl | | 7 bis, r. de Musset, Paris. |
| *Hypocholate | | 2, pl. des Vosges, Paris. |
| Hypodermozone | | 56, bd Péreire, Paris. |
| Hypolyse | | 24, av. Chatillon, Paris. |
| *Hypophédrine | | 18, r. de Beaune, Paris. |
| Hypophos Hurbourgne | | à Montmeyan (Drôme). |
| Hypophosphites Chur- chill | | 12, r. Castiglione, Paris. |
| Hypophosphites Fel- lows | | 5, r. de la Paix, Paris. |
| Hypophydose | | D ^r FRAYSSE, 21, r. de Neuilly, Nanterre. |
| Hypophyse - Endocri- sines Fournier | | 7, r. Biscornet, Paris. |
| Hypophysine | | OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles. |
| Hypophyscl | | 107, r. des Dames, Paris. |
| *Hyposulfène | | 22, r. de la Sorbonne, Paris. |
| *Hypotan | | LEMATTE & BOINOT, 52, r. La Bruyère, Paris. |
| Hypotensol | | LABESSE, Angers (M.-et-L.). |
| Hyrganol | | SPÉCIA, 21, r. Jean-Goujon, Paris. |

I

***I. A. M. (Gouttes)**

- Iasthol**
Ibogaïne Nyrdhal
Ichtyol Zinc
Idéalax
Idéolaxine
Iénol
***Ifranol**
***Iloglandol Roche**
Imido Roche
***Iminasthme**
Immunase
Immunicorps
Immuniderm Grémy
Immuniphages Gremy
***Immunizols Grémy**
Immuno-Antivirus
Immunovaccin anti-pyorrhéique
***Immunovaccin Anti-rhumatismal**
Immunovaccin bronchopulmonaire
Inacrïne
***Indhaméline Lejeune**
simple et pluriglandulaire
Indine
***Indoberbérine**
Inertyl
***Infangyl Carlier**
Infra-rouges
Infusion orientale R. B. L.
Inhabillol
Inhalateur Hojasol
Inhalateur et Innalations
- D^r LAVOUÉ, à Rennes (Ille-et-Vilaine).**
Usine du Blosset, Moulins-sur-Yèvre (Cher).
12, r. de la République, Puteaux.
Labor. DULCIS, pl. Clichy, Monte-Carlo.
62, r. Marengo, St-Étienne.
OPTIMA, 78, Grande-Rue-au-Bois, Bruxelles.
37, r. Galilée, Paris.
19, r. Jacob, Paris.
10, r. Crillon, Paris.
id.
Lab. SERVIER, Orléans (Loiret).
26, av. d'Italie, Paris (XIII^e).
6, r. Dombasles.
14, r. de Clichy, Paris.
14, r. de Clichy, Paris.
14, r. de Clichy, Paris.
61, av. Louise, Bruxelles.
8, av. des Sources, Nice.
id.
id.
12, sq. Delambre, Paris (XIV^e).
142, r. de Picpus, Paris.
DABAT, à Pau (Bas.-Pyr.).
TAVERNIER, 32, r. de l'Ouest, Paris.
CHARVOZ, 3, chem. du Vallon, Lyon-Caluire.
St-Florentin (Yonne).
La Verrerie Scientifique, 12, av. du Maine, Paris.
74, quai Jemmapes, Paris.
36, r. des Francs-Bourgeois, Paris.
19, r. Ferdinand-Duval, Paris
Lab. INHAL, 98, r. J.-Maillotte, La Madeleine-Lille.

- *Inhalation-Gargarisme** VOCALDOP, 222, fg St-Martin, Paris.
- *Inhalation Lancosme** 71, av. V.-Emmanuel-III, Paris.
- Inhalation Sargéthyl** STOLZ, 56, av. Edouard-Vaillant, Boulogne-sur-Seine.
- Inhalatoriol** 57, r. Edgar-Quinet, Nantes.
- Inhalène** à Berson (Gironde).
- Inhalex** 37, r. Galilée, Paris.
- *Inhalo-Bol** P. TAVERNIER, 32, r. de l'Ouest, Paris.
- *Inhalol** 62, r. d'Antibes, Cannes (Alpes-Maritimes).
- Inhalone** CH. DEHAY, à Arras.
- *Inhalo-Sel** P. TAVERNIER, 32, r. de l'Ouest, Paris.
- *Inhaloxyl** 4, chaus. de la Muette, Paris.
- Inhalyl** 137, av. Parmentier, Paris.
- Inhaphone** 20 bis, r. Sergent-Godefroy, Montreuil-sous-Bois.
- Inhatillol** ADLER, 36, r. des Francs-Bourgeois, Paris.
- Injection Clin Strychno** 20, r. des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
- Phospharsinée** DUC, 24, av. Mac-Mahon, Paris.
- Injection orientale** JEHAN & BRÉRA, Montauban (L.-et-G.).
- Injection sèche Bréra** 46, r. Pierre-Charron, Paris.
- *Innerclean** 60, r. de Monceau, Paris.
- *Inogyl** 42, r. du Mont-Cenis, Paris.
- *Inolène** 60, r. de Monceau, Paris.
- *Inorenol** DEBAT, 60, r. de Monceau, Paris.
- *Inorhinyl** id.
- *Inosepta** id.
- Inosphacelol** id.
- Inosplénol** id.
- *Inotylol** id.
- Inoxemol** id.
- *Inoxyl** id.
- Inoxine** 22, av. Opéra, Paris.
- *Insevaccin** DEBAT, 60, r. de Monceau, Paris.
- Inshépatyl** 20, fg Poissonnière, Paris.
- *Institut Pasteur** 22, r. Dutot, Paris.
- *Insulanol** 97, r. de Vaugirard, Paris.
- *Insuline** (voir *Endo-pancrine)
- Insuline A. B.** 4, r. Dajot, Melun.
- *Insuline buccale Fornet** 23, r. du Caire, Paris.
- *Insuline Byla** 26, av. Observatoire, Paris.
- *Insuline Léo** 39, r. Fondaudège, Bordeaux.
- Insuline Phyllose** 48, r. de la Procession, Paris (XV°).
- Insuline Rogier** 56, bd. Péreire, Paris.
- Insuloxyl Roussel** 97, r. de Vaugirard, Paris.
- Insulyl** 97, r. de Vaugirard, Paris.
- Intaline** THOMAS, Chemillé (Maine-et-Loire).

- Integral Vaccin**
Intestase
Intestinal Merminod
***Intraits Dalsse**
Ioda
Iodalbin Adrian
Iodalia
***Iodalose Galbrun**
***Iodamelis Logeais**

Iodaminase
Iodamol
Iodargol Viel
Iodarsène
***Iodarsenic Guiraud**
Iodarsine
Iodasclerine
Iodaselle Delamarre
***Iodaseptine Cortial**
***Iodassium**

Iodatoxine Laleuf
***Iodaupébine**

Iode Aucher
Iodehameline Louveau
Iode liquide Lambiotte

***Iodéine Montagu**
Iodel

***Iodentérol**
Iode Oberlin
Iodeolaxine

Iode Organique Boissy
Iodéol Viel
Iodeptol
Iode Rozé
Ioderme
***Iode Tulasne**
Iodéyl Fournier
***Iodex**
***Iodhéma**
Iodhyrine du Dr Des-champs
Iodine Médol

***Iodiniectol Jammes**
Iodion
***Iodo-Bismuthate de Quinine**
***Iodo-Bismuth Ercé**
Iodo-calcique
- 12, r. Paul-Baudry, Paris.
 69, r. de Wattignies, Paris.
 49, r. de Paradis, Paris.
 4, r. Aubriot, Paris (1V^e).
 63, r. de la Falsanderie, Paris.
 9, r. de la Perle, Paris.
 12, r. Vavin, Paris.
 8, r. du Petit-Musc, Paris.
 22 bis, r. de Silly, Boulogne-sur-Seine.
 2, rue des Deux-Ponts, Paris.
 3, bd Beaumarchais, Paris.
 7, r. Saint-Yves, Rennes.
 42, av. de Breteuil, Paris.
 10, imp. Milord, Paris.
 304, r. St-Jacques, Paris.
 SANOVA, 29, r. de Liège, Paris.
 49, r. Thiers, Boulogne-s.-Mer.
 7, r. de l'Armorique, Paris.
 4, chaussée de la Muette, Paris.
 51, r. Nicolo, Paris (16^e).
 ADLER, 36, r. des Francs-Bourgeois, Paris.
 La Ferté-Macé (Orne).
 78, bd des Batignolles, Paris.
 OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
 49, bd Port-Royal Paris.
 COUDERT, 116, av. Ledru-Rollin, Paris (XII^e).
 4, r. Candolle, Paris.
 17, r. Cadet, Paris.
 OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
 48 r. d'Alésia, Paris.
 7, r. Saint-Yves, Rennes.
 4, imp. de Bearn, Paris.
 2, allées de Chelles, Le Raincy.
 20, r. de Verdun, Carcassonne.
 48, bd des Batignolles, Paris.
 7, r. Biscornet, Paris.
 46, r. Claude-Lorrain, Lille.
 4, r. Candolle, Paris.
 49, av. Lamotte-Picquet, Paris.
 J. MIDY, 41, r. de Courbevoie, La Garenne (Seine).
 86, r. Michel-Ange, Paris.
 94, r. Michelet, Alger.
 FRAISSE, 8, r. Jasmin, Paris.
 37, r. de Bourgogne, Paris.
 Labor. DULCIS, pl. Clichy, Monte Carlo.

- *Iodocalcium**
 Iodocéréol Dalloz
 Iodocol Carrion
 Iodo-dépuratif Jacquet
 Iodogalle Vial
 Iodogéline
 Iodo-Hamamelis Ducoq
 Iodo-Juglan
***Iodogénol Pépin**
***Iodo-Maïsine**
***Iodométine Hautdidier**
***Iodone Robin**
***Iodonésyl**
 Iodonine
 Iodonion
 Iodonoses Clin
***Iodonucléol**
 Iodonyl
 Iodophosfer Duplex
 Iodoplasme
 Iodoplume
 Iodo Rubidium
***Iodo Salva Evesque**
 Iodoscilline
 Iodosigol
 Iodostarine Roche
***Iodotensyl Dubois**
 Iodo-Théine Henry
***Iodo-Thyroidine Catillon**
 Iodo-Trypsine
 Iodoveine Leduc
 Iodo-Vitasine
 Iodoxol
 Iodural Novat
***Iodurase**
***Iodure d'Amidon**
 Iodures Cros
 Iodures Domergue
 Iodure de fer
 Iodures Foucher
 Iodures Laroze
 Iodure Philippe
***Iodures Pachaut**
 Iodures Souffron
 Iolase Corbière
- Lab. Biologique de l'Ile-de-France, 19, av. d'Orléans, Paris (XIV^e).
 13, bd de la Chapelle, Paris.
 54, fg St-Honoré, Paris.
 Vierzon, (Cher).
 4, pl. Croix-Rousse, Lyon.
 CROZET, à Cannes (A.-M.).
 Langeais (Indre-et-Loire).
 LE GALLO, à Auray (Morbihan).
 à Courbevoie (Seine).
 48, r. d'Alésia, Paris.
 37, r. Galilée, Paris.
 13, r. de Poissy, Paris.
 34, r. St-Lazare, Paris.
 OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
 9, r. Victor-Letalle, Paris.
 20, r. d. Fossés-St-Jacques, Paris.
 22, bd Circulaire d'Epina y, Gennevilliers (Seine).
 56 r. Beaubourg, Paris.
 Lav. DREYER-DUFER, Villiers-sur-Marne.
 85, rue des Morillons, Paris.
 PIALOUX, 55, r. de Chabrol, Paris.
 Labor. DULCIS, pl. Ferry, Monte Carlo.
 10, r. de Belfort, Rennes.
 5 r. Lefebvre, Paris.
 CHAUVIN, Aubenas (Ardèche).
 10, r. Crillon, Paris.
 16, bd Péreire, Paris.
 39, r. Sclessin, Liège.
 3, boul. Saint-Martin, Paris.
 46, av. des Ternes, Paris.
 JAUME, à Tamaris (Gard).
 H. SALLE, 4, r. Elzévir, Paris.
 Lab. ISCOVESCO, 107, r. des Dames, Paris.
 BOMEL, Annonay (Ardèche).
 18, av. Hoche, Paris.
 LUMIERE, 45, r. Villon, Lyon.
 12, r. de Nice, Paris.
 20 bis, r. Gravelotte, Toulouse.
 64, r. de la Rochefoucauld, Paris.
 19, r. Grégoire-de-Tours, Paris.
 2, r. des Lions, Paris.
 14, r. Palais-Grillet, Lyon.
 130, bd Haussmann, Paris.
 98, r. de Sèvres, Paris.
 27, r. Desrenaudes, Paris.

- Ionoldes**
*** Ionyl**
Iophénol
Iosorbine
I. O. Z. X.
Ipéca digitale Dausse
*** Irénine Gannon**
Irol Churchill
Irovarine Tisy
Irradiol
*** Irrastérine Byla**
*** Isacène Roche**
*** Isalaxine**
Isobromyl
Isocolium
Isoluol
*** Isonal**
Isorhinol
*** Isotonyl (Poudre de Lausanne)**
*** Ispaghul**
Ivula Pearson
*** Ixium**
Ixogyne
 13, r. Pavée, Paris.
 La Biomarine, Dieppe (Seine-Inférieure).
 P. C. B., 12, r. du Téléphone. Bruxelles.
 VANDA, 16, r. Flicatier, Courbevoie.
 155 bis, r. Lafayette, Paris.
 4, r. Aubriot, Paris (IV^e).
 14, r. Victor-Hugo, Lyon.
 12, r. Castiglione, Paris.
 R. & A. FEIGNOUX, 95, r. de Turenne, Paris (III^e).
 16, r. de Rocroy, Paris.
 26, av. de l'Observatoire, Paris.
 10, r. Crillon, Paris.
 BRICHARD, Bar-le-Duc (Meuse).
 COMAR & C^{ie}, 20, r. des Fosses-St-Jacques, Paris.
 Ph. Anglaise, 62, av. des Champs-Élysées, Paris.
 1, pl. Victor-Hugo, Paris.
 89, r. du Cherche-Midi, Paris.
 VIDAL, 46, r. de Grenelle, Paris.
 87, r. Lafayette, Paris.
 TROUETTE-PERRET, 61, av. Philippe-Auguste, Paris (XI^e).
 J. MIDY, 41, r. de Courbevoie, La Garenne (Seine).
 98, r. de Sèvres, Paris.
 24, r. Paul-Bert. Paris.
 22, r. de la Sorbonne, Paris.
 52, rue La Bruyère, Paris.
 120, Grande-Rue, Draveil (S.-et-O.).
 P. HARDY, 42, bd St-Marcel, Paris.
 3, r. Watteau, Courbevoie.
 13, r. Beudant, Paris.
 OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
 Inst. de Microbiologie, à Sarrbruck.
 42, av. de Breteuil, Paris.

***Jemalt Wander**

Jicémine

***Jouvamély**

Jovine Brisson

Juglamarine

***Jugland Gmet**

Juglandine Ferrouillat.

Juglane**Juglanrégine**

Juniodyl

Juraisin Macon**Juranol**

Jus de raisins Challand

Jus de raisins Pampryl

Juvéol

Juvigor

151 bis, route de Joinville,
Champigny (Seine).

304, r. Saint-Jacques, Paris.

Lab. GAMBY-VISSES, pl. Hô-
tel - de - Ville, Salon - de -
Provence.

157, r. Championnet, Paris.

WARIN, 4, chaussée de la
Muette, Paris.

27, faub. Montmartre, Paris.

33, r. Daguerre, Paris.

à Chambéry (Savoie).

58-60, r. des Moulins, Valence
(Drôme).THÉVENOT, 21, r. des Roses,
Dijon.Etabl. Œnologiques de Bour-
gogne, Mâcon (S.-et-Loire).

32, r. Guyot, Paris.

Nuits-St-Georges (C.-d'Or).

2, villa de la Terrasse, Paris.

17, r. Cadet, Paris.

Nuits-St-Georges (Côte-d'Or).

K

Kalastyl

Kalmine

Kalmigraine**Kalmobrol**

Kalmogastrol

Kalmopyrine

Kamara C. 47

Kaobrol**Kaolinase**

Kaolin Crookes

Kaolin Géo

***Kaviase**

Kéfir Carrion

Kéfir Caucase

Kéfir Nutricia

Kélène

Kénapirine Chanteaud

***Kénol**

Képhaline Brunot

***Képhédryl**

1, pl. Victor-Hugo, Paris.

METADIER, à Tours.

MEUNIER, r. du Commerce,
Montmarault (Allier).

3, r. Royet, Lyon-Caluire.

132, av. Victor-Hugo, Paris.

49, r. Paradis, Paris.

47, qual Jemmapes, Paris.

54, r. Paris, Charenton (S.).

12, bd Saint-Martin, Paris.

2, Fg St-Denis, Paris.

20, cours Morand, Lyon.

CANAT, 76, av. d'Italie, Paris.

54, ig. Saint-Honore, Paris.

53, r. de Spa, Bruxelles

142, r. Fransman, Bruxelles.

21, r. Jean-Goujon, Paris.

54, r. des Francs-Bourgeois, Paris.

MILLET & GUILLAUMIN, 8,
r. Richer, Paris et 5, r. Am-
broise-Thomas.

10, pl. Thiers, Le Mans.

3, r. Scribe, Paris.

- Kérafline** THERAPLIX, 98, r. de Sèvres, Paris.
- Kéraphiline** 112, r. de Gerland, Lyon.
- Keratolyne** HYGIO DONIS, Croissy-sur-Seine (S.-et-O.).
- Kératoplastol** L. DORDIN, Harnes (P.-de-C.).
- * **Kerlactine** 1, rue Lassalle Lyon.
- Kerlol Lorck** à Saint-Etienne, 63, pl. St-Roch.
- Ketophan** 6, r. des Cigognes, Strasbourg.
- * **Kidoline** GALLIER, 38, bd Montparnasse, Paris.
- Kina-Coca-Kola** GRANVAL, 12-14, r. Fery, Reims.
- Kina Elzevir** Lab. des Etabl. SALLE, 4, r. Elzévir, Paris.
- Kinébyl** 24, bd J.-Jaurès, Boulogne-sur-Seine.
- * **Kinéchol** 29, r. des Marchands, Avignon.
- * **Kinectine** 12, r. du Chemin-Vert, Ville-neuve-la-Garenne.
- Kinégastrine** LEURQUIN, 50-52, r. Pierre Legrand, Lille.
- Kineurine Moncour** 49, av. Victor-Hugo, Boulogne-sur-Seine.
- Kino pancréatine** HENRY, 39, r. de Sclessin, Liège (Belgique).
- Henry** 53, bd de Verdun, Fontenay-sous-Bois.
- Kioféine** 64, r. La Rochefoucauld, Paris.
- Kipsol** VIDAL, 46, r. de Grenelle, Paris.
- Kitine** 38, av. J.-B.-Clément, Boulogne-sur-Seine.
- * **Kluchol Remeaud** LEISYN, 1 bis, r. Molitor, Paris.
- Koch-I-Cide** rte de Moulleau, Arcachon (Gironde).
- * **Kodos** 3, pl. Jussieu, Paris.
- * **Kola caféinée** 15, r. Immeubles-Industriels, Paris.
- Kola-ier Trouette** 27, fg. Montmartre, Paris.
- Kola Gmet** 41-47, r. du Dr-Blanche, Paris.
- * **Kola granulé Astier** 81, boul. Suchet, Paris.
- Kola granulé Roy** 4, r. des Carmes, Paris.
- Kolagum** 109, r. de Sèvres, Paris.
- Kolaïne** U. C. E. P., 5, r. Labroque, Strasbourg.
- Kolamalt** 4, r. du Colonel-Moll, Paris.
- Kola Midy** 14, r. Victor-Hugo, Lyon.
- * **Kola Monavon** OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
- Kola** 5, c. Charlemagne, Lyon.
- Kola Pichat** 45, fg. St-Denis, Paris.
- Kolarsan** 10, r. Constantinople, Paris.
- Kolarsine Pautauberge** 58-60, r. des Moulins, Valence (Drôme).
- Kolasthène Badel** 8, r. Victor-Noir, Neuilly-sur-Seine.
- * **Kolatinés** 4, r. des Carmes, Paris.
- Kola Venaize**

- *Koumyl
Kréazone
- Kréofos Novat
Kreptol
- *Kydalose
- *Kymosine Rogier
- 66, r. Nationale, Lille.
- TROUETTE, 15, r. des Im-
meubles-Industriels, Paris.
- BOMEL, Annonay (Ardèche).
- LOUINET, 39, r. de l'Arcade,
Paris.
- DALIN, 49, quai Saint-Vin-
cent, Lyon.
- 56, boul. Péreire, Paris.

L

- *Lab-Lacto-Ferment
Laborol
- *Laby lax
- *Laccodermes Brisson
- *Lachésine
- Lacodia
- *Lacpinine
- Lacrenile Meurice
- *Lac-Ser
- *Lactagol
- *Lactaris
- Lactéol Boucard
- Lactéomaltol
- Lactermol Vigier
- Lacticholéine Tulivet
- Lactifère
- Lactigélose
- *Lactimase
- *Lactobacilline
- Lactobactyl
- *Lactobyl
- *Lactocalcine
- *Lactochol
- Lactocoaguline Fabre
- Lacto-Diastal
- Lacto-ferment
- Lactofermentine
- Lactogélose
- *Lactolaxine Fydau
- MIALHE, 8, r. Favart, Paris.
- CHAUVIN-AUBENAS.
- 94, r. Pasteur, Fontenay-sous
Bois (Seine).
- 157, r. Championnet, Paris.
- RENAUD, 2, r. P. Demours,
Paris.
- Joué-les-Tours (Indre-et-Loire).
- FISCH, 4, r. d'Ilizach, Mulhouse.
- 61, av. Louise, Bruxelles.
- 49, bd Port-Royal, Paris.
- 48, r. d'Alésia, Paris.
- Lab. Central, 129, r. de Turenne
Paris.
- 30, r. Singer, Paris.
- 9, r. Rodier, Paris.
- 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
- 52, r. de Poissy, St-Germain-en-
Laye.
- 3, r. Capitaine-Scott, Paris.
- DUCLOY, Arques (P.-de-C.).
- 18, av. Hoche, Paris.
- Rue Saint-Maurice, Nanterre
(Seine).
- TORAUDE, 22, r. de la Sor-
bonne, Paris.
- 46, av. des Ternes, Paris.
- 7, r. des Petits-Carreux, Paris.
- 46, av. des Ternes, Paris.
- 33, r. de la Haie-Coq, Aubervil-
liers.
- 45, fg St-Denis, Paris.
- OPTIMA, Gde-Rue au Bois,
Bruxelles.
- THEVENOT, r. des Roses, Dijon.
- DUCLOY et C^{ie}, Arques (P.-de-C.).
- 4, r. de la Motte-Picquet, Paris.

- Lacto Mannitase** 37, r. de Tivoli, Bordeaux.
Lacto-Magnésie Vita 27, r. Desrenaudes, Paris.
Lactomorrhuel DELPECH, 5, r. Danton
 Paris.
Lactophéine CACHAT, Evian-les-Bains
 (Hte Savoie).
Lactophorine 9, r. de la Gare, Levallois-Perret.
Lactophosphine 8, r. de la Pompe, Paris.
***Lactoprotéide** CARRION, 54, r. du Fg St-
 Honoré, Paris.
Lactoscoparine CHAUVIN, Aubenas (Ardèche).
Lactosine 142, r. Fransman, Bruxelles.
***Lactoseptyl Legrand** 11 pl. Louis XII, Blois, (L.-et-C.).
***Lacto-Sérum Lavril** Pacy-sur-Eure (Eure) et 26, bd
 des Batignolles, Paris.
Lactosérum R. M. 146, av. Champs-Élysées, Paris.
***Lactosmose** Pacy-sur-Eure (Eure) et 26, bd
 des Batignolles, Paris.
Lactosone 17, r. Cadet, Paris.
Lactozymase B. 52, r. La Bruyère, Paris.
Lactyl Meurice 61, av. Louise, Bruxelles.
Lait albumineux Mol- 25, cours Lafayette, Lyon.
lard
Lait allégé Dieticus 15, quai de Bourbon, Paris.
Lait Berna 199 bis, bd St-Germain, Paris.
***Lait Dardelet** Bonnard (Yonne).
Laits de cèdre Sapolan CAVAILLES, 29, r. de Singer,
 Paris.
***Lait de magnésie Phil-** O. C. P., 108, r. de Picpus, Paris.
lips
Lait de Sapolan 29, r. Singer, Paris.
Lait de Soufre Sapolan id.
Lait Gallia Ch. Ger- 11, r. de Prony, Paris.
vais
Lait Gloria 4, r. Roussel, Paris (XVII^e).
***Lait Guigoz** 19, r. J.-J.-Rousseau, Paris.
Lait Lepelletier 48, r. Ampère, Paris.
Lait Mont-Blanc Rumilly (Haute-Savoie).
Lait Ofco 25, av. Michelet, St-Ouen.
Lait sec C. G. Sté de Spécial. Diététiques et
 Pharm. (COW et GATE),
 22, r. des Belles-Feuilles,
 Paris.
Lait Sec Lo-lo 123, r. de Paris, Saint-Denis.
Lait sec Nutricia 1, bd St-Martin, Paris.
Lait Seklé 51, r. Rennequin, Paris.
Laits Nutricia 142, r. Fransman, Bruxelles.
Laminarol 132, r. de Turenne, Paris.
Laminiode 29, av. de St-Mandé Paris.
Laminolax id.
***Lanceryl** MOREAU, 13, r. des Nonnains-
 d'Hyères, Paris.
***Lansoyl** 5, r. de la Paix, Paris.
***Lantol** 18, av. Hoche, Paris.
***Laristine Roche** 10, r. Crillon, Paris.
Larocaïne HOFFMANN LA ROCHE,
 10, r. Crillon, Paris.

- *Larosane Roche
 Laryngolan
 *Laurénol
 *Lauriatol
 Lavement mucobary-
 tiné
 Lax
 Laxadonal
 Laxafégine
 Laxagarine
 *Laxamalt
 Laxamer Lefèvre
 Laxatif Châtel-Guyon
 Gubler
 *Laxatifs Miraton
 Laxatine Mory
 Laxatol
 Laxatone Déjardin
 Laxaul
 Laxia Dannec'h
 Laximanne
 Laxinol-Vichy
 Laxocholéine Tulivet
 Laxogélose Tulivet
 Laxoil
 Laxoléine
 Laxol Fraudin
 Laxo-lin
 Laxolip Henry
 *Laxopeptine Girard
 Laxophore Brachin
 Laxor
 Lebnot
 Lécithine Adrian
 Lécithine Clin
 *Lécithine Vacheron
 Lécithine Vial
 *Lénadryl
 Lénicade Brissot
 Lénicure-Vichy
 *Léniforme
 Léophani
 *Léotamine
 Leptab
 Leptandrine Royer
 *Leucagine
- 10, r. Crillon, Paris.
 24, r. Jardel, Bordeaux.
 19, r. Drouot, Paris.
 31, av. Foch, La Garenne-
 Colombes (Seine).
 145, r. Yves-Le-Goz, Versailles.
 19, av. Secrétan, Paris.
 LOUINET, 39, r. de l'Arcade,
 Paris.
 74 r, Lourmel, Paris.
 5, av. des Tilleuls, Paris.
 LICARDY, 38, bd Bourdon,
 Paris-Neuilly.
 52, rue Decamps, Paris.
 70, r. Legendre, Paris.
 48, r. d'Alésia, Paris.
 OPTIMA, Gde-Rue-au-Bois,
 Bruxelles.
 SAUBA, Montreuil.
 10, r. Parent-de-Rosan, Paris.
 pl. Guillaume-le-Conquérant, à
 Falaise (Calvados).
 64, r. des Tournelles, Paris.
 23, r. Danton, Paris-Levallois.
 PATRICE, à Vichy.
 52, r. de Poissy, St-Germain-en-
 Laye.
 Id.
 74, r. Monge, Paris.
 MILLET, à Rambouillet.
 4, av. Desfeux, Boulogne-s.-S.
 182, av. de Versailles, Paris.
 39, r. Sclessin, Liège.
 48, r. d'Alésia, Paris.
 à Joinville (Haute-Marne).
 Lab. Biologique de l'Île-de-
 France, 3, r. Laugier, Argen-
 teuil.
 23, r. de Douai, Lille.
 9, r. de la Perle, Paris.
 20, r. des Fossés-Saint-Jac-
 ques, Paris.
 14, r. Victor-Hugo, Lyon.
 8, r. Vivienne, Paris.
 102, r. Vincent, Marseille.
 157, r. Championnet, Paris.
 24, av. Mathurin-Moreau, Paris.
 26, r. Pétrelle, Paris.
 11, square Marie-Louise, Bru-
 xelles.
 149, r. du Palais-Gallien, Bor-
 deaux.
 56, r. Beaubourg, Paris.
 223, r. Saint-Martin, Paris.
 22, r. de la Sorbonne, Paris.

- Leucaginol**
Leucobules Gallier
Leucogénase
 ***Leucolyse**
 ***Leucoseptyl**
Leucoserum
Levaine

Levulose Rogier
Levurase

 ***Levure B. 17**
Levure Boss

Levure Coirre
Levure de bière
Levure de bière De-
bouzy
Levure Déjardin
 ***Levure fraîche Myceta**
 ***Levure Mycéta en com-**
primés
 ***Levure Zymaculine**
 ***Levurine extractive**
Levurine brute
Levuritine

 ***Levuromaltine Dejar-**
din
Libérine
Licardet Brisson
 ***Lichénose**

Ligatures chirurgi-
cales
Limital

Limmerol
 ***Limon. Churchill**
 ***Limonade (Citrose de**
Vichy)
 ***Limonade Godfrin**

Limonade hypotensive

Línadéline

 ***Lin Tarin**

Liniderme
Liniment du Dr Ber-
nard
Lioncyl
Lipasonol

 ***Lipaurol**
- 32, r. de la Sorbonne, Paris.
 28, bd Montparnasse, Paris.
 9, av. Jean-Jaurès, Lyon.
 32, r. de l'Ouest, Paris.
 121, av. Gambetta, Paris.
 66, r. Nationale, Lille.
 OPTIMA, Gde-Rue -au -Bois,
 Bruxelles.
 56, bd Pèreire, Paris.
 CHARMAISON, av. de Royat,
 Chamalières (P.-de-Dôme).
 22, r. de la Sorbonne, Paris.
 Lab. G. CESAR & B. BOSS, Be-
 sançon (Doubs).
 5, bd Montparnasse, Paris.
 ADRIAN, 9, r. de la Perle, Paris.
 34, r. Sedaine, Paris.

 10, r. Parent-de-Rozan, Paris.
 9, pl. Félix-Faure, Paris.
 id.
 id.
 18, av. Hoche, Paris.
 id.
 FEIGEL, à Lutterbach
 (Haut-Rhin).
 DEJARDIN, 10, r. Parent-de-
 Rozan, Paris.
 CAPIN, Roquefort (Landes).
 157, r. Championnet, Paris.
 DUCLOY et C^{ie}, Arques, (P.-de-
 C.)
 OPTIMA, 78, Grande-Rue-au-
 Bois, Bruxelles.
 Lab. ROMON, 6, r. Bridaine,
 Paris.
 12, r. de Strasbourg, Paris.
 12, r. Castiglione, Paris.
 7, r. Galvani, Paris.

 5, av. Watteau, Nogent-sur-
 Marne.
 PACHAUT, 130, bd Haussmann,
 Paris.
 Lab. VARIOT, 151 bis, Grande-
 Rue, Villemomble.
 61, av. Philippe-Auguste, Paris
 (XI^e).
 24, bd Sébastopol, Paris.
 34, r. Thiers, Gray (Hte-Saône).

 6, r. Robert-Estienne, Paris.
 30, r. N.-Dame-des-Victoires,
 Paris.
 LECOQ et FERRAND, 14, r.
 Gravel, Levallois-Perret.

- Lipex**
 ***Lipiodol Lafay**
 Lipiodol « F »
 Lipobil
 ***Lipo-Bismuth Ercé**
 ***Lipocérérine**

 Lipochol Byla
 Lipocytol Grémy
 ***Lipodéterpénol Zyma**
 Lipoféine

 Lipogazes dermatolo-
 giques
 Lipogyre Ciba

 ***Lipolodine Ciba**
 Lipol
 Lypolysine Merminod
 Lipolysine Martinet
 ***Liposeptine**
 ***Liposplénine du D^r Groc**
 Lipothine
 Lipo-Vaccins
 ***Lipovita**

 Liqueur de l'Etoile anti-
 asthmatique
 Liqueur d'Hermès
 Liqueur Laprade
 Liqueur Laville

 Liqueur peptophos-
 phorique
 Liqueur de Pittermont
 Liqueur Talobre
 Liqueur à la Thyroï-
 dine Bouty
 Liqueur végétale Narud
 Liq. organiques inject.
 ***Liquidix**

 Liseronine
 Listérine
 ***Listose Vicario**
 ***Lita**

 Litharsyne Ferré
 Lithiné Henry
 Liverine
 ***Lobéliane**
 ***Lobéline Bruneau**

 ***Lobéline Sandoz**
 ***Lobuline**
 Locrinol
- 132, av. Victor-Hugo, Paris.
 22, r. du Landy, St-Ouen.
 id.
 29, pl. Wilson, à Denain.
 37, r. de Bourgogne, Paris.
 LEMATTE et BOINOT, 52,
 r. Labruyère, Paris (IX^e).
 26, av. Observatoire, Paris.
 14, r. de Clichy, Paris.
 9, pl. Félix-Faure, Paris.
 109-113, bd de la Part-Dieu,
 Lyon.
 LECOQ & FERRAND, 14,
 r. Gravel, Levallois.
 109-113, bd de la Part-Dieu,
 Lyon
 id.
 34, pl. Alex.-Dumas, Lille.
 49, r. de Paradis, Paris.
 16, r. du Petit-Musc, Paris.
 2, pl. des Vosges, Paris.
 14, r. des Minimes, Paris.
 JOSSE, pl. Wilson, Denain.
 32, r. de Vouillé, Paris.
 22, bd Circulaire d'Epina y,
 Gennevilliers (Seine).
 MONIN, 49, r. de Maubeuge,
 Paris.
 12, bd Saint-Martin, Paris.
 49, r. de Maubeuge, Paris.
 20, r. Fossés-Saint-Jacques,
 Paris.
 ADRIAN, 9, r. de la Perle,
 Paris.
 2, rue de Paris, à Douai.
 Saint-Girons (Ariège).
 3, rue de Dunkerque, Paris

 38, r. N.-D.-Nazareth, Paris.
 BOUTY, 3, r. Dunkerque, Paris.
 Ph. DELAPRÉE, Mortagne
 (Vendée).
 19, r. Drouot, Paris.
 5, r. de la Paix, Paris.
 17 bd Haussmann, Paris.
 CORTIAL, 7, r. de l'Armo-
 rique, Paris.
 19, r. Grégoire-de-Tours Paris.
 39, r. de Sclessin, Liège (Belgique)
 5, r. de la Paix, Paris.
 51, r. Nicolo, Paris (XVI^e).
 BRUNEAU, 17, r. de Berri,
 Paris.
 20, r. Vernier, Paris.
 37, r. de Bourgogne, Paris.
 GUÉRAUD, Pharm. à Chabeuil,
 (Drôme).

| | |
|-------------------------|---|
| Lofodol | 98, r. de Sèvres, Paris. |
| *Logaphos | 9, av. Jean-Jaurès, Lyon. |
| *Loraga | 13, rue Pagès, Suresnes. |
| Lortocarboul | 86, bd Port-Royal, Paris. |
| Lotion végétale Pachaut | 130, bd Haussmann, Paris. |
| Luargol | 21, r. Jean-Goujon, Paris. |
| Luatine | 2, av. Parmentier, Paris. |
| Lual | BAILLY, 15, r. de Rome, Paris. |
| Luarsyl | id. |
| Luatol | 21, r. Jean-Goujon, Paris. |
| *Lubrokall | 19, r. Drouot, Paris. |
| Luchon | C ^{ie} Fermière de Luchon (Haute-Garonne). |
| Lucinine | 88, r. Duhesme, Paris. |
| *Lucodal | 2, quai Paul-Bert, Tours. |
| *Ludin | REY, 12, r. Montmartre, Dijon. |
| Luerol | 37, r. Pajol, Paris. |
| *Lugocalcion | NOVALIS, Oullins (Rhône). |
| *Luostyl | 22, r. de Nemours, Paris. |
| Lusitol | 7, passage Thionville, Paris. |
| *Lusoforme | 15, r. d'Argenteuil, Paris. |
| *Lutéovar | 20, fg Poissonnière, Paris. |
| Lux-Gaillac | av. du Mar.-Foch, Gaillac (Tarn). |
| Lycétol Vicario | 17, bd Haussmann, Paris. |
| Lyciflore | HOURTOULLE, 11, r. des 2-Ponts, Paris (IV ^e). |
| Lycobile | 115, r. St-Honoré, Paris. |
| Lyméogène | 26, r. Cambon, Paris. |
| Lymphactol | 4 bis, r. de Lyon, Paris. |
| *Lynévol | 112, r. des Pyrénées, Paris. |
| *Lysacrème L. M. L. | 37, r. de Bourgogne, Paris. |
| *Lysarthrol | 89, r. du Cherche-Midi, Paris. |
| *Lysaxins L. M. L. | 37, r. de Bourgogne, Paris. |
| Lysiode | 78, bd Beaumarchais, Paris. |
| Lysol | 65, r. Parmentier, Ivry (Seine). |
| Lysolats | 65, r. Parmentier, Ivry. |
| Lysomol | HENDRIX, à Anvers (Belgique) |
| Lysurol | 112, r. de Gerland, Lyon. |

M

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| *Magbromyl | 10, r. de la Mairie, Ivry (Seine). |
| *Magécarine | 15, r. St-Maurice, Nanterre. |
| *Ma iodyl | 10, r. de la Mairie, Ivry-s.-Seine. |
| Magistère de Bismuth | 2, bd Pershing, Paris. |
| Magiose | 178, r. Montmartre, Paris. |
| Magnacalc. ne | SANOVA, 41, r. d'Amsterdam, Paris. |

- Magnebyl**
Magnécal
Magnéclo
***Magnécythine D^r Tissot**
***Magnélax**
Magnésia Régnier
Magnésie Bismurée
Magnésie Drouet
Magnésie Durel
Magnésie Carlo Erba
Magnésie D^r Gustin
Magnésie Henry
Magnésie hydratée
Magnésie Roy
Magnésie Storke
Magnésiode
Magnésion
Magnésium chloruré
**Magnésium Groll-
chard**
***Magnésium Hardy**
**(Sirop et Tablette-
Bouillon)**
Magnésol
***Magnésio-tubes Robi-
net**
***Magnésiovules**
Magnétol
Magnétone
Magnidia
***Magnogène**
Magnolax
***Magol Churchill**
***Magsalyl Mg**
***Maizena**
***Malarsan**
Maltase Fanta
Malt Barley
***Maltea Moser**
***Malt Ethel**
***Malt français Déjardin**
(extrait)
Maltine Gerbay
- 126, r. de la Pompe, Paris.
 54, r. des Francs-Bourgeois,
 Paris.
 16, r. du Petit-Musc, Paris.
 34, bd de Clichy, Paris.
 FAURE et DUSSUEL, Aix-les-
 Bains.
 Fontainebleau (Seine-et-Mar-
 ne).
 SCOTT, 348, r. St-Honoré, Paris.
 37, r. de Marly, Rueil (S.-et-O.).
 7, bd Denain, Paris.
 105, bd Malesherbes, Paris.
 BRISSON & C^{ie}, 157, r. Cham-
 pionnet, Paris.
 5, r. de la Paix, Paris.
 37, r. de Marly, Rueil-Malmaison (S.-et-O.).
 81, bd Suchet, Paris.
 71, av. Victor-Emmanuel-III,
 Paris.
 20, pl. de la Mairie, Parc-St-
 Maur (Seine).
 27, r. Poids-de-la-Farine, Mar-
 seille.
 107, av. de la Reine, Boulogne-
 sur-Seine.
 12, pl. de la Révolution, Besan-
 con.
 42, bd St-Marcel, Paris.
 37, r. Galilée, Paris.
 Moret-sur-Loing (S.-et-M.).
 16, r. du Petit-Musc, Paris.
 ROUX, 58, r. de Maubeuge,
 Paris.
 10, r. Vignon, Paris.
 17, r. du Midi, Vincennes.
 6, r. Bridaine, Paris.
 87, av. Borriglione, Nice.
 12, r. Castiglione, Paris.
 10, r. de la Mairie, Ivry (Seine).
 29, r. de Berri, Paris.
 P. AUBRY, 62, r. Erlanger,
 Paris.
 Brasserie FANTA, 77, rte d'Or-
 léans, Montrouge (Seine).
 id.
 8, ch. de Montbrillant, Lyon.
 Usines ETHEL, Schiltigheim
 (Bas-Rhin), 132, r. du Fg St-
 Denis, Paris.
 10, r. Parent-de-Rosan, Paris.
 à Roanne (Loire).

| | |
|-------------------------------|---|
| Malt kneipp | Juvisy-sur-Orge (S.-et-O.). |
| Maltine-Phénix | 22, bd Circulaire d'Epinaÿ, Gennevilliers (Seine). |
| Malt Moritz | 189, r. de Vaugirard, Paris. |
| Maltolax | U. C. E. P., 5, rue Labroque, Strasbourg |
| Malt-Oléol | 20, Fg Poissonnière, Paris. |
| *Maltosan | 151 bis, route de Joinville, Champigny (Seine). |
| *Malt Pailleté | 77, r. de Miromesnil, Paris. |
| Malt Régina | 10, r. Pajol, Paris. |
| Malt Strauss | 12, r. Broca, Paris. |
| *Malt Wander | 151 bis, route de Joinville, à Champigny (Seine). |
| Malzémose | 18, r. de Ménilmontant, Paris. |
| Mamelle Endocrisines | 7, r. Biscornet, Paris. |
| Fournier | |
| Mamelline Meurice | 61, av. Louise, Bruxelles. |
| Mammol | Lab. ISCOVESCO, 107, r. des Dames, Paris. |
| *Mancobène | 32, r. de l'Ouest, Paris. |
| Mandragol | GAILLON, 113, bd Voltaire, Paris. |
| *Mangaine | 71, r. Sainte-Anne, Paris. |
| Manganéol | Usine du Blosset, Moulin-sur- Yèvre (Cher). |
| *Manganésia | Produits Dannech'h, 64, r. des Tournelles, Paris. |
| Manganifer | VIGIER, 9, r. de la Gare, Le- vallois (Seine). |
| Mangano-Calcique | à Saint-Amand-Montrond. |
| Manganoglobine | Lab. du Gastrocarbone, Saint- Louis (B.-du-Rhône). |
| *Mangano Phosphal Ju- lien | 105, r. de Rennes, Paris. |
| Mangaphos | 4, imp. de Béarn, Paris. |
| *Mangarsenic | D ^r LAVOUÉ, Rennes (I.-et-V.). |
| Manglynol Ducatte | 31, r. Francs-Bourgeois, Paris. |
| *Mangratinés | 163, r. de Flandre, Paris. |
| Mannitine | 62, r. Carnot, Vernon (Eure). |
| Marabout | 6, r. Trencavel, Béziers |
| Marcynase | 11, r. Antoine Bourdelle, Paris. |
| *Marimine | 191, Fg St-Antoine, Paris. |
| *Marinol | à Dieppe (Seine-Inférieure). |
| Mariode | BERGER, 14, r. des Pyramides Paris. |
| Marnal | 10, r. du Quatre-Septembre, Paris. |
| Marron d'Inde Dausse | 4, r. Aubriot, Paris. |
| Marronine | 61 bis, r. Corot, Ville-d'Avray (S.-et-O.). |
| *Marrubène | 2 pl. des Vosges, Paris. |
| *Marrubiase | COMTE, 60-62, r. St-Guilhem, Montpellier. |
| *Marrucol | COIRIER, 69, av. du Maine, Paris. |
| Marruséra | 133, r. Lecourbe, Paris. |

- Marsyle Clin** 20 r. des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
- *Marubor** VALENTIN, 1, rue d'Arras, Béthune.
- Masbi** 7, pass. Thionville, Paris.
- Mas de la V. le** Arles-sur-Rhône.
- Masglandol** 156, r. des Fauvelles, Courbevoie.
- *Maté Douglas** 62, Champs-Élysées, Paris.
- Matéine Dufert** 163, r. de Flandre, Paris.
- Matico de Grimault** 8 r. Vivienne, Paris.
- Maya Bulgare** 322, r. Saint-Honoré, Paris.
- Médicament de Saint-Boes** par Orthez (Basses-Pyrénées).
- Medicoferments Boss.** 10, r. de la Viotte, Besançon.
- Medocain** 71, r. de la Course, Bordeaux.
- Mégathion** 62, bd J.-Jaurès, Boulogne-sur-Seine.
- Ménacrine** 18, r. Ferdinand, Flocon, Paris.
- *Menatol** BAILLY, 15-17, r. de Rome, Paris.
- Menopausine** 9, pl. de la Paix, Mulhouse.
- *Menosedine** Demasles, à Vienne (Isère).
- Ménovarine** 211, r. de la Convention, Paris.
- Mensorrhine** EON, 3, r. des Rouairies, Dinan (C.-du-N.).
- *Mensuosedyl** AUGIER, 2, r. des Lombards, Paris.
- Mentholina** GUIGNIER, Bois-Colombes.
- Méral** 61, av. Louise, Bruxelles.
- Mercuriaux Vigier** 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
- Mercurochrome 220** AMECOUSEMA, 25, r. St-Augustin, Paris (II^e).
- Méroléol Salle** 4, r. Elzévir, Paris.
- *Mésoforme** 17 bis, av. Parmentier, Paris.
- *Mésogastrine** 37, av. Jules-Coutant, Ivry-sur-Seine.
- *Mesothine Rhemda** 17, r. d'Hauteville, Paris.
- *Mesothorium Rhemda** id.
- *Mésothorium Buisson** 98, r. de Sèvres, Paris.
- *Métacarbène** 3, pl. Jussieu, Paris.
- *Métacitrine** id.
- *Métacuprol** 5, r. François-Ponsard, Paris.
- *Métaformine** AUBERT, 3, pl. Jussieu, Paris.
- Métalase** 252, fg. St-Martin, Paris.
- Métallosal** 149, r. du Palais-Gallien, Bordeaux.
- Métarsine Jasma** JARMON, 4, pl. de la Gare Tunis.
- Métasérum** BOUTY, 3, r. de Dunkerque, Paris.
- Metasulfol Vigier** 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
- *Méta-Titane** MÉTADIER, à Tours.
- *Métaux colloïdaux** Lab. A. LANCEN, 26, r. de Gonesse, Aulnay-sous-Bois.
- *Méta-vaccin** MÉTADIER, à Tours.
- Métharfer Bouty** 3, r. de Dunkerque, Paris.

- Métharsinate Clin** 20, r. des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
- Métharsol Bouty** 3, r. de Dunkerque, Paris.
- Méthylarsinates Bouty** 3, r. de Dunkerque, Paris.
- Méthylarsinate Vicario** 17, bd Haussmann, Paris.
- Méthylarsinate Vigier** 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
- *Métophan** HY, 61, av. de Choisy, Paris.
- *Métricine** 23, Gde-Rue, Asnières (Seine).
- *Metritols** 127, bd St-Michel, Paris.
- Métrostyptal** **Grosi-** 12, pl. de la Révolution, Besançon.
- chard**
- Mexalyl** 6, r. des Dames, Paris.
- *Mexyl** 6, r. des Dames, Paris.
- *Mialbaïne** 8, r. Favart, Paris.
- *Micelliode** 4, r. Platon, Paris (XV^e).
- Micranyl** GREMY, 14, r. Clichy, Paris.
- *Microlyse** 10, r. Strasbourg, Paris.
- *Mictasol** BARBE, Pharmacien, 155, bd Magenta, Paris.
- Mictasovules** id.
- *Mictophile** 45, fg St-Denis, Paris.
- Mictosédol** 49, r. du Loing, Montargis (Loiret).
- *Mictoseptol** 29, fg de Bourgogne, Orléans.
- *Mictualine** CLUZEL, 60, cours E.-Zola, Lyon.
- Migrainol** 16, c. Gambetta, Lyon.
- *Milkase** pl. de l'Hôtel-de-Ville, Salon-de-Provence.
- Mimophédrine** 71, r. St-Blaise, Paris (XX^e).
- Minéraline du D^r Baud** 22, bd Circulaire d'Epinay, Gennevilliers, (Seine).
- Minéralogène** 4, pl. Croix-Rouge, Lyon.
- *Minergil** 77, r. Miromesnil, Paris.
- Minérol** 10, r. Richelieu, Paris.
- Minérolaxine** D^r LETANNEUR, 87, av. Borriglione, Nice.
- Minervéa** 82-84, r. de Belleville, Paris.
- *Minervol** 82-84, r. de Belleville, Paris.
- Mintosol** JOUFFRAY, Bourgoin (Isère).
- *Miroxyl** 32, r. de l'Ouest, Paris.
- Mitigans** 6, r. Robert-Estienne, Paris.
- Moka du Travailleur** 36, r. de Verdi, Nice.
- Mokavène** 16, r. de Rocroy, Paris.
- Molavose** 7, r. des Petits-Carreaux, Paris.
- *Molène** 14, r. Gravel, Levallois-Perret.
- Mondorasme** 95, r. de Turenne, Paris.
- Moranyl** SPECIA, 21, r. Jean-Goujon, Paris.
- *Moréthyl Dausse** 4, r. Aubriot, Paris (IV^e).
- *Morisland** CHEVILLON, 99, r. de Paris, Massy (S.-et-O.).
- Moroïdol** 7, r. Guillaume-Budé, Montgeron.
- *Morphéroinn Lelsyn** 1 bis, r. Molitor, Paris.
- *Morrhualène Gautier** 17 bis, avenue Parmentier, Paris.

- *Morrhuéline Jungken** 105, r. de Normandie, Courbevoie (Seine).
à Grenoble.
- Morrhaine Puy** 8, r. Vivienne, Paris.
- Morrhual** 163, r. de Flandre, Paris.
- *Morrhuxine** 7, r. des Petits-Carreaux, Paris.
- *Morsine** 44, r. de Lagny, Montreuil.
- *Morubiasse Crosnier** 32, r. Joubert, Paris.
- Morubiline** U. C. E. P., 5, r. Labroque, Strasbourg.
- Moruemalt** BOST, Villefranche (Rhône).
- Moruphyle** 3, pl. Intérieure St-Michel, Toulouse.
- Moruxase Abadie** 21, r. Mouton-Duvernet, Paris (XIV^e).
- Mosti** 5, r. de Provence, Paris.
- *Mothersill's seasick remedy** 78, fg Saint-Denis, Paris.
- Mouches Albespeyres** 5, pl. Bisson, Lorient.
- *Movebil** Lab. E. MILLET, à Rambouillet (S.-et-O.).
- *Mucicarbos** MOUFLET, Chennebrun (Euze).
- Mucicardine** 71, r. Ste-Anne, Paris.
- Mucigénol** Lab. E. MILLET, à Rambouillet (S.-et-O.).
- *Mucilaxine** id.
- Mucilose** CHANTEREAU, 26 bis, r. Dombasle, Paris.
- *Mucinum** 145, r. Yves le Coz, Versailles.
- Mucobarytine** id.
- *Mucobismuthine.** 45, r. Docteur-Blanche, Paris.
- Mucogène Astier** LANDON, av. Baraduc, Châtel-Guyon.
- Mucoléine** 37, r. de la Fédération, Paris.
- *Mucosodine** BERNARD-GARCIN, St-Saturin-les-Avignon (Vaucluse).
- *Mucyllium** 10, r. du Plâtre, Paris.
- Mugrizol Dumesnil** 7, r. Biscornet, Paris.
- Muqueuse Endocrisines Fournier** SILBERT RIPERT, 30, r. Bénédict, Marseille.
- *Muronos du Dr Robert Jacques** 13, r. St-Agricol, Avignon.
- Musclanol** FEIGNOUX, 95, r. de Turenne, Paris.
- Musculargyre** 121, r. Victor-Hugo, Houplines (Nord).
- Musculogenol** 26, av. de l'Observatoire, Paris.
- *Musculosine Byla** 5 bis, rue des Haudriettes, Paris.
- Mustérole** GREMY, 14, r. de Cluchy, Paris.
- Mutandine** 55, bd de Strasbourg, Paris.
- *Muthanol** 4, impasse de Béarn, Paris.
- Muthoquinol** Lab. SERVIER, à Orléans.
- Muxol** 77, bd de Grenelle, Paris.
- Muxyl** à Valence-sur-Rhône.
- *Mycidol Badel** 10, r. Parent-de-Rosan, Paris.
- Mycodermine** 122, r. du Cherche-Midi, Paris.
- Mycolactine** 5, r. Bourg-l'Abbé, Paris.
- *Mycolysine Doyen**

| | |
|----------------------------------|---|
| Mydriasine | Labor. DULCIS, pl. Clichy, Monte-Carlo. |
| Mydriédrine | 194, r. de Rivoli, Paris. |
| * Mygdal | 295 bis, r. de la Benauge, Bordeaux. |
| * Myochrysine | SPECIA, 21, r. J.-Goujon, Paris. |
| * Myoden | E. DAUPEZ, 37, r. des Lois, Toulouse. |
| Myodyne Mauchant | 22, bd Circulaire d'Epina y, Gennevilliers (Seine). |
| * Myoral | 20, r. des Ecoles, Paris. |
| Myo-Serum | 168, bd St-Germain, Paris. |
| Myosine (forte et faible) | Labor. DULCIS, pl. Clichy, Monte Carlo. |
| Myostone Merminod | 49, r. de Paradis, Paris. |
| * Myothermine | 47, r. Bokanowski. Asnières. |
| * Myovarsyl | 89, r. Cherche-Midi, Paris. |
| Myrcol | 74, quai Jemmapes, Paris. |
| Myrtanol | 30, r. N.-D.-des-Victoires, Paris. |
| Myrtiline Demasles | à Vienne (Isère). |

N

| | |
|------------------------------|---|
| Nader | 6, rue de l'Ecole, Versailles (S.-et-O.). |
| Nadolor | 191, fg St-Antoine, Paris. |
| Nadorine | 25, r. Tocqueville, Paris. |
| * Naïodine Logeais | 22 bis, r. de Silly, Boulogne-sur-Seine. |
| Naphtocarbine | FAURE, 80, r. du Rocher, Paris. |
| Narcotile Bengué | 47, r. Blanche, Paris. |
| * Narcyl | 34, r. Sedaine, Paris. |
| Narsénol | SPECIA, 21, r. Jean-Goujon, Paris. |
| Nasale Ymera | 28, r. de Seine, Paris. |
| * Nasargine | MAIRE, 171, r. de Belleville, Paris. |
| * Nasobore | 102, r. Vincent, Marseille. |
| Nasocaine | J.ah. ANINAT, Nîmes (Gard). |
| Nasogyne | 37, r. des Lois, Toulouse. |
| Nasolene | ODILIA, 42, r. du Mont-Cenis, Paris. |
| * Nasopon | 239, r. Paul-Bert, Lyon. |
| * Nasosulfolarsan | DOMERGUE, Agen (L.-et-G.). |
| * Natibaine Nativelle | 27, r. de la Procession, Paris. |
| * Natirose | 27, r. de la Procession, Paris. |
| * Natrosyl | 127, bd St-Michel, Paris. |
| Navédrine | 194, r. de Rivoli, Paris. |
| Naza-Capsules | BERGER, 29, fg de Bourgogne, Orléans. |
| Nazilante | ANINAT, Nîmes (Gard). |

- Naziline**
 * **Nazinette**
Nazogyne

Nazophyl Darva
 * **Néalgyl**
Nécessaire d'Accouchement
Néfitol
Neigotan
 * **Néoarsite**
Néo-Arsycodile
Néo-Asclérol
 * **Néo-Biol**
Néoby

 * **Néo-Calculine**
 * **Néocardyl**

 * **Néo-chloral Nau**
 * **Néo-Collargol**
 * **Néo-Dmégon**

 * **Néo-Dmetys**
Néo-Dispositif Ravaut
Néo-Emétinol
Néofilhos le Perdril
Néo-Galyl

Néoglobuline
Néoiacol I. S. M.
Néo-Iodure Ménard
Néo-Kola Lumière
 * **Néol**
Néolactyl
Néolactine

 * **Néo-Laxatif Chapotot**
Néolides H. B.
 * **Néolyse**
Néo-Mg
 * **Néo-Neurosine**
 * **Néo-Pancarpine**
Néopansement du Dr Wolf
 * **Néophage**

Néo-Phanol
Néophos
 * **Néo-Physio**

Néo-Pituitairine

Néoplalysines
 * **Néopulmine**
Néoquinine Falières
- 33, Gde-Rue, Besançon.
GILBERT, 6, r. du Laos, Paris.
DAUPEZ, 37, r. des Lois, Toulouse.
 19, b. Bonne-Nouvelle, Paris.
 115, r. N.-D.-des-Champs, Paris.
LUCINIA, 154 bis, r. de Breteuil, Marseille.
 24, r. de Monttessuy, Paris.
 48, bd La Tour-Maubourg, Paris.
 7, r. Galvani, Paris.
 62, r. de la Tour, Paris.
 45, r. Caumartin, Paris.
 4, pl. du Val, à Vanves (Seine).
TROUETTE-PERRET, 15, r. des Immeubles-Industriels, Paris.
 21, r. Violet, Paris.
SPÉCIA, 21, r. Jean-Goujon, Paris.
 21, Gde-Rue Argenteuil (S.-et-O.)
 16, r. du Petit-Musc, Paris.
SPÉCIA, 21, r. Jean-Goujon, Paris.
 id.
 37, r. de Bourgogne, Paris.
 2, r. de Rivoli, Paris.
 11, r. Milton, Paris.
MOUNEYRAT, Villeneuve-la-Garenne (Seine).
 65, r. d'Hauteville, Paris.
 25, r. Dagorno, Paris.
 3, r. République, Lyon.
 45 rue Villon, Lyon.
 115, r. N.-D.-des-Champs, Paris.
 10, av. de Wagram, Paris.
 2, r. des Fossés St-Denis, Boulogne-sur-Seine.
 56, bd Ornano, Paris.
 115, r. N.-D.-des-Champs, Paris.
 55, bd de Strasbourg, Paris.
 229, cours Gambetta, Lyon.
 1, quai Aulagnier, Asnières.
 5, r. François-Ponsard, Paris.
 46, r. des Fuurs, Bordeaux.

JAMMES, 86, r. Michel-Ange, Paris.
 26, r. Sainte-Claire, Mulhouse.
 74, quai Jemmapes, Paris.
DROUET & PLET, Rueil-Mal-maison.
OPTIMA, 78, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
 49, r. de Paradis, Paris.
 45, fg St-Denis, Paris.
 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris;

- Naza-capsules
- Nazilante
- *Néoral
- *Néo-Rhomnol
- Néo-ricin
- *Néo-Riodine Astier
- Néosaliodé
- Néosantal
- Néo-Serosan
- *Néo-Séti
- *Néospasmodyl
- Néo-spermine
- Néo-Sphérulines
- Néosplénine
- *Néosuline Fornet
- *Néo-Tannurgyl
- *Néothorium Millot
- Néo-Tréparséan
- *Néo-Trépol
- Néotrope
- *Néotrophène
- *Néovaryl
- Néovitalyne
- Néoxyl
- Néphrine Bouty
- Néphrine Byla
- Néphrocrinol
- *Néphrylan
- *Néptal
- Neptol
- Nergilène
- *Nergine Heudebert
- Nertose
- *Nervocithine Tissot
- Nervosédol
- *Nésal
- *Nestogène
- *Nestosyl
- Neubryne
- *Neurène
- *Neuréol
- Neurhémol Vinçon
- Neuricure
- Berger, 29, fg de Bourgogne, Orléans.
- ANINAT, Nîmes (Gard).
- 295 bis, r. de la Benauge, Bordeaux.
- 62, r. de la Tour, Paris.
- 39, r. de la Gare, Bondy.
- 41 à 47, r. Docteur-Blanche, Paris.
- 5, r. Lefebvre, Paris.
- Fabris, Chambéry (Savoie).
- TORAUDE, 22, r. de la Sorbonne, Paris.
- 157, r. Championnet, Paris.
- 132, av. Victor-Hugo, Paris.
- 172, rue d'Alésia, Paris.
- (Voir : *Opothérapie Moncour*.)
- 3, pl. Jussieu, Paris.
- 23, r. du Caire, Paris.
- D^r LE TANNEUR, 87, av. Borri-glione, Nice.
- 177, r. de Courcelles, Paris.
- COMAR, 20, r. des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
- 22, r. de la Sorbonne, Paris.
- AGUETTANT, 36, quai Fulchiron, Lyon.
- Lab. de Chimie appliquée, 31, r. Chemin-de-Fer, Nanterre (S.).
- 6, av. Mirabeau, Nice.
- 28, r. de l'École Militaire, Lille
- 27, r. G.-Tessier, St-Étienne (Loire).
- 3, r. de Dunkerque, Paris.
- 26, av. de l'Observatoire, Paris.
- Lab. ISCOVESCO, 107, r. des Dames, Paris.
- 3, r. Parrot, Paris.
- SPECIA, 21, r. Jean-Goujon, Paris
- (Voir : *Topique Nasal A. B. C.*)
- SFÉAT, 15, r. Catulienne, St-Denis (Seine).
- 85, r. Saint-Germain, Nanterre.
- 132, r. de Turenne, Paris.
- 34 bd de Cluchy, Paris.
- 109, r. de Sèvres, Paris.
- 26, r. Vauquelin, Paris.
- Société NESTLÉ, 6, av. César-Caire, Paris.
- 72, r. St-Dominique Paris (VII).
- 78, bd Beaumarchais, Paris.
- 62, bd Jean-Jaurès, Boulogne-sur-Seine.
- LAFARGE, 6, bd Arago, Paris.
- Auxerre (Yonne).
- 77, bd de Grenelle, Paris.

- *Neuridor
- *Neurinase
- *Neurobore
- *Neurocalcium
- Neurodonai Koenig
- Neurodose
- Neuroflorine
- Neurogalacol Dethan
- Neurogénéol
- Neuroiodure Dethan
- Neurolipase
- Neuro-Pax
- Neuroplasma
- Neuroplasmine
- *Neuropol
- Neurosérine
- *Neurosine Prunier
- Neurosmon
- Neurosomnyl
- Neurosthéma
- Neurosthyll
- Neurotanio
- *Neurotensyl
- Neurotonine
- Neurotrol Abadie
- Neurotrope
- Neurotrophène (ampoules)
- *Neurotrophol Byla
- *Neurovarol Douetteau
- Neurovoïne
- *Neuséda
- Neutralcaol
- Neutralisine Bureau
- Neutralol
- Neutrobyl
- Neutrol
- Neutrose Vichy
- Neuvaritol
- *Névoral
- Névralgésine
- Névralgine Montsarrat
- *Névralgol Brossard
- Névraltéine Rogier
- Névraltine
- SAUBA, Montreuil (Seine).
- 45, r. d. Marche, Neuilly (Seine).
- 26, r. des Moines, Paris.
- Lab. Biol. de l'Île de France 19,
- av. d'Orléans, Paris (XIV^e).
- THOMAS, Chemin (M.-et-L.),
- 4, r. de Neuilly, Nanterre.
- 44, r. de Lagny, Montreuil.
- 11, r. A.-de-Neuville Paris.
- Usine du Blois et, Moulins-sur-
- Yèvre (Cher).
- 11, r. A.-de-Neuville Paris.
- 132, r. de Turenne Paris.
- Cte de GRAUWE, 16, r. de
- Rocroy, Paris.
- 16, r. Henri-Regnault, Courbe-
- voie.
- id.
- 83, bd de la Villette, Paris et
- 46, fg du Temple.
- JARMON, 4, pl. de la Gare,
- Tunis.
- 1, quai Aulagnier, Asnières.
- 49, r. Paradis, Paris.
- 229, cours Gambetta, Lyon.
- CELLIER, Saint-Uzé (Drôme).
- 4, r., Lamotte-Picquet, Paris.
- GREMY, 14, r. Clichy, Paris.
- 72, bd Davout, Paris (XX^e).
- OPTIMA, Gde-Rue au Bois,
- Bruxelles.
- 3, pl. Intérieure St-Michel, Tou-
- louse.
- MÉROBIAN, 37, r. Pajol, Paris.
- 9, r. de Boissonnade, Paris.
- 26, av. Observatoire, Paris.
- 20, fg. Saint-Honoré, Paris.
- GREMY, 14, r. Clichy, Paris.
- 30, r. Monge, Paris.
- BENDERITTER, Vendôme (L.-
- et-Ch.).
- 86, bd Port-Royal, Paris
- 13-15, r. de la Sablière, Bécon-
- les-Bruyères.
- D'AUBERT, 3, pl. Jussieu Paris.
- AMICI, Saint-Sylvestre, Nice.
- 49, av. de Wagram, Paris.
- 132, av. Victor-Hugo, Paris.
- R. FEIGNOUX, Lab. RAFFEY,
- 95, r. de Turenne, Paris (III^e).
- DÉBORDES, à Moulins (Allier).
- à Revel (Hte-Garonne).
- 1, r. Cordouans, La Rochelle.
- 56, bd Péreire, Paris.
- COUDERT, 116, av. Ledru-Rol-
- lin, Paris.

- Névrasite**
Névraxites
Nevristhone

Névrol Fréval
Névropathyl Leisyn
***Nevrosan**

Nevroserum
Névrosol
***Névrosthénine Freys-
singe**
Nickobalt
***Nigérine Vincent**
Nigroformine
Nipostra

***Nisaméline**

***Nitium Buisson**
***Nitroyl Leisyn**
Noctifen Léo

***Noctisédyll**

***Nopirine Vicario**
***Normacol**
Normalarine
***Normatensol**
***Normogasthryl**
Nortal Clin

Nosodol
Nosol Aguetant
***Novacétine Prunier**
Novaline de Montfleury
Novanol

***Novargyre Guillaumin**
Novarine Vicario
***Novarsénobenzol Billon**

**Novarsénobenzol Cor-
bière**
Novarsénobenzol Ercé
Novarthritol
***Novatropine**

Novaiodal
Noviode

Novismuth

***Novo-Brol**

***Novolactol**
***Novolug**
- 11, r. Joseph-Bara, Paris.
 7, r. J.-César, Paris (XII^e).
 GERDA, 163, bd de la Croix-
Rousse, Lyon.
 84, r. de Rochechouart, Paris.
 1 bis, r. Molitor, Paris.
 P. C. B., 12, r. du Téléphone,
Bruxelles.
 4, fg Stanislas, Nancy.
 12, r. des Apennins, Paris.
 6, r. Abel, Paris.

 12, r. Paul-Baudry, Paris.
 14, av. Mac-Mahon, Paris.
 51, r. de Paris, Pierrefitte.
FERREMBACH, Kaisersberg
(Haut-Rhin).
TROUETTE, 61, av. Philippe-
Auguste, Paris (XI^e).
 98, r. de Sèvres, Paris.
 1 bis, r. Molitor, Paris.
 11, square Marie-Louise, Bru-
xelles.
AUGIER, 2-4, r. des Lombards,
Paris.
 17, bd Haussmann, Paris.
 41, r. de Rome, Paris.
 18, r. de Beaune, Paris.
 87, r. Lafayette, Paris.
 14, r. des Minimes, Paris.
 20, r. des Fosses-Saint-Jacques,
Paris.
 57, r. Edgard-Quinet, Nantes.
 36, q. Fulchiron, Lyon.
 1, q. Aulagnier, Asnières (Seine).
 6, r. d'Alsace, Grenoble.
J. MIDY, 41, r. de Courbevoie,
La Garenne (Seine).
 13, r. Cherche-Midi, Paris.
 17, bd Haussmann, Paris.
SPÉCIA, 21, r. Jean-Goujon,
Paris.
 27, r. Desrenaudes, Paris.

 37, r. de Bourgogne, Paris.
DARBANS, St-Chinian, Hérault.
MATHIVAT, 66, r. de la Pompe,
Paris (XVI^e).
 45, fg St-Denis, Paris.
 Lab. **SALVOXYL**, 237 r. La-
fayette, Paris (X^e).
 30, r. des Francs-Bourgeois,
Paris.
 62, bd Jean-Jaurès, Boulogne-s-
Seine.
 Et. **DAGUIN**, St-Maur (Seine).
NOVALIS, Oullins (Rhône.)

| | |
|----------------------------|---|
| Novoptine | Labor. DULCIS, pl. Clichy, Monte-Carlo. |
| Novoseptine | 57 bis, av. La Motte-Picquet, Paris (XV ^e). |
| Nox | UNIS-SPES, 14, r. Demarquay, Paris. |
| Nuclabia | Lab. chimie physiologique, 37, r. Tivoli, Bordeaux. |
| Nuclarène Cognet | 43, r. de Saintonge, Paris. |
| Nucléarrhol Gabriel | 39, r. Sclessin, Liège (Belgique). |
| *Nucléarsitol Robin | 13, r. de Poissy, Paris. |
| *Nucléasine | 163, r. de Flandre, Paris. |
| *Nucléatol Robin | 13, r. de Poissy, Paris. |
| Nuclécithine | Collonges-Saint-Just-sur-Loire (Loire). |
| *Nucléigène | Lab. CHEVILLON, 99, r. de Paris, Massy (Seine-et-Oise). |
| Nucléigénol | 30, r. St-Jacques, Namur (Belgique). |
| Nucléinovarine | Lab. DEBOUDAUD, 22, r. Turbigo, Paris. |
| Nucléocalcose | 67, r. de Paris, Charenton-le-Pont (Seine). |
| *Nucléocardyl | 2, r. Lauzac, Bordeaux. |
| Nucléo-fenugrene | FURNON, Ste-Sigolène (Hte-Loire). |
| Nucléo-fer Girard | 48, r. d'Alésia, Paris. |
| Nucléol Hanbro | Lab. Central de France, 1, r. de Chateaudun, Rennes. |
| *Nucléophorène | 40, r. Claire-Paulhac, Toulouse. |
| *Nuclergol | 14, r. Demarquay, Paris. |
| Nuclhémose | RÉMY & LECOQ, 6, pl. Clichy, Paris. |
| Nuclocithol | 28, av. Grammont, Tours. |
| *Nujol | 98, r. de Sèvres, Paris. |
| *Nuphos | E. POINSIER, Méru (Oise). |
| Nurécase | GRANDVAL, à Reims. |
| Nurserine | 6, c. Joseph-Thierry, Marseille. |
| Nutréine | 46, av. des Ternes, Paris. |
| Nutréol | 61, r. de Seine, Paris. |
| Nutritine Déjardin | 109, bd Haussmann, Paris. |
| Nutro | 1, bd St-Martin, Paris. |
| Nutrobiase | 10, r. Cimarosa, Paris (XVI ^e). |
| *Nutromalt | 151 bis, route de Joinville, Champigny (Seine). |
| Nuxolein | 17, r. d'Hauteville, Paris. |
| Nuxyl | 26, av. des Klauwaerts, Bruxelles. |
| Nyctal | DURET & RÉMY, Asnières. |



- Occi-Gourme
 Océanine
 *Ocréine Grémy
 *Odarsol
 Oderma
 Odynal Chevalier
 Œnase Couturieux
 *Œnophos
 Oenoquinol
 Oenosthène
 *Oéréliode
 *Œstrobrol Roche
 Œio-Thyroidine
 *Okamine
 *Olbia
 *Olcalan
 Olcanfral
 Oléobiline
 Oléo-Calcium
 *Oléochrysine Lumière
 *Oléocidase
 Oléodermine Vincent
 Oléodine
 *Oléoformine«Corbière»
 Oléogazeur
 Oléo-Iode Dubois
 Oléojasol
 Oléol
 Oléolaxine
 *Oléo-Mel
 *Oléophédrine Béral
 Oléo-Psyllium
 Oléo-Sérums
 *Oléovules
 *Oléthyle Benzyle
 Olinex
 Oliolase Corbière
 *Oliphédrol
 4, av. de Brazza, Romainville.
 52, r. La Bruyère, Paris.
 14, r. de Clichy, Paris.
 COMAR & C^{ie}, 20, r. des Fos-
 sés-Saint-Jacques, Paris.
 Gonneville-la-Mallet (S.-Inf.).
 à Varennes-sur-Allier.
 18, av. Hoche, Paris.
 29, pl. Bossuet, Dijon.
 12-14, r. Fery, Reims.
 MOUFLET, Chennebrun (Eure).
 BOUVOT, Auvers-sur-Oise (S.-
 et-Oise).
 10, rue Crillon, Paris.
 OPTIMA, 78, Gde-Rue au Bois,
 Bruxelles.
 50, r. de Turenne, Paris.
 MOUNEYRAT, Villeneuve-la-
 Garenne (Seine).
 7, pl. Pey-Berland, Bordeaux.
 M. MARTIN, Cloyes (E.-et-L.).
 2, r. Maréchal-Pétain, Nice.
 MAURES, à Port-de-Penne
 (Lot-et-Garonne).
 45, r. Villon, Lyon.
 48, r. d'Alésia, Paris.
 14, av. Mac-Mahon, Paris.
 Pont-à-Celles (Belgique).
 27, r. Desrenaudes, Paris.
 122, fg. St-Martin, Paris.
 16, bd. Pereire, Paris.
 19, r. Ferdinand-Duval, Paris.
 BRUN, Demi-Lune, Lyon (Rh.).
 5, av. des Tilleuls, Paris.
 DELFOUR, Pouillon (Landes).
 194, r. de Rivoli, Paris.
 Lab. ADLER, 36, r. des Francs-
 Bourgeois, Paris.
 Route de Cimiez, Nice.
 SFEAT, 15, r. Catulienne, St-
 Denis.
 122, fg. S-Honoré, Paris.
 69, av. du Maine, Paris.
 27, r. Desrenaudes, Paris.
 18, r. Daval, Paris.

- *Olliricyl Hardy
- *Olisol
- *Olivéol Etiévant
- Ombiplaste
- Omonos
- *Onction Angelini
- *Onction Leisyn
- Ondanol
- *Onguent Fréval
- Onguent Ilon
- Onguent Ivula
- Onguent Prunot
- Onguent Pyorrhépha-
gine
- Onguent Salas
- Oophorine
- Ophtalmine Leprince
- Ophtalmo-vaccin Sa-
lantale
- Opobrol
- *Opobyl
- *Opocalcium
- *Opocalcium Irradié
- Opochlorine
- *Opochol
- Opocobalt
- Opocrinases
- *Opodermyl
- *Opoferrine vitaminée
- Opogénines
- Opoglandéol Fray
- *Opolases (voir *Am-
polases)
- Opolaxyl Corbière
- Opomanganol
- *Oponuclyl irradié
- Trouette-Perret
- Opopédol
- Opopeptol
- *Opophos
- Opophytol
- Oporadol
- Oposérum
- Opositoires opothéra-
piques Pellissier
- *Opostyl
- Oposynergines
- *Opothérapie Bouty
- *Opothérapie Byla
- 42, bd St-Marcel, Paris.
- SAUBA, Montreuil (Seine).
- BRUN, Demi-Lune, Lyon.
- 37, r. Godot-de-Mauroy, Paris.
- 33, Gde-Rue, Besançon.
- 61, r. de Seine, Paris.
- 1 bis, rue Molitor, Paris.
- SAUBA, Montreuil
- 84, r. Rochechouart, Paris.
- 31, r. Ilizach, Mulhouse.
- J. MIDY, 41, r. de Courbevoie,
La Garenne (Seine).
- 61, r. de Seine, Paris.
- Croissy-sur-Seine.
- 132, r. de Turenne, Paris.
- OPTIMA, Gde-Rue au Bois,
Bruxelles.
- 62, r. de la Tour, Paris.
- 42, Grandes Arcades, Stras-
bourg.
- 295 bis, r. de la Benaige, Bor-
deaux.
- BAILLY, 15-17, r. de Rome,
Paris.
- 121, av. Gambetta, Paris.
- 121, av. Gambetta, Paris.
- 132, r. Turenne, Paris.
- TÉTARD, Beauvais (Oise)
- 83, bd de la Villette, Paris.
- 132, r. de Turenne, Paris.
- BENSIMON, 36, r. des Martyrs,
Paris.
- 121, av. Gambetta, Paris.
- 40, r. Bellechasse, Paris.
- DURAND, Aigues-Mortes.
- 163, r. de Flandre, Paris.
- 27, r. Desrenaudes, Paris.
- DUVAL, Mézières (Ardennes).
- 61, av. Philippe-Auguste, Paris
(XI^e).
- ISCOVESCO, 107, r. des Dames,
Paris.
- 105, bd Malesherbes, Paris.
- 19, r. de Fleurus, Paris.
- D^r TESTART, Chalais (Chart^e).
- 25, r. Vaneau, Paris (VII^e).
- D^r TESTART, Chalais (Cha-
rente).
- 33, av. de Villiers, Paris
- BOUTY, 3, r. de Dunkerque,
Paris.
- 132, r. de Turenne, Paris.
- 3, r. de Dunkerque, Paris.
- 26, av. de l'Observatoire, Paris.

- * Opothérapie Carrion 54, fg Saint-Honoré, Paris.
- Opothérapie Chaix 10, r. Al-Bertillon, Paris.
- Opothérapie Chevreton 52, r. La Bruyère, Paris.
- * Opothérapie Choay 48, av. Théophile-Gautier, Paris.
- * Opothérapie du D^r Fraysse 21, r. de Neuilly, Nanterre (Seine).
- Opothérapie Fortin 109, r. de Sèvres, Paris.
- * Opothérapie Fournier 7, r. Biscornet, Paris.
- Opothérapie Fumouze 78, fg. Saint-Denis, Paris.
- Opothérapie Henning 49, r. de Paradis, Paris.
- * Opothérapie Iscovesco 107, r. des Dames, Paris.
- Opothérapie "Le Pecq" 11, r. Beautreillis, Paris.
- * Opothérapie Moncour 49, av. Victor-Hugo, Boulogne-sur-Seine.
- Opothérapie Richard 79, av. d'Orléans, Paris.
- Opothérapie Richter 49, r. Paradis, Paris.
- Opothérapie U. T. A. P. THIVISSEN, 13, r. Sainte-Véronique, Liège.
- Opothérapiques Meurice 61, av. Louise, Bruxelles.
- * Opothérapiques Pélissier 33, av. de Villiers, Paris.
- Optonine 20, r. des Martyrs, Paris.
- * Opo-vacuoline 39, r. de la Gare, Bondy.
- Opo-veinine 10, r. Maubeuge, Paris.
- * Opozones Lumière 45, r. Villon, Lyon.
- Opsine Grémy 14, r. de Clichy, Paris.
- Opsolysine 7 à 13, r. Saint-Maurice, Nanterre (Seine).
- Opsomyl A et B. 37, r. de Bourgogne, Paris.
- * Optalidon Sandoz 20, r. Vernier, Paris.
- * Optiplaste 4, r. d'Ilzach, Mulhouse.
- * Optraex 16-22, r. des Orteaux, Paris.
- Opunsine 94, r. Michelet, Alger.
- * Orargol Lab. AMICROS, 177, r. de Courcelles, Paris (XVII^e).
- Orarigène 35, av. Alsace-Lorraine, Grenoble.
- * Oralcine 2, place Meissonier, Lyon.
- Orcéol 17, r. Mont-Désert, Nancy.
- Orchidine OPTIMA, 78, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
- Orchitine Byla 26, av. Observatoire, Paris.
- Orchitine Meurice 61, av. Louise, Bruxelles.
- * Orex 18, r. St-Amand, Paris.
- Organésium 20, fg St-Honoré, Paris.
- * Organicalcion 81, r. de Lille, Roubaix.
- Organocalcine 121, av. de St-Ouen, Paris.
- Orge germé Fanta 77, rte d'Orléans, Montrouge.
- Orianol GENTON, à Petit-Quévilly (S.-Inférieure).
- Oriphol 8, r. Richer, Paris.
- Ormatol E. ROBINEAU, 80, rte des Petits-Ponts, Drancy (Seine).
- Orpranor LOUVEL, Elbeuf (S.-I.).
- Orthobiline 37, r. Galilée, Paris.

- * Ortho-Gastrine
 * Orthogénol
 Ortho Malleval
 * Orthozomine
 * Osmoléine
 * Osmo-Vaccins P. L.
 Ossical
 Osteline
 * Ostéogène
 * Ostéoglandulol
 Ostéo-hépatine
 Ostéopeptine
 Ostomalt
 Ostréine Buisson
 Otagine adrénalinée
 * Otaglolex
 Oto-Antisclérol
 Oto-Draineur
 Otolan
 Oto-vaccin Salantale
 * Otoléine
 * Ouabaine Arnaud
 Ouabaine Deglaude
 * Ouataplasme Langlebert
 Ouate Rhinol
 * Ovaire Fournier
 Ovaire Iscovesco
 Ovairine
 Ovaridine Meurice
 Ovarids
 Ovarigène Disdier
 Ovarine Dubois
 Ovarine Henning
 Ovarine Meurice
 Ovarine Optima
 Ovarine Tisy
 Ovarose
 Ovaro-Thyroidine
 Ovex Léo
 Ovigénine Bouty
 Ovo-biol
 Ovo-Cao
 LEBLOND, 51, r. Gay-Lussac, Paris.
 Lab. BÉLIERES, 19, r. Drouot, Paris.
 34, r. du Plat, LYON.
 LONGUET, 34, r. Sedaine, Paris.
 26, r. des Moines, Paris.
 Lab. d'analyses BREANT, 11, r. de Clichy, Paris.
 ROBERT et CARRIERE, 37, r. de Bourgogne, Paris.
 Lab. Rissa, 46, r. Claude-Lorrain, Lille.
 Lab. AMMANN, 3, imp. Adam, Boulogne-sur-Seine.
 14, r. des Pyramides, Paris.
 62, bd Jean-Jaurès, Boulogne-sur-Seine.
 DRAPIER, Lucquy (Ardennes).
 46, r. Claude-Lorrain, Lille.
 98, r. de Sèvres, Paris
 2, pl. de l'Hôpital-Général, Montpellier (Hérault).
 21, r. Feydeau, Paris.
 6 pl. Cambronnet, Paris.
 5, r. Emmanuel-Liais, Cherbourg.
 24, r. Jardel, Bordeaux.
 42, Gdes Arcades, Strasbourg.
 72, r. de Bagneux, Montrouge.
 27, r. de la Procession, Paris.
 6, r. d'Assas, Paris.
 SABATIER, 10, r. Pierre-Ducreux, Paris.
 DUBAT, 80, fg St-Denis, Paris.
 7, r. Biscornet, Paris.
 107, r. des Dames, Paris.
 62, r. Notre-Dame, Bordeaux.
 61, av. Louise, Bruxelles.
 4, imp. de Béarn, Paris.
 av. Alsace-Lorraine, Grenoble.
 49, av. Lamotte-Picquet, Paris.
 49, r. de Paradis, Paris.
 61, av. Louise, Bruxelles.
 OPTIMA, 78, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
 95, r. de Turenne, Paris.
 58, r. St-Placide, Paris.
 OPTIMA, 78, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
 11, square Marie-Louise, Bruxelles.
 3, r. de Dunkerque, Paris.
 62, bd Jean-Jaurès, Boulogne-sur-Seine.
 2, r. de Compiègne, Paris.

- Ovo-lécithine Billon** SPÉCIA, 21, r. Jean-Goujon, Paris.
- Ovomaltine** 151 bis, route de Joinville, Champigny (Seine).
- Ovothyrol** 62, bd Jean-Jaurès, Boulogne-sur-Seine.
- Ovrine** 88, cours de Vincennes, Paris.
- Ovules à l'Inolène** 42, r. Mont-Cenis, Paris.
- Ovules Amicros** 177, r. de Courcelles, Paris.
- Ovules antiseptiques** VÉLY, 132, av. V.-Hugo, Paris.
- * **Ovules Chaumel** 78, fg Saint-Denis, Paris.
- Ovules Derma** ROBIN, 13, r. de Poissy, Paris.
- Ovules Evine** 16, r. Barbette, Paris.
- Ovules au gonagone** 54, fg. St-Honoré, Paris.
- Ovules Gynol** Chaussée d'Ixelles, Bruxelles.
- Ovules Halogènes du D^r Bern** 3, pl. Int. St-Michel, Toulouse.
- Ovules Halleana** 4, imp. de Béarn, Paris.
- * **Ovules Inséva** DEBAT, 60, r. de Monceau, Paris.
- * **Ovules Intima** 85, cours Albert-Thomas, Lyon.
- Ovules Ivula Pearson** J. MIDY, 41, r. de Courbevoie, La Garenne (Seine).
- Ovules Magida** 56, r. des Dames, Paris.
- * **Ovules Néothorium** MILLOT, 177, r. de Courcelles, Paris.
- * **Ovules au nestosyl** 72, r. St-Dominique, Paris.
- Ovules Patrat** 61, r. de Seine, Paris.
- * **Ovules Rhemda** 17, r. d'Hauteville, Paris.
- * **Ovules Roche** 10, r. Crillon, Paris.
- Ovules Sédo-hémosta-tiques Jouve** 29, rue Vercingétorix, Paris (XIV^e).
- * **Ovules au Terpoxyl** 1, r. Christine, Paris.
- Ovules Uxora** DHAUSSY, à Mennevret (Aisne).
- Ovules-Vaccins Salan-tale** 42, r. des Grandes-Arcades, Strasbourg.
- Ovules-Vaccins Gol-denbergl** IVAGO, 17, r. de Provence Paris.
- Ovules Vézès** 52, bd du Temple, Paris.
- Ovunéol Bottu** 115, r. N.-D.-des-Champs, Paris.
- Oxhydrate de Bi** DESMARS, 89, av. Wagram, Paris.
- Oxitane** CASENEUVE, Saint-Cyprien (Dordogne).
- Oxnol** 45, fg Saint-Denis, Paris.
- Oxycyanure d'hydrar-gyre** GUILLAUMIN, 168, bd Saint-Germain, Paris.
- Oxy-Dents C. R. S.** 264, bd Voltaire, Paris.
- Oxyde orangé de Hg ophtalmoforme** Lab. DULCIS, pl. Clichy, Monte-Carlo.
- * **Oxydothyridine Paris** 4, r. de la Motte-Picquet, Paris
- * **Oxydovarine Paris** id.
- Oxydrol** POINTET et GIRARD, 30, r. des Francs-Bourgeois, Paris.
- * **Oxyfuge** CASTEL, 1, pl. Bouquerie, Nîmes.

- Oxygénase**
Oxygénés du D^r Prim
Oxygéné bore « Obs »
 * **Oxy-Injecteur du**
D^r Fialip
 * **Oxyléine**
Oxylisine
 * **Oxymenthol Perraudin**
Oxymuth Saca
Oxynargyl
 * **Oxyol Leisyn**
Oxyquinothéine
Oxytane
Oxythymol
Oxy-Thymoline
Oxytoires Sorin
Oxydrol
 * **Ozobiase**
 * **Ozobiase opothérapi-**
que
Ozodor
Ozol
Ozonair
 * **Ozothine**
- D^r CHAPELLE, 8, r. Vivienne,**
Paris.
27, r. Fourcroy, Paris.
Neuilly-sur-Saône (Rhône).
23, av. de la Motte-Picquet,
Paris.
37, r. de Marly, Rueil-Malmaison
(S.-et-O.).
LAMBERT, 6, r. de Longchamp,
Vichy.
21, r. Chaptal, Paris.
89, r. du Cherche-Midi, Paris.
BESNARD, 56, r. des Dames,
Paris.
1 bis, r. Molitor, Paris.
S. A. L. P., 91, r. Marietton,
Lyon.
CASENEUVE, St-Cyprien (Dor-
dogne).
GLORY, 38 bis, bd Beaumar-
chais, Paris.
GODFRIN, à Nancy.
TROMBETTA, à Blain (L.-Inf.).
30, r. des Francs Bourgeois, Pa-
ris.
37, r. de Marly, à Rueil-Mal-
maison.
id.
Lab. SERVIER, Orléans(Loiret)
à Avignon.
2, r. de Vienne, Paris.
23, r. Sébastien-Mercier, Paris.

P

- Pacyl**
 * **Paderyl**
Pain d'amandes au
gluten frais
 * **Pain essentiel Heude-**
bert
 * **Pain massé Sana**
 * **Pains spéciaux Heude-**
bert
Pains de régime Mil-
liat
Pains Nutricia
 * **Pain Redeuil**
- 8, r. de Prague, Paris.**
20, r. des Fossés-St-Jacques,
Paris.
37, r. du Rocher, Paris.
85, r. de Saint-Germain, Nan-
terre (Seine).
Gaillac (Tarn).
85, r. de Saint-Germain, Nan-
terre (Seine).
319, av. Berthelot, Lyon.
142, r. Fransman, Bruxelles.
7, r. Couche, Paris.

| | |
|--|--|
| Pain de santé Martin | à Montreuil-Belfroy (Maine-et-Loire). |
| Paloval | Pharm. de l'Etoile, Strasbourg. |
| Paludase Corbière | 27, r. Desrenaudes, Paris. |
| Paludol | PATRICE, à Vichy. |
| *Pampryl | 29, r. Tronchet, Paris. |
| Panbiase antiphy - mique | BAILLY, 15-17, r. de Rome, Paris. |
| *Panbiline | à Annonay (Ardèche). |
| Panbromine | 17, r. Cadet, Paris. |
| Pancalbiose | 1 r. Chancelier, Périgueux. |
| *Pancalcion | Lab. LEBRUN, 155, bd Magenta, Paris. |
| *Pancarbo | P. HARDY, 42, bd St-Marcel, Paris. |
| Pancréadénine | OPTIMA, 78, Gde-Rue au Bois, Bruxelles. |
| *Pancréanne | 10, r. Poncelet Paris (XVII ^e). |
| Pancréas-Endocrisines Fournier | 7, r. Biscornet, Paris. |
| *Pancréastase Defresne | 19, r. Jacob, Paris. |
| Pancréatokinase | 54, fg St-Honoré, Paris. |
| *Pancréatose Idon | 89, r. St-Georges, Nancy. |
| *Pancrébile | D ^r AUBERT, 3, pl. Jussieu, Paris. |
| *Pancrépatine Laleuf | 51, r. Nicolo, Paris (XVI ^e). |
| Pancrésal | SCHREIBER, av. du Bois, Luxembourg. |
| *Pancrinol du D^r Debat | 60, r. de Monceau, Paris. |
| Pandigitale Houdas | 26, r. Saint-Claude, Paris. |
| Pandigitale | OPTIMA, 78, Gde-Rue au Bois, Bruxelles. |
| *Pandrénaline Julien | 105, r. de Rennes, Paris (VI ^e). |
| *Panfébrine | 17 bis, av. Parmentier, Paris. |
| Panfortan | 4, ch. de la Muette, Paris. |
| *Pangaduine | 16, r. du Petit Musc, Paris. |
| *Pangastrol | STOULS, 156, av. Victor-Hugo, Paris. |
| *Pangermine | 10, pl. Thiers, Le Mans (Sarthe). |
| *Pangestyl Narty | 134, bd. Péreire, Paris. |
| *Panglandine | 18, av. Hoche, Paris. |
| Pangynol | 20 bis, r. Gravelotte, Toulouse. |
| Panhémol | 90, av. des Ternes, Paris. |
| Panhistol | 4 bis, r. de Lyon, Paris (XII ^e). |
| *Paniode | 239, r. P.-Bert, Lyon. |
| *Panlabyl | 94, r. Pasteur, Fontenay-sous-Bois. |
| Panlacto-Midy | 67, av. de Wagram, Paris. |
| Panlax Allard | Lab. GMET, 27, fg. Montmartre, Paris (IX ^e). |
| Panlaxyl | 37, r. des Lois, Toulouse. |
| Panlutéine | 2, rue des 2-Ponts, Paris. |
| *Panlysine | 7, r. des Petits-Carreaux, Paris. |
| Panopepton | ROBERTS, 5, r. de la Paix, Paris. |

Panophytes

- *Panostyl
 Panphylase
 Pansedine
 Panprocol
 Pansement otalgique Alsai
 *Pansolanée
 *Panstomase
 Pantofort du Dr Boveil (granules)
 Pantolaxine du Dr Boveil (cachets)
 Pantokinon
 *Pantopon Roche
 Panurol Tissot
 Panvalérase
 Panvalerine Delattre
 *Panvita
 *Panxylon
 Paospholine
 Papaïne Henry
 *Papaïne Trouette-Perret
 *Papaveryl
 Papavhydrine
 Papier Albespeyres
 Papier du Dr Balme
 Papier Fayard
 Papier Gicquel
 Papier iodogène Eymonnet
 Paquets P. C. L.
 Paquets Salins du Revard
 *Paquets Védé
 Paracarbochloryl
 Paradol
 *Paradoline
 Paraffinol
 Paraffinoléol Hamel
 Paraformine
 Paragar
 *Paragélose
 Paraghurt Léo
 Paragangline Vassale
 *Paralactine Byla
- TROUETTE-PERRET, 15, r. des Immeubles-Industriels Paris.
 57, r. Mathurin-Régnier, Paris.
 37, r. de Bourgogne, Paris.
 121, r. de Gerland, Lyon.
 222, r. Duguesclin, Lyon.
 1, r. Griffon, Lyon.
 2, pl. des Vosges, Paris.
 45, r. du Marché, Neuilly.
 1, r. Lassalle, Lyon.
 id.
 94, r. Michelet, Alger.
 10, r. Crillon, Paris.
 34, bd de Clichy, Paris.
 36, av. Niel, Paris.
 10, r. du Bac, Paris.
 2, r. Lauzac, Bordeaux.
 E. LOGEAIS, 24, r. de Silly, Boulogne-sur-Seine.
 21, r. Mouton-Duvernet, Paris.
 39, r. de Sclessin, Liège (Belgique).
 61, av. Philippe-Auguste, Paris (XI^e).
 Lab. ORRILLARD, 245, r. de Vaugirard, Paris.
 MERMINOD, 49, r. de Paradis, Paris.
 78, fg Saint-Denis, Paris.
 56, bd Péreire, Paris.
 2, av. Mathurin-Moreau, Paris.
 64 r. des Tournelles, Paris.
 139 c. Tolstoï, Lyon-Villeurbanne.
 163, r. de Flandre, Paris.
 St-André (Bouches-du-Rhône).
 2 et 4, pl. Gambetta, Paris.
 76, r. Réaumur, Paris.
 99, r. de Paris, Massy (S.-et-O.).
 99, r. de Paris, Massy (S.-et-O.).
 LANDON, av. Baraduc, Châtel-Guyon.
 17, r. de Berri, Paris.
 172, r. d'Alésia, Paris.
 107, av. de la Reine, Boulogne-sur-Seine.
 11, r. de Clichy, Paris.
 11, square Marie-Louise, Bruxelles.
 25, r. Dagorno, Paris.
 26, av. Observatoire, Paris.

- Paralaxol**
Paralymphine
Paratétanine
***Parathyrocalcine Mon-**
cour
Parathyroïde Endocri-
sines Fournier
Paratone Léo
Paratoxine Ducatte
Paratyl
***Paratyronc**
Parégorique Lafran
Paremanol
Parkibleu
Parlax
***Parolagar**
***Paroxyl**
***Parvula**
***Passicarbone**
***Passiflorine**
Passival
***Pastapalm**
Pastilles Bala
Pastilles Brachat
Pastilles Contre-ut
Pastilles Debar
Pastilles des Eaux-
Bonnes
Pastilles Fayès
Pastilles Helgé
Pastilles Houdé
Pastilles Irsi
Pastilles Libéria
Pastilles Maya
***Pastilles M. B. C.**
Pastilles Méry
Pastilles Midy
Pastilles Miraton
Pastilles Norvégiennes
Pastilles Palangies
Pastilles Paterson
Pastilles de Pougues
Pastilles Sabel à la
Codéine
Pastilles St-Christau
Pastilles Seclo
- TULIVET**, 52, r. de Poissy, à
 St-Germain-en-Laye.
 32, r. de Grenelle, Paris.
 17, r. Bourgelat, Lyon.
 49, av. Victor-Hugo, Boulogne-
 sur-Seine.
 7, r. Biscornet, Paris.
 11, square Marie-Louise, Bru-
 xelles.
 31, r. des Francs-Bourgeois,
 Paris.
CHAUVIN, Aubenas (Ardèche).
BYLA, 26, av. de l'Observa-
 toire, Paris.
 8, r. de Prague, Paris.
BRUNEAU, 17, r. de Berri,
 Paris.
 79, r. de la Roquette, Paris.
F. LATOUR, 71, r. Douy-Del-
 cupe, Montreuil-sous-Bois.
 348, r. St-Honoré, Paris.
THIRIET & C^{ie}, 26 et 28, r. des
 Ponts, Nancy.
BRUNSCHWIK, 3 bis, r. Vallier,
 Levallois-Perret (Seine).
 2, r. Boucicaut, Paris.
REAUBOURG, 2, r. Boucicaut
 Paris.
H. SALLÉ, 4, r. Elzévir, Paris.
BAILLY, 15, r. de Rome, Paris.
BRICHARD, Bar-le-Duc (Meuse).
 5, av. Victoria, Paris.
GIRAUD & JEANDET, 217, r.
 La Fayette, Paris.
BRICHARD, Bar-le-Duc (Meuse).
RAIMOÀ, 264, bd Voltaire,
 Paris.
 199, r. St-Denis, Paris
D^r LALAUURIE, Cuxac-d'Aude.
 9, r. Dieu, Paris
 4, ch. de la Muette, Paris.
 10, r. Cyrano-de-Bergerac, Paris.
 142, r. Fransman, Bruxelles.
GOY, 23, r. Beautreillis, Paris.
 16, r. de Rocroy, Paris
 4, r. du Colonel-Moll, Paris.
 48, r. d'Alésia, Paris.
 36, r. de Verdi, Nice.
 8, r. Vivienne, Paris.
 43, r. de Saintonge, Paris.
 21, r. Chaptal, Paris.
 20 bis, r. Sergent-Godefroy,
 Montreuil-sous-Bois.
ERGELOT, 163, r. de Flandre,
 Paris.
 6, r. Mathilde, Courbevoie.

- Pastilles Violettes A. B. C.** 24, r. de Monttesuy, Paris.
Pastilles Vichy-Etat 24, bd des Capucines, Paris.
Pastils Meran 18, r. de Maubeuge, Paris.
Pâte Aseptor 21, r. Feydeau, Paris.
Pâte Berthé 78, fg Saint-Denis, Paris.
Pâte dentifrice OPTIMA, 78, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
Pâte dentifrice Kraus 37, r. Godot-de-Mauroy
Pâte dentifrice Philipps O. C. P., 108, r. de Picpus, Paris.
Pâte Dermos Neyret NEYRET, 35, r. de la Bourse, Lyon.
***Pâte Gingivale** 21 r. J.-Goujon Paris.
Pâte Jane 2, r. Marché-des-Blancs-Man-teaux, Paris.
Pâte Magali 43, av. Kléber, Paris.
***Pâte Mireille** Lab. LEGENDRE & C^{ie}, sec-tion D. S., Houilles (S.-et-O.).
Pâtes lacto-maltées du D^r Jacquet 89, r. de Rivoli, Paris.
Pâte Neyret 35, r. de la Bourse, Lyon.
Pâte pectorale du P^r Williams 66, r. de Paris, Poissy (S.-et-O. Gaillac (Tarn)).
Pâtes Sana 26, ch. de la Madeleine, Nantes.
Pâte Silka 21, r. Jean-Goujon, Paris.
***Pâte Spécia** GRIGNON, 2, r. Duphot, Paris
Pâte de Terpene Quédet 38, r. Gay-Lussac, Paris.
Pâte thionique Ram-baud
***Patholysine** 142, r. de Picpus, Paris.
Pausodyne 98, r. d'Angoulême, Paris.
***Pavérinol** LALEUF, 51, r. Nicolo, Paris) (XVI^e).
***Paveron Dausse** 4 r. Aubriot, Paris (IV^e).
Paxanus 295 bis r. de la Benaige, Bor-deaux.
***Paxène** MILLET & GUILLAUMIN, 8, r. Richer, Paris.
Paxol Lab. ORRILLARD, 245, r. de Vaugirard, Paris.
Pebromon Henry 39, r. Sclessin, Liège.
Pecthionol Lab. MANSEAU, Margaux (Gi-ronde).
***Pectine Oberlin** 17, r. Cadet, Paris.
Pectobiol 21, Gde-Rue, Montfermeil.
Pectoforme Lab. GODART, Andenne (Bel-gique).
Pectoral des Dames de France 119, r. de Sèvres, Paris.
Pellicules radifères du D^r Vallet 22, r. de la Sorbonne, Paris.
Pellidol 26, r. Vauquelin, Paris.
***Pelviformine** 14, r. des Minimes, Paris.
***Penghavvar des Iles** RINGEADE, pharm., Fossebou-deau-Blaye (Gironde).

- *Pentaluès** SFÉAT, 15, r. Catulienne, St-Denis (Seine).
- Pentarsyl Lecoq et Ferrand** 14, r. Gravel, Levallois-Perret.
- Penghawar Vicario** 17, bd Haussmann, Paris.
- *Pennès (Produits)** 3, r. de Dunkerque, Paris.
- *Pentaluès** 15, r. Catulienne, St-Denis (Seine).
- Pentarsyl** LECOQ & FERRAND, 14, r. Gravel, Levallois-Perret.
- *Pepiodon Henry** 39, r. Sclessin, Liège (Belgique).
- Pepsencia Roberts** 5, r. de la Paix, Paris.
- Pepsobyl** Lab. DEBOUDAUD, 22, r. Turbigo, Paris.
- Pepsodia** 24, r. Paul-Bert, Paris.
- Peptalac** Sté des Spécial. diététiques et diurétiques (COW et GATE). 22, r. des Belles-Feuilles, Paris.
- *Peptalmine** 21, r. Chaptal, Paris.
- Pepticol** 13, av. Maréchal-Foch, Dammarie-les-Lys (S.-et-M.).
- Peptidol** 7, r. des Petits-Carreaux, Paris.
- Peptobrol Kopp** 19, r. des Foulons, Strasbourg.
- Peptocalcine** 22, r. de Paris, Houilles (S.-et-O.)
- *Peptodiase** ZIZINE, 24, r. de Fécamp, Paris.
- *Pepto-fer du Dr Jaillot** DARRASSE, 13, r. Pavée, Paris.
- Pepto-ferrine** OPTIMA, 78, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
- *Peptogil** 77, r. Miromesnil, Paris.
- *Peptokola Robin** 13, r. de Poissy, Paris.
- *Pepto-Magnésie Vassal** 28, r. Hôpital-Militaire, Lille
- *Peptomaltone Déjardin** 10, r. Parent de Rozan, Paris.
- *Peptonal** DURET & REMY, à Asnières (Seine).
- Peptonate d'Etain Henry** 39, r. de Sclessin, Liège (Belgique).
- *Peptonate de fer Robin** 13, r. de Poissy, Paris.
- Peptone Byla** 26, av. de l'Observatoire, Paris.
- Peptone Catillon** 3, bd Saint-Martin, Paris.
- Peptone Chapoteaut** 8, r. Vivienne, Paris.
- Peptone Cornélis** OPTIMA, 78, Gde-rue au Bois, Bruxelles.
- *Peptone Vassal** 28, r. Hôpital-Militaire, Lille.
- Peptosodine** 12, r. Mademoiselle, Paris (XV^e).
- *Peptosthénine Choay** 48, Av. Théophile-Gautier, Paris.
- Peptoalériane du Dr Gigon** 25, bd Beaumarchais, Paris.
- Peptozym** 90, av. des Ternes, Paris.
- Peptyl** COUDERT, 116, av. Ledru-Rollin, Paris.
- Peraziodol** 37, r. de Bourgogne, Paris.
- *Percaïne-percaïnal** CIBA, 113, bd de la Part-Dieu, Lyon.
- *Percalcine** 84, r. Rochechouart, Paris.
- *Péricols Legros** 88, r. Duhesme, Paris.

- Périol Soulié**
***Péristaltine Ciba**
 Perles Jeka
 Perles réductrices
***Perles Taphosote**
 Peroxydines
 Péroxyl
***Perquinol**
 Perrhinol

***Persodine Lumière**
 Pertussin Salle
***Perubore**
 Perunhyl
 Pérusol
 Peruviol
 Phagocytine Bureau
 Phagolysine
***Phagostyl**

***Phagostyl Mangané**

***Phaguryl**
 Phanodorme
 Pharmetan
***Pharyngaseptyl**
***Pharyngoléine**
 Pharynxoil
 Phelaxine Moulines
***Phénacodine**
 Phénalgéine
 Phénaseptyl
 Phénol Bobœuf
 Phiamine Coursaget
 Philodermine

***Philogastrine**
 Philogyne

 Philtroline

 Phléboguil
***Phlébos**

 Phlébosine M et F.
***Phlébotonine**

 Phléboveinol
 Phlyctol
 Phora
 Phos
 Phosarrhène
 Phosbiogyl
 Lab. Colonial, 21, r. Mouton-Duverniet, Paris.
 109-113, bd de la Part-Dieu, Lyon.
 13, r. St-Agricol, Avignon.
 PATRICE, à Vichy.
 20, r. Dumont-d'Urville, Paris.
 135, r. de Rome, Paris.
 69, av. du Maine, Paris.
 22, cité Trévisé, Paris (IX^e).
 Lab. Arquevaux, Étampes (S.-et-O.).
 45, r. Villon, Lyon.
 4, r. Elzévir, Paris.
 1, pl. Victor-Hugo, Paris.
 80, r. du Rocher, Paris.
 114, r. du Temple, Paris.
 REBOUL, Pont-Ste-Maxence.
 86, bd Port-Royal, Paris.
 14, r. Cantin, Courbevoie.
 A. PARIS, 4, r. La-Motte-Picquet, Paris.
 A. PARIS, 4, r. La Motte-Picquet, Paris.
 BAILLY, 15-17, r. de Rome, Paris.
 r. Saint-Honoré, Paris.
 61, av. Louise, Bruxelles.
 20 bis, r. Gravelotte, Toulouse.
 72, r. de Bagneux, Montrouge.
 8, r. Vivienne, Paris.
 à Villeneuve-la-Guyard (Yonne).
 132, av. Victor-Hugo, Paris.
 29, r. de Metz, Toulouse.
 4, pl. Wilson, Limoges.
 41, r. de Rome, Paris.
 9, r. Porte-Côté, Blois (L.-et-C.).
 13, r. de la République, Yzeure-Moulins (Allier)
 34, r. Saint-Lazare, Paris.
 OPTIMA, 78, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
 MARTINET, 16, r. du Petit-Musc, Paris.
 H. SALLE, 4, r. Elzévir, Paris.
 Lab. LAGOUTTE, 85, cours Albert-Thomas, Lyon.
 54, Fg St-Honoré, Paris.
 MARTINIE, 62, av. Philippe-Auguste, Paris.
 109, r. de Sèvres, Paris.
 37, r. de Bourgogne, Paris.
 LANG, 14, r. de Marignan, Paris.
 213, r. St-Honoré, Paris.
 112, r. de Gerland, Lyon.
 P. FONTANIER, Moulins-sur-Yèvre (Cher).

- *Phosbiose
Phoscalgène
- *Phoscamine
Phocéol
Phoscol
Phosféryl Fournier
Phosfodéine
Phoshémoquinol
Phosiodine
Phosma
Phosoda
- *Phosoforme
- *Phosol Quinet
- *Phosorine
- *Phosote Lambiotte
Phosphalose
Phosphan Caducia
- *Phospharsol
Phospharsinol
Phospharsyl colloïdal
du Dr Pinard
Phosphate Geffroy
- *Phosphates Pinard
- *Phosphate Vital de
Jacquemaître
- *Phosphatine Falières
Phosphatol Vitaminé
Irradié
- *Phosphobrom
Phospho-Calcine
- Phospho calcine ferru-
gineuse
Phosphodéine
- *Phospho-Fluor-Beynet
- *Phospho-Gaiacol Mary
Phosphogénase
- *Phosphogène Favri-
chon
Phosphoglycérate de
Chaux Chapoteaut
Phospho-Iodine
- *Phospholécose Demasles
- *Phosphomagnésium
- *Phosphonine Soulié
Phosphonucléose
- *Phosphopinal Juin
Phosphorescine Leker
Phospho-Serum
Phosphotal Clin
- 12, r. Payée, Paris.
LESCAROUX, à Châteauroux
(Indre).
- 22, bd Circulaire - d'Épinay,
Gennevilliers (Seine).
CHAUVILLE, Aubenas (Ardèche).
LESCAROUX, à Châteauroux.
7, r. Biscornet, Paris.
VELY, 132, av. V.-Hugo, Paris.
21, r. des Roses, Dijon.
GRAVIER, 64, r. d'Orsel, Paris.
68, Chaussée-d'Antin, Paris.
MATRAY, 4, villa d'Orléans,
Neuilly-sur-Seine.
37, r. de Marly, Rueil-Malmaison.
143, r. du Temple, Paris.
VIDAL, 46, r. de Grenelle, Paris.
20, r. Dumont-d'Urville, Paris.
62, r. Marengo, St-Étienne.
12, Squ. Delambre, Paris (XIV°).
46, r. Pierre-Charron, Paris.
MORAND, à Auray (Morbihan).
88, bd Saint-Denis, Courbevoie.
DELAMARE & C^{ie}, Romilly
sur-Andelle (Eure).
90, bd St-Denis, Courbevoie.
à Villefranche (Rhône).
1, quai Aulagnier, Asnières.
15, r. Catulienne, St-Denis
(Seine).
22, r. Poncelet, Paris.
OPTIMA, 78, Gde-Rue au Bois,
Bruxelles.
OPTIMA, 78, Gde-Rue au Bois,
Bruxelles.
132, av. Victor-Hugo, Paris.
165, r. Saint-Honoré, Paris.
32, r. de l'Ouest, Paris.
37, r. Tivoli, Bordeaux.
à Saint-Symphorien - de - Lay
(Loire).
8, r. Vivienne, Paris.
46, Gde-Rue, Boulogne-s. Mer.
Vienne (Isère).
22, r. Poncelet, Paris.
Lab. Colonial, 21, r. Mouton-
Duvernet, Paris.
DUPONT, Velines (Dordogne).
10, impasse Milord, Paris.
13, r. Marbeuf, Paris.
62, r. Dupont-des-Loges, Rennes.
20, r. des Fossés-Saint-Jacques,
Paris.

- Phospho Yogourt**
Phospirine
Phostaniol
Phostone
***Phostyl**
Phusasmine
Phydermol
***Phylactone Byla**
***Phylla**
Phyllosan
***Phymo-Stéryl Leysin**
Physéine Grémy
Physioscyamine
***Physiosthénine**
***Physocrisine**
Phytalgine
Phytergol
Phyteta
Phytinate de Quinine
Ciba
***Phytine Ciba**
***Phytogénine Byla**
Phytogénol
***Phytogyl**
Phytol
***Phytolécithine**
Phytomarine
***Phytomensyl**
***Phytosplénol**
Phyto-Tanin
Phytothérapie Coirre
***Phytovitamine Plé**
Picrol
Pilixyl
Pilka (Gouttes)
Pilules Anhépatiques
Christiaens
Pilules antidiabétiques
Midy
Pilules antinévralgi-
ques du Dr Cronier
Pilules Bengue
Pilules Blancard
 21, r. Aug.-Chabrières, Paris
 (XV^e).
 37, r. de Marly, Rueil-Malmaison (S.-et-O.).
 Lab. COMTOS à Fesches-le-Châtel (Doubs).
 BRÉANT, 4, r. de Clichy, Paris.
 Lab. PY, 58, bd R.-Wallace, à Puteaux.
 E. ROBINEAU, 80, rte des Petits-Ponts, Drancy (Seine).
 70, r. Boucicaut, Fontenay-aux-Roses.
 26, av. Observatoire, Paris.
 5, r. Claude-Decaen, Paris.
 26, r. Ste-Claire, Mulhouse.
 1 bis, r. Molitor, Paris.
 14, r. de Clichy, Paris.
 49, r. Maleret, Bordeaux.
 DROUET & PLET, 37, r. de Marly, Rueil-Malmaison.
 7, r. Biscornet, Paris.
 P. FONTANIER, Moulins-sur-Yèvre (Cher).
 24, r. Paul-Bert, Paris.
 7, pass. Talonville, Paris.
 109-113 bd de la Part-Dieu, Lyon.
 109-113, bd de la Part-Dieu, Lyon.
 26 av. de l'Observatoire, Paris.
 MARIOTTE, 15, r. Pasteur, Bourg (Ain).
 89, r. du Cherche-Midi, Paris.
 3, r. Chanez, Paris (XVI^e).
 77, r. de Miromesnil, Paris.
 132, r. de Turenne, Paris.
 59, r. Bolssière, Paris.
 PLÉ, 111 bis, r. de Turenne, Paris.
 Dr A. Petit, à Angoulême.
 5, bd Montparnasse, Paris.
 111 bis, r. de Turenne, Paris.
 22, r. Maréchal-Foch, Montpelier.
 BOUVELOT, 62, r. d'Antibes, Cannes.
 9, pl. Félix-Faure, Paris.
 2, r. du Champ-de-Mars, Reims.
 4, r. du Colonel-Moll, Paris.
 MONIN, 49, r. de Maubeuge, Paris.
 47, r. Blanche, Paris.
 64, r. La Rochefoucauld, Paris.

- Pilules Bosredon** GIGON, 25 bd Beaumarchais, Paris.
- Pilules bronchotoniques Arco** 38 bis, Beaumarchais, Paris.
- Pilules Clauss** GILBERT, 6, r. du Laos, Paris
- Pilules Clérambourg** 10, r. St-Antoine, Paris.
- Pilules Couplier** 30, r. Louis-le-Grand, Paris.
- Pilules Cuticura** 3, av. Lowendal, Paris.
- Pilules Doumer** à Annonay (Ardèche).
- Pilules Dray** 196 r. de Paris, Montreuil-sous-Bois.
- *Pilules du Dr Debouzy** LONGUET, 34, r. Sedaine, Paris
- Pilules du Dr Moustier** St-Vallier (Drôme).
- *Pilules du Dr Séjournet** 62, r. de la Tour, Paris.
- Pilules énergétiques Fradier** 53, bd de Verdun, Fontenay-sous-Bois.
- Pilules Eparvier** 26, Grande-Rue, Lyon.
- Pilules Galvane** Chabanais (Charente).
- Pilules Gip** 11, r. Joseph-Bara, Paris.
- Pilules Hardy** 13, r. Minimes, Le Mans.
- *Pilules héléniennes Naud** 37, r. Pajol, Paris.
- Pilules Hémabione** Lab. MOURGUES, Chemin-Neuf, Ganges (Hérault).
- Pilules d'Hermal** 28, r. Saint-Claude, Paris.
- Pilules Laville** 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
- Pilules Lartigue** 78, fg. Saint-Denis, Paris.
- Pilules Lemary** 14, r. Palais-Grillet, Lyon.
- *Pilules lithurannées du Dr Boveil** 1, r. Lassale, à Lyon.
- Pilules de Moussette** 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
- *Pilules Myosotis** 41, r. de Rome, Paris.
- Pilules Nella** 4, r. Jean-Goujon, Paris.
- Pilules noires Leisyn** 1 bis, r. Molitor, Paris.
- Pilules Norma** 33, Gde-Rue, Besançon.
- Pilules Oco** 87, r. Lafayette, Paris.
- Pilules oporénales** 132, r. de Turenne, Paris.
- Pilules Panma** Dr LALAURIE, Cuxac-d'Aude.
- Pilules Philippe** 14, r. Palais-Grillet, Lyon.
- Pilules Prophylactiques Christiaens** 2, r. du Champ-de-Mars, Reims.
- Pilules Purgatives du Dr Dehaut** 147, faub. Saint-Denis, Paris.
- Pilules de Quassine Frémint** 6, r. Abel, Paris.
- Pilules Roya** 41, r. de Rome, Paris.
- Pilules Salvia** 139, av. Émile-Zola, Paris.
- Pilules stibiées** 2, r. Volney, Paris.
- *Pilules V.-E. Doumer** Bomel, Annonay (Ard.).
- Pinofluol** 3, r. de Surène, Paris.
- Pinolac** ROBERTS, 5, r. de la Paix, Paris.
- Pinéoléum** id.
- Pipérasol Tissot** 34, bd, de Clichy, Paris.
- *Pipérazine Midy** 67, av. de Wagram, Paris.

- Pipérazine R. B. La-** 74, quai Jemmapes, Paris.
grave
***Pipérazyl** 30, bd Raimbaldi, Nice.
Pipettes nasales M. S. 1, pl. Victor-Hugo, Paris.
Piscidia Gmet 27, fg Montmartre, Paris.
Pitol 2, r. de Paris, Douai.
***Pituilobine Byla** 26, av. Observatoire, Paris.
Pituitairine OPTIMA, 78, Gde-Rue au Bois,
 Bruxelles.
Pixel Koehly 117, r. Vieille-du Temple, Paris.
Placenta Endocrisines 7, r. Biscornet, Paris.
Fournier
Placentodose 47, r. de Neuilly, Nanterre.
Plaganol 13, r. des Nonnains-d'Hyères,
 Paris.
Plagéine Soulas 119, r. de Sèvres, Paris.
***Plasma de Quinton** 54, f. Saint-Honoré, Paris.
Plasmargol HION, Paimpol (C.-du-N.).
***Plasmarine** Lab. de la BIOMARINE, Dieppe.
Plas Mastyl 20 bis, r. Sergent-Godefroy,
 Montreuil-sous-Bois.
***Plasmocalcium** Saint-Just-en-Chaussée (Oise).
Plasmocol 150, r. des Fauvelles, Courbevoie.
Plasmodine Vicario 17, bd Haussmann, Paris.
***Plasmosthène** 14, r. des Minimes, Paris.
Plasone Vauris 72, av. Kléber, Paris.
***Plasthamélyne** 59, r. Boissière, Paris.
Plastima 17, r. Vieille-du-Temple, Paris.
Plethorine 112, r. de Gerland, Lyon.
***Pléxorine** 132, av. Victor-Hugo, Paris.
***Plombyl** 37, r. de Marly, Rueil-Malmaison
 (S.-et-O.).
Pluorisse FABRIS, Chambéry (Savoie).
***Pluribiase** 21, r. Violet, Paris.
Pluriglandine M OPTIMA, 78, Grande-Rue-au-
 Bois, Bruxelles.
Pluriglandine F id.
***Plurion** 18, av. Hoche, Paris.
Pneoline 8, r. Vivienne, Paris.
Pneuma Wander 151 bis, r. de Joinville, Cham-
 pigny.
Pneumobiol 48, r. de Paris, Vichy.
Pneumo-calcine 46, av. des Ternes, Paris.
Pneumocratol 147, fg Saint-Denis, Paris.
***Pneumogéine Renard** 35, r. de Paris, Clichy.
***Pneumogénol** BURE, 74, fg d'Ambrail, Epinal.
***Pneumo-lipase** YVRARD, 17, r. Soufflot, Paris.
***Pneumostyl Daguin** à Saint-Maur (Seine).
Pneumotanic Grémy 14, r. de Clichy, Paris.
Podophylle Coirre 5, bd Montparnasse, Paris.
***Poliol Churchill** 12, r. Castiglione, Paris.
Polvista 6, r. Trencavel, Béziers.
***Polybromure Gonnon** 14, r. Victor-Hugo, Lyon.
***Polycautére** 19, r. Drouot, Paris.
Polychromol Couderc 143, r. de la Guillotière, Lyon.
Polycine 113, bd Voltaire, Paris.

- *Polyferments** LALEUF, 51, r. Nicolo, Paris (XVI^e).
18, av. Hoche, Paris.
- Polyformiate** 14, r. Victor-Hugo, Lyon.
- *Polyiodure Gonnon** 16, r. Henri Regnault, Courbevoie.
- Polyminéral Fort** 4, imp. de Béarn, Paris.
- Polyna** 61, r. de Seine, Paris.
- *Polypeptine** DURET et RÉMY, Asnières (Seine).
- *Polypeptonal** 6, r. Abel, Paris.
- Polyphorine Freyssinge** Joué-les-Tours (I.-et-L.).
- Polysel** 74, r. Lourmel, Paris.
- Polyseptol** 10, r. Alp. Bertillon, Paris.
- *Polyvaline D^r Bayle** JAUME, Tamaris (Gard).
- Polyveinine** 1, r. Delacroix, Chartres.
- Pommade 731** Lab. MIDY, 4, r. du Colonel-Moll, Paris.
- Pommade adrénostyptique Midy** 54, r. d'Étretat, Fécamp (S.-Inf.).
- *Pommade Aiphème** ODILIA, 42, r. Mont-Cenis, Paris.
- Pommade à l'Inolène** 11, r. Lafayette, Paris.
- Pommade Bernhard** HY, 61, av. de Choisy, Paris.
- *Pommade Bertol Vichy** Lab. REY, 12, r. Montmartre, Dijon.
- *Pommade-Crème Luddin** 3, av. Lowendal, Paris.
- Pommade Cuticura** 2, av. Gambetta, Choisy-le-Roi.
- Pommade de l'Esterel** LETTRY, 69, r. de Sèvres, Paris.
- Pommade de Séru** D^r Ferry, Monte-Carlo.
- *Pommades aseptiques Dulcis**
- Pommade Eon** 3, r. des Rouairies, Dinan (C.-du-N.).
- Pommade épidermogène** 53, bd de Verdun, Fontenay-sous-Bois.
- Pommade Forgeue** 37, r. de Bourgogne, Paris.
- *Pommade Fornet à l'Insuline** 23, r. du Caire, Paris.
- Pommade Harsen** S. G. I. P., 73, r. Gal-Sarrail, Le Havre.
- Pommade Heliatol** 4, pl. Royale, Nantes.
- *Pommade Inséva** DEBAT, 60, r. de Monceau, Paris.
- Pommade Jahnson** DUC, 24, av. Mac-Mahon, Paris.
- *Pommade Kléos** 2, r. des Cordeliers, Meung-sur-Loire.
- Pommade L. 3** 3, r. Abreuvoir, Boulogne-sur-Seine.
- *Pommade Lenoir** 142, r. de Picpus, Paris.
- *Pommade Logeais** 24, r. Silly, Boulogne-sur-Seine.
- *Pommade Midy** 67, av. de Wagram, Paris.
- Pommade Néothorium Millot** 177, r. de Courcelles, Paris (XVII^e).
- *Pommade au Nestosyl** 72, r. Saint-Dominique, Paris.
- *Pommade Noelline** Guingamp (C.-du-N.).
- Pommade Périol** 21, r. Mouton-Duvernet, Paris.
- Pommade Phlébos** 229, cours Gambetta, Lyon.
- Pommade Poncet** 107, av. de la Reine, Boulogne s-Seine.

- Pommade Quartier**
Pommade Radioactive
Raderm
Pommade Radine
***Pommade Raimoa**
***Pommade Rhinol**
***Pommades ophtalmiques Chibret**
Pommades Royer
Pommades Stéryl
Pommade-Vaccin Sallantale
***Pommade V.-E. Doumer**
Pommade Ygra
Posoplaste A. K.
Postérisan
***Post-Hypophyse Choay**
***Potion Adol**

Potion Boissel
Potion Bonnet
Potion des Cordeliers de Seez
Potion Dioga
Potion du D^r Henry

Potion Granval
Poudre à l'Inolène

Poudre américaine Leroy
Poudre antiasthmaticque Henry
***Poudre Cassarini**

Poudre antigestralgique
Poudre Bellada
Poudre Blot Laxative

Poudre Cap

***Poudre Chaumel**
Poudre Cosy
Poudre Cytisia

***Poudre Danica**
Poudre Deol
Poudre Dumur

Poudre dentifrice Charlard
Poudre de Lausanne (Voir : Isotonyl).
Poudre de Sapolan
- 34r. de Paris, Essonnes (S.-et-O.).**
14, r. de la Pépinière, Paris.

DUCLOS, Evreux (Eure).
264, bd Voltaire, Paris.
DUBAT, 80, fg St-Denis, Paris.
CHIBRET, 5, r. St-Hérem, Clermont-Ferrand.
223, r. Saint-Martin, Paris.
94, r. Michelet, Alger.
42, r. des Grandes-Arcades, Strasbourg.
BOMEL, Annonay (Ardèche).

34, r. Thiers, Gray (Hte-Saône).
37, r. Godot-de-Mauroy, Paris.
6, r. des Cigognes, Strasbourg.
48, av. Théophile-Gautier, Paris.
GIROUD, 78, c. de la Liberté, Lyon.
4, cours Circé, Bordeaux.
17, r. Cadet, Paris.
19, av. Secrétan, Paris.

14, r. Demarquay, Paris.
Usine du Blosset, Moulins-sur-Yèvre (Cher).
12-14, r. Fery, Reims.
ODILIA, 42, r. Mont-Cenis, Paris.
12, r. de la République, Puteaux.

39, r. Sclessin, Liège.

COLUMEAU, 45, r. d'Aix, Marseille.
BERNHARD, 11, r. Lafayette, Paris.
24, r. Keller, Paris.
MONIN, 49, r. de Maubeuge, Paris.
2, r. Marché-des-Blancs-Manteaux, Paris.
78, fg St-Denis, Paris.
89, r. St-Georges, Nancy.
AXAREL, 15, r. Catulienne, St-Denis.
50, r. de Turenne, Paris.
61, r. de Seine, Paris
GIROUD, 78, cours de la Liberté, Lyon.
12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.

87, r. Lafayette, Paris.

CAVAILLÈS, 29, r. Singer, Paris.

| | |
|--|--|
| Poudre de viande | 15, r. des Immeubles-Industriels, Paris. |
| Poudre du D^r Cléry | 18, r. de Maubeuge, Paris. |
| *Poudre du D^r Souli-goux | 1, quai Aulagnier, Asnières. |
| Poudre épidermogène | 53, bd de Verdun, Fontenay-sous-Bois. |
| Poudre Escouflaire | à Baisieux (Nord). |
| Poudre Espic | 20, r. Saint-Lazare, Paris. |
| Poudre Evine | 16, r. Barbette, Paris. |
| Poudre Exhibared | 6, r. Dombasle, Paris. |
| Poudre Fiore | 61, r. de Seine, Paris. |
| Poudre Ferromanganique | 8, r. Vivienne, Paris. |
| Poudre Gast | 6, pl. Clichy, Paris. |
| Poudre Gécé | 48, r. de Berri, Paris. |
| Poudre Génia | 136, r. Chemin-Vert, Paris. |
| Poudre Gilbert Trillon | 24, r. Eugène-Pelletan, Vitry-sur-Seine. |
| Poudre gynol | 316, ch. d'Ixelles, à Bruxelles. |
| Poudre Gynule | CH. DEHAY, à Arras. |
| Poudre Héliatol | 4, pl. Royale, Nantes. |
| Poudre Helvétia | 50, r. de la République, Puteaux. |
| Poudre Hunier | REBOUL, Pont-Ste-Maxence. |
| Poudre Klappa | GIBAN, à Sens (Yonne). |
| Poudre Lartigue | 78, ig Saint-Denis, Paris. |
| *Poudre Mass plastique | 17, r. Soufflot, Paris. |
| *Poudre Noelline | Guingamp (C.-du-N.). |
| Poudre Optima | Gde-Rue au Bois, Bruxelles. |
| Poudre O. R. L. | 4, r. d'Illzach, Mulhouse. |
| *Poudre Paterson | 43, r. de Saintonge, Paris. |
| Poudre Pelevine | 16, r. Barbette, Paris. |
| *Poudre et Pommade d'Insuline Phyloze | 48, r. de la Procession, Paris. |
| Poudre purgative Künckel | 3, r. Watteau, Courbevoie. |
| Poudre Pylor | 20, Gde-Rue, Besançon. |
| Poudre Remoro | JEHAN & BRÉRA, Montauban (L.-et-G.). |
| Poudre Rhodys | 97, bd St-Germain, Paris. |
| *Poudre Rocher laxative | 19, r. Grégoire-de-Tours, Paris. |
| Poudre du Roy | 5, r. Diderot, Nice. |
| Poudre Salva | Lab. Central de France, 1, r. de Châteaudun, Rennes. |
| Poudre de soufre Sapolan | CAVAILLES, 29, r. Singer, Paris. |
| *Poudre Satine | 7, r. Galvani, Paris. |
| Poudre de soufre Sapolan | CAVAILLES, 29, r. Singer, Paris. |
| Poudre Stear | 12, r. de Buci, Paris. |
| Poudre Stoma | HERIN, 98, r. Jeanne-Maillotte, La Madeleine (Nord). |
| *Poudre Zani | 52, r. de Polssy, St-Germain-en-Laye. |
| Poudre Ziethen | 85, r. des Morillons, Paris. |
| *Pragmoline | SPÉCIA, 21, r. Jean-Goujon, Paris. |

- Praunase Corbière**
Préaléxol
Pré-asthme
***Précibiase**
Précy
Prélase
***Prévalidine**
***Prévarsyl**
***Préventyl**
***Prézymase**
Primalgine
Primargol
***Primulyze**
Prises Delqué
Probios
Procuta Brisson
Produits antidiabé-
tiques Dupont
Produits Benedictus
Produits Billault
Produits Chanteaud
Produits diététiques
Produits Gmet
Produits Gory
***Produits Mafas**
Produits de Malt
Produits organiques
Richard
Produits Orhino
***Produits Pennès**
(voir : Pennès)
Produits de Régime
***Prodynase**
***Progaster**
***Progone**
Progyne Thelliez
***Prométhine**
Propeptase
Prophylax
Prophylaxis
***Propidex**
***Propidon**
***Prostaphile Leisyn**
***Prostatols**
***Prosthénase Galbrun**
***Prostigmine**
- 27, r. Desrenaudes, Paris.
 49, r. de Paradis, Paris.
 3, pl. d'Armes, Valenciennes
 (Nord).
 22, r. de la Sorbonne, Paris.
 96, r. Lafayette, Paris.
 71, r. Ste-Anne, Paris.
 4, r. d'Ilzsch, Mulhouse.
 89, r. du Cherche-Midi, Paris.
 74, r. des Jacobins, Amiens.
 LEBOIME, 3, r. Fernand-Widal,
 Paris.
 24, bd Sébastopol, Paris.
 86, r. Amsterdam, Paris.
 23, r. Beautreillis, Paris.
 46, r. Pierre-Charron, Paris.
 1, av. Pasteur, Paris.
 157, r. Championnet, Paris.
 38, r. Rochechouart, Paris
 74, r. Lamarck, Paris.
 4, pl. de la Sorbonne, Paris.
 54, r. Francs-Bourgeois, Paris.
 FAVRICHON, à Saint-Sym-
 phorien-de-Lay (Loire).
 27, fg. Montmartre, Paris.
 51, r. des Mathurins, Paris.
 FOUCHERE, Rive-de-Gier
 (Loire)
 5, r. Labroque, Strasbourg.
 79, av. d'Orléans, Paris.
 82, r. de la Croix-Verte, Albi.
 BOUTY, 3, r. de Dunkerque.
 Paris.
 LA NUTRICIA, 142, r. Frans-
 man, Bruxelles.
 12, r. Charles-V, Paris.
 NOVALIS, Oullins (Rhône).
 15, r. Catulienne, St-Denis
 (Seine).
 83, r. Maubeuge, Paris.
 20, r. des Écoles, Paris.
 132, r. de Turenne, Paris.
 6, r. des Feuillants, Marseille.
 11, r. de la Montagne-Ste-Gene-
 viève, Paris.
 SPECIA, 21, r. Jean-Goujon,
 Paris.
 SPECIA, 21, r. Jean-Goujon,
 Paris.
 1 bis, r. Molitor, Paris.
 BEAUXIS-LAGRAVE, 74, qual
 Jemmapes, Paris.
 8, r. du Petit-Musc, Paris.
 HOFFMANN LA ROCHE, 10,
 r. Crillon, Paris.

- Prosvelta**
- Protaminol Byla**
- Protège-Vaccin Kraus**
- *Protensène**
- Protéobiol**
- *Protéodyne**
- Protéol**
- Prothéine**
- Prothiol**
- Protiode Grémy**
- Protolysine**
- Protonic**
- Proto-Gambier**
- Protyline Roche**
- *Proveinase**
- Provenine**
- Provitol**
- Proxylases**
- *Proxylol**
- *Prunagar**
- Pruneline Bost**
- *Prunines Sentini**
- Prurilyse**
- Pruritol Raimoa**
- Psinase Grémy**
- *Psoréon**
- Psorialan**
- Psorimangane**
- *Psothanol**
- Psycho-Neuryl**
- Psyliolaxine**
- Puberglandol**
- Pulcéine**
- Pulmicure**
- Pulmine Byla**
- Pulmobiasé**
- Pulmobryne**
- Pulmobules Hyva**
- Pulmocardine**
- Pulmocholine**
- Pulmochrysine**
- *Pulmodion**
- *Pulmodynol**
- *Pulmofluide**
- Ph. LAUMONIER**, 223, r. St-Martin, Paris.
- 26, av. Observatoire, Paris.
- 37, r. Godot-de-Mauroy, Paris.
- LEJEUNE**, 142, r. de Picpus, Paris.
- BAILLY**, 17, r. de Rome, Paris.
- 29, pl. Bossuet, Dijon.
- 5, r. Bourg-l'Abbé, Paris.
- 29, pl. Bossuet, Dijon.
- 4, r. Childebert, Lyon.
- 14, r. de Clichy, Paris.
- 7, r. Guillaume-Budé, Montgeron.
- 88, r. Duhesme, Paris.
- 42, r. Émile-Deschanel, Courbevoie (Seine).
- 10, r. Crillon, Paris.
- MIDY Frères**, 67, av. de Wagram, Paris.
- 4, cité Magenta, Paris.
- D LEBAT**, 60, r. de Monceau, Paris.
- 97, r. de Vaugirard, Paris.
- id.
- 71, r. St-Jacques, Paris.
- à Villefranche (Rhône).
- DOMERGUE**, Agen (L.-et-G.).
- 51, Grande-Rue, Flers (Orne).
- 264, bd Voltaire, Paris.
- 14, r. de Clichy, Paris.
- 3, r. des Rouairies, Dinan (Côtes-du-Nord).
- 14, r. St-Claude, Paris.
- MERMINOD**, 49, r. Paradis, Paris.
- 55, bd de Strasbourg, Paris.
- 1, r. F.-Ponsard, Paris.
- St-Rémy-de-Provence** (B.-du-R.).
- 156, r. des Fauvelles, Courbevoie.
- LE NAOUR**, Quimperle (Fin.).
- Eon, 3, r. des Rouairies, Dinan (C.-du-N.).
- 26, av. Observatoire, Paris.
- ADLER**, 36, r. des Francs-Bourgeois, Paris.
- 38, r. N.-Dame de Lorette, Paris.
- 12, r. Grande, Evreux.
- 57, r. Origet, Tours.
- 20, r. d'Avron, Paris.
- BONNAY**, Nogent-s.-Marne (Seine).
- 10, impasse Milord, Paris.
- 22, r. de Nemours, Paris.
- LEURQUIN**, 50-52, r. Pierre-Legrand, Lille.

*Pulmogrog
Pulmogyl
Pulmolaxol

Pulmone
Pulmonine Bouty

*Pulmosédor
*Pulmosérum Bailly
Pulmosirop

*Pulmositoires
Pulmovaccin

*Pulmoverne
Pulmovitine

Pulmostéryl
Pulmostyl

*Pulsamone
Pulsophyle
*Pulvéol
Pulvérisateur E. C. S.
Pulvérisateur Vaast
Pulvinasol
Pulvi-Lactéol du D^r
Boucard
Pulvinha-Pathuro

*Pulvita

Punch Novela

*Puragar

*Purargol

Purgalax

*Purganol Daguin

Purgatif Voux

Purgelettes Roux

Purgemint

Purgipastilles

*Purgos

Purgyl Koehly

Purolive

Pyal Hanbro

*Pyo-Amphogel

Pyodarsénol

Pyodermase

*Pyoformine

Pyol Hambro

*Pyo-Vaelydun

Pyramidon U. R.

Pyran

Pyratone

FERCOCQ, St-Maur (Seine).

33, r. Lauriston, Paris.

GERDA, 163, bd Croix-Rousse,
Lyon.

Lab. DARDENNES, Tours.

3, r. de Dunkerque, Paris.

7, av. Marceau, Paris.

15 et 17, r. de Rome, Paris.

MEUNIER, r. du Commerce,
Montmarault (Allier).

82, r. Duhesme, Paris.

23, r. des Moines, Paris.

13, r. D^r-Mazet, Grenoble.

P. FONTANIER, Moulins-sur-
Yèvre (Cher.)

à Châteauroux (Indre).

Lab. LESCAROUX '3, r. Victor-
Hugo, Châteauroux.

6, r. Dombasle, Paris.

4, imp. de Béarn, Paris.

10, impasse Milord, Paris.

10, r. Caumartin, Paris.

22, r. de l'Odéon, Paris.

26, r. des Moines, Paris.

30, r. Singer, Paris.

LE GALLO, à Auray (Morb.).
62, bd Jean-Jaurès, Boulogne-
sur-Seine.

St-Julien-en-Jarez (Loire).

46, r. de Rome, Marseille.

102, r. Vincent, Marseille.

24, r. Montessuy, Paris.

7-13, r. Bobillot, St-Maur (Seine).

31, av. Michel-Bizot, Paris.

ROUX, 58, r. de Maubeuge,
Paris.

MOULIN, 50, r. de la Répu-
blique, Puteaux.

37, r. Godot-de-Mauroy, Paris.

7 bis, r. Galvani, Paris.

117, r. Vieille-du-Temple, Paris.

25, av. Ledru-Rollin Le Per-
reux (Seine).

10, r. de Belfort, Rennes.

RONCHÈSE, 6, r. Rothschild,
Nice.

26, r. Pagès, Suresnes.

pl. du Marché, La Rochelle
(Ch.-Inf.).

89, r. du Cherche-Midi, Paris.

Lab. Central de France, 1, r. de
Châteaudun, Rennes.

27, r. Desrenaudes, Paris.

21, r. Jean-Goujon, Paris.

156, r. des Fauvelles, Courbevoie.

71, bd Saint-Michel, Paris.

***Pyrélaïne Collas**

Pyr éthane
Pyr éthrine

Pyréthrosol
Pyréthroxyl
Pyridone D^r Berlioz
Pyrinol Vichy

***Pyri-Pyridium**

Pyrocidine

***Pyroléol Edet**

Pyrothéine

***Pyurol**

35, av. de Beauté, Le Parc Saint-Maur (Seine).

18, r. Ernest-Rousselle, Paris.
CARTERET, 15, r. d'Argenteuil, Paris.

12, r. Pavée, Paris.

r. Faidherbe, Lille.

6, r. d'Alsace, Grenoble.

PATRICE, à Vichy.

Lab. SERVIER, Orléans (Loiret).

OPTIMA, 78, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.

7, r. de Jouy, Paris.

3 r. de Paris, Auxerre.

51, r. Gay-Lussac, Paris.

Q

***Quassia-Kina Rabot**

Quassine Frémint

Quassine Houdé**Québralgine*****Quergemol**

Quiétol

Quiétyl

***Quina Baron**

Quina Bourcet

Quinacrine**Quina pepsiné Blot**

Quinacinas

Quina-fer Mechling

Quina Laroche

Quinamagnésion

Quinarsan

Quinarsol antianémique Grandval**Quinarsol Fébrifuge**

Granval

***Quinby**

Quinéase

Quinéine**Quinicardine**

49, r. Bitche, à Courbevoie.

6, r. Abel, Paris.

9, r. Dieu, Paris.

2, bd Pershing, Paris.

BAILLY, 15-17, r. de Rome, Paris.

21, r. Jean-Goujon, Paris.

1, pl. Victor-Hugo, Paris.

P. FOURNIE, 3, pl. Miséricorde, Lyon

7, r. du Doyenné, Lyon-St-Jean

21, r. J.-Goujon, Paris.

38, bd de Strasbourg, Toulouse.

ROBERTS, 5, r. de la Paix, Paris.

à Mulhouse.

COMAR, 20, r. des Fossés-Saint-Jacques, Paris.

SAUBA, Montreuil (Seine).

22, r. de la Sorbonne, Paris.

12 et 14, r. Féry, Reims.

id.

P. AUBRY, 62, r. Erlanger, Paris.

37, r. de Marly, Rueil-Malmaison (S.-et-O.).

21, r. Chaptal, Paris.

27, r. de la Procession, Paris.

- Quinimuthol Sacca**
Quinine Pelletier
 * **Quinino Phytine Ciba**
Quinio-Goyl Meurice
 * **Quinio-Stovarsol**

Quinismuth

Quinium Roy
Quinobore
Quinobromine

 * **Quinoforme Lacroix**
 * **Quinoidine Duriez**
Quinol
Quinolax

Quinophage
Quinopyroi
Quinorhéine Duteil
Quinotane Valguy
Quino-Thorium
Quinovarine

 * **Quinquina Gmet**
Quinquina granulé As-
tier
Quinquina Granval
Quinquina Watelet
 * **Quinsal**

 * **Quinthéryl**
Quinurée

 * **Quintozone**
 * **Quinuryl**

Quiphos Churchill
Le Quotidien (Raisin)
- 89, r. du Cherche-Midi, Paris.
 VIAL, 8, r. Vivienne, Paris.
 109, bd de la Part-Dieu, Lyon.
 61, av. Louise, Bruxelles.
 SPÉCIA, 21, r. Jean-Goujon,
 Paris.
 DEMARS, 89, av. Wagram,
 Paris.
 81, bd Suchet, Paris.
 143, r. du Temple, Paris.
 TORAUDE, 22, r. de la Sor-
 bonne, Paris.
 37, r. Pajol, Paris.
 20, pl. des Vosges, Paris.
 G. HENRY, à Vernon (Eure).
 ROBERTS, 5, r. de la Paix,
 Paris.
 12, r. Pavée, Paris.
 172, r. d'Alésia, Paris.
 90, av. St-Ouen, Paris.
 12, r. Charles-V, Paris.
 98, r. de Sèvres, Paris.
 OPTIMA, 78, Gde-Rue au Bois,
 Bruxelles.
 27, fg Montmartre, Paris.
 45, r. du Docteur-Blanche,
 Paris.
 12-14, r. Féry, Reims.
 15, av. Montsouris, Paris.
 34, r. Thiers, Gray (Haute-
 Saône).
 LÉONARDON, Arcachon (Gir.)
 TERRIAL, 22, r. de la Bienfai-
 sance, Paris.
 18, r. Daval, Paris.
 LONGUET, 34, r. Sedaine, Pa-
 ris.
 12, r. Castiglione, Paris.
 H. Chartier, à Saumur.

R

- Radiargyl**
Radiobaume Adrian
Radiobiogyl

Radiocréméline
Radiodine
Radiofor
- 17, r. d'Hauteville, Paris.
 9 et 11, r. de la Perle, Paris.
 Usine du Blosset, Moulins-sur-
 Yèvre (Cher).
 25, r. Vaneau, Paris.
 4, r. St-Anastase, Paris.
 10, r. Maubeuge, Paris.

- *Radiogastrol
 Radiole
 Radiolysine
 Radioma-nésium
 Rhemda
 *Radio-mordant Leisyn
 *Radiopaque
 Radiophorine
 Radiorésinol
 Radiosérum Jaboin
 *Radiotétrane
 Radiotonine
 Radiovitine
 *Radiovules
 Radipirine
 Radjunal Chevrier
 Raiforyl
 Raisin Moillard
 *Raisin quotidien
 Rami-gouttes
 *Rangol
 Rapidoats
 Ravix
 Réalgnose
 Réaline
 *Réalphène Buisson
 Réargon
 *Reconstituant Mary
 *Recrésal
 *Rectagine
 Rectaméline (Voir Pom-
 made Logeais).
 Rectanol
 *Rectoline
 *Rectopaniline
 Rectoplasme
 *Rectosol
 Rectosote
 Recto-Vaccin Salan-
 tale
 Recytile
 Réfistine
 Régulase Efgé
 Régulaxane
 Regyl
 Rein- Endocrisines
 Fournier
 Remède Boss
- 12, r. Pavée, Paris.
 25, r. Vaneau, Paris.
 41, r. de Rome, Paris.
 17, r. d'Hauteville, Paris.
 1 bis, r. Molitor, Paris.
 HEUDEBERT, 85, r. St-Ger-
 main, à Nanterre.
 JOOSS, Montreuil (Seine).
 16, r. de la Tour, Paris.
 24, r. Monttessuy, Paris.
 40, r. Bellechasse, Paris.
 4, r. St-Anastase, Paris.
 P. FONTANIER, Moulins-sur-
 Yèvre (Cher).
 17, r. d'Hauteville, Paris.
 9, r. Victor-Letalle, Paris.
 21, fg. Montmartre, Paris.
 15, pl. Godefroy-de-Bouillon,
 Boulogne-sur-Mer.
 8, r. Lacépède, Le Havre.
 CHARTIER, Saumur (M.-et-L.)
 à Levallois-Perret, 44, r. Chaptal.
 LACOR, 81, r. de la Roquette,
 Paris.
 BLOCH à Tomblaine (M.-et-M.).
 CRAISSON, 19, r. J.-J. Rous-
 seau, Paris.
 4, imp. de Béarn, Paris.
 GUILLAUME, Issoudun.
 98, r. de Sèvres, Paris.
 41, r. de Rome, Paris.
 32, r. de l'Ouest, Paris.
 19, r. Drouot, Paris.
 22, r. de la Sorbonne, Paris.
 37, r. de Bourgogne, Paris.
 M. SOULAS, Surgères (Ch.-I.).
 Lab. du D^r-Plantier, à Anno-
 nay (Ardèche).
 MILLET, à Rambouillet.
 M. SOULAS, Surgères (Ch.-I.).
 CARLIER, à St-Florentin
 (Yonne)
 42, r. Grandes-Arcades, Stras-
 bourg.
 4, r. d'Illzach, Mulhouse.
 20, r. du Conseil, Bruxelles.
 40, av. Secrétan, Paris.
 Ph^{ie} LAUMONIER, 223, r. St-
 Martin, Paris.
 8, r. Richer, Paris.
 7, r. Biscornet, Paris.
 est
 PRAX, à Br (Finistère).

- *Renaleptine
 Renalgin
 Renetol
 *Renion Vincardi
 Renocardine
 Renotanic Grémy
 *Renovol
 Renovules
 *Réparateur Thuau
 *Résocaïne
 *Résyl
 *Réthragine
 Retropituine Carrion
 Retusol
 Revitalose
 Révulsif
 *Révulsif Boudin
 Révulsif liquide SR
 *Révulsif Milko
 *Révulsif Procipha
 Révulsior
 Révulsoplasme
 *Rhagadine Bracque-
 mond
 Rhamnine Henry
 *Rhéantine Lumière
 Rhéothymine
 *Rhésal-Vicario
 *Rhinacridyl Lersam
 *Rhinadrargol
 Rhinadrol
 Rhinaldose
 Rhinalginol
 *Rhinaquintine
 Rhinaseptogène
 *Rhinaspir
 Rhine
 Rhinodol
 *Rhinodrops
 *Rhinofluine
 Rhino geramol
 *Rhinogénol
 *Rhino Glottyl
 *Rhinol
 SPÉCIA, 21, r. Jean-Goujon,
 Paris.
 LONGUET, 34, r. Sedaine,
 Paris.
 DUVAL, à Falaise.
 14, av. Georges-Clemenceau,
 Nice.
 57, r. Origet, Tours.
 14, r. de Clichy, Paris.
 22, r. de Paris, Houilles.
 id.
 22, fg. St-Michel, Angers.
 BRESSIER, 102, r. Vincent,
 Marseille.
 109-113, bd de la Part-Dieu,
 Lyon.
 22, r. de la Sorbonne, Paris.
 54, fg. Saint-Honoré, Paris.
 119 bis, av. Ch.-de-Fer, Rueil
 (Seine-et-Oise).
 D^r FRAYSSE, 21, r. de Neuilly,
 Nanterre.
 4, r. d'Illzach, Mulhouse.
 9, av. Jean-Jaurès, Joinville-
 le-Pont (Seine).
 4, r. Levert, Paris.
 60, cours Emile-Zola, Lyon.
 4, r. d'Illzach, Mulhouse.
 PAULIN & BARRE, Tours.
 4, r. Levert, Paris..
 71, av. de Villiers, Paris.
 39, r. de Sclessin, Liège.
 45, r. Villon, Lyon.
 7, r. Guillaume-Budé, Mont-
 geron.
 17, bd Haussmann, Paris.
 92, bd Murat, Paris.
 56, Gde-Rue, Harnes (P.-de-C.).
 A. FALVY, 40, r. des Acacias,
 Paris.
 4, imp. de Béarn, Paris.
 LONGUET, 34, r. Sedaine, Paris.
 58, r. de Vouillé, Paris
 PATRICE, à Vichy.
 21, r. Feydeau, Paris.
 FLEURY, Dresles (Oise).
 50, r. de la République. Puteaux.
 194, r. de Rivoli, Paris.
 5, r. François-Ponsard, Paris.
 ADLER, 36, r. des Francs-
 Bourgeois.
 4, villa Ornano, Paris.
 DENIS, 85 bis, r. du Ranelagh,
 Paris (XVI^e).
 80, fg St-Denis, Paris

- Rhino-Lactéol** du Dr 130, r. Singer, Paris.
Boucard
Rhinolan 24, r. Jardel, Bordeaux.
Rhinolin 82, av. Malakoff, Paris.
***Rhino-Liposeptine** 2, pl. des Vosges, Paris
***Rhinopharynxoil** Lab. de Pharmacologie générale,
 8, r. Vivienne, Paris.
Rhinophédrine 82-84, r. de Belleville Paris.
Rhino-Pro 4, cité Magenta, Paris.
Rhinora 82-84, r. de Belleville, Paris.
Rhino-Salas 132, r. de Turenne, Paris.
***Rhino Salva** Lab. Central de France, 10 r.
 de Belfort, Rennes.
Rhino-Socoll 132, r. de Turenne, Paris.
Rhino Spécifique Favrot 6, r. Dombasle, Paris.
Rhinostagone 20 bis, r. Sergent-Godefroy,
 Montreuil-sous-Bois.
Rhinotherme Bagnères-de-Bigorre (Htes-Pyr.).
Rhino-Vaccin Salan- 42, r. Grandes-Arcades, Stras-
tale bourg.
***Rhino-Vaclydun** 27, r. Desrenaudes, Paris.
***Rhizotanin** 56, bd, Ornano, Paris.
***Rhocya** 5, r. Claude-Decaen, Paris.
***Rhodarsan** SPÉCIA, 21, r. Jean-Goujon,
 Paris.
***Rhodazil** id.
Rhodocaïne 18, av. Hoche, Paris.
***Rhoféine** SPÉCIA, 21, r. Jean-Goujon,
 Paris.
***Rhomnol Leprince** 62, r. de la Tour, Paris.
Rhubarbe comp. de 8, r. Vivienne, Paris.
Baudry
Rhumatoidine 39, r. de la Gare, Bondy (Seine).
Ricifruit S. G. I. P., 73, r. Gal-Sarrail, Le
 Havre.
Ricigel ROBERTS & C^{ie}, 5, r. de la
 Paix, Paris.
***Ricilax** 60, rte de Châtillon, Paris.
Ricinopalmine 5, bd. des Brotteaux, Lyon.
Ricinpoudre 15, r. de Naples, Paris.
Ricomalt 156, r. des Fauvelles. Courbevoie.
Rinoleina Lab. SASSE, 78, bd Beaumar-
 chais, Paris.
***Riodine Astier** 41 à 47, r. du Docteur-Blanche,
 Paris.
***Rob Cabanès** 17, r. Cadet, Paris.
Rob Dussang Lab. LESCAROUX, Château-
 roux.
Rob Gory JOOSS, Montreuil (Seine).
***Rob Oberlin** TIMARDON, 17, r. Cadet, Paris.
***Rogerma** MAHIEU, Lens (Pas-de-Calais).
Roléine 49, r. de Bitche, Courbevoie.
***Romarantyl** 61, av. Philippe-Auguste, Paris
 (XI^e).
***Romarène** BEAUFOUR, 18, pl. Dogue-
 reau, Dreux (E.-et-L.).
Romarol 81, av. Malakoff, Paris.

Rongicor
***Rosalyl**
Rosanol
***Rosaseptor**
Royérine Dupuy
***Rozoderme**
***Ruby**
***Rutonal**
Rylal Noyon
***Rythmos Leisyn**
***Rythmosystol**

DUC, 24, av. Mac-Mahon, Paris.
DROUET & PLET, Rueil-Mal-
 maison (S.-et-O.)
L. HINGLAIS, à Epernay.
 21, r. Feydeau, Paris.
 223, r. St-Martin, Paris.
 11, r. des Deux-Ponts, Paris
SPECIA, 21, r. Jean-Goujon.
 Paris.
SPECIA, 21, r. Jean-Goujon,
 Paris.
 24, r. Paul-Bert, Paris.
 1 bis, rue Molitor, Paris.
COMTE, 60, 62, r. St-Guilhem,
 Montpellier.

S

Sacérase
***Saint-Aré**
***Salantale**
Salasenyl
Salbiase
Salbine du Dr Fayès
***Salénal Ciba**
***Salène Ciba**
Salicaïne
Salicaire Dausse
Salicaire Henry
Salicairine
Salicéral Clin
Salicol Dusaule
Salicydol
***Salicylate de soude**
Clin
Salicylate Le Perdriel
Saliodé
***Salsanos**
***Sal-Sodyl**
Salt Pepton
***Salubrine Phénix**
Salurol
Salvacid
Salvandra
Salvanos

20, r. du Pré-St-Gervais, Paris.
 Sté des Eaux minérales de
 Decize (Nièvre).
 42, Gdes-Arcades, Strasbourg.
 132, r. de Turenne, Paris.
 La Baule-sur-Mer (Loire-Inf.).
 3, r. du 4-Septembre, Paris.
 109-113, bd de la Part-Dieu,
 Lyon.
 id.
 168, b. Saint-Germain, Paris.
 4, r. Aubriot, Paris (IV^e).
 39, r. de Sclessin, Liège.
 3, r. de Sévigné, Paris.
 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
 6, r. Abel, Paris.
 69, r. de la Colonie, Paris.
 20, r. des Fossés-St-Jacques,
 Paris.
 11, r. Milton, Paris.
GABAIL, 5, r. Lefebvre, Paris.
 5, r. de la Paix, Paris.
 16, r. H.-Regnault, Courbevoie.
 9, av. J.-Jaurès, Lyon
 22, bd Circulaire d'Epinau,
 Gennevilliers (Seine).
 56, ch. de Combe-Blanche, Lyon.
MIALHE, 8, r. Favart, Paris.
 71, fg St-Honoré, Paris (VIII^e).
 2, r. Marché-des-Blancs-Man-
 teaux, Paris.

- Salva-Serum**
- *Salvatyl**
- *Salvé**
- *Salvebyl**
- *Salvenase Legoux**
- Salvocaf**
- Salvoxyl**
- *Salychlore**
- Salyfrène**
- *Salyptol Narty**
- *Salsérum**
- *Sambul**
- *Sanaféine**
- Sanalginge**
- Sanalia**
- *Sanas**
- Sanatogène Bauer**
- *Sandoptal Sandoz**
- *Sanedrine**
- *Sanex Inhalant**
- Sanguifer Bouret**
- *Sanguil**
- Sanguine irradiée**
- Sangule Dubat**
- Sanka**
- *Sanluol**
- *Sanocrysine**
- Sanocure**
- *Sanoformine**
- Sanogène**
- *Sanogyl**
- Sanomint**
- *Sanoquinol**
- *Sanoram**
- Sanos**
- Santal Bretonneau**
- Santal Clin**
- ! Santalex**
- *Santal Midy**
- *Santal Monal**
- Santal Oberlin**
- OPTIMA, 78, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.**
- 42, r. Emile-Deschanel, Courbevoie.**
- 45, fg St-Denis, Paris.**
- 45, r. du Fg-St-Denis, Paris.**
- 6, r. Louis-Blanc, La Garenne-Colombes (Seine).**
- Villeneuve-les-Avignon (Gard).**
- 237, r. Lafayette, Paris.**
- 46, r. de Rome, Marseille**
- 210, av. de Toulon, Marseille.**
- 134, bd Pereire, Paris.**
- 37, r. de Marly, Rueil-Malmaison.**
- à Evreux (Eure).**
- FOURNIER, 7, r. Biscornet, Paris.**
- Lab. SANAL, St-Louis (Haut-Rhin).**
- 35, r. des Francs-Bourgeois, Paris.**
- 72, r. du Commerce, Paris.**
- 49, r. Paradis, Paris.**
- 20, r. Vernier, Paris.**
- SPÉCIA, 21, r. Jean-Goujon, Paris.**
- BOISSY, 15, r. de Belgrand, Paris (XX^e).**
- 87, r. Lafayette, Paris.**
- 12, r. Saint-Gilles, Paris.**
- RIETHE, 40, r. des Abbesses, Paris.**
- 80, fg. Saint-Denis, Paris.**
- 54, quai de Boulogne, Boulogne-sur-Seine.**
- SPÉCIA, 21, r. Jean-Goujon, Paris.**
- 39, r. Fondaudège, Bordeaux.**
- REBOUL, Pont-Ste-Maxence.**
- 1, pl. Victor-Hugo, Paris.**
- REBOUL, Pont-Ste-Maxence.**
- 5, r. Paul-Barruel, Paris.**
- GROS, 13, pl. Delille, Clermont-Ferrand (P.-de-D.).**
- CIBA, 113, bd de la Part-Dieu, Lyon.**
- 5, r. Paul-Barruel, Paris.**
- G. MIQUEL, 3, av. Lowendal, Paris.**
- 6, r. Saint-Claude, Paris.**
- 20, r. des Fossés-St-Jacques, Paris.**
- 14, r. Demarquay, Paris.**
- 8, r. Vivienne, Paris.**
- 6, r. Bridaine, Paris.**
- 17, r. Cadet, Paris.**

- Santal P. Petit**
Santal Salolé
Santal Salolé Cabanès
Santaline Daupez
Santalol Montagu
Santéine Montagu
***Santhéose**
Santogénol Caubin
Santol Dolmay

Santomalt

Santuroil
Sapobarbe

Sapocade
Sapocrème
***Sapolan**
Sapolsine
Sapopâte

Sapogynol
Sarco-sérum
Sarcoglobine

Sarcolactine
***Sarcoptol**

Sargéthyle

Sarkol
Satine
Saturalgine
Saturaline
Saturol

***Saubarsinol**
***Saucholine**
Sauge Gmet
Savon dentifrice Vigier

Savon de Sapolan

Savon Iodé Oberlin
Savons Denisol Brisson
Savons ichthyol, sou-
fre, etc.
Savons Michon
***Savons Mollard**

Savon Perusol
Scatagar
Scialine

Sciaticure
***Scillarène**
Scillase
- 12, bd Saint-Martin, Paris.
 37, r. Pajol, Paris.
 17, r. Cadet, Paris.
 37, r. des Lois, Toulouse.
 49, bd Port-Royal, Paris.
 49, bd. Port-Royal, Paris.
 4, r. du Roi-de-Sicile, Paris.
 62, r. Erlanger, Paris.
 71, av. de la République, Cham-
 pigny (Seine)
 U. C. E. P., 5, r. Labroque, Stras-
 bourg.
 21, r. des Roses, Dijon.
 CAVAILLES, 29, r. Singer
 Paris.
 id.
 id.
 id.
 18, r. Daguerre, Paris.
 CAVAILLES, 29, r. Singer,
 Paris.
 74, r. Blanche, Paris
 107, r. des Dames, Paris.
 DUCLOY et Cie, Arques (P-
 de-C.).
 28, bd de la Cluse, Genève.
 177, r. de Courcelles, Paris
 (XVII^e)
 56, av. Ed.-Vaillant, Boulogne-
 Billancourt.
 à Dammarie-les-Lys (S.-et-M.).
 11, r. Joseph-Bara, Paris.
 3, bd Beaumarchais, Paris.
 80, r. du Fg-St-Denis, Paris.
 Laborat. DURET & RÉMY,
 Asnières
 SAUBA, Montreuil (Seine)
 Lab. SAUBA, Montreuil, Paris.
 27, fg. Montmartre, Paris.
 12, boulevard Bonne-Nouvelle,
 Paris.
 CAVAILLES, 29, r. Singer,
 Paris.
 17, r. Cadet, Paris.
 157, r. Championnet, Paris.
 VIGIER, 12, bd Bonne-Nou-
 velle, Paris.
 49, bd Port-Royal, Paris.
 2, r. du Marché-des-Blancs-
 Manteaux, Paris.
 114, r. du Temple, Paris.
 46, r. de Rome, Marseille.
 P. C. B., 12, r. du Téléphone,
 Bruxelles.
 121, av. St-Ouen, Paris.
 SANDOZ, 20, r. Vernier, Paris.
 85, r. des Morillons, Paris (XV^e).

Scillitrine*Scléramine Dausse****Sclérobyl****Sclérolitique****Sclérolysine*****Sclérosérol*****Scléroserum****Scléroveine Hardy****Scorogènes*****Scurocaine****Scuroforme*****Sécacornine Roche****Seccase*****Sédacrine****Sédarsan Optima*****Sédarthryl****Sédasia****Sédasix****Sédasthmine****Sédatif Py****Sédatine Christiaens****Sédaton Leo*****Sédatose Gigon****Sédatuline*****Sédergine****Sédibaïne*****Sedlitz Ch. Chanteaud****Sedobore*****Sédobrol Roche****Sédocardine****Sédoderme****Sédoflorine*****Sédofolline****Sédoformine*****Sédogastrine****Sedo-gaz****Sédogène Sallé*****Sédol Buisson****Sédomens*****Sédoneurol*****Sédopavérine****Sédopelvien****Sédophoryl****Sédoplasme****Sédopulmine****Sédorgine****PERRIER, 17 bis, bd Rochechouart, Paris.****4, r. Aubriot, Paris (IV^e).****65, av. Victor-Hugo, Paris.****10, r. Vignon, Paris.****31, r. des Francs-Bourgeois, Paris.****40, r. Claire-Paulhac, Toulouse.****18, av. Daumesnil, Paris.****200, r. de Tolbiac, Paris.****COMAR, 20, r. des Fossés-Saint-Jacques, Paris.****SPÉCIA, 21, r. Jean-Goujon, Paris.****id.****10, r. Crillon, Paris.****DUBAT, 80, fg St-Denis, Paris.****SOULAS, Surgères (Ch.-Inf.).****OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.****22, r. de Nemours, Paris.****DOUETTEAU, 20, r. Fg-St-Honoré, Paris.****20, r. du Fg.-St-Honoré Paris.****3, bd Beaumarchais, Paris.****58, bd Richard-Wallace, Puteaux.****1, r. du Ch.-de-Mars, à Reims.****21, sq. Marie-Louise, Bruxelles.****25, bd Beaumarchais, Paris (IV^e).****46, r. de la Barrière, Elbeuf.****St-Just-en-Chaussée (Oise).****79, r. de la Roquette, Paris.****3 et 5, r. Alex.-Dumas, St-Ouen (Seine).****80, r. du Rocher, Paris.****10, r. Crillon, Paris.****Lab. BARRE, 7, pl. Pereire, Paris.****FERRAND, Clichy (Seine).****24, bd Sébastopol.****42, r. du Mont-Cenis, Paris.****12, r. Pavée, Paris.****ZIZINE, 24, r. de Fécamp, Paris.****BOUDIER, 37, r. de Bourgogne, Paris.****14, r. des Pyramides, Paris.****98, r. de Sèvres, Paris.****21, r. Alsace-Lorraine, Lyon.****66, r. Nationale, Lille.****122, Fg St-Honoré, Paris.****196, r. de Paris, Montreuil-sous-Bois.****20 bis, r. Sergent-Godefroy, Montreuil-sous-Bois.****276, r. Lecourbe, Paris.****6, r. Robert-Estienne, Paris.****33, Gde-Rue, Besançon.**

Sédorhinol**Sedormid Roche*****Sédosalyl*****Sédosine****Sédospasmine****Sédotensyl*****Sédotyol****Sédo Viette*****Seignet' fruits****Seklé****Sektal Grémy*****Selamon****Sels Clarks****Sel D.*****Sel de Hunt*****Sel d'Ewald*****Sel digestif Bé Me Cé****Sel de fruit Crolas*****Séléniol*****Sel hépatique U. N.****Arquevaux****Sel Impérial Borotar-
trine****Sel Jolivet*****Sels Intar****Sels du Jura*****Sels de lithine effe-
vescents*****Sels Mags****Sel Marva****Sels Montecatini****Sels Na 4****Sel de Salins-Moutiers*****Selor****Selvan****Sel Vichy-Etat****Selnos-Vichy****Sels radioactifs Ra-
diana*****Selunic****Sel Zem*****Sénécol****Sénophile*****Séotral Leisyn*****Séphydine*****Septicémine Cortial****Septocarbine*****Septolan****REGAGNON**, 276, r. Lecourbe,
Paris.

10, r. Crillon, Paris.

32, r. de l'Ouest, Paris.

38, b. Bourdon, Neuilly-s-Seine.

DEMASLES, Vienne (Isère).

6, r. Robert-Estienne, Paris.

DEBAT, 60, r. de Monceau,
Paris.

163, r. de Flandre, Paris.

rte du Moulleau, Arcachon
(Gironde).

51, r. Rennequin, Paris.

34, r. Sedaine, Paris.

10, r. Vignon, Paris.

16 bis, r. Vivienne, Paris.

DUPUY, à Montluçon (Allier).

16, r. Boulainvilliers, Paris.

BRACQUEMOND, 105, r. de
Normandie, Courbevoie.

21, r. Violet, Paris.

56, ch. de Combe-Blanche, Lyon.

18, av. Hoche, Paris.

à Etampes (Seine-et-Oise).

22, r. de l'Arcade, Paris.

140. fg. Saint-Honoré, Paris.

FAURE, 83, bd de la Villette,
Paris.

11, av. de l'Opéra, Paris.

11, r. Milton, Paris.

88, r. Duhesme, Paris.

14, r. Demarquay, Paris.

25, r. Dagorno, Paris.

LEURQUIN, 50-52, r. Pierre-
Legrand, Lille

46, r. Pierre-Charron, Paris.

3, r. de Vouillé, Paris.

COUTURIEUX, 18, av. Hoche.
Paris.

24, bd des Capucines, Paris.

COUBAND, 27, r. Drouot, Paris,

20, pl. de la Nation, Paris.

G. MIQUEL, 3, av. Lowendal,
Paris.

85, r. Turbigo, Paris.

23, r. Beautreillis, Paris.

17, r. de Berri, Paris.

1 bis, r. Molitor, Paris.

Chabeuil (Drôme).

7, r. de l'Armorique, Paris.

4, r. Major, Pamiers.

LAFFORT, Joué - les - Tours
(Indre-et-Loire).

- Septometrol**
Septylase
- Séquardine Bouty**
- * **Sérélbé**
Sérénol
- * **Serifer Laurençon**
- Seringue (spéciale pour insuline)**
- Séripol**
Sérobél
- * **Sérobisol**
Séro-Citral
Séro-Collosol
Séro-comprimés
- * **Serodausse antitoxi-senyl**
Séroferrine
- * **Sérogyné**
Séroléine
- * **Seroma Rey**
Sérosan
- Séro-Sérum Rivier**
Serosine Boullé
- * **Sérossthényl Bouty**
Serpoline
- * **Sérum antiasthmaticque de Heckel**
Sérum antiphymique Vadam
Sérum antityphoïdique de Rodet
- * **Sérum de Jousset**
- Sérum Collyre**
Sérums de l'Institut Mérieux
Sérum maternel
- * **Sérum neuropsychique**
* **Sérum Nevrosthénique Fraisse**
Sérum Nevrotone
- Sérum Normet**
Sérum Oliviero
- * **Sérums Clin**
- * **Sérums Pasteur**
- 132, av. Victor-Hugo, Paris.
BRISSON & C^{ie}, 157, r. Champignonnet, Paris.
 3, r. de Dunkerque, Paris.
L. B. L., 18, r. Daguerre, Paris.
 46, av. des Ternes, Paris.
 Villefranche-sur-Saône (Rhône).
 149, r. du Palais-Gallien, Bordeaux.
 21, r. de Neuilly, Nanterre.
LBL, 18, r. Daguerre, Paris.
 191, fg St-Antoine, Paris.
 37, r. de Bourgogne, Paris.
 116, bd Haussmann, Paris.
 Produits Biologiques I. M., 28, r. de la Quarantaine, Lyon.
 4, r. Aubriot, Paris.
- 52, r. La Bruyère, Paris.
LBL, 18, r. Daguerre, Paris.
C. BARON, aux Sables-d'Olonne (Vendée).
 12, r. Montmartre, Dijon.
TORAUDE, 22, r. de la Sorbonne, Paris.
 26-28, r. St-Claude, Paris.
 12, av. de la Grande-Armée, Paris.
 3, r. de Dunkerque, Paris.
OPTIMA, 78, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
CORBIERE, 27, r. Desre-naudes, Paris.
 (Voir : *Antiphymique*).
 Lab. **AGUETTANT**, 36, q. Fulchiron, Lyon.
BRUNEAU, 17, r. de Berri, Paris.
 26, av. de l'Observatoire, Paris.
 17, r. Bourgelat, Lyon.
OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
 191, Fg-St-Antoine, Paris.
 8, r. Jasmin, Paris.
P. C. B., 12, r. du Téléphone, Bruxelles.
 10, r. Vignon, Paris.
 62, bd J.-Jaurès, Boulogne-sur-Seine.
 20, r. des Fossés-St-Jacques, Paris.
Institut PASTEUR, 22, r. Dutot, Paris.

- Sérum polymicrobien** ADLER, 36, r. des Francs-Bourgeois, Paris.
- Sérum sthénique** OPTIMA, 78, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
- *Sérum végétal** D^r CUGUIILLERE, 19, r. 'es Chalets, à Toulouse.
- *Séti** BRISSON, 157, r. Championnet, Paris.
- *Setirtem** 8, r. Passy, Paris.
- *Sféol** 15, r. Catulienne, St-Denis (Seine).
- S. I. A. V.** 8, av. des Sources, Nice.
- Siccogyne** J. MIDY, 41, r. de Courbevoie, La Garenne (Seine).
- Siccol** 5 r Robert-Planquette, Paris.
- Sicopion** 31, r. Saint-Georges, Paris.
- Sidéranyl** 23, r. de Douai, Lille.
- Sidérarsan** Lab. HALLEANA, 4, imp. de Béarn, Paris.
- Siforcia** 163, r. de Flandre, Paris.
- Sigma-Cones** 17, r. Cadet, Paris.
- Sigma-Sérum** 132, r. de Turenne, Paris.
- Sigmoïdine Grémy** 14, r. de Clichy, Paris.
- Sigmotal** 5, r. de Stockholm, Paris.
- Sigol** à Saint-Fons (Rhône).
- *Silguine** 2, r. Bouicaut, Paris.
- Silicate de soude Pel-** 33, av. de Villiers, Paris.
- lissier**
- *Silicyl** 18, r. Ernest-Rousselle, Paris.
- *Silisode** MICHELS, 9, r. Castex, Paris.
- *Sinahin** 15, r. d'Argenteuil, Paris.
- Sinapisme Rigollot** 13, r. Pavée, Paris.
- *Sinaplasme du D^r** FAURE & DUSSUEL, à Aix
- Faure** les-Bains.
- *Sinapol** Lab. DEODAX, R. Renaud, Arnould (Vosges).
- *Sinaqua Nutricia** 142, r. Fransmann, Bruxelles.
- *Sinaseptic** 197, av. de Versailles, Paris.
- Sinrénaline** 66, r. Nationale, Lille.
- *Sinusyl** CHATEAU, 137, av. Parmen-
- Sirodion** tier, Paris.
- Sirop d'Aconit Ecalle** 228, r. de Paris, Montreuil-
- Sirop Alba** sous-Bois.
- Sirop antiasthmatique** 98, r. de Sèvres, Paris.
- Favrot** 61, r. de Seine, Paris.
- Sirop antiphlogistique** BLOTTIERE, 6, r. Dombasle,
- de Briant** Paris.
- Sirop d'Aubergier** 64, r. La Rochefoucauld, Paris.
- Sirop Avet** COMAR, 20, r. des Fossés-
- Sirop Axaria** Saint-Jacques, Paris.
- Sirop Bala** DUC, 24, av. Mac-Mahon, Paris.
- Sirop béchique Maire** AXAREL, 15, r. Catulienne,
- St-Denis.
- BRICHARD, Bar-le-Duc (Meuse)
- 171, r. de Belleville, Paris.

- Sirop Belca**
Sirop Berthé
Sirop Blagny
Sirop de Blancard
Sirop Blottière
Sirop Bolla
***Sirop Brahma**

Sirop Briant
Sirop Britannia
Sirop de Broméine

Sirop bromoformique
Henry
Sirop Bronchophilos
Sirop Brumauld
Sirop Buci

Sirop Bural
Sirop carbolique du
D^r Vialle
Sirop du D^r Canac
Sirop Carpeau

***Sirop Cassibor**
Sirop composé aux Hypophosphites
Fellows
***Sirop de Créosote Vacheron**
Sirop Debar

Sirop de Dentition Al-
deni
Sirop Delabarre
Sirop de Raifort iodé
de Grimault
Sirop Derbecq
Sirop de digitale

Sirop Deroux
Sirop Diver
Sirop Dubois au créosol
(Voir : Créosol).
Sirop du D^r Dubreuil
Sirop Ducode

Sirop de Dusart
Sirop D^r Dusourd
Sirop Escolle

***Sirop Famel**
Sirop ferrug. Laroze
Sirop Flamand
Sirop C. Frany
Sirop Gabi
- THÉVENOT, r. des Roses,**
Dijon.
8, fg Saint-Denis, Paris.
PAMÉLA, Forges-les-Eaux.
64, r. La Rochefoucauld, Paris.
6, r. Dombasle, Paris.
34, r. Thiers, Gray (Hte-Saône).
COULOUX, 116, r. du Pont,
Auxerre (Yonne).
131, r. Vaugirard, Paris.
Labor. BERTHIER, Grenoble.
MONTAGU, 49, bd Port-Royal,
Paris.
39, r. de Sclessin, Liège (Bel-
gique).
6, r. Berbizey, Dijon.
65, cours National, Saintes.
COMAR, 20, r. des Fossés-
Saint-Jacques, Paris.
1, rue Rambuteau, Paris.
87, r. Lafayette, Paris.

1, pl. Davell, Marseille
102, av. Camille-Pelletan, Mar-
seille.
78, fg St-Denis, Paris.
5, r. de la Paix, Paris.

14, r. Victor-Hugo, Lyon.

BRICHARD, Bar-le-Duc
(Meuse).
15, r. Catulienne, St-Denis
(Seine).
78, taub. Saint-Denis, Paris.
8, r. Vivienne, Paris.

12, rue Cadet, Paris.
LABELONYE, 99, r. d'Aboukir,
Paris.
Vic.-sur-Aisne (Oise).
50, r. de la République, Puteaux.
51, r. Nicolo, Paris (XVI^e)

37, r. Galilée, Paris.
P. ROCHE, Aigueperse (P.-
de-Dôme).
VIAL, 8, r. Vivienne, Paris.
8, r. Vivienne, Paris.
LAMAR, pl. Forbin, Aix* (B.-
du-R.).
16 à 22, r. des Orteaux, Paris.
2, r. des Lions, Paris.
6, pl. Clichy, Paris.
52, av. de la République, Paris.
AXAREL, 15, r. Catulienne,
St-Denis.

- *Sirop de Gaïarsol
 Sirop Gécé
 *Sirop Gélinau
 Sirop Gelvart
 Sirop de Gibert
 Sirop Gigon
 *Sirop Girard
 *Sirop de glycér phosphates Vacheron
 *Sirop Gribell
 Sirop Grimault
 Sirop du Dr Hecquet
 Sirop Helgé
 Sirop d'Hémoglobine Byla
 Sirop d'Hémoglobine Grimault
 Sirop d'Hémoglobine Henry
 Sirop d'Hémoglobine Star
 Sirops Henry
 *Sirops Henry Mure
 Sirop d'Hypophosph. de chaux
 Sirop d'Iodéine
 Sirop Iodermol Vigier
 Sirop-Iodo-noyer
 Sirop iodotannique Guillermon
 Sirop Jackson
 Sirop Jane
 Sirop Jolivet
 Sirop Jovin
 Sirop Kérída
 Sirop de Kola Henry
 Sirop Koff
 Sirop Kopé
 Sirop de la Bonne Mère
 Sirop Lagasse
 Sirop de Lamouroux
 Sirop Lanchat
 Sirop Laurin
 Sirop laxatif Gobey
 *Sirop Lecœur
 Sirop Lex
 *Sirop de Lovel
 Sirop Magali
 Sirop du Dr Manceau
 BOUTY, 3, r. de Dunkerque, Paris.
 132, r. de Turenne, Paris.
 MOUSNIER, 9, bd Carnot, Bourg-la-Reine.
 24, r. Bagnole, Paris.
 35, av. de Poissy, Maisons-Laffitte (S.-et-O.)
 25, bd Beaumarchais, Paris.
 48, r. d'Alésia, Paris.
 14, r. Victor-Hugo, Lyon.
 19, r. Drouot, Paris (IX^e).
 VIAL, 8, r. Vivienne, Paris.
 49, bd Port-Royal, Paris.
 Dr LALAUURIE, Cuxac-d'Aude.
 26, av. Observatoire, Paris.
 8, r. Vivienne, Paris.
 39, r. Sclessin, Liège.
 2, r. Marché-des-Blancs-Manteaux, Paris.
 39, r. Sclessin, Liège.
 71, r. Saint-Jacques, Paris.
 8, r. Vivienne, Paris.
 49, bd Port-Royal, Paris.
 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
 OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
 64, r. La Rochefoucauld, Paris.
 Gde rue au Bois, Bruxelles.
 2, r. Marché-des-Blancs-Manteaux, Paris.
 140, fg Saint-Honoré, Paris.
 172, r. d'Alésia, Paris.
 37, r. des Lois, Toulouse.
 39, r. de Sclessin, Liège (Belgique).
 BEDEIL, Lavelanet (Ariège).
 4, r. Alexandre-III, Dunkerque.
 GAVIN, Vimoutiers (Orne).
 8, r. Vivienne, Paris.
 6, r. Dombasle, Paris.
 Lab. COMTOS, à Fesch-le-Châtel (Doubs).
 86, bd Port-Royal, Paris.
 89, r. du Cherche-Midi, Paris.
 GAVIN, Vimoutiers (Orne).
 MARTINET, 16, r. du Petit-Musc, Paris.
 14, r. Victor-Hugo, Lyon.
 43, av. Kleber, Paris.
 à Château-du-Loir (Sarthe).

- *Sirop de la Maternité** 7, r. Galvani, Paris.
Sirop Maver S. G. I. P., 73, r. Gal-Sarrail, Le Havre.
Sirop Mignard 29, bd Sébastopol, Paris.
Sirop de Mimotannin 3, r. Bab-Azoun, Alger.
Iodo-phosphaté
***Sirop minéral sulf.** 44, r. de Lagny, Montreuil.
Crosnier
***Sirop Mireille** Lab. LEGENDRE & C^{ie}, Section DS. Houilles (S.-et-O.).
***Sirop Morlas** 18, r. Favart, Paris (II^e).
Sirop Mory OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
Sirop Myrianis AXAREL, 15, r. Catulienne, St-Denis.
Sirop Névra FAURE, 80, r. du Rocher, Paris.
***Sirop Nogués** 7, r. Galvani, Paris.
Sirop Nourry 20, r. des Fossés-Saint-Jacques, Paris. (Voir : Vin Nourry).
Sirop Patrat 61, r. de Seine, Paris.
Sirop Pectiline 37, r. des Lois, Toulouse.
***Sirop pectoral du Dr** pl. de l'Hôtel-de-Ville, à Salon-de-Provence.
Pyot Moulins-surYèvre (Cher).
Sirop pectoral Laeinnec
Sirop phéniqué Vial 8, r. Vivienne, Paris.
Sirop Polybromuré Laroze 2, r. des Lions, Paris.
Sirop Polyformiaté Pr. Chapelle 8, r. Vivienne, Paris.
Sirop polyiodure Gonnon 14, r. Victor-Hugo, Lyon.
***Sirop Prega** (Voir : Capsules Préga).
Sirop Pulmophile Pl. Forbin, Aix-en-Provence.
Sirop Rabuteau COMAR, 20, r. des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
Sirop Rambaud E. POINSIER, Méru (Oise).
Sirop Rami r. Chaptal, Levallois-Perret.
Sirop Ramos 7, r. Capeyron, Bordeaux.
Sirop Rébellion 6, r. Pas-de-la-Mule, Paris.
Sirop du Dr Reinwillier 64, r. La Rochefoucauld, Paris.
Sirop Rhegia BONNAURE, Alès (Gard).
***Sirop Roche au thiocol** 10, r. Crillon, Paris.
***Sirop Sentini** DOMERGUE, Agen (L.-et-G.).
Sirop de Sirtal 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
Sirop de Sozopectone éphédriné CHAUVIN, Aubenas (Ardèche).
***Sirop Teyssedre** 34, fg d'Angoulême, Limoges.
Sirop Thomas 2, r. Volney, Paris.
***Sirop Tinardon** 17, r. Cadet, Paris.
Sirop tribromuré Gigon 25, bd Beaumarchais, Paris.
***Sirop Vacheron au galacol** 14, r. Victor-Hugo, Lyon.
Sirop Vauthier Marcq 98, r. du Chemin-Vert, Paris.
Sirop vermifuge Rémonia AXAREL, 15, r. Catulienne, St-Denis.

- *Sirop Viano
 Sirop Viette
 Sirop Zemmette
 Sirtal
- *Sistex
 *Sistomensine Ciba
 S. I. V. A.
- Sodamyl
 *Soderséine
 *Sodésyl
 *Sodisalyne
 *Sodogastrol
 *Sodolactine
- Sodorose
- Sodotétrane
 *Sodotniol
- *Soja « Soyolk »
 Solargol
 *Solarsyl
 *Sol-Ei Fraisse
 Solicide
 *Solmuth
 Solubaine Nativelle
 Solucalcine
- *Solucamphre Dela-
 lande
 *Solucamphre spartéi-
 né Delalande
 Soluprotine Roche
 Solurase
 *Soluro
- Soluté Gaube du Gers
 Soluthanol
 Solution de li-phos-
 phate de chaux
 Solutions Clin
 Solution Coirre
 Solution Cunaud
- Solution du Dr Jacobson
- Solution Fumouze
 Solution Henry Mure
 *Solution huileuse au
 Nestosyl
 Solution Laroyenne
 *Solution Normet
 *Solution Pautauberge
 *Solution Quinquina
 Bardet
- 15, r. Catullenne, St-Denis, Seine.
 163, r. de Flandre, Paris.
 85, r. Turbigo, Paris.
 COMAR & C^{ie}, 20, r. des Fossés-
 St-Jacques, Paris.
 18, r. St-Amand, Paris.
 109-113, bd de la Part-Dieu, Lyon.
 Labor. des Immuno-Vaccins,
 av. des Sources, Nice.
 LEGRAS, à Avranches (Manche).
 18, r. de Beaune, Paris.
 Vierzon (Cher).
 PILLET, 5, av. Victoria, Paris.
 229, cours Gambetta, Lyon.
 Lab. GERDA, 163, bd Croix-
 Rousse, Lyon.
 Labor. Hyg. Appliquée, 64, bd
 Voltaire, Paris.
 132, av. Victor-Hugo, Paris.
 Labor. de Médecine Expé-
 rimentale, Beauvais.
 7, av. Marceau, Paris.
 37, r. Godot-de-Mauroy, Paris.
 6, r. des Dames, Paris
 8, r. Jasmin, Paris.
 94, r. Michelet, Alger.
 14, r. Gravel, Levallois (Seine).
 27, r. de la Procession, Paris.
 Dr COIRRE, 5, bd Montpar-
 nasse, Paris
 16, r. Henri-Regnault, Cour-
 bevoie.
 16, r. H. Regnault, Courbevoie.
 10, r. Crillon, Paris.
 71, r. du Fort, Aubervilliers.
 COMAR, 20, r. des Fossés-
 Saint-Jacques, Paris.
 177, r. de Courcelles, Paris (XV^e).
 55, bd de Strasbourg, Paris.
 ARSAC, Montélimar (Drôme).
 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
 5, bd Montparnasse, Paris.
 pl. du Marché, La Rochelle
 (Ch.-Inf.).
 CARRION, 54, fg St-Honoré,
 Paris.
 78, fg Saint-Denis, Paris
 à Annonay (Ardèche).
 72, r. St-Dominique, Paris.
 7, bd Denain, Paris.
 10, r. Vignon, Paris.
 10, r. de Constantinople. Paris.
 76, r. de Sèvres, Paris.

| | | |
|------------------------------|-------------------|---|
| Solution Henry | salicylate | 39, r. Sclessin, Liège (Belgique). |
| Solution Schoum | | 84, av. de St-Mandé, Paris. |
| Solution Valens | | 52, r. Decamps, Paris. |
| Solution V.-E. Doumer | | BOMEL, Annonay (Ardèche). |
| Solution Watelet | | BLANCHOT, 15, av. du Parc-Montsouris, Paris. |
| Solvochine | | 4, r. d'Illzach, Mulhouse. |
| Solvosclérose | | 83, bd de la Villette, Paris. |
| Solvurène | | Place Forbin, Aix-en-Provence. |
| * Solvuric | | 22, bd Circulaire d'Epinay, Gennevilliers (Seine). |
| Somalguine | | 18, av. Daumesnil, Paris. |
| Somnacétine | | MERMINOD, 49, r. de Paradis, Paris. |
| * Somnicones | | 194, r. de Rivoli, Paris. |
| * Somnifène Roche | | 10, r. Crillon, Paris. |
| Somnitis | | LYONS, 30, r. Monge, Paris. |
| Somnoblol | | 50, r. de l'Université, Liège. |
| Somnofan | | TORAUDE, 22, r. de la Sorbonne, Paris. |
| Somnopol | | 80, r. du Rocher, Paris. |
| * Somnothyryl | | Lab. CANTIN, Palaiseau (S.-et-O.). |
| * Sonène | | 2, pl. des Vosges, Paris. |
| * Soneryl | | SPECIA, 21, r. Jean-Goujon, Paris. |
| Sonomalt | | 128, r. du Mont-Cenis, Paris. |
| * Soporatose | | POINTET & GIRARD, 30, r. des Francs-Bourgeois, Paris. |
| * Soporigène Delqué | | 46 r. Pierre-Charron, Paris. |
| Soporine | | BADEL, 58-60, r. des Moulins, Valence. |
| Sornyal | | 22, r. de la Sorbonne, Paris. |
| Sorol Churchill | | 12, r. Castiglione, Paris. |
| Sparablanc | | SAUTER, à Bellegarde (Ain). |
| Sparaplast Fournier | | 18, r. de Jouvence, Dijon. |
| * Spartéine Houdé | | 9, r. Dieu Paris. |
| * Sparto-Camphre | | 20, r. des Fossés-St-Jacques, Paris. |
| * Spartoval | | 20 r. des Fossés-St-Jacques, Paris. |
| Spasalgique | | DUTEIL, 90, av. de St-Ouen, Paris. |
| * Spasmacol | | Alexandre, 41, r. de Rome, Paris. |
| Spasma Couturieux | | 18, av. Hoche, Paris. |
| * Spasmalgine Roche | | 10, r. Crillon, Paris. |
| * Spasmalone | | Ancenis (Loire inférieure). |
| * Spasmine Jolly | | 1, r. Christine, Paris. |
| Spasmolyse | | 24, av. de Châtillon, Paris. |
| * Spasmonéural | | 239, cours de l'Yser, Bordeaux. |
| Spasmopurine | | MERMINOD, 49, r. de Paradis, Paris. |
| * Spasmoryl | | 18, av. Daumesnil, Paris. |
| * Spasmosedine | | 15, bd Pasteur, Paris. |
| * Spasneurol | | 64, bd Barbès, Paris. |
| Spécific Brachat | | Lab. chimico-pharmac., à Livry-Gargan (S.-et-O.). |

Spécifique Bejean*Spécifique Broca****Spécifique Lancelot****Spécifique Rousset****Spécifique Thorat*****Spectrol****Sphérulines - Moncour***(Voir Opothérapie)***Sphinkterol****Sphygmine*****Spicanol****Spiralgine****Spirillan****Spirobismol*****Spirochtan*****Spirogyl*****Splénarmone*****Splénique (Extrait du
Dr Bayle)****Splénocarbène****Splénocrinol*****Splénocrisine****Splénodose****Spléno-Magnésium*****Splénomanganol****Splenora****Splénose****Splenotanic*****Splényl*****Spyrolides*****Stal-Kosal****Stabyne*****Stalysine*****Stanion*****Stanno-Bardane Henry****Stannolip Henry*****Stannoxyol****Staphydex*****Staphylagone*****Staphylase du Dr
Doyen*****Staphylocide Audras*****Staphylo-coccine Fra-
quet****Staphyloplast**30, r. des Francs-Bourgeois,
Paris.COUDERT, 116, av. Ledru-
Rollin, Paris

100 ter, av. St-Mandé, Paris.

9, pl. de la Croix-Rousse, Lyon.

Le Mont-Dore (Puy-de-Dôme).

71, av. Victor-Emmanuel-III,
Paris.49, av. Victor-Hugo, Boulogne-
s.-Seine.MERMINOD, 49, r. de Paradis,
Paris.

109, r. de Sèvres, Paris.

54, r. de Sablonville, Neuilly-
sur-Seine.

Lab. SERVIER, Orléans.

23, r. de Berne, Paris.

4, r. d'Ilzsch, Mulhouse.

22, r. de la Sorbonne, Paris.

5, r. Paul-Barruel, Paris.

BYLA, 26, av. de l'Observatoire,
Paris.

8 et 10, r. Alp. Bertillon, Paris.

88, r. Duhesme, Paris.

Lav. ISCOVESCO, 107, r. des
Dames, Paris

7, r. Biscornet, Paris.

47, r. de Neuilly, Nanterre.

FAURE, 80, r. du Rocher, Paris.

191, Fg St-Antoine, Paris.

LÉONARDON, Arcachon (Gi-
ronde).

163, r. de Flandre, Paris.

GREMY, 14, r. Clichy, Paris.

BYLA, 26, av. de l'Observatoire,
Paris.

19, bd Bonne-Nouvelle, Paris.

62, bd Jean-Jaurès, Boulogne-s.-
Seine.

REBOUL, Pt. Ste-Maxence.

41-47, r. Docteur-Blanche, Paris.

18, av. Hoche, Paris.

39, r. Sclessin, Liège.

39, r. Sclessin, Liège.

37, r. de Bourgogne, Paris.

WARIN, 4, chemin de la Muette,
Paris.CARRION, 54, f. St-Honoré,
Paris.LEBEAULT, 5, r. Bourg-l'Abbé,
Paris.

112, r. de Gerland, Lyon.

21, r. Chaptal, Paris.

FOURNIER, Dijon.

- *Staphylotanol
- *Staphylo-Vaclydun
- *Staprolysat
- Staréol Dupraz
- *Stavafer
- Stearol
- Sténergine
- Sténofer Lumière
- Sténogénine
- Sténoi Chanteaud
- Stenon du D^r Gelm
- Sténophyl Vigan
- Sténovarine
- *Stéramine
- Stéridrophil Wuhrlin
- Stérilait
- Stérinase Vincent
- *Stérobi
- Sterocalcium
- *Stérogyl
- *Sthénoléine
- Sténophos
- *Sthenoxal
- Stibial
- *Stillargol
- *Stimyl
- Stock-Vaccin Bovy-
- Cantonnet
- Stomachine
- Stomacol Boulet
- Stomacurine
- Stomagyl
- Stomal
- Stomalex
- *Stomacrol
- Stomasalvine
- Stomaton
- Stomaxines
- *Stoméol Vichy
- Stommol Leisyn
- *Stomobrol
- *Stomophile
- *Stomoxygène
- Stomytéol
- *Stopral
- *Stovaine Billon
- *Stovarsol
- 55. bd. de Strasbourg, Paris.
- 27, r. Desrenaudes, Paris.
- 22, r. de la Sorbonne, Paris.
- 41, r. Etienne-Marcel, Paris.
- 45, fg St-Denis, Paris.
- M, Bonnet, Saint-Etienne.
- 4, pl. des Vosges, Paris.
- 45 r. Villon, Lyon.
- MOUFLET, Chennebrun (Eure).
- 54, r. Franco-Bourgeois, Paris.
- D^r LALAURIE, Cuxac-d'Aude.
- 103, r. Saint-Lazare, Paris.
- 132, r. de Turenne, Paris.
- Lab. Antiseptiques Chlorés,
- 42, r. Thiers, Le Havre.
- à Houdouville (Eure).
- 10, r. Cardinal-Mercier, Paris.
- 14, av. Mac-Mahon, Paris.
- 15, r. Catulienne, St-Denis.
- 132, r. de Turenne, Paris.
- Lab. du D^r ROUSSEL, 89, r. du
- Cherche-Midi, Paris.
- 2, r. Claude-Matrat, Issy-les-
- Moulineaux.
- 74, r. Lourmel, Paris.
- 47, r. Bokanowski, Asnières.
- 21, r. Jean-Goujon, Paris.
- 1, pl. Victor-Hugo, Paris.
- FALQUE, Besançon.
- 10, r. Drouot, Paris.
- OPTIMA, Gde-Rue au Bois,
- Bruxelles.
- 14, r. Eugène-Delacroix, Paris.
- 21, r. de Neuilly, Nanterre.
- 143, c. de la Somme, Bordeaux.
- Lab. PY, 58, bd R.-Wallace,
- à Puteaux (Seine).
- 14, r. Demarquay, Paris.
- ROLLAND, 4, r. Platon, Paris
- (XV^e).
- Moulins-sur-Yèvre (Cher).
- 6, r. Robert-Estienne, Paris.
- id.
- 99, r. de Paris, Massy (S.-et-O.).
- 1 bis, rue Molitor, Paris.
- 4 av. Brazza, Romainville
- (Seine).
- 17 bis, av. Parmentier, Paris.
- 2 bis, r. du Chevalier-de-la-Barre,
- à St-Quentin.
- VIGNAL, Périgueux.
- 41, r. Bokanowski, Asnières.
- SPÉCIA, 21, r. Jean-Goujon,
- Paris.
- id.

- *Stovédrine
- *Stovoléine
- *Streptoderme
- *Strepto-vacydun
- Strictoforme Dausse
- Strontium Parai-Javal
- Strontiurane
- Strophantal
- *Strophantine et Strophantus Catillon
- *Strychnal Longuet
- *Strychnarsitol Robin
- Strychno Cacodyl
- Strychnophyl
- *Strychnot moses
- *Stupho
- Stymogénol
- Succharure Leprince
- Succomusculine
- Suc-Durham
- Suckine
- Sucre Diabetalm
- *Sucre Edulcor Ferré
- Suc Simon
- Sucroquinine
- Sudyl Roberts
- *Sufrolax
- *Sulfa ampoules
- *Sulfan
- Sulfarène
- *Sulfarsenol
- Sulfarsinol Lefèvre
- *Sulfarsiode
- Sulfate d'Atropine Clin
- Sulfate de quinine Léo
- *Sulfex
- *Sulphydral Ch. Chanteaud
- Sulfinhal
- Sulfo-benzol
- Sulfo-bore Roy
- *Sulfobyl
- Sulfocadoi
- Sulfocol
- *Sulfocrème Liless
- Sulfodelbiase
- *Sulfodermol
- LICARDY, 38, bd Bourdon, Neuilly-sur-Seine.
- 26, r. des Moines, Paris (XVII^e).
- 7, av. Marceau, Paris.
- 27, r. Desrenaudes, Paris.
- 4, r. Aubriot, Paris (IV^e).
- 8, r. Vivienne, Paris.
- MERMINOD, 49, r. de Paradis, Paris.
- 62, r. Marengo, St-Étienne.
- 3, bd Saint-Martin, Paris
- 34 r Sedaine, Paris.
- 3 r de Poissy, Paris.
- 21, r. Alsace Lorraine Lyon.
- 74, r. Lourmel, Paris.
- MATHIVAT, 66, r. de la Pompe, Paris (XVI^e).
- 38, r. Mauguy, Bondy (Seine).
- Lab. HY, 61, av. de Choisy, Paris.
- 62, r. de la Tour, Paris.
- 10, r. de l'Orne, Paris.
- 14, r. de Birague, Paris.
- 12, av. Stéphane-Mallarmé, Paris
- 61, r. Vandamme, Paris.
- 19 r. Grégoire-de-Tours, Paris.
- Chalon-sur-Saône.
- 7, r. Guillaume-Budé, Montgeron.
- 5, r. de la Paix, Paris
- 44, r. de Lagny, Montreuil-Paris.
- Sté PYRNE, Cauterets (Htes-Pyr.)
- DALAYEUN, Sannois (S.-et-O.). (Lab. du), à Agen.
- 19-21, r. Van-Loos, Paris.
- 52 r Decamps, Paris.
- MURARD, 4, r. Désirée, Lyon.
- 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
- 11, square Marie-Louise, Bruxelles.
- 42, r. des Grandes Arcades, Strasbourg.
- 3 et 5, r. Alex. Dumas, St-Ouen (Seine).
- 98, r. J. Maillotte, La Madeleine.
- 230, fg Saint-Honoré, Paris.
- 81, bd Suchet, Paris.
- Lafarge, 6, bd Arago, Paris.
- 16, r. Henri-Regnault, Courbevoie.
- M. Godart, Andenne (Belgique).
- FISCH & C^{ie} 4 r d'Ilzsch, Mulhouse.
- 8, r. Vivienne, Paris.
- FLAHAUT, 74, r. Monge, Paris.

- *Sulfoldol Robin**
***Sulfolax**
 Sulfol Charlard
 Sulfoléine Rozet
 Sulfo-Mésarca Roche
 Sulfo-mel du D^r Fayès
 Sulfo-Perless
 Sulforéon
 Sulfo-rhinol Fayès
***Sulfosine Léo**
Sulfostan
***Suno-Iomorine**
 Sulfaxal
***Sulfoxyl**
 Sunoxyne
 Sulfur concentré Dax
***Sulfureux Poulliet**
 Sulfurine du D^r Langlebert
***Sulfurion**
***Sulfuryl Monal**
***Sulf.-Y**
 Sulphaqua Pépin
 Sulphénine Trouette
***Sulphium**
 Sulsol
***Sunalcol**
 Suniforme
***Sunoxol**
 Super-digestif
 Supernucléine Legrand
***Suppargyre du D^r Faucher**
 Supparsol
***Suppoalgos Lagoutte**
 Suppo-Cuivrol
***Suppo-Gynals**
***Suppopirine**
***Suppositoires Almine Louveau**
 Suppositoires Anugeol
***Suppositoires au Nestosyl**
***Suppositoires Chau-mel**
 Suppositoires Colludrol
 13, r. de Poissy, Paris.
 COUSSINET, 20, r. des Martyrs, Paris
 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
 à Vendôme (Loir-et-Cher).
 10, r. Crillon, Paris.
 3, r. du 4-Septembre, Paris.
 26, r. Friant, Paris.
 3, r. des Rouairies, Dinan (C.-du-N.).
 199, r. St-Denis, Paris.
 39, r. Fondaudège, Bordeaux.
 CAVAILLES, 29, r. Singer, Paris.
 39, r. Fondaudège, Bordeaux.
 FANYAU, 48, r. Claude-Lorrain, Lille.
 102, r. Vincent, Marseille.
 43, r. Laillotte, Paris.
 MORELLET à Bagnoles-de-l'Orne.
 62, r. du Cardinal-Lemoine, Paris.
 9, r. de la Perle, Paris.
 18, av. Hoche Paris
 6 r. Bridaine, Paris.
 SALAVERT, Ste-Foy-la-Grande (Gironde).
 116, bd Haussmann, Paris.
 15, r. des Immeubles-Industriels, Paris.
 BRISSON, 157, r. Championnet, Paris.
 56, r. Beaubourg, Paris.
 145, bd Haussmann, Paris.
 11, r. de la Station, Asnières.
 KUHLMANN, 145, bd Haussmann, Paris.
 96, r. Monge, Dijon.
 96, r. Monge, Dijon.
 34, bd de Clichy, Paris.
 37, r. de Bourgogne, Paris.
 85, cours Albert-Thomas, Lyon.
 Matray, Aubières (Puy-de-D.).
 127, bd St-Michel, Paris.
 SECLO, 6, r. Mathilde, Courbevoie (Seine).
 78, bd des Batignolles, Paris.
 BOEGLIN, 26, r. Ste-Claire, Mulhouse.
 72, r. St-Dominique, Paris.
 78, fg Saint-Denis, Paris.
 ANDRÉ, r. des Etuves, Montpellier.

- *Suppositoires à l'Arsénobenzol Corbière** 27, r. Desrenaudes, Paris.
***Suppositoires à l'Esculéol** 16, r. Henri-Regnault, Courbevoie.
Suppositoires Eon 3, r. des Rouairies, Dinan (C.-du-N.).
Suppositoires Gonnon 14, r. Victor-Hugo, Lyon.
***Suppositoires Hymel** DUTEIL, 90, av. de St-Ouen, Paris.
Suppositoires Lama-line AFFRE, St-Mandé (Seine).
***Suppositoires Logeais** 24, r. de Silly, Boulogne-sur-S.
***Suppositoires Midy** 67, av. de Wagram, Paris.
***Suppositoires Pachaut** 130, bd Haussmann, Paris.
***Suppositoires Pepet** 56, bd. Péreire, Paris.
***Suppositoires Pyrax** Lab. Chavialle, 70, Gde-Rue, Sèvres (S.-et-O.).
***Suppositoires Rocav** 116, bd Haussmann, Paris.
Suppositoires Royer 223, r. Saint-Martin, Paris.
***Suppositoires Sféat** 15 r. Catulienne, St-Denis.
Suppo-Vaccin Salantale 42, r. Grandes-Arcades, Strasbourg.
Suprarénidino OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
Suractivase 122, r. du Cherche-Midi, Paris.
Suralimentine Rolland 41, r. d'Amsterdam, Paris.
***Surbical** 42 r. Mont-Cenis, Paris.
Surc Durham 22, bd Circulaire d'Epina, Gennevilliers (Seine).
Surlax 24, bd Sébastopol, Paris.
***Surparine** MATHIVAT, 66, r. de la Pompe, Paris (XVI^e).
***Surrasthénine** BYLA, 26, av. de l'Observatoire, Paris.
Surrénale - Endocrines Fournier 7 r. Biscornet, Paris.
Surrénaline Bouty 3, r. de Dunkerque, Paris.
Surrénotanac Grey 14, r. de Chénay, Paris.
***Suryali** BLOUIN, 50, r. de Turenne, Paris.
***Sylcase** 7, r. Saint-André, Le Mans.
Sylvol 46, r. Pierre-Charron, Paris.
Sylvor 4, q. Pasteur, Sète.
Sympasedal 195 bis, av. de Versailles, Paris (XVI^e).
***Sympathocrine** 14, r. Demarquay, Paris.
Sympathol PERDRIGEON, Vaires (S.-et-M.).
***Sympathoriane** 21, Grande Rue, Montfermeil (S.-et-O.).
***Sympathyl** 26 bis, r. Dombasle, Paris.
Synase 40, r. des Acacias, Paris.
Syncaïne Clin 20, r. des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
***Synchrines Choay** 48, Av. Théophile-Gautier, Paris.
Synergyl Vadam 111 bis, r. de Turenne, Paris.
***Synthaline B** Lab. CRUET, 13, rue Miollis, Paris (XV^e).

Synthol

*Syntropan Roche

*Syphonéol

3 à 9, r. de l'Abreuvoir, Boulogne-sur-Seine.

10, r. Crillon, Paris.

BAUDE, St-Aubert (Nord).

T

Tabedo

Tablettes Boval

Tablettes Enurésan

*Tablettes Hova

Tablettes oxymenthol
Perraudin

*Tablettes Perroud

Tablettes Renard

Tablettes de Phospharsol

Tablettes Stuart

Tablettes de thyroïde

*Tablettes Zeva

*Taburol Monal

Tacia

*Tachygastrine

Tachysmuth

*Taenifuge Bardet

*Taenifuge Castel

Taenifuge des Dames
de France

*Taenifuge du Dr Du-
hourcau

*Taenifuge du Dr Jac-
quème

Taenifuge Ercé

*Taenifuge Kirn

Taenifuge Larix

Taenifuges Limousin

Taffetas Marinier

Talcazone

*Tamar Indien Grillon

*Tamarine

*Tampol Roche

SPÉCIA, 21, r. Jean-Goujon,
Paris.

DEHAY, Arras (P.-de-C.).

KUNTZMANN, à Ribeaupville
(Haut-Rhin).

Lab. Zyma, 4, r. Bellart, Paris.

Lab. SCIENTIA, 21, r. Chap-
tal, Paris.

3, r. Sébastien-Gryphe, Lyon.

GIBAN, à Sens (Yonne).

17, r. Rochechouart, Paris.

DUC, 24, av. Mac-Mahon, Paris.

CATILLON, 3, bd Saint-Martin,
Paris.

60, c. Emile-Zola, Lyon.

6, r. Bridaine, Paris.

15, r. du P^t-Wilson, Gentilly
(Seine).

DU CLO Y et C^{ie}, Arques (Pas-de-
Calais).

DEMARS, 89, av. Wagram,
Paris.

76, r. de Sèvres, Paris.

1, pl. Bouquerie, Nîmes.

119, r. de Sèvres, Paris.

6, r. Louis-Blanc, La Garenne-
Colombes (Seine).

CHIARINI, Aix-en-Provence.

37, r. de Bourgogne, Paris.

62, bd Jean-Jaurès, Boulogne-
sur-Seine.

25, r. Thiers, Tarbes.

10, r. du Bac, Paris.

11, r. Milton, Paris.

Lab. des Antiseptiques chlorés,
42, r. Thiers, Le Havre.

DARRASSE, 13, r. Pavée, Paris.

4, rte de Médoc, Le Bouscat
(Gironde).

10, r. Crillon, Paris.

- Tampons Alsai**
Tampovules Corbière
Tanacétyl Clin
Tanisol

Tannarsol
Tanno-Bismuth
***Tanno-Calceine**

***Tannurgyl**

Tanode

Tanosal

***Tapo**

Tarbisol
Tardospermine

Tartrate Borico-potas-
sique du D^r Gigon
***Tartrate Borico-potas-**
sique Pachaut
Tartrobol
***Taxol**
T. B. X. Métacrysine

***Tébéphaguine**
***Técarine**

***Tégéol**
Teinture de Cocheux
Ténébrvl
***Tensédine**
***Tensol Laurençon**
***Tensoryl-D**
Teperos
Tercinol
Terco
***Tercodal**
Tercolène

Tercyn Chéron
Terebentozone
***Térébhine**

Térébules Gallier
Tergyl Lamo
***Terkal Monal**
Ternose Trouette

***Térozone**

Terpène iodé

Terpine Boveil
- 1, r. Griffon, Lyon.
 27, r. Desrenaudes, Paris.
 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
 MIGNON, 119, r. de Noisy, Les
 Lilas.
 119, r. de Sèvres, Paris.
 REBOUL, Pont-Ste-Maxence.
 62, bd Jean-Jaurès, Boulogne-
 sur-Seine.
 D^r LETANNEUR, 87, av.
 Borriglione, Nice.
 REBOUL, Pont-Sainte-Maxence
 (Olse).
 FEIGEL, à Lutterbach (Haut-
 Rhin).
 Lab. MADYL, 14, r. Miromesnil,
 Pa r
 21, r. Jean-Goujon, Paris.
 MERMINOD, 49, r. de Paradis,
 Paris.
 25, bd Beaumarchais, Paris.
 130, bd Haussmann, Paris.
 71, r. St-Jacques, Paris.
 46, av. des Ternes, Paris.
 S. G. I. P., 73, r. Gal-Sarrail, Le
 Havre.
 23, r. du Caire, Paris.
 SPECIA, 21, r. Jean-Goujon,
 Paris.
 11, r. de Clichy, Paris.
 36, q. Fulchiron, Lyon.
 22, r. du Landv. St-Ouen.
 6, r. Bridaine, Paris.
 Villefranche-sur-Saône (Rhône)
 52, bd du Temple, Paris.
 4, r. d'Illzach, Mulhouse.
 158, r. Saint-Jacques, Paris.
 239, Fg St-Honoré, Paris.
 14, r. Demarquette, Paris.
 22, bd Circulaire d'Epinay,
 Gennevilliers (Seine).
 à Vincennes.
 16, r. de la Tour, Paris.
 PLANCHE, 1, bd de la Made-
 leine, Marseille.
 38, bd Montparnasse, Paris.
 26-28, r. Paul-de-Kock, Paris.
 6, r. Bridaine, Paris.
 15, r. des Immeubles-Industriels,
 Paris.
 62, r. d'Antibes, (Cannes).
 FROSSARD, 86, r. de Varenne,
 Paris.
 9, pl. des Terreaux, Lyon.

- Terpene Cailleux
 Terpene du Mezenc
 Terpene Duval
 *Terpene Gannon
 *Terpene granule Baron
 Terpinets
 Terpinol Adrian
 Terpoflor
 *Terpoxyl interne et
 externe, ovules
 Tersel
 Tersol
 Teskrine
 Testicule - Endocrisi-
 nes Fournier
 Tétralgie Routhier
 Tetra magnesium
 *Tetranitrol Roussel
 Tetrasulfol
 Testogan Vigier
 Thalaphyl
 Thalassan
 Thalassotonine Vadam
 *Thaolaxine
 Thapsia Le Perdriel
 *Thébaïl
 Thé de l'Emyrne
 Thé Evine
 *Thé d'Oranger
 *Théinol Bailly
 *Théïsine Dubat
 Thelygan
 *Themsaline Zyma
 Théobromine Guillaumin
 Théobromine Houdé
 *Théobromine Invar
 Théobromine Rous-
 seau
 Théobromine Vicario
 *Théobromose
 *Théobryl Roche
 *Théocalciodé
 Théosalvine
 *Théosalvose
 *Théovadil
 *Théovérine Laleuf
 *Théoxanthine
 Thermalgol
 Thermo-bloc
 Parmain (S.-et-O.).
 CELLIER, Roanne (Loire).
 62, r. Marengo, St-Étienne
 14, r. Victor-Hugo, Lyon.
 74, r. Monge, Paris.
 8, r. Vivienne, Paris.
 9, r. de la Perle, Paris.
 26, r. Petrelle, Paris.
 JOLLY, 1, r. Christine, Paris.
 34, r. Thiers, Gray (Hte-Saône).
 32, r. Carnot, Beaune (Côte-d'Or).
 89, Grande-Rue, Sens (Yonne).
 7, r. Biscornet, Paris.
 à Vierzon.
 GENEVRIER, 45, r. du Marché,
 Neuilly.
 10, r. Washington, Paris.
 12, bd Bonne-Bouville, Paris.
 MERMINOD, 49, r. de Paradis,
 Paris.
 BOUTTET, à Ruffec (Charente-
 Inférieure).
 49, r. Paradis, Paris.
 111 bis, r. de Turenne, Paris.
 DURET & REMY, à Asnières.
 11, r. Milton, Paris.
 7, r. Galvani, Paris.
 151, r. St-Maur, Paris.
 16, r. Barbette, Paris.
 J. NEGRE, 18, r. L. Blanc,
 Cannes (Alpes-Maritimes).
 15 et 17, r. de Rome, Paris.
 80, fg Saint-Denis, Paris.
 MERMINOD, 49, r. de Paradis,
 Paris.
 9, pl. Félix-Faure, Paris.
 3, r. du Cherche-Midi, Paris.
 9, r. Dieu, Paris.
 7, r. de Jouy, Paris.
 à Ermont (Seine-et-Oise).
 17, bd Haussmann, Paris.
 10, r. du Plâtre, Paris.
 10, r. Crillon, Paris.
 17 bis, bd Rochechouart, Paris.
 13, r. Cherche-Midi, Paris.
 13, r. Cherche-Midi, Paris.
 85, r. des Morillons, Paris (XV^e).
 51, r. Nicolo, Paris (XVI^e).
 15, bd Pasteur, Paris.
 Lab. DEODAX, R. Renaud,
 Arnould (Vosges).
 GAUDICHARD, à Châtelle-
 rault (Vienne).

- *Thermocédone
 Thermoplaste
 Thermo-Vicardine
 Thé Suédois
 Thiesdyne
 *Thigénol Roche
 *Thiocitran
 *Thiocol Roche
 Thiokéine
 *Thionaphte
 Thionhydrol Grémy
 *Thiophyl
 *Thiorine
 *Thiosédal
 Thiosinamine Cognet
 *Thiosote-Lambiotte
 Thiosyl
 *Thio-terpine Dalin
 *Thorix (Thorium X
 Rhemda)
 *Thoroxyl
 Thylargol
 Thyméphédrine
 Thymo-Mentol Eup-
 nique
 Thymus -Endocrisi-
 nes Fournier
 Thymine
 Thymol doré
 Thymoléine
 Thymusine Byla
 Thyratoxine Byla
 *Thyrénine Grémy
 *Thyrocréine Grémy
 Thyrodose
 Thyroguine
 Thyroïde - Endocrisi-
 nes Fournier
 Thyroïde Leo
 Thyroïdine Bouty
 Thyroïdine Byla
 Thyroïdine Couturieux
 Thyroïdine Flourens
 Thyroïdine Gory
 Thyroïdine Henning
 Thyroïdine Meurice
 Thyrol A.
- 11, r. Lepic, Paris.
 COQUELU, Digoïn (S.-et-L.).
 ACHARD, 15, r. du Commerce,
 Riom (P.-d.-D.).
 HERIN, 98, r. Jeanne-Maillotte,
 La Madeleine (Nord).
 BESNARD, 56, r. des Dames,
 Paris.
 10, r. Crillon, Paris.
 THEVENOT, 21, r. des Roses,
 Dijon.
 10, r. Crillon, Paris.
 4, imp. de Béarn, Paris.
 9, pl. Municipale, Tulle (Corrèze)
 14, r. de Clichy, Paris.
 12, bd St-Martin, Paris.
 39, r. Fondaudège, Bordeaux.
 79, r. de Paris, Saint-Denis.
 43, r. de Saintonge, Paris.
 20, r. Dumont-d'Urville, Paris.
 M. BERGER, à Orléans.
 BOITAS & C^{ie}, 1 r. de la Mar-
 tinière, Lyon.
 17, r. d'Hauteville, Paris.
 40, r. de Bellechasse, Paris.
 109, r. de Sèvres, Paris.
 23, r. Danton, Paris-Levallois.
 13, r. de Rivoli, Paris
 7, r. Biscornet, Paris.
 11, ch. de la Muette, Paris.
 10, impasse Milord, Paris.
 ABOU, 26, r. Temple, Paris.
 26, av. de l'Observatoire, Paris.
 id.
 14, r. de Clichy, Paris.
 id.
 47, r. de Neuilly, Nanterre.
 BRICHARD, Bar-le-Duc
 (Meuse).
 7, r. Biscornet, Paris.
 11, square Marie-Louise, Bru-
 xelles.
 3, r. de Dunkerque, Paris.
 26, av. Observatoire, Paris.
 18, av. Hoche, Paris.
 62, r. N.-Dame, Bordeaux.
 JOOSS, 7 bis, r. Général-Galliéni,
 Montreuil (Seine).
 MERMINOD, 49, r. de Paradis,
 Paris.
 61, av. Louise, Bruxelles.
 107, r. des Dames, Paris.

- Thyroxine Henning
 *Thyroxine Roche
 *Tiliane
 Tinctiode
 *Tiodine Cognet
 Tisane Cisbey
 Tisanes Dausse
 Tisane dépurative de Cavailles
 *Tisane hépatique Lahaye
 Tissus Le Perdriel
 *Tochlorine
 Total
 Toile vésicante Le Perdriel
 Tolu Le Boeuf
 Tonal
 Tonapérine
 *Tonax
 Toni bronchique
 Tonicalcine
 *Tonicardine Gonnon
 Tonicardine
 Toniformiase
 Tonigène
 Tonigénine
 *Tonikéine Chevretin
 Tonikéol
 Tonilécithine Rogier
 Tonimalt
 Toni-Pectoral
 Toniphlébine Hardy
 Toniphos Baron
 Toniphosphine
 Tonique Favrot
 *Tonique Gonnon
 Tonique Koenig
 Tonique Néda
 *Tonique Roche
 Tonique Zéva
 Toni sérum Freyssinge
 *Toniveinine
 *Tonuclyl
 MERMINOD, 49, r. de Paradis, Paris.
 10, r. Crillon, Paris.
 LACAZE, Pharm., Amélie-les-Bains (Pyrénées-Orientales).
 ROBERT et CARRIERE, 31, r. de Bourgogne, Paris.
 43, r. de Saintonge, Paris.
 12, bd St-Martin, Paris.
 4, r. Aubriot, Paris (IV^e).
 29, r. Singer, Paris.
 145, r. des Bourguignons, Bois-Colombes (Seine).
 11, r. Milton, Paris.
 SPECIA, 21, r. Jean-Goujon Paris.
 22, r. Godot-de-Maurel, Paris.
 11, r. Milton, Paris.
 61, r. de Seine, Paris.
 COLUMEAU, 45, r. d'Aix, Marseille.
 LYONS, 30, r. Monge, Paris.
 REBOUL, Pont-Sainte-Maxence (Oise).
 MARTINIE, 62, av. Philippe-Auguste, Paris.
 14, r. Victor-Hugo, Lyon.
 OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
 34, r. Montgallet, Paris.
 LECOQ, 11, r. Eugène-Flachat, Paris.
 Labor. à Montrevel (Ain).
 52, r. Labruyère, Paris (IX^e)
 ADLER, 36, r. des Francs-Bourgeois, Paris.
 56, bd Péreire, Paris.
 Rumilly, (Haute-Savoie).
 ADRIAN, 9, r. de la Perle Paris.
 200, r. de Tolbiac, Paris.
 Les Sables-d'Olonne.
 56, r. des Dames, Paris.
 6, r. Dombasles, Paris.
 14, r. Victor-Hugo, Lyon.
 37, av. Marceau, Paris.
 134, cours de Verdun, Bordeaux.
 10, r. Crillon, Paris.
 60, cours Emile-Zola, Lyon.
 6, r. Abel, Paris.
 BLANCHOT, 15, av. du Parc-Montsouris, Paris.
 MEUNIER, r. du Commerce, Montmarault (Allier).

- *Tonudol**
Tonyol "F"
Tophol
Topique Bertrand
Topiques Chaumel
Topique Nasal A. B. C.
Topique pyorrhépha-
gine
Topique Sabatier
Topique stomacal
Dausse
Torigyre Lamo
Toritane Lamo
Toritanol Lamo
Totalcalin
Totaliode
***Total-Tonic**
Total magnésien
***Tot'Hamelis**
***Touranol**
***Touranyl**
Toussyl Py
Trachovaccin Salantale
Traitement Vernet
Transpulmine
Tranquital
***Traphéine**
Traumatol
Traumatoplaste
Tréparsénans
***Tréparsinyl**
***Treparsol**
***Tréphonyl**
***Trépobiur**
Trépocidine
***Trépol**
Trépoquinol
Tréposan
Trépositoires
Triarsonyl
Triase
***Tribromure Gigon**
***Tricalcine**
***Tridigestine Dalloz**
***Tridynol**
- LICARDY, 38, bd Bourdon,**
Paris-Neuilly.
VARGAS, 5, r. Chauveau-
Lagarde, Paris.
3, r. Condillac, Grenoble.
à Oullins (Rhône).
78, 1g Saint-Denis, Paris.
Lab. TIFFENEAU, 24, r. Mont-
tessuy, Paris
Croissy-sur-Seine.
13, r. de Longchamp, Paris.
4, r. Aubriot, Paris (1V^e).
26-28, r. Paul-de Kock, Paris.
id.
id.
S. G. I. P., 73, r. Gal-Sarrail,
Le Havre.
58, r. de Maubeuge, Paris.
29, 1g Bourgogne, Orléans.
24, bd Sébastopol. Paris.
CHANTEREAU, 26 bis, r.
Dombasle, Paris.
94, r. Pasteur, Fontenay-sous-
Bois (Seine).
94, r. Pasteur, Fontenay-sous-
Bois (Seine).
58, bd Richard-Wallace, Puteaux.
42, Gdes Arcades, Strasbourg.
9, r. Laloy, Chaumont.
4, r. d'Illzach, Mulhouse.
6, r. Bridaine Paris.
13, r. Beudant, Paris.
37, r. Gaudot-de-Mauroy, Paris.
COMAR, 20, r. des Fossés-
Saint-Jacques, Paris.
FALQUE, Besançon.
LECOQ & FERRAND, 14, r.
Gravel, Levallois-Perret.
97, r. de Vaugirard, Paris.
SFÉAT, 15, r. Catullienne.
St-Denis.
OPTIMA. 78, Gde-Rue au Bois,
Bruxelles.
22, r. de la Sorbonne, Paris.
id.
156, r. des Fauvelles, Courbevoie.
id.
137, Fg St-Antoine, Paris (XI^e).
4, pl. des Vosges, Paris (1V^e).
25, bd Beaumarchais, Paris.
21, r. Chaptal, Paris.
13, bd la Chapelle, Paris.
JOURNET, 18-20, r. Vavin,
Paris.

- Triféryl
 Trifloral François
 Triganol Vigier
 *Triglandine Bouty
 Triglandol Bouty
 Tri-Iodo-Ercé
 Trijumine Pelletier
 Trilactine
 *Triluès
 Trilysine
 Trineuxyl
 *Trinitrine Caféinée Du-
 bois
 *Trinitrine-Papavérine
 Laleuf
 *Trinitrine Roussel
 Trinitrine Vicario
 *Trinivérine
 *Tripyoril
 *Triradol
 *Trisalyl
 *Triseptine
 Trisodyl Rozet
 Tristyl Noyon
 Tritonine
 Triurase
 Trixyl Fraudin
 Tri-Zymol
 Trousses Dosurine
 Tryclene
 Trynol
 Tryparsamide
 Trypsogen
 Tséamine
 Tuberculine C. L.
 Tubercuséine Leisyn
 *Tubérol
 *Tubes Blache
 Tubes Bromure Pa-
 chaut
 *Tubes Chauvin
 *Tubes Dulcis
 *Tubes Ferlux
 *Tubes du Dr Guiraud
 Tubes Levasseur
 Tubes Lux
 Tubes Sals
 *Tubes Strana
 37, r. Galilée, Paris.
 TACLET, Arras (P.-de-C.).
 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
 3, r. de Dunkerque, Paris.
 id.
 37, r. de Bourgogne, Paris.
 48, r. Jacob, Paris.
 22, bd Circulaire d'Epina-
 y, Gennevilliers (Seine).
 SFÉAT, 15, r. Catulienne.
 St-Denis.
 49, r. Paradis, Paris.
 6, r. des Dames, Paris.
 -LALFIER, 51, r. Nicolo, Paris
 (XVI^e).
 id.
 10, r. Washington, Paris.
 17, bd Haussmann, Paris.
 6, r. Bridaine, Paris.
 15, r. Catulienne, St-Denis
 (Seine).
 55, bd Strasbourg, Paris.
 14, r. des Minimes, Paris.
 LAMBERT, 6, r. de Longchamp,
 Vichy.
 BENDERITTER, à Vendôme.
 24, r. Paul-Bert, Paris.
 64, r. des Tournelles, Paris.
 46, r. de Rome, Marseille.
 4, av. Desreux, Boulogne-s.-S.
 OPTIMA, Gde-Rue au Bois,
 Bruxelles.
 16, r. Charlemagne, Paris.
 52, bd du Temple, Paris.
 FALVY, 40, r. des Acacias,
 Paris.
 SPECIA, 21, r. Jean-Goujon
 Paris.
 DÉGÈCE, 7, r. Princesse, Paris.
 SFÉAT, 15, r. Catulienne,
 St-Denis.
 21, r. Jean-Goujon, Paris.
 1 bis, r. Molitor, Paris.
 23, r. des Moines, Paris.
 CHAUVIN, Aubenas (Ardèche).
 130, bd Haussmann Paris.
 Aubenas (Ardèche).
 Dr FERRY, pl. Clichy, Monte-
 Carlo.
 G. BOUSQUET, à Albi.
 10, imp. Milord, Paris.
 23, r. de la Monnaie, Paris.
 35, r. de l'Abattoir, Bruxelles.
 Oullins (Rhône).
 SALANTALE, Strasbourg.

*Tulle gras Lumière
 *Tulle rose Beslier
 Fussomalt

Tuya Feuillé

Tymocalcine
 Tympano

45, r. Villon, Lyon.
 COQUELU, Digoïn (S.-et-L.).
 U. C. E. P., 5, r. Labroque,
 Strasbourg.
 D^r BIDOT, 4, r. du Cirque,
 Paris.
 156, r. des Fauvelles, Courbevoie,
 CHAUVIER, 66, r. Falguière,
 Paris.

U

*Uclarsyl
 Ubécholone
 Udanka
 *Ulcéobalnéine
 *Ulcéobande
 *Ulcéoplaque
 *Ulcéosine
 *Ulcéosol
 *Ulcérine Berger
 *Ulcérophile Nosan
 *Ulmacétyl
 Ulmaire Gmet
 *Ulmarene Gigon
 Ultracao Laurençon

*Ultraformine B et S

*Ultra-Levure
 Ultrargen Leclerc
 Ultrasténil

Ultra-Violets

*Ultravitamine 4

Ultravitine

Uracétose
 *Uralysol
 Uraséol
 *Uraseptine Rogier
 *Urazine

*Ur-Clar
 Urdol

80, r. du Cherche-Midi, Paris.
 MOUFLET, Chennebrun (Eure).
 D^r LALAURIE, Cuxac-d'Aude.
 76, r. des Rondeaux, Paris.

id.

id.

id.

id.

P. NADAUD, 31, bd de la
 Villette, Paris.

6^{ter}, r. Voltaire, La Garenne-
 Colombes (Seine).

54, r. Sablonville, Neuilly-s-Seine.
 27, fg Montmartre, Paris.

25, bd Beaumarchais, Paris.

16, r. République, Villefranche-
 s-Saône.

SAUZE, 60, r. Jean-Jaurès, Fir-
 miny.

22, r. de la Sorbonne, Paris.

10, r. Vignon, Paris.

P. FONTANIER, Moulins-sur-
 Yèvre (Cher).

La Verrerie Scientifique, 12, av.
 du Maine, Paris.

LAURENÇON, 16, r. Républi-
 que à Villefranche-sur-Saône.

P. FONTANIER, Moulins-sur-
 Yèvre (Cher).

76, r. des Rondeaux, Paris.

46, av. des Ternes, Paris.

17, r. Cadet.

56, bd Péreire, Paris.

SPECIA, 21, r. Jean-Goujon,
 Paris.

ROUX, 58, r. de Maubeuge, Paris.

OPTIMA, 78, Gde-Rue au Bois,
 Bruxelles.

| | |
|-------------------------|---|
| Urénile Meurice | 61, av. Louise, Bruxelles. |
| *Uréol Chanteaud | 3 et 5, r. Alex. Dumas, St-Ouen (Seine). |
| Urgoplast | FOURNIER, Dijon. |
| *Uribiline | REBOUL, Pont-Sainte-Maxence (Oise). |
| Uricase | 26, r. de Gagny, Neuilly-sur-Marne. |
| Uricémine | 29, r. de Liège, Paris. |
| Uricine | 50, r. République, Puteaux. |
| *Uriclarine | 157, r. Champignonnet, Paris. |
| *Urifluine | 2, pl. des Vosges, Paris. |
| Uriloxal | 108, r. Maréchal-Pétain, Vichy. |
| Urilysonne | 109-113, bd de la Part-Dieu, Lyon. |
| Uri-Magnétol | ROUX, 58, r. de Maubeuge, Paris. |
| Urisal du Dr Des-champs | 51, r. Nicolo, Paris (XVI ^e). |
| *Urisanine | LONGUET, 34, r. Sedaine, Paris. |
| Urixine | S. G. I. P., 73, r. Gal-Sarrail, Le Havre. |
| Urobényl | MERMINOD, 49, r. de Paradis, Paris. |
| Urobiose | 4, imp. de Béarn, Paris. |
| Urobleu | 4, imp. de Béarn, Paris. |
| *Urobuccol Malmanche | 101, av. Paul-Doumer, Rueil (S.-et-O.). |
| Urocarbol | GENTON, Petit-Quévilly (S.-Inférieure). |
| Urocédrol | GALLO, à Aurillac. |
| Urocholine | 20, pl. de la Mairie, Parc-St-Maur (Seine). |
| *Uroclase | ALEXANDRE, 41, r. de Rome, Paris. |
| Uroclean | ADLER, 36, r. des Francs-Bourgeois, Paris. |
| Urococcine | 51 r. Nicolo, Paris, (XVI ^e). |
| Urocuro | 10, r. Maubeuge, Paris. |
| *Uroflux | 21, r. Feydeau, Paris. |
| *Uroformine Gobey | 89, r. du Cherche-Midi, Paris. |
| Urogène | Dr LALAUERIE, Cuxac-d'Aude. |
| *Urofodine | 7, r. Jules-César, Paris. |
| Urolan | 55, bd de Strasbourg, Paris. |
| *Urol Neuville | 239, fg St-Honoré, Paris. |
| Urolithiase | Sté Rég. de l'Ouest, Rennes. |
| Urolithol | 3, pl. Intérieure St-Michel, Toulouse. |
| Urolyse | 27, r. G. Teissier, St-Étienne, (Loire). |
| *Urométhyl | BRESSIER, 102, r. Vincent, Marseille. |
| *Urométine Lambiotte | 20, r. Dumont-d'Urville, Paris. |
| *Uromil | Dr BELIERES, 19, r. Drouot, Paris. |
| *Urophényl | CROUY, 73, r. d'Albuféra, Vernon (Eure). |

- *Urophile Bailly
Uropiat
Uroquinase
*Uroquinol
- *Urosalyl
- *Urosan
Urosinol Damber
- Urosodine Louveau
- *Uro-tisan
- Urotropine Lafran
- *Urozea
- Urticide Roche
- Utéramine Zyma (Voir
Hemosamine)
- Utérol Leo
- *Utéro-streptine
- *Utersan
- *Uvargol
- *Uvé
- *Uvécline
- Uvéovules
- *Uvéphorine
- *Uvestérol
- Uviosterine
- Uvotonyl
- 15 et 17, r. de Rome, Paris.
- 19, r. de Sèze, Lyon.
- DUBOIS, 16, bd Péreire, Paris.
- DEXO, 23, r. Danton, Paris-
Levallois.
- GARDIOL, 6, r. Félix-Pyat,
Marseille.
- 12, r. des Saints-Pères, Paris.
- 71, av. de la République, Cham-
pigny (Seine).
- 78, bd des Batignolles, Paris.
- 112, r. des Pyrénées, Paris.
- 8, r. de Prague, Paris.
- LOBRY, 6, r. Parrot, Paris.
- 2, r. Michelet, Alger.
- 4, r. Bellart, Paris.
- 11, square Marie-Louise, Bru-
xelles.
- CARRION, 54, r. du Fg St-
Honoré, Paris.
- 20, r. des Martyrs, Paris.
- MARTINIE, 62, av. Philippe-
Auguste, Paris.
- 18, r. Saint-Amand, Paris.
- Pharmacie Ambard, Carcès (Var)
- AMBARD, Carcès (Var).
- 37, r. Galilée, Paris.
- 18, r. Saint-Amand, Paris.
- (Voir : Irrastérine).
- Joué-les-Tours (I.-et-L.).

V

- Vabéol
- Vacciderm
- *Vaccin anti-asthma-
tique du Pr. Minet
- Vaccin antigonococci-
que
- *Vaccin antigrippal du
Pr. Minet
- *Vaccin anti-pneumoni-
que du Pr. Minet
- Vaccin antitubercu-
leux Bossan
- *Vaccin Demonchy
- 30, r. N.-D.-des-Victoires, Paris.
- UNIS-SPES, 14, r. Demar-
quay, Paris.
- Lab. STÉNÉ, 2, pl. des Vosges.
Paris.
- OLIVIERO, 87, r. Denfert-
Rochereau, Paris.
- 2, place des Vosges.
- 2, place des Vosges.
- Lab. des Indus. Biologiques,
26, r. Royale, Paris.
- THERAPLIX, 98, r. de Sèvres,
Paris.

- *Vaccin de Weill et Dufourt 37, r. de Bourgogne, Paris.
- *Vaccinothérapie atoxique Cépède 60, r. Mathurin-Régnier. Paris.
- Vaccinovules 23, r. des Moines, Paris.
- Vaccins antipollin 26, av. Observatoire. Paris.
- Vaccins Antituberculeux Vaudremer 51, r. du Ranelagh, Paris.
- *Vaccins atoxiques stabilisés SPÉCIA, 21, r. Jean-Goujon, Paris.
- *Vaccins Bactériens Lab. Biologie Médicale, 16, r. Dragon, Marseille.
- I. O. D. 46, r. de Verneuil, Paris.
- Vaccins bactériophages 7, r. Biscornet, Paris.
- *Vaccins Bruschetti 54, r. du Fg St-Honoré. Paris.
- Vaccins Carrion 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
- *Vaccins Glin 1, r. Bonaparte, Paris.
- Vaccins du Dr Creuzé 26, r. Pagès, Suresnes (Seine).
- Vaccins Inava 4 ch. de la Muette, Paris.
- Vaccins Irsi 19, r. Drouot, Paris.
- *Vaccins Ivago (Voir : *Formo-vaccins*).
- Vaccins Lucinia GREMY, 14, r. de Clichy, Paris.
- Vaccins microbiens curatifs
- *Vaccins Virultra VIRULTRA, à Launay-Serquigny (Eure)
- *Vaccins Pasteur Institut PASTEUR, 22, r. Dutot, Paris.
- Vaccins Polyvalents 37, r. de Bourgogne, Paris.
- Renard
- *Vaccins Ronchèse 6, r. Rothschild, Nice.
- *Vaccins Sténe 2, pl. des Vosges, Paris.
- *Vacciphages 20, r. du Fg-Saint-Honoré, Paris.
- Vacciplast FOURNIER, Dijon.
- *Vaclodyne Vaclyderm 27, r. Desrenaudes, Paris.
- Vacuoline 39, r. de la Gare, Bondy (Seine).
- Vadérol DURAND, à Joigny (Yonne).
- *Vagoriane 21, Gde-Rue, Montfermeil (S.-et-O.).
- *Vagosédyl 20, r. des Martyrs, Paris
- *Vagostabyl MONIN, 49, r. de Maubeuge, Paris.
- Vagotonic Fournier Institut physiologique, Vauresson (S.-et-O.).
- *Vagotonine BYLA, 26, av. Observatoire, Paris.
- *Valbornine Rogier 56, bd Péreire, Paris.
- *Valbrol MAYOLY, 1 pl. Victor-Hugo, Paris.
- *Valedyl 191, fg St-Antoine, Paris.
- *Valénaï Novalis NOVALIS, Oullins (Rh.).
- Valéral Puy à Grenoble (Isère)
- Valéramyl Foulon 20, r. du Fg Poissonnière, Paris.
- Valergyl Doucet r. Gambetta, Bolbec.
- Valérianate Gabail 5, r. Lefebvre, Paris.
- *Valérianate Grignon 2, r. Duphot, Paris.
- Valérianate Pachaut 130, b. Haussmann, Paris.
- *Valérianate Pierlot 26, r. Saint-Claude, Paris.

- *Valériane Byla
 Valériane Dausse
 *Valériane Gmet
 *Valériane Pachaut
 *Valérianose Gigon
 Valeriflore
 *Valérinodor Malmanche
 *Valerium Paul Thibault
 *Valérobromine Le-grand
 *Valéromenthol
 *Valéronal
 *Valérothéine
 Valéthryne
 Valimyl Clin
 *Val'ovarine
 *Valovosan
 Vals St-Jean
 *Valthène
 Valtine
 Valyl Midy
 Vamétol
 *Vanadarsine Guillaumin
 Vanadine Chevrier
 Vaniol
 Vanotonyl
 Vansol
 *Vanucléol
 Varicine
 Varicolyse
 Varicure Marck
 *Varilaxine
 *Variphile
 *Varisclérine
 Variserum Lebon
 Vasculine
 *Vascurol
 Vasocônes
 Vasoconstrictine
 Vasogènes Pearson
 *Vasolaxine
 *Vaso-Neurine
 *Vasonitryl
 Vasorhinine
 *Vaso-Rhinol
 Vasothyol
 *V. A. V.
 Vaxa du D^r Boucard
- 26, av. de l'Observatoire, Paris.
 4, r. Aubriot, Paris.
 27, fg Montmartre, Paris.
 130, bd Haussmann, Paris.
 25, bd Beaumarchais Paris.
 38 bis, bd Beaumarchais, Paris.
 101, av. Paul-Doumer, Rueil
 (Seine-et-Oise).
 48, r. d'Alésia, Paris.
 DARRASSE, 13, r. Pavée, Paris.
 10, r. Poncelet, Paris (XVII^e).
 BERGER, 14, r. des Pyramides,
 Paris.
 DOMERGUE, Agen (Lot-et-
 Garonne).
 39, r. de la Chapelle, Paris.
 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
 64, r. d'Orsel, Paris.
 MATHIVAT, 66, r. de la Pompe,
 Paris (XVI^e).
 53, bd Haussmann, Paris.
 166, r. de la Roquette, Paris (II^e).
 12, r. Tour-des-Dames, Paris.
 4, r. du Colonel-Moll, Paris.
 14, r. de Périgueux, Angoulême.
 13, r. du Cherche-Midi, Paris.
 21, fg Montmartre, Paris.
 156, r. des Fauvelles, Courbevoie.
 BRÉANT, 11, r. de Clichy.
 18, r. Maréchal-Foch, Versailles.
 37, r. Pajol, Paris.
 12, r. Cadet, Paris.
 DAGRAN, 16, r. Saltaire, Taras-
 con (Bouches-du-Rhône).
 à Neuilly-sur-Seine.
 SOULAS, Surgères (Ch.-Inf.).
 21, r. Feydeau, Paris.
 61, r. de Seine, Paris.
 à Charost (Cher).
 4, imp. de Béarn, Paris.
 GUÉRIN, Meulan (S.-et-O.).
 BRUN, Demi-Lune, Lyon.
 id.
 48, r. d'Alésia, Paris.
 7, r. Biscornet, Paris.
 Lab. Pathologie Gle de Paris, 5,
 r. François-Ponsard, Paris.
 13, r. Pagès, Suresnes.
 22, r. Gambetta, Cherbourg.
 20 bis, r. Gravelotte, Toulouse.
 9, r. Laloy, Chaumont.
 51, r. du Ranelagh, Paris.
 30, r. Singer, Paris.

- Véba-gastrine**
 92, r. du Maréchal Pétain, Vichy (Allier).
- *Véganine**
 13, r. Pagès, Suresnes (Seine).
- *Végélaet**
 7, av. Marceau, Paris.
- *Végéphos**
 7, r. de Jouy, Paris.
- Végétol Fournier**
 8, r. des Quatre-Fils, Paris.
- *Véguva Wander**
 151 bis, r. de Joinville, Champigny.
- *Veinalgol**
 64, bd Barbès, Paris.
- Veinargyre**
 29, r. des Jardiniers, Montreuil (Seine).
- Veinhormones Logeais**
 24, r. de Silly, Boulogne-sur-Seine.
- Veinicura**
 42, bd Péreire, Paris.
- Veinofluine**
 239, fg St-Honoré, Paris.
- *Veinogène**
 14, r. Demarquay, Paris.
- Veinoglandol**
 156, r. des Fauvelles, Courbevoie.
- Veinophiline**
 27, r. Poids-Farine, Marseille.
- *Veinoposine**
 40, r. Claire-Paulhac, Toulouse.
- *Veinoserum Abadie**
 3, pl. Intérieure St-Michel, Toulouse.
- *Veinosine**
 5, r. Bourg-l'Abbé, Paris.
- *Veinotrope**
 46, av. des Ternes, Paris.
- Veinyl**
 4, imp. de Béarn, Paris.
- Velledol Adrian**
 9, r. de la Perle, Paris.
- *Velpeau (bande de crêpe)**
 7, r. de Jouy, Paris.
- Vénecine**
 7, r. des Italiens, Paris.
- Venin de Cobra**
 62, bd J.-Jaurès, Boulogne-sur-Seine.
- *Véralgine**
 38, r. du Mainguy, Bondy.
- Veramone**
 Cruet, 13, r. Miollis, Paris.
- Verbenol Hanbro**
 10, r. de Belfort, Rennes.
- *Vérianne Buriat**
 25, r. Copernic, Paris.
- Vermicide Grahaut**
 21, r. Ste-Catherine, Villeneuve-sur-Lot.
- Vermicure Pigeon**
 18, r. de Jouvence, Dijon.
- Vermifuge Castel**
 1, pl. Bouquerie, Nîmes.
- *Vermifuge Cornet**
 7, pl. Pey-Berland, Bordeaux.
- Vermifuge des Moines**
 2, r. Marché-des-Blancs-Manteaux, Paris.
- Vermifuges Pivot**
 PUY, Grenoble (Isère).
- Vermifuge Rabi**
 14, r. Turgot, Limoges.
- Vermifuges Sorin**
 TROMBETTA, Blain (L.-Inf.)
- *Vermirene Audibert**
 Cinq Cantons, Bayonne.
- Vermitox**
 BOULLE, 12, av. de la Gde-Armée, Paris.
- Vermosol**
 46, r. du Bac, Asnières.
- *Vernis à la Diachusine**
 142, r. de Picpus, Paris.
- Verocodal Boeglin**
 26, r. Ste-Claire, Mulhouse.
- Vérogénol**
 101, av. Mozart, Paris.
- *Véronidia Buisson**
 98, r. de Sèvres, Paris.
- Verruccin Leo**
 11, square Marie-Louise, Bruxelles.
- Verrucure**
 6, r. d'Auteuil, Paris.
- *Verrulyse**
 Lab. FLUXINE, Villefranche (Rhône).

- *Verticurine**
- *Véryl**
Vésicatoire rose Beslier
Vésicatoires d'Albepeyres
Vexillan
Viburniode
Viburnum Gmet
Viceliase
- *Vichy Purgatif**
Vichy Rapide
Vigardyne
Vigine
Vigogastrine
- *Vigostérol irradié**
- Vigotonal**
Vigotonique
- Vilax**
- Vin à l'extrait de foie de morue**
Vin d'Anduran
- *Vin Anti-Diabétique Talon**
Vin Aroud
Vin Boillaud
Vin Bravais
- *Vin de Baudon**
Vin de Beef Lavoisier
- *Vin de Bugeaud**
***Vin de Carnéose**
- *Vin de Chassaing**
Vin de Coca du Pérou
Vin des Indes
- *Vin de Vial**
Vin Désyless
Vin diurétique Pyrola
Vin énergétique Fra-dier
Vin Gallia
- *Vin Girard**
Vin de Kola Midy
- *Vin de Lavoix**
Vin de Moride
- Vin de Séguin**
***Vin Lux Gaillac moussaux**
Vin Mariani
Vin Mory
- GRIAS, 47, r. Feray, à Corbell (Seine-et-Oise).**
12, bd St-Martin, Paris.
COQUELU, Digoïn (S.-et-L.)
FUMOUIZE, 78, fg Saint-Denis, Paris.
98, av. Wagram, Paris.
GIRY, 49, r. de Metz, Nancy.
27, fg Montmartre, Paris.
71, av. de la République, Champigny (Seine).
7 bis, r. Galvani, Paris.
22, r. de l'Arcade, Paris.
21, r. du Chemin de fer, Sceaux
AMBLARD, Cunlhat (P.-de-D.).
222, r. Duguesclin, Lyon.
B R I C H A R D, Bar-le-Duc, (Meuse).
122, bd Murat, Paris.
71, av. de la République, Champigny (Seine).
16, bd Filles-du-Calvaire, Paris (XI^e).
21, Fg Montmartre, Paris.
- MOUSNIER, à Sceaux.**
153, bd Montparnasse, Paris.
- 6, r. Dombasle, Paris.**
172, r. d'Alésia, Paris.
3, r. Mogador, Paris.
12, r. Charles-V, Paris.
Usine du Blosset, Moulins-sur-Yèvre (Cher).
5, r. Bourg-l'Abbé, Paris.
Usine du Blosset, Moulins-sur-Yèvre (Cher).
1, quai Aulagnier, Asnières.
21, Fg Montmartre, Paris.
61, r. de Seine, Paris.
36, pl. Bellecour, Lyon.
Levallois-Perret (Seine).
19, r. des Chalets, Toulouse.
53, bd de Verdun, Fontenay-sous-Bois.
7, r. des Petits-Carreux, Paris.
48, r. d'Alésia, Paris.
4, r. du Colonel-Moll, Paris.
(Voir : Beef Lavoix).
LANDRIN, 12, r. de la République, Puteaux.
165, r. Saint-Honoré, Paris.
6, av. Foch Gaillac (Tarn).
- 41, bd Haussmann, Paris.**
OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.

- Vin Nourry** 20, r. des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
- Vin Oophorine** Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
- *Vin Raimoa Tonic** 264, bd Voltaire, Paris.
- Vin St-Raphaël** à Valence (Drôme).
- Vin Surtonique Val** Usine du Blosset, Moulins-sur-Yèvre, (Cher).
- Notre-Dame** 24, r. de Monttessuy, Paris.
- Vin Tonic Tiffeneau** au Bouscat-Bordeaux.
- Vin Urané Pesqui** 5, r. Eug.-Delacroix, Paris.
- Vin Voguet** 109-113, bd de la Part-Dieu, Lyon.
- *Vioforme Ciba** id.
- Vioformol Ciba** 4, r. du Cirque, Paris.
- Violet Bidot** 81-83, r. de Lille, Roubaix.
- *Viophan** Dr LESCENE, 58, r. de Vouillé, Paris et Livarot (Calvados).
- *Viosten** Villeneuve-la-Garenne (Seine).
- *Vioxyl Mouneyrat** 120, r. Lecourbe, Paris.
- *Viradène** 65, r. Monge, Paris.
- Viridol** DÉGÈCE, 7, r. Princesse, Paris.
- Viriligin** MERMINOD, 49, r. Paradis, Paris.
- Virilium** 4, r. Désirée, Lyon.
- *Virmonal** 25, r. Dagorno, Paris.
- Viroglan I. S. M.** 11, r. de Fontainebleau, Kremlin-Bicêtre.
- Viscine** FOSSET, 21, Gde-Rue, Montfermeil (Seine-et-Oise).
- Visco-dermine** 55, bd Strasbourg, Paris.
- *Viscoserum** 20 bis, r. Gravelotte, Toulouse.
- Viscosodine** 21, Gde-Rue Montfermeil (S.-et-O.).
- *Viscoveine Fosset** 9, pl. Félix-Faure, Paris.
- *Viscum Zyma** 49, av. Victor-Hugo, Boulogne-sur-Seine.
- *Vitacalcine Moncour** LABO-VITA, 190, bd Haussmann Paris.
- *Vitacholine** 2, r. Lauzac, Bordeaux.
- *Vitacrines** 190, bd Haussmann, Paris.
- *Vitacuirol** 122, bd Murat, Paris.
- Vitaderme Bergonier** BYLA, 26, av. de l'Observatoire, Paris.
- *Vitadone** Moulins-sur-Yèvre (Cher).
- Vitaférine** SÉGUIN 7, r. Ste-Isaure, Paris.
- Vitagéine** DRYCO, 5, r. St-Roch, Paris.
- Vitagermine** 48, r. de la Procession, Paris.
- *Vitaglyc** E. BASSOL, à Ste-Alvère (Dordogne).
- Vital Extrait** REBOUL, Pont-Ste-Maxence, (Oise).
- Vitalogène** 10, r. Bayard, Toulouse.
- Vitalyne** 8, r. Vivienne, Paris.
- Vitamina** 7, r. de l'Armorique, Paris.
- *Vitamine D Cortial** 56, bd Péreire, Paris.
- Vitamine Rogier** BYLA, 26, av. de l'Observatoire, Paris.
- *Vitaminol**

Vitamorrhaine**Vitamyl**
Vitaphorine***Vitargyl****Vitasol****Vitastérol****Vitazem*****Vitène****Vitergomine****Vitosine Décornez****Vitricine Carves****Vivassol****Viviodol****Vivo-Dynergol*****Vivoléol*****Vocaldop****Vogénol*****Voka****Voltargol Robin****Vonol*****Vulcapil Brisson*****Vulcase****Vulco (ouate)*****Vulnérine Bergen****P. C. B.**, 12, r. du Téléphone,
Bruxelles.

4, pl. des Vosges, Paris.

Usines du Blosset, Moulins-
sur-Yèvre (Cher).**POINTET & GIRARD**, 30,
r. des Francs-Bourgeois, Paris.49, r. d'Angoulême, Cognac
(Charente).**F. GUILBERT**, 10, r. du Collège,
Arras (P.-de-C.).

85, r. Turbigo, Paris.

12, r. Charles-V, Paris.

Pharmacie centrale de Bel-
gique, 12, r. du Téléphone,
Bruxelles.

à Ornans (Doubs).

à Chambéry (Haute-Savoie).

78, fg Saint-Denis, Paris.

11, r. de Marseille, Paris.

BROTHIER, 163, r. St-Denis,
Paris.

24, r. de Fécamp, Paris.

222, fg St-Martin, Paris.

13, r. de la République, Yzeure-
Moulins (Allier).

11, r. Ant. Bourdelle, Paris.

13, r. de Poissy, Paris.

MERMINOD, 49, r. de Paradis,
Paris.

157, r. Championnet, Paris.

157, r. Championnet, Paris.

OPTIMA, 78, Grande-Rue-au-
Bois, Bruxelles.**DUCOQ**, Langeais (I.-et-L.).**W****Wantor****Witch Hazel****Wipla****Wismuthane****BÉRAUD**, 13, pl. de la Nation,
Paris.

3, av. Lowendal, Paris.

6, r. des Dames.

132, av. Victor-Hugo, Paris.

X

Xanthocol
Xémaderm
Xylosulfol Vigier

37, r. de Bourgogne, Paris.
59, r. Châteaudun, Paris.
12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.

Y

*Yacourtine
*Yo-Androl

18, pl. Laborde, Paris.
ISCOVESCO, 107, r. des Dames,
Paris.

Yocaïne
Yogourth (Extrait de)
Yoghourt Karlos
Yoghourt Lactella
Yoghourt Lagnel
Yoghourt Nutricia
*Yo-Gynine

12, r. Pavée, Paris.
23-25, r. Singer, Paris.
à Lécluse (Nord).
à Tourcoing.
7, r. de la Pépinière, Paris.
142, r. Fransman, Bruxelles.
ISCOVESCO, 107, r. des Dames,
Paris.

Yohourth Carrion
Yohourt Douriez
Yohimalt

54, fg St-Honoré, Paris.
37, r. Voiture, Amiens.
U. C. E. P., 5, r. Labroque,
Strasbourg

Yohimbine Gilbert

2, r. du Marché-des-Blancs-
Manteaux, Paris.

*Yohimbine Vicario
Yprine

17, bd Haussmann, Paris.
4 bis, r. Hébert, Courbevoie
(Seine).

*Yptor
Yse
Ystaline
Yzeuroi

22, r. de la Sorbonne, Paris.
62, r. Louis-Blanc, Paris.
2, pl. du Th.-Français, Paris.
26, av. Tourville, Paris.

Z

- | | |
|------------------------------------|---|
| Zaryl | CHAUZEIX, 26, r. Pradier, Ville-d'Avray (Seine-et-Oise). |
| Zébo-Plastol Dumes- nil | 10, r. du Plâtre, Paris. |
| Zédeno | 37, r. de Bourgogne, Paris. |
| Zimbyl | CHAUZEIX, 26, r. Pradier. Ville d'Avray (Seine-et-Oise), |
| Zingal | 11, ch. de la Muette, Paris. |
| Zistazine | 163, r. de Flandre, Paris. |
| *Zomine du Pr. Richet | 34, r. Sedaine, Paris. |
| Zomol | VIAL, 8, r. Vivienne, Paris. |
| Zomo-maltine | 172, r. d'Alésia, Paris. |
| Zomo-musculosine | 26, av. de l'Observatoire, Paris. |
| Byla | |
| *Zoocytine | DURET & RÉMY, Asnières (Seine). |
| *Zymatine-Lescène | à Livarot (Calvados) et 58, r. de Vouillé, Paris. |
| *Zymogastrine Kervan | 6, bd Arago, Paris (XIII ^e). |
| Zymostol | 22, r. de la Sorbonne, Paris. |
-

4^e Partie

NOMENCLATURE
DE
SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES
CLASSÉES
PAR LABORATOIRES

- Lab. Abadie Tanzi**, 3, pl. Intérieure St-Michel, Toulouse. — *Asclérogénol* (cachets), *Baume de la Faculté*, *Cachets digestifs du D^r Bern*, *Diocol*, *Essence landaise*, *Gouttes calciques Zanit*, *Gouttes halogènes du D^r Bern*, *Gouttes pectosérum*, *Moruxase*, *Neurotrol*, *Ovules halogènes du D^r Bern*, *Urolithol granulé*, *Veinosérum*.
- Lab. Abarnou**, 72, av. Thiers, Le Mans. — *Fenurobur*.
- Lab. d'Actino-Biologie**, 16, r. de la République, Villefranche-sur-Saône. — *Algécrine*, *Serifer Laurençon*, *Tensol-Laurençon*, *Ultracao Laurençon*, *Ultravitamine 4*.
- Lab. Adam**, Granville (Manche), *Adrénocalcine*, *Chlocchi*.
- Lab. Adler**, 36, r. des Francs-Bourgeois, Paris. — *Anorexyl*, *Bismuth Adler*, *Collybor*, *Cratœgniode*, *Formocholine*, *Gastroclean*, *Hémoclean*, *Hémovarine*, *Inhabillol*, *Iodarbépine*, *Oléopsyllium*, *Pulmobiasé*, *Rhinogéramol*, *Tonikéol*, *Urocléan*.
- Lab. Adol (M. Giroud)**, 78, cours de la Liberté, Lyon. — *Baume Adol*, *Blennopiat*, *Cachets Adol*, *Cachets Louix*, *Potion Adol*, *Poudre Dumur*.
- Lab. de l'Æthone**, 9, r. Boissonnade, Paris. — *Æthone-Neurotrophène*.
- Lab. de l'Aigue d'or**, 53 bis, bd de la Liberté, Lille. — *Aigue d'or*.
- Lab. Pierre Alexandre**, 41, r. de Rome, Paris. — *Carbomucil*, *Decorpa*, *Enzypan*, *Gastrosédase*, *Hamaméline Royat*, *Normacol*, *Phénol Bobeuf*, *Pilules Myosotis*, *Pilules Royat*, *Radiolysine*, *Réargon*, *Spasmacol*, *Uroclase*.
- Lab. de l'Algane**, 145, r. de Saussure, Paris. — *Algane*.
- Lab. de l'Algor**, 137 ter, Grande-Rue, Roubaix. — *Algor*.
- Lab. de l'Amibiasine**, 69, r. de Wattignies, Paris. — *Amibiasine*, *Bioentérase*, *Intestase*.
- Lab. Amicros**, 177, r. de Courcelles, Paris (XVII^e). — *Amicrargol*, *Elain Amicros*, *Fer Amicros*, *Orargol*, *Ovules Amicros*, *Sarcoptol*.
- Lab. des Prod. Amido**, 4, pl. des Vosges, Paris (IV^e). — *Amidal*, *Bacherine*, *Génatropine*, *Génésérine*, *Genhyoscyamine*, *Génomorphine*, *Génosthéniques*, *Génoscopolamine*, *Génostrychnine*, *Vitamyl irradié*.
- Lab. H. Ammann**, 3, impasse Adam, Boulogne-sur-Seine. — *Belhemine*, *Blocs Vécot*, *Ostéogène*.
- Lab. des Ampho-vaccins (Ronchèse)**, 6, r. de Rothschild, Nice et 62, r. Charlot, Paris. — *Ampho-pulvérisateur Ronchèse*, *Ampho-tablettes*, *Ampho-vaccin anti-infectieux*, *Ampho-vaccin anti-staphylococcique*, *Ampho-vaccin antityphoïdique T. A. B.*, *Ampho-vaccin pulmonaire*, *Ampho-vaccin urinaire*, *Ampho-vaccin intestinal*, *Ampho-vaccin pansement antipyogène*, *Ampho-vaccin pansement rhino-pharyngien*, *Pyoamphogel*.
- Lab. Ana**, 18, av. Daumesnil, Paris. — *Euphoryl*, *Euphoryl infantile*, *Hirudinase*, *Sclérosérum*, *Spasmoryl*.

- Lab. Angelini, 61, rue de Seine, Paris. — *Depuriode*, *Nutréol*, *Onction Angelini*, *Onguent Prunot*, *Ovules Patrat*, *Polypeptine*, *Poudre Deol*, *Poudre Fiore*, *Sirop Alba*, *Sirop Patrat*, *Tonal*, *Varisclérine*. *Vin des Indes*.
- Lab. de l'Angiolympe, 4 bis, rue Hébert, Courbevoie. — *Angiolympe du D^r Rous*, *Argycuprol*, *Yprine*.
- Lab. de l'Aniodol, 3-9, rue des Alouettes, Nanterre. — *Algatan*, *Aniodol*.
- Lab. des Antigénines, 1, pl. Lucien-Herr, Paris. — *Antigénines*, *Biazan*, *Cresentyl*.
- Lab. de l'Antiphlogistine, 11, r. du Petit-Parc, St-Maur (Seine). — *Antiphlogistine*.
- Lab. des Antiseptiques chlorés, 42, rue Thiers, Le Havre. — *Clonazone*, *Hydroclonazone*, *Stéramine*, *Talcazone*.
- Lab. de l'Aphosal, 48 bis, av. Mozart, Paris. — *Aphosal*.
- Lab. de l'Appétyl, 37, av. de la République, Paris. — *Appétyl*.
- Sté d'Applications pharmacodynamiques, 5, rue Claude-Decaen, Paris. — *Chlorophylle du D^r David*, *Dinitra*, *Erythra*, *Phylla*, *Rhocyra*.
- Sté générale d'Application thérapeutique « *Théraplix* », 98, rue de Sèvres, Paris. — *Bromure Souffron*, *Catalgine*, *Crème de Nujol*, *Crescol*, *Efryl*, *Freinix*, *Féroxal*, *Grassyl*, *Hémotonine*, *Iodure Souffron*, *Ixiun*, *Kéraffine*, *Lofodol*, *Mésothorium*, *Nitium*, *Nujol*, *Ostreïne*, *Perofreinix*, *Quinothorium*, *Réalphène*, *Lofodol*, *Sédol*, *Vaccin Démonchy*, *Véronidia*.
- Lab. L. Arquevaux, Pharmacien, pl. de la Bastille, Etampes (S.-et-O.). — *Elixir thiogaiacolé Arquevaux*, *Eupeccatorial*, *Glyctone phosphatée Charrière*, *Perrhinol*, *Sel hépatique U. N. Arquevaux*.
- Lab. Aseptor, 21, rue Feydeau, Paris (II^e). — *Aseptorhine*, *Auriculine*, *Boréol*, *Glycalcion*, *Otalgolex*, *Rhinaspir*, *Rosaseptor*, *Uroflux*, *Variphile*.
- Lab. P. Astier, 41-47, rue du D^r-Blanche, Paris. — *Arhéol*, *Colitique*, *Condurango granulé Astier*, *Glycophosphates granulé Astier*, *Kola Astier*, *Néo-Riodine*, *Quinquina granulé Astier*, *Riodine*, *Stalysine*.
- Lab. du D^r E. Aubert, 3, pl. Jussieu, Paris. — *Créacalcine*, *Créatine*, *Créatonine*, *Kola caféinée Aubert*, *Méla-carbine*, *Mélaclitrine*, *Mélaformine comprimé*, *Mélaformine granulé*, *Néosplénine*, *Neutrobyl*, *Pancrébile*.
- Lab. Aubry, 62, rue Erlanger, Paris. — *Cellu-Son*, *Malarsan*, *Quinby*.
- Lab. Marcel Audibert, Cinq-Cantons Bayonne. — *Gélicurine Audibert*, *Vermirène Audibert*.
- Lab. Andras, 112, r. de Gerland, Lyon. — *Bilentéric*, *Entérisane*, *Epidermine*, *Endigérase*, *Fluxhemo*, *Formopectine*, *Lysurol*, *Néosedine*, *Phosarrhène*, *Plethosine*, *Staphylocid Andras*.

Lab. Augier, 2, rue des Lombards, Paris. — Biocalcine.
Cachets Laxa, Mensuosédyl, Noctisédyl.

Prod. Bactériologiques L. B. L., 18, r. Daguerre, Paris (XIV^e).
 — *Sapolysine, Serélibé, Sérogyne.*

Lab. Badel, 58-60, rue des Moulins, Valence (Drôme). —
Florosine, Goultes Bronchophiles André, Juglanrégine
André, Kolasthène Badel, Mycidol Badel, Soporine.

Lab. Bailly et Cie, 15, rue de Rome, Paris (VIII^e). — Anaxe-
ryl, Forxol, Glucolactol, Huilaxine, Ménatol, Opobyl,
Pastapalm, Phaguryl, Pulmosérum, Quergémol, Theinol,
Urophile.

Lab. du D^r Baissade, Saint-Loup, Marseille (B.-du-Rh.). —
Baume du D^r Baissade.

Lab. du Baldisedan, 133, rue Lecourbe, Paris. — Baldisedan

Lab. Bapaume, 85, av. de Neuilly, Neuilly-sur-Seine. —
Bikréol.

Lab. Barbessou, Marmande (L.-et-G.). — Baume du D^r Serin
de Gaillac, Antidouleur Barbessou.

Lab. Bardet, 76, rue de Sèvres, Paris (VII^e). — Cachets Ka-
pylan, Capsules Haarlem Bardet, Solution Quinquina
Bardet, Taénifuge Bardet.

Lab. du D^r Barey, 37, av. Jules-Coutant, Ivry-sur-Seine. —
Formocitrine, Mesogastrine.

Lab. Bassin, 38, r. de Mainguy, Bondy (Seine). — Stupho,
Véralgine.

Lab. Basuyaux, 94, r. Pasteur, Fontenay-sous-Bois (Seine).
 — *Billabstine, Fokienyl, Labylax, Panlabyl, Touranol,*
Touranyl.

Lab. Baude, St-Aubert (Nord). — Anthraseptol, Syphonéol.

Lab. B. C. L., 29, fg de Bourgogne, Orléans. — Alsodine,
Gastrépatine, Naza capsules, Mictosetol, Totallonic.

Lab. B. E. A. 18. faub. des Ancêtres, Belfort. — Alibourine,
Curoxyure.

Lab. Beaufour, 18, pl. Doguereau, Dreux (E.-et-L.). — Ro-
marène.

Lab. Beauxis-Lagrange, 74, quai Jemmapes, Paris. — Acatar,
Bensanine, Calomel R. B. Lagrange, Cérébrinol A et B,
Cinnolipol chaulmoogré, Dragées Vityl, Infusion orien-
tale RBL, Kamara C. 47, Myrcol, Néophos Pipérazine
RB Lagrange, Prostatols.

Lab. du Spécifique Bejeau, 12, rue des Hospitalières-St-
Gervais, Paris (IV^e) et 30, r. des Francs-Bourgeois,
 — *Spécifique Bejeau.*

- L. Belières**, 19, rue Drouot, Paris. — *Absuric*, *Antirrhoïde*, *Arachise*, *Argion*, *Dépuratif Kromélinck*, *Désensibilysine*, *Eusomnine*, *Laurénol*, *Lubrokal*, *Orthogénol*, *Polycautére*, *Recresal*, *Sirop Gribell*, *Uromil*, *Vaccins Ivago de Goldenberg*.
- MM. Benderitter et Cie**, Vendôme (L.-et-C.). — *Cynhépatil*, *Gastrocaol*, *Neutralcaol*, *Sulfoléine*, *Trisodyl Rozet*.
- Lab. du D^r Bengué**, 16, rue Ballu, Paris. — *Baume Bengué*, *Dragées Bengué*, *Chloréthyle Bengué*.
- Lab. Béral**, 194, r. de Rivoli, Paris. — *Adrénoides*, *Adréphédrine Clearol*, *Ephédermine*, *Ephédraféine*, *Ephédrampoules*, *Ephédrisol*, *Ephédroïdes*, *Ephédromel*, *Ephéiodine*, *Ephétropine*, *Grains d'Ephédrine*, *Mydriédrine*, *Navédrine*, *Rhinodrops*, *Somnicones*.
- Lab. Berger**, 14, rue des Pyramides, Paris. — *Alliocardia*, *Calciophose*, *Glutinettes d'Aspirine*, *Gynéose*, *Mariode*, *Ostéoglandulol*, *Valéronal*.
- Lab. Bergevin**, Châteaudun (E.-et-L.). — *Arrhénuclène*.
- Lab. Bernard Garcin**, St-Saturnin-les-Avignon, Vaucluse. — *Mucyllium*.
- Lab. G. Bernhard**, 11, rue Lafayette, Paris. — *Ampélidine Bernhard*, *Baume Bernhard*, *Cachets parégoriques Bernhard*, *Gargarisme sec Wuhrlin*, *Granulés des Vosges*, *Poudre antigestralgique Bernhard*, *Pommade Bernhard*, *Telenol Bernhard*.
- Lab. G. Berthon**, Dornes (Nièvre). — *Asthmo Actine Berthom*.
- Lab. Beytout**, 12, bd St-Martin, Paris. — *Aérophagyl*, *Carbonésie*, *Kaolinase*, *Lutéovar*, *Thiophyl*, *Tisane Cisbey*, *Véryl*.
- Lab. de Biochimie médicale (Ch. Desgrez, D^r en pharmacie)**, 19-21, rue Van-Loo, Paris. — *Arsénos solvant*, *Ektophanol*, *Sulfarsénol*.
- Lab. de Biologie médicale**, 7, av. des Sources, Nice. — *Antipiol*, *Entérofagos*.
- Lab. Biologique de l'Île de France**, 19, av. d'Orléans, Paris (XIV^e). — *Appétyl*, *Atoplastine*, *Iodocalcium*, *Neurocalcium*.
- Lab. de la Biomarine**, Dieppe (S.-Inf.). — *Arthritose*, *Ionyl*, *Marinol*, *Plasmarine*.
- Lab. du Bionéol**, 14, r. Périgieux, Angoulême. — *Bionéol*, *Vamétol*.
- Lab. de la Biopausine**, 32, rue de l'Ouest, Paris. — *Ergocoline*, *Leucolyse*.
- Lab. du Bio-Sel**, 5, rue Diderot, Nice (A.-M.). — *Bio-Sel*, *Poudre du Roy*.
- La Biothérapie**, 5, rue Paul-Barruel, Paris. — *Antivirus*, *Arapal*, *Bili-vaccins*, *Crysiodal*, *Sanogyl*, *Sanoram*, *Spirogyl*.
- Lab. de la Biovigorine**, 4, route de Médoc, Bordeaux-Bouscat. — *Biovigorine*.

- Lab. Blanchot**, 15, av. du Parc-Montsouris, Paris. — *Toni-
veinine, Solution Watelet.*
- Lab. Bloch**, Tomblaine près Nancy (M.-et-M.). — *Arrow-
root, Blokao, Farines de régime, Farines de céréales,
de légumes et de fruits, Rapidoats, Semoules et flocons
de céréales, Tapiocas.*
- Lab. Idon Bloch**, 89, r. St-Georges, Nancy. — *Pancréatose
Idon, Poudre Cosy.*
- Lab. Blouin**, 50, r. de Turenne, Paris. — *Adénoseptyl, Fluo-
choline, Okamine, Poudre Danica.*
- Lab. du Blosset**, Moulins-sur-Yèvre (Cher). — *Vin de Car-
néose.*
- Lab. H. Boissel**, 295 bis, rue de la Benauge, Bordeaux. — *Myg-
dal, Néoral, Paxanus, Potion Boissel.*
- Lab. Boissy**, 15, rue Belgrand, Paris (XX^e). — *Ampoules
Boissy d'Iodure de Potassium, Causylh (comprimés),
Eccémacrème Boissy, Sanex-Inhalant.*
- Lab. Boize et Alliot**, 9, av. Jean-Jaurès, Lyon. — *Alzine,
Atomine, Diurobromine, Diurocarbine, Diurocystine,
Logaphos.*
- Lab. Bomel**, Annonay (Ardèche). — *Ampoules V.-E. Dou-
mer, Bi-iodural Novat, Collutoire V.-E. Doumer,
Iodural Novat, Kreofos Novat, Pilules V.-E. Dou-
mer, Pommade V.-E. Doumer, Solution V.-E. Dou-
mer.*
- Lab. Bonetti**, 60, rue E.-Dolet, Malakoff (Seine). — *Diader-
mine.*
- Lab. Borne**, 79, r. de Paris, St-Denis. — *Thiosédal.*
- Lab. Bornet**, 5, bd des Brotteaux, Lyon. — *Bismuth B3.*
- Lab. Bottu**, 115, r. N.-D.-des-Champs, Paris. — *Codoforme
Bottu, Gaze néolée, Néalgyl Bottu, Néol, Néolides,
Ovunéol Bottu.*
- Lab. Boudin**, 9, av. Jean-Jaurès, Joinville-le-Pont. — *Ré-
vulsif Boudin.*
- Lab. Bouillet**, 48, bd des Batignolles, Paris. — *Bismuth
Tulasne, Iode Tulasne.*
- Lab. des Boules Quiès**, 47, bd Victor, Paris. — *Boules Quiès.*
- Lab. E. Boulle**, 12, av. de la Grande-Armée, Paris. — *Cata-
plasme du D^r Lelièvre, Géranine, Sérosine Boulle,
Vermitox.*
- Lab. Bouteille**, 23, rue des Moines, Paris. — *Cantéine, Disuryl,
Neurobore, Pulmovaccin, Tubérol, Vaccinovules.*
- Lab. Boutroy**, 8, rue de Passy, Paris. — *Eugastrol, Exonérol,
Setirtem.*
- Lab. Bouty**, 3, rue de Dunkerque, Paris. — *Biliol, Gastro-
zymase, Globépal, Liqueur Bouty, Liquides organiques
injectables, Métasérum, Métharfer, Métharsol, Méthy-
larsinates, Néphrine, Opostyl, Opothérapie Bouty,
Ovigénine, Produits Pennès, Sérosthényl, Sirop de
Gaiarsol, Surrénaline, Thyroïdine, Triglandine, Tri-
glandol.*

- Lab. Bouvelot, 62, rue d'Antibes, Cannes. — *Acodros, Inhalol, Pilixyl, Torozone.*
- Lab. Bouvot, Auvers-sur-Oise (S.-et-O.). — *Oéréliode.*
- Lab. Boyer, 12, r. Pavée, Paris. — *Phobiose, Radiogastrol.*
- Lab. Bracquemond et Cie, 105, rue de Normandie, Courbevoie. — *Morrhuetina, Juncken, Sel d'Ewald.*
- Lab. d'analyses Bréant, 11, r. de Clichy, Paris. — *Cedrosan, Chlorure d'ammonium, Lycobile, Osmo-vaccins, Phos-tone, Vanotonyl.*
- Lab. Ch. Brésil, 12, rue St-Gilles, Paris. — *Broncosol, Sanguil.*
- Lab. J. Bressier, 102, rue Vincent, Marseille. — *Adrénargol, Gouttes Eryl, Lénadryl, Nasobore, Purargol, Résocaïne, Sulfoxyl, Urométhyl,*
- Lab. Brichard et Fils, 23, bd Ray.-Poincaré, Bar-le-Duc. — *Baby Bala, Forvital, Hémovéine, Isalaxine, Pastilles Bala, Pastilles Debar, Sirop Bala, Sirop Debar, Thyroguine, Vigostérol irradié.*
- Lab. Pierre Brisson, 157, rue Championnet, Paris. — *Ampoules Egralène, Ampoules huile soufrée, Ampoules Sigmuth, Anytal Brisson, Cathiote Brisson, Denisia, Denisoline, Dithioléine Brisson, Entéricure Brisson, Jovine Brisson, Laccodermes Brisson, Lenicade Brisson, Licardet Brisson, Néo-séli, Procuta Brisson, Savon Denisol Brisson, Vulcase Brisson, Vulcapil Brisson, Uriclarine Brisson, Septylase Brisson, Seti, Sulphium Brisson.*
- Lab. du Bromo-Garnal, 13, rue Boinod, Paris. — *Bromo-Garnal.*
- Lab. Bruel, 36, r. de Paris, Colombes (Seine). — *Caspules Bruel, Benzo-iodhydrine.*
- Lab. Bruneau et Cie, 17, rue de Berri, Paris. — *Brunyl, Cutiphile, Cutiplaste, Lobéline, Paraffinoléol, Paremanol, Senophile, Sérum de Jousset.*
- Lab. A. Brunot, 16, rue de Boulainvilliers, Paris. — *Dialyl, Sel de Hunt.*
- Lab. Brunschwik, 3 bis, rue Vallier, Levallois-Perret. — *Parvula.*
- Lab. Buriat, 25, rue Copernic, Paris. — *Arséniode Buriat, Vériane.*
- Etabl. Byla, 26, av. de l'Observatoire, Paris. — *Amino-sel Aminine, Antélobine, Gui Byla, Hormovarine, Insuline Byla, Héparmone, Irrastérine, Musculosine, Neurotrophol, Opothérapie Byla, Paralactine, Paratyron, Phylactone, Phytogénine, Pituitobine, Splénar-mone, Splényl, Surrasténine, Vagotonine, Valériane, Vitadone, Vitaminol, Zomo-musculosine.*

- Lab. des Spécialités Cabasson**, 183, rue de Rome, Marseille. — *Cyto-Sirop, Dynosthène, Granulé Cabasson.*
- Lab. Caducia**, 12, square Delambre, Paris (XIV^e). — *Phosphan Caducia.*
- Lab. Caillaud**, 37, rue de la Fédération, Paris. — *Aldine, Choléo Combretol, Cyanhermine, Dioradin, Hydralin, Mucosodine.*
- Lab. Calmel-Domergue**, 20 bis, rue Gravelotte, Toulouse. — *Arsélonyl, Biiodures Domergue, Dermodiol, Ephédro-Rhinol, Eucalcine, Gonurol A. et B., Hexarubrine, Iodures Domergue, Pangynol, Pharyngaseptyl, Vaso-rhinol simple, Vaso-rhinol mentholé, Vaso-rhinol adrénaliné, Viscosodine.*
- Lab. des Calmosuppos**, La Mothe St-Héraye (Deux-Sèvres). — *Calmosuppos antithermiques, Calmosuppos sédatifs.*
- Lab. Camuset**, 18, rue Ernest-Rousselle, Paris. — *Hexotal, Pyrétane, Silicyl.*
- Lab. du Canol**, 39, rue de l'Arbalète, Paris. — *Canol.*
- Lab. Cantin**, Palaiseau (S.-et-O.). — *Comprimés Nican, Gouttes Nican, Somnothyrid.*
- M. J. Capin, Pharmacien**, Roquefort (Landes). — *Antiphi, Libérine.*
- Lab. Carbou**, 8, rue Jean-du-Bellay, Paris. — *Cholélyse.*
- Lab. Caresmel**, 2, qual Paul-Bert, Tours. — *Antonal, Lucodal.*
- Lab. Carlier**, à St-Florentin (Yonne). — *Colarsénol, Infangyl Carlier, Rectosote.*
- Lab. de la Carnine Lefrancq**, 32, av. de Metz, Romainville (Seine). — *Bov'Bilic, Bov'Cardiac, Bov'Hépatie, Bovstrol, Carnine Lefrancq.*
- Lab. Carrion**, 54, rue Fg St-Honoré, Paris. — *Adrénaline, Antasthène, Cardio-Streptine, Coliflorine, Dyspeptine Hepp, Entérocoque, Eukinase, Evalmine, Gonagone, Hémalloéthéroïdine, Hépaglycérol, Hépanème, Lactoprotéide, Oothérapie Carrion, Ovules au Gonagone, Pancréatokinase, Phlébosine M. et F., Plasma de Quinton, Réthropituine, Solution du D^r Jacobson, Staphylagone, Utéro-Streptine, Vaccins Carrion.*
- Lab. Carron**, 69, rue de St-Cloud, Clamart. — *Amiphène, Fosfoxyyl, Fosyls.*
- Lab. Carteret**, 15, rue d'Argenteuil, Paris. — *Bactioxyne, Célémol, Chrysemine, Diurène, Euronol, Lusoforme, Sinahin.*
- Lab. du Castanol**, 9, pl. Municipale, Tulle. — *Castanol, Dépuratif Santa, Thionaphie.*

- Lab. Castel**, 1, pl. Bouquerie, Nîmes — *Oxyfuge, Taenifuge, Vermifuge*.
- Lab. Catillon**, 3, bd St-Martin, Paris (III°). — *Glycérine Catillon, Iodo-thyroidine Catillon, Peptone Catillon, Strophantine Catillon, Strophantus Catillon*.
- Lab. du D^r R. Cavaillès**, 29, r. Singer, Paris. — *Bronchoplastre, Coloplastre, Crème du D^r Rap, Crème de Quinine, Sapolan, Émplatres Rogé-Cavaillès, Extrait du D^r Rap, Gaze Anadhère, Lait de Cèdre Sapolan, Lait de Sapolan, Lait de soufre Sapolan, Poudre de soufre Sapolan, Sapobarbe, Sapocade, Sapocrème, Sapolan, Sapopate, Savon de Sapolan, Sulfostan, Tisane dépurative de Cavaillès*.
- Lab. Central**, 129, rue de Turenne, Paris (III°). — *Lactaris*.
- Lab. Central de France**, 10, rue de Belfort, Rennes. — *Cigarettes Salva, Dermal Hanbro, Iodo Salva Evesque, Nucléal Hanbro, Poudre Salva, Pyal Hanbro, Rhino Salva, Verbenol Hanbro*.
- Lab. Central de Paris**, 122, fg. St-Honoré, Paris. — *Oléthyle-Benzyle*.
- Lab. Cesbron**, 63, rue de la Falsanderie, Paris. — *Gélor, Ioda*.
- Lab. Chaix**, 8-10, rue Alphonse-Bertillon, Paris (XV°). — *Colloïdogénine du D^r Bayle, Polyvaline du D^r Bayle, Splénique (extrait) du D^r Bayle*.
- Lab. Chalas**, 188 bis, av. de Neuilly, Neuilly-sur-Seine. — *Kolatinés*.
- Lab. P. Chambon**, 5, pl. Francheville, Périgueux (Dordogne). — *Antisciatique P. Chambon*.
- Lab. Chanteaud**, 3 et 5, rue Alex. Dumas, St-Ouen (Seine). — *Granules Chanteaud, Sedlitz Chanteaud, Sulphydrat Chanteaud, Uréol Chanteaud*.
- Lab. Chantereau**, 26 bis, rue Dombasle, Paris. — *Mucinum, Sympathyl, Tot'Hamélis*.
- Lab. Chapotot**, 56, bd Ornano, Paris. — *Néo-laxatif Chapotot, Rhizotannin Chapotot*.
- Lab. des Charbons Fraudin**, 4, av. Desfeux, Boulogne-Billancourt (Seine). — *Benzoate de naphтол Fraudin, Biscols, Carboiodure Fraudin, Charbon Fraudin naphтолé, Charbon Fraudin simple (granulés, comprimés, dragées), Laxol Fraudin*.
- Lab. Chartier**, Saumur (M.-et-L.). — *Le Raisin quotidien*.
- Lab. Chassaing Le Coq et Cie**, 1, quai Aulagnier, Asnières (Seine). — *Dioséine Prunier, Néo-neurosine Prunier, Neurosine Prunier, Novacéline Prunier, Phosphatine Falières, Poudre laxative de Vichy, Vin de Chassaing*.
- Lab. Pierre Château**, 137, av. Parmentier, Paris. — *Digéryl, Energétyl, Gélax, Inhalyl, Sinuzyl*.
- Lab. Chatelut**, 65, rue Louis-Blanc, Paris. — *Dragées Yse*.
- Pharmacie Chaumel**, 87, rue Lafayette, Paris. — *Isotonyl Bouret (poudre de Lausanne), Normatensol*.

- Etabl. Alfred Chauvin**, Aubenas (Ardèche). — Acoégénol, Atropophédrine, Collohirotol, Ergophédrine, Gouttes Chauvin à l'Audisclérocure, Gouttes Chauvin à la Sclérocure, Laborol, Lactoscoparine, Paratyl, Phocéol, Sirop de Sozopectone Ephédriné, Tubes Blache, Tubes Chauvin.
- Lab. L. Chauvin**, 3, r. de Vouillé, Paris (XV^e). — Asthmolène, Cachets Spévin, Sélor.
- Lab. Chavialle**, 70, Grande-Rue, Sèvres. — Fornose, Suppositoires Pyrax.
- Lab. Chevillon**, 99, rue de Paris, Massy (S.-et-O.). — Bilio-gastrine, Morisland, Nucléigène, Paradol-Paradoline, Stoméol Vichy.
- Lab. Chevetin-Lematte**, 52, r. La Bruyère, Paris. — (Voir Lab. Lematte et Boinot).
- Lab. Chiarini**, Aix-en-Provence (B.-du-R.). — Elixir vermifuge Chiarini, Taenifuge du D^r Jaquème.
- M. Chibret**, 5, rue St-Hérem, Clermont-Ferrand. — Collyres Chibret « Optima », Pommades ophtalmiques Chibret « Optima ».
- Lab. de « Chimie appliquée de Nanterre »**, 31, r. du Chemin-de-Fer, Nanterre. — Néotrophène.
- Lab. Choay**, 48, av. Théophile-Gautier, Paris. — Opothérapie Choay : Extraits totaux, Extraits injectables, Folliculine Choay, Gélotanin Choay, Peptosthénine Choay, Posthypophyse Choay, Syncrines Choay.
- Christiaens (Lab. de la Pharmacie de la Place-Royale)**, 2, rue du Champs-de-Mars, Reims. — Antialgos Christiaens, Benzophosphine Christiaens, Capsules Goubaux, Pilules anhépatiques Christiaens, Pilules prophylactiques Christiaens, Sédatine Christiaens.
- Lab. Churchill**, 12, rue de Castiglione, Paris. — Fosfomagnyl Churchill, Limol Churchill, Magol Churchill, Poliol Churchill.
- Lab. Ciba**, 109-113, bd de la Part-Dieu, Lyon (Rhône). — Agomensine, Androstine, Ascéine, Atoquinol, Cibalgine, Coagulène, Coramine, Dial, Dialacétine, Didial, Digifoline, Elbon, Ferrophytine, Fortossan, Fortossan irradié, Hémypnal, Lipotodine, Percainal, Percaine, Péristalline, Phytine, Quinino phytine Ciba, Résyl, Salène-Salenal, Sanoquinol, Sistomensine, Vioforme, Vioformol.
- Lab. du Cimarsényl**, 68, av. de Normandie, Colombes. — Cimarsényl.
- Lab. du Cimatriyl**, 4, pl. Royale, Nantes. — Cimatriyl, Héliatol (poudre et pommade).
- Etabl. C. I. P.**, 128, r. Vieille-du-Temple, Paris. — Dialine.
- Lab. Claverie**, 4, av. Brazza, Romainville. — Grogantigrip, Laborom, Stomobrol.

- Lab. Clin**, 20, rue des Fossés-St-Jacques, Paris (V°). — *Adré-naline Clin*, *Arsaminol*, *Arsénobenzènes*, *Aséphéine*, *Cinnozyl*, *Electrargol*, *Electraur*ol, *Electrocuprol*, *Electro Hg*, *Electromanganol*, *Electromartiol*, *Electropalladiol*, *Electro-platinol*, *Electro-Rhodiol*, *Electrosélénium*, *Elixir Deret*, *Enesol*, *Génisténal*, *Néo-Trépardénan*, *Odarsol*, *Padéryl*, *Salicylate de soude Clin*, *Scorogènes*, *Sérums Clin*, *Sirop Buci*, *Sirop d'Aubergier*, *Sirop Rabutteau*, *Sirtal*, *Soluro*l, *Sparto-Camphre*, *Sparloval*, *Vaccins Clin*, *Valimyl Clin*, *Vin Nourry*.
- Lab. du Clupeyl**, 69, av. Faidherbe, Malo-les-Bains. — *Clupeyl*.
- Lab. Cluzel**, 60, cours Emile-Zola, Lyon. — *Gouttes Milko*, *Micthualine*, *Révu*lsif Milko, *Tablettes Zéva*, *Tonique Zéva*.
- Lab. des Prod. Cognet** (Armingeat et Cie), 43, rue de Saintonge, Paris (III°). — *Agonol Cognet*, *Capsules Cognet*, *Dragées de fer Cognet*, *Dragées Dubourg*, *Hemoneuro*l Cognet, *Nuclarène Cognet*, *Pastilles et Poudre Paterson*, *Tiodine Cognet*, *Thiosinamine Cognet*.
- Lab. A. Goirier**, 69, av. du Maine, Paris. — *Clinogyne*, *Codérax*, *Gynoglandine*, *Marrucol*, *Olinex*, *Peroxyl*.
- Lab. Colas**, 133, r. Lecourbe, Paris. — *Baldisédan*, *Choléolax*.
- Sté des Prod. Collas et Boudault**, 35, av. de Beauté, Le Parc St-Maur (Seine). — *Pyrélaïne Collas*.
- Lab. Colonial**, 21, rue Mouton-Duvernet, Paris (XIV°). — *Mosti*, *Périol Soulié*, *Phosphonine Soulié*, *Tricophane*.
- Lab. Columeau**, 45, rue d'Aix, Marseille. — *Custodine*, *Poudre Cassarini*, *Tonapérine*.
- Lab. Comte**, 60-62, rue St-Guilhem, Montpellier. — *Bulles d'Haley*, *Marrubiase*, *Rythmosystol*.
- Lab. C. Cons**, rue des Ecoles, Chambéry. — *Juglane*.
- Consortium Scientifique**, 2, pl. Meissonier, Lyon. — *Procalcyl*.
- Lab. du Coprex**, 39, r. de Clichy, Paris. — *Coprex*.
- Lab. Coquelu**, Digoin (S.-et-L.). — *Compressif Beslier*, *Coakuplaste*, *Thermoplaste*, *Tulle rose Beslier*, *Vésicatoire Rose Beslier*.
- Lab. Corbière**, 27, rue Desrenaudes, Paris. — *Alcalinose*, *Broncho-Vaclydun*, *Coli-Vaclydun*, *Créagénol*, *Cytocholine*, *Cyto-manganol*, *Cytophédrine*, *Cyto-sérum*, *Cyto-Strychnine*, *Dermaline*, *Entéro-Vaclydun*, *Fixococcine*, *Gono-Vaclydun*, *Gynéco-Vaclydun*, *Hémo-cyto-sérum*, *Iolase*, *Lacto magnésie*, *Vita*, *Novarsénobenzol*, *Oléofor*mine, *Oliolase*, *Opolaxyl*, *Paludase*, *Praunase*, *Pyo-Vaclydun*, *Rhino-Vaclydun*, *Sérum anti-asthmatic* de Heckel, *Staphylo-Vaclydun*, *Strepto-Vaclydun*, *Suppositoires à l'arseno-benzol Corbière*, *Vaclyderm*.
- Lab. Cornaud et Brossard**, 1, rue des Cordouans, La Rochelle. — *Néveralgol Brossard*.
- Lab. Cortial**, 7, rue de l'Armorique, Paris. — *Androcalcion*, *Cortiode*, *Gynocalcion*, *Iodaseptine*, *Lita*, *Septicémine*, *Vitamine Cortial*.

- Lab. Cortot, 36, rue des Archives, Paris. — *Angiosédine*.
- Lab. Coudert, 116, av. Ledru-Rollin, Paris. — *Hémostatique Coudert*.
- Lab. Coulloux, 116, rue du Pont, Auxerre. — *Sirop Brahma*.
- Lab. Cousin, rue Albert 1^{er}, Beaumont-sur-Oise. — *Eugaline, Hépatergol*.
- Lab. G. Coussinet, 20, rue des Martyrs, Paris. — *Bursol, Codocol, Opatonine, Sulfolax, Utersan, Vagosedyl*.
- Lab. Couturieux, 18, av. Hoche, Paris. — *Anti-paludique, Argolion, Arsenion, Aurion, Avanazol, Azufrol, Bismulthion, Bromiase, Cidrase, Collargol, Cuprion, Cytuline, Diurétique, Fébrifuge, Fer-ion, Glésol, Glycolactimase, Héracléine, Hydrargyrion, Iodurase, Lactimase, Lantol, Levurine extractive, Levurine brute, Métaux colloïdaux, Œnase, Panglandine, Plurion, Polyformiate, Sélénol, Selvan, Spasma, Stanion, Sulfurion, Thyroïdine*.
- Lab. de la Créoformine, 18, r. de Jouvence, Dijon. — *Créoformine*.
- Lab. Crosnier, 44, rue de Lagny, Montreuil (Seine). — *Morubiase, Neuroflorine, Sirop Minéral sulfureux, Sufrolax*.
- Lab. Grouy, Vernon (Eure). — *Urophényl*.
- Lab. Cruet, 13, rue Miollis, Paris. — *Arcanan, Atophan Atophanyl, Synthaline B*.
- Lab. Cuguillière, 19, rue des Chalets, Toulouse. — *Sérum végétal, Vin Pyrola*.
- Lab. de la Curatine Brunet, 23, rue des Ecouffes, Paris. — *Curatine Brunet*.
- Lab. du Curogène (D^r J. Galimard), 145, r. Yves-le-Coq, Versailles. — *Curogène, Mucobismulthine*.
-
- Lab. Daguin, 7-13, rue Bobillot, St-Maur (Seine). — *Choléolactol, Novo-Lactol, Pneumostyl, Purganol*.
- Lab. Dalayeun, 15, rue de Paris, Sannois (S.-et-O.). — *Sulfan*.
- Lab. Dalin, 49, quai St-Vincent, Lyon. — *Cérébrosthénine, Glycocarpine, Kydalose*.
- Lab. Dalin (R. Boitias et Cie), 1, r. de la Martinière, Lyon. — *Ampoules « Gay Lussac », Cyanhermyl, Thio-Terpine Dalin*.
- Lab. Dalloz et Cie, 13, bd de la Chapelle, Paris. — *Antalgol, Glycérphosphale, Gosiérine, Hémoglobine, Tridigestine*.

- Lab. Daniel Brunet**, 62, bd Jean-Jaurès, Boulogne-s-Seine.
— *Algostérine*, *Biocéane*, *Cholergine*, *Coréine*, *Cytomagnésium*, *Hépatine Gad*, *Hépato-Byl*, *Hétérolysine*, *Mégathion*, *Neurène*, *Novo-Brol*, *Ostéo-hépatine*, *Ovobiol*, *Ovothyrol*, *Pulvita*, *Sérum Oliviero*, *Stal Kosal*, *Taenifuge Hirn*, *Tanno-Calcine*.
- Lab. Danjou**, 28, rue de l'Hôpital-Militaire, Lille (Nord). — *Anapeptone*, *Pepto-Magnésie Vassal*, *Peptone Vasal*.
- Prod. Dannech'h (MM. Brun et Martineau)**, 64, rue des Tournelles, Paris. — *Cachets Phébor*, *Chloridia*, *Cigares Gicquel*, *Elixir du D^r Thermes*, *Laxia Dannech'h*, *Manganésia*, *Papier Gicquel*, *Tritonine*.
- M. J. Dardelet**, Bonnard (Yonne). Tél. 4. — *Babeurre Dardelet*, *Laits Dardelet*.
- Etabl. Darrasse**, 13, rue Pavée, Paris. — *Pepto-fer du D^r Jaillet*, *Tamar Indien Gillon*, *Valérobromine Legrand*.
- Lab. Darrasse**, rue St-Maure, Nanterre. — *Choléine Camus*, *Choléine lactique*, *Dragées Séranti*, *Eupnine Vernade*, *Lactobaciline*, *Magécarine*.
- Lab. Daupez**, 37, rue des Lois, Toulouse (Hte-Gar.). — *Baume Fuba*, *Gouttes Pectiques du D^r Albert*, *Myoden*, *Nasogyne*, *Pantaxyl*, *Santaline Daupez*, *Sirop Kérída*, *Sirop Pectiline*.
- Lab. Dausse**, 4, rue Aubriot, Paris. — *Camphodausse*, *Fondants de soufre*, *Gouttes Phosphosthéniques*, *Hémogénol*, *Hormodausse*, *Hespéridausse*, *Intrails*, *Moréthyl*, *Pa-veron*, *Sérodausse*.
- Lab. du D^r Debat**, 60, rue de Monceau, Paris. — *Androsthénol*, *Filtrat Inosepta*, *Hépacrine*, *Hépapeptine*, *Inogyl*, *Inoren ol*, *Inorhinyll*, *Inosepta*, *Inosepta ophthalmique*, *Inosph acéol*, *Inosplenol*, *Inotyol*, *Inoxemol*, *Inoxyl*, *Insevaccin*, *Pancrinol*, *Pommade Inseva*, *Provitilol*, *Sedotyol*.
- Lab. Dechatre**, 20 bis, r. Sergent-Godefroy, Montreuil-sous-Bois. — *Boroseptine*, *Bronchoforme*, *Granulé Sabel*, *Hormotensyl*, *Inhaphone*, *Pastille Sabel à la codéine*, *Plasmastyl*, *Rhinostagone*, *Sédophoryl*.
- Lab. du Décholestrol**, M. et P. Ledent, Pharmaciens, Montreuil-sur-Mer (P.-de-C.). — *Décholestrol*.
- Lab. Déchosal**, 39, rue de la Gare, Bondy. — *Aldor formogène*, *Néo-ricin*, *Opo-Vacuoline*, *Rhumatoidine*, *Vacuoline*.
- Lab. Deffarge**, 2, rue Lauzac, Bordeaux. — *Nucléocardyl*, *Panvita*, *Vitacrines*.
- Lab. Defresne**, 19, r. Jacob, Paris. — *Pancréastase Defresne*.
- D. G. C.**, 11, rue Ant. Bourdelle, Paris (XV^e). — *Voha*.
- Lab. Deglaude**, 15, bd Pasteur, Paris. — *Cardibaïne*, *Digibaine*, *Theoxantine*, *Spasmosédine*.
- Lab. Dehaussy**, 66, rue Nationale, Lille. — *Anti-asthmine*, *Biocalcium*, *Capsules et sirop Préga*, *Céréossine*, *Cré-*

done, Crypthermol, Diastogène, Entérobyl, Formobenzyl, Gladyl, Hermarsinol, Hermomulhol, Houmyl, Leucosérum, Sédoneurol, Sinrénaline.

Lab. Déjardin, 10, rue Parent-de-Rozan, Paris. — *Extrait de malt français Déjardin, Laxatone Déjardin, Levuro-Maltine Déjardin, Malt français Déjardin, Mycodermine Déjardin, Peptomaltone Déjardin.*

Lab. Delalande et Cie, 16, rue Henri-Regnault, Courbevoie, — *Baume Suella, Ephédrocamphre, Esculéol, Neuroplasma Fort, Neuroplasma Massif, Neuroplasmine, Polyminéral, Sal-Sodyl, Solucamphre, Solucamphre Associations, Solucamphre spartéine, Sulfocadol, Suppos. à l'Esculéol.*

Lab. du Dr L. Delalbre, 2, r. Claude-Matrat, Issy-les-Moulineaux (Seine). — *Adipolysine, Dermo-rhinhistol, Grains Céphalgifuges, Humoro-Stabiline, Sthénoléine.*

Pharmacie Delaprée, Mortagne-sur-Sèvre (Vendée). — *Baumix, Liquidix.*

Lab. Delfour, Pouillon (Landes). — *Oléo-mel laxatif.*

Lab. Delouche, Pharm., 32, rue Marius-Aufan, Levallois-Perret. — *Curoraisin.*

Lab. du Delta, 84, rue Rochechouart, Paris. — *Arcica, Calcivitam, Calmaby, Kodos, Névol Fréval, Onguent Fréval, Percalcine, Seignel' Fruits.*

Lab. Demasles, 5, pl. Miremont, Vienne (Isère). — *Atihal, Biogénol, Crinhémol, Hématogénine, Ménosédine, Myrtiline, Phospholéose, Sédospasmine.*

Lab. Denis, 85 bis, rue du Ranelagh, Paris. — *Glottyl, Rhino-Glottyl.*

Lab. Denisot, 19, rue de Fleurus, Paris (VI*). — *Carbolactyl simple, Carbolactyl bilié, Cervol, Hémosédine, Opophos.*

Lab. du Dr Densmore, 25, rue Dagorno, Paris. — *Bioplastine Serono, Esanofèle, Endo-Ovarina, Endoxidine, Sels de Montecatini, Néoiacol ISM, Paragangline Vassale, Viroglan et toutes préparations de l'Institut Sérothérapique de Milan (opothérapie et Vitamines Ferments, Métaux Colloïdaux, Produits Chimiothérapiques et Antiluétiques), Raphanose du Prof. Gerhardt.*

Lab. Deodax, R. Renaud, Anould (Vosges). — *Sinapol, Thermalgol.*

Lab. Depruneaux, 18, rue de Beaune, Paris. — *Antigel, Ciproveinol, Diemenal, Dienol, Dragées Elkin, Granules Elkin, Hypophédrine, Normalarine, Soderséine.*

Lab. de la Dermofagine (L. Saglot), 15, pl. Godefroy-de-Bouillon, Boulogne-sur-Mer. — *Dermofagine, Dyspepsia, Dyuril, Holocalcine, Raiforyl.*

Lab. Deschiens, 9, rue Paul-Baudry, Paris. — *Hémoglobine Deschiens, Hépathémo, Holos.*

Lab. Descouraux et fils, 52, bd du Temple, Paris. — *Chloro-Magnésion, Dragées Lumeval, Ovules Vézès, Tensoryl D, Tryclène.*

- Lab. du Détensyl, 8, av. Walkanaer, Nice. — *Détensyl*.
- Lab. Dexo, 23, rue Danton, Paris-Levallois. — *Biovitai*, *Bismokaol*, *Collunovar*, *Dexogyne*, *Laximanne*, *Thyméphédrine*, *Uroquinol*.
- Lab. du Diasclérol, 26, r. de Norvins, Paris. — *Diasclérol*.
- Lab. de la Digastrine, 11, r. St-Agricol, Avignon. — *Digastatine*.
- Lab. du Dolophos, 61, rue de St-Quentin, Caudry (Nord). — *Dolophos*.
- Lab. Charles Domergue, Agen (L.-et-Gar.). — *Antifuronculeux D.*, *Crayons antifissure Domergue*, *Elixir vermifuge Allvers*, *Gatercodéine*, *Naso-Sulfolarsan*, *Prunine Sentini*, *Sirop Sentini*, *Valérothéine*.
- Lab. du Donagol, Péronne (Somme). — *Donagol*.
- Lab. Dor (M. Dorantowicz, Pharmacien), 17 bis, av. Parmentier, Paris. — *Alcamfétol*, *Benzylocalcium*.
- Lab. Dorantowicz, 17 bis, av. Parmentier, Paris. — *Chéloïdine*, *Curiode*, *Hormobiline*, *Mésosome*, *Morrhualène* *Gauthier*, *Panfébrine*, *Stomophile*.
- Lab. P. Dordin, Harnes (P.-de-C.). — *Algosédine*, *Cachets Aspéca*, *Cachets Urby*, *Kératoplastol*, *Rhinadrargol*.
- Lab. de la Dosurine, 16, rue Charlemagne, Paris. — *Dosurine* (Trousseau).
- Lab. Douetteau, 20, r. du Fg St-Honoré, Paris. — *Astasol*, *Neurovarol*, *Organésium*, *Sédasix*, *Vacciphages*.
- Lab. Dreyer-Dufer, Villiers-sur-Marne. — *Anurique Dupleix*, *Iodophosfer Dupleix*.
- Lab. Dronet et Plet, 37, rue de Marly, Rueil-Malmaison (S.-et-O.). — *Anexol*, *Byliérine*, *G. 40*, *Magnésiehydratée*, *Néo-physio*, *Oxyléine*, *Ozobiase*, *Ozobiase opothérapique*, *Phososome*, *Phospirine*, *Physiosthénine*, *Plombyl*, *Quinéase*, *Rosalyl*, *Salysérum*.
- Sté Française du Dryco, 5, rue St-Roch, Paris. — *Dryco* (lail sec). *Vitagermine*.
- Lab. du Dr Dubat, 80, fg St-Denis, Paris. — *Comprimés Rhinol*, *Ouate Rhinol*, *Pommade Rhinol*, *Sangule*, *Saturaline*, *Seccase*, *Théisine*.
- Lab. Dubois, 16, bd Péreire, Paris. — *Cardialgine*, *Campho-Spartéine*, *Codarsyl*, *Collo-iode*, *Oléoiode*, *Iodotensyl* *Dubois*, *Uroquinase*.
- Lab. Duc, 24, av. Mac-Mahon, Paris. — *Bleusantal*, *Cèdrel Bel*, *Dragécalcion*, *Injection orientale*, *Pommade Jahnson*, *Rongicor*, *Sirop Avel*, *Tablettes Stuart*.
- Lab. Ducatte, 31, rue des Francs-Bourgeois, Paris. — *Entéro-antigènes Danysz*, *Paratoxine*, *Sclérollysine*.
- Lab. Ducloy et Cie, Arques (P.-de-C.). — *Boldo-Biline*, *Bradygastrine*, *Lactogelose*, *Lichénose*, *Sarcoglobine*, *Tachygastrine*.
- Lab. Ducoq, Langeais (Indre-et-Loire). — *Iode Hamamelis* *Ducoq*, *Vulnérine*.

- Lab. Dufayard**, 12, rue des Saints-Pères, Paris. — *Gheralys, Urosan.*
- Lab. Henri Dufour**, 40, rue des Carmes, Orléans (Loiret). — *Apsophol, Codéphryl, Dymozyl, Edistol.*
- Lab. du D^r E. Duhourcau**, 6, rue Louis-Blanc, La Garenne-Colombes. — *Dragées anticalarrhales du D^r Duhourcau, Gastricine du D^r E. Duhourcau, Tœnifuge français du D^r E. Duhourcau.*
- Lab. Dulcis, D^r Ferry**, place Clichy, Monte-Carlo. — *Alcaloïdes seuls et combinés, Argolène, Cadmiol zinc, Cuprinol, Iodo-calcique, Iodo-Rubidium, Ichtyol zinc, Myosine forte et faible, Mydriasine, Novoptine oxyde orangé de Hg, Ophthalmoforme, Tubes Dulcis.*
- Lab. Dumesnil**, 10, rue du Plâtre, Paris. — *Aseptampoules Dumesnil, Crémo-plastol Dumesnil, Dépuratif Dumesnil, Dermoplastol Dumesnil, Géligrème Dumesnil, Girasiol Dumesnil, Huile au calomel Dumesnil, Mugrizol Dumesnil, Théobromose Dumesnil, Zébo-plastol Dumesnil.*
- Lab. Dumesny**, 18, rue de Maubeuge, Paris. — *Cigarettes antiasthmiques du D^r Clery, Poudres antiasthmiques du D^r Clery. Pastils Meran.*
- Lab. M.-L. Durand**, 28, rue de Seine, Paris. — *Gravural.*
- Etabl. du D^r Durand**, 6, av. Foch, Gaillac (Tarn). — *Vin Lux Gaillac mousseux.*
- Lab. Duret et Rémy**, 13 bis-15, rue des Champs, Asnières. — *Bis-Ka-Ma, Choléokinase, Comprimés d'Alibour, Hépatosodine, Nyctal, Peptonal, Polypeptonal, Saturol, Thaolaxine, Zoocytine.*
- Lab. E. Duriez**, 20, pl. des Vosges, Paris. — *Chloral bromuré Elixir Ducro, Quinoïdine.*
- Lab. A. Duteil**, 90, av. de St-Ouen, Paris. — *Elixir Hymel, Quinorhéine Duteil, Spasalgique Duteil, Suppositoires Hymel.*

Sté des Eaux minérales de Decize, 49, bd de Port-Royal, Paris. — (Source) Saint-Aré.

Lab. Echeman, 26, rue des Moines, Paris (XVII^e). — *Camphocalyptol, Eupnol (pastilles et poudre), Eupnoléine (ampoules et solution), Eupnophédrol, Osmoléine, Pulvinasol, Stovoléine.*

Lab. de l'Elocine, 51, r. du Ranelagh, Paris. — *V. A. V.*
Soc. de l'Embryonine Barré, 10, pl. Thiers, Le Mans (Sarthe). — *Pangermine.*

- Lab. de l'**Endopancrine**, 48, r. de la Procession Paris (XV^e). — *Endopancrine, Endothymusine, Holosplénine, Holo-varine, Insuline* (voir *Endopancrine*), *Insuline Phyloze* (poudre et pommade), *Vitaglyc*.
- Lab. de l'**Entériode**, 39, r. de Clichy, Paris (IX^e). — *Entériode*.
- Lab. **Eon**, 3, rue des Rouairies, Dinan (C.-du-N.). — *Derméon, Pommade et suppos. Eon, Psoréon, Pulmicure*.
- Lab. **Eparvier**, 26, Gde-Rue St-Clair, Lyon. — *Boldoïne, Cascara, Ferroxyline*.
- Lab. de l'**Ephédrolénol**, 24, bd Jean-Jaurès, Boulogne (Seine). — *Ephédrolénol, Ephédrolénol dédoublé, Ephédrolénol pommade, Kinebyl*.
- Lab. de l'**Eranol**, 45, rue de l'Echiquier, Paris. — *Eranol*.
- Lab. de l'**Ergépatine**, Arnault, St-Just-en-Chaussée (Oise). — *Plasmocalcium*.
- Lab. de l'**Ergocoline**, 32, rue de l'Ouest, Paris. — *Biopausine*.
- Lab. de l'**Erythéma**, 200, Gde-Rue, Maisons-Alfort (Seine). — *Androvar, Erythéma*.
- Lab. **Escouflaire**, Baisieux (Nord). — *Cigarettes anti-asthmiques Escouflaire n^o 1 et 2, Poudres anti-asthmiques Escouflaire n^o 1 et 2*.
- Lab. **Ethel**, 132, rue du Fg St-Denis, Paris. — *Malt Ethel*.
- Lab. général d'**Etudes biologiques**, 29, pl. Bossuet, Dijon (Côte-d'Or). — *Doloma, Œnophos, Protéodyne injectable, Protéodyne dragées*.
- Lab. de l'**Euphysol**, 22 bis, av. de St-Cloud, Versailles. — *Euphysol* (tisane, pastilles, cachets).
- Lab. **Evine**, 16, r. Barbette, Paris (III^e). — *Ovules Evine, Poudre Evine, Poudre Pélevine, Thé Evine*.
- Sté Française d'Extension bio-chimique**, 2 bis, rue du Chevalier-de-la-Barre, St-Quentin. — *Boromyl, Gabiol, Halocure, Stomoxygène*.
- Lab. **Fabre**, 33, rue de la Hale-Coq, Aubervilliers (Seine). — *Caséone Fabre, Ferments lactiques Fabre, Lacto-Coaguline Fabre*.
- Lab. **Fabre**, 112, r. des Pyrénées, Paris. — *Lynévol, Uro-tisan*.
- Lab. **Fagard**, 44, rue d'Aguesseau, Boulogne-sur-Seine. — *Antiasthme Bengalais, Barèges Fagard, Capsules d'Euviscol, Cigarettes Schulzé, Elatine Bouin*.
- Lab. **Falque**, Besançon. — *Entéryl, Stimyl, Tréparsinyl*.
- Laboratoires. P. Famel**, 20-22, r. des Orteaux, Paris (XX^e). — *Optraex, Sirop Famel*.

- Lab. des spécialités Farma, 64, r. d'Orsel, Paris (XVIII^e). — *Gynsol, Phosiodine, Val'ovarine.*
- Lab. Faure et Dussuel, 15, av. de Marlioz, Aix-les-Bains. — *Elixir Bonjean, Euphorine du D^r Chaboud, Magnelax. Le Sinaplasme, Tannurgyl.*
- Lab. Faure, 83, bd de la Villette, Paris. — *Neuropol, Sels Intra.*
- Lab. Favrichon et Vignon, Saint-Symphorien-de-Lay (Loire). — *Céréales Bébé Favrichon, Céréales granulées, Farines mâtées, Phosphogène Favrichon.*
- Lab. Feignoux, 95, r. de Turenne, Paris (III^e). — *Névorol, Ovarine Tiey.*
- Lab. du Feminadène, 120, rue Lecourbe, Paris. — *Femina-dène, Laxatif Coprex, Viradène.*
- Lab. Fercocq, St-Maur (Seine). — *Pulmogrog, Hémocalcine.*
- Lab. G. Fermé, 55, bd de Strasbourg, Paris. — *Muthanol, Néolyse, Psiothanol, Soluthanol, Staphylotanol, Tri-radol, Urolan, Viscosérum.*
- Ferme de Lafaye, Marlhès (Loire). — *Babeurre Lafaye.*
- Lab. de la Fer-ovarine Vitalis, 38, bd de Charonne, Paris. — *Fer-ovarine Vitalis.*
- Lab. du D^r Ferré, 6, rue Dombasles, Paris. — *Broncho Favrot, Dismine Favrot, Hémoduol, Immunicorps, Pulsamone, Rhino-spécifique, Sirop Lamouroux, Tonique Favrot.*
- Lab. E. Ferré, 19, rue Grégoire-de-Tours, Paris. — *Iodures L. Foucher, Litharsyne, Poudre Rocher laxative, Sucre Edulcor.*
- Lab. du D^r Fialip, 23, av. de la Motte-Picquet, Paris. — *Oxy-injecteur du D^r Fialip.*
- Lab. Fisch et Cie, 4, rue d'Illzach, Mulhouse (Haut-Rhin). — 104, fg Poissonnière, Paris. — *Bains carbogazeux Wolo, Baumolacpinine, Cellona, Chlormagnésium, Chymosine Fisch, Elastoplaste, Empyrol, Fango Fisch, Lacpinine Fisch, Optiplaste, Poudre Orl, Prévalidine, Recytèle, Sulfocrème, Thiorubrol.*
- Lab. Flahaut, 74, r. Monge, Paris. — *Acépile, Anadiposine Laxoil, Sulfodermol, Terpène granulée Baron.*
- Lab. du Fluosalyl (M. Beaugourdon), 43, av. Kléber, Paris. — *Crème Lygie, Fluol, Fluosalyl Beaugourdon, Pâte Magali, Sirop Magali.*
- Lab. de la Fluxine et des spécialités pharmaceutiques Jacquemaire (Bonthoux, Pharmacien), 42 bis, rue Pasteur, Villefranche (Rhône). — *Evonyl, Fluxine. Formule Jacquemaire n° 60, Verrulyse.*
- Lab. du Fokiényl, 94, r. Pasteur, Fontenay-sous-Bois. — *Fokiényl.*
- Lab. Paul Fontanier, Moulins-sur-Yèvre (Cher). — *Algbiogyl, Algilaxine, Algovitine, Curalgine, Gaduine algovitine, Gastrosalvine, Phosbiogyl, Phytalgine, Pulmovitine, Radiovitine, Ultrasténil, Ultravitine.*
- Lab. du Forcival, 6, r. Bridaine, Paris. — *Forcival.*

- Lab. Fortin, 109, rue de Sèvres, Paris. — *Anticalcine*, *Hylol*, *Kolaine*, *Nervosédol*, *Opothérapie*, *Phleboveinol*, *Sphygmine*, *Thylargol*.
- Lab. Fosset, 21, Grande-Rue, Montfermeil (S.-et-O.). — *Cytopulmase*, *Pectobiol*, *Sympathoriane*, *Vagoriane*, *Viscodermine*, *Viscoveïne*.
- Lab. Fouard, 61, r. Gaston-Lauriau, Montreuil (Seine). — *Les granions de Fouard*.
- Lab. Fouché, 2, bd. Pershing, Paris. — *Chlorhydrol*, *Cicabi*, *Magistère de Bismuth*, *Québralgine*.
- Lab. H. Foucher, 77, bd de Grenelle, Paris. — *Copraxe*, *Elixir Héla*, *Entérohépatine*, *Gastérinase*, *Muxyl*, *Neuricure*.
- Lab. Fouchère, Rive-de-Gier (Loire). — *Agobyl*, *Benzo-carbine*, *Biodynol*, *Fluerase*, *Produits Maïas*.
- Foulon et Cie Pharmaciens, 20, fg Poissonnière, Paris. — *Colhépatyl*, *Cuscutine*, *Inshépatyl*, *Lutéovar*, *Valéramyl*.
- Lab. Fournie, 3 pl. Miséricorde, Lyon. — *Quina Baron*.
- Lab. A. Fournier et Cie, 147, bd de Montparnasse, Paris. — *Cérébrine Fournier*.
- Lab. Fournier frères, 7, rue Biscornet, Paris. — *Bileyl*, *Bio-lactyl*, *Crino-Menstryl*, *Crino-Sthényl*, *Opothérapie Fournier*, *Ovaire Fournier*, *Physocrisine*, *Sanaféine*, *Splenocrisine*, *Vaccins*, *Vasolaxine*.
- Lab. Fraisse Père et Fils, 8, rue Jasmin, Paris. — *Camphro-Salyl Fraisse*, *Fer intraveineux Fraisse*, *Gouttes hypotensives Fraisse*, *Iodo bismuthate de quinine Fraisse*, *Sérum Névrosthénique Fraisse*, *Sérum hypotensif Fraisse*, *Sol-Bi Fraisse*.
- Lab. du D^r Fraysse, 21, r. de Neuilly, Nanterre. — *Arthridol du D^r Fraysse*, *Energinoïse du D^r Fraysse*, *Folliholine*, *Hypophydose du D^r Fraysse*, *Opothérapie Associée du D^r Fraysse*, *Revitalose du D^r Fraysse*, *Séripol*, *Stomacurine*.
- Lab. du Frénasma, 71, r. St-Blaise, Paris (XX^e). — *Mimophé-drine*, *Frénasma*.
- Lab. Freyssinge, 6, rue Abel, Paris. — *Capsules Dartois*, *Céthocal*, *Chloramine*, *Neurosthénine*, *Polyphorine*, *Freyssinge*, *Quassine Frémint*, *Salicol Dusaule*.
- Société des Fructines Vichy, 5, pl. des Ternes, Paris. — *Fru-geolines-Vichy*.
- Lab. Fumouze et Cie, 78, faub. St-Denis, Paris. — *Baume Lartigol*, *Capsules Raquin*, *Globules Fumouze*, *Ovules Chaumel*, *Poudre Chaumel*, *Sirop Cassibor*, *Suppositoires Chaumel*.

- Lab. Galbrun, 8-10, rue du Petit-Musc, Paris. — *Aristargol*, *Iodalose Galbrun*, *Prosthénase Galbrun*.
- Lab. R. Gallier, 38, bd. Montparnasse, Paris. — *Arhéma-pectine Gallier*, *Basedowine*, *Hidoline*.
- Etabl. Gallina, 4, rue Candolle, Paris. — *Huile Gallina*, *Iodentérol*, *Iodhéma*.
- Lab. Gamby-Wisse, pl. de l'Hôtel-de-Ville, Salon de Provence (B.-du-R.). — *Jouvamelys*, *Milkase*, *Sirop pectoral du Dr Pyot*.
- Lab. Clément Gardiol, 6, rue Félix-Pyat, Marseille. — *Urosalyl*.
- Lab. du Gastrhema, 71, r. St-Blaise, Paris (XX^e). — *Gastrhema*, *Mimophédrine*.
- Lab. du Gastrocarbone, Saint-Louis (B.-du-R.). — *Bisalicylate Gastrocarbone*, *Manganoglobine*.
- Lab. J. Gautier, 42, rue Emile-Deschanel, Courbevoie. — *Gambéol*, *Comprimés de Proto-Gambier*, *Ganderma*, *Salvatyl*.
- Lab. Gavin. Vimoutiers. — *Sirop Lecœur*.
- Lab. Genevet, 29, rue des Marchands, Avignon. — *Kinechol*.
- Lab. Génévrier, 45, rue du Marché, Neuilly-sur-Seine. — *Adolan*, *Alepsal*, *Bis-Hyd*, *Boues radioactives de Pistyan-les-Bains* (Tchécoslovaquie), *Beurinase*, *Tetramagnésium*, *Panstomase*.
- Lab. Gerda, 163, bd Croix-Rousse, Lyon (Rhône). — *Arvensyl*, *Calsédine*, *Gerdabyl*, *Nevrithone Daclin*, *Pulmolaxol*, *Sodolactine*.
- Sté Ch. Gervais, 11, r. de Prony (XVII^e). — *Carnet de Santé Gallia*, *Galliasec*, *Lait Gallia*.
- Etabl. Géo Gignoux, Usine et Bureaux à Savigny-sur-Orge (S.-et-O.). — *Géo Baryum*.
- Lab. des Prod. du Dr Gigon, 25, bd Beaumarchais, Paris. — *Cétrarose*, *Sédatorose*, *Tribromure*, *Ulmariène*, *Valérianose*.
- Lab. Gilbert, 6, rue du Laos, Paris. — *Agaricine Clauss*, *Artérase*, *Bilolive*, *Forcéase*, *Nazinette*, *Pilules Clauss*.
- Lab. A. Girard, 48, rue d'Alésia, Paris. — *Caséoline*, *Glycérophosphate de Chaux granulé Girard*, *Nucléofer Girard*.
- Lab. Givaudan, 56, chem. de Combe-Blanche, Lyon. — *Glyphospher*, *Hipposarcine Roy*, *Huile de ricin Orolas*, *Salurol*, *Sel de fruit Crolas*.

- Lab. des Gloxines**, 6 bis, rue Campagne-Première, Paris. — *Gloxines*.
- Lab. Gmet**, 27, rue du Faubourg-Montmartre, Paris. — *Boldo Gmet*, *Composé Gmet*, *Condurango Gmet*, *Crataegus Gmet*, *Diurétique Gmet*, *Dragées Gmet*, *Extrait Hamyd*, *Frêne Gmet*, *Fucus Gmet*, *Gui Gmet*, *Hamamélis Gmet*, *Hydrastis Gmet*, *Jugland Gmet*, *Kola Gmet*, *Piscidia Gmet*, *Quinquina Gmet*, *Valériane Gmet*, *Viburnum Gmet*, *Sauge Gmet*, *Ulmaire Gmet*.
- Lab. P. Godfrin**, 5, av. Watteau, Nogent-sur-Marne. — *Limonade Godfrin*.
- Lab. du Gomenol**, 48, rue des Petites-Ecuries, Paris. — *Gomenol*, *Gomenolé* et tous produits au *Gomenol*.
- Prod. Gonnon**, 14, rue Victor-Hugo, Lyon. — *Antidiabétique Monavon*, *Cacodyle Gonnon*, *Créosote soluble Vacheron*, *Eupeptique Monavon*, *Irénine Gonnon*, *Hola Monavon*, *Lecithine Vacheron*, *Polybromure Gonnon*, *Polyiodure Gonnon*, *Sirop de créosote Vacheron*, *Sirop de glycérophosphates Vacheron*, *Sirop de Lovel*, *Sirop Vacheron au gaiacol*, *Suppositoires Gonnon*, *Terpine Gonnon*, *Tonicardine Gonnon*, *Tonique Gonnon*.
- Lab. Gouin**, 20, r. des Ecoles, Paris. — *Avantol*, *Cuprénone*, *Prométhine*, *Gouttes P. A. S.*
- Lab. Gouzène**, 139, rue de Paris, Pantin. — *Aloysine*.
- Lab. Gouzerb**, 5, pl. Bisson, Lorient. — *Movébil*.
- Etabl. Goy**, 23, rue Beautreillis, Paris. — *Calcisan Cachets*, *Comprimés et Gouttes Magalo*, *Comprimés et Gouttes Notal*, *Elixir Goy*, *Fer Larcade*, *Globules et Granulé Chomet*, *Hémostatique Goy*, *Inhalation Goy*, *Narizol*, *Panol*, *Pastilles M. B. G.*, *Pâte Goyer*, *Pimpinol*, *Primulyse*, *Reclusol*, *Saturateur Chomet*, *Seneçol*, *Sirop Chalin*, *Thiocosyl*, *Urosidal*, *Vin William*.
- Lab. Grandval**, Quirin succ., 12-14, rue Féry, Reims (Marne). — *Eugynol Grandval*, *Hamamelis Grandval*, *Cénoquinol Grandval*, *Potion Grandval*, *Quinquina Grandval*, *Kina coca kola Grandval*, *Quinarsol antianémique Grandval*, *Quinarsol fébrifuge Grandval*.
- Lab. Grémy**, 14, rue de Clichy, Paris. — *Diasténine*, *Epidosine Grémy*, *Eutensyl Grémy*, *Follestrine Grémy*, *Immuniderm Grémy*, *Immuniperos Grémy*, *Immuniphages Grémy*, *Immunizols Grémy*, *Ocréine Grémy*, *Thyrénine Grémy*, *Thyrocréine Grémy*.
- Lab. Grias**, 47, rue Féray, Corbeil (S.-et-O.). — *Verticurine*.
- Lab. Grignon**, 2, rue Duphot, Paris. — *Eniode Lefebvre*, *Valérianate Grignon*, *Pâte de Terpine Guédet*.
- Lab. Grorichard**, 12, pl. de la Révolution, Besançon. — *Comitiol*, *Magnésium Grorichard*, *Métrostyptal Grorichard*.
- Lab. Gros**, 13, pl. Delille, Clermont-Ferrand. — *Capsellase*, *Diurocalcine Gros*, *Diurocalcine iodurée*, *Hergénol Sanomint*.

- Lab. Grysa**, 7, r. St-André, Le Mans (Sarthe). — *Cinéyl, Sylcase.*
- Lab. André Guerbet et Cie**, 22, rue du Landy, St-Ouen (Seine). — *Lipiodol Lafay, Lipiodol « F », Ténébryl.*
- Lab. Guéret**, rue des Cordeliers, Meung-sur-Loire (Loiret). — *Anoxyne, Comprimés Kléos, Pommade Kléos.*
- Lab. P. Guérin**, 58, rue Basse, Meulan (S.-et-O.). — *Ferrocaltine, Vascurol.*
- Lab. André Guillaumin**, 13, rue du Cherche-Midi, Paris. — *Acésine, Comprimés Guillaumin, Cyanargyre, Bovargyre, Théosalvose, Vanadarsine.*
- Lab. Guillaumin et Gérard**, 12, rue Charles-V, Paris. — *Prodynase.*
- Lab. de la Guimelinde**, Ancenis (L.-Inf.). — *Guimelinde.*
-
- Lab. Paul Hardy**, 42, bd St-Marcel, Paris. — *Bil-flux, Borsalyl, Cèdre bleu, Collyre de l'Hotel Dieu, Jécosfluy, Magnésium Hardy, Neutracid, Oliricyl Hardy, Pan-carbo, Polypnal, Pulmonaire Bourgogne.*
- Lab. Hautdider**, 37, rue Galilée, Paris. — *Benzylol, Dentoxyl, Gastérol, Hématogénol, Iénol, Inhalax, Iodométine, Magnésol, Orthobiline, Sirop Dubreuil, Triferyl, Uvéphorine.*
- Lab. Henry**, 39, r. de Sclessin, Liège (Belgique). — *Arsenof Henry, Bromovaleron Henry, Bronchital Henry, Cascara Henry, Chloro-magnésium Henry, Digestif Henry, Disménine Henry, Fer Henry, Kino pancréatine Henry, Laxolys Henry, Lithine Henry, Iodothéine Henry, Méthyplarsine Henry, Nucleantol Gabriel, Papaine Henry, Pebromon Henry, Peptonate d'étain Henry, Pepiodon Henry, Salicaire Henry, Sirop bromoformique Henry, Sirop d'hémoglobine, Sirop de kola composé Henry, Solution salicylate Henry, Stanno bardane Henry, Stannolip Henry.*
- Lab. Hépatie Efa**, rue du Château, Carentan (Manche). — *Byl Efa, Eczem Efa, Hépatie Efa.*
- Prod. Heudebert**, 85, rue St-Germain, Nanterre. — *Farine de Malt, Nergine, Pain essentiel, Pains spéciaux, Radiopaque.*
- Lab. Hinglais**, Epernay (Marne). — *Capsules Kuchner, Chénantol.*
- Prod. Hinglais**, 30, rue Miromesnil, Paris. — *Follicormone buccale Hinglais.*

- Lab. Hocquette**, 191, rue du Faubourg-St-Antoine, Paris. — *Acobella*, *Fenucalcium*, *Marimine*, *Sérobiol*, *Sérum neuropsychique*, *Splenomanganol*, *Valédyl*.
- Lab. F. Hoffmann. La Roche et Cie**, 10, rue Crillon, Paris. — *Adoverne*, *Allonal*, *Ampoules de Pantopon*, *Ampoules de Digalène*, *Ampoules de Spasmalgine*, *Arsylène*, *Cachets Roche de thiocol*, *Choline*, *Comprimés Roche de thiocol*, *Digalène*, *Diiodotyrosine Roche*, *Hémostra*, *Iloglandol*, *Iodostarine*, *Imido*, *Isacène*, *Lariotine*, *Larocaine*, *Larosan*, *Cestrobol*, *Ovules Roche*, *Pantopon*, *Prostigmine*, *Sécacornine*, *Sédobrol*, *Sédormid Roche*, *Sirop Roche*, *Soluprotine*, *Somnifène*, *Spasmalgine*, *Syntropan Roche*, *Tampol*, *Théobryl*, *Thigénol*, *Thiodol*, *Thyroxine*, *Tonique Roche*.
- Lab. de l'Hormocrinol**, 17, r. de la Glacière, La Garenne-Colombes (Seine). — *Gossypiol Maurin*, *Hormocrinol F. et M.*
- Lab. Houdé**, 9, rue Dieu, Paris. — *Aloïne Houdé*, *Boldine Houdé*, *Ephédrine Houdé*, *Granules Houdé*, *Hydrastine Houdé*, *Hyoscyamine Houdé*, *Quassine Houdé*, *Sparteïne Houdé*.
- Lab. J. Huerre et Cie**, 9, rue de la Gare, Levallois. — *Albuplast Vigier*, *Aristoplast*, *Cédrocadinol*, *Extensoplast*, *Furoplast*, *Lactophorine*, *Manganifer*.
- Lab. Hy**, 61, av. de Choisy, Paris. — *Cardialisine*, *Etainazyl*, *Métophan*, *Pommade Bertol Vichy*, *Stymogénol*.
- Cie de l'Hydroxydase**, 10, rue Blanche, Paris. — *Hydroxydase*.
- Lab. d'Hygiène et Thérapeutique appliquées**, 47, rue Bokanowski, Asnières (Seine). — *Calcomagnésie*, *Dysthène*, *Héxafel*, *Myothermine*, *Sithénoxal*, *Stopral*.
- Lab. Hypnos**, Chabeuil (Drôme). — *Gobillettes Hypnos*.
- Lab. des Immuno-Vaccins**, 8, av. des Sources, Nice (A.-M.). — *Cinol*, *Digicardine*, *Ferments immuno lactiques*, *Immuno-vaccin antirhumatismal*, *Immuno-vaccin bronchopulmonaire*, *S. I. V. A.*, *Immuni-vaccin antipyyor-rhéique*.
- Institut de Biologie appliquée (C. Cépède)**, 57-59-60, rue Mathurin-Régnier, Paris (15°). — *Panostyl*, *Vaccino-thérapie atoxique Cépède*, tous examens de laboratoire.
- Institut Jacquemin**, Malzeville-Nancy. — *Ferment pur de raisin Jacquemin*.
- Institut Pasteur**, 22, rue Dutot, Paris. — *Serums*, *Vaccins*.
- Lab. de l'Iodarsenic Guiraud**, 10, imp. Milord, Paris. — *Citratin*, *Gouttes païdophiles du D^r Guiraud*, *Iodarsenic Guiraud*, *Tubes du D^r Guiraud*.

Lab. Iscovesco, 107, rue des Dames, Paris. — *Adrénol total*, *Afatyl*, *Androcrinol Iscovesco*, *Andropolycrinol*, *Cardiocrinol*, *Cérébrocrinol*, *Gynocrinol*, *Gynohyphophysol*, *Gynolutéol*, *Gynopolycrinol*, *Hépatocrinol*, *Hypophysol*, *Mammol*, *Néphrocrinol*, *Opopédol*, *Opothérapie Iscovesco*, *Ovaire Iscovesco*, *Sarcosérum*, *Splenocrinol*, *Thyrol A.*, *Yo-Androl*, *Yo-Gynine*.

Lab. Ivago, 17, r. de Provence, Paris. — *Vaccins intradermiques*, *Vaccins Ivago*, *Gelées vaccins Ivago*.

Etabl. Jacquemaire, Villefranche (Rhône). — *Blécao*, *Blédine*.

Lab. Jammes, 86, rue Michel-Ange, Paris. — *Boldocrinol*, *Cacodyline*, *Jammes*, *Iodinjectol Jammes*, *Néophage*.

Lab. Jauffret, 4, pl. du Val, Vanves. — *Néobiol*.

Lab. du Jécol, 3, rue Watteau, Courbevoie. — *Allophaquina*, *Jécol*.

Lab. Jicem, 304, rue Saint-Jacques, Paris. — *Citropaïne*, *Iodarsine*, *Jicémine*.

Lab. Jolly, 1, rue Christine, Paris. — *Créositoires*, *Spasmine Jolly*, *Terpoxyl*, *Terpoxyl (Ovules)*.

Lab. Jonids, 9, bd Sévigné, Dijon (Côte-d'Or). — *Athérolysins*, *Bisalyt*, *Génergosine*, *Hémaxol*.

Pharmacie Journet, 18, r. Vavin, Paris. — *Tridynol*.

Lab. Julien, 105, rue de Rennes, Paris (VI^e). — *Benzoflorine*, *Corylase*, *Elgine Julien*, *Manganophosphat Julien*, *Pandrénaline Julien*.

Lab. du Juranol, 32, rue Guyot, Paris. — *Juranol*.

Lab. du Kalmobrol, 3, r. Royet, Lyon-Caluire. — *Bismusodine*, *Kalmobrol*.

Lab. du Kaobrol, 54, r. de Paris, Charenton. — *Bigynol*, *Colisel*, *Cytopan*, *Dosotol*, *Kaobrol*, *Opobrol*.

Lab. de la Kaviase, 76, av. d'Italie, Paris (XIII^e). — *Kaviase*.

Lab. L. Kerfysen, 4, rue Alexandre-III, Dunkerque, (Nord). — *Benzoquinol*, *Dermaline*, *Demeulenaere*, *Globabyl*, *Hémorroïdine* (*Pommade*, *Gouttes*, *Suppositoires*), *Sirop Kopé*.

Lab. Kervan, 5, bd. Arago, Paris (XIII^e). — *Zymogastrinc Kervan*.

Lab. du Képhédryl, 3, rue Scribe, Paris. — *Képhédryl*.

- Lab. Kraus**, 37, rue Godot-de-Mauroy, Paris. Tél. : Caumartin 24-54. — *Anti-convulsif Kraus*, *Citrol*, *Franco-plaste*, *Franco-plaste élastique*, *Ombiplaste*, *Posoplaste*, *Protège-vaccin Kraus*, *Solargol*, *Traumatol*, *Traumatoplaste*.
- Lab. Krieger**, 121, av. de St-Ouen, Paris. — *Antipur*, *Artéριοεινίνη*, *Butyral*, *Eczémacure*, *Gélocalcine*, *Géraldine*, *Organocalcine*, *Sciaticure*.
- Etabl. Kuhlmann**, 145, bd. Haussmann, Paris. — *Binoxol*, *Chloralosane*, *Sunalcol*, *Sunoxol*.
- Laboradium**, 33, rue St-Jacques, Paris. — *Aseptoradol*, *Balnéradol*, *Dermoradol*.
- Lab. Léon Lacaze**, Amélie-les-Bains (P.-O.). — *Tiliane*.
- Lab. Lacombe et Cie**, 42, r. du Mont-Cenis, Paris. — *Chlorumagène*, *Do-sa-no-sal*, *Fanerval*, *Surbical*.
- Lab. Lacor**, 81, rue de la Roquette, Paris. — *Rangol*.
- Lab. Lacroix**, 37, rue Pajol, Paris. — *Arsi-Quinoforme*, *Camphostyl simple et spartéiné*, *Luerol*, *Neurotrope*, *Pilules Hélieniennes Naud*, *Quinoforme*, *Santal salolé*, *Vanucléol*.
- Lab. du Lacto-sérum Lavril**, Pacy-sur-Eure (Eure) et 26, bd. des Batignolles, Paris. — *Lactosérum Lavril*, *Lactosmose*.
- Lab. de la Lactothérapie**, 12, square Delambre, Paris (XIV^e). — *Clinax*, *Drainochol*, *Inacrine*.
- Lab. Lafarge**, 6, bd Arago, Paris. — *Neuréol*, *Sulfobyl*.
- Lab. « La Faye »**, Marlihes (Loire). — *Babeurre « La Faye »*.
- Lab. Laffort**, Joué-les-Tours (I.-et-L.). — *Evobiline*, *Fluokol*, *Lacodia*, *Polysel*, *Septolan*, *Uvotonyl*.
- Lab. Lafran**, 8, rue de Prague, Paris. — *Aspirine Lafran*, *Charbenzo Lafran*, *Dicodéine Lafran*, *Glandimbine Lafran*, *Parégorique Lafran*, *Urotropine Lafran*.
- Lait Guigoz**, 19, r. J.-J. Rousseau, Paris. — *Babeurre Guigoz*, *Lait en poudre Guigoz*.
- Lab. Lagoutte**, 85, cours Albert-Thomas, Lyon. — *Boldolactic*, *Calmocardine*, *Dermodulci*, *Ovules Intima*, *Phlébos*, *Sodogastrol*, *Suppoalgos*.
- Lab. du Dr Lalaurie**, Cuxac-d'Aude. — *Adolol*, *Analgot*, *Calemenyl*, *Cemag*, *Crémasepta*, *Elixir Gelm*, *Grains Gelm*, *Gunose*, *Pastilles Helge*, *Pilules Panma*, *Sirop Helge*, *Stenon du Dr Gelm*, *Udanka*, *Urogène*.
- Lab. Laleuf**, 51, rue Nicolo, Paris (XVI^e). — *Adrépatine*, *Colloïdine*, *Créosal*, *Crinocardine*, *Folliovarine*, *Iodatoxine*, *Lobéliane*, *Pancrépatine*, *Paverinol*, *Polyfer-*

ments, Sirop Dubois au créosol, Théoverine Laleuf, Trinitine caféinée Dubois, Trinitine-Papavérine Laleuf, Urisal du Dr Deschamps, Urococcine.

Lab. Lamar, pl. Forbin, Aix (B.-du-Rh.). — Anaural, Baume St-Roch, Biliboldo, Sirop Escolle, Sirop Pulmophile, Solvurène.

Lab. Lambert, 6, rue de Longchamp, Vichy. — Epicral, Oxylysine, Triseptine.

Lab. Lambert, pl. du Châtelet, Orléans. — Comprimés Galac, Fenucine.

Lab. Lambiotte frères, 20, rue Dumont-d'Urville, Paris. — Arhine, Créosoforme, Galform, Perles Taphosote, Phosote, Trisote, Urométine.

Lab. André Lancien, 26, rue de Gonesse, Aulnay-sous-Bois. — Métaux colloïdaux.

Lab. Lancosme, 19, rue Alain-Chartier et 71, av. Victor-Emmanuel III, Paris. — Acolitol, Algocratine, Anémor, Argybil, Bain Carré, Bismhydral, Bismuth, Desleaux, Carbonate de chaux Lancosme, Globules Laincar, Hémodrome, Inhalation Lancosme, Magnésie Storke, Spectrol.

Lab. Landrin et Cie, 12, rue de la République, Puteaux. — Cipromarol, Elixir de Virginie Nyrdahl.

Lab. Lang et Cie, 2, rue du Marché-des-Blancs-Manteaux, Paris. — Capsules Dieu, Digestif Capmartin, Hémoglobine Star, Poudre Cap, Savons Mollard, Salvanos, Sirop Jane et pâte Jane, Vermifuge des Moines, Yohimbine Gilbert.

Lab. L. Laroze, 54, rue de Paris, Charenton (Seine). — Bigynol, Colisel, Cytopan, Dosotal, Haobrol.

Lab. Laryngologique, 222, fg. St-Martin, Paris. — Hydrorrhéol, Inhalation gargarisme Vocaldop, Vocaldop.

Lab. du Dr Laurent-Gérard, 40, rue de Bellechasse, Paris. — Evolaxine, Radiolétrane, Thoroxyl.

Lab. Lauriat, av. Foch, La Garenne-Colombes (Seine). — Bronchoseptol Lauriat, Lauriatol.

Lab. Lavire, 46, r. de Rome, Marseille. — Arsységum, Aseptopoudre, Aseptovule, Fluoganèse, Puragar, Salychlore, Scalagar, Triurase.

Lab. du Dr Lavoué, Rennes (I.-et-V.). — Gouttes I. A. M., Mangarsenic.

Lab. Lebeault, 5, rue Bourg-l'Abbé, Paris. — Citrolargol, Germose, Mycolysine, Staphylase du Dr Doyen, Veinosine, Vin de Bugeaud.

Lab. Le Blond, 51, rue Gay-Lussac, Paris. — Ortho-Gastrine, Pyurol.

Lab. Leboime, 3, r. Fernand-Widal, Paris. — Calcozymase, Prezymase.

Lab. Lebrun, 155, bd Magenta, Paris. — Dragées toni-cardiaques, Eucalyptine, Pancalcion.

- Etabl. T. Leclerc**, 10, rue Vignon, Paris. — *Bactériophage Leclerc*, *Cadior*, *Entérochir*, *Entéroxin Leclerc*, *Félicol*, *Magnétone*, *Sélamon*, *Sérum Normet*, *Solution Normet*, *Sclérolitique*.
- Lab. Leconte**, 7, r. des Petits-Carreux, Paris. — *Bilaxyl*, *Choléfluine*, *Euglyma*, *Gouttes Leconte*, *Lactocalcine*, *Morsine*, *Panlysine*.
- Lab. Lecoq et Ferrand**, 14, rue Gravel, Levallois-Perret. — *Antipsorine*, *Curalues du Dr Lafay*, *Entéropoxines Abry*, *Erythrolues du Dr Lafay*, *Gatran*, *Helminthyl*, *Lipaurol*, *Molène*, *Pentarsyl*, *Dolmuth*, *Tréparsol*.
- Lab. Lees**, 127, bd St-Michel, Paris (V^e). — *Métrilols*, *Suppogynals*.
- Lab. Legendre et Cie**, Houilles (S.-et-O.). — *Pâte Mireille*, *Sirop Mireille*.
- Lab. Legoux frères**, 6, rue Louis-Blanc, La Garenne-Colombes. — *Salvénaase Legoux*.
- Lab. Legrand**, 11, pl. Louis-XII, Blois (L.-et-Ch.). — *Hépatomanganol*, *Lactoseptyl*.
- Lab. Leisyn**, 1 bis, r. Molitor, Paris. — *Albuol Leisyn*, *Ampoules suractivantes Leisyn*, *Anéo Leisyn*, *Cerebroil Leisyn*, *Colloil Leisyn*, *Comprimés vaginaux Leisyn*, *Cupranéo Leisyn*, *Morpheroinn Leisyn*, *Névropatil Leisyn*, *Nitroyl Leisyn*, *Onclicion Leisyn*, *Oxyol Leisyn*, *Phymo-stéryl Leisyn*, *Pilules Noires Leisyn*, *Prostaphile Leisyn*, *Radio-Mordant Leisyn*, *Rythmos Leisyn*, *Séotral Leisyn*, *Stomnol Leisyn*.
- Lab. Lejeune**, 142, rue de Picpus, Paris. — *Baume Daynoc*, *Diachusine*, *Gouttes Daynoc*, *Indhaméline simple*, *Indhaméline Plurial*, *Patholysine*, *Pommade Lenoir*, *Protensène*, *Vernis à la Diachusine*.
- Lab. Le Marois**, 197, av. de Versailles, Paris (XVI^e). — *Sina-septic*.
- Lab. Lematte et Boinot**, 52, rue La Bruyère, Paris. — *Acécolex*, *Acécoline*, *Acécoline-spartéine*, *Acécoline-camphre*, *Acécoline-yohimbine*, *Arsoplasmine*, *Bio-calcose Chevreton*, *Calcional*, *Cholestériodine*, *Hémo-tonikéine*, *Hormocline*, *Hypotan*, *Jap*, *Lactozymase B*, *Lipocérébrine*, *Océanine*, *Séroferrine*, *Tonikéine*.
- Lab. Léonardon**, rue du Casino, Arcachon (Gironde). — *Hemofluidol*, *Quinthéryl*, *Splenora*.
- Lab. Le Perdriel**, 11, rue Milton, Paris. — *Antipyrine effervescente Le Perdriel*, *Benzoate de lithine effervescent Le Perdriel*, *Biosine Le Perdriel*, *Bromhydrate de lithine effervescent Le Perdriel*, *Carbonate de lithine effervescent Le Perdriel*, *Citrate de lithine effervescent Le Perdriel*, *Coaltar Saponiné Le Beuf*, *Fucoglycine du Dr Gressy* (sirop bromo-iodo-phosphore végétal), *Glycérophosphate de chaux effervescent Le Perdriel*, *Glycérophosphate de fer effervescent Le Perdriel*, *Glycérophosphate de lithine effervescent Le Perdriel*, *Glycérophosphate de soude effervescent Le Perdriel*, *Goudron*

Le Beuf (émulsion de goudron végétal), *Salicylate de lithine effervescent* *Le Perdriel*, *Taffetas Marinier* (à l'*arnica*, au baume du commandeur ou au collodion), *Thapsia* *Le Perdriel-Reboulleau*, *Toile vésicante* *Le Perdriel*, *Tolu le Beuf*.

Lab. Leporcq, 9, rue du Temple, Enghien (S.-et-O.). — *Ardogène*.

Lab. du D^r Leprince, 62, rue de la Tour, Paris. — *Arsycodile*, *Cascarine Leprince*, *Eumictine*, *Ferrocodile* et *Ferricodile*, *Freinospasmyl*, *Guipsine*, *Néo arsyncodile*, *Néo Rhomnol*, *Ophthalmine*, *Pilules du D^r Séjournet*, *Rhomnol*.

Lab. Lersam, 92, bd. Murat, Paris (XVI^e). — *Acridia*, *Amphotonyl*, *Arsécrinol*, *Ethyl Pneumine*, *Rhinacridyl*.

Lab. Lescene, 58, rue de Vouillé, Paris. — *Anaquintine Lescène*, *Balsamol*, *Rhinaquintine*, *Viosten*, *Zymatine*.

Lab. G. Lesourd, 88, rue Duhesme, Paris (XVIII^e). — *Bolcitol*, *Foenugol*, *Lucinine Borelle*, *Péricols du D^r Legros*, *Sels-Mags*, *Splénocarbène*.

Lab. du D^r Le Tanneur, 87, av. Borriglione, Nice. — *Manolux*, *Minerolaxine*, *Tannurgyl*, *Néo-Tannurgyl*.

Lab. Lettry, 69, rue de Sèvres, Paris. — *Agoxyl*, *Gouttes de Séru*, *Pommade de Séru*.

Lab. Leurquin, 50-52, rue Pierre-Légrand, Lille. — *Bromocarbonate*, *Gélok*, *Kinégastrine*, *Pulmofluide*, *Sels Na 4*.

L. E. V. A., 26, rue Pétreille, Paris. — *Leniforme*.

Lab. Licardy, 38, bd Bourdon, Neuilly-sur-Seine. — *Fluobyl*, *Gélogastrine*, *Hémoductyl*, *Laxamalt*, *Sédosine*, *Stovédrine*, *Tonudol*.

Lab. des Lipides, 14, r. des Minimes, Paris. — *Dermosplénine*, *Liposplénine* du D^r Groc, *Trisalyl*.

Lab. de la Liposeptine, 2, pl. des Vosges, Paris. — *Diapirine*, *Fenugrène*, *Fucusol*, *Gastrobiase*, *Liposeptine*, *Marrubène*, *Pansolanée*, *Rhino-Liposeptine*, *Sonène*.

Lab. Lobica, 46, av. des Ternes, Paris. — *Azotyl*, *Béatol*, *Garditone*, *Chlorobyl*, *Iodo-trypsine*, *Lactobyl*, *Lactochol*, *Nutréine*, *Pneumo-calcine*, *Sérénol*, *Taxol*, *Uralysol*, *Veinotrope*.

Lab. Lobru, 26, r. Vauquelin, Paris (V^e). — *Nésal*.

Lab. Lobry, 6, r. Parrot, Paris. — *Hemofer*, *Néphrylan*, *Urozéa*.

Lab. Emile Logeais, 24, rue de Silly, Boulogne-sur-Seine. — *Panxylon*, *Pommade Logeais* (*Rectaméline*), *Suppositoires Logeais*, *Veinhormones Logeais*.

Lab. Jacques Logeais, 22 bis, rue de Silly, Boulogne-sur-Seine. — *Boricine Meissonnier*, *Fluidol*, *Globules Secretan*, *Iodamélis*, *Naiodine*.

Lab. Marcel Logeais, 24, rue des Plantes et 1, r. Bénard, Paris. — *Gholéopeptine*.

- Lab. Longuet**, 34, rue Sedaine, Paris. — *Arsi-Strychnal*, *Carbofixine*, *Cholépan*, *Citrosodine*, *Clisemine*, *Facmine*, *Fixine*, *Levure de bière du D^r Debouzy*, *Narcyl*, *Ortho-Zomine*, *Pilules du D^r Debouzy*, *Quinuryl*, *Rénalgine*, *Rhinalginol*, *Strychnal*, *Urisanine*, *Zomine*.
- Lab. Lorrain de Produits synthétiques purs**, Etain (Meuse). — *Caparlem*, *Capsules Mirba*, *Collosoufre*, *Cryosan*, *Sérocaltine*.
- Lab. J. Lorthioir**, 22, rue Perceval, Paris. — *Biotrignon*, *Carbiotrignon* synonyme, *Biotrignon hépatique*.
- Lab. A. Louveau**, 78, bd des Batignolles, Paris. — *Iodehame-lins Louveau*, *Suppositoires Almine Louveau*, *Urosodine Louveau*.
- Lab. Lucinia**, 154 bis, rue de Breteuil, Marseille. — *Formovaccins*, *Fusol*, nécessaire d'accouchement *Lucinia*, *Galabactéine*.
- Lab. Lumière** (Prod. chimiques spéciaux « Brevets Lumière »), 45, rue Villon, Lyon. — *Allocaïne Lumière*, *Allochry-sine Lumière*, *Antipaludique*, *Borosodine Lumière*, *Cryogénine Lumière*, *Cryptargol Lumière*, *Emge Lu-mière*, *Entalva Lumière*, *Enterovaccin Lumière*, *Gelée Lumière*, *Germosine Lumière*, *Hémoplase Lumière*, *Hermophényl Lumière*, *Iodure d'amidon Lumière*, *Néokola Lumière*, *Oléochrysine*, *Opozones Lumière*, *Persodine Lumière*, *Rhéantine Lumière*, *Tulle gras Lumière*.
- Lab. Lutsia**, 4, villa Ornano, Paris. — *Rhinogénol*.
- Lab. Lyons**, 30, r. Monge, Paris. — *ArthrilaX*, *Neuseda*, *Som-nitis*, *Tonax*.
- Lab. Madyl**, 14, rue de Miromesnil, Paris. — *Bromovose*, *Euphytose*, *Tapo*.
- Lab. du Magsalyl**, 10, rue de la Mairie, Ivry-sur-Seine. — *Catalyl Mg*, *Magbromyl Mg*, *Magiodyl Mg*, *Magsalyl Mg*.
- Lab. Mahieu**, rue des Jardins, Lens (P.-de-C.). — *Rogerma*.
- Lab. Maire**, 171, r. de Belleville, Paris. — *Calcisténine*, *Gul-toléol*, *Nasargine*.
- Lab. Malmanche**, 101, av. Paul Doumer, Rueil-Malmaison. — *Digestif Harvey*, *Rosalyl*, *Urobuccol*, *Valérinodor*.
- Lab. du Malone (M. Vincent)**, Ancenis (Loire-Inf.). — *Gouttes Malone*, *Spasmalone*.
- Lab. Mannet**, Loudun (Vienne). — *Dragées ferro-ergotées Mannet*, *Elixir ferro-ergoté Mannet*, *Elixir tribromure Mannet au Salol*, *Elixir Mannet à l'iodure de potas-sium et au Salol*, *Elixir Mannet à l'iodure de sodium et au Salol*.

- Lab. Marceau** (D^r A. Grigaut et A. Boutroux, pharmaciens, chefs de Lab. à la Faculté de Médecine), 7 av. Marceau, Paris. — *Bismuth Grigaut, Triptyque Digestif: Carb-Carbagyre-Cholérène, Cholurgyle, Gouttes Fluvia, Végé-lact.*
- Lab. Marchand et Leroy** (Et. Marrel Succ^{rs}), 74, rue des Jacobins, Amiens. — *Préventyl.*
- Lab. Marinier**, 52, rue de Flandre, Paris. — *Bi-Citrol, Carbagol.*
- Lab. A. Martin**, 24, r. de Charenton, Paris. — *Cytobiase.*
- Lab. du D^r Martinet**, 16, rue du Petit-Musc, Paris. — *Granoxyl, Gynarsol, Hémopausine, Hépadrainase, Homorvitol, Hygioline, Magnésosules, Néo-collargol, Pangaduine.*
- Lab. Martinie**, 62, av. Philippe-Auguste, Paris. — *Phlebotonine, Tonicalcine, Uvargol.*
- Lab. R. L. Mathivat**, 66, rue de la Pompe, Paris (XVI^e). — *Demalgon, Novatropine, Strychnotonine, Surparine, Valovosan.*
- Lab. du Marubor**, 1, rue d'Arras. — *Béthune, Marubor.*
- Lab. Mauchant**, 22, bd. Circulaire d'Épinay-Gennevilliers (Seine). — *Asthmapepton, Bircol Mauchant, Cassitol, Fluveinose Maucant, Iohonductéol, Lipovita, Maltine Phenix, Minérale du D^r C. Baud, Myodyne Mauchant, Phoscamine, Salubrine Phenix, Solvuric, Surc Durham, Tercolène, Trilactine.*
- Lab. Mayaud**, 6^{ter}, rue Voltaire, La Garenne-Colombes (Seine). — *Ulcérophile Nosan.*
- Lab. Mayoly Spindler**, 1, place Victor-Hugo, Paris. — *Baume Aroma, Borostyrol, Dicaliode, Euphon, Fluenzyl, Isolulol, Kalastyl, Perubore, Pipettes nasales M. S. Sanoformine, Stillargol, Valbrol.*
- Lab. de Médecine Expérimentale**, 1-3, rue Malherbe, Beauvais. Tél. : 484. — *Fludiose, Formocarbène, Opochol, Sodothiol.*
- Lab. Mercier**, Fécamp (S.-I.). — *Baume Iki, Pommade Aiphème.*
- Lab. J. Messis**, 71, av. de la République, Champigny (Seine) — *Agozymase, Guérysipèle, Santal Dolmay, Urosinol Damber, Vicéliase, Vigotonique.*
- Lab. du Métacuprol**, 5, rue François-Ponsard, Paris. — *Métacuprol.*
- Lab. Métadier**, Tours. — *Méta-vaccin, Méta-titane.*
- Lab. de la Métricine**, 23, Gde-Rue, Asnières (Seine). — *Métricine.*
- Lab. Meunier**, 11, bd. Davout, Auxerre. — *Anaudase.*
- Lab. Meunier**, r. du Commerce, Montmarault (Allier). — *Calmant Meunier, Halmigraine, Tonuclyl.*
- Lab. Mexyl**, 6, rue des Dames. — *Mexalyl, Mexyl, Solarsyl, Trineuxyl, Wipla.*

- Lab. du Dr Mialhe**, 8, rue Favart, Paris. — *Adréntine*, *Aérocide*, *Anusol*, *Aquintol*, *Digi-Lanatine*, *Digimialbaine*, *Digitaline*, *Elixir Mialhe*, *Lab-lacto-ferment*, *Mialbaine*.
- Lab. Michelon**, 20, bd Heurteloup, Tours. — *Aesculase*.
- Lab. Michels**, 9, rue Castex, Paris. — *Chloro-calcion*, *Silisode*.
- Lab. de Microbiologie**, 23, rue du Caire, Paris. — *Anthraxone Fornet*, *Blennosine Fornet*, *Grippol Fornet*, *Héparcyl-Insuline Fornet*, *Néosuline*, *Pommade Fornet*, *Tébépha*, *guine Fornet*.
- Lab. de la Microlyse**, 10, r. de Strasbourg, Paris. — *Microlyse*.
- Lab. du Mictasol**, 155, bd. Magenta, Paris. — *Mictasol*, *Mictasovules*.
- Lab. Midy frères**, 67, av. de Wagram, Paris. — *Antidiabétique Midy*, *Antigastralgique*, *Antigrippine Midy*, *Bétul ol Midy*, *Bi-iodure de mercure indolore Midy*, *Carbolin Midy*, *simple et composé*, *Cascara Midy*, *Cocaine Midy*, *Colchi-Sal Midy*, *Panlacto Midy*, *Pipérazine*, *Pommade Midy*, *Proveinase Midy*, *Suppositoires Midy*.
- Lab. E. Millet**, Rambouillet (S.-et-O.). — *Carbos*, *Comprimés et suppositoires de Calomel*, *Comprimés de Carbonate de chaux*, *Formocarbos*, *Laxoléine*, *Mucicarbos*, *Mucilaxine*, *Mucilose*, *Rectoplasme*.
- Lab. Millet et Guillaumin**, 5, r. Ambroise-Thomas, Paris. — *Kénol*, *Paxène*.
- Lab. Millot**, 177, rue de Courcelles, Paris. — *Ampoules Dubé*, *Benzo-bismuth Millot*, *Comprimés néothorium Millot*, *Crayons néothorium Millot*, *Orargol*, *Ovules néothorium Millot*, *Pommade néothorium Millot*, *Sarcoptol*, *Soluté Gaube du Gers*.
- Lab. Miluc (M. Ragoucy)**, 37, rue Raspail, Ivry-Paris. — *Allergantyl Miluc*.
- Lab. Géo Miquel**, 3, av. Lowendal, Paris. — *Glyco-M*, *Sanos*, *Selunic*, *Witch Hazel*.
- Lab. Monal**, 6, rue Bridaine, Paris. — *Boléase*, *Forcival*, *Globules Romon*, *Magnogène*, *Santal Monal au bleu de méthylène*, *Sulfuryl Monal*, *Taburol Monal*, *Tensédine*, *Terkal Monal*, *Trinivérine*.
- Lab. Moncour**, 49, av. Victor-Hugo, Boulogne-sur-Seine. — *Opothérapie Moncour* (sphérulines et néo-sphérulines), *Parathryocalcine Moncour*, *Vitacalcine Moncour*.
- Lab. Monin**, 49, rue de Maubeuge, Paris. — *Crussol*, *Dépuratif Rob. Lechaux*, *Elixir Grez*, *Liqueur de l'Etoile anti-asthmatique*, *Pilules anti-névralgiques du Dr Cronier*, *Poudre Blot laxative*, *Vagostabyt*.
- Lab. Montagu**, 49, bd de Port-Royal, Paris. — *Broméine Montagu*, *Carbalcaloides*, *Carbatropine*, *Carbosanis*, *Dragées Hecquet*, *Génacide*, *Iodéine Montagu*, *Lac-Ser*, *Papier réactif du Génacide*, *Savons Michon*.
- Lab. Moreau**, 13, rue des Nonnains-d'Hyères, Paris. — *Lanceryl*, *Plaganol*.

- Lab. Moser et Cie**, 8, chem. de Montbrillant, Lyon (Rhône). — *Maltea Moser cristallisée*.
- Sté An. Mothersill Remedy Company**, 5, rue de Provence, Paris. — *Mothersill's Seasick Remedy*.
- Lab. Moulin**, 50, rue de la République, Puteaux (Seine). — *Aseplone, Bacilactine, Baume Dolora, Benzothymol, Capsules ovigéniques, Dépuration, Diabésia, Purgemint granulé, Poudre Helvetia, Rhinodol, Sirop Diver, Uricine*.
- Lab. Mouneyrat**, 12, rue du Chemin-Vert, Villeneuve-la-Garenne. — *Arsénomyl, Exobol, Histogénol, Hectine, Hectargyre, Kinectine, Olbia, Vioxyl*.
- Lab. Mousnier-Delorme**, 9, bd Carnot, Bourg-la-Reine. — *Dragées du D^r Gélinau, Sirop du D^r Gélinau*.
- Lab. Mouré**, 18, r. Favart, Paris. — *Elixir Morlas, Crino-Sérum, Sirop Morlas*.
- Lab. du Myoral**, 20, r. des Ecoles, Paris (V°). — *Calcium Francalcion, Francalcion, Myoral*.
- Lab. P. Nadaud**, 31, bd de la Villette, Paris (X°). — *Ulcérine Berger*.
- Lab. du D^r Narodetzki**, 19, bd Bonne-Nouvelle, Paris. — *Elixir Spark, Griponal, Nazophyl Darva, Spyrolides*.
- Lab. du Nasopon et du Paniode**, 239, rue Paul-Bert, Lyon. — *Nasopon, Paniode*.
- Lab. Nativelle**, 27, rue de la Procession, Paris. — *Digitaline Nativelle, Natibaine Nativelle, Natirose, Ouabaine Arnaud, Quinicardine*.
- Lab. Nau**, 21, Grande-Rue, Argenteuil (S.-et-O.). — *Néochloral Nau*.
- Lab. J. Nègre**, 18, rue Louis-Blanc, Cannes (A.-M.). — *Thé d'oranger*.
- Néoplastex**, 71, Fg St-Martin, Paris (X°). — *Bande Néoplastex*.
- Société Nestlé**, 6, av. César-Caire, Paris. — *Babeurre sec Eledon, Lait en poudre Nestogène*.
- Lab. du Nestosyl**, 72, rue St-Dominique, Paris. — *Nestosyl, Ovules au Nestosyl, Pommade au Nestosyl, Solution huileuse au Nestosyl, Suppositoires au Nestosyl*.
- Lab. du Neurotensyl**, 72, bd Davout, Paris (XX°). — *Neurotensyl*.
- Lab. Neuville**, 239, fg St-Honoré, Paris. — *Boldagar, Terco (Gouttes, Dragées, Sirop), Urol*.
- Lab. H. Noé**, 14, r. Thiers, St-Amand-les-Eaux, (Nord) — *Carbophos, Citrophos, Chloropeptase*.

- Lab. Noelline, Guigamp (C.-du-N.). — *Pommade Noelline, Poudre Noelline.*
- Lab. H. Nogues, 7-7 bis, r. Galvani, Paris. — *Baume maternité, Capsules Noguès, Grains de Vals, Néarsite, Poudre Saline, Sirop maternité, Sirop Noguès, Thébail.*
- Lab. du Normogastryl, 14, rue des Minimes, Paris. — *Pelvi-formine, Plasmosthène.*
- Lab. Novalis, Oullins (Rhône). — *Progaster compr., Lugocalcion, Novolug, Valénal.*
- Lab. Nutricia, 142, r. Fransmann, Bruxelles. — *Babeurre, Bacilactine, Biscottes, Biscuits, Chocolat au lait Crème de Lait, Farines, Flocons d'Avoine, Fromage frais, Kéfir, Lactosine, Laits Nutricia, Pains, Pastilles Maya, Sinaqua, Yoghourt.*
- Lab. Oberlin, 17, rue Cadet, Paris. — *Aliment Tinardon, Analgénine, Biodynamine, Capsules grises Cabanès, Ferropéptone Oberlin, Gastrocalcine, Goulttes Linober, Granulé Tinardon, Gynaicéol, Hamaméliode, Iode Oberlin, Juvéol, Lactosone, Panbromine, Pectine Oberlin, Potion Bonnet, Rob Cabanès, Rob Oberlin, Santal Oberlin, Santal Salolé Cabanès, Savon iodé Oberlin, Sigma Cônes, Sirop Tinardon, Uraséol.*
- O. C. P. 108, rue de Picpus, Paris. — *Lait de magnésie Phillips, Pâte dentifrice Phillips.*
- Lab. Odilia, 42, rue du Mont-Cenis, Paris. — *Gynopausine, Inolène (simple, thymolé), ovules à l'Inolène, pommade à l'Inolène, poudre à l'Inolène, Nasolène, Sedofolline.*
- Lab. Odinot, 21, r. Violet, Paris. — *Calciline, Gastrosodine, Néocalciline, Pluribiase, Sel digestif Bé Mé Cé.*
- Lab. de l'Oliphédrol, 18, rue Daval, Paris (II^e). — *Oliphédrol, Quintozone.*
- Lab. de l'Olivéol, Tassin-la-Demi-Lune (Rhône). — *Oléol, Olivéol, Vasocones, Vasoconstrictine.*
- Lab. des Prod. Ollivier, de Rochefort-sur-Mer, préparés par les Lab. Hardy, 42, bd St-Marcel, Paris (V^e). — *Cachets Céli, Cachets Syncal, Dragées Céli, Poudre Syncal, Spécifique Saint-Jean.*
- Lab. de l'Opodermyl, 36, rue des Martyrs, Paris. — *Opodermyl.*
- Lab. moderne d'Opothérapie et Biologie médicale, 40, rue Claire-Paulhac, Toulouse. — *Glandocalcyl, Hépatozyl Caldo, Nucléophorène, Sclérosérol, Veinoposine.*
- Lab. Orrillard, 245, rue de Vaugirard, Paris. — *Biarsol, Papaveryl, Paxol.*

Lab. Ozothine, 23, r. Sébastien-Mercier, Paris (XV^e). — *Ozothine*.

Lab. Pachaut, 130, bd Haussmann, Paris. — *Bromures Pachaut, Cachets Pachaut Alpha et Gamma, Eupaveryl Pachaut, Iodures Pachaut, Limonade hypotensive Pachaut, Lotion végétale Pachaut, Suppositoires Pachaut, Tartrate borico-potassique Pachaut, Tubes de Bromure Pachaut, Valériane liquide Pachaut*.

Société du Pampryl, 29, rue Tronchet, Paris. — *Jus de Raisin naturel*.

Lab. de la Pangermine, 10, pl. Thiers, Le Mans (Sarthe). — *Pangermine*.

Lab. du Professeur Pancier, 21, rue de Saint-Leu, Amiens. — *Energine iodée de Berck, Energine phosphorée de Berck*.

Lab. Paret, 22, rue Guibal, Marseille. — *Azym, Cellules Paret, Fixase et Fixase irradiée*.

Lab. A. Paris, 4, rue de la Motte-Picquet, Paris. — *Hémophagostyl, Lactolaxine, Oxydothyrine, Oxydovarine, Phagostol, Phagostyl Mangané*.

Lab. M. Paris, 1, rue Lassalle, Lyon (La Boucle) (IV^e). — *Cachets du D^r Boveil, Comprimés de Pantolaxine du D^r Boveil, Ergotine Lamanle, Granules de Pantofort du D^r Boveil, Kerlactine, Pilules lithuranées du D^r Boveil*.

Lab. du Parolagar, 348, r. St-Honoré, Paris. — *Parolagar, Prod. Passeur*, 11, r. de Clichy, Paris. — *Paragélose, Tégéol*.

Lab. des Prod. Paterson (G. et M. Armingeat), 43, rue de Saintonge, Paris. — *Poudre Paterson, Pastilles Paterson*.

Lab. de Pathologie, 5, rue François-Ponsard, Paris. — *Néopancarpine, Rhinofluine, Vaso-neurine*.

Lab. Pautauberge, 10, rue de Constantinople, Paris. — *Broncurool, Dragées Pautauberge, Gaiacol Pautauberge, Solution Pautauberge*.

Lab. Pellissier, 33, av. de Villiers, Paris. — *Hepagastrol, Héparfer, Opothérapiques Pellissier, Oppositoires opothérapiques Pellissier, Silicate de soude Pellissier*.

Lab. de la Pelviformine, 14, rue des Minimes, Paris. — *Normogastryl*.

Lab. Pôpin et Leboucq, 30, rue Armand-Sylvestre, Courbevoie. — *Bromogénol, Gaurol, Guethural, Iodogénol*.

Lab. Perichon, 11, r. Lepic, Paris. — *Avistyl, Collubleu, Thermocédone*.

Lab. H. Perignon, 6, rue de Paris, Joinville-le-Pont. — *Elixir Godfrin*.

- Lab. des Peroxydes médicaux**, 12-18, r. Lamartine, Paris.
— *Ehlogan Bocquillon* (Poudre, Pommade, Pâte, Méchettes, Gazes, Ovules, Ekloplaste), *Hopogan Bocquillon* (Cachets, Pilules glutinisées, Prise-Bébé), *Hopoganase*.
- Lab. du Perquinol**, 22, Cité Trévisse, Paris. — *Amybdine*, *Perquinol*.
- Lab. Perrier**, 17 bis, bd Rochechouart, Paris. — *Scillitrine*, *Théocalciodé*.
- Lab. Perrin et Bruno**, 4, r. Désirée, Lyon. — *Asclérosol*, *Eudynol*, *Guitose*, *Hémo-antitoxine Sofos*, *Sulfarsiodé*, *Virmonal*.
- Lab. Perroud**, 3, rue Sébastien-Gryphe, Lyon. — *Carbonate de bismuth*, *Tablettes Perroud*.
- Lab. E. Petit**, pl. de l'Eglise, Argenteuil (S.-et-O.). — *Hémagénine Giraud*.
- Pharmacie anglaise des Champs-Élysées**, 62, av. des Champs Élysées, Paris. — *Emerson's Bromo Seltzer*, *Isacollium*, *Maté Douglas*.
- Pharmacie Biologique**, G. Combastel, F. Rischshoffer S^r, 57, r. Mathurin-Régnier, Paris. — *Panostyl*.
- Pharmacie Centrale de Belgique**, 12, rue du Téléphone, Bruxelles. — *Carbobel*, *Digistabiline*, *Hypersan*, *Iophénol*, *Névrozan*, *Scialine*, *Vitamorrhaine*, *Vitergomine*.
- Pharmacie Centrale de France**, 7, rue de Jouy, Paris. — *Adrénaline Invar*, *Caféine Invar*, *Crêpe Velpeau*, *Digitaline Invar*, *Pyroléol Edel*, *Théobromine Invar*, *Végéphos*.
- Pharmacie Marceau**, 7, av. Marceau, Paris. — *Pulmosedor*, *Soyolk*, *Streptoderme*.
- Pharmacie moderne**, rue Victor-Hugo, Mauléon-Soule (B.-P.). — *Baume Robernard*.
- Lab. de Pharmacologie générale** (D^r Ph. Chapelle), 8, rue Vivienne, Paris. — *Boldorhéine*, *Capsules d'apioline Chapoteaut*, *Capsules de boldo-glucine Chapoteaut*, *Capsules de Colchiflor*, *Capsules à l'éther valérianique de Vial*, *Capsules d'eucalyptéol Antoine*, *Capsules à l'huile de genévrier de Vial*, *Capsules et injection au Matéo de Grimault*, *Capsules de lécithine Cial*, *Capsules de morrhuel Chapoteaut*, *Capsules de Morrhuel créosolé Chapoteaut*, *Cardiosthénine*, *Cérévisine*, *Cigarettes indiennes de Grimault*, *Crystol*, *Cypridol*, *Delbiase*, *Delbosel*, *Elixir polybromuré de Baudry*, *Elixir digestif de pepsine de Grimault*, *Farine malée Vial*, *Fer Girard*, *Fer Leras*, *Gélocalcase*, *Gélodelbiase*, *Glycogène Guarana purifié de Grimault*, *Morrhuel*, *Oxygénase*, *Pastilles Palangié*, *Peptone de Chapoteaut*, *Phosphoglycère de chaux Chapoteaut*, *PNéoline*, *Poudre ferromangannique de Burin du Buisson*, *Quinine Pelletier*, *Rhubarbe comprimée de Baudry*, *Santal Midy*, *Sirop du D^r Dusourd*, *Sirop d'hémoglobine de Grimault*, *Sirop d'hypophosph. de chaux de Grimault*, *Sirop Lagasse*, *Sirop phénique Vial*, *Sirop polyfor-*

miatè du Dr Ph. Chapelle, Sirop de Raifort iodé de Grimault, Strontium Paraf Javal, Sulfodelbiase (cachets), Terpinets, Vin et poudre de Rhinopharynxoil, Vin et sirop de Dusart au lacophosphate de chaux, Vitamina.

Lab. Philippe, 122, fg St-Honoré, Paris. — Oléthyle, Benzyle, Sédopavérine.

Lab. Philbert, 6, av. Mirabeau, Nice. — Blüyl, Néovaryl.

Lab. du Phosphopinal Juin, 10, imp. Milord, Paris. — Phosphopinal Juin, Pulvéol, Pulmodion.

Lab. de Physiologie du Puits-d'Angle, Le Chesnay (S.-et-O.). — Dyspeptine Hepp.

Lab. Phytalia, 47, bd St-Michel, Paris. — Hamacitro.

Lab. de Phytothérapie de Paris, 113, bd Voltaire, Paris. — Amipyrine, Ballotyl, Polyoine.

Lab. Pialoux, 55, rue de Chabrol, Paris. — Aïroglyce, Cédrométhyle, Chlorurol, Dynamoférol, Iodoplume.

Maison du Dr Pillet, 5, av. Victoria, Paris. — Anti-urique de Contrexéville, Beef Lavoix (ou Vin Lavoix), Hygioline Pastilles Brachat, Sodisalyne.

Lab. du Dr Pinard, 90, bd St-Denis, Courbevoie. — Phosphates du Dr Pinard, Calcigénol.

Lab. Plagnol, 18, r. du Maréchal-Foch, Versailles. — Cachets Van Sol, Gaïacamphre.

Lab. Planche, 2, rue Volney, Paris. — Amidon Planche, Eau Sova, Hémophiline Planche, Pilules Stibiées Sirop Thomas.

Lab. Planche, 1, bd de la Madeleine, Marseille. — Térébline.

Lab. du Dr Plantier, Annonay (Ardèche). — Hemopanbiline, Panbiline, Rectopanbiline.

Lab. du Plasmocalcium, St-Just-en-Chaussée (Oise). — Ergépatine, Sédergine.

Lab. J. Plé, 111 bis, rue de Turenne, Paris. — Antiphymique Vadam, Phytosplénol Plé, Phytovitamine Plé, Synergyl Vadam, Thalassotonine Vadam.

Lab. de Pharmacodynamie E. Poincier, Méru (Oise). — Nuphos, Sirop Rambaud.

Lab. Pointet Girard, 30, rue des Francs-Bourgeois, Paris. — Goudroline, Hépatodiagnose, Novismuth, Oxydrol, Soporalose, Vilargyl.

Lab. Pompanon, 62, rue du Cardinal-Lemoine, Paris. — Figadol Vivien, Sulfureux Pouillet.

Lab. Porcher, 35, rue des Blancs-Manteaux, Paris. — Dermacide Porcher, Eczéda, Eczosec.

Lab. Prochimal, 10, r. de Florence Paris. — Actiphos.

Lab. des Produits Biologiques I. M., 28, rue de la Quarantaine, Lyon. — Séro-Comprimés.

Soc. des Produits du Mais, 29, rue de Berri, Paris. — Dextrosol, Maïzena.

- Sté Progil**, 77, r. de Miromesnil, Paris. — *Diasés, Galactolgil, Malt Pailleté, Minergil, Peptogil, Phytolécithine.*
- Lab. L. Prothière**, 55, rue Auguste-Comte, Lyon. — *Fucosine, Fucobiline.*
- Lab. Georges Prunier et Cie**, 4, rue de la Coutellerie, Paris. — *Comprimés Vichy-Etat.*
- Lab. du Plumodynol**, 22, rue de Nemours, Paris. — *Sédarthryl.*
- Lab. du Pulvéol**, 10, impasse Milord, Paris. — *Pulvéol.*
- Sté Purgos**, 7-7 bis, r. Galvani, Paris. — *Limonade Citrose Vichy, Vichy purgatif, Purgos.*
- Lab. Py**, 58, bd Richard-Wallace, Puteaux. — *Baume Py, Phostyl, Sédatif Py, Stomal, Toussyl Py.*
- Sté Pyrné** (M. Lafitte, Pharmacien, Cauterets : Htes-Pyr.) — *Sulfa.*
-
- Lab. du D^r Quesneville**, 12, rue de Bucl, Paris. — *Crème de Bismuth, Crème de Bismuth Chl. magnésienne, Cupro-Salyl.*
- Lab. du Quina Blot**, 38, bd de Strasbourg-Toulouse. — *Quina pepziné Blot.*
- Lab. Quinet**, 143, r. du Temple, Paris. — *Phosol, Quinobore.*
- Lab. du Quinsal** (F. Bolla), 34, rue Thiers, Gray (Hte-Saône). — *Calmel, Curatif Ygra, Liniment du D^r Bernard, Pommade Ygra, Poudre Stean, Quinsal, Sirop Bolla, Tersel.*
-
- Lab. Raby et Cie**, pl. de la Comète, Asnières. — *Biliase Raby.*
- Lab. Raimbaldi**, 30, bd Raimbaldi, Nice. — *Antispasmyl, Coalt Derma, Pipérazyl.*
- Lab. Raimoa**, 264, bd Voltaire, Paris. — *Pastilles des Eaux-Bonnes, Oxydents C. R. S., Pommade Raimoa, Pruritrol Raimoa, Vin Raimoa Tonic.*
- Lab. Ranque et Senez**, 16, rue du Dragon, Marseille. — *Vaccins bactériens I. O. D.*
- Lab. Ranson**, 121, av. Gambetta, Paris. — *Anaxlasine, Leuco-septyl, Opocalcium, Opocalcium irradié, Opoferine vitaminée.*
- Lab. Ravaut**, 6, pl. de Breteuil, Paris. — *Arsenogéyl, Baume merveilleux, Bismutatrol.*

- Lab. Reaumont, 2, rue Boucicaut, Paris.** — *Agarase, Passi-carbone, Passiflorine, Silguine.*
- Lab. Reboul, Pont-Ste-Maxence.** — *Cardiobromine, Choiagol, Créo-suppo-campbre, Ergostol Violet, Sanocure, Tanode, Toni-bronchique, Uribiline, Vitalogène.*
- Etab. Redeuil, 7, r. Couche, Paris.** — *Pain Redeuil.*
- Lab. Regagnon et Cie, 276, rue Lecourbe, Paris (XV°).** — *Amborhinol, Bi-Collyre, Bronchosédyl, Energésines, Sédoplasme, Sedorhinol.*
- Lab. du Reipar, Lucquy (Ardennes).** — *Ampoules Reipar, Ostéopeptine.*
- Lab. Remeaud, 38, av. J.-B.-Clément, Boulogne-sur-Seine.** — *Kluchol Remeaud.*
- Lab. Renard, 35, rue de Paris, Clichy (Seine).** — *Atural Crypthiol, Pneumogéine.*
- Lab. Renard et Cie, 35, rue de Paris, Clichy (Seine).** — *Gaduamine.*
- M. Renaud, 2, rue Pierre-Demours, Paris.** — *Lachesine.*
- Lab. Renault, 24, pl. des Vosges, Paris.** — *Corizol.*
- Lab. du Renovol, 22, r. de Paris, Houilles (S.-et-O.).** — *Gynocure, Peptocalcine, Rénovol.*
- Lab. du Réparateur Thuau, 22, faub. St-Michel, Angers.** — *Réparateur Thuau.*
- Lab. Revel, 34, rue St-Lazare, Paris.** — *Iodonesyl, Philo-gastrine.*
- Lab. Rey, 12, rue Montmartre, Dijon (Côte-d'Or).** — *Ludin, Pommade Crème Ludin, Seroma Rey.*
- Lab. Rhemda, 17, rue d'Hauteville, Paris.** — *Boues radio-actives Rhemda, Bougies radioactives Rhemda, Derma-thorium, Mésothorium Rhemda, Mésothine Rhemda, Nuxolein, Radiargyl, Radiomagnésium Rhemda, Radiovules Rhemda, Thorix (Thorium X Rhemda).*
- Lab. Ch. Requis, 171, av. Félix Faure, Lyon.** — *Antidiabé-tique Requis, Asurol.*
- Lab. du Rhinophta, 82, rue de la Croix-Verte, Albi (Tarn).** — *Produits Orhino, Tubes Ferlux.*
- Lab. Ricardou et Cie, 46, rue Pierre-Charron, Paris.** — *Antibiliaux Fuzor, Bolène, Dentoline, Innerclean, Phos-pharsol, Prises Delqué, Soporigène, Sylvol.*
- Lab. Richer, 45, fg St-Denis, Paris.** — *Colpophile, Comprimés Salvé, Embrocation Richer, Euskine, Florhépatine, Gynométine, Kolarsan, Lactodiasal, Mictophile, Néopulmine, Novaiodal, Oxnol, Salvébyl, Stavafer.*
- Lab. Ringeade, Pharmacien, Fosseboudeau-Blaye (Gironde).** — *Penghawar des Iles.*
- Lab. Bissa, 46, rue Claude-Lorrain, Lille.** — *Colci-Osteline, Glaxo, Iodex, Osteline, Ostomalt.*
- Lab. de Rive, 82-84, rue de Belleville, Paris.** — *Ephédrocure, Gomydrine, Gënox, Minervol, Minervéa, Rhinophé-drine, Rhinora.*

- Lab. **H. Rivier**, 26-28, rue St-Claude, Paris. — *Anégrine*, *Ascoléine Rivier*, *Séro-sérum Rivier*, *Valériane Pierlot*.
- Pharmacie **J. Robert (J. Boudier, succ.)**, 37, rue de Bourgogne, Paris. — *Hémocalciopectine*, *Sédo-Gaz*, *Gouttes Him*.
- Lab. **Robert et Carrière**, 37, rue de Bourgogne, Paris. — *Adral*, *Anacamphre*, *Bacté-intesti-phage*, *Bacté-coli-phage*, *Bacté-pyo-phage*, *Bacté-staphy-phage*, *Bacté-rhino-phage*, *Bacté-dysentériphage*, *Benzylanil*, *Bio-choline*, *Blomucine*, *Néo-dispositif Ravaut*, *Dysurol*, *Endoxène*, *Ennego*, *Entéromucine*, *Ercerhinol*, *Gométer*, *Gométyle*, *Huile grise Ercé*, *Iodo-bismuth Ercé*, *Lipo-bismuth Ercé*, *Lobuline*, *Lysaxins L. M. L.*, *Lysacrème L. M. L.*, *Panphylase*, *Opsomyl*, *Ossical*, *Péraziodol*, *Phlyctol*, *Rectanol*, *Séro-Citral*, *Stannoxyol*, *Supparsol*, *Taenifuge Ercé*, *Tri-iodo-Ercé*, *Vaccin pneumo-entérostaphylo-coccique de Weil et Dufourt*, *Vaccins Renard*, *Xanthocol*.
- Lab. **Roberts et Cie**, 5, rue de la Paix, Paris. — *Allcock's Porous Plaster*, *Antikamnia*, *Bemax*, *Bromidia*, *Calox*, *Coloval*, *Embrocation Roche*, *Hormantoxone*, *Lansoyl*, *Listerine*, *Liverine*, *Magnésie Henry*, *Panopecton*, *Pepsencia*, *Pinéoléum*, *Pinolac*, *Quinacinas*, *Quinolax*, *Ricigel*, *Salsanos*, *Sirop Roberts*, *Sudyl*.
- Lab. **Robin**, 13, rue de Poissy, Paris. — *Bismuthoïdol Robin*, *Bromone Robin*, *Camphydryl Robin*, *Camphydryl strychno-spartéiné*, *Glycérophosphate Robin*, *Glykolaine Robin*, *Iodone Robin*, *Nucléarsitol*, *Nucléatol*, *Peptonate de fer Robin*, *Peptohola Robin*, *Strychnarsitol Robin*, *Sulfoïdol Robin*.
- Lab. **Robinet**, Moret-sur-Loing (S.-et-M.). — *Magnésio tubes Robinet*.
- Lab. **Rochereau**, Salbris (L.-et-C.). — *Dolysine*.
- Pharmacie **Rogé Cavallès**, 116, bd Haussmann, Paris. — *Anoïde*, *Elixir iodépuratif Pépin*, *Suppositoires Rocav*.
- Lab. **Henry Rogier**, 56, bd Péreire, Paris. — *Baume Delacour*, *Insuline*, *Kymasine Rogier*, *Levulose Rogier*, *Suppositoires Pepet*, *Uraseptine*, *Valbornine Rogier*, *Vitamine Rogier*.
- Lab. **Albert Rolland**, 4, rue Platon, Paris (XV^e). — *Hépa-phos*, *Hépatrol*, *Micelliode*, *Stomarol*.
- Lab. **F. A. Rolland**, 85, rue Victor-Hugo, Levallois-Perret. — *Biocatalyseur Rolland*.
- Lab. **Pierre Rolland**, 127, bd St-Michel, Paris. — *Batmiga*, *Hypalène*, *Natrosyl*.
- Lab. **Romon**, 8, rue Bridaine, Paris. — *Ampoules Romon*, *Forvical*, *Globules Romon*, *Limital*, *Magnogène*, *Tranquital*.
- Etab. **Roques**, 36, rue Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris. — *Delcaine Roques*.

Lab. Rosa, 1, pl. Porte Champerret, Paris. — *Chophytol cristallisé Rosa* (ampoules), *Chophytol Rosa* (dragées), *Gynuirol Rosa* (dragées).

Lab. Rousseau, 71, av. de Villiers, Paris (XVII^e). — *Rhagadine Bracquemond*.

Pharmacie Roussel, 10, rue Washington, Paris. — *Tétranitrol*, *oussel*, *Trinitine Roussel*.

Lab. du D^r Roussel, 97, r. de Vaugirard, Paris (VI^e). — *Angioxyl*, *Disonyl*, *Gravidostyl*, *Hémostyl*, *Hépagyl*, *Insulanol*, *Insulyl*, *Proxytöl*, *Trephonyl*.

Lab. du Docteur Roussel, 89, r. du Cherche-Midi, Paris (VI^e). — *Benzo-Gynoestryl*, *Bivatol*, *Casaldyl*, *Folliculine*, *Gynoestryl*, *Isonal*, *Lysarthrol*, *Phytogyl*, *Pyoformine*, *Sterogyl*, *Uroformine Gobey*.

Lab. Routier, 20, rue St-Lazare, Paris. — *Barème Duret*.

Lab. M. A. Roux (M. A. R.), 58, rue de Maubèuge, Paris. — *Antiseptique Nénita*, *Armosine*, *Bili-Magnétol*, *Gastronaldine*, *Glandex*, *Gutturyl*, *Purgelettes Roux*, *Totakiodé*, *Ur-Clar Blanc Bleu*, *Uri-magnétol*.

Lab. Roy, 29, av. Charras, Clermont-Ferrand. — *Ferydal*.

Lab. du Roxoderme, 11, rue des Deux-Ponts, Paris. — *Roxoderme*.

Lab. Sabatier, 10, rue Pierre-Ducreux, Paris. — *Fluodyle*, *Ouataplasme D^r Langlebert*.

Lab. Salantale, 42, rue Grandes-Arcades, Strasbourg. — *Ophthlmo-vaccin Salantale*, *Oto-vaccin Salantale*, *Ovules vaccin Salantale*, *Pommade Vaccin Salantale*, *Recto-Vaccin Salantale*, *Rhino-Vaccin Salantale*, *Salantale*, *Sulfex*, *Suppo-Vaccin Salantale*, *Tracho-vaccin Salantale*, *Tubes Strana*.

Lab. Salavert, Ste-Foy-la-Grande (Gironde). — *Antinéase*, *Sulf-Y*.

Lab. du Sambul, 22, rue St-Pierre, Evreux (Eure). — *Dermopode*, *Sambul*.

Sté des Produits « Sana », Gaillac (Tarn). — *Pain-masse Sana*, *Pates Sana*.

Prod. Sandoz, 20, r. Vernier, Paris (XVII^e). — *Allisatine* « Sandoz », *Baume Panthésine* « Sandoz », *Belladénal* « Sandoz », *Bellafofine* « Sandoz », *Bellergal* « Sandoz », *Calcibronal* « Sandoz », *Calcium* « Sandoz », *Digilamide* « Sandoz », *Félamine* « Sandoz », *Gynnergène* « Sandoz », *Lobéline* « Sandoz », *Optalidon* « Sandoz », *Sandoptal* « Sandoz », *Scillarène* « Sandoz ».

Lab. de la Santhéose, 4, rue du Roi-de-Sicile, Paris. — *Santhéose*.

- Lab. **Sauba**, Montreuil, Paris. — *Adrénaline* (tablettes), *Anthracalcine*, *Boldobyl*, *Cachets Dolozyms*, *Cafédrine*, *Chlorical*, *Codobromyl*, *Dragées Gargarisme de Luchon*, *Gouttes Barkay*, *Neuridor*, *Olisol*, *Saucholine*, *Sau-barsinol*.
- Lab. **Sauze**, 60, rue Jean-Jaurès, Firminy (Loire). — *Ultraformine B et S*.
- Lab. **Henri Schéhadé**, 17, rue de Chomel, Paris (VII^e). — *Asthmasédine*.
- Lab. **Schmit**, 71, rue Ste-Anne, Paris. — *Aseptobiline*, *Galliodine*, *Mangaine*, *Mucigénol*, *Prélase*.
- Lab. des **Prod. Scientia** (D^r E. Perraudin, pharmacien de 1^{re} classe), 21, rue Chaptal, Paris. — *Calcoléol*, *Diabétifuge*, *Digestonic*, *Globexine*, *Huile iodée Finikoff*, *Oxymenthol Perraudin*, *Peptalmine*, *Peptalmine magnésinée*, *Quinéine*, *Staphylococcine Fraquet*, *Tricalcine*.
- Lab. **Seclo**, 6, rue Mathilde, Courbevoie. — *Suppopirine*.
- Lab. **Seguin**, 165, rue St-Honoré, Paris. — *Capsules Joret et Homolle*, *Phosphofluor Beynet*.
- Lab. **Séguin**, 7, rue Saint-Isaure, Paris (XVIII^e). — *Ehtal*.
- Lab. **Séphyda**, Chabeuil (Drôme). — *Séphydine*.
- Lab. **Serindat**, 22, rue Poncelet, Paris. — *Phosphobrom*, *Phosphomagnésium*.
- Lab. **J.-M. Serre**, 7, pl. Pey-Berland, Bordeaux. — *Olcalan*, *Vermifuge Cornet*.
- Lab. **Servier**, 25, rue Eugène-Vignat, Orléans (Loiret). — *Gaduase*, *Iminasthme*, *Muxol*, *Ozodor*, *Pyri-pyridium*, *Spiralgine*.
- Lab. **Sevenet**, 10, rue Le Chapelais, Paris. — *Hémagène Tailleur*.
- Lab. **Sévigé**, 76, rue des Rondeaux, Paris (III^e). — *Ulcéoplaque*, *Ulcéobande*, *Ulcéosine*, *Ulcéosol*, *Ulcéobalnéine*, *Fortal*, *Bigara*.
- Lab. **Siéat**, 15, r. Catulienne, St-Denis. — *G. B. K.*, *Gamétoxy*, *Gastrolues*, *Nergilène*, *Oléovules Pentalués*, *Progone*, *Sféol*, *Sirop Viano*, *Stérobi*, *Suppositoires SFEAT*, *Trépobiur*, *Trilués*, *Tripyril*, *Tséamine*.
- Lab. **S. I. A. C.**, 16, r. Beudant, Paris (XVII^e). — *Jecopeptol*, *Traphéine*.
- Etab. **Silbert et Ripert**, 30, rue Bénédict, Marseille. — *Murones du D^r Robert Jacques*.
- Lab. **Guy Simon**, 44, r. d'Inkermann, Lille. — *Ephargol*, *Essoforme*, *Garsédol*.
- Etab. **Soudan**, 48, rue d'Alésia, Paris. — *Ampoules Boissy* (*Iodure d'Éthyle*), *Ampoules Boissy* (*Nitrite d'Amyle*), *Biophorine Girard*, *Bromomaisine*, *Caséoline Girard*, *Diabétosan*, *Euonymine Thibault*, *Glycérophosphate de chaux*, *Granulé Girard*, *Iode organique Boissy*, *Iodomaisine*, *Lactagol*, *Laxatifs Miralon*, *Laxopeptine Girard*, *Nucléo-Fer Girard*, *Oléocidase Thibault*, *Sirop Girard*, *Valérium Thibault*, *Vasogènes Pearson*, *Vin Girard*.

- Lab. du Sodésyl, Vierzon (Cher). — *Electralgine, Iodo-Dépuratif Jacquet, Sodésyl.*
- Lab. du Spasmonéural, 239, cours de l'Yser, Bordeaux. — *Spasmonéural.*
- *Specia* • (Sté Parisienne d'Expansion chimique), 21, rue Jean-Goujon, Paris. — *Acétylarsan, Alunozal, Anthéma, Asciatine, Balsoforme, Baume Rhodia, Cardyl, Coryphédrine, Crisalbine, Diagnothorine, Dmelcos, Ergorone, Flétase, Foriod, Gardenal, Gelobarine, Gonacrine, Hexorcène, Huile de foie de morue médicinale suractivée Rhône-Poulenc, Hyrganol, Moranyl, Myochrysin, Néocardyl, Néo Dmegon, Néo Dmetys, Neptal, Novarsénobenzol, Ovolécithine, Pâte Gingivale, Pâte Specia, Pragmoline, Propridex, Propidon, Quinacrine, Quinio-Storvasol, Rénaleptine, Rhodarsan, Rhodazil, Rhoféine, Rubyl, Rutonal, Sanedrine, Sanluol, Scurocainé, Scuroforme, Soneryl, Stovaine, Stovarsol, Tabedo, Tecarine, Tochlorine, Tryparsamide, Urazine, Vaccins atoxiques stabilisés.*
- Lab. Spès Guiraud, 10, impasse Milord, Paris. — *Citralin, Elixir Spès du Dr Guiraud, Iodarsenic, Tubes du Dr Guiraud.*
- Lab. de la Star Monopole, route du Moulleau, Arcachon. — *Hodos, Seignet' Fruits.*
- Lab. Stelvia, 59, r. Boissière, Paris (XVI^e). — *Carbo-Combrosmol, Combrosmol, Crème résolutive Stelvia, Granules Edges, Equisétol, Phytomensyl, Plasthamélyne.*
- Sté des Lab. Stène, 2, pl. des Vosges, Paris. — *Bilifluine, Bouillon vaccin opératoire Sténé, Crésopirine, Crésotanol, Flavurool, Hémato-iodine, Hypocholate, Urifluine. Vaccin antiptyogène Sténé, Vaccin anti-staphylococcique Sténé, Vaccins Sténé, Vaccins (anti-asthmatique, anti-pneumonique, antigrippal).*
- Lab. H. Stouls, 156, av. Victor-Hugo, Paris. — *Pangastrol.*
- Lab. Substantia, 13, rue Pagès, Suresnes. — *Calmag-Na, Loraga, Vasonitryl, Véganine.*
- Lab. Substantia (A. S.), 53, r. du Poinçon, Bruxelles. — *Agarol, Anusol, Véganine.*
- Lab. Sulfo-Thioline, 39, r. Fondaudège, Bordeaux. — *Sulfo-Thioline, Thioline.*
- Lab. du Dr Talon, 153, bd Montparnasse, Paris. — *Vin Anti-Diabétique Talon.*
- Lab. de la Tamarine, 4, route de Medoc, Le Bouscat. — *Tamarine.*

- Lab. P. Tavernier, 32, rue de l'Ouest, Paris. — *Cinalose*, *Indoberberine*, *Inhalo-bol*, *Inhalo-sel*, *Mancobène*, *Miroxyl*, *Phospho-Gaïacol Mary*, *Reconstituant Mary*, *Sédosalyl*, *Tisane Hépatique Lahaye*.
- Lab. Testart, Chalais (Charente). — *Gérol Testart*, *Opophytol*.
- Lab. Teyssèdre, 34, fg d'Angoulême, Limoges. — *Sirop Teyssèdre*.
- Lab. Thaidelmo, 23, r. du Caire, Paris (II^e). — (Voir lab. de Microbiologie.)
- Lab. du Théovadil, 85, rue des Morillons, Paris (XV^e). — *Théovadil*.
- Lab. A. Thépenier, 10 et 12, rue Clapeyran, Paris. — *Amylodiaslase*, *Bulgarine Thépenier*.
- Lab. de Thérapeutique, 75, fg d'Ambrail, Epinal. — *Anxi-sédine*, *Pneumogénol*.
- Lab. de Thérapeutique expérimentale médico-pharmaceutique, 366, av. Thiers, Bordeaux. — *Hémostérine irradiée*.
- Lab. de Thérapeutique O. R. L., 72, rue de Bagnaux, Mont-rouge. — *Aminolétine*, *Otolétine*, *Pharyngolétine*.
- Lab. Thévenot, 21, rue des Roses, Dijon. — *Azigot*, *Borocalcyl*, *Choléoboldine*, *Cosmargyre*, *Eupnéol*, *Juniodyl*, *Lactofermentine*, *Phoshémoquinol*, *Santuroil*, *Sirop Belca*, *Thiocitrin*.
- Lab. Thierry, 141, rue de Paris, Angoulême. — *Antéroformine*.
- Lab. Thiriet et Cie, 26-28, rue des Ponts, Nancy. — *Paroxyl*.
- Lab. Thorat, Le Mont-Dore (Puy-de-Dôme). — *Asm*, *Bronchasmine*, *Catarasmine*, *Diuréphédrine*, *Ephédrasmine*, *Garéphédrine*, *Spécifique Thorat*.
- Lab. G. Tinard, 134, bd Pérelre, Paris. — *Dulcilax*, *Pangestyl*, *Salypsol*.
- Lab. du Dr G. Tissot, 34, bd de Clichy, Paris. — *Broncho-dermine*, *Charbon Tissot*, *Diasto-pepsine*, *Magnecy-thine*, *Nervocithine* (*Hépatocithine*), *Suppargyre*.
- Lab. Tixier, 55, r. du Centre, Pantin. — *Bain Bagnor radio-actif*.
- Lab. Toraude, 22, rue de la Sorbonne, Paris. — *Bain Flévar*, *Diumnal*, *Emapirine*, *Hemo-serosan*, *Hépabyl*, *Hypo-sulfène*, *Jabosulfène*, *Lactobactyl*, *Leucagine*, *Leucaginol*, *Levure B. 17*, *Néo-serosan*, *Néo-trépol*, *Précibiase*, *Quinarsan*, *Quinobromine*, *Rectagine*, *Réthragine*, *Sérosan*, *Somnofan*, *Sornyal*, *Spirochtan*, *Staprolysal*, *Trépol*, *Trépoquinol*, *Ultra-Levure*, *Yptor*.
- Lab. Trouette-Perret, 61, av. Philippe-Auguste, Paris. — *Aphloïne*, *Gouttes livoniennes*, *Ispaghul*, *Lin Tarin*, *Nisaméline*, *Oponuclyl*, *Papaine*, *Romaranlyl*.

- Lab. de l'Ulmacetyl et du Spicanol, 54, r. de Sablonville, Neuilly, Paris. — *Hemovitis* (Cachets, Elixir), *Spicanol* (tonique liquide), *Ulmacetyl* (cachets).
- Lab. Unis-Spès, 14, rue Demarquay, Paris. — *Algonal*, *Algophagine*, *Dépuratif Nox*, *Gastéose*, *Gastiase*, *Hémotal*, *Hépatodase*, *Nox*, *Nuclergol*, *Potion Dioga*, *Santalex*, *Sel Marva*, *Stomalex*, *Sympathocrine*, *Tercedal*, *Vacciderm*, *Veinogène*.
- Lab. de l'Uroiodine, 7, r. Jules-César, Paris (XII^e). — *Névraxites*, *Uroiodine*.
- Lab. Uromil L. Bellères, D^r en Ph^m, 19, r. Drouot, Paris. — *Uromil*.
- Usine de la Carnine Lefrançois, 32, route de Metz, Romainville (Seine). — *Carnine Lefrançois*.
- Usine-Laboratoires du Blosset, Moulins-sur-Yèvre (Cher). — *Beef Lavoisier*, *Carnéose du D^r Spès*, *Dépuratif Berry*, *Elixir supertonique Stella*, *Gargarinal*, *Iasthol*, *Manganéol*, *Neurogénéol*, *Potion du D^r Henry*, *Radiobiogyl*, *Vin de Carnéose*, *Vin surtonique du Val Notre-Dame*, *Vitaphorine*.
- Usines Chimiques des Laboratoires Français, 89, rue du Cherche-Midi, Paris. — *Hormuclases*, *Myovarsyl*, *Prévarsyl*, *Uclarsyl*.
- Lab. de l'Uvé-Crinex, 18, rue St-Amand, Paris. — *Crinex*, *Folliculine Crinex*, *Orex*, *Sistex*, *Uvé*, *Uvéstérol*.
- Lab. de l'Uvéoline (M. Ambard, Pharmacien), Carces (Var). — *Uvéoline*, *Uvéovules*.
- Lab. Vaillant, 19, r. Jacob, Paris. — *Audigénine*, *Ifranol*, *Pancréastase Defresne*.
- Valentin Aage Moller, 149, r. du Palais-Gallien, Bordeaux. — *Exhepa*, *Insuline Léo*, *Léotamine*, *Métallosal*, *Sancrysine de Mollgaard*, *Seringues*, *Sulfostine Léo*.
- Lab. du Valéromenthol, 10, rue Poncelet, Paris. — *Caogland's*, *Pancréanne*, *Valéromenthol*.
- Lab. de la Valthène (A. Valat), 166, rue de la Roquette, Paris (II^e). — *Valthène*.
- Lab. Van Lier, 30, r. St-Jacques, Namur (Belgique). — *Asepturine*, *Ferment lactique*, *Hémoplasmine*, *Nucléigénol*.
- Lab. de la Varilaxine, Surgères (Ch.-Inf.). — *Gargarisme du Mont-Dore*, *Rectoline*, *Rectosol*, *Sédacrine*, *Varilaxine*.

- Lab. des Vaso-Rhinol.** — Voir Calmel-Domergue.
- Lab. Vaudin et Guillaumin**, 12, rue Charles-V, Paris. — *Elixir eupeptique Tisy, Prodynase, Quinolane Valguy, Vin de Baudon antiminio-phosphaté, Vitène.*
- Lab. Védé**, 2, pl. Gambetta, Paris. — *Hépalomel, Paquets Védé.*
- Lab. F. Vellay**, 116, av. Berthelot, Vienne. — *Biophylactine M. G., Eupnogénol.*
- Lab. des Prod. Vely**, 132, av. Victor-Hugo, Paris. — *Amphos-thène, Calmogastrol, Disolurante, Eufostyl, Gasto-Entérol, Hypnovel, Kalmogastrol, Lipex, Néospasmodyl, Neuvaritol, Ovules Antiseptiques, Phénacodine Phos-fodgine, Plexorine, Septométrol, Sodatétrane, Wismu-thane.*
- Lab. Venot**, 139, av. Emile-Zola, Paris. — *Bain Salvia, Pilules Salvia.*
- Lab. opothérapique E. Vergelot**, 163, rue de Flandre, Paris. — *Ampolases, Amyliodine, Déméteros, Henrich's bill, Opolases, Mangratines, Matéine Dufert, Morruxine, Paquets P. G. L., Nucléasine, Pastilles Saint-Christau, Sédo Vielte, Siforcina, Sirop Vielte, Splénose, Zistazine.*
- Lab. du Dr Vermersch**, 71, rue St-Jacques, Paris (V^e). — *Bromure de Calcium, Chlomag, Prunagar, Sirops Henry Mure.*
- Lab. Verger**, Ancenis (L.-I.). — *Guimelinde.*
- Lab. Verne**, 13, rue Dr Mazet, Grenoble (Isère). — *Boldo Verne, Pulmoverne.*
- H. Vial**, Pharmacien, 36, pl. Bellecour, Lyon. — *Vin de Vial.*
- Lab. Vésontio**, (R. Thirode, pharm.), 33, Gde-Rue, Besançon. — *Belcarmine, Eczémine, Génecarmine, Gorgex, Hydramélis, Naziline, Omonos, Pilules Norma, S^d dorgine.*
- Lab. Vicario**, 17, bd Haussmann, Paris. — *Adonal Vicario, Andryl Vicario, Bibromure de Hg Vicario, Bromadyl Vicario, Calomel Vicario, Collyre des Alpes Vicario, Dimétol Vicario, Héroïne Vicario, Listose Vicario, Nopirine Vicario, Penghawar Vicario, Plasmodine Vicario, Rhésal Vicario, Trinitrine Vicario, Yohim-bine Vicario.*
- Lab. Vidal**, 46, rue de Grenelle, Paris. — *Isorhinol, Kitine, Phosorine.*
- Lab. F. Vigier et Cie** (Voir : Lab. Jean Huerre et Cie).
- Lab. Vincardi**, 14, av. G.-Clemenceau, Nice. — *Artérion Vin-cardi, Cardion Vincardi, Renion Vincardi.*
- Lab. Vincent**, 14, av. Mac-Mahon, Paris. — *Adréna Vincent, Angitan, Cholécystine, Nigérine, Stérinase.*
- Lab. Vita**, 190, bd. Haussmann, Paris. — *Vitacholine, Vitacuro.*
- Lab. du Viophan**, 81-83, rue de Lille, Roubaix. — *Viophan, Organi-calcion simple, Organi-calcion endocrinien polyvitaminé.*

Lab. Virultra, Launay-Serquigny (Eure). — *Vaccins injectables et Vaccins-pansements Virultra*.

Lab. Visconti, 64, bd Barbès, Paris. — *Carbocitol, Spas-neurol, Veinalgol*.

Sté anonyme des Etab. Wander, 151 bis, route de Joinville, Champigny (Seine). — *Alcacyl, Alucol, Carottase, Christolax, Formitrol, Gloma pur (Calcio Gloma, Ferro Gloma, Gaya Gloma, Glycéro Gloma, Hémio Gloma, Iodo Gloma, Pepso Gloma), Jemalt, Maltosan, Malt Wander (Gloma), Nutromalt, Ovomaltine, Pneuma Vegova*.

Lab. Warin, 4, chaussée de la Muette, Paris. — *Bucminé, Buc-Vac, Cachets Rava, Citrocarbine, Citrofluyt, Fidulax, Hépatogastrine, Hermostyrum, Hydrogemmins Lagasse, Inhaloxyl, Iodassium, Juglamarine, Panfortan, Pastilles Irsi, Staphydex, Vaccin-Irsi*.

Lab. Weber, 5 bis, rue des Haudriettes, Paris. — *Glyco-thymoline*.

Lab. A. Welcker et Cie, 72, rue du Commerce, Paris. — *Bacté-Ricyl, Sanas*.

Lab. de la Yaourtine (L.-J. Mounier), 18, pl. Laborde, Paris. — *Yaourtine*.

Lab. Yvrard, 17, rue Soufflot, Paris. — *Cérébro-lipase, Pneumolipase, Poudre Mass plastique*.

Lab. du Dr Zizine, 24, rue de Fécamp, Paris. — *Aggcholine, Enteropansement, Gastropansement, Peptodiase, Sédogastrine, Vivoléol*.

Lab. Zyma, 9, pl. Félix-Faure, Paris. — *Hémosamine (Uléramine), tablettes Hova, Levure fraîche Mycéla, Levure Mycéla en comprimés, Levure Zymaculine, Lipodélerpénol, gouttes Pilka, Themsaline, Viscum Zyma*.



